

OPERV M GALENI
TOMVS SEXTVS CLAS
SEM SEPTIMAM HABET, QVAE ET

ARTEM MORBORVM CVRATRICEM, ET EIVS-

dem in Hippocratis Chirurgica Commen-
tarios continet.



BASILEAE M▷ D▷ XLIX▷

IN SEXTO TOMO HAEC HABENTVR.

Galenī De medendi methodo libri xiiij. Thomā Linacro interprete.	Colum. 5.
De arte curatiua ad Glauconem libri duo, Nicolao Leonico interprete.	365
De remedijs paratu facilibus liber, ab Hupertō Barlando Philiatrīo Latino sermoni traditus, & à Iun. Paulo Crasso Patauino accuratissime castigatus, addito etiam principio quod antea desiderabatur.	417
De remedijs paratu facilibus ad Solonem, spurius à Iun. Paulo Crasso cōuersus.	447
Liber tertius De remedijs paratu facilibus, spurius, eodem interprete.	485
Documentum de puero epileptico, Nicolao Leonico Thomāo interprete.	517
De incantatione, & amuletis, & colli suspensione &c. incerto interprete, spurius, qui Græce non habetur.	525
De oculis Therapeuticon, Demetrio Græco interprete, spurius: Græcum exemplar desideratur.	529
De renū affectuū dignotiōe atq; medela, Christophoro Heyl interprete, spurius.	565
In libros Hippocratis De uictus ratione in morbis acutis, commentarij quatuor, Ioanne Vasseo Meldensi interprete.	585
In librum Hippocratis De ijs quæ in medicatrīna fiunt, cōmentarij tres, Ioanne Bernardino Feliciano interprete.	745
In librum Hippocratis De fracturis commentarij tres, eodem interprete.	839
In librum Hippocratis De articulis commentarij quatuor, eodem Feliciano interprete.	943

Omnia per Ianum Cornarium Medicum recognita,
& innumeris locis emendata.

ARGVMENTVM LIBRI PRIMĪ.

Primo libro Theſſali arrogantiam conſutat, qua ille a ceteros medicos ſuperſaſſe ſibi videbatur, adeo impudenter, ut Hippocrate quoq; calumniaretur, ut qui noxia præcepta tradidiſſet. Hūc igitur Galenus ſuis pingit coloribus, docens eū neq; dialecticē, neq; quicquam reliquarū liberaliū diſciplinarū tenuiſſe: & à medicinæ conſuetudine prorsus abeſſe. Quippe qui differentias tantū morborū clauſum & fluxū, pro morbis & morborū generibus adduxerit. Veras igitur ſanitatē atq; morbi definitionē Galen. artificio logico inquiri, unā cū enar ratione præcipuorū nominū, quibus artis medica tanq; fundamētū nititur: ut pote actionis; paſſionis, affectus, ſymptomatum, cauſarū, accidentiū, &c. Cap. 1. Quas ob cauſas hæcenus Therapeutica methodum ſcribere diſtulit: inter quas præcipua fuit, uerarū diſciplinarū contemptus. 2. Inuehitur in Theſſalū, quod impudenter Hippocrate reprehenderit qd aliā, tum quod naturæ hominis curioſum nō eſſe oporteat. 3. Reprehendit Theſſali ruditatē in arte diuidēdi, qui differentias morbi fluxum & clauſum morborū ſpecies ſtauerit: cū uel go notū ſit, nō omnē differentia generi additam, ad ſpeciei conſtitutionē aliquid cōducere: ſed eam tantū, quæ ex generis propria diuiſiōe naſcatur. 4. Reddit cauſas cur plerimi in methodo medicinæ errauerint: & exempla Mathematica. 5. De principio in quo oēs conueniunt ſtatuendo, ex quatuor eſſe præſcienda in hac ſciētia. 6. Docet methodum reſolutoria, ut deinceps ad inqui-

ſitionem diſtinctionemq; rerum præter naturā ſe conſeruat. Aliter præparat ſe Galenus ad prædicta quatuor inueſtiganda, nimirū quatuor ad rerum quæ ſunt præter naturā cognitionem: & primum de motu ſecundum locum & alterationē: Quibus cum expēdit etiā paruum ſeu particulariū inſtrumentorumq; illarū operationes. 7. Veterum definitionē morbi diluit, & ſuā conſirmat rationibus. Aliter qd Theſſalus non recte cum in actionis uicio poſuiſſet morbum, in parium tamen conſtitutione ſanitatē poſuerit: cum cōtraria ſub eodē genere collocari debeant. 8. Quomodo diſtinguere oporteat quatuor res præter naturā. Alit. Anacephaloſis prædictorū. Reprehēſio methodicorū qui quatuor hæc cōfundebant, quæ ſunt: 1. affectus & ſtatus corporis. 2. Actiones ſeu functiones quas gignit affectus, naturalis quidē inculpabiles: præter naturā autē uitioſas. 3. Cauſa, quæ hos affectus creat. 4. Symptomata dicta, quæ in ſanis accidentia uocant. 9. Deſtruit morbi ſignificatiōē à quibusdam ueterum prolatam. Aliter, Notat Olympicum, hominē in doctiſſimum, qui neq; quid pathos, neq; quid ſymptoma eſſet, intelligebat.

Aliter, Argumenta primi libri.

Suorum temporū ad bonas artes capeſſendas ignauiam improbat. In Theſſalum ſecūda methodica principem acerrime inuehitur, atq; eius omnia fundamenta deſtruit. Contra ueteres medicos de morbi definitione diſcepat.

CL. GALENI METHODI MEDENDI. ID EST, DE MORBIS CVRAN DIS, LIBRI QVATVORDECIM

Thoma Linacro Anglo interprete.

LIBER PRIMVS



VANQVAM & tu ſæpe aliās chariſſime Hiero, & alij quidam amici me nunc hortantur, ut ſibi medendi methodum cōſcribā: & ego ſanē, tum uobis in primis gratificari, tum uero poſteros pro uiribus iuuare cupio: ſemper tamen ſum cunctatus, ac diſtuli: idq; multis de cauſis, quas nunc quoq; ſatius (opinor) fuerit, prius qd opus ipſum aggrediar, exponere: ſunt enim ad ea quæ poſt dicentur, ſanē non inutiles. Earum igitur omnium illa præcipua fuit, quod fruſtra me ſcripturū timebam: cum nemo, propēdixerim, hæc noſtra ætate ueritatis inqueſtioni ſit deditus: ſed pecuniā, & ciuilem potentia, & inexplēbiles uoluptatū delicias omnes eoſq; ſuſpiciant, ut ſi quis ſapientia quoduis ſtudiū ſegetur, pro infano hunc habeant. quippe qui primam ipſam & uere ſapientia, quæ diuinarū humanarūq; rerum eſt ſciētia, ne eſſe quidem omnino exiſtimēt. Medicinam uero, Geometriā, Rhetoricen, Arithmeticen, Muſicen, ac reliquas id genus artes, eſſe quidē autumant: cæterum finem earum ſtudioſe perſequendū minime cenſeant. Me uero ex ijs, qui me uicē diſligere ſunt uifi, nōnulli

Galen.

ſepe increpāt, quod plus iuſto ueritatis ſtudio ſim addiſtus, quali nec mihi uſus, nec ipſis in tōta uita ſim futurus, niſi & ab hoc tāto ueritatis indagādæ ſtudio deſiſtam, & mane ſalutādū circumcēdā, & uel ſperi apud potentes cōcē. His enim artibus tum amari, tū amicitias cōſiliari, tū uero pro artiſtibus haberi, nequaquā ex priuata ac domi parta induſtria. Neq; enim eſſe qui de ea iudicēt, ubi omnes torū diē diuerſis ſtudijs tranſigāt, mane quidē oēs ſimul ſalutatiōibus occupati, poſt autē diſtracti, ad forum quidē et lites nō exigua turba, ad ſaltatiōes aut & aurigas alia maior. ſā uel aleg, uel amoribus, uel balneis, uel ebrietati, uel cōmeſſationi, uel demū alicui corporis uoluptati deditus ſanē nō exiguus numerus. uel ſperi uero rurſum oēs ad ſympoſia ſimul collecti, ubi poſtq; uino ſe impleuere, nō lyra citharāue, aut aliud muſicū inſtrumentū in orbem circūferē, (quod ſicut olim in eiſmodi cōgreſſu tetigiſſe, honeſtū: ſic cōtrā, nō tetigiſſe admodū erat turpe) ſed nec ſermones ulli habentur, quales in ſympoſiis agitari ſolere ueteres prodiderunt, nec aliud honeſtū quicq;: imō inuicē ſibi propināt, & de magnitudine poculorū certāt: ut poſt inter quos optimus cenſetur, nō qui plurimis inſtrumētis muſicis, aut etiā ſermone philoſophico uti nouit: ſed qui multos, eosq; maximos calices exiccauit, adeo ut mihi mane etiānum ebrj ex his pleriq; uideantur: nonnulli uero etiam euidenter

tom. 6 a 2 adeo

adeo uinum olere, & si modo haussissent. Eoq; iure fit, ut cum ægrotare cœperint, medicos aduocet, non quidē optimos, utpote quos per sanitatē noscere nunq; studuerunt: sed eos quos maxime familiares habent, quicq; ipsis maxime adulant: qui & frigidā dabant, si hanc poposcerint: & lauibūt, cum iusserint, & niuē uinumq; porrigent: postremo quicquid iubebūt, mancipiorū ritu facient: contra q̄ ueteres illi medici ab Aesculapio oriumdi, qui tanq; duces militibus, & reges subditis, imperare agris uoluerunt: nequa q̄ uero Getarum, & Tibiorū, & Phrygum, & Thracum emptiorū ritu parere, atq; obsequi. Itaq; is non qui melius artem callet, sed qui adulari aptius nouit, apud istos magis in precio est: huicq; omnia plana peruiāq; sunt: huic adium fores patet: hic breui efficitur diues, plurimumq; potest: huic discipuli multi a cubiculis, ubi iam fuerint exoleti, traduntur. Quod Theſſalus ille intelligēs, nō solum cætera Romæ diuitibus assentabatur, sed etiā artem sex mēſibus traditurum se professus, quā plurimos discipulos breui cōparauit. Si enim neq; Geometriæ, neq; Astronomiæ, neq; Dialēctices, neq; Musices, nec ulius deniq; bonarum disciplinarū indigēt, qui medici sunt futuri, (quemadmodū Theſſalus iste generosissimus promittebat) nec etiā longā experientia, & operū artis usum desiderat: cui nō promptum sit artem aggredi ceu facile medicō futuro? Atq; hinc adeo fit: ut nunc etiā sutores, & tinctorēs, & fabri, tum materiarij, tū ferrarij, proprio magisterio relicto, in medicinæ artis op̄a insiliant, Quin et rhætopole ipsi, etiā de primo loco certāt. Atq; ob hæc ipse medendi methodū scribere sum cunctatus. quam utiq; & uiri ueteres inceperunt, & posteri eorum perficere sunt conati. Atq; olim quidē nō parua līs erat eorum, qui in Co atq; Cnido habitabāt, utri uidelicet inuentorū multitudinem reliquos superaret. quippe geminū hoc genus Aſclepiadarū adhuc in Asia supererat, deficiente nimirū quod in Rhodo uiguerat. Certabant autē cum his honestum illud certamē, quod Hesiodus prædicabat, etiā medici qui Italiā incolebant, Philſtion, Empedocles, Pausanias, & horum sectatores: erantq; tres hæ certantiū inter se nobilium medicorum scholæ. Plurimos quidē atq; optimos discipulos Coæ fortuna cōtulit: ab hoc Cnidia. Nec tamen in paruo habenda precio erat, & quæ in Italiā nosebatur. At horum nemo nec mane potentium fores ipsos salutaturus, nec uesperī cœnaturus frequentabat: sed sicut Hesiodus cecinit, Namq; alium ditē cernens, cui deest quod agatur, Ipse solum uertit tauris, & semina ponit.

Ita & illi inter se perpetuo certabant, non utiq; de aranda ferendā ue terra, (quippe quæ ut Aſclepiadarum genere inferiora, sic Aſcræo poetæ erāt non indecora) sed de Apollinis Aesculapij arte tum exercenda, tum uero semper augenda, ac prouiribus perficienda. Nunc uero honestū illud certamen intercidit, aut certe minimū eius inter homines adhuc superest. Regnat autē inhonestū: nec est qui hoc auertat, aut malo medeat, ut Hesiod.

A Lis ne te inducat mala deuitare laborem,
Dulce malum alterius cui sit.

Hec em̄ lis, ut Hesiodo etiā diuinior poeta cecinit, Armator primum tenuis, mox improba cœlo Inſerit alta caput, terris uestigia figens.

2 Huius litis stimulis agitatus ille Theſſalus Hippocrate ac reliquos Aſclepiadas maledictis incelsit, ac totius terrarum orbis theatrū in suis ipsius libris constituens, inibi iudicatur, uincitq; & contra omnē antiquitatē coronatur, ipse q; a se uictor declaratur. Hæc facit tum in eo libro, quē de Cōmunitatibus scripsit, tum in Syncreticis: quin in reliquis quoq; omnibus cōtumulosis esse non desistit, ueluti in epistola quam ad Neronē mittit, his ipsis inter initia uerbis usus: Cum nouā sectam condiderim, & quæ sola uera sit, propterea q̄ qui ante me medici fuerūt oēs, nihil utile prodiderūt, uel ad sanitatē tuendā, uel morbos propulſandos.

Pergēs autē in epistola Hippocrates, inquit, noxia præcepta tradidit. Ausus est & Aphorismis eius cum summo dedecore cōtradice. Et cum ostendat se Hippocratica disciplina, nec a quoq; instigatum, nec eius opera sub præceptore legisse: tamen nō ueretur etiā, talis cum sit, palmā sibi ipsi tribuere. Quo magis aliquæ esse mēæ partes uidentur (quāq; alias parum affluerit improbus acerbe taxare) aliquid cōtra hūc ob ueterum cōtumeliā dicere. Quid improbe, quæ bona sunt, calūniatentas, ut multitudinē placeas, cum liceret tibi in ueritatis cōtēplatione excellere, si diligens esses, ac ueritatis amator? Quid ita ruditatis auditorum patrociniō abuteris ad ueterū blasphemā? Nū pater ne artis socios, impudentissime Theſſale, iudices medicorum statues. Istis scilicet iudicibus uinces proculdubio, siue cōtra Hippocrate, siue contra Diocle, siue cōtra Praxagorā, siue cōtra reliquos oēs ueteres dixeris. Quin potius uiros antiquos, Dialēcticos, scientes, qui uerum salumq; discernere sunt periti, qui conſequēs ac repugnās distinguere, qui demonstrandi methodum a pueris sunt meditati, hos in quā iudices in cōſeſſum introducto. His ſedentibus aude quippiā Hippocrate ac cufare. His pronunciatuſus aggredere ſceleſta illa tua, barbaraq; uoce cōtra Hippocrate primum illud diſſerere, Nō oportere de hominis natura curioſum eſſe: deinde, ſi quis hoc donet: male illum de ea inſiſſiſſe, ac falſo omnia præcepiſſe. Ergo quis iudex erit? Num Plator? quādo huic falſe iniurius eſſe minime es auſus. Ego uero ne diſcipulos quidē eius refugia, nō Speuſippum, nō Xenocratem. Ariſtotelis uero, uel roge, iudicium ſubeas, & cum eo Theophrasti. Optem utiq; & Zenonē, & Chryſippum, & eorum qui hoſ ſeſtantur, quibet iudicē eligas. Horum nemo, uir audaciſſime, Hippocratis De natura hominis ſcīta damnauit: quæ tu mihi nec legiſſe unquā uideris, nec ſi legiſti, intellexiſſe. & ſi intellexiſti, iudicare certe de ijs minime gentiū potuiſti, ut qui ſub patre male lanas carpente, in gynæcio ſis alius. Nec enim putēs nos, uel egregiū genus tuum, uel clarā doctri-

C nam, latere. Nec te, Hippocrati & reliquis ueteribus

D

bus in furdo theatro maledicere: sed qui sis, & unde uenias, quo genere ortus, qua educatione usus, qua disciplina imbutus, prius ostende; atq; ita demum dicit, Illud ipsum prius uir audacissime monitus, nō esse cuius in ulla bene instituta ciuitate cōcessum, publice dicere: sed si quis uir clarus est, qui genus possit, & educationē, tum uero eruditionem cōcōtatione dignā ostendere, huic dicere permittunt leges. Tu cum nihil horum ostendere habeas, audes tamē homo generosissime, Hippocratem accusare: facisq; in nugacibus libellis tuis Græcos sedere iudices: fers aut ipse sententiā, nec illorum expectas. Et palmā tibi ipsi das, modo de omnibus medicis, modo de omnib. in uniuersum Græcis. Hæc enim insignis audacia sapientissimi scilicet Thessali est, oēs se medicos uicisse, sed se ipso litigatore, seipso agonothea, seipso iudice: post hos etiā reliquos Græcos in certamen prouocasse, Rhetoras, Geometras, Grāmaticos, Astronomos, Philosophos: inter quos cōstitutum, ac laudis elocutione usum, celsere se omniū primum esse, quippe medicinā reliquas oēs artes præcellere, se uero medicos omnes superasse. quod unum forte fortuna recte collegit. Si enim medicina est omnium artium præstantissima, in ea uero Thessalus primas partes obtinet, utiq; omniū hominum ita sit primus, ac Socratē & Lycurgum præcellat, ceterosq; oēs quos Pythius, uel ut uiros bonos, uel ut sapientes, uel ut musarū ministros, uel ut louis famulos, uel deniq; ut alio quolibet munere dijs gratos laudauit. Agedum igitur Thessalo hymnos de cetero omnes cantet, scribantq; uictorie carmina, et publicum orbis theatrum cōstituant, acceditoq; aliquis, qui canat eum, qui in textrina sit altus, uicisse Demosthenē, Lysiam, & reliquos Rhetoras: superasse Platonē, Socratē, & ceteros Philosophos: palmā eripuisse Lycurgo, Soloni, & alijs legislatoribus: uictorē deniq; totius hominū generis coronatum esse, Rhetorum, Philosophorum, Legislatorum. Nam si Geometras, etiam & Grāmaticos, ac Musicos, nominatim post tantos titulos cōmemore, cōtumeliosus in hominē uidear. Vbi enim Lycurgus, Solon, Plato, Socrates, & Pythagoras dant manus: num pulchrum etiam sit, Hipparchi, Archimedis, Aristoxeni, Aristarchi, & aliorum quorundā id genus meminisse, ho minū (ut Thessalus dicat) nullius precij? Sed quis tam magniloquus poeta nobis existet, qui hæc canet? Quis nūc dabitur Homerus, qui hexametro tono hæc Thessali uictoriā celebrabit? aut quis Lyricus, qui ueluti Pindarus alte in dithyrambis canet: quicq; sicut olim Bacchi, ita nunc Thessali præconium efferet? An horum potius nullum requirimus, sed eorum qui iambos scribunt, Archilochum aliquē, aut Hipponactē, aut ex Tragica scena quempiam, qui sic hominem compellet: Quiesce dum miserime in fratribus tuis, Namq; haud uides, quæ te putas nosse probe.

Orestis mihi somnium narras Thessale. Qualenam id theatrum est, in quo tu uincēs Hippocratem? Qui iudices erunt? Qui nam præmia propo-

Galen.

nent? Visne primum Platonis suffragiū legamus: fortasse em hunc iudicē nō reſicies. Atqui ille hæc ad uerbum ait: Animæ igitur naturā apte putas intelligi posse, nō cognita totius naturæ. Imō, siquidem Hippocrati ex Asclepiadarum genere fides est habenda, ne corporis quidē naturā absq; hac methodo. recte eis amice; oportet tamen insuper ad Hippocratē, etiā rationē expendere, & an consona sit uidere. Sanē quidē. Igitur de natura cōsidere, quid est qd Hippocrates rectaq; ratio dicit? Num ad hunc modum? de cuiusq; rei naturā primum illud perpendi oportet, sitne de quo uolumus uel ipsi scientes esse, uel alios facere scientes posse, simplex, an uarias species habeat. Mox si simplex sit, facultas eius æstimanda est, quam uidelicet ad quid agendum obtineat, aut quā ad patiēdum ab alio sit sortitum. Sin plures habeat species, his enūmeratis, quod in una feceris, id in unaquaq; exigere oportebit: nempe quid illa facere per suā naturā sit apta, uel quid ab alio pati. Audisti uir bone Platonē simili methodo animæ naturā inueniendā esse censere, qua corporis naturā Hippocrates? An adhuc uis multas hominis dictiones ex multis librorū eius locis deligā, in quibus ille Hippocratē omnium qui ante se fuerunt, maxime admiratur? An potius, cum id alibi fecerim (nempe in eo opere, in quo de Hippocrate, & Platonis placitis differui) illuc, qui id scire uolet, remittam; ubi, ut arbitror clarissime ostendimus, in plurimis maximisq; rebus horum hominum inter se cōsensum: atq; aliō me conferēs, alium tibi iam aduocē in testē cōtūm, nempe Peripateticum, qui & ipse Hippocratis physiologiæ principia confirmat? Quin de hoc q; proditū a me in alijs cōmentarijs est, quorum unus De elementis secundum Hippocratē inscribitur: post hunc alij tres De tēperamentis: mox alij duo, alter De inæquali intēperie, qui etiā ad tractationē de tēperamentis pertinet; alter De optima corporis cōstitutione; deinde etiā tres De naturalibus facultatibus: hos igitur si quis legat, clare perspiciet, rationē Hippocratis de natura, Aristoteles interpretē esse. Quin etiā de morborū discrimine, quothī, quicq; sint, ac de symptomatis pari modo: præterea de horum utrorumq; causis, primus omnium quos nouimus, Hippocrates recte principia dedisse uidetur. Post eum uero Aristoteles fusissime ea est interpretatus. Hæc ita esse intelliget, qui cōmentarios nostros, quos de singulis horum scripsimus, legere nō grauabitur. Quare si Peripatetici iudicium exercebunt, Hippocrates (arbitror) uincet: Thessalus ut impudēs, & nequā efficietur. Sin Stoicis philosophis in cōsensum admissis iudicium permittetur ex ijs placitis, quæ ipsimet statuūt, Hippocrati palmā dabūt. quippe calidum, frigidum, siccū, & humidum, primum Hippocrates inuexit: post eū Aristoteles demonstratione asseruit. Eadē Chrysippus paratā cū accepisset, minime est oblectatus: sed omnia ex horū mixtura cōstare cōfirmat, atq; hæc inter se mutuo agere ac pati, artificēq; naturā esse. omnia deniq; alia Hippocratis dogmata de natura recipit.

tom 6

a 3

nili

nisi quod in re tenui est illi cum Aristotele dissensio. quippe cum recte Hippocrates affirmet totum corpus esse (ut Græce dicitur) *σύνολον ἢ σύμμελον*, quasi conspirabile & cōfluxibile dicas, omnesq; animalis particulas mutuo a se affici: recipiunt quidē hoc utriq; dissident tamen in eo qd Aristoteles qualitates tantum in se mutuo transire, omninoq; misceri, Stoici non has modo, sed etiā substantias ipsas existimant. Quod autem hoc definire medico superuacuum sit, quodq; ad medicinæ opus ab unde sit, si tantum concedantur ea quæ ab utriq; sunt demonstrata, item qd qualitates uirtutesq; in mistis totæ sint totis permixtæ: hæc & ante a me sunt demonstrata, & si res poscet, nunc demonstrabuntur. Quare & Platonis, & Peripateticorum & Stoicorū iudicio, Hippocratis physiologiæ uictoria dabitur. Imò uero ex eius physiologia omnes, qui iam cōprehensi sapientiæ professores sunt ostendunt nemini fas esse morbos cōmode curare, qui corporis uniuerſi naturā nō perspexerit. Num quid igitur si de palma sub horum sapientiæ professorum iudicio certasset Theſſalus, uicisset, qui omnis suæ physiologiæ Hippocratem autorem habent. Quid autem si Geometris, Astronomis, Musicis, aut Rhetoribus iudicium concederet: putemus hos Hippocrate prætermisso, alij ulli palam daturus. Ego sanè nec alium quemuis primas esse laturum arbitror, omniumq; minime, impudentissimū Theſſalum, ut quo nemo Geometriam, Astronomiā, Musicen, ac Rhetoricen magis dehonestarit. Itaq; hac saltē ratione apud hos in parum amico theatro certauerit. Verū hos satis in theatrū minime inducet, utpote quos ipse prior inimicos reddiderit: sed ijs sapientiæ professorum dumtaxat, qui in Dialectice sunt periti, ut qui ueræ falsæq; orationis iudicandæ facultatē exercuerint, iudicium partes cōcedet. Atqui, si Platonem, Aristotelem, & Chrysippū, ceu parum in hac facultate exercitatos transibimus: quos nam, quæſo, alios inueniemus? Quare si nec aliarum artium professores iudices admittet, nec qui in Dialectice cæteris omnibus sapientiæ professoribus præstiterunt, illi suffragabuntur: qui tandē erunt, qui eum uicisse iudicabunt. Qui illi frequēs theatrum cōstituerunt? Qui uictorem pronuntiabunt? Qui deniq; coronabunt? Ipse uidelicet seipsum id quod in illis egregijs libris suis fecit, in quibus se ipsum iudicauit, coronauit, uictorēq; declarauit.

3. At fortassis illud sibi gloriæ memoriæq; inter homines occasione fore est arbitratus, si optimis uiris lacesſitis, nos sibi respōdere cogeret. Verum ita & Zoilus celebris clarusq; sit, qui Homerī statum flagellauit, & Salmoneus, qui Iouem est imitatus, reliquaq; flagitiosorum hominum non exigua turba, qui uel meliores non sunt reueriti, uel in deos ipsos fuerunt contumeliosi. Verum hi non bonam de se opinionē reliquerunt, nec æmulatur quisquam, qui compos sit mētis, nec Homeromastiga Zoilum, nec dementem Salmoneum: quauis maledicis Zoilus in admiratione sit, & Salmoneus sacrilegis. Sed quid hos memoror? Cū &

qui loculos præcidunt, similia perditorum studia, & proditores proditorum, suspiciant: nec est prorsus quippiā, qui proprium cœtum, in quo palam mereatur non desideret. Adeo si Theſſalus inter coquos, tinctoros, lanificos, sutores, textores, ac fullones, de uictoria certans scripsisset, utiq; & retulisset de Hippocrate uictoriam, & nemo nostrū ei repugnasset. Nūc cum omnes homines iudices facit, ex horum aut numero sunt & Plato, & Aristoteles, & Theophrastus, & Chrysippus, nequaquā omne punctum solus feret, sed alicui fortassis prouocare ad alium iudicē licebit. Quancum enim Hippocrates certare cum Theſſalo, utpote indigno se, nollet: at forte Erasistratus nō negliget multoq; minus Herophilus, atq; his etiam minus Asclepiades, aliq; multi iuniorum medicorū, quibus est ad contentionem natura propensior, minime impune abire contumeliā sinent, quæ pariter omnes Græcos Theſſalus aspergit: sed producto in medium homine, omnes eius libros, crassissima ignorantia refertos, Græcis ostendunt: qui totæ tantis libris scriptis, & tot nugacissimorum uersuum milibus effusis, nusquā in ullo operum uerum demonstrationem ullam asserre tentauit: sed tyrāni ritu duos tantum esse in omni uictus ratione morbos iubet, nempe fluxum, & clausum: non intelligens se differentiam quandam morborum dixisse, quam utiq; priſci (ut ostēdemus) probe norunt. Cæterum, nemo tam rudis fuit, ut differentias morborum ipsos esse morbos putaret: ac remedium indicationem ab ijs sumeret, substantia ipsa prætermissa. Atqui hic Theſſali paruus scilicet error, quem uel puer in liberalibus disciplinis altus statim aduertisset, hic inquam paruus error, eō insolentia hominē euexit, ut magnum & præclarum aliquid inuenisse se putaret: perinde ac si quis cum omne animal rationale esse, aut irrationale dixerit, non animalium differentias, sed aliud quippiam dixisse se putet: cum scilicet huic illud quoq; similiter sit dictum. Omne animal mortale est, uel immortale. Quippe oppositio, quæ in singulis differētijs notatur, cōiuncta de omnibus speciebus dicitur. omne enim animal, aut mansuetum est, aut ferum. Omne animal, aut pedatum est, aut apes. Omne animal, aut cornutum est, aut cornuum expers. Nec est inter differentias inuenire oppositionē ullam, quæ sit altera præstantior, aut potior, nec quæ magis omnibus insit particularibus. Verum nō cōuenit cum de animalium numero quaritur, unā differētiarum oppositionē respondere. Hoc enim pacto duo erunt animalia uniuerſa, nec ullum magis rationale, uel irrationale, qd mortale, uel immortale, aut ferum, uel mansuetum, aut reliquarum oppositionū quælibet. Quod si quis differētijs omnis (sic ut planè ratio exigit) equū, bouem, canē, hominē, aquilā, apim, formicā, leonē, & ouem respōdeat, reliquaq; omnia per species animalia cōnumeret: constat hunc querentē quot sint in totum animalia, recte respondisse. Quin si multa quidē sermone animalia memoret, testetur autē enumerare se omnia nō posse: sic quoq; cōmode dissimile

disimile respōderit. Similis agitata quæstio de morborum numero, & omnibus antiquis medicis est: alijs septem eos in totum esse affirmantibus, alijs plures his, pauciores dicentibus: omnibus tamen ad species quæ in substantia, non quæ in differentia essent, respectum habentibus. Nemo enim ita erat indoctus, aut Logicæ speculationis rudis, ut differentiam specierum pro substantia loquendo usurparet: quemadmodum Thessalus iste, qui e gynacio exiliens, tantis uiris maledicit, ipse nec genus habes quod referat, nec educationem, nec eruditionem, qualem illorum quisq;: quorū alius Aristotelis, alius Platonis, alius Theophrasti, aut denique alterius cuiusquam eorum, qui in Logicæ cōtemplatione fuere exercitati, familiaris fuit. Velut igitur rogatus quispiā, quot sint in uniuersum uocis elementa: si duo esse respōderit, quippe aut uocalem omnino, aut cōsonantem esse quicquid uocis sit elementum, is uerum quidem dixerit: cæterum ad quæstionem non responderit. Ad eundem modum, arbitror, si quis omnium morborū numerum comprehendere studens, speciem quidem ullam morborum, ueluti phlegmonem, scirrhum, uel oedema, referre nō curet, solas autem differentias memoret, siue clausum & fluidum, siue rarum & densum, siue durum & molle, siue tensum & laxum, uerum hic quoq; dixerit: minime tamen ad quæstionem responderit. Primum namq; in eo error est, quod non omnis differentia generi addita, ad speciei constitutionē aliquid conducit: sed quæ ex generis propria diuisione nascitur, quippe hæc diuisionis differentia sunt, quæ species constituent: reliquæ omnes alienæ. Etenim animalis propriæ differentia sunt, mortale & immortale, rationale & irrationale, mansuetum & ferum, aliq; id genus. Molle uero ac durum, graue & leue, rarum & densum, magnum & paruum, animalis differentia non sunt, sed substantiæ. Itaq; etiam si cum animali, uel molle, uel durum, uel densum, uel rarum, uel magnum, uel paruum, cōponas: ad speciem cōstitutā nihil sane plus contulerint. sin uel rationale & immortale, uel rationale & mortale animali adieceris: efficitur iam illic deus, hic homo. Ita uero & si rationali animali duas illas differentias peculiāres addideris, quæ sunt gressile & bipes, sic quoq; speciem quampiam effeceris: nempe hominē. Unde fieri non potest, ut ullius rei specificas differentias inueniat, qui eam definitionē, siue substantiæ ipsius oratione ad unguem non circumscripterit. Alius deinde error incidere solet ijs, quibus parū exercitata ratio est, quod cum unam aliquā differentiarū oppositionē inuenerint, speciem aliquam propositi generis se putēt inuenisse: ceu paulo ante de uocis elementis est dictū. Siquidē qui uocalem & cōsonantē dixit, nondum omnia humanæ uocis elementa dixit, sed duas tantū primas & generales differentias. Quod si uocales rursus in longas, breues, ancipitesq; diducens, tum cōsonantes in semiuocales, & mutas: itemq; tum longas, tum breues uocales bifariā; ancipites uero trifariā: sed & mutas primum in aspiratas, tenues, ac medias:

A deinde rursus tripartito harū singulas, mox semiuocales propria (ne frustra multis morer) sectione fecit: ita quatuor & uiginti elementa uocis, quæ Græci utuntur, inueniat: quippe id tantū dixisse, qd elementorū uocis quædā uocales sint, quædam cōsonantes, nondum omnium elementorum artificem, aut planē scientem auditorem reddidit: sed si quis ubi in longas, breues, & ancipites diduxerit, adijcit duas esse breues, nempe *ε* & *ο*, duas præterea longas, *η* & *ω*, tres uero ancipites, *α*, *ι*, *υ*: sic sanē artificem auditorem de omnibus uocalibus effecerit. itemq; de cōsonis ad eundem modum. Itidē si quis tradere de morborū numero instituat, quot hi in uniuersum sint, non debet, arbitror, is in prima statim differentia subsistere, sed diuisa ea procedere, donec ad aliquam infimarum specierum, & quæ amplius in aliā distrahi non possit, perueniat. Id uero quāu haud cuiq; sit promptū, sed ei diutinat, qui in diuidendi arte magnopere sit exercitatus, intelligere quisq; poterit, primum si omnia legerit, quæ de eo genere methodi in principio Philēbi à Platone sunt prodita, deinde si Sophistā etiam & Politicū legerit. Iam uero difficilior adhuc res uidebitur, si quis primum Aristotelis librum De partibus animalium legerit. Conatur enim in eo libro, omnes animalium differentias enumerare, at ubi multas dubitationes mouit, uix tandem suspicte ac timide pronuciare quippiā audet. Et cum Aristoteles & Plato tantam tamq; difficilem rem esse censuerint genera in proprias differentias exacte diuidere, ac post hos Theophrastus et alij philosophi rationem absolueret tētauerint, utpote ne apud illos quidem satis adhuc constantem, homo audacissimus Thessalus absolute, citraq; ullam rationem adhibitam pronuciāns, credendum sibi censet, duos in totū esse in uictis ratione morbos, & eos quidem simplices, ac primos, & ueluti elementares. nam tertiu ab his ratione gignit, ex ambobus compositum. At si ulla methodo hæc, sicut iactas, inuestigasti: cur hanc nobis nō dixisti? Sed contra planē qd pro grauitate nominis, quod tibi arrogas homo temerarie, atq; à methodo alienissimē, rem pronuciasti, qui ne principium quidem ipsum unquam attigeris, à quo coepisse necesse sit eum, qui recte cuiuslibet rei species, & differentias peculiāres sit inuenturus. De re enim qualibet, dpuer, unum principium optimum, nosse id oportet, de quo proposita quæstio est: aut prorsus est aberrandum, (Plato quodam loco ait) non ad diuidendū modo quiduis, ab ipsa quæstione rei essentia nobis esse inchoandum censens, sed etiam in omni disquirenda re eiusmodi semper principio utendum. Ergo hic quoq; (arbitror) par erat, ubi quid morbus sit, quid symptoma, & quid palsio; diligenter prius dixisses: ac deinde qua conueniant, differantq; ipsorum singula, definiuisses: sic deum tentare in proprias ea differentias diducere, secundum eam quam sapientiæ professores tradiderunt methodum: aut si quam potiorē ea, quæ ab ijs prodita est, explorasses, hanc ipsam prius astringere, tū illud offendere, ac Græcos docere, hūc

qui in tetrina sit altus, superasse Aristotelem, & Platonem in Methodis Logicis, humo afflixisse Theophrastum, & Stoicos in Dialectice, clarissime ostēdisse, omnes eorum sectatores, ne primos quidem morbos, qui essent, unquam nouisse. dico & Herophilum illum Dialecticum, & cōdiscipulum eius Philotimum, & preceptorem eius Praxagoram, qui ab Aesculapio originem traxit, & qui cum his & ante hos fuerunt Erasistratum, Dio cle, Mnesitheum, Dieuchen, Philistionem, Plistonium, ipsum deniq; Hippocratem. Porro, simplici uerbo dicere omnes, in uictu morbos esse duos, non methodo, non demonstratione, non ratione ulla probabili, non lenimento aliquo, non alia re prorsus adhibita, preterquam eiusmodi in ueteres blasphemiam, id facere intemperantis hominis est, nō docentis. Esto uero taceas qua Logica methodo insistentes, hæc inueneris: at certe unde saltē de ueritate sermonis iudicasti, adhibitum aliquid oportuit. Nam inueniendi eius quod queritur, Logicae methodi facultatem præstant. At quæ fidem ijs faciant, quæ recte sunt inuenta, duo sunt apud omnes homines instrumenta, nempe ratio, & experientia. Quippe ad eū qui interrogauerit: Cur huic febricitanti frigida bibendæ potestare feceris, duplex responsio est. Altera, quæ ortū naturamq; febris docet, ac de morborum temporibus differit. tum ad eundē modum aquæ frigida naturam explanat. ubi hæc proposuit, conatur docere in hoc morbo, atq; hoc tempore, aquam frigidam congruum remedium esse. Altera de nullius horū natura sollicita, ad experientia cōfugit. nempe quod in tali morbo atq; tempore sæpe frigidam profecisse uidit. Debebat igitur (ut opinor) & Thessalus uel experimentum, uel rationē assertioni suæ probationem adhibuisse, non sicuti tyrannus imperare, ac sibi citra demonstrationem credendum exigere. At quam (inquiunt) audire demonstrationem postulas? Ita enim contra nos interrogant eius sectatores: neq; id iniuria, ut qui nec eō unq; peruenerint, ut notionem demonstrationis tenerent, cum nec Geometriam, nec Arithmeticē, nec Dialecticē, nec resolutoriam, nec deniq; Logicam ullam speculationē attigerint. Quocirca respondendum his ita est: Nimis serō, quid demonstratio sit, discere postularis: nec fieri potest, ut breui tempore speculationem, quæ subtilitatem mentis desiderat, assequamini: præsertim qui nec subtilēs rationēs audire sitis assueti, & peruersi in diuturno errore uersati. Sed istos mittamus, ut qui ne intelligere quidem, quæ ueræ disciplinæ sint, ualeant, nedum ipsas discere, aut recte iudicare.

4 Nos uero unā cum ijs qui exercitati sunt, & demonstrationem intelligunt, & natura sunt sagaces, (neq; enim Thessalios asinos docere profitemur) ad id quod propositum nobis ab initio est, accingamur: ac statim unā cum ipsa medendi methodo tradenda, etiam causas ipsas unde errant medicorū plurimi, qui tradere eam sunt conati, exponamus. quippe ad firmiorem ueritatis fidem id quoq; non parum cōducere uidetur. Ac primum

A quidem illud cauebimus, ne simul de ambobus tum methodo quæ ratione nititur, tum experientia quæ ratione non utitur, agamus. Non enim de omni remediorum inuentione nunc loqui statumus, sed tantū de ea quæ hæc methodo explorat: ita utiq; ut de Empirice ipsa & a nobis in alio opere est proditū, & ab ipsis Empiricis medicis, quos uocant, plurimū elaboratū. Atq; utinam Rationales omnes medici propositū ita premeret nec experientiam & rationē miscerent, atq; in unū cōfunderent: sed quam utraq; habeat, quantūq; ad propositum artis finē cōducatur, seorsum tractaret, atq; perpenderet. Ergo methodo quippiam inquire inuenireq; ex aduerso opponit ei quod est fortuito, temereq; reperire. Est autē id cum uia quadam, & ordine, ita ut in disquisitione aliquid primum sit, aliquid secūdum, & tertium, & quartū, atq; ita de reliquis omnibus deinceps, quoad demū ad ipsum quod ab initio est propositū, sit peruenitū. Ac Empirici quidē rationabiliter fatentur, nec inueniēdi, nec docēdi apud ipsos necessariū ordinē, nam nec arte ulla rationē uel experientiam niti, imō unius fortunæ fauorē ad ea quæ querit, inueniēda requirere. Qui uero rationē, inuentionis suæ auctore statuerūt, ac ordinē, unamq; uiam, quæ ad finē ducat, proposuerunt: ijs fuerat quidē necessariū a primo aliquo auspiciis, de quo inter omnes homines conueniret, sic transire ad reliqua. Ceterum hanc rationē nō sequitur pleraq; medicorum pars. imō principia quoq; ipsa controuersa sumit, nec illa demonstratione cōfirmat. tum ad reliqua simili modo transit, legislatorum ritu fanciens uerius, quā demōstrans. Quæ omnia inde adeo his accidunt, quod nihil prius de demonstratione sunt meditati: sed simul & inquisitis insiliūt, & ad eorum fidē demonstratione uti audent: simile profecto quiddam ijs molientes, qui sphaeram, aut cubum, aut conum, aut cylindrum, aliusdūe id genus metiri aggrediuntur, cum tamē omnis Geometriae ac Logisticae rationis sint ignari, imō uero nec cubiti palmiū, aut pedis mensuram præparatam habeant: ac deinde ijs qui uel demonstrationē ab ipsis exigunt, uel tacere consent, irascuntur. Veluti enim in illo ridiculus eritis, qui rectanguli trigoni, cuius alterum (exempli causa) latus circa rectum angulum quinq; sit pedum, alterum duodecim, dicat aream nō esse triginta pedum, sed quadraginta, nec eius rei demonstrationē ullam afferat: ita hic quoq; ridiculus est, qui quicq; affirmat, quod demonstrare nō possit. Ergo sicuti in demonstratione de triangulo (neq; enim recedendū nobis ab exēplo est, qui in doctos istos methodicos ad disputatione nostra iam abegimus) ipsum quod propositū est, ex duabus his propositionibus colligebat: una quæ spatium id quod lateribus pedum quinq; & pedum duodecim cōtinetur, sexaginta pedum effici dicit: altera quæ triangulū dimidiū eius esse spaciū proponit, atq; ostendit. harū utraq; rursus ut demonstrationis fidem reciperet, alijs propositionibus egebat. mox illæ alijs, quoad peruentum ad primas esset. hæc uero nec ex alijs, nec

per demonstrationem, sed ex se fidem faciunt: sic arbitror & in ijs omnib. quæ in medicina demonstrantur, ad primas & in demonstrabiles propositiones, & quæ ex se fidem faciant, omnia esse perducenda. Ac si omnes de medendi methodo sic dicere aliqui instituisent, prius sicuti inter Arithmeticos, Geometras, & Logísticos: ita inter ipsos quoque conuenisset: quippe apud nos dicere ab ipso sitam initio licet, quid quoque nomine, quo usuri sunt, significet: quas præterea propositiones in demonstrabiles (quæ axiomata uocant) ad disceptionem sunt sumpturi: ueluti lineam esse longitudinē citra latitudinē: superficiem, quæ longitudinem latitudinemque tantum habeat: & triangulum esse hoc, quadrangulū illud: ac reliqua ad eundem modum. Ab ijs ubi axiomata eiusmodi usurpanda sibi esse prædixerint, quæ scilicet quæ eidē sunt æqualia, inter se etiam esse æqualia: & si æqualibus æqualia sint adiecta, tota fore æqualia: postea demonstrare theoremata iam tentant, nihil extra ea quæ a principio præsumpserūt, adijcientes. Plerique tamen medicorum, sicut ipse scis Hiero charissime, interrogati undenam principium inuentionis suæ sumpserint, tantum abest, ut in demonstrabilia principia, & quæ omnibus hominibus in confesso sint, proferant, ut nec quod sibi ipsi consona respondeant, inueniant: sed sursum ac deorsum Euripi more agantur, contraria quisque in progressu sermonis ijs quæ ab initio statuerunt, afferentes. Siquidē sapientissimus iste Thessalus, cum apparentes esse cōmunitates dixisset, paulo post nō solum nō alium quenquam priorū medicorū uidisse eas asseuerat, sed nec ipsum qui primus eas peperit Themisonem. Huius namque unus esse monstrifas illas cōmunitates fatetur, ceu patris legitimus filios. Post hos uero qui secuti sunt omnes, & inter se, & ab ipso Thessalo dissentiunt, nec easdem cōmunitates tradentes, nec omnino inter se uel in uno concordantes. Id quod sepe numero tibi, ipsis etiam Methodicis præsentibus, ostendi: fortasse quod aliquando maius oculus nactus, de inconstantia eorum scribam. Ac nunc tantum saltem ad rem propositā sumi expedit, oportuisse eos præsertim sedicere autores exposuisse prius de qua res singula nomina dici uellent, sicut Empirici faciunt, qui appa-
 rere ea dicunt, quæ sub sensum cadunt, nosci uero, quæ memoria tenentur, apparere simul & nosci, quæ & ante aliquando sub sensum uenerunt, & nunc simili modo ueniunt. Num igitur ita ipsi quoque appareere cōmunitates dicunt, ceu sensu cognitæ? An & quæ ratione comprehendimus, apparentia nominant? Empirici namque non admodum concedunt quicquam ex ijs, quæ sola ratione nosci uidentur, appareere dici. Rursus ueteres philosophi duplex esse genus apparentium decernūt. Vnum quod ipsi Empirici comprobant, nempe eorum quæ sensu aliquo noscuntur, ueluti albi, nigri, duri, molles, calidi, frigidi & similia. Alterum inde monstrabile, eorum nimirum quæ intelligentiæ primo occurrit parent. ueluti quæ eidem sunt æqualia, ea etiam inter se esse æqualia, & si æqualibus

A æqualia addantur, tota etiam æqualia fieri. & si ab æqualibus æqualia demas, quæ restant etiam æqualia fore. Huius esse generis autem, & quod nihil citra causam fiat, & quod omnia ex ente quopiam, & quod ex eo quod omnino non sit, nihil fiat. simili modo nihil corruptum in id quod omnino nō sit, ite quod affirmare, uel negare de quoque sit necesse: aliaque id genus nō pauca, de quibus in Logicis tractatibus agitur, & ipse in cōmentarijs de demonstratione, quam potui, dixi clarissime. De his inter eiusmodi principia, cuiusmodi Logica nuncupamus, quidā Philosophorum contendunt, atque ambigunt. hi tamen haec tenus salte sunt modesti, qui omni demonstrationi fidem suam abrogant, intelligentes (arbitror) tamen si id non dicant, illud salte se certo scire, nihil omnino demonstrari posse, si logicis principijs fides non sit adhibita. At qui eousque rudes amentesque sunt, ut ne id quidē intelligere queant, hi demonstrare quidem conantur, ceterum quæ, qualia se [aut quot] demonstrationis principia sint, nec noscere, nec querere uolunt, nec alius doctorem audire sustinent: sed absolute pronuntiant, & uerba loquuntur, quæ nec quid significant, ipsi clare explicare ualeant. Merito igitur eorum emulis centum uoluminum opera scribuntur, partim inuestigantibus de quo quodque dici nomē Thessalus uoluerit, partim nihil tale inuenientibus, cui omnia ab eo particulatim dicta consentiant. Nam quæ demum apparentes illæ cōmunitates sunt, aut quomodo apparentes, dicere nō possunt, ne si iterum atque iterum totidem libros scripserint. quippe quod apparet, aut sub sensum omnino cadat oportet, aut sub intelligentiā, uno semel occurso utrique sine ulla demonstrationis ope. quod uero intellectui se uno occursum non exhibet, protinus id controuersum est, ac demonstratione eget, nec artem ullam a tali principio incepisse conuenit. Hæc si in Logicis methodis exercuissent, & ipsi ea intelligerent, & tempus nostrum frustra non contererent. Nunc quoniā in exercitatu rudesque, per amentiam audent demonstrare uti prius, quam quid ea sit didicerint, necesse est cum similibus suis, omnes aberrerent, prorsusque nugetur ac eos qui recte demonstrant, minime intelligant, sed tepus inaniter consumant. Ergo cum his nequaquam ut cum rationalibus animalibus uel disputandum amplius est, uel ipsidem impense contradicendum, prius quam didicisse, quamnam res demonstratio sit, uelint: & quatenus exercitatum esse oportet, qui ea probe sit usus.

5 Tecum uero omnē deinceps sermonē conferā, ipsis usus methodis, quas in cōmentarijs De demonstratione tradidi. Quippe non solū principia omnis demonstratiōis esse ea que tum sensui, tum intelligentiæ manifeste se exhibent, sed etiam in omni re querenda nomen ipsum adsumi in disputatione oportere, in illis docuimus. Nunc neutrum præcipere statui, nec quemadmodū inuenire, nec quemadmodū demonstrare conueniat: sed ijs qui iam didicerunt, & exercitati sunt, simul aliquē laboris opportunū fructum reddere, inuenta nimirum non tenuire, quam nunc instituimus: simul si

qui sunt, quibus artium maxima cordi est, quæ circa animum hominis versatur, ipsos quoque in minoribus prius exercitare conuenit. Quippe id tenaciter seruare in omni methodo oportet, ut in ea te multis sæpe leuioribus problematis prius exerceas, quam maioribus manū admoueas. Hoc igitur nobis ueræ disciplinæ principium esto. quod utique statim inter initia facturi fueramus, tum artem ipsi inquirentes, tum alijs præeuntes, qui adhuc peruerſi non essent. Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est morborum numerum prius sciri. At quoniam fieri nequit, ut aut differentias generis ullius, aut species inuenias, ipso quod diuiditur non planè explorato, oportet profecto nunc etiam quid morbus sit, narremus, quò sic diuisionē eius rite adæmus. Quia igitur rationē id methodo inueniamus? Quanam alia nisi ea quam in libris De demonstratione præcepimus? Nempe ut de notione ipsa prius conueniat, cum sine hac, propositæ rei substantiā inuenire non liceat. Ipsam uero notionem, quæ omnibus in confesso sit, sumendam diximus, ut quæ aliās principium fure non dicatur. Quæ igitur est de ægotando omnibus hominibus confessio? Et de qua maxime subiecta re uerbū hoc ægotare enunciant? Nunquid ubi citra offensam omnium corporis partium actiones obeunt, & ualere se tunc dicunt, & minime medicis egere putant: ubi uero naturalium corporis actionum senserint quampiam uel male geri, uel prorsus nō geri, & ægotare se illa parte corporis existimant, cuius actionem læsam uident, & medicum de remedio consulunt? Ego fanē omnes homines ita uideo tum morbi, tum sanitatis, nomen usurpare. Quinetiam eam, quam dixi, notionem, omnes obseruant, non in his modo nominibus, sed etiam nihilominus in omnibus, quæ cum his conjugata sunt, tum nominibus, tum uerbis. Quippe cum & ualere illum existiment, cui nullius partis actio sit uitata: & ægotare, cui sit uitata: & ualentē eum nominent, cuius omnes corporis partes actiones suas secundum naturā edant: & ægotantem, cui male affecta pars aliqua sit. Nec quisquā omnino Græcorum aut alijs nominibus utitur, aut de alia re enunciat iam dictorum nominum quoduis. id quod diffuse in medicinalium nominum interpretatione ostendimus. Atque hoc saltem mihi per omnem disceptationem memoria teneri maxime uelim, nominū quidem interpretationem ex Græcorum me consuetudine facturum: (sicuti in commentarijs De demonstratione dixi) ipsius autem rerum essentia tum inuentionem, tum inquisitionem, tum demonstrationem, non ex ijs quæ multitudinē uidentur: imò ex sumptionibus scientificis, quæ *λημματα* Græce uocant, de quorum inueniendi ratione in illis est proditum. Ergo accepto eo quod omnes cōsentunt principio, nempe illud in medendi methodo propositum esse, ut ægota corpora in sanitatem uindices: id uero est, ut naturales partium actiones, si quæ uitatæ sint, corrigas: Iam quod deinceps est, inquiramus, quot nume-

ro in totum res sint, quæ loco inter se sibi sunt propinquæ: nec ubi aliqua procedente sermone, uel pro morbis accipiamus, cum sint his similia: uel sanitatem, cum ad huius naturā propè accedant. Proponamus autem claritatis causa particulas aliquas, in quibus confirmetur quod dicimus, ac primum quidem ante cæteras oculum. De hoc igitur omnibus hominibus nō medicis modo, sed etiam alijs quibuslibet cōuenit, eius opus esse, ut uideat. Seu uero opus, seu actionem inter loquendum dicam, in præsentia saltem non refert. Ad eundem modum, nec si quis aspicere, oculorum esse opus dixerit, nec si quis aspectum, aut usum, aut uisionem, aut quomodocumque aliter nominet, quicquid refert. quando etiam si quis sollecissimum committens nominet, ad rei ipsius scientiam nihil id afferat incommodi, modo de qua re nomen pronunciet, clare explicet. In hoc enim præcipua doctrinæ uis est. Nominetur igitur oculus pars corporis, neque hic referat partem ne, an particulam quis dixerit. Quicquid enim totū complet, atque integrat: id totius uidelicet corporis quod cōplet, particulam, siue pars nominatur. Est enim pars ex ijs, quæ ad aliquid dicuntur, quippe pars totius, integræque pars dicitur: æque profecto, ut totum et integrum per relationē ad partes & particulas proprias nominatur. Estque sicuti dextrum ad sinistrum, & sinistrum ad dextrum: ita & totum ad partem, & pars se habens ad totum. Ergo si quis hæc seruata notione, malit partē dicere quam particulam, aut si quis cōtra particulam potius quam partem: is mihi ad rerum inuentionē impedimento non sit, cæterum imperitum se linguæ Latine prodit. Quemadmodum certe si quis integrū à toto seceruat, is quoque linguæ Latine est ignarus. Dictum uero alibi (ut scis) diffuse De nominum usu est. Ac nunc quantum satis ad rem sit propositā adijciam, illud duntaxat indicans, non oportere nominibus seduci. nec qui in ijs dissentiant, hos statim in rebus quoque ipsis dissentire putare. In quo genere omnes (ut uno uerbo dicam) non medicos modo nostre tempestatas, sed etiam philosophorū plerisque parum exercitatos uides: ut quorum paucissimi nominum diuersitatem à rerū diuersitate distinguere norint. Verum huius quoque rei methodū in Logicis speculationibus tradidimus. cuius opportunitas si quando aliās, utique nunc quoque ad usum uenit. Quænam igitur fuit ea methodus? Nempe ut à rerum incipias differentia, non autē nōminum. Tū ostendas quatuor, exempli gratia. esse res quæ in uicino sunt positæ. post deinde, ut demonstratio ne confirmes neque plura esse, neque pauciora quæ in proposita disceptatione contineant. Postremo ut accommodato rerū cuiusque suo nomine sic reliquum sermonē absoluas, nec mutans dehinc, nec transiens nomen ullum: sed cui rei ipse ab initio imposueris, de eadem perpetuo usurpās. Quippe ita & dilucida doctrina efficitur, atque à cauillationibus, quæ homonymia parit, libera. & quod frustra est additum, facile deprehenditur. & quod deficit, citò inuenitur. & quæ consonant dissonantque, maxi-

tere in altero sanitatem, in altero morbum, sed in eodem omnino genere ambo constituit. Siquidem contraria sunt, quæ in eodẽ genere plurimũ inter se dissident: ueluti candidũ, & nigrũ. etenim unũ est horum genus, color. Ideoq; si contraria inter se sunt, sanitas, & morbus: in quocunq; genere eorũ, quæ naturaliter se habent, statuetur sanitas: in eodem, cum præter naturam se habet, ponetur morbus. Quare si sanitas actio est, quæ secundum naturam se habeat: omnino morbus præter naturam actio fuerit. Sin autem affectio quæpiam, aut constitutio naturaliter se habet, sanitas est: & morbus affectio, constitutioq; præter naturam necessario fuerit. Ac Thessalus quidem finire morbum ne aggressus quidem unq; est, quin potius hariolandum nobis reliquit, de qua re uocabulũ id enũciat. Quod enim nihil interesse censat inter morbum & pathos, iam tibi in ipsius hominis cõmentarijs ostendimus, in quibus translatiõne ambo ponit, transfertq; utrunq; in alterius locum, ceu nihil interfit, hoc, an illo modo loquaris. Eius uero sectatores uniuersi sursum deorsumq; aguntur, ratio cinãtes ac se regentes, omniaq; facientes, ut uel obscure loquantur, uel omnino nihil, ut Thessalus ipse, atq; ante hunc Themiso, qui fundamentum illis huius infantiæ fecit. Quod si tibi ea quæ Proclus, & Rheginus, & Antipater, ad hæc quæ Eudemus, Mnæfæus, Philo, & Dionysius in hoc genere prodiderunt, dicere uelim: utiq; à proposita tractatione, quæ & scientifica est, & ipsum quod utile sit docere conatur, imprudẽs excidã. Verũ de horũ dissidentia licebit aliquando, fortasse etiã in sequentibus, mentionem facere: unaq; cum his Menemachi, qui omnes eorũ res astutius turbauit, atq; confudit: & nugacis Olympici, cumq; hoc etiã Apollonide, & Sorani, & qui adhuc uiuit Iuliani, quem utiq; & nos conuenimus, ut uia uidelicet hominis uoce meras nugas condiscerẽ. sed nec is explicare potuit quid morbus, pathosue esset. Cuius rei uel maximũ signũ est q; cum uiginti plus annis iam sint, ex quo illũ Alexandriã cõuenimus: scripseritq; iterũ atq; iterũ institutiones: (nam has alidue transponit, transformatq; nunq; ijs, quas scripsit, cõtentus) nusq; tamen earum est ausus quid morbus sit prodere, tamen certe adeo ea quæ nihil ad rem pertinent, in ijs agit, ut etiam illud inquirat, Sit ne pictura medicis ex usu. & tamẽ tam multa taliaq; cum scribat, nec dissimulare queat, (sicut nec Menemachus) quin Methodicæ sectæ absurditatẽ clare norit, ne in hodiernum quidem diem in institutionibus suis usq; scripsit quid morbum pathosue nominet. Mihi certe ipsum interroganti, adeo multa obscuraq; respondit, ut nihil eorum quæ dixit, planẽ intelligerem, cogererq; illud tantum homini dicere, quod mihi desciscere ab Olympico uideretur, quanq; is ausus doctriinã ipsius fuerat. Nam Iulianus hic Apollonidæ Cyprij, ille Olympici discipulus fuerat. Ergo Olympicus (ut dixi) sanitatem morbumq; finire ausus, illam esse affectum dixit, qui absentia sit morbi. Rursus morbum mutationẽ à naturali in id quod

A præter naturam sit, stabilem. Quorum sanẽ utriusq; permulta insunt à ratione aliena, quæ & tunc Iuliano exposui, & nunc summam dicẽ. Quod enim (inquam) confusionem facit id est, q; Olympicus non illud tantum absolute dicit, sanitatẽ affectum esse positum extra morbum: sed etiam illud definitioni adijcit, quem affectũ definimus naturalium actionum constantiam, & firmitudinem. haud enim coniscere ualeo, in sola ne actionum constantia, an in corporis affectu, an in ambobus sanitatem statuat. sed forte, ut utiq; cum reliquis Methodicis assoler, confuse alieneq; abuti Græcorum uocibus, ita nunc quoq; affectum non ad corpus, sed ad actiones refert: ut nimirũ ad hunc modum definitionem intelligas. Sanitas affectio est actionis in absentia morbi. Porro iustum (arbitror) fuerat, alterum duorum definitioni adieciẽ, ut actionum, aut corporis: ut uidelicet aut ita se haberet initio, Sanitas est affectus actionum morbi. aut certe talis. Sanitas est affectio corporis in absentia morbi. Quinetiam si ambo iungere uoluisset, ita quoq; licuisset, ut dilucide, sic breuiter dicere, Sanitas est affectio tum actionũ, tum corporis in absentia morbi. Quid autẽ cum subiicit: Quem affectum definimus constantiam, ac robur actionum naturã suam tuentium: utrum ne pars hæc putanda est eius quod prædictum est, iungendaq; tota definitio est ad hunc modum: Sanitas est affectus corporis in absentia morbi, & constantia actionum, quæ secundum naturam se habent, ac robur.

C an ista ipsa per seipsam perfecta definitio est, ac quid sanitas sit docens, prout sanẽ nonnullis Methodicorum placuit, qui sanitatem esse dixerunt constantiam secundum naturam se habentium actionum: Verũ si hæc absoluta est, haud scio quid doceat ea quæ ante dicta est, quæ affectum esse la nitatem præcipit. Quippe illud quod dixit in absentia morbi, eiusdem planẽ est, quod uel puer rideat: cum si ita definire permittetur, manifestum sit & morbum fore affectum corporis in absentia sanitatis. ita uidelicet, ut utraq; definitio, non quid sit id quod queritur, sed quid non sit, doceat. Sed mittamus (inquam) si placet & hæc, cum sint ad rem non admodum necessaria. Illud certe præterire dissimulareq; non licet, quod in sanitatis explanatione omnia actionibus tribuatur, uel solis, uel etiã confundendo inuoluendoq; ac obscure quodammodo miscendo ipsum affectionis uocabulum, quemadmodum fecit Olympicus: in ipsius uero morbi definitione, nulla sit actionum mentio. nam illud dicere satis habuit, morbum esse mutationem corporis à naturali statu ad eum, qui præter naturam sit, constantem & stabilem. At debuerat, inquam, aut in actionibus, aut in affectibus utrunq; constituere. Quid uero mihi responderit, & sæpe tibi iam mihi Hiero narraui, & nunc repetere non erit alienum. Nihil (inquit) miri est in actionum quidem constantia cum robore sanitatem poni: in affectu autem corporis præter naturam, morbum. Neq; enim contraria sunt, ut tu renis, inquit. Est enim eorũ aliquid medium, quod nec

sanitas sit, nec morbus. Quo ego sermone audito abij stupescactus simul ac dolens. fatendū enim est quod accidit. Antea enim neminē unquā eorum, qui in ea opinione prorsus sunt stupidi, conueniam. tum autē primum conueniens merito obstupui: non quod is solus adeo sine sensu esset, sed q̄ multo se etiam agrestiores tot haberet discipulos, qui cum statim in initio doctrię sue Methodicos ita errare uiderent, tamen a secta non descicerēt: aut si omnino non uiderent, prorsus essent attoniti. Nam quid, quæso, ad rem, morbum sanitati non esse contrarium, propterea q̄ aliquid eorū sit medium: Patet enim hac scilicet ratione non fore alium nigro cōtrarium, propterea q̄ eorū sint media, flauum, & fuscum, & rubrū & pallidum, & reliquorū colorū singuli. nec calidum frigido, quippe horum quoq̄ sunt media, tepidum, & temperatum. Ac sapientes istos methodicos, cum nec leui, nec spernendo lapsu sic sint inter initia statim lapsi: speremusne ueritatē ullam eorum quæ sequantur, posse intelligere: minime p̄fecto. quippe quę in arte medica spectant, omnia ex his pendere docebimus, idq̄ merito. siquidem in ijs artibus, quę methodo aliqua traduntur, earum constituendarum principium, est finis ipsius notio. Ac in huius quidem notitia, alijs quoq̄ permultis est uariē erratū: alijs medicinæ finē esse affirmantibus, ut plurimū sanare: alijs ea facere, quę sint ad sanitatē cōducibilia: alijs morborū causas adimere: alijs pro se quęq̄ omnia peragere: alijs prout cuiq̄ succurrat ac de his definire seorsum conuenient. Nemo tamen adeo fuit stupidus, ut in alio genere poneret sanitatem, in alio morbum: sed uel actionibus naturaliter se habētibus tribuit, uel partium constitutionibus, quos aliqui affectus uocant. Siue autē in actionib. naturaliter editis sit sanitas, in ijs quę præter naturam sunt, erit morbus. siue in constitutionibus naturaliter se habentibus, in iisdem præter naturam se habentibus erit morbus. siue in affectibus, in his ipsis erit & inualetudo. Neq̄ enim profunda ulla spectatione ad hoc est opus, tantū sufficit non esse puerum. Nam quis obsecro dubitet, si uidere sanitas sit, morbum esse uel cæcutire, uel omnino non uidere? Quis non intelligit, si audire sanitas sit, esse morbum uel egre audire, uel prorsus non audire? Pari modo si concoquere, bona ualentudo est: male concoquere, uel planē non concoquere, inualetudo est. Et si suo aliquem arbitrio moueri sanitas est, utiq̄ morbus fuerit & cōuulsio, & palpitatio, quem *παλμός* uocant, & nervorū resolutio, & tremor: & deniq̄ quicquid uoluntarium motum uel penitus destruit, uel etiam impedit. Ad hæc, si naturaliter sentire sanitatis opus sit in sensibilitas, & difficilis sensus, & stupor, & dolor, aggritudines erunt. Rursus si ordinate respirare sanitas est: utiq̄ spirandi defectus, uel difficultas, morbus est. Atqui si hi morbi sunt, dubium non est particularū affectus, ex quibus hæc eduntur, morborum esse causas: nec oportere aut phlegmonē, aut scirrū, aut erysipelas, aut abscessum, aut ulcus, aut oedema morbos dicere. Quod si hæc

Galen.

aggritudines sunt, manifestum est nullum illorum esse morbum. Quippe duo rerū genera sunt nūq̄ inter se similia, sed omnifariam dissidentia, & tota natura differētium. alterum horū generū corpus uocant, alterum actionem. Ergo oculus, & lingua, & auris, & crus, atq̄ id genus singula, corpora sunt certo modo affecta. uisus, auditus, sermo, incessus, actiones prædictorum sunt corporum. Si itaq̄ in certo quodā corporū habitu aggritudo constituitur, certē in certo quodā actionū habitu non statuetur. Quando si in hoc morbus consistat, planum rursus est in corporum affectu non esse. Verum quod affectus ipse causa sit, actio uero id quod ab affectu corporis efficitur, id uero est quod omniū maxime & fatendum medico sit, & tenendum. Adeo quisquis hoc ignorat, is in relabitur, quæ planē est ex necessarijs. At qui uel actionis læsionem, uel corporis affectum, morbum appellat: quamquam parum conuenienter nominat, potest tamē de rebus ipsis rectam habere sententiam. Contingit autē non ex nominum, sed rerum recta opinione, recta morborū curatio. Iam hoc ipsum multos medicorū ignorātes inuenias, putantesq̄ in rebus dissidere eos, qui corporū affectus morbos esse cēsent, ab ijs qui in actionis uitio eosdem constituunt. Atq̄ horum omnium errorum (quod & sæpe iam dictum est, & post dicetur) iunica causa est, quod qui inuenire quiduis Logicę sunt aggressi, non fuere in Logicę methodo exercitati: sed simul ueluti ratione cogitationeq̄ exercitati fuissent, ab experientia descierunt: simul, cum in illis inexercitati essent, magnopere sunt lapsi. siquidem milites eos de nominibus tanquā de rebus litigantes inuenio. Rursus ubi rem quampiam maximam ignorarint, non in se ignorare putantes, ueluti in eo quod nunc est propositum, discernere nequeunt corporis quidē statum cause rationem sustinere, actionē eius quod ab eo perficitur: sed nec quod sanatur, id esse corporis affectum. quippe comitatur necessario hunc naturaliter se habentem naturalis actio. Contra, si a natura recesserit, actio statim præter naturam se habeat necesse est. Porro in hoc totum uertitur, estq̄ hoc principium, ac ueluti primum quoddam elementum omnis methodi, quæ de medendo instituitur. Caterum an hoc ipsum appellare morbum oporteat, an actionis uitium, id est de nomine dubitare. Dicemus autē aliquid, & de nominū usu, sicut in alijs prius iam fecimus. Verum nunc de ipsis nondum distinguo, quod uidelicet hoc ipsum rerum fide magis comprobem, ostendāq̄ quod nam sit huius de medendo methodi principium & radix. In quo cum alijs multi ex ijs qui rationales se dogmaticosq̄ appellant, tum uero probi isti methodici sunt falsi. atq̄ illud quidem ijs qui prudentes sunt, iam quodāmodo apparet, nihil esse aliud quod a medicis curetur, quam corporum affectū, ueluti proximo libro monstrabitur.

8 Nunc illud nobis propositū erat, ut ignorantiam eorum corigeremus, qui quot in uniuersum res sint, quæ in presenti disputatione proximæ in-

tom. 6

b ter

ter se habeant, ignorat. Videtur enim unum harum genus esse ipsorum corporum, alterum actionum. Ac corporum quidem genus precedere actiones, easque gignere: has uero sequi. idque si corpora naturaliter se habeant, inculpabiles ac naturales: sin preter naturam sint affecta, aut nullas prorsus, aut omnino certe impeditas. Tertiū prater hæc genus est causarum, quæ hos affectus creant. nam quam rationem habet affectus ad actionem, hanc alterum quippiam ad ipsum affectum omnino habeat oportet, illo dumtaxat euarians, quod affectus cum actione una consistit; nec potest usquam aut proba actio esse sine corporis naturali affectu: aut uitiosa, nisi cum corpus sit uitio affectum. Eius autem affectus qui actionem impedit, causæ possunt quidem non etiam esse. possunt autem & adhuc nunc manere. Ergo diuersæ omnino ab affectibus causæ sunt. Ac tertium hoc iam inuentum genus diuersum est, & ab actione, & eo qui hanc gignit affectu. Ab hoc quartum aliud genus est affectus eorum, quæ cum corporibus & naturaliter, & prater naturam se habentibus insint, actioni nec commodant, nec incommodant. sicut, exempli causa, color corporis ex diuturna in Sole mora niger ex candido factus. aut cōtra, ubi uersatus in umbra quis sit, ex nigro candidus: aut ruber lauantibus: aut pallidus timentibus. Quippe hæc nec actiones sunt, nec corporis affectus, qui sint actionis causæ: multoque minus ipsæ causæ quæ affectus, qui prater naturam sunt, creant sed sunt symptomata, quæ diuersas corporum alterationes necessario sequuntur, siue hæc secundum naturam, siue prater naturam se habeant. Ergo cum quatuor definita genera iam sint, ex quibus uel noscendis, uel non noscendis, probe secus incipiendum esse medendi artem monstrabimus, licet de cetero cui uis, prout uolet, istis nomina imponere. ueluti affectum corporum prater naturam se habentem, cum actionem aliquam uitiat, morbum si placet, appellato. Ipsum uero functionis uitium, insigne quoddam morbi symptoma. Quæ alia ratione accidit, ceu colores: ea quoque, si uolet, appellato symptoma. cæterum ea distinguat a functionum uitio, & si illa insignia, morbi symptoma uocat, hæc familiaria propriaque nomet. Quædam etiam prater hæc, si uolet, nec familiaria, nec propria, sed forte quadam incidentia. Quartum uero ab istis genus statuito, quod sit insalubrium, siue (ut ita dicam) morbosicarum causarum. Atque harum quæ quidem in ipso animalis corpore consistunt, internas nominet: quæ extrinsecus, externas. [nisi malit (ut nunc uulgo medicorum insueuit) illas antecedentes, has primitiuas uocare.] positis autem pro arbitrio uel hoc uel alio modo nominibus, dummodo clare, & ex usu legentium, nec mutet postea, nec transponat eorum usum: sed perpetuo per omnem disputationem obseruet, quod & quæ dicat facile intelligamus, & refutationes redargutionesque omnes ad aliquod clarum distinctionumque referamus. Qualiter, inquis, & ad quæ modum? (nam id ipsum quod indicandum adhuc arbitror propter stupidos istos methodicos) nempe esto dicat aliquis, phlegmo-

nem affectum esse preter naturam: ipsam uero lasam phlegmone laborantis particule functionem morbi insigne symptoma, ueluti pedum quidem ingressum, o colorum uitium, aurium auditum, ruborem autem, tensionem, & renixum, & tumorem qui preter naturam sit, ac phlegmonis succedat, diuersum quoddam genus siue symptoma, siue accidentium, siue quo alio nomine appellare malit: illud modo sciat, clareque definiat, non esse idem genus cum uitio actionis, rursus sanguinis redundantiam (si forte hæc fuit) internam phlegmones causam: externam uero & quæ hanc præcessit, ciborum abundantiam. Ergo si utiplace exemplar phlegmonis habendi clara posui, & quatuor genera distinxim, ac notiones eorum dixi: ita & Thesalo arbitrator faciendum fuit, præsertim post tot & tantos uiros, quos se uicisse prædicauit, nouam sectam condituro.

Nunc uero nec ipse apertum quicquid attulit, nec sectatorum eius quisquam. Olympicus enim cum ausus sit definire quid pathos sit, non eius, sed symptomatis retulit notionem. In summa igitur nec quid pathos sit, nec quatenus a morbo differat, intelligunt. Verum hoc nos in sequentibus docebimus, simul enim omnia dici non possum. Verum concessio istis idem esse morbum ac pathos, inspicimus ea quæ dicit Olympicus. Pathos, inquit, est conuersio corporis a naturali habitu in eum qui prater naturam est, permanens. Post paululum progressus ait: Sciendum est differre a symptomate pathos: quod pathos, ut paulo ante dixi, affectus corporis est prater naturam permanens: symptoma quod huic accidit, quodque in istis quæ prater naturam sunt, speciale ac magis etiam particularefigurationem habet. Hæc est egregia interpretatio sapientis Olympici, qui pathos ac symptoma finire est ausus, Quæ sanè tot uitiis scatet: ut mihi in mentem ueniat illud stulti ad cribrum, negantis inuenire se quid eius obturet aut non obturet. Quid enim primum ex ipsis dicas, aut quid omittas? quippe omnia refutare, quæ perperam sunt dicta, longum sit. Num omnem mutationem ab eo quod secundum naturam se habet, ad id quod prater naturam est, morbum censetis, si modo permanentia illi adstet? At uos tum coloris uitium, tum atrophiam, id est, affectum, in quo corpus non nutritur, symptomatis, nequaquam morbis adnumeratis. Quid autem caco chymia id est uitiosus succus: quid cachexia, id est malus corporis habitus: quid succi defectus: quid uero ipsa redundantia: nonne prater naturam sunt? Si ergo permanentia his accedat, inter morbos numerabuntur. Atqui nec ipsi id uultis, & merito sanè. Etenim supra id quod prater naturam sit affectus, adijci oportet etiam aliquam ab eo laedi actionem. nam quoad illas hæc omnes seruatur, etiam si nullius corpus sit alteratum mutatumque, nullus tamē eorum affectuum adhuc morbus est. Quod enim curationem desiderat, aliud planè non est quam affectus, qui uitiat actionem. Si quidem quod primum maximeque omnium desideramus, id naturalis est actio: propter hanc, & naturalem siue affectum, siue constitutionem nominare uelis. Videre namque, &

audire, & loqui, & ingredi indigemus, non autem oculis, auribus, lingua, aut cruribus. nam si uidere alia particula liceret, quis oculorum esset usus? Et si alio quouis instrumento audire liceret, quæ auris esset utilitas? Pari modo & lingua, & cruribus minime profecto esset opus, si loqui atq; ingredi sine his possemus. Ac uidere quidem, nostra ipsorum causa indigemus: o oculis non nostra, sed id ut uideamus. Iam linguam, aures, crura, non propterea requirimus, ut ociosis & multis affluamus partibus, sed loquelæ gratia, & auditus, & incessus. quippe demortua quauis particula, quæ abscondi potest, ueluti digito, pede, aut summa manu, non patimur hanc ociosam gestare, ac ueluti pondus alienum circumferre: illud clare hoc ipso declarantes, haudquaquā nos particulis illis, sed functionibus egere. Veluti igitur totā particulam actionis causā requirimus, eodem (arbitror) modo naturalem quoq; eius cōstitutionem actionis gratia desideramus. Sicuti enim supra diximus, causæ uicem ad actionē cōstitutio præstat. Quæ uero cōstitutionem unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis accidentia, ægrotantibus symptomata nuncupantur. Atq; hæc quatuor genera sunt omnium, quæ in corpore nostro habentur, seu secundum naturam nos, seu præter naturam habeamus, actiones, cōstitutiones, quæ hæc præcedunt, quæ sequuntur. his dehinc nomina qui uolet, imposito, singulis seorsum: & si Dionem, aut Theonem appellare uelit eorum quodlibet, mea nihil refert: illud modo intelligat seruetq; ubiq; quatuor in uniuersum res esse, quæ sitæ inter se proxime sint. Et quoniā huc sermonis ueni, uideor mihi hoc iuste exigere, ut sicuti nos illis permittimus quæ uelint nomina indici: ita illi inuicem nos usitatis & antiquis uti sinant. Alioqui sanè graue atq; adeo iniurium sit, si illis solæcisimū cōmittere tyrannorum ritu licebit, nobis uel Græce, [uel Latine] loqui non concedatur. Vocanto, si placet, sanitatem, ipsarum functionum constantiam. quanquam ostensum a nobis est affectū cōstitutionemq; partū, cuius ope functiones secundum naturam edimus, hygien, id est sanitatem ab omnibus Græcis appellari. Atq; id cum statuerint sanitatem, morbum tamen censento non actionis uitium, sed qui præter naturam sit affectum. Tanquam ergo nos illos nec Græce [Latine] nec Dialectice nominantes, nō impedimus: ita illi nobis permittant, & Græce [Latine] & Dialectice non omnem qui præter naturam sit affectum, sed qui actioni in cōmodat, morbū nominare: qui præter naturam sit, nec tamē actionem obturbet, non morbum, sed morbi symptoma. Rursus, sicut illi permanētiam adiſciunt, nec indicant quot horas eiusmodi affectus moratus, morbus sit censendus: ita illi nobis concedant illud permanentię nomen fibrare. Nam si quis siue tribus horis, siue quatuor, siue horæ tantum dimidio, toto corpore uehementer sit arreptus, sic ut neq; sentiat, neq; moueatur: hunc nos apoplectum siue attonitum dicimus. Aequē si quis cōuulsus toto corpore sit, hūc

Galen.

etiam comitali morbo laborare, nullā ne chorarum, nec diē ratione habita. quippe nomina id genus, naturæ rei, nō temporis modi sunt indicia: non aliter quā album & nigrum, & calidum & frigidum: alioqui mirum me hercule sit, si aqua calida, calida non sit, nisi perpetuum diē talis perduret. aut qui sex horis febricitauit, non febricitauerit: oportuisse enim ut febricitauerit, durasse malum. quanquam quod tempus id sit quod durationem illam iusta ne fuerit an secus, determinet, nemo eorum tradidit: utrumne diē aliquid numerus sit, an mēsum, an horarum: aut cur durabilem dicant, cum licuerit diuturnū dicere: aut cur hoc quidem mutantes nonnulli eorum, difficile solubilem dicant. At certe hoc nō generaliter morbi, sed longi morbi proprium est: perinde ac facile solubile, breuis. Verum existimare refert, ægrē solubilem, an durabilem, an diuturnū dixeris, nōne extrema est ruditatis: Iam illud pfecto magis mirum, quod ipsi ueluti à graui somno experrecti, diſtinguere pathos à symptomate aggrediuntur: cū autor stupiditatis eorum in secūdo De methodo, sic scribat. Eadem namq; cum præcedunt, pathe dicuntur: cum succedunt, symptomata. Quamuis etiam longe mirabilius hoc ipsum sit, quā ea quæ ab illis dicuntur, utiq; iocinoris phlegmonē, si primo statim die irruat, pathos esse cōcedere: sin alteri cuiſpiam secundo, ac tertio diē succedat, abire in symptoma. quanquam quid diē secundā memoro: cum melius sit horā secundā à morbi inuasiōe dicere. An enim in secundo diē phlegmonē iocinoris in symptoma migrabit, in secunda ab initio hora nō migrabit, nec symptoma erit: cum illud saltem quod est alicui quod præcessit, superuenire illi omnino competet. At quod tam celeriter, inquirunt, superuenit, ab eo quod unā irruit, non distat. Rursus igitur diſtū ab illo clare oportuit, quot horis determinet, diſtinguatq; quod superuenit, ab eo quod unā inuadit. Ac Theſſalus quidem eiusmodi est. Olympicus uero, cui in arcem ipsam sapientiæ euectus, nō ita pathos à symptomate diſcernit: sed pathos id esse quod dictum est, symptoma uero quod huic accidit: mirifice uidelicet ac dilucide essentiam eius interpretatus, quippe quid ipsum symptoma quod pathos comitatur, sit, adiſcere (ut arbitror) ac definire oportuit, num corporis aliquis affectus, num læſio quæpiā actionis, num pariter utrūq; esset. At ille quidem minime id dicit: sed nobis uidelicet diuina est opus. Illud uero quod definitioni apposuit, nempe specialem atq; etiam magis particulare in iſs quæ præter naturam sunt, figuratiōem habens: quā non excellentiam claritatis habet, atq; etiā nomen Græcam perlepidamq; interpretatiōem: Si magis specialem quandam figuratiōē, in iſs quæ præter naturam sunt, symptoma habet: quid ergo est quod magis generale notā habet. Non enim dixit, an sine collatiōe ad generale, magis speciale liceat inuenire. sin ad nihil omnino referens, magis speciale pronunciat: oppido quā diſtingere clareq; interpretatur. quanquam & paucis, & di-

tom. 6

b 2 lucidis

lucidis uerbis dicere ei licebat, omnia quæ circa corpus animalis præter naturā sunt, uel morbum esse, uel causam, uel symptomata. Quibus omnibus cum illud præter naturam sit cōmune, morbus actioni officit, causa ipsum præcedit, symptoma eū sequitur, ipsum uidelicet natura duplex: alterum actionis læsio, alterum affectio quædam morbum sequens. Verum (ut dixi) si quis omnes eorum errores excutere uelit, finem dicendi non inueniat. ipseq; mi Hiero, optime scis eorum nos ne milleſimam quidem ipsorum partem refutare conatos. Ergo si illud tantum adiecerō, primū hunc librum hoc loco claudā: nempe quod in ipso statim methodi principio non pauci medicorum falluntur, utiq; qui Theſſali ac Themisonis sunt emuli, quicq; methodicos se appellant, insignibus ac maximis erroribus. cum his uero non pauci eorū qui se analogisticos, dogmaticos, ac logicos, nominant. Si quidem nisi quis omnes affectus à quibus actio le datur, inuenerit, numerum ipsum morborū quantus qualisq; sit, ad unguem definire non potest. Id cum quidam eorum facere nunq; uel tentauerint, tyrannorū more quæ ipsis uidentur citra demon-

ARGVMENTA

De differentia eorū quæ præter naturā sunt. Illud quod primo curatur esse corporis affectum, à quo actio læditur. Si ignores corporis affectum secundum naturam, à quo actio producitur, prorsus fieri nō posse ut cognoscas affectū præter naturam à quo actio læditur.

Qui affectus in partibus consimilibus existant, qui actiones lædant. Quod si dem morbi nō sint partium instrumentarium & consimilium. Quod consimilium partū morbi per distantā à temperamento sunt: instrumentarium aut partium uel in formatione quæ à naturali recedat, uel in quantitate partium quæ in eis sunt, uel in magnitudine uniuscuiusq; ipsorū, uel in positione consistunt. Continui solutionem instrumentarium & consimilibus partibus communem esse. Quod per solam experientiam eſſi non perfecte, saltem cōmode quis curare possit. Quod artem medicam per experientiā addiscere præſtiteris qui neq; in rationalibus disciplinis sunt exercitati, neq; studiū adhibent ut methodos discant quibus inueniuntur quæ ad rationalem uiam curandi necessaria sunt.

Aliter, Secundum numeros capitum Textui adscriptos.

Cap. 1. Morbū esse de genere rerum præter naturam. Et quod affectus ipse sit morbus: actionē autem læsam aut symptomata, morbum dici non debet. 2. Quot modis imponantur nomina morbis: à parte læsa, à symptomate, ab utroq; (ut algia) à causa, à similitudine, &c. Vlcera quædam ab ipsis quæ primū sanantur. 3. Doloris & morbi discrimen. Al. Quid inter morbum & pathos interfit: dein, morbos inueniri non posse sine cognitionis, ex quibus consistit corporis elementis. 4. Explicat species morborum numeratim comparādo cum sanitate. Al. Quoniam Aſclepiadis & aliorum quorun-

strationem pronunciant. Alij non modo ipsi non demonstrant, sed nec à demonstrantibus discunt. Ac plurima (ut scis) medicorū pars qui nunc sunt in pretio, eiusmodi est, nec id fortasse mirū. Nā ubi philosophorum pleriq; citra demonstrationē credendū sibi postulant, quid de medicis mirere, quibus nec uacat ueritatis inquisitioni uacare: ut qui mane in salutationibus (ita enim appellant) sine occupatū, uesperī cibo distenti, ac ebrij. Verū ego ueteris tibicinis exemplo, mi Hiero, uel cum musis ipsis certauero. cum aliqui turpe putem, tibicinem, qui præsertim haud magnam rem prospere moliebatur, adeo repertū fuisse laudis cupiditatem autē, qui medendi methodum ab antiquis inquisitam, non tamen hætenus exacte proditam, inuestigare absolueretq; ualeam, propter eam quæ hac tempestate regnat ignauiam, grauati atq; negligere, ac differre. Quare contra nunc affectus, quante, mihi uideor. Non enim priuatim uobis, qui me ad medendi artē totam ordine perſcribendam hortati estis, hoc opus dedico. Ac primus liber hic mihi finiatur: totius quod sequitur operis secundus ad hunc modum deinceps incipitor.

SECUNDI LIBRI.

dam sententia erat, Sanitatem, non in primarum qualitatū temperie (quæ similariū proprie partū secundum Hippocratē sanitas est) sed in meatū symmetria consistere, ut eorundem uel astrictio nimia, uel laxitas, morbus sit: Galenus hoc capite tum corpuscula hæc adstringentia meatus, tum laxitates etiam ipsas, ratione contemplabilia tantum esse adierit. 5. Per digestionem explicat, quantum Empirici & rationales medici differant. Al. Quantum delirent, qui uni alicui scēte addicti sunt, Empirici enim inueniri posse non putant quicquam eorum quæ abstrusa sunt, neq; id si inueniunt sit se desiderare. Logici uero, ut se appellant, ne scire qui dem se blaterant an 8. affectus sint: & cum nuda uerba adferant, omnia sibi credi postulant. 6. Inquiret docet numerum omnium morborum generum absoluit, quæ sex in uniuersum constituit: in similibus unum, in instrumentalibus quatuor, & sextum utriusq; cōmune. Prius autem Theſſalum et Aſclepiadem reprehēdit, & quædam hætenus dicta recapitulat: Et de libris ante hanc methodum legendis admonet: & potius experientia accedendum esse, qualis empiricorum est, quam uitiōſæ logicorum rationi. 7. Prolixissimo hoc capite, de indicationibus præcipue agit. Al. Methodus aliud est ab experientia, & cōfundi non debet. Hoc ipsum autem quo differant, indicatio est. Quamobrē methodum medendi inuestigāt ab indicationibus auspicandū fuerit. Præterea, Medicinæ finem esse inuenire cuiusq; morbi remedia: ad quod peruenitur ex ipsius morbi cognitione. Deinde longa disceptatione docet morbos omnes unius eiusdēq; participatione morbos appellari: & aliud numero, aliud genere, aliud specie idē & unū esse. Itē Morbū esse, quamuis ipse per se solus non appareat.



VAE corporibus nostris à natura suæ modo egressis. Hic ro dulcissime, accidunt, eorū quatuor traditæ differentiæ sunt. una ipsius functionis uitata. altera eius qui hanc peperit affectus. tertia causarū, quæ ipsū præcesserunt affectum. quarta symptomatum, quæ hunc necessariò consequuntur. Quod itaq; uel cuncta hæc esse morbum oporteat, uel horum quædam, uel certe ex his unum, id promptū colligere cuius est. cum enim ægrotantibus præter hæc nihil insit, utiq; præter hæc morbus non fuerit. Quod ergo reliquum est, aut omnia hæc collecta morbus erit: aut horū quædam, aut unum saltem omnino. sed enim omnium esse collectionem, præter id quod neminem usquam habuit autorem, etiā dici non potest. nam quæ quæso, morbi causa, aut quod morbi symptomata erit, si omnium pariter collectio morbus censetur. Neutrum perfecto erit. Ergo duo præter morbos genera relinqui necessum est; alterū causarum, quæ hos creant; alterum eorum quæ necessariò sequuntur, non tamen homini officiant. Verum si hæc abstuleris, reliquum est ut in altero duo rum statuat morbus, aut ipsi functionibus affectis, aut qui has edunt affectibus. Fuitq; & antiqua sanè de hoc cōtrouersia, et hodie dissident inter se omnes, non modo medici, sed etiam philosophi: alij ipsius actionis uitia, alij affectuum unde actio prodit, morbos nominantes. Et dissidere uiros in rebus tam obscuris minime est mirum. non intelligere tamen eos quod de nomine cōtentand sanè taxatione est dignum. quippe si inter omnes cōuenit, ad affectum qui functioni obest, curationis consilia dirigi: quid ad artis officia conferat definiuisse affectus ne, an læsa functio morbus sit appellandus? Vtouis enim modo appellantis æger sanitati resituetur, modo quis affectui commodis præsidij occurrat. Hinc nanq; est quem aliterare mutareq; & prorsus summouere oportet, non uitium functionis. Nemo enim ipsam claudicationem sanat, (id enim esset ridiculum) sed affectum qui hanc efficit, ueluti phlegmonem, si huius uitio claudicatur, atq; hanc & perfundit, & cataplasma superimponit, & scarificat, & per haliū digerit, & omni ratione discutere tentat: utpote cum hac obla, reddatur rectus incessus: nec hac summota claudicationem corrigere prorsus sit opus: cum nec remaneat quicquam prauæ functionis, si qui huic obfuit, prorsus sit amotus affectus. Quoad uero huius quicquam relinquitur, necessum est ad portionem eius, actionem uitiose edi. Hunc itaq; affectum, seu morbum appellasse, seu pathos, uitium uē, seu morbi causam, seu pathus uitiosæ causam quis uelit: id nihil ad curationem nec profit, nec obstat. Sed neq; si Theonē aut Dionem hunc uocet quis, modo rite sanet, ne hic quidem

agrotanti officiat. Quinimo si quis prorsus innominato eo, tamen quæ ex usu agrotantis sunt adhibeat remedia: non solum hic nihil offendet, sed etiam bellissime curabit. Verum qui alterum docere uolet, quæ ipse tenet: huic prorsus nominibus propter res uti est opus, in quorū usu claritas quasi meta spectanda erit. nam qui sic nominare quæq; studet, ut qui discit, clarissime intelligat, is optimus præceptor fuerit. Quoniam igitur & nos iam docēdi munus ingredimur, necesse est alicubi rebus nomina imponamus: an uero dilucide, id uos æstimetis licet. Ergo affectus qui actionem uitiat, morbus appellatur. hunc si quid sequitur, symptoma. quod illum excitat, causa.

2. His ita distinctis, inspicienda diligēter est non minū diuersitas quæ ægritudinibus imposuerunt ipsorum primī auctores. Subinde enim à læsa partícula sunt indita, ut Græcis πλ ού εις, id est laterum compunctio, πνευ π ού μονί α, id est pulmonū phlegmone. ιγ ις, id est coxendicū morbus. ποδ ά γ ρ α, id est pedum uitium. νι φ ρί πς, id est renū uitium. αρ θ έ ις, id est articularum uitium. οφθα λ μί α, id est oculorum phlegmone. & κεφα λ α λ γί α, id est capitis dolor. & δυσεν τε ρί α, id est intestinorum tormina. Subinde ab ipso symptomate, ut α λ ις, id est tenuioris intestini morbus. τνις μος, id est desidendi assidua cupiditas. σπασ μος, id est conuulsio. πα λ μος, id est palpitatio. & τρόμος, id est tremor. πνεύ λυς, id est neruorū resolutio. & άπνεύ α, id est cruditas. δύσπνοια, id est difficultas spirandi, uel inordinata spiratio. άπνοια, id est defectus spirandi. & άγρυπνία, id est uigilia. & παράφροση, id est delirium. & κάμα, id est sopor. Sæpe ab ambobus simul: ut κεφα λ α λ γί α, & όπα λ γί α, id est aurium dolor. & καρδι α λ γί α, id est cordis siue stomachi dolor. όδον τ α λ γί α, id est dentium dolor. ύπερ α λ γί α, id est uterī dolor. Sæpenumero à causa putata, ut με λ α γ χ α λ ί α, ab omnibus: χολ έ ρ ε α, ijs qui sunt à Chido medicis. Hinc etiā fortassis & λοβ ο φ λ η γ μ α ίς υδερ θ, quæ aquæ intercutis est species, nomen accepit. Nonnumq; à similitudine ad aliquid extra positū, ut Elephas, siue Elephantiasis, Cancer, Polypus. σφυ λ ις id est, uua. λ δύ κη, id est uutiligo alba. μύρμη κί α, id est myrmecis, siue fessiles uerrucæ. άβέρω μ α, id est tuber, cui pulcicula simile quid inest, quam Græci άβερ α, dicunt. σιά ττωμα, quod seuo simile quid continet. σφυ λ ωμα, id est oculi morbus. Eū in summa tunica quiddam acino simile eminet.] με λ ι κ ρ ε ρς. άνθραξ, id est carbo. άλω π κί α, id est areæ in capite. όζί ας, id est uitium serpentis formæ representans. σήκως, id est ficus. ό τνις α σμοί, & πρις πτομοί, purdendi præter naturam erectiones. Ipsorum uero morborum, quæ nec locū affectū nominare repræsentent, nec causam quæ eos efficit, per pauca sunt nomina. Phlegmone, Gangræna. σκί ρ θ, id est durities uix sentiens, Erysipelas. άπό σ η μ α, id est abscessus. όίδημα, qui tumor est laxus, citra dolorē. έμπύημα, id est collectū in thorace pus.

Vlcus. ἰσάρθρημα, id est luxatio. κάταγμα, id est ossis fractura. σάγμα, id est conuulsus. ῥήγμα, id est ruptū. κολόωμα, id est mutilū siue curti. σθλήν, id est furunculus. ἰσθός, id est varus. φῦμα, laxariū partium phlegmone. Quāq; horum quoq; nōnulla partim locum corporis siue particulā afflicta subindicare uidentur, partim à prægrauante symptomate nominari. Quod siquid citra huiusmodi insinuationē est nominatum, at certe differentias suas multiformes habet, ueluti ulcus tametsi ipso nomine unitatis solutionē in carnosa parte non indicet, atq; ita afflicta partē unā insinuet. At particularis eius differentia uariæ sunt nomine nominata, Chironium, Telephium, Cancer, Herpes, Phagedæna, omniacq; id genus, partim ab ijs qui primū ea sanarunt, ut Chironium: partim ab ipsis qui ipsē sunt affecti, ut Telephium. Cancer autem à similitudine ad animantem. Phagedæna à symptomate, similiter Herpes. Verū Phagedæna ulcus omnino est, idq; depascens, siue exedens, siue quomodocunq; appellasse libet. Herpes non semper ulcus est, quotiesq; cum exulceratione est, non utiq; seruata ueteri sede, uicinas partes depascit: sed sicuti nomen ipsum indicat, ritu serpentis bestia, relicto priore loco transit ad alterum. Caurum uero ulcus, & sordidum, & purum, & æquale, & quod ἰσφίγγον, Græce dicitur, id est cuius supercrescit caro: hæc magis proprias sortita sunt appellationes, non tamen similiter omnes, sed æquabile à propria nimium differentia, sicuti & caurum, & supercrescens. At cruentū, & purū, & sordidū, nō à proprijs differentijs, sed ab externis symptomatis sunt appellata. Ergo cum tam impar nominum impositio ueteribus fuerit, multoq; etiā magis cum Epinyctida, & Acrochordona, id est penilem verrucā, & Nyctilopa dicant, (primū quod noctu est enatum, alterum quod summā occupat cutē, tertium quod noctu uisum auferit) aliacq; eiusmodi multa faciāt. Ergo si omnia numerē id periculū incurro, ut quæ fugere iussi, ipse facere uidear. Id itaq; omni modo agendum est ei, quem ueritatis studium tenet, ut ab ea quam nomina imaginationē faciunt recedens, ad ipsam rerum substantiam se conferat, atq; hanc inspiciat tum quot in uniuersum sint, & morbi, & symptomata, & proximæ siue internæ horū causæ, requirat. Nos igitur id alijs cōmentarijs fecimus, quorum unus de ægritudinū numero est, inscriptus autem est De morborū differentiā. alter De symptomatum est differentia. Adeo uero in eo opere causas horū utriusq; seorsum explorare studuimus (dico tū morbi, tū symptomatis cuiusq;) ut ad præsentem disputationem nihil amplius desideretur, sed præparata omnia iam sint. Itaq; ne legenda quidem quæ hic dicemus ulli suaserim, priusquam in illis sit exercitatus. Quippe si quis illis tam numerosis theorematibus neglectis, huc se contulerit, nec ipse fructū percipiet: & quæ recte sunt tradita, temere incusabit. A. c. in illis quidem particulatim omnia, tum morbos, tū symptomata, tum causas inquirō. hic duobus adhuc additis, quæ necessaria erunt ijs qui medendi artem exercebunt,

tum me ad usum inventorū prodendum confectū. 3 Quānā sunt, inquires, duo illa quæ dicere paror? Certe unum, quid inter morbū & quod Græci πάθος uocant, intersit, indicabit. Alterum q; sine corporis elemētis, ex quibus primum cōsistit, noscendis, nō possint morbi inueniri, ostendet. Hæc igitur nos accuratissime tradere studebimus. Qui ea legēt, oro ne prius ad ipsam methodum medendi se cōferant, q̃ & ipsi quot in totum morbi sint, per se inquisierint, & quæ prodita à nobis sunt, curiose inspexerint. Ergo ceu hæc fecerint, incipiam quæ promisi. Tres esse in corpore affectus præternaturā, ostensum iam est, causas, morbos, symptomata. Causas, ueluti redundantiam uel corruptionem. Morbos, ut phlegmonem, ulcus. Symptomata, ut malum colorem, & gracilitatē. Diuersa ab his sunt quæ immo dicē à corpore excernuntur, aut quæ præternaturam retinentur, & functionum utilitā: omnia scilicet cōmuni nomine symptomata dicta, ceterū nō unī generi subiecta. Quippe affectus quidā corporis est uitiosus color. quod excernitur aut retinetur, affectus non est, sed affectū sequi. Similiter actio uel læsa, uel integra, affectus sanē nō est: particulā autē unde editur, affectū necessario comitat. Ac œdema quidē & phlegmone ex ijs sunt, quæ absolute esse dicunt. Eodē modo & redundantia si ea sit sanguinis, & corporis pallor. A. Actio uero ex eorum numero non est, quæ absolute dicuntur, aut certe nō similiter sicut iam cōprehēsa. siquidē nullo tēporis spatio manent eius partes, sicuti profecto nec seminis, nec etiā motus ullius: sed horū quilibet in ipso (ut sic dicā) fieri esse suū obtinet. Cū uero duplex sit motus genus, unū in loco, aliud in qualitate: prius latitio, secundū alteratio dicūt. Ac omnis quidē actio, motus est actiuis. Omnis alteratio, eius quod alteratur, motus est passiuus. Patitur namq; quod alteratur. Ergo affectus dum alterant, mouent. Cum à motu cessauerint, iā alterati sunt: nō autē amplius alterant. Quicquid em̃ quocunq; modo se habet, aliquo omnino affectu est præditū. Quod autē in cōstanti ægrecq; asensibili affectu est, id habitū iam quodā affectū est. Sanē alteratur is qui nigrescit, alteratus est qui iam obnigruit, siue (ut sic dicā) nigresfactus est. Itaq; alteratio generatio est qualitatis, aut affectus, aut quomodocunq; appellare uelis. nec si alterationē esse depositionē, uel mutationē eius qd̃ prius fuit, dicas, id pugnet cum eo qd̃ dixi alterationē generationē esse qualitatis, cū ambo in idem recidant. nam & quæ prior in corpore qualitas fuit, mutatur, & nūc noua gignitur. Quippe eius qui in Sole uersatur, candor mutatur, nigritas gignit. Rursus eius qui igni se calefacit, frigus mutatur, calor fit. Quoties uero cuiuspiam quod substantia nō sit, generationem esse dicimus, non idem eo sermone significamus, sicut cum absolute generationē proferimus. Nam quæ absolute generatio nominat, uia est in substantiā. Quæ uero huius, uel illius generatio dicūt, uia est in illius (ut sic loquar) entia, siue substantiā. Verū hoc ueluti extra rem sit dictum. Quod uero propositum nobis

bis in disputatione maxime fuit, ferme iam definitum est. nempe aliqua in generatione, & mutatione, & alteratione, & ut semel dicam, in motu ipsam essentiam habere: aliqua in ipsius substantiæ constantia. Ac sanitas quidē, & morbus, & quæcūq; symptomatum causarumq; affectus, uel habitus sunt, ex permanentium constantiumq; numerosum. Actiones oēs alterationesq; in quacūq; re fuerint, in ipso fieri essentia suam possident. Et corpus secundum quodcūq; mouetur, secundum idem patitur: motusq; eius pathos, siue passio est. Sanæ præsi motus omnes, etiam qui naturaliter se habent nisi actui sint *πάθος* Græci, id est passiones nominant: sicut etiam ipsos actiuos motus actiones. Eo pacto & Plato sensum alterationes, pathes siue passiones appellat: cum iunioribus aliter (nescio quomodo) sit uisum, ut uidelicet de solo eo qui præter naturam sit motu, id nomē usurpent. Ac a ueteribus quidem pathos priuatim de omni extrinsecus motu dicebatur: nunc per abusum etiam affectus, qui ex passione iam prouenire, nec amplius in motu sunt, pathes siue passiones appellat: non tamen diuturnior, neq; solutu difficilior est affectus, q̃ habitus, quæ admodum neq; infirmitas. Sed eiusmodi nomenclaturæ a iunioribus sunt in uerba. Diximus autem alibi diffusius De medicinalium nominum usu. Nec illud nobis ad considerationem propositum nunc est: sed tantum quem admodum ipsi utemur, claritatis gratia, distinguere necessarium est uisum. Nam contrariū sanitati affectum, a quo lædi actionem dicimus, morbum tantum appellamus, siue diutinus hic, siue brevis sit, siue momēto duret. Ex reliquis affectibus, qui præter naturam sunt eos qui hunc præcedunt, causasq; rationē obtinent causas tantum dicimus, non pathes. Qui illi sequuntur, si actionū offensæ sunt, & symptomata, & pathes. Eodem modo & immodicas uel inactiones, uel retentiones. Qui uero affectus sunt, ueluti uitiosus color, supra passionis & symptomatis appellationē, etiam affectus uel affectiones uocamus, ita nimirū ut sunt. Omnium igitur horum cōmune id est quod præter naturam sunt, & causæ, & morbi, & symptomatis. Propriū autem morbi quidem est actioni incommode, symptomatis hunc se qui, causæ præcedere. Ergo nec is qui morbum esse motum præter naturam dixit, intellexit quid diceret: quæ admodum in proximo libro docuimus methodicorum nonnullos definiuisse, adiecta ex superabundanti constantia. nec si quis mutationē esse ab eo quod secundum naturam, ad id quod præter naturam, uoluit. quippe quæ non magis morbi quam causæ, & symptomatis definitio est: quando omnia ea affectus sunt præter naturam. Verum si brevis spatij sunt, constatacuta esse: si in ægre auelluntur, diuturna. *νόσος*, autem, an *νόσος* dicas, nihil interest, sicut neq; *πάθος*, aut *νόσος*. Et sanē *πάθος* siue passionis appellationem de morbo dixisse ueteres, quemadmodum & *ἀσθενία*, id est infirmitatem: & *ἀσθενία*, id est imbecillitatem, ostensum nobis est in ijs quæ De medicinalib. uocabulis scripsimus. In quibus

illud quoq; traditum est, nihil referre dicere ualitudinem infirmam, an infirmitatē ualeitudinis. Nam & ipsos qui ægrotant, appellāt nō solum *νόσους* sed etiā *ἀσθενίας*, id est ægre habētes, & *ἀσθενίας*, id est paru ualentes, & *ἀσθενίας*, id est laborantes. Reliquū nunc fuerit, ut cuius causæ hæc omnia diximus, in medium adducto, ad aliquid eorum quæ proxime tractada sunt, deinceps transeamus. Id quid sit, rogas? Certe nō aliud q̃ quod iam sapius ante dictum est. Primum ac maxime id medicos studere, idq; ferē propriū eorum munus esse, ut morbos adimant. Quippe simul cum hoc non modo actionis uitium statim euanescit: sed etiam reliqua omnia symptomata tolluntur. Siquidē primum ac maxime actionis ipsius quæ secundum naturam edatur, oēs egemus: propter illam uero & sanitatis. Sed & functionis incommodum amoliri omnes cupimus, ob id uero etiā morbum ipsum. Ceterum, non functionis uitio, sed morbo ipsi, id est affectui præter naturam qui actioni incommodat, applicamus remedia. Quisquis igitur ex ijs quæ particulis naturaliter insunt, & quæ temere accidunt, & quæ actionis sunt causæ, distinguere nō potest: hūc sanē credibile non est affectū ex quo primum actio læditur, inuenire posse. Nā quæ temere corporibus accidunt, etiam si milles sint alterata, nocere profecto actioni non possunt, quandiu a quibus fiebat, omnia naturam suam teneant. Horum uero si uel unū quodlibet sit alteratū, actionē quoq; ipsam statim lædi intantum est necesse, in quātum ab eo, cum secundum naturam se haberet, est adiuta. Ac mihi quidē res tota explicata iam est, clarēq; ostensum, ijs præsertim qui intelligere uerā possunt, fieri nō posse ut omnium morborum numerum methodo quis cōprehendat, nisi idem omnium causarum actionis numerū corpore secundum naturam se habente, norit. Nihil tamen ex iā dictis intelligere adhuc possunt, quicūq; uel rudiores sunt, & ingenio crassiores, uel methodicæ scitæ nugis innutriti. Denuo igitur quod nunc generatim dictum intelligentibus est, illis quoq; ipse ciatim exponamus, unum aliquod atq; alterū ueluti exemplum sermoni proponentes.

4. Curingua sapores percipit, nec ulla pars alia. Num propter colorem, aut situm, aut magnitudinem, aut figuram? Quippe ea affecta, nec commode sapores sentiente, aut calorem eius ad naturam suam reducemus, si uidelicet huic actionē debet: aut iam dictorum quoduis, si ab illo agēdi uim accipit. Quod si propter aliud ab ijs quippiā, constat si illo tantum tenuis ad naturalē habitum sit restituta, nullo etiam reliquorum fore opus. Nam esto, exempli gratia, densitas certa pororum causa sit, cur succi saporem diiudicet. Nunquid horum symmetriā quæ in sanitate uisitur, tuebimur, rursusq; a metriam, id est a iusto modo recessum, quoties laborat, corrigemus? Esto (si placet) medicocris calor causa sit, cur saporem intelligat. Num hīc quoq; manifestum est, ceteris neglectis, unam adhibendam curam, ut illud seruemus a quo agendi facultatē accepit: lā si propterea quod ita in siccō humi-

doq; temperata sit, idcirco sentiat: quis non reli-
 quis possit habitis, huc tantum intendat, ut neq; ius-
 sito sicciior sit, nec etiam humidior? Quis rursus, si
 hoc uerum est, nō facile prompteq; colligat duos
 esse uniuersos linguae morbos, alterum siccum, al-
 terum humidū? Veluti rursus si per moderatum
 calorem, & frigus habet quod sentiat: quis nō hic
 quoq; duos esse morbos eius intelligat, caloris fri-
 gorisq; a modo recessum? Non aliter quoq; si pro-
 pter tenuium meatuum competentiam sensum
 est naeta, promptum profecto hic quoq; collige-
 re est, omnino eam ex horum immoderato habi-
 tu esse uitandam, duplexq; uitium fore, densitudi-
 nem eiusmodi meatuū, & raritūdem. Sed num
 etiam plura dicam, quō stupidos istos inducam,
 ut si nihil aliud, illud saltem intelligant, non posse
 quenquam, nec inuenire, nec demonstratione as-
 ferere morborum numerum, qui non ex ijs quae
 particulis insunt, tum quae causae actionis sint, tū
 quae temere accidunt, norit? Num etiam alterum
 adhuc tertiumq; exemplū adijciam? Saepe nam
 que multitudine exemplorum, stupidorum ani-
 mi ueluti a somno excitantur. Age igitur ita ho-
 mines interrogemus: Idcirco ne corpus calida, fri-
 gida, dura, mollia, lenia, & aspera, omnia deni-
 que tangibilia sentit, quod candidum colore est,
 aut nigrum, aut rufum, aut uno uerbo, quod talis
 coloris est? Aut propter horū nihil, sed aliud quispi-
 am? Neminē enim arbitror latere, quin si quid
 probe sentiendi munere utetur, id tantum illi tu-
 endum custodiendumq; sit, ex quo uno probe
 sentiendi facultatem accepit. Nam si ex eo quod
 candidum fuit, id dotis obtinuit: eius nimirum
 tuendi maxima erat habenda cura, sicut nigri fu-
 giendi. Sin contra ex eo quod nigrū fuit, sentien-
 di uim habuit: omnes (arbitror) alios colores fu-
 gere formidareq; oportebat. Ad eundem mo-
 dum & si inde adeo sentit, quod flauum, uel ru-
 fum est, fugiendi (arbitror) alij colores sunt ceu
 sensum, uel penitus abolentes, uel uitiantes. Prae-
 terea, si eo quod durum sit, sensu est praeditum:
 si molle fiat, deterius sentiet. Aequē ut si eo quod
 densum sit, si ad raritudinem mutetur. Iam si tenui-
 um meatuum symmetrię acceptam sentiendi uim
 refert, ubi ab hac recesserit, uitabitur. Et genera-
 liter, ut sentiat, id tantum ipsum adit oportet, un-
 de sensum obtinuit: atque id tantum corrigatur,
 unde sensus est laesus, cum a natura recessit. Num
 igitur tertio exemplo est opus? an hac abunde sa-
 tisfaciant? Sanē prudentibus uel hac super uacua
 puto, ut qui uniuersale intelligere sine exemplis
 possint: rudibus autem, & improbis, & conten-
 tiosis ne si tertium quidem addam exemplū, quic-
 quam fortasse profecero. Veruntamen quando
 duo iam dicta sunt, & inaniter tempus nostrū sem-
 per terunt: non fuerit alienum, unum etiam num
 ijs exemplū adijcere. Proponatur itaq; iam quem
 admodum uentriculus malē cōcoquens nobis sit
 corrigendus. Verba autem faciemus, non solum
 contra methodicos, sed etiam contra eos rationa-
 lium qui non cognita ipsius actionis prima causa,

quam cōtinentem etiam nominare sunt soliti, me-
 thodo quadam ac ratione constitui posse artem
 putant. Esto igitur quispiā dicat (ab ijs enim quae
 obuiam promptamq; absurditatem exhibent, coe-
 pisse praestat, quō eos, si fieri potest, ad ea quae con-
 fusa magis sunt, intelligenda sensim perducamus)
 Esto inquam, aliquis dicat hunc quempiam, qui
 nunc cruditate laborat, quod multos deinceps di-
 es solo lacte est altus uentris colorem mutasse, al-
 bumq; ex rubro, reddidisse, idcircoq; uentris sui
 functionem uitiasse. Fortasse iam rides, et iure pro-
 fecto rides. Verum si scias quā sit simile, & huic
 de coloribus citra ullam demōstrationem adhibi-
 tam quiduis pronūciare, & tibi de exiguo uen-
 tuum (uerbi gratia) symmetria, aut alio quolibet
 affectu, non arbitror iure ridebis. Nam aut in tete-
 rifum uertes, aut non in hunc. Nam esto impudēs
 sit, qui causam minus probe concoquendi coloris
 imputet, dicatq; quoniam ex naturali colore uen-
 triculus ruber est, nunc uero redditus est planē al-
 bus, idcirco cruditate laboret est necesse. Libens
 sanē audiā, quid tu cōtra hunc obijcias. Ego enim
 aliam rationem nō inuenio, quā ut iubeam qui
 ita dicit, prius ostendat an omnino propter colo-
 rem, iustam ac naturālē actionē uentriculus edat.
 Tu si quam aliam habes, libens audiā. Sed nec ha-
 bes, nec habere aliam contradicendi rationem po-
 tes contra eum, qui colore ex cruditatē uentriculi
 causam esse dicit, quā exigere ut doceat quomo-
 do ex naturali colore consecutus, ut concoqueret
 uentriculus, sit. An igitur huic qui coloris crudita-
 tis causam imputat, fides non adhibebitur anteq̃
 doceat etiam hoc nomine agere uentriculum: tu-
 cum uel tenuium meatuum symmetrię uitio, uel
 alij cuiuspiam hanc ascribas, credi tibi postulabis,
 priusquam doceas quo pacto ex symmetria in il-
 lo genere agat? At non hoc aio, inquit, nec aliud
 quicquam esse cōcoctionis cōtinentem causam,
 sed prorsus id ignorare me fateor. Atqui si ei qui
 coloris actionis causam tribuit, necesse est etiam ei
 dem lationē actionis imputet: qui uero tenuium
 meatuum symmetriā actionis causam dicit, etiam
 horum ipsorum a iusto modo recessum, eandem
 uitare fateatur: tum qui temperamento quatuor
 qualitatum, caloris, frigoris, humoris, & siccitatis,
 actionis causam assignat, etiam eorundē ipsorum
 intemperiei offensam eius ascribat: utique & tibi
 necesse erit, eo quod secūdu naturam est, prius
 praesumpto, ita quod praeter naturam est, inquire-
 re. aut si ipsum quod secundum naturam est, non
 nosti, nec quod egressum a natura est, nosti. Ete-
 nim uos etiam ipsos audio contra Empiricos dici-
 cere, fieri non posse ut qui id quod secundum na-
 turam sit, non norit, dignoscere id quod praeter na-
 turam sit, possit. At nosco, inquit, quod secundum
 naturam se habet. Quaro, totū ne an partē eius
 aliquam? Atque pars ipsa quam nosti, est ne actio-
 nis ipsius causa, an uentriculo inest ociose? Nam
 quid demum eius nosti? situm uidelicet, & magni-
 tudinē, & cōtextum, & figuram? At nihil horum
 actionis est causa. Sed nec Empiricos horū quic-

quam latet. quippe qui & se partium dissectione, cum occasio hanc offert, uti fatentur; et ex illa se hec intelligere, non tamen actiones ususque particula- rum. At noui, inquit, & actionē. Est enim circumplexus & attritus. At nisi causam eius noueris, nec morbum intellexeris. Nam si quatuor qualitatuum medio cris temperies, actionis sit causa, earum in- temperies, omnino uitij causa erit. Tu uero reris phlegmonē, & scirrhum, & oedema, et abscessum, aliaque quae oculis usurpari possunt, solos esse uen- triculi morbos, quamuis ne haec ipsa quidem uelu ti Empirici solis oculis, manibus, & reliquis sensi- bus apprehendas; sed ad ipsam essentia eorum ten- tas ascendere, atque hanc diligenter disquirere, uide- licet non contentus ijs symptomatis, quae sensui apparent, quae tamen symptomata Empirici defi- niunt, ac circumscribunt tuam syndromem. Sic enim ipsi appellanda censent symptomatum con- gregem, quae in affecto sunt loco. Sed nec curatio- nis indicationem ex apparentibus symptomatis accipis. Non enim an tumor praeter naturam, nec an renitens, nec an cum dolore, nec an ruber: sed an sit in finibus arteriarum impactio ex coinciden- tia, consideras, ac curationē (ut ipse fateris) ad hoc referens, exploras. An nō ea est Erasistrati docen- di ratio, ubi de febribus agit: sicuti rursus alia Dio- clis, alia Praxagorae, alia Aesclepiadis. Itaque non à symptomatis quae in phlegmones apparent loco indicatio praesidij his sumitur: sed ab ipsa substantia. Neque enim an tumor à natura egressus, neque an retinentia, neque an dolor pulsatilis: sed an & coin- cidentia, & impactio in finibus arteriarum, aut ob- structio in exitu uenarum, aut putredo aliqua suc- corum, aut corpusculorum ratione contemplabi- lium, in laxitatibus aequae ratione speculabilibus, intentio sit, aestimant. Quare hi omnes ab affectu phlegmone laborantis partis, non à symptomatis quae hanc sequuntur, praesidiorum indicationem sumunt. Ad eundem arbitror modum, et si quis ca- lidum, frigidum, humidum, & siccum, causatur. Ve- rum hic etiam si uentriculus citra phlegmonē, aut ulcus, aut abscessum, aut alia id genus, eo tantum quod frigidus sit, non recte concoquat: tamen re- medijs non destituitur. At qui phlegmonas, scir- rhos, aliaque quae oculis uidere licet, tantum esse mor- bos putant, ridicule planè cruditates, quae sine ijs sunt, ex imbecillitate uentriculi incidere dicunt: ceu affectum aliquem priuatum seicundumque im- becillitatem esse uelint, non autem uelut in suppu- rantibus, aut scirrho grauatis, aut phlegmone affe- ctis, aut alia quauis ratione laborantibus inesse. Quippe omnia haec uitia, siue in uentriculo, siue in iocino, siue in pectore, siue in alio quouis acci- dant, illico partem in qua sunt, ad propria functio- nem edendam imbecilliolem reddunt. Sed id non satis illis erat ad indicanda remedia: alioqui frustra inquirunt affectus, frustra ad ipsam morbi essen- tiam subeunt, tanquam non aliter detur idonei com- potes esse remedia. Nō igitur qui imbecillitatem uitium esse dicunt, ubi nullo ex ijs quae ipsi mor- bos definiunt, affecto uentriculo, animal crudita-

telaboratijs, dum à nobis refellantur, expectant, sed ipsi se ipsos redarguunt: cum non proprium aliquid, sed commune omnium dicat, quodque nec illis ipsis iudicibus, remedium inuentionem in- dicare facile possit. Quippe illud roborare imbe- cillitatem, nomen nudum, ac ueluti meta potius est quod curans dirigit, non curatio. Nam quid faci- endo ijs qui inualidi ad actionem sunt robur uin- dices, non dicunt. At in hoc curatio consistebat, & nisi uentriculi affectu inuento, ut remedium sis compos, fieri nō potest: quippe si refrixit, calfaci- endus est: si humectus est effectus, siccandus est: pari modo si immodice incaluit, refrigerandus est: si siccatus, humectandus est. Atque haec quatuor sim- plices curationis rationes sunt. Altere quatuor co- politae sunt. Si frigidior ac siccior temperamen- to redditus uentriculus est, calfaciendus simul hu- mectandusque est. Si humidior & calidior iusto eua- sit, siccandus ac refrigerandus est. Pari modo si ca- lidior ac siccior est effectus, tū refrigerandus, tū hu- mectandus est. Sin humidior ac frigidior, quod pro na- tura est, siccandus ac calfaciendus est. Quare octo tū uentriculi ipsius affectus sunt, quas illi imbecillita- tis causas dicunt: tum octo medendi rationes.

5 Nec sicut Empirici, sic ulli dogmatizantium dicere licet, sint haec an non sint, nihil esse opus in- telligere. Funditus namque logicam sectam subuer- tent, si ignorato affectu, curationis tamen faculta- tem abunde sibi superesse dicant. Etenim ab usu ipso omnes quomodo curandum sit, intelligent, si ab ipsius rei natura indicationem non sument. Ac Empirici quidem & quod inuenire posse non pu- tent quicquam eorum quae abstracta sunt, & quod id etiam si inuentum sit, non desiderent, (quippe ob- seruatas à se esse curationes in apparentibus con- cursibus) merito nec scire se an octo affectus sint, quibus uentriculus imbecillus sit, aiunt: & citra eiusmodi superuacuum morositatem remedijs se abundare. Qui uero & rationem se habere pro- fiterentur, cuius ope etiam abstracta inquirant, & ipso- rum inuentionem praesidiorum praestare indicatio- nem dicunt: hos quomodo nō pudeat dicere, aut non nosse se, an octo affectus sint, aut eos ad me- dendum parum se requirere? Neque enim id tantum dicere latis est, nō nosse se: sed refellere par est eos, qui se scire affirmant, ceu parum uera professos. Quo- ad uero nec ipsi id faciunt, alijque non pauci demon- strationis fide confirmant omne corpus pro certo quatuor qualitatuum temperamento opus suum edere, rationabilius est illis accedere: nisi forte qui nuda afferunt uerba, plus sibi credi postulabunt, quam qui cum demonstrationum fide loquuntur. Atqui illi si nō aliud, saltem suadere ac docere au- ditorem studet, non cogere iubereque. Hi totum con- tra tyrannorum ritu iubent, ne quaeramus actio- nis causam. Verum nos hoc nomine Dionysium, Phalarim, ceterosque tyrannos odio prosequimur, quod iubent imperantque, non suadent, ac docent, sicut Solon, Draco, & Lycurgus. At, inquit, ego intra limites artis maneo. uos & ab ijs exceditis, & ad naturalis philosophiae principia nos reduce-

reconamini. An igitur homo lepidissimè, ne hoc quidē ipsum demonstrabis, qui nā uidelicet medicinæ artis sint limites, quæq; nouisse expediat ei qui rationē remedium inuentionē molietur, sed terrifico uultu tuo reddere attonitos putas? Audio quidem & te illud dicere, non oportere actionis inquiri causam. Audio & Empiricos dicere, nec actiones ipsas esse considerandas. Audio nō minus illum qui dicit non tantū has esse asstimandas, sed etiam causas unde nascantur querēdas. Num igitur ex eo esse me iniquorū iudicium numero iubes, qui priusquā omnes qui inter se dissideant, audierint, uni statim ferunt suffragium? An primum quæ uestrum quisq; dicat, seorsum audire uis, dein conferre, atq; perpendere quis tum sibi, tum apparentibus consentiat, quis rursus nec secum, nec cū ijs quæ apparent? Atqui si ita faciā, Empiricos audiam, et si quæ dicunt, stabiliter nō demonstrant, saltem ea leniter conantes. Vos ne id quidem facitis. Nam sanē libenter audierim quis uestrum, uel lenimē aliquod, uel demonstrationē aliquam asferre sit conatus, cur actionis causam inquiri nō expedit. Quæ enim à me methodo supra est posita, inquirendā esse demonstrauit. Vos q; inquirenda non sit, nec demonstrationē ullam, nec rationem ullam probabilē asferre conamini: sed tantum elato supercilio tetricè nos oburgatis, abscedere à summa physiologia iubentes, nec sic querere hominis naturam intelligere, ut philosophi faciunt, qui ad prima usq; elementa ratione ascendunt. Illud quoq; uobis, uel dixisse tantum satis uidetur, nempe arteriā, & uenam, & neruum, principia continentia, & ueluti elementa eius physiologiæ, quæ de homine instituitur, ponenda esse. In quo quidā Herophilū laudauit, q; ita ad uerbum dixerit: Esto hæc prima esse, tametsi prima non sint. Sed qui ad demonstrationē prouocat, ac hypotheses istorum qui sic opinantur, pugnare secum ostendit, hunc auerfamini ac fugitis, prorsusq; nō auditis, & contemnere simulatis, ibiq; rationem fastiditis, ijdem scilicet qui cōtra Empiricos rationem demonstrationeq; extollitis. Nam q; secum dissideant rationes omnium, qui uel ex dimidio dogmatizant, etiam ijs qui tenuiter in demonstrandi methodo sunt exercitati, facile perspicere licet. Cum enim phlegmone uētriculus laborat, atq; inde adeo cōcoquere non ualet, quæ nam phlegmones causa sit, querendum censent, atq; inde præsidiorum copiam coniectant, sprete Empiricorū inuentione. Cum uero citra phlegmonē, aliud ue id genus uitium, solius intemperantiæ culpa cōcoquere non ualet, hic rursus auxiliorum facultatē ab experientia petunt. Atqui hæc secum non cōueniunt, cum Empiricorū opinio sibi constet, præterea demonstrat efficiatq; quod uolunt, ex ijs quæ uos ipsi nō inficiamini, lemmatis. Quippe si fieri ullo modo potest, ut ex ijs quæ apparent symptomatis curandis ratio coniectetur, ignorato affectu: utiq; nō hic possibile, in alio fuerit parum possibile: sed æque in omnibus possibile erit. Ergo ne hoc quidem loco rationē ullam asferre poteritis, quo minus ubi

affectum explorare nequitis, experientia ipsa satis sit ad remedium inuentionem. Omnia igitur tyrannorū ritu imperatis. Vti uero demonstratio. nē nec ipsi uultis: (prestat enim ita fortale dicere, quā non posse uos) nec ijs qui uti tum uolunt, tum possunt, acceditis. Itaq; quid aliud sunt disputationes uestræ, quā lites, & contentio, & prouocatio ad conuitia, & pugnas: cuiusmodi præceptorum uestrorum quidā perpetuo exercuit: aut irridens si quis calidi, uel frigidi mentionem faceret, tanquam balneatoribus magis, quā medicis ea nomina cōuenirent: aut uehementer increpatis, quasi longissimè à medendi arte digressum: aut Erasistrati grauem illam autoritatem obijciens. Verum hæc ut primo auditu oblectabant, ita cum secundo & tertio audiui, molesta sanē fuerūt, ceu scurris, quā medicis magis congrua. Si enim semel autoritas eorum, qui ultra non esse procedendum iubent, legitimus testis esse ad demonstrationem putabitur, omnia iam meræ nugæ erunt, nec finis in disputatione ullus, nisi qui nunc uisitur, inimicitia, pugna, cōuitium. Quippe qui à logicis demonstrationibus digressi, credi quippiam cēsent, propterea quòd Herophilus, aut Erasistratus ita iussit, hos necesse est omnis generis conuitia pugnascq; sequi, admiranda scilicet disputationum quæ nunc habentur præmia. Fingamus enim alius dicat, huic qui commodè non concoquat, uentriculum frigidum & siccam intemperie cōtraxisse, proindeq; humectandum, ac calfaciendum esse. alius, quòd naturalis eius habitus mutatus ad frigidius, & humidius sit, calidum siccumq; uitium adhibendum suadeat. tertius autem quipsi accedens, quod quæ comprehensa sunt, non recte sint dicta, id ne tentet quidem ostendere, sed tantum eos qui dixerint, oburget, quasi superflua scrutentur, & testes adhibeat Erasistratum, uel Herophilum: nōnne (ut dixi) dissidiū hinc mutuiq; conuiuii initium excitabitur: quippe illos cōtra necesse est Athenæum, & Mnesitheum, & Diodem, & Plistonium, & Hippocratem, & Philistionē, & sex cētos alios tales opponere testes. Si enim testibus decidenda lites erit, non modico hi uincent. Nam quod tum insalubris intemperamenti plures sint species, tum cuiusq; earum diuersa curatio, ubi nō Hippocratis modo, et plurimorum aliorum medicorum, sed etiam Platonis, Aristotelis, Theophrasti, Zenonis, Chryssippi, & omnium illustrium philosophorum testimonio comprobantur: utiq; et q; citra naturam corporis exacte inuentam fieri nequeat, ut uel de morborum differentia quicquam inuenias, uel auxiliorum cōuenientium copias compos, ijdem ipsi tum philosophis, tum medicis confirmabunt: hisq; non tyrannorum ritu, sicut isti, iubentibus, sed euidenti ratione probantibus. Contra hæc igitur, qui calidum, & frigidum, balneatorum, non medicorum dicunt esse uocabula, dicteris uidelicet utentur, & risus mouebunt, moriones, phrygas, aut scholasticos narrantes. Quippe conscj sibi sunt non modo nihil demonstratione confirmatum scire: sed nec quid de

num demonstratio sit intelligere. Ergo ex his di-
 cterijs necesse est oriatur dissidij initium. Vt enim
 primum omnium memorem quæ nugantes sine
 demonstratione dicere non dubitât, cōsidera quo
 pacto necesse sit ex eo pugnâ subsequi. Nam ubi
 contra dicta eorum nuda, & demonstrationis ex-
 pertia, ac contra testes ipsos quibus credendū cen-
 sent, alij tū celebriores, tum longe plures testes
 opponit, necesse est, uel cedere, uinciq; utrōq; no-
 mine, & quod demonstrare recusarunt, & quod nu-
 mero testium sint impares; uel perfricta fronte, E-
 rasilfratum omnibus illis testibus dicere maioris
 esse fidei. Siquidem hic necessum est alterum ne-
 gare esse maioris fidei, aut Hippocrate, & Mnesi-
 theo medicis, aut Aristotele, & Platone philoso-
 phis; alterum esse maioris fidei instare; deinde uar-
 iis ultro citro tam immodesta, contentiosaq; con-
 tradictione iactata, alterū eorum impelli, ut dicat
 non esse, alterum bene sanē, si tu Erasistratū in or-
 dinē redigas. Hæc enim quotidie fieri in medico-
 rā disputationibus: o Hiero, uides, Ea uero semel
 data porta, omnia iam muliercularum uerba inge-
 runtur; & cum mutuis se maledictis aspererint, in-
 utiliter amisso tempore discedunt. Atq; hanc tur-
 pitudinem non est q; dicat aliquis non esse ab ijs
 qui demonstrationem fugiunt, inceptam. Fugiant
 aut multifariam, ut scis: alij cum gravitate tantum
 increpantes; alij scurrile aliquid cōmenti; alij in ri-
 sum sannasq; disceptione abrepta. Quod si quis
 sermonisare, demonstrationesq; audire audeat, pri-
 mum quidem omnino nō intelligit, neq; enim po-
 test qui demonstratiue methodi sit imperitus, eos
 qui ipsa utitur intelligere. quod si aliquatenus in-
 telligit, at quod dogma suū in quo est innutritus,
 propugnare omnino decreuit, contra tendere ag-
 gressus, dein deprehensus, quæ nec rite cludant,
 nec colligant, sed uana nugaciāq; sint dicere, irasci-
 tur, & deuouet. Dialecticos, ceu malorū autores,
 quod uidelicet pituitam a naribus ipsorum deter-
 gent, ipsiq; mederi conantur. adhibitis scilicet nō
 melle, & placentis, sed alijs, & capis, quæ etiā pi-
 tuita tentatos gallinaceos sanare solent. Quippe
 nullies affuisti ijs, cum a diuersis cludentibus argu-
 mentis non aliter quā ab ipso alio, & capis co-
 geretur lachrymari. Nec te profecto latet, multos
 sapientibus priuatim falsos sentire iam se suam se-
 ctam, quā sit absurda, nec tamen hanc posse pu-
 blice mutare: cum alioqui, nec alia noscent, unde
 haberentur in precio, & iam uulgo propter hæc,
 & notū, & in precio forēt. Itaq; ob hæc ipse quoq;
 distuli cōmentarios De medendi methodo scribe-
 re, pro comperto planē habēs paucissimos huius
 tempestatis ab ijs adiutum iri. Etenim nisi magna
 quæpiam mirac; mutatio humanarum rerum fiat,
 actum de bonis studijs est, utpote confusus ac cor-
 ruptus, nemine ueritatem ipsam, sed tantum scien-
 tiæ famam quærentem. Optime enim profecto scis,
 ne quinq; uiquam inuenisse nos qui esse potius q;
 uideri docti cuperent. Atquin nisi quis sapientiam
 ipsam propter seipsam expetat, ne tempus quidē
 ullum inueniet, quo se in Logica methodo exer-

ceat. imō diuitijs, & famæ, & potentia ciuili inhi-
 ans, in horum ambitu uitam omnem consumet.
 Ergo dimissis his, rursus ad propositū redeamus.
 6 Est aut ab initio propositum illud. qui oēm
 morborū numerum methodo non inuenierit, hūc
 maxime in ipsis medendi methodi foribus lapsu-
 rum. cum constet totidem esse medendi rationes,
 quot sint morborum idæ. Ergo sic in enumeran-
 dis morbis egisse, ut neq; priuatis proprietatibus
 attētus infinitos statuatur, nec in primis statim gene-
 ribus subsistat, id in promptu cuiq; non est, sed ei
 tantū, sicut antea dictum est, qui in diuidendi me-
 thodis sit exercitatissimus. Principium uero diui-
 sionis eorum est, ut etiā aliubi diximus, ut essentig
 ratio rei diuidendæ constitutur. Igitur illud mon-
 stratū nobis est, morbū omnino unum ex ijs esse,
 quæ præter naturā sint. Hæc aut quatuor cum sint,
 actio offensa, affectus unde actio, puenit, affectus
 ipsius causa, & quæ hunc subsequunt symptomata;
 siue functionē ipsam uitiatā, siue unde hæc pro-
 uenit affectum, morbum nominare uelis; nihil id
 medēdi methodum immutare ostēsum est, modo
 unum illud intelligat, primā ipsam curationē, quæ
 etiā nōnulli continentē appellat, affectus esse qui
 actioni incōmodat. Porro ostensum a nobis dixi-
 mus, rationabilis hunc morbum appellari, nō ta-
 men uetare nos quin si cui id cordi sit, actionis no-
 xam morbum nomet; affectum qui hanc creet,
 morbi causam. Præsumpto igitur q; morbus uoce-
 tur affectus is præter naturam, qui functioni offi-
 ciat, inquisiuimus deinceps quot in uniuersum
 morbi essent. Vbi clarum obiter fecimus, si quis
 uia ordinēq; processurus sit, nec (sicut uulgo me-
 dicorum facit) tyranni ritu imperaturus, hūc pri-
 mum inueniendum esse affectū illum qui functio-
 nis effectrix sit causa. Hunc sanē nos *ὑπερθερμὴν* di-
 ximus esse calidi, frigidi, humidi, ac sicci. Proin-
 deq; primum morbum in similaribus esse, ex ho-
 rum intemperie ostendimus. Alius quispam cor-
 pusculorum, & meatuū symmetriam statueret, eoq;
 ex indebito meatuū ipsorum modo ægrotare ani-
 mās; Ceterum, si quis nec ipse actionis causam,
 in quonam entū sit genere, audebit statuere, nec
 ijs qui statum cōtradiciet, ac nihilo fecius tamen
 ratione methodoq; se procedere arbitrabitur, hūc
 egregie improbū esse diximus: ut qui nec tutum
 se ab Empiricorum accusatiōe facere possit, & se-
 eum planē pugnet; quippe eiusmodi homines ex
 dimidio logicos esse, qui qua ratiōe phlegmone,
 scirrhus, oedema, & alia id genus fiant, multo labo-
 re disquirunt: lædi autem etiā citra hæc omnia ex
 sola intemperie actionem, non intelligunt; sed em-
 pirice talia curāt. Quisquis igitur quantum hi ab-
 errent scire uolet, tū quot morbos transfiliat, quan-
 toq; plures ignorent, q; norint, librum De morbo-
 rum differentijs perlegat. Intelliget em̄ Hippocra-
 tem primū omniū recta instituisse uia. Quæ cū a po-
 sterioribus absoluēda fuerat, nō modo nemo eorum ab-
 soluit, sed pleriq; etiā quæ probe fuere inuēta, cor-
 ruperunt. Proximē aut ut uia quæ inchoata est ab
 eo, perficeret absoluerentq; Aristoteles, & Theo-
 phra

phrastus acceſſerūt; & ſi fateri uerum oportet, po-
teſtate abſoluerunt: cum cōſtituerint aliud eſſe in
corporibus ſimilaribus morbi genus, aliud in ijs
quæ inſtrumentalia dicantur. Quippe à ſimilaribus
functiones edi, eoq; eſſe cuiuſq; inſtrumentū unam
etiam ſimilare. Reliquas uero quæ cum hac quod
uis inſtrumentum perficiunt, eas, uſus aliquid gra-
tia, illius quæ prima erat actionis cauſa factas eſſe.
Sed & horū tamen rursus cuiuſq; eſſe per ſe actio-
nem, ueluti in oculis. Satiſ enim fortaliſſi ſit, quæ
in alijs diſtufe oſtendimus, ſtriſtim hic cōmemo-
remus. Ipſum uiſus inſtrumentum eſt cryſtallinus
humor. reliquæ oculi partes, eius cauſa funt factæ.
Quarum omnī uſus narrauiſus in decimo ope-
ris De partium utilitate libro. Cæterū, quanq; cry-
ſtallini maxime cauſa omnes ſunt factæ, ſingulæ
tamen earum aliquam ſeorſum actionem ſunt na-
tæ. ac uena quidem, & arteria, & nervus, toti ani-
manti cōmunem. Membranulæ oculi omnes cum
ſint nutrimenti participes, omnino naturalibus fa-
cultatibus ſunt præditæ, ac perinde etiam func-
tionibus quæ ab his proficiſcunt. Quoties igitur cry-
ſtallinus humor ex intemperie laborat, omnino le-
ditur oculorum func-
tio. Cæterum, non eſt eorum,
ut organa ſunt, morbus. At quod hypo-
chyma uo-
cant, nullius ſimilarium eſt morbus, ſed oculi toti-
us, ut inſtrumenti. Ad eundem modum, ſi in ſini-
bus uenarū, quæ in cauo iocinoris habētur, obſtru-
ctio ex lentis, aut craſſis ſuccis ſubhæſit, digeſtio
quidem in corpus per has morabitur, ægrotudo ta-
men totius iocinoris, ceu inſtrumentū cenſebitur,
nulla ſimilarī eius partium ægrotate. Quod ſi in-
temperies uenas eius inſeſtauerit, ipſarum quidē
illarum morbus primū erit, ex accidente uero etiā
iocinoris. Ac Eraſiſtratus quidem in phlegmone
ſubſtantiā tradēda eſt lapſus. cum nec in particulis
quæ phlegmone laborat in ſinibus arteriarum, im-
pactio neceſſario cernatur, nec arteriæ ſpiritu tan-
tum, cum in naturali habitu ſunt, continēat; ueluti
in tractatione de his oſtendimus. Si igitur phleg-
mone eius generis morbus ſit, cuius autumat, &
ſcirrus eius generis, cuius ille opinat, & reliquo-
rum ſingulū, ſicut ipſe obſcure, & multi ſequaces
eius clariſſe explicare conantur; utiq; ſolidas ipſas
partes liberās propemodū à morbis relinquit, niſi
quatenus ulcerari, collidi, incidiq; ualeant, atq; id
genus aliud quiſpiā pati. Laborare uero eas ſe to-
tis, eiſmodi morbis, quales nos octo intemper-
tias oſtēdimus, id nuſquā dicit. At qui corpora uni-
uerſa etiā quæ diſſicillime afficiunt, ueluti es, lapis
ferrū, ſaltē calſieri, frigefieri, ſiccari, humefcereq;
cernuntur: ut utiq; mirum ſit, ſi tantum arteriæ,
& uena, & nervus, niſi eiſmodi ſentient. Atq; hoc
etiā magis mirum, ſi patientur quidē, functionem
tamē legitimā edent. ueluti (ſi ita fors tulit) in cor-
de facultas quædā eſt, (ut ipſe quoq; Eraſiſtratus
confirmat) qua laxatur, & contrahitur. Hanc autē
lædi proſpectio oportet, ſi uiuenti animali cor ſit ex-
emptum, quemadmodum ſæpe factum in ſacrifi-
cijs uidemus. Quippe ſi non leditur, perpetuo mo-
uebitur, nec tantum ad tempus aliquod, ut nunc

A cernitur. Maniſteſtum eſt igitur læſam eſſe, proin-
deq; mouere deſinere. Illud igitur cōſideratum non
inutile erat, cum poteſt ſaltē facultas ea ledi, etiam
antequam cor ſit exemptum, quæ nam ſit eius læ-
ſio, quænam alia, præter intemperiem. Nam neq;
figura eius mutata apparet, nec cauitas, nec liga-
mentum, nec oſculum, nec alia ulla pars perditā,
ſed tantum naturalis temperies mutata. Ergo om-
nes hi ſimilarium partium morbi omnino, ut di-
ctum eſt, ab illo ſunt omiſſi. Si quidem ubi ſanguis
in ſinibus arteriarum impactus actionem uiuat, id
arterias ipſas quatenus inſtrumenta ſunt, male ha-
bet. Vt uero ſimilares particulæ ſunt, octo quidē
ſecundum nudas qualitates intemperies habent,
octoq; rursus cum fluxione. Oportet igitur, quiſ-
quis horum cum certa ſcientia demonſtrationes
coeſpiſſe uelit, à libro De elementis incipiat, poſt
deinde reliquos ſingillatim (ut dictum eſt) legat.
Sunt uero proximi huic cōmentarij de tempera-
mentis. Ab ijs proximus eſt, qui de inæquali intem-
perie inſcribitur. Mox, qui de naturalibus faculti-
tibus. Alij q; qui de animæ affectibus ſunt proditi.
idq; de unoquoq; deinceps, & ſeorſum. Hos exci-
piūt qui de particularum uſu ſunt inſcripti. Quos
ſequuntur qui de morborum, ſymptomatumq;
differentijs titulū habet. Pleriq; uero medicorum,
nec tantum experientiæ applicantes animū (cum
tamen liceret ex Empiricorum inſtitutione bonis
eſſe medicis) & perfectioris rationis cupidi, cum
aut ijs quæ citra demonſtrationem ſunt enuncia-
ta credant, aut uitioſis demonſtrationibus fallan-
tur, non ſolum niſi excogitant boni, ſed etiam
quæ per experientiam ſunt cognita, corrumpunt.
Si quidem ratio non leue momentum obtinet ad
experientiam, uel ornandam, uel corrupendam,
ſed quantum recta ratio ornando adſciit, tantum,
uel etiam amplius, uitioſa detrahit. Atq; hæc me
ſæpe medicorum uulgo prædicantem audiſſe, qui
priuſquā in methodis Logiciſ ſe exercuerint, illi
cum demonſtrare aliquid tentant, ſeipſos fallunt;
uel cum diuidere quiduis in ſpecies, ac diſſerētias,
hic quoq; imperitorum coquorum ritu nō per ar-
ticulos incidunt, ſed conterunt, collidunt, ac diſa-
niſiāt, ueluti in eo quod nunc eſt propoſitum. Con-
ſulo igitur (ut ſcis) talibus omnibus, experientia
animū intendant, cum non leue inſit periculum
ijs, qui ſupra uires aliquid moliantur, ne & id non
conſequantur, & quæ intelligere alijs poſſent, om-
nino amittāt. Ergo cū ijs qui tum recto ſunt in-
genio, tum diſcere parati, ipſi rursus ſermonē con-
feramus, illud tantum ex ijs quæ inter initia dixi-
mus, commonentes, non eſſe committendum, ut
utraq; ſimul confundantur, miſceanturq; & quæ
per experientiam ſunt inuenta, & quæ ſola ratio-
ne ſunt inueſtigata: ſed cum utrūq; ſeorſum ſit tra-
ctatum, poſt ambo coniungantur. Ergo cum ipſi
de experimentalī ſectā alibi egerimus, de Logica
in his cōmentarijs diſſerere propoſuiſus. Ac mi-
hi uideor ijs præſertim qui cōmentarios no-
ſtros De morborum ſymptomatumq; differen-
tijs perlegerūt, cum quibus ſcilicet mihi deinceps
ſermo

sermo erit, iam clare ostēdisse maxime in ipsis statim foribus lapsum Theſſalum eſſe. Lapsus enim non leui lapsu, & Aſclepiades erat, ubi inter initia de elementis corporis male ſenſit. Cæterum, multo & maiore & grauiore Theſſalus, quippe qui omnes in uictus ratione morbos in duos ſimiliter illi contulit affectus, multos uero medicinalium ſcoporum ademittit, quibus ille eſt uſus. Peſſimum autem grauiſſimumq; illud admittit, quod nec ipſas actionum noxas, nec affectus qui earum cauſe ſunt, morbos cenſet; ſed ſolis uacuationibus, uel ſtatis, uel præcipitatis intentos eſſe uult, cum ne quid ſit plus iuſto ſiſti præcipitariue uacuationē, clare nos doceat. Quippe uel ad uires, uel ad cauſam, uel ad affectum, uel ad id quod per ſanitatē ſemper eſt obſeruatum, reſerui iudicium oportet. Ex quo factū arbitror, ut pugna inter eius ſequaces non parua ſit orta, ut qui tum de reliquis omnibus inter ſe diſſideant, tum de eorum quæ pache uocant, & notione, & ſubſiſtentia. Verum ſi nunc de pugna eorum hitoriā moueam deſectam ad inuitalia ſermonem. Omnem igitur, deinceps ſermonem faciā ceu cum illis agam, qui cōmentarios De morborum ac ſymptomatum diſſerentijs, præterea de cauſis eorum legerint, ad hæc qui ea omnia quorum paulo ante memini, reuoluerint. atq; hinc ordiar. Quoniā actiones omnes à ſimilaribus corporibus proficiſci oſtēdimus, reliquas uero omnes ſingulōrum inſtrumentorum particulas, uſum quempiā ipsis præbere, duplex ſanè morborum genus erit; alterum in partibus ſimilaribus; alterum in totis organis. In ſimilaribus impenetratā, in totis organis unum in figura ſpectatur, aliud in particularum numero, aliud in cuiuſq; quantitate obſeruatur, quantum in poſitura. Virarumq; uero partium, id eſt ſimilarium inſtrumentaliumq; communis eſt ipſa unitatis diuiſio. Ergo ſex in uniuerſum morborum ſunt genera. Vnum ipſorum ſimilarium proprium: nempe in temperies. quatuor, ut modo dictum eſt, inſtrumentorum cuiuſq; & cum his ſextum, quod tum ſimilaribus, tum inſtrumentalibus eſt commune, ipſius unitatis ſolutio. Horum cuiuſq; differentia ad ultimas uſque ſpecies in libro De morborum differentia ſunt tradita.

7 His ſic ſe habentibus, iam de medendi indicationibus eſt dicendum; ſed hoc ipſo indicationis uocabulo prius expoſito. Quippe ipſam ſequentis, ſiue agendi inſinuationem, indicationem dicimus. Nam inuenitur quidem, & ab ipſa experientia id quod conſequens faciendum ſit: cæterū, non ita quaſi in præcedenti aliquo deſignatum. proindeq; nemo Empiricorum dicit id ſito indicari: quanquā certe hoc ſequi illud dicunt, & hoc præcedere illud, & conſiſtere hoc cū illo. Deniq; omnem artem horum obſervationem memoriāq; eſſe dicunt: nempe quid cum quo, & quid à quo, & quid poſt quid identidem ſit uſum. Ergo ex ipſa rei natura ordiri, atq; ab ipſa quod ſequens ſit, citra experientiam inuenire, id eſt indicatione inuenire. Deſinito iam hoc quoq; ac ruruſus quod

Galen.

ante diximus, ad memoriā reuocato, omnē medendi methodum ſeiunctam ab experientia procedere, nec recte facere eos qui ambas doctrinas Empiricam, Logicamq; in unum cogunt, atq; cōfundunt, quæ reliqua ſunt, proſequamur. Fuerit autem omnium quæ reliqua ſunt, ordine primum, quod & propoſita iam proxime ſequitur. Sequitur autem primum ac maxime illud, quod omnis medendi methodus, per indicationem ſit. Quippe quicquid ab experientia ſeiunctum eſt, id totum indicatio nominatur. Quare quiſq; conde re medendi methodum ad unguem parat, huic à primis eſt indicationibus auſpicandum: atq; hinc ad eas quæ deinceps ſunt tranſeundum: ruruſusq; ab his ad proximas. Itaq; pergenti, non prius deſiſtendum, quam ipſius compos ſit ſinis. Porro, ſi nis propoſita nunc nobis tractationis eſt, intueri re cuiuſq; morbi remedia. Quod nam igitur uitæ quæ huc perducit, ſtatueretur principiū? Nempe morbi ipſius cognitio, qualis ſcilicet iſta natura ſit, ut prius eſt oſtenſum. Quippe id quod curatur eſt, ratio proſecto eſt ab ipſo quoq; indicationes eſſe incipiendas. Ergo primum quæ generalis communisq; morborum omnium indicatio ſit, inueſtigandum eſt. ab hac deinceps ad alias ſpeciatim deſcendendum. Quippe nec eſſe omnes morbos unius eiufdemq; participatione morbos appellari: ueluti arbitror, & hominem, & bouem, & canem, & reliquorū ſingula. Vnum namq; idemq; in omnibus hominibus habetur, cuius gratia omnes eandem appellationem hominis ſortimur. Pari modo canibus unum idemq; omnibus ineſt, cui cogitatione innititur, cum canem intelligere uolumus. Similiterq; in omnibus equis unū idemq; ineſt, propter quod omnes equi dicuntur. In homonymis autē hoc clarius perſpicere licet. Nam omnibus quadrupedibus animalibus, quæ latrāt, unum idemq; ineſt, utique quod & quadrupedia ſunt, & latrabilia. At marinis illis rapacibus beluiſ, quas ipſas quoque canes appellamus, unum ruruſus idemq; ineſt, quod terreſtribus non eſt: ita ut his cum illis in canum natura nulla ſit, niſi tantum nominis conuenientia. At hominis cum homine, ueluti Socratis cum Alcibiade, non nominis modo, uerum etiam eorum quæ iſiſunt, ſocietas eſt. Nam & animalia, & bipedes, & pedeffres, & rationales, & mortales ſunt. Et in ſumma niſi ulli ſingularium hominū quæ homo eſt ineſſe deprehendas, quod non et reliquis hominibus inſit. Cæterum terreſtribus canibus, ab ijs qui ſunt marini, multa inſunt diuerſa: ſeu corporis ſpecteſ for mam, ſeu animi mores. Quippe ille cicur eſt, hominiſq; amans: hic inſidiator, & ſerus. Ille terreſtris, hic marinus. Ille quadrupes, hic non. Ruruſus, ille latrabilis, hic ad latrandum minime habilis. At non terreſtriū canum hic latrabilis eſt, ille nō: nec ruruſus hic quadrupes, alter non quadrupes: ſed omnibus ipsis una forma ineſt, qua canes nominantur. Nec uero ſubſtantijs modo id ineſſe uidetur, uerum etiam ipsis accidentibus, uel ut affectus ſunt, uel ut actiones, uel ut paſſiones. Verbi

tom. 6

c

gratia

gratia, homo inambulans ab homine inambulan-
te nihil differt secundum ipsam inambulationem;
sed nec usus ab ulso, nec cæsus a cæso, nec albus
ab albo, nec niger ab nigro. Verum in maioris mi-
norisq; ratione singuli horum non parvam obti-
nent differentiam, ueluti magis minusue albus. Ve-
rum quatenus albus, unum idemq; cum altero al-
bo possidet: ita nimirum, ut qua homo est, unum
idemq; cum alio quolibet homine. Et in singulis
deniq; significatorum, unum idem omnibus inest.
Ita igitur & ipsum ægrotare, & ualere se habent.
Illud enim ægrotantisq; omnibus inest, hoc uale-
ntibus; utiq; unum idemq; utrunq;. Et ueluti nomi-
ne hominis unum, ita etiã nomine sanitatis unum
significatur. Declarat autem & quotidianus inter-
nos sermo, quod in quibus homonymia non est,
in his unum est quod significatur. Si enim dicat
quispiam uulneratum sibi esse lapide caput, nemi-
ni qui audiat, sermo est obscurus, aut ambiguus: si
cut est cum dicitur deuoratum esse à cane Cori-
scum. Siquidem à quo cane, statim rogabit audi-
tor: propterea uidelicet quod duo sunt canum ge-
nera: terrestre alterum, alterum marinum. At non
quo lapide, aut quod caput, rogabit: cum & om-
nis lapidis qualapis est, una species sit, & omnis
capitis qua caput. Canis uero, ut canis, sanè nō u-
na: sicut nec linguæ qua lingua, quando & tibiar,
& calcæamentis, & animantis pars lingua est. Ac si
quem audias ministro iubentem, ut linguam asse-
rat, incertum est quam linguam dicat. Sin uetrem,
aut uescicam, aut iecur asserre iubeat, non item. Er-
go singulis significatis una certa subiecta res est:
non tamē cuiq; uoci una res subijcitur. Interdum
enim tantummodo significatur per uocē, nec quic-
quam subijcitur. Verum de his quæ ita dicuntur
differere, præsentis propositi non est. Quibus au-
tem nō tantum significatur aliquid, sed etiam res
aliqua subiecta est, his quotquot significata fue-
rint, totidē sunt & rerū idæ. Ac uocis quidem u-
num significantis, una necessario erit & rei speci-
es, numero tamē plures has esse licet: sicut & Eoq;
septem esse uocales dicimus: elementa Græco-
rum idiomate quatuor & uiginti: ad cōmūnem u-
delicet omnem speciem, quæ una est, referentes,
non ad particulares, quæ chartis, lignis, mēbranis,
& lapidibus sunt scriptæ: quarum maximus nume-
rus est, nec potis numerari, penesq; in infinitum ex-
tensus, nam possunt in toto temporis spatio infini-
ta scribi, tum α, tum β, tum γ. Eodem modo &
reliquarum literarum singulæ. Verum ea in uni-
uersum quatuor esse & uiginti numero dicimus,
non particulares intelligentes, sed tantum speci-
es, quibus (ut arbitror) ipsa nomina indimus.
Quippe non hoc quod in charta scribit, & dicitur:
illud quod in ligno pingitur, non & dicitur: immo
tum hoc, tum illud. idq; siue describas in terra, si-
ue in lapide, siue scalpas, siue colorib; pingas. Sed
nec pueros docet quispiam multa α, & β, & γ, &
reliquorum singula: immo quodq; horum unum,
simul autem omnia uigintiquatuor. Simili genere,
si equum unum puero indices, aut camelum; ubi

aliū rursus equum, aut camelum aspexit, non ro-
gat quod animal id sit, sed illud equum, hanc ca-
melum nominat. atq; illum quem prius, cum hoc
quem nunc cernit, eundem esse dicit, quauis for-
tassis alter mortuus iam sit, alter (hic uidelicet quē
cernit) supersit. Iam unum homines heri hodieq;
idem bibisse se dicūt: nempe specie idem. Interim
tria se uina hodie bibisse narrant: aut etiam unum,
ad speciem ubiq; respicientes. Præterea quindenas
fores uno sigillo obsignatas, ad speciem scilicet in
omnibus his sermonem referentes. Adeoq; est eui-
dens, ac omnib; natura insitum, tum hominibus,
tum brutis, ut aliud quid ceu in substantia subie-
ctum, aliud ceu specie unum intelligant: ut uel asi-
norum (qui tamen omnium brutorum stupidissi-
mi uidentur) aliud esse specie unū, aliud numero,
notitiam non fugiat. Conspecta namq; camelo,
asinus se retrahit, et fugit, ac timet, si nunq; ante ca-
melum conspexit. sin autem uidere iam assuevit,
quamuis aliam aliamq; illi demonstrēs, tamē pro-
pter consuetudinem non amplius timet: sed uelu-
ti unam speciem intuetur, & illam cui insueuit, &
hanc quæ nunc primū apparet. Ad eundem mo-
dum, nec homines timet, propter cōsuetudinem:
sed hos quoq; uelut unam speciem uidet. Verum,
si curatorem inspexit, non solum ut hominem, sed
etiam ut hunc hominē agnoscit, & micat auribus,
& caudam quatit, & rudis, & lasciuit, cum eum a-
spexit, utiq; indicās se familiarem agnoscere. Hūc
itaq; tum ut hominē, tum ut familiarem noscit.
Eum autem quem primum iam uidet, ut hominē
similiter, ut familiarem non similiter. Quare non
nōs modo, uerum asini quoq; iam aliud, ut nume-
ro idem, tum uident, tum etiam noscunt, ac memi-
nerūt: aliud ut specie. Ac Dionem curatorem (esto
enim ita uocetur) aliter ut hominē, aliter planē,
ut curatorem suum agnoscunt uernaculi asini, utiq;
communem eius cum alijs hominibus speciem,
ut hominis capientes: priuatam uero ac secretam,
ut Dionis tantum. Ergo tantum abest, ut ueteres
philosophos laudem, tanquam amplum aliquid
magnæq; subtilitatis inuenerint, quod idem ac di-
uersum, unum ac non unum, non solum numero,
sed etiam specie sit (inaudiendum: ut etiam ipsis a-
sinis hoc inesse natura dicam. Sanè adijciunt uete-
res philosophi non tantum numero, ac specie ali-
quid idem dici, uerum etiã genere. Verum id iam
ad rem propositam non delidero. Mihi enim uni-
cum illud satis facit, quod ipsi asinis stupidiore
ostendi, qui nō concedunt aliud specie unum, ali-
ud numero dici: magisq; his etiam, qui unum esse
phreniticum, & unum Empiricum dicunt, unum
tamen esse hominē non cōcedunt: aut qui non
intelligunt specie quidem unum esse hominē,
numero nō unum, nec Socratem unum esse, tum
specie, tum numero: Phreniticum autem specie
esse unum, multitudinem non unum: cum fieri non
possit, ut Dion, Socrates, Theon, & Coriscus;
pariter si ita fors tulit, phreniti laborantes, cū qua-
tuor sint, unus multitudine sint, sed specie unus,
multitudine non unus. Absurdius autem multo
est

est quod Empirici dicunt, cum unum esse Empiricum dicunt, deinde rogati quomodo unum dicant eum qui uiuit, cum eo qui mortuus est, & eum qui est in Græcia, cum eo qui est in Aegypto, mirificum responsum afferit. Quatenus (inquiunt): Empiricus est, hætenus etiam unus est. Hoc enim extremæ stupiditatis est, si adiectis illis quatenus & hætenus, nec quæ ipsimet loquuntur, intelligunt. Si enim hætenus Serapion, & Menodotus unus sunt, quæ Empirici sunt: profecto in alijs unus non erunt. quædō si omnifariam unus essent, superuacue arbitror, ac frustra addita essent illa, quatenus & hætenus. cum prout esset simpliciter dicere unus esse Serapionem & Menodotum: ita nimirum, ut si de ipso tantum Menodoto loquens, adiectione non egeres, sed absoluto sermone diceres: Menodotus est unus. Ergo si unus absoluto sermone est Menodotus, Serapion autem & Menodotus non absoluto sermone unus, sed quatenus Empirici: omnino profecto ipsis alia quæpiam inerunt quibus duo sunt, & non unus ambo. Efficiturque hoc illud quod antiqui Philosophi dixerunt, aliud numero, & idem, et unum esse, aliud specie. nec esse mirum si Menodotus Serapioni in aliquo idem sit atque unus, in aliquo non idem, neque unus, quatenus enim Empiricus, idem. quatenus autem hæc refimus, ille naso adunco, aut candidus, aut niger, aut magnus, aut parvus, non idem. Nunquid igitur sic est uterque eorum homo, ut uel naso est adunco, uel refimus: an sicut Empiricus est? An hoc quoque puer intelligat, quod qua homo, unus sunt: qua hæc refimus, illegrypus, non unus? Num igitur extremi stuporis est, aut pertinaciæ, aut nescio quo nomine merito appellem, fateri unum esse phreniticum qua phreniticus, simili modo letargicum, & pleuriticum: hominem uero, qua homo est, non unum? Præterea Empiricum unum dicere qua est Empiricus: equum uero, ut equus est, non unum? Cum audire liceat Aristotelem, & Theophrastum affirmantes, specie quidem posse alterum alteri idem esse, numero uero non idem. Atque etiam ante hos, illum qui ipsos huiusmodi significatorum distinctionem docuit, audire dicentem nihil esse mirum unum esse multa, & multa unum. Quippe a deo di lucide omnem hæc disceptationem Plato in principio Philebi absoluit, ut mihi uel ipsis stupidis uideatur esse dilucidus. Asini namque norunt, tum hominem, tum camelum, tum bouem. præterea hunc hominem quædam, hanc camelum, hunc bouem. Eodem modo uiam norunt, non tantum absolute ut uiam: sed etiam ut hanc aliquam uiam. Nam in ingressu uis quam non nouit, asinum statue, attende: ut illam perambulet, ac tota peragat, in neutram partem declinans, nisi si ubi in diuersa scinditur, utique declarans se speciem ipsam uis meminisse, & clare agnoscere. Quippe inambulatur eam, quæ trita est. quatenus autem ignorat, fallitur. Neque enim ex recordatione eius, quæ insectilis, unaque numero est, hanc quam non nouit, peragere potest. Manifestum uero est eum hæc uiam, qua nunc

Galen.

A primum insistit, quatenus uia est, ut specie noscens inambulare. quatenus uero numero una est, eatenus ignorare, propterea quod & nusquam ad non tritam diuertat, & qua in duas scinditur, nesciat utra sit eundum. Quod tamen omnino non ignoraret, si secundo, aut tertio, nunc per hanc ingrederetur. Nam quoniam alterum nouit, alterum non nouit, propterea uidelicet quod communem uis speciem cognoscit, propriam autem huius, uel illius ignorat: utique quatenus nouit, non fallitur. quippe qui trita insistit. quatenus ignorat, fallitur subinde in truijs, nescius quam eligat. Duplicem ergo cognitionem habent & asini: communium specierum alteram, priuatarum alteram. In summa, siue unam speciem appellare commune illud uelis, siue genus, siue communitatem, si illius hanc quam ipse nunc interpretor notionem custodias, de nominibus contendens, rem tamen mutare non poteris. Et de nominum quidem impositione, alius fortasse quispiam tecum contendat, utique qui æque in rerum contemplatione, ut turparum est exercitatus. Ceterum, nos saltem non contendemus. illud potius te monebimus meminisse, quod Plato ait: Multa enim unum esse, & unum multa. Mirificum sane dictum. nec facile est contendere cum eo, qui horum utrumlibet statuat. Etenim si hoc obserues, non erit quod contendas, ut nunc contendis, partim ignorantia, partim adductus pertinacia. Sed siue quis unum esse phreniticum dicat, unum esse consenties: siue multa, ita quoque consenties. Simili modo & Empiricum, & Dogmaticum, & Methodicum. Non sane & medicum unum esse, ac multos dices. unum quidem qua medicum, non multos uero particulari multitudine. Non enim de Empirico loquens, illud quatenus adhibebis, de medico loquens idtolles. Neque rursus de medico loquens adicies, de homine loquens auferes. Nec phreneticum unum esse dices qua phreneticus, ægrotantem uero non unum. Siquidem hic quoque qua ægrotans est, unus est. Dedisce igitur tandem nugas illas, quibus in alijs libris captiose utens, censens ostendi tibi ipsum hominem solum, & seorsum à particularibus hominibus: tanquam ipse ostendere possis Empiricum citra Menodotum, & Serapionem

D & alios particulares Empiricos: aut etiam phreniticum seorsum à particularibus phreneticis. Vbi igitur est error, unde hæc mutatio, ut asinis adeo ipsis sint stolidiores? Nempe unde in alijs quoque infinitis falluntur. Quippe ubi à notionibus ad rerum substantias transire tentant: deinde per Logicæ contemplationis imperitiæ falluntur, utique subvertentes cum rerum addubitatione etiam ipsas notiones. Siquidem excepit eos hic quaestio de generibus, & speciebus, quæ non modo homines qui in Logicis methodis non sunt exercitati, sed etiam nisi acriter intendant, aliquos ex ijs qui sunt exercitati potest fallere. Ceterum non oportet propterea quod de rerum substantia dubitant, à manifestis recedere notionibus: nec putare consilium aliquid inuenisse utrosuis, uel Empiricos

tom. 6

c 2

si unum

si unum dicant, nō adiecto quo significato unum sit: uel Methodicos si pro genere, uel specie, uel communi, communitatem usurpent. Mihi enim melius uisum est notione ipsa clare iam definita (nempe qua phrenetici sunt, hac esse omnes unū: qua uero hic iuuenis, ille senex, aut gracilis, aut obesus, aut uir, aut mulier, hac multos) ueteri elocutione de cætero uti, ac cum Aristotele, Theophrasto, & Platone loquendo periclitari, qui omnia id genus specie esse unum dicunt, multitudine uero non unum, non phreneticum modo, aut lethargicum, aut Empiricum, sed etiam Dogmaticum, & Methodicum, & hominem, & equum, & uirum, & mulierem, & reliquorū singula. quōd si ad particularia descenderis, ueluti hanc mulierem, quæ indicari digito potest, hanc sanē non possis specie quidem unam dicere, multitudine uero multas. Quippe hæc mulier, quæ indicari digito potest, una est utroque modo, & specie, & multitudine, quod etiam aliter numero dicere solemus. Hi uero ita non faciunt, sed alij cōmunitates nomināt, ceu uero non magis dubitari de ijs, quā generibus, & speciebus. possit. Alij quatenus hoc quippiā est, unum esse dicunt. quatenus autem nō unum, nequaquam explicāt. Etenim par erat hos quoq; quemadmodum ostendunt, quōd Menodotus, & Serapio, & Theodas, & Glaucias, & Apollonius, & Calicles, & Diodorus, & Heraclides, & Lycus, unus omnes sunt qua Empirici, ita rursus quē admodum non unus omnes, sed multi sunt, exponere. Siquidem in his exponendis alicubi planē deprehēdissent idem, tum unum, tum multa, non modo esse, sed etiā dici posse. Menodotus namq; & Serapio, qua Empirici sunt, unus sunt: id uero & qua medici, & qua homines. Quid uero qua animalia? Nam id quæri ab his operæpretium est. Num hætenus quoque Menodotus & Serapio unus sunt? Nam si id negent, nec nos cōcedemus quatenus Empirici sunt, eatenus duos homines esse unum. Sin concedant hac quoq; duos esse unum, nempe quatenus ambo sunt animalia, protinus illud subiiciemus: Recte igitur ab antiquis philosophis dictum est, aliud numero, aliud specie, aliud genere esse quod tum idem, tum unum est. Dehinc rursus interrogabimus, Phreneticus Menodotus, phreneticus Serapio, idem ne est, an diuersus. Si respondent eatenus unum phreneticum esse, unumq; & eundem ambos qua phrenetici, rursus percontabimur. Quid autem qua ægrotantes? num hac quoq; ambo unus sunt? Si negent, neq; nō illis cōcedemus qua phrenetici. Sin annuent, utiq; rem aliquam ponemus, cuius una sit species, de qua omnes homines morbi nomen enunciant. Non enim phrenitis res aliqua fuerit, cui una sit idea, atque eatenus omnes qui ea sunt affecti, unum efficiens. Morbus autem similiter unum non faciet eos, quos occupauerit. At nulla est, inquit, ista distincta species, aut animalis, aut morbi, sicut hominis, & phrenitidis. Quid ais improbe? An nihil tibi significare uidentur hæ uoces, animal, & morbus, sed similiter efferri, ut bli

tyri, & scindapsus? An significant quidem, uerum nulla res substat, quæ uocibus respondeat, ueluti in Scilla, & Centaurus? an etiam significant, atq; id quod significatur, unum est? Quippe si nulla sit res, quæ ijs uocibus animal, & morbus indicetur, non recte dicis hominem esse animal, aut phreneticum morbum. Sin est res aliqua, & uere dicis, cum hunc qui aduenit, animal esse, aut phreneticum morbum, tum hunc qui decumbit, ægrotare: est utiq; omnino aliquid eorum, quæ ipsi insunt, de quo uocem utranque enuncias. Verum ad hæc intelligenda parum es exercitatus, tamen si ea ex primis sint, quæ in Logicis institutionibus tradantur. Cæterum, quid hoc ad ipsam ueritatem? Non enim profecto ex ijs quæ tu non intelligis, iudicanda ueritas est: sed ex ijs quæ quispiam intelligit, qui & natura prudēs sit, & ea didicerit, ac exerceat, nec idem contentiosus sit: sed ueritatē amet, quorum nullū in te est, quanquā mediū fidius haud scio, an ista natura prudentem desideret. Quis enim nescit non idem significare Socratem, ac resimul & calum: sed Socratem totius esse substantiæ substantiæ nomen. reliquorum autem nominum nullum de tota corporis substantiā dici: non simum, non uentrosim, non calum: sed horum aliud figuræ nasi esse nomē, aliud defectus capillorum in capite, aliud magnitudinis esse uentris. Atq; hæc sunt, quæ respectu partium dicuntur. At si candidum aut nigrum Socratem dicam, de omnibus arbitror corporis partibus nomina pronunciem: cæterum non totam substantiam, sed unum ex ijs quæ illi accidunt, indicem, nempe colorem. Quinetiam si obesum dicam aut gracilem, durum aut mollem, hirtum aut glabrum, aut cætera id genus, quæ Socrati accidunt, ne sic quidem de omni eius substantiā appellationes afferat: sed unum aliquid eorum, quæ ipsi accidunt, ostendo. Ad eundem modum & sedere ipsum, & inambulare, & moueri, & dormire, & uigilare, & singula id genus nomina, de nulla profecto substantiā dicimus. sed aliquid eorū, quæ Socrati insunt, his significamus. Quæ nimirum in superioribus uel actiones esse, uel passionēs, uel affectus quosdam diximus. Satis ergo fuerit, nunc quoq; sub hac te formula exerceam, quemadmodum etiam in superioribus ostendimus, nō à nominibus, sed à rebus orsum. Incipe uero à teipso primum, æstimaq; simplex ne res sis, an composita. Vtrum ne pes sis, an nasus, an oculus, an caput. Cōstat enim nullum te horum esse, sed nec sine his. Verum & ex his & ex reliquis partibus uniuersis, quarum singulæ debitam habeant posituram, totus es compositus. Esto igitur tibi nomen Themiso. At cum Themiso claudum esse aio, eò quod dico claudum, pedum affectum significo. Themiso uero totius est nomen. Quinetiam simus cæcusq; à parte dicitur Themiso. Fuluus uero & crassus non à parte, sed ab effectibus qui toti insunt, non aliter quā inambulans, sedens, disputans, & uiuens. Num igitur intelligis non esse hæc totius substantiæ tuæ signa: sed alia à parte quapiam esse nomi-

nata, alia ab uno affectu? Cum uero bonum te iustum esse quispiam dicit, num etiam prospicis hæc esse affectuum nomina, qui in animo tuo consistunt? Atqui si noris quod hæc ad portionem se habent cum albo & nigro (quippe sicuti ista corporis, ita illa animi affectionum sunt nomina) intelliges (arbitror) & artificem & artis rudem ab animi affectibus esse imposita. Iam si artifex unde nomen accepit scias, scies (arbitror) medicus quoque unde sit appellatus. At hunc si unde dictus sit cognoris, non est quod magnopere labores, ut in uenias cui demum inditum sit nomen Empirici. Sanè ipsum quod à uobis exigo, nec adeo difficile, nec magnum est. Quippe ipsa prædicamenta diuidere, logicæ speculationis est initium, cuius esse uos omnino expertes, facile declarant ea quæ temere nugamini. Vel nunc igitur resipiscentes, posthac incipite quæ corpori accidit nominare, ueluti quod hic albus est & niger, aut certe uehementer calidus, adeo ut ægre ferre calorem possit. Deinde calorē qui adeo auctus sit, ut occasione eius corpus laboret, nec probe perfungi actione possit, permittite uolenti appellare febrem. Si quidem omnes homines eum qui ita sit calidus, febricitare dicunt. Nec sanè rem magnam facietis nomen mutantes, nisi quod tempus uestrum perdetis. Illud potius uir bone facito: Cum Themisonē febricitare dices, & Dionem febricitare, & multos deinceps ad eum modum febricitantes nominabis, perpende diligenter nunquid in ijs omnibus unum idemq; sit ipsum (ut sic dicam) febricitare, an diuerfum. Inuenies enim unū esse idemq; specie: multitudinem autem quod etiam numero dicimus, nō unum, cum aliter tibi nec ut respondeas fas sit, nec intelligas. Ergo qui febricitat, is qua febricitat, unus planē est: quādo & qui delirat, qua tenus delirat, etiam est unus. quid uero & qui simul febricitat & delirat? nunquid & is unus est, qua simul & febricitat & delirat? Sanè id neminē latere arbitror. Ponatur igitur ambobus ijs unum nomen, febricitanti dico ac deliranti, uoceturq; phreniticus, qui ita laborat. Quod si non intelligis quē ad modum ambobus unum nomen sit positum, admonebo te fortasse nominum quæ ipsē usurpas. Quippe equum aliquid appellas, nempe animal (ut ita dicam) hinnibile, siue quod ad hinnitum sit habile. An igitur interesse cēses, equum dicas, an animal quod ad hinniendum sit habile? Ego sanè non censeo. Atqui si id ita est, ambobus illis nominibus, & animali, & hinnibili, quō utiq; breuior esset sermo, equum indidisti. Ad hunc etiam modum si quod pedestre & bipes animal sit, pro tribus nominibus uno interpretari uelis, hominem uocabis. Et sanè solutio cuiusq; nominis in suam definitionē, ad eum modum absoluitur. Quinetiam ut conijcias componasq; orationem in unum nomē, non aliter quam iam dicto fit modo: cum uidelicet & simpliciter cuiusq; notionem secundum ipsius nomen tenes, & simul ex duobus simplicibus rursus alteram notionem efficere compositam potes: mox illi nomen imponere:

Galen.

A subinde rursus ipsi compositæ alio simplici adiecto, ubi ex tribus iam simplicibus unam notionē feceris, huic quoque nomen aliquod imponere. Quomodo, inquires, & quæ ratione id? Equidem non grauabor exercēdo eos, qui resipiscere à diuturna ista ignorantia non recusant, longius progredi. Calor, simplicis rei nomen est. præterea actionis læsio, simplex quadam res est. At tantus calor quantus iam actioni officiat, non etiam simplex res est, Quod si etiam totum uexet corpus, multo profecto minus iam simplex est. Ergo quod minus multis nominibus utantur homines, ad cōpendium alioqui natura proclius, eiusmodi calorem febrem uocant. Quippe expeditius dictū est febricitare Dionem, quā tantum in toto corpore caloris habere, ut multas functiones corrumpat. Ergo cum affectum ipsum significare uolunt, febri: cū uerō eum qui affectu laborat, ab affectu ipso nomen declinat, uocantq; febricitantem, ad eum modum quo à candore candidum, & à nigro re nigrum. Itaq; compositæ rei nomen febris est, atq; hoc etiā magis febricitans. Simplex autē est delirium. Verum si simplex hoc cum composito copules, homo ipse phreniticus, affectus phrenitis nominatur. quemadmodum & homo ipse, ne animal rationale mortale dicamus, breuitatis causa homo est nominatus, ipso hominis uocabulo definitionis uim quandam comprehendente. Atq; id est quod ueteres Philosophi definitionē nominis dicere appellant. Caterum non ducunt in infinitum, sed usq; ad simplicia subeunt. Nam cum hominem in animal & rationale & mortale solueris, postea ipsum animal solues in substantiam sensitiuam. At non ipsam substantiam amplius soluere poteris, nec etiam sensum. Quippe simplex primumq; est horum utrumq;. Quo fit, ut mihi mirari subeat de ijs qui phreniticum aliqueum & hominem esse cōcedunt; morbum uero & animal esse non concedunt. Quippe quod perinde est ac si cōposita esse des, de simplicibus dubites: quasi non priora compositis natura simplicia sint. At non uidi (inquit) ipsum per se animal. Sed nec hominem insule uidisti: & tamē te ipsum ais hominem esse. An illud fateberis, animal autem esse te non fateberis? Nusquam (inquit) uidi per se morbum. Sed nec phrenitiam unquam solam uidisti, sed in Theone, aut Dione, aut alio quopiam homine. Quare hoc planē puerile est, eo quod nusquam morbum ipsum per se solum uideris, idcirco putare morbū nō esse. Quippe ita nec febriem, nec phrenitiam, nec aliud quippiam id genus esse dabis, ut quorum nullum usquam ipsum per se solum uideris. Sanè expediebat potius non ita, sed ut dictum supra est, à rebus ipsis cœpisse, cogitationeq; ipsa spectasse quot essent in totum simplicia: mox proprio nomine cuiq; impositum, ex ipsis iam composita necere. Ergo subiecto corpori unum hoc primum insit, quod sentit. Num cui id inest, animal non appellabis? Non, inquires. Atqui de nomine hoc pacto hæsitabis. Sed nec sentiens corpus esse concedes: iam ita de rebus ipsis falsò

tom. 6

c 3

opi

opinaberis. At si & corpus aliquid sentiens esse, & nomen hoc animal de eiusmodi corpore dici cōcedas: audebis postea dicere animal nihil esse? Ergo nec album aliquid erit, nec inambulans, nec currens. quippe ab ijs quæ ipsi accidunt, dici corpus album, inambulans, & currens. Ipsorum uero accidentium hoc albedo, illud inambulatio, tertium cursus dicitur. Eodem modo sensus unū quid est ex ijs quæ corporibus accidunt: sentiens uero ipsum est corpus. hoc uero etiam animal nominatur. Quis igitur ubi sentiens corpus aspexit: omisso hoc nomine, animal, aliud quærat quod de eo dicat: Num corpus duntaxat intelligitur, tanquā Centaurus; an res quoque aliqua huic appellationi est subiecta? Pater proculdubio esse subiectam aliquam. Age quid sensus? intelligiturne tantum, an aliquid est eorum quæ corpori insunt? Mihi uero etiam id clarum esse uidetur: nempe sensum unū esse ex ijs quæ corpori insunt. At qui si neque corpus tantummodo intelligitur, sed etiam subsistit: nec etiā sensus, immò is quoque subsistit, qui fiet, ut ambo coniuncta cōpositum efficiant non ens? Nam id iam perdidicimus sit: corpus quidem esse quid ac sensum, nihil tamen esse sentiens corpus. Sicut illud magis ridiculum: sentiens quidē corpus esse, animal autē nihil esse: ceu aliud quiddam animal sit, & non hoc; aut quicquam intersit, oratione, an nomine indicare aliquid uelis. Aequē absurdum sit & morbum negare aliquid esse. Quippe si affectus nihil sit, morbus quoque nihil erit. Sin affectus aliquid esse detur, utique & morbus aliquid fuerit. Quicunque enim affectus functioni officit, is est morbus. At non potes (inquiunt) offendere mihi ip-

sum per se morbum. Immo nec phrenitum uir bone, nec febrim, quæ tamen & ipsa esse fateris, sicu- ti multa alia. Nam micrologiam nominum, quam philosophi quidam scite sunt commenti, sed quæ omnem in uita loquendi consuetudinem subuertit, sic, ut ne ipsi quidem in suis ipsorum operibus ea uti possint, impræsentiarum omitto, ut qui & alibi de ipsis diffusius egerim, & in opere De elementis quæcunque sunt necessaria dixerim. Intelligo autem micrologiam, curiositatem illam, quæ diuidunt in genera, græca illa *ἡ δὲ, ὡς ἰσχυρῶς, & ὡς ὑπερῶς*: latine ens, & subsistens, siue subsistans dixeris. quippe quæ indifferenter nobis tūc hic, tum in sequentibus latine ponentur. Vt autem omnes in omnibus refutem, fieri omnino nō potest. Sed enim quod nō modo propria morbi notio sit, sed etiam res aliqua subiecta quæ hæc appellationem sit sortita, satisfaciunt ad præsens quæ hæc tenus sunt dicta. Clarius autem idem ipsum in progressu sermonis intelligetur, ubi de primis indicationibus absoluta disputatio erit. Quæcunque uero nunc dicta de morbo sunt, ea mihi & de sympto- mate, & passione esse dicta censeo. præterea sanitate, & integritate, & robore, & potentia, omnibusque alijs, quorum nomina & notiones de rebus quibusdam subiectis sunt dicta. Omnia namque hæc corporibus insunt, partim ut affectus, partim ut actiones, partim ut passionēs. Præterea quedam ceu naturaliter insunt, quedam ceu præter naturam. Indicatio quoque ex singulis eorum seorsum præbetur, à plurimis tamē medicorum prætermittitur.

ARGVMENTA CAPITVLM LIBRI SEQVENTIS.

Cap. 1. Methodicos conuellit, qui primam indicationem, quæ à morbo sumitur, tanquā rem magnam & præclaram iactabant: cum ea principium tantum sit unde medendi ratio proficiscitur, res ita facilis ut ne idiotam quidem ullum lateat, ut uerrucam tolli oportere, uulnus uel ulcus simplex glutinari, aluum fluentem sisti. 2. Sarcoticorum rationem pro explendo sinu fo ulcere cōsiderat: & in Thestaliis rudiatem inuoluitur. Multa enim de ratione & experientia dicit, & de medicamentorum cōpositionis inuentione: & de methodo sua circa oculorum curationē. 3. Redit à digressione ad propositū de cauo ulcere sanando. Et primū in bona temperie & sanguine non uitioso carnē natura ducere regere rari declarat. 4. De curatione uulneris quatenus est uulnus: de duplici cure, cum in hoc ulcere nō cōtinui solium solutio sit, sed etiam substantiæ cutis amissio, de differentia inter glutinatoriū medicamen & carnē generās. 5. De cicatrice inducēda. Et quæ cutis quæ deluxerat, eadē repululare non possit, sed summa tantū caro cuti assimilari fieri. 6. De supercrescente in uulnerib. carne, Græci hyperfarcosin uocāt, geminū uitii, ubi & ulcus est & caro pariter supercrescit. 7. Anacephalæosis dicitur in hoc lib. Contra Empiricos & Thestalias. Quod nō quæuis natura eadē medicamenta requirat: nempe molliis & laxa, ut puerorum & foeminarum, & qui tenero sunt corpore, medicamentis minus siccantibus: dura, sicca & cōpacta, ut uirorum, iuuenū, agricolarum, nautarum uehementius siccantib. & astringentib. curatur.

Docet itaque Methodico à cōmunitatibus suis descendendum esse ad idiosyncrasiā, i. priuatā cuiusque naturā: quæ quamuis sit incōprehensibilis, eā tamen quæ possimus diligenter inuestigandā. Non. n. cōmunis homo, sed singulorum quisque curatur. 8. De cura ulcerū cum alijs affectib. cōplicatorum: & primum eorum quæ ulcerant carnē intēperie quapiā afflicta: quæ nisi primum emendetur, irrita erit ulceris medicatio. 9. Anacephalæosis prædictorum. Deinde, cum cōtrariæ fuerint in una cura indicationes, utra alteri præferri debeat. 10. Vlcerum affectus qui sint cōpositi: Nempe phlegmone iuncta ulceri putrescenti aut eroso aut gangranoso, aut erysipelatodi, aut canceroso, aut dolenti aut indolenti. &c. Et quod Empirici has ulcerum differentias non recte fecerint. Nam quod cōsistere seorsum & per se potest, id nō est alterius differentia. Sed magnitudo, æqualitas, cū contrarijs, tempus & figura, cum accidiētia sint, ulcerū differentia esse possunt.

Aliter.

Methodus curationis ulcerum non malignorum. Quo pacto medicamenta carnem generantia ab Empiricis inuenta sint. Cui ulceris curatio. Curandū ulceris indicationes à laborantis particulæ temperamento sumi debere. Similiarium corporum sanitatem in bona quatuor qualitatū temperie consistere. Quod omnia corpora si demedicamentis non indigent, sed imbecillioribus quidem & mollioribus, molliora: robustioribus uero & siccioribus, uehementia cōueniunt.

GALENI METHODI MEDENDI, ID

EST DE MORBIS CVRANDIS,

Liber tertius.



igitur Hicero, indicatio quæ ab ipsa rei natura primum oritur, quod agendū sit inueniri, necesse est remediorum initium ex morborum ipsorum natura sumi. Si quidem absurdum sit, aliud esse quod curādi rationem prescribat, aliud quod curetur. Etenim indicare de se quicquā magis potest quam de alio. Hoc autem clarius fiet in sequentibus. Verum quoniam omnibus in cōfesso est primas indicationes ex affectibus esse sumendas, certe laborandum pluribus frustra non est, ut hinc esse incipiendū doceā. Illud potius monstrare tentemus, neque totum hoc esse, nec prorsus magnam aliquam partem, ueluti Methodici putant, sed minimam, & rātum initium. Igitur iidem ipsi autem calculū qui in uesica sit, propterea quod toto genere præter naturā sit, ablationem sui indicare. Ad eundem modum peniles uerrucas, & myrmecias, & atheromata, & steatomata, & melicerida, et alia id genus. At intestinum quod iam in scrotum decidit, omniaque que luxata sunt, quod uidelicet loco ipso præter naturam se habent, reponenda se in suum locum docent. At qui tantum abest, ut horum quippiā artificij cuiusquam sit, ut etiam priuatorum cuique parere possit. quippe qui membrum quod luxatum sentiunt, reduci in artus iubent; præterea uerrucam tolli, & ulcus ad cicatricem duci, & alium fluentem sisti. Verum quibus hæc rationibus fiant, id sanē nesciunt. atque id est quod adijci à medico debet. Itaque indicatio quæ à morbis sumitur, principium tantum est, & (ut sic dicam) carcer unde medendī ratio promouet, nulla prorsus ipsius medicinæ artis adhuc portio, aut certe nec magna nec propria, sed quæ etiam plebi sit communis. Ergo cui facultas est illa inueniendi, ex quibus perfici possit quod à prima indicatione suggeritur, est merito morborum est curator, qui si per experientiam inuenit, obseruator & empiricus est nominandus. sin ratione quadam & methodo, logicus, & methodicus, & dogmaticus. Ergo plebeius quidē (altius enim idem repetendum est) medicum adit reponi sibi membrum iubens, aut os quod forte fractum est, formari atque componi, aut melicerida sibi tolli. Verum quo pacto horum quodque peragetur, id sanē inuenire medicæ artis est munus. Ac Empirici qui demper experientia inueniri omnia contendunt. Nos partim experientia, partim ratione. cum neque illa inuenire omnia queat, neque sola ratio. Veruntamen confusam mistamque tradendam esse doctrinam non censemus, sed seorsum empiricam, & seorsum logicam, quod facile appareat quam ha-

beat utraq; uim. Nunc uero de ea quæ ratione paritur, inuentione dicere statuimus. Num igitur est nobis methodus aliqua, qua usis inuenire prædictorum singula liceat? dico quod superuacaneū genere sit, adimere; & quod morū loco sit, id proprio loco reddere: & quod unitatis solutum sit, unire. An empiricen ad hæc requiremus? Ego sane methodum esse aliquā, qua quæ sita inuenias, planē mihi persuasi: eiusque principium esse id quod singuli morbi faciendum dicant. Unitatis namque solutio unitiōnem postulat. Ea in osse fractura dicitur, Græce *κάρκυν*; in carnosa parte ulcus: sicut etiam uulnus, & ruptio, quod *ῥήγμα*; & conuulsio, quod *σπασμα* dicitur. Vulnus quidem solutio quædam ex uulnerando in carnosa parte relicta. Ruptio, & conuulsio citra uulnerationem facta. Prior enim carnosa partis diuisio est, posterior neruosa. His omnibus unitio moliēda indicatur, quæ an præstari ubique possit, an in multis non possit, hoc utique internoscere primum iam artificis est. Quippe nemo plebeius nouit nec neruosam transuersi septi partem, nec intestina tenuia non posse quem indicant finem recipere. Sed & de præputio, & de tenui buccarum parte, quod similiter se habet, idē ignorat. Præterea an caries in osse, quæ *τρυφή* Græce dicitur, sanari queat, sicut erosio in carne, compertum non habet. Iam an coalescere fractura possit, ueluti uulnus, præterea an callo ad glutinari possit, non intelligit. Pari modo in capitis fracturis uulgus omnino non nouit, sit ne expectanda calli generatio, an aliter curandum. Porro multo adhuc magis ignorat an corde uulnerato, aut pulmone, aut uentriculo, aut iocinore, fiducia sanationis sit. Nec in summa quicquā ultra primum scopum uulgaris quisquam nouit. Itaque hoc ipsum primum artis est opus, ut intelligas sperare ne id quod tendis debeas, an secus. Eius rei duplex cognitio est, nec potest addi tertia. Altera per experientiam, cui longo usu est opus. Altera per ipsius rei naturam. siquidem hæc tum cuiusque particularē substantiam æstimabit, tum actionem, tum usum, situmque. A quibus procedens, non solum quod sanari non potest, præuidebit: sed etiam quod recipere sanitatem potest, de inueniendis ei remedijs deliberabit.

2 Constat autem quod à simplicissimis incipiet. Porro nihil est simplicius ulcere quod in summa carnosa parte sit. Huius ergo, siquidem ulcus tantum sit, curationis scopus unitio est. Sin etiam cum cauitate sit, duplex eius propositus est scopus: sicuti etiam duplex est affectus, nempe ulcus quod est unitatis solutio, & cauitas quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est contracta. In quo genere fieri sæpe non potest, ut alterius

propositorum scoporum si compos: ueluti si non modo caro ipsa, sed etiā subditū illi os perierit. Quippe impleri ad unguē cāuitas eiusmodi nō potest, cicatrice induci certe potest, sed hæc ulceris sanatio est, cāuitas autē insanabilis remanebit. Hoc igitur ipsum aut per experientia, aut rationis ope dignosci omnino oportebit. At Thessalus nec his utitur, nec tertium quicquid adijcit: & tamen nugari non erubescit. Sed id mittamus. Illud potius doceat imitator Thessali medicus, quo pacto caui in carnoſa parte ulcus, nullo ex his quæ subsunt læso, sanabimus. Sarcotico (inquit) medicamentū, id est, quod carne impleat, impositū. Bene sanē, magna facilitas, fortasse autē stupiditas potius erat dicendum, si cum sarcotico dixit, satisfecisse se questioni putat. Quippe si sarcotico iam scimus quid amplius requiramus: Dignobis, quod illud sarcotico sit, quo es usus? Thus reor, inquires, aut irim, aut aristolochia, aut erui farinā, aut panacem. nam de siccis medicamentis principio mentionē faciā. Age igitur hæc medicamenta quo pacto inuenisti? Experientia, inquis. Quid igit est, quod per te amplius est adiectum? Siquidē quod cauum implendum sit, id quidem uel idiota nouit. at ex quibus id, & per quæ medicamentū fiat, experientia docuit. Thessalus uero nec ut empiricus, nec ut Logicus, medicamentū id nouit. Ut empiricus, quia uidelicet nō uult. Ut Logicus, quia nō potest. Nam ego eum ut empiricū id scire, planē noui. Cum enim duo sint omnis inuentionis instrumenta, (nempe experientia & ratio) qui quod inuentū est nouit, sed tamen rationē eius dicere [in promptu] non habet, is prodit se per experientia id inuenisse. Ut igitur quantū erret intelligat, aurium nobis operam paulisper accommodet. Volo enim paucis cum solius experientie professore agere. Etenim hunc quoque dicere par est, quo pacto siccum hoc quod carnē producat medicamentū inuenierit: quod utique Cephalicon nominat. Porro componitur id ex iride, & aristolochia, & eruo, & thuris manna [id est, purgamento thuris]. Est autē aliud quod præter iam dicta corticē panacis recipit: sicuti etiā aliud cui elota cadmia admisceat. Dicat itaque mihi, hæc quomodo sint inuenta. Et quid (inquit) attinet de inuentione eorū querere, ac non recte potius inuētis uti? Atque hæc quidem initio statim respondent: Verum in congressu cum amicis: Sic enim ipsi uocant: interim ex somnijs inuēta esse potuisse talia dicunt: interim forte fortuna aliud fuisse in aliud effusum: mox aliquē uti misto ausum. Cæterū audacia eius spem nō dicunt. Hæc igitur manifestæ sunt nugæ. Tertius his inueniendū modum planē est rationalis. Siquidem simplicia illorū priuatim quispiā unūquodque ut sarcotico expertus, mox carnem aliquando nō facere cernens, ratione deprehendit non omni naturæ eorum quodque competere. Si enim cui aristolochia ulcus carne non impleuit, huic thus contulit: cui autem thus non profuit, huic iris admodum fuit utilis: rationali le erat (arbitror) non omnes ab omnibus similiter affici. Hoc ubi semel in ratione cinationem uenit,

optimum factū est uisum quamplurima eiusdem speciei in idem conuenire, quo nulli corporis nature deessef quod conueniat. Nam si aut corporis naturam inuenire possent, aut adhibiti medicamenti uim, non esset fortasse ijs tali uarietate opus, ut quibus unū illud medicamentū quod uni corpori conueniret, inuenire in propriū semper esset. Nunc cum ignorant utriusque, parum recte omnia misceant: unum scilicet quod omnibus naturis quadret, moliri medicamentum studentes. Hanc ego componendorum medicamentorum rationem primis illis medicis excogitatū arbitror, atque ut antiquum inuentum recipio. Ceterum tantū eam ad uera medicinali methodo abesse reor, quanto certo rationabilior est transfusis in se mutuo cribris. Quippe nisi illud primum cogitet, solius se compositionis quæ ex similibus specie medicamentis conflatur, nō eius quæ ex contrarijs initur, methodum discesse: mox in eius miscellæ multitudine unū fortasse esse medicamentum quod laboranti sit utile, fortasse uero nec unum, contra septem octidne quæ ex usu non sint, ita ut pluribus numeris obstitit eiusmodi medicamentū quā profic hac inquam nisi reputer, plus eum ignorare de re ipsa quā nouisse dixerim. Oleum namque cauo uulneri infusum aduersissimum omnium medicamentum est: cum si ita moderi uelis, usu ipso intelliges sordidum ac male olens ulcus fieri. Quod si tempus quoque anni calidius sit, ac uitio mali succi homo laboret, aut fluxionibus obnoxius natura sit, aut etiam in uictu ratione delinquat: timor est, ne illi pars ea computrescat, in qua ulcus est factum. Timor uero est & si cera, siue sola, siue in oleo soluta utare. Atque hæc quidem putrescere ulcus facient. At si æruginem ad leuiorem tuncam insperges, ea quidem nullo modo putrefaciet: dolorem tamen ac rosionem inferet nō paruum. præterea exedet, ac phlegmonem excitabit. Quod si largius utere, cōuulsionem quoque accerset. Quoniam igitur neque oleum, neque ærugo, neque cera cauum ulcus implere carne potest: constat quod ex ijs qui experientiam proficiunt, nemō ulquam eam miscebit. At ego sanē hæc miscebo. immo debita mensura non hæc modo uerum etiā alia mille pharmaca ex ijs quæ cauo ulceri sunt inimica. Quippe si non ipsidem facultatibus lædunt, sed quodāmodo contrarijs: imparia quidem immodicæ profecto fuerint, ut ad cauum ulcus implendum. Verū quemadmodum ex duobus temperamentis immodicis unum efficiatur moderatum, id in medicamentorum componendorum rationibus docuimus. Non est igitur difficile, ex oleo, cera, & æruginē, medicamentum quod carnem producat, coſicere. Si enim noris eiusmodi ulcus medio critere siccandum esse, non siccare autē nec ceram, nec oleum, utique intelliges nec alterū seorsum, nec ambo simul cauum ulcus implere posse: immo uero nec æruginem solam, ut quæ immodice siccet. Ergo si omnia miscueris, modice siccum efficere medicamentū poteris. Quis uero cuiusque esse modus debeat, id mihi in libris qui De medicamentorum compo-

sitione sunt inscripti, iam traditū est. Nunc quoque si res postulet, indicabitur in sermonis progressu. Nam primum omnium abigendus mihi à sequentibus libris amethodus iste Thessalus est, sed indicato prius illi quantum à recto aberret. Nam prudenti uel quæ nūc dicta sunt, satis ostenderint quæ hisse debeat medendi methodus. Verum nō est cum talibus sermo. Itaque etiā necesse est cum istis adhuc disputemus, hinc sumpto initio: Omnis quæ præter naturam est cautitas, impleri postulat. quare & quæ in carnosa etiā accidit parte. Ipsa uero impletio, inueniendorum remedium finis quō tendis, est. Ut uero quæ impleat inuenias, & multatione opus est, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Etenim saepe uidisti difficilia sanatu ulcera curare nequiuisses nec eos qui experientiam profitentur (istos inquam qui remedijs scatent) nec etiā eos qui rationem sibi uindictā omnes. quippe Thessalij isti quos Methodicos nomināt, sunt autem reuera à methodo alieni tanquam asini ad lyram, ne ad audiendam quidem eiusmodi speculationē sunt idonei: nedum quod rectum est, ratione inueniant. Vidiisti autē subinde in eiusmodi ulceribus Empiricos quidem aliās se ad aliud medicamentum transferre, cū nulla profecto ratio transitū ipsū monstraret. Verum quoniam multa sunt experti, quæ cauū ulcus impleat, ipsam uero utriusdem uocat *ιδιονυπαρταίαν*, id est corporis proprietatē, in qua singula eorū pollere rebus uisā: nec dignoscere, nec meminitisse possunt, ideo nunc quoque ad quod transferrent non intelligentes, sed sperantes in multis particularibus experiendis, obiter quod cōueniat omnino inueniūt iri, aliās ad aliud transiliunt, fortunæ potius quam rationi eius quod conducit inuentione permissa. Similes his sunt, tamen si id uolunt, & qui ex Dogmaticis ad naturalia corporū principia subire ratione non ualuerunt. Quippe hi (ut ante ostēdimus) ex dimidio Dogmatici sunt, qui ne prima quidē elemēta assequi potuerūt. De istis uero amethodis Thessalijs quid etiā loquar? Soligitur ij qui uera methodo curāt, tum singulis id genus ulceribus, idonea medicamenta et uictum aptum inueniunt, tū liquidissime rebus ipsis ostendunt quantopere cōducant, quantūque ad medendū lumē præstet ipsa de natura tractatio. Etenim prætermitti negligi, aliquando quod utile sit, ijs qui ab alio pharmaco ad aliud alsi diue transeunt, non semel nobis ostēdi, uno aliquo ex medicamentis quibus illi fuerāt usi eiusmodi ulceribus sanatis. Spreta uero eiusmodi medicamentū facultas ab ijs merito est, quidelicet & propter intempestiū usum nō solum nō prodesse, sed etiā obesse esse usum, & quod in primo usu nihil aliquādo quod esset euidentis, effecit. Vidisti porro nō minus oculorū nos grauissimos dolores sanare aut balneo, aut uini portione, aut fomentis, aut sanguinis missione, aut purgatione, quibus nihil aliud adhibet medicorū uulgius, quam medicamēta hæc quæ ex opio & mandragora & hyosciamo fiunt, maximam planē oculorum perniciē, utpote quæ nulla re alia sublata ad

præsens doloris speciem præstant quam quod ipsum sensum enecant. Multosque nosti ab eiusmodi medicamentorū usu, cum liberalius fuissent admota, nunc postea naturalem statū recepisse, sed ex his principio quidem obscure atque ægre uidisse, tempore uero suffusione, quam *ὀφθαλμια* uocant, uel pupillæ nimia dilatatioe, quam *μυδρίαση* appellant, uel tæbe, uel corrugatione, quæ *πυρρῶσιν* uocant, occupatos. Nosti profecto non minus & illud, cum ab ephēbis usque mecum sis uersatus, nec sub ullo me uisquam præceptore uidisse eiusmodi opus, sed id per meratione excogitasse, & quæ longo tempore aphorismum illum, Dolores oculorū meri porio, uel balneū, uel fomentū, uel uena incisa, uel purgatio tollit, considerauerim, quamque ex reliqua Hippocratis diligeſtia sperarim ne in hoc quidem uel salūm quippiam, uel quod fieri non possit, præcipi, idque fuisse quod me ad inquisitionem incitauit, quod ipsa Hippocratis inſiſtēs uia, inueni quo pacto discernere, quando, quomodoque doctorū quoque sit utendum. Quæ ratioe multis qui talia uiderunt, manifestum feci quantamedicinalis methodi uis, quantique mali occasio fuerint qui non seruata ueteri medicina, nouas sectas condiderint. Hæc sanē & uos præterea me, quantūque à principio reculantem, orando tamen impulisti omne hoc opus tractandum susciperem. Quod, deos precor, alijs quoque hominibus alicui siturus. Certe minimā spem habeo, propter eum qui nunc regnat bonarū artium contemptum, diuitiarum uero existimationis, & ciuilis potētiae admirationē. Ad quæ quisquis se cōuertit, is nulla in re ueritatē inuenire poterit. Verū hæc prout deo placebit, ita finientur. At nos medendi methodum, quæ ueteribus quidem exculata est, nunc uero neglecta facit, pro uirili restituemus: repetita nimirū quam de cauo ulcere inchoauimus, disputatione. Ac de prima quidē inuentione eorū quæ eiusmodi ulcus carne impleant, satisfaciāt quæ paulo ante diximus, concedamusque si libet Empiricis quæ dicūt omnia. Ad de inuentorū usu & sæpe tibi in ipsis rebus ostendi, et nunc nihilominus ratione demōstrare conabor, quemadmodum Empirici ubi solenne cuique medicamentū nihil proficit, apte ad aliud, certa que ratione transire nesciant.

Atque id iure accidit. siquidē cū causam improspere successus prioris medicamēti ignorēt, nec quod eam in secundo declinet, habent, quippe cum causam ignorēt, cur munere suo medicina fungatur, nec cur fallant intelligere ualent. Hoc uero ignorato, neque ad aliud transire rationabiliter possunt: quādo nec in illo uitare eandem causam possunt.

3 Agedū igitur ipsi iam Hippocraticā uerāque causi ulceris sanandi methodum tradamus. Porro hanc ab ipsa rei substantia ordini oportet. Itaque quoniam in cauo ulcere id nobis proponitur, ut caro quæ periit restituatur, scire licet generāde carnis materiā, sanguinem bonū esse: opificem (ut ita dicam) authoremque naturā. Verum non satis est naturam simpliciter dixisse, nisi etiā quorū natura, sit adiectum, & ubi. Constat autē quod subiecto-

rum corporū quibus superinduci caro debet, natura ipsa gignēdā carnis opifex est. Porro cuiusq; corporis natura monstrata est esse calidā, frigidi, humidī, ac sicci temperatūra consistere. Quare manifestum est iustum horum temperamentū in subiectis particulis, quibus restituri deficientē carnē sumus, opificis habere rationē. Ac primū quidem in omni cauo ulcere duo illa consideranda nobis sunt, & quod subiectū est, iustāne temperie sit, id est an secundum naturam se habeat, quippe monstratum est sanitatem in similaribus corporibus, ipsarum quatuor qualitātū esse iustam tēperiem, & præterea sanguis qui adfluit, bonūsnē, ac mediocris sit. Si igitur horum alterutrū uitiosum sit, multū sanē effectus præter naturā existit. Nobis tamē unā cautitas in carnosa parte proponat. Fingamus igitur & sanā esse partē, & sanguinis cōfluxum citra ullum uel in qualitate uel quātitate uitii. Porro his ita se habētibus, nihil est præterea quod obstat quo minus prima carnis generatio prospere contingat, idq; nullius externi medicamenti ope. Quippe causis ambabus unde nascitur præsentibus, nulloq; extrinsecus quod impediāt obstante, nō potest prohiberi carnis generatio. Verū in ipsa primæ carnis generatiōe duplex prouenire excrementū necesse est, ueluti etiā in commētiarijs De natura docuimus, qd omnē qualitatis alimēti mutationē alterū crassius, alterū tenuius excrementū sequitur. His excrementis etiā per uniuersum corpus semper proueniētibus, quod tenuius est ipsa inuisibilis est perspiratio. quæ etiā subinde fit uisibilis quoties uel naturalis calor laqueet, uel nutrimento uitur qd iustū sit ampliore, uel motus quispia uehemētiōr animali cōtingit, alterum est sordēs, quæ in summo corpore nostro colligūt. Quin etiā in ulceribus tenuius excrementū sanies. Græce *ἰχθὺς* appellat: quod crassum est, sordēs. Ac ex tenui quidē excremento ulcus humidū reddīt, ex crasso sordidū, eoq; duplicib. medicamētis eget: utique ut humidū est, siccātibus: ut sordidū, quæ ipsum se expurgent. Ergo cū nullo unq; tempore natura cesset, certe nec tēpus ullū erit, in quo non ambo hac in cauo ulcere colligentur. Quare nec tempus ullum erit, in quo nō utrūq; medicamentorum genus desiderabit, utiq; & quod siccet, & quod expurget. Ac cuiusmodi quidē genere esse medicamentum debeat, inuētum iam est. Verum non est id satis. Siquidem specie aliqua inuēta est opus, quæ sit ulceri ad mouēda. Hæc igitur quomodo & qua methodo inuenietur? Nempe ea, quæ in libris De simpliciū medicamentorū uiribus est tradita. Ostendimus nanq; in his quædā medicamenta siccare, quædam humectare, quædā refrigerare, quædam calfacere, nonnulla per coniugationem uel calfacere & siccare, uel frigefacere & humectare, uel calfacere & humectare, uel refrigerare & siccare: esseq; in singulis eorū maioris minorisq; rationē, multitudine sanē infinitam: ceterum ad usum medicinale mētib. qui facile cōprehendātur, circumscriptam, primo quodam in his & secundo, & tertio, & quarto statuto ordine gra-

duatē. Cuius igitur ordinis erit medicamentum, quod carni producendā sit aptum: quodq; modice tū siccare debere, tū detergere propoliūsnē. Certe primi ordinis. Quippe quod super hūc fuerit, ita ut non modo humoris qui influit redundantiā consumat, sed etiā affluentem sanguinem ipsum populetur, id refici, carnē ceu materiā eius absumēs prohibebit. Porro talia esse ostensum est: thūs & hordeacea, & fabacea, & erui farinam, & irīm, & aristolochiam, & cadmiā & panacem, & pompholygem. Omnia uero hæc tum maioris minorisq; discrimine inter se dissidere, tū alia eorum simplices facultates uincētes habere, alia cōpositas, monstratum est. Siquidem aristolochiā & panax tum cæteris plus siccāt, tum natura magis calēt. hordeacea fabarumq; farina multo his minus siccant, nec ullum calorem obtinēt. Thus uero moderate calet, minus tamen illis siccāt, adeo ut quasdam corporum naturas omnino non siccet. Erui farina, & iris, horum atq; aristolochiæ & panacis mediū locum tenent. Verum quod sermo noster utiliter attigit, denuo repetamus. Quippe thus in humidā corporis natura carnē producere potest, in sicca non potest. Scire nanque licet duas esse primarum indicationū differētiās: quod secundum naturā se habet, custodiā sui indicante, & propterea quæ similia sui sint postulant: quod præter naturā est, sublationē sui, eoq; cōtrariā requirente. Perit enim quidq; in contrariū, & cōtrario. Atque ulcus quidem quo est humidius, eo sanē medicamēto quod magis siccet, indiget. Corporis uero natura quāto est humidior, tāto quod minus siccet, medicamentum postulat. Quare si quæ sunt ulcera, quibus par est humiditas, quod in sicciorē corporis temperamento consistit, utique magis siccari postulat: quod in humidiorē, hoc sanē minus, quo natura naturæ interest. Siquidem productā carnem ei, quæ ante erat, similem esse oportet. Vbi igitur pristina siccior fuit, nouellam quoq; sicciorē fieri cōueniet, quare uberius hæc siccari, quantoq; magis sicca fuerit, tanto quod ad mouetur medicamentum, magis siccā facultatem habere debet. At in humidiorē natura tanto rursum ijs quæ minus siccant medicamētis est opus, quanto caro ipsa minus est sicca. Thus igitur, ut ad humani corporis naturā, eiusmodi obinet tēperamētum, ut temperatam & mediā naturam propemodū ad æquet, humidiorē autē sensim exsiccet, quemadmodum ea, quæ ad summum esse sicca, paulo est humidius. Merito itaque thus in quibusdā tum ulceribus, tum naturis, pus quidē mouet, carnem non producit: in quibusdā etiā carnem producit. Itaq; si obseruaueris, rationi respondere euenta deprehendes. In humidiorē nanq; natura producere carnem potest, in sicciorē non potest. Præterea in modice humidis ulceribus carnē efficere potest: in ijs quæ præhumida sunt, prorsus nō potest. Vidēsne igitur quotsimē, qui rectā methodo curare ulcus uelit, quot huic theorematū sit opus? Nam postq; inuentum est humorem omnino huic uitio inesse, utiq; siccans parandum me-

dicamentum indicauit. At quoniam ipsorum siccantium quædam magis siccant, quædam minus, partim ex ulceri diuersitate, partim ex ægri natura, quod expedit, est desumptum. Itaq; non modo de corporis natura meditatus sit, oportet, quisquis comode sanare ulcus debet: uerum etiã diligenter speculationẽ omnẽ de medicamentis didicisse, tum siccationẽ humiditatis corporum temperamentis notas callere. Cõtẽplare igitur quanta sit Methodicorum istorum pronũciandi temeritas, qui unum id sibi ad cauum ulcus sanandum satisfecerunt, si sciãt quod carne est implendũ. Non enim in hoc curandi ratio consistit, imò in eo inueniendo quod carne sit impleturũ. At quod implebit, iam (inquit) experiẽtia est inuentum. Dic proinde & quod sanabit, inuentũ experiẽtia esse: nec frustra gloriari, nec methodũ extolle. Quancũ apud ipsos quoq; Empiricos experiẽtia, quæ sine certa limitatione sit damna. Scribũt namq; in cõmentarijs De medicamentis, ad hunc modũ: Emplastrũ ad eos qui molli sunt corpore, & pueros, & mulieres. Norũtq; thus in naturis eiusmodi carnem in cauis ulceribus (modo aliud nullum symptoma sit) producere, eademq; implere. Vtrũ tamen eiusmodi corpora humida sint, atq; idcirco modice siccantia desiderant, an alia euentus causasit, sanẽ nõ norunt. Rursus enim ad senilia corpora aliud scriptũ medicamentũ inuenies, aliudq; ad ea ulcera quæ ægre ad cicatricẽ ueniunt, orasq; prætumidas habent, quæ *ὀξέως*. Græci uocant, multasq; alias discretiões in omnibus suis medendi cõtentiarijs scribunt, quibus quoad licet, ad curandæ naturæ proprietatem appositu pharmacũ inueniũt. Quippe discretiões in quaque arte proprium à cõmuni scernere conantur. quãtũq; plura quis discreuerit limitaueritq; eò propius ad proprietatem accedit. Ipsum uero ad uogũ proprium nec scribi omĩno potest, nec dici. Eoq; tum Empirici ij qui in arte fuere diligẽtissimi, tum Dogmatici ferẽ omnes fatẽtur nullam scribi posse curationem ad unguem exactã. Sed id quod ad cõiecturam de laborantis naturã desideratur, illi ex proprio cuiusq; medentium usu, hĩ ex artificiose ratio cinando adijciendum affirmant. Nemo tamẽ eorum adeo fuit præceps, ut omĩ ulceri cauo unã se habere medicinam quæ carnem restituerit, profiteretur. Non enim apud ullum inuenies eiusmodi pharmacum, quod omne ulcus cauum sanet, imò pro modo humoris sordisq; atq; ipso laborantis temperamento, immutandum medicamentum esse. Missa ergo hic Methodicorum impudentia, age uideamus quid Empirici dicant, qui ex proprio cuiusq; usu exercitationeq; adijciendum aliquid censent ad propria laboranti inuenienda remedia. Si quidem (ut sæpe diximus) nulla est in arte medica nec res nec medela, quæ specie dicibilis nõ sit. Sed qd nec dici, nec scribi, nec omnino præcipi potest, id quantitas in quoq; est. Nam in ulceribus humor & fordes dici possunt, quantitas in neutro dici potest. quanquam hic quoq; accedere proprius ad indicandum eam studemus, exiguam

A copiosamq; sordem dicẽtes, præterea tenuem, & crassam, & prorsus multam & admodum paucã, & mediocrẽ, & cõperentem, aliterq; ad hunc modum uarie nominãtes: quod uidelicet quamproxime licet, ad quantitatem indicandã accedamus. Diligenter igitur attendas nunc uelim, ut intelligas quantum præstet methodo quid uis, q; sola experiẽtia facere. Esto namq; notum sit hoc uel illud pharmacũ ad cauum ulcus implendum facultatẽ habere in ijs qui, ut nos loquimur, humidiores sunt temperamento: ut autem obseruator & Empiricus ijs, qui molli sunt carne, ac mulieribus & pueris: deinde nunc talẽ admotum nihil proffit. Nos igitur cuius causa nihil profuit, inuestigabimus, atq; hanc in duo æstimãda reducemus. Nã aut parcius siccauit medicamentum, aut nimis, horumq; notas habebimus sordem & saniem. Nam si plussolum sordis sit, totumq; ulcus humidius, intra modum siccauit. sin purũ, & absq; humore cernitur, ultra. Statim igitur mensuram quoq; excessus defectusq; ex ipso notarũ modo intelligemus: tantoq; pharmacũ quod deinceps applicabitur, uel siccius, uel nõ tale admovebimus. Empiricus aut si admotum cuiuspiã medicamentũ carnem non restituit, id quidem uidet: ceterũ ignarus parciusne an nimis siccando id euenierit, transire ad alterũ non potest. Ad eundem planẽ modum & Erasistratus, Herophilusq; ex dimidio (ut dictum est) Dogmatici, male ulcus sanabunt. quippe qui ea tantũ uitia curare ratione tentant, quæ instrumentaliũ partium sunt propria. Vlcus (ut iam dictũ est) commune similariũ instrumentaliumq; est. ideoq; id quatenus in similariũs prouenit, earenus empirice curabunt. Quin etiã si ea curare tentent, quorum substantia omnĩno perijt, aut etiam manca curtaq; est: in his quoq; necesse est, à Logice curando multifariã aberrare. Si em̃ quod perijt substantia quẽpiã similaris sit, necesse est eum qui regnandẽ huic consulet, totius esse naturæ peritum. Ac de his quidẽ post dice. Illud interim clarissimẽ ostensum arbitror, non esse cuiusque probe ulcus curare, primamq; omnium indicationẽ, quæ uel plebeijs patet, minimam esse curationis partem: Nam & calorem, frigus, humiditatem, ac siccitatem, ac tũas qualitates esse, demonstratiõne accepisse necesse est: et deinde quæ nobis tum De temperamẽtis seorsum dicato uolumine sunt scripta, tum quæ huc pertinent in alijs uoluminibus, omnia nouisse. Atque hætenus quidem de ulcere cauo sermo est habitus, ipsam tantum cauitatem curantibus nobis. Si quidem quæ ulceris propria curatio sit, nondum traditũ est. Perficitur autem ea quoq; iuxta eandem methodum. quippe quæ tum à laborantis partis temperamento, tum à medicamentorum facultate accipitur. Porro ambo hæc à tractatiõne De elementis pendent. Etenim nisi illud in methodo concessum sit, quatuor qualitates genituræ corruptelæq; causas esse, nec methodũ inchoasse, nec prouexisse, nec absoluisse fas est. At uero ut illas agẽtes mutuo patietesq; ostendas, id ad speculationẽ De elementis pertinet.

net. Quod igitur in precedentibus ostendimus, id nunc presenti sermone confirmatur. nempe nihil posse medicū de ulla similitum partium agitare, sine naturali, quā uocat, scientia. Verum illic de similibus duntaxat id est ostensum, hic iam sermo noster quodammodo insinuat, ne in ipsis quidem instrumentalibus cuiquam integram inuenire curationē licere, qui illam non attigerit. Porro idem in toto opere etiā euidentius monstrabitur.

4 Verum ad ipsam ulceris quod solum consistit, curationē trāfire nunc tempestiuum uidetur. Fuerit autē solum, si nec affectus ullus simul adsit nec symptoma. Est igitur quæ exulcerata est particula, nec fluxione uexata, nec malo succo utiōsa, nec omnino extra naturalem temperiem: sed nec ulla ei cāuitas adsit, nec ulla cutis amissio. Nam id quoque bona pars medicorum præterit, non intelligens postquā cauum ulcus carne iam impletum, ac plenum effectum, nihilo minus tamen hiat, duplicem adhuc particulā affectum superesse; alterum substantiæ cutis amissionē, alterum continui solutionē. Ergo quoties unum id habetur, nempe cōtinui solutio, siue ea summa est cuticulæ, (quā *ὠδὲ σπυδα* uocant) siue cutis totius, siue etiā pariter subiectæ carnis, utrium quod ulcus dicitur, ita existit, postulatque tantū agglutinari. Quippe si cōmissæ simul sint cutis oræ, nihil erit in medio cutis generis diuersi. quemadmodū in eo quod iam repletum est, planumque redditū. In hoc enim orę ulceris se nō contingūt, sed totius ulceratæ partis cutis perijt, quam utique restituere oportet. At in eo quod acuto aliquo est diuissum, una agglutinatio requiritur, nō etiam cutis generatio. Quoties ergo ulceris simplicis propositū sit inuenire curationem, præsumendū in sermone est diuisam esse carnem partemque citra ullius portionis amissionem. Nam latum quod cicatrice induci possulat, omnino cuticulā, quam *ὠδὲ σπυδα* Græce uocauimus, desiderat. Hanc igitur tum gignere, tum si bi unire oportet. duoque tibi hoc loco existunt, ad quæ sicuti in cauo ulcere consiliū diriges, propterea quod affectus ipsę geminus in ambobus est. Quo igitur (ipsorum inquit forte aliquis) planum ulcus a cauo discernis, si & geminus utrobique est affectus, et geminus curati propositus finis? Nempe multitudinem amissarū partiū. Quippe in cauo ulcere non ipsa modo perijt cuticula, uerum etiā reliqua cutis natura uniuersa, & subiectæ carnis portio aliquādo nō exigua. In repleto ulcere caro nō deest, exterius tamen cooperimentū desideratur. At quæ eius generis ulcerū curatio sit post dicemus. Nunc eius quod ulcus tantū sit, nec alium ullum affectum adiunctum habet, quænam debita curatio sit, præcipiamus. Ergo quoniā hic sola diuissio proponitur, diuisorū oras unā cōiunctas esse oportet. An non id solum, uerum etiā cōiunctas manerere porro bifariam simul manent, quæ commissa sunt, cum alia per se, alia ope aliorū maneat. Per se quidem, quæcumque secum cōcrescunt ac coalescunt. Aliorum ope & quæ colligantur, & quæ glutino aliquo tenentur. Ac quæ cōcrescant, om-

nino mollia naturaliter sint oportet. Talis sanē est rum caro ipsa, tum quæcumque ex carne consistunt. Quæcumque uero dura siccatæ sunt, eorum diuissæ partes coire simul nequeunt: sed glutinum aliquod uinculū mut, quo cōmissa maneant, requirunt. Et talium quidem corporū sanatio in sequētibz præcipietur. Nunc de ijs quæ uniri possunt, inceptum sermonem peragamus: hic quoque ipsam cōitionē, coalescētiāque causam inuestigantes. Est uero sicuti in cauis ulceribus ut caro producat, ita in simplicis ulcere ut oræ ipsæ secum coalescant, natura certe causa; adeo, ut si quæ dissident, in idem ad amissum cōponas, citra omnē reliquā extrinsecus molitionē coalescāt. Oriturque tibi iam alius attendendus finis, nempe orarū adductio: a quo orsus, quibus id efficias, inuestigabis. quippe aut uinculo ex duobus iniunctis circumdato, aut sutura, aut fibulis (quas Græce *ἄγκυρας* uocāt) impolitis, aut horum quibuscūq, aut omnibus, quæ diducta sunt, in idem adduces. Expedit autē quod circūjicitur, neque molle nimium sit, & algæ ritu fragile, (*ἀπαλὸς* Græce uocāt) quo uidelicet tutō cōtineat, neque rursus ita durum, ut premēdo offendat. Tum uero ipsa circumductio nec ita laxa sit, ut nihil efficiat; nec ita uehemens, ut premendo dolorē excitet. Hæc si feceris, fueritque ulcus solum citra uitiosum succū, aut fluxionē, aut intemperie, aut phlegmonem, aut aliud quodlibet uitium, proculdubio cōsibit. At si uel præ eius magnitudine fieri nequeat, ut disiunctæ ipsæ partes exacte ad inum utque si bi coniungantur, uidelicet nec sutura, nec fibulis, nec deligatura pertingere ad eas ualente, ut etiā sanies iam illic sit collecta, uel dolor quispiā adiunctus: eiusmodi ulcus ex sola partium cōmissione agglutinari omnino nō potest, quando quod dolere, plus aliquid affluere facit: atque etiā si quod affluit, pro iusto naturæ modo se habeat, attamen uires ipsæ partiū quæ tum propter dolorem, tum etiam ex uulnere sunt imbecillæ, ne quod iustum esset ferent, sed ueluti ab iniusto grauabuntur. Arque hinc omnino superuacua sanies proveniet, mirū etiam nisi & phlegmonem. Iam uero si etiā citra dolorem sanies in medio adductorum laborum ulceris interuenerit, aut etiam locus quispiā medius interfuerit, qui sanie quidē sit uacuu, sed aere plenus: non potest eiusmodi ulcus sola dissidentium partium coniunctione glutinari quādo & sanies iam unionem discescit, & quæ cōiungendis interueniunt loca uacua, interiorū laterum frōtes prohibēt se contingere. Quare illæ saltem ulceris partes ut coeant, etiam carne prius impleri naturæ opera postulant. Porro hæc adeo planē sunt exigue, si modo diuissæ ulceris partes rite sint cōiunctæ, ut unius diei spatii desidererent, aut ad summū bidui. Hoc igitur tempore medicamēto opus est quod particulā siccet, ut & si qua sanies iam sublit, hanc cōsumat, & si qua in uacua loca influxura est, hanc prohibeat. Nunc igitur medicamentū quod carnem producat, & mediocriter siccet, rursus mihi ad memoriā reuocabis, ut intelligamus siccissimē eo esse glutinatorium debeat an lecius. Sanē quod

carnem producit, si totum qui cōfluit sanguinem consumeret, ipsam materiam creandæ carnis sic adimeret. At glutinatoriū aut omnino carnis generatione non eget, aut planè exigua. quare plus siccet, oportet, q̃ quod carnē producit. Ergo tum hac ratione tenui quadam differentia inter se distident, tum uero altera non parua, quatenus scilicet quod carnem producit, statim etiam detergendi vim obtineat oportet, quō non modo redundantiam humoris siccet, sed etiā sordem auferat. glutinatoriū uero nec detergeat, nec expurget, sed contra prorsus substantiā omnē in idem cogat, cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea quæ aufera & adstringentia uocantur. Hæc namq̃ in idem cogendi, ac stipandi, nō detergendi, neq̃ purgandi facultatem habent. Quo fit, ut ubi carni producendæ studemus, maxime cauendum sit ad medicamentum quod adstringat, utpote quod sordem ulceribus arctius affigat, quā ut facile possit absolui. Vinum igitur, omnis ulceris, qua ulcus est, optimum est medicamentum. Quod si nec illud, qua ulcus, sermoni sit adiectum, idem tamen arbitror intelliges. Quippe recordationis tantum causa est additum, (ne quis obadiat,) non sicut necessariū aliquid definiens. Adeo si memorem te eorum omnium quæ in proximo libro sunt tradita de rebus singulis tum nominandis, tum uero subiectis, præstiteris, nihil est quod talia tibi de cætero definiā. Illud tantum abunde mihi erit, si per singula eorū simplices affectus a compositis fecernam. De quibus mihi non nihil prius est dictum, ac nunc nihilominus est dicendū, nō adeo mehercule re ipsius causa, q̃ quod pleriq̃ medicorū dictione ipsa decepti, cauum & aquabile, cruentum siue recens & inueteratum, sordidum & purum, liberū phlegmone, & phlegmone impeditum, putant differentias esse ulcerum. Necesse igitur est distinguere quæ propriæ ulcerum differentię sint, & quæ aliorum affectuum complexiones. Verum hoc postea paulo. Sanè solennis ueteribus doctrina (quæ utinam nunc esset in usu) maxime naturalis est. Quippe si simplicis cuiusq̃ affectus propriam curationem dicūt, præcipueq̃ omnium Hippocrates. Medendi namq̃ methodus ad hunc modū bellissime procedet, si de singulis simplicibus seorsum præceperimus; post deinde de cōpositis omnibus alteram aliquam methodum indicauerimus. Veluti enim si duo uere essent in uictus ratione morbi, clausum & fluens, id est qui in retentione & fluore spectarentur, cum seorsum utriusq̃ curationem dixissemus, de coniunctione amborum esset agendum, sicut Thessalus ipse censet: eodem (arbitror) modo quoniam ulcerum qua ulcera sunt, una omnino est species, tum phlegmonarum qua phlegmonæ sunt, altera item species una est, oportet ubi seorsum ulceris, seorsum rursus phlegmones curationem tradideris, post deinde ambas in idem coniungere. Id igitur si fecerimus, omne perfectio ulcus tum siccari debere, tum etiam adstringi, pro dicta iam methodo inueniemus, nō tamen detergeri, contra, cavitatem in carne siccari quia-

Galen.

dem postulare & abstergeri, minime autē adstringi. Quin etiam ad eundem modum quem prius diximus in cauis ulceribus, nunc ad portionem naturam corporis estimabimus, mollisne an laxa sit, an dura, sicca, & cōpacta. Siquidem prior quanto est humidior, tanto medicamentis minus siccantibus eget. Posterius quatenus est siccior, eatenus rursus quæ uehementius siccet, magisq̃ adstringant, desiderat. Empiricus em̃ (arbitror) hic quoque pueros, & foeminas, & qui tenero sunt corpore, memorabit, iuuenes, agricolas, & nautas his opponens. Cæterum cum non intelligit quod in pueris & foeminis propter humiditatem temperamenti eiusmodi medicamenta uisa sunt conducere, rursus altera messoribus ac nautis propter siccitatem conuenire, nec cuiusq̃ corporis curationem exactè cōiiciet, nec erroris causam deprehendet. Quo fit, ut nec intelligat quemadmodū se ad potius transferet, ubi parum cessit ijs quæ per experientiam prius nouit. Hæc igitur summatim De glutinatorijs medicamentis diximus. Hinc uero altera quædam methodus succedit ad eorum preparationem cōpositionemq̃ pertinēs. Siquidem cauo ulceri quicquid uolumus, statim applicamus: siue siccum id, siue humidum, medicamentū sit. Licet enim om̃i parti ulceris ea tum inspergere, tum illinire. At in uulneribus quorū maior est profunditas, id non licet. Quippe ubi semel oras coniunxeris, contingere quæ sunt in alto diuisa, non possis. Considerandum igitur est non modo, an siccās adstringensq̃ modice medicamentum sit, uerum etiam an peruenire ad imum ualeat. Nam & cerussa & lithargyrus siccant, adstringuntq̃ modice: sed si ea cineris ritu circa uulnus inspergas, nihil proficies. Neq̃ enim ad fundum peruenit medicamenti uis, quod ita sit siccum: humiditatem igitur quandam desiderat, quod simile emplasticū sit, uel etiam humidioris cuiusquā medicaminis. Verum hæc operis eius quod De medicamentorum compositione præcipit, propria speculatio est, nō eius quod De medendiratione instituitur. Quod si quid ea ad rem propositam indigebimus, id procedente opere attingemus.

5 Nunc ad ulcus quod cicatrice induci postulat, reuertar, de quo pauloante dixi eius quoq̃ primum quod tenditur finem ex eodem esse genere, cuius est & caui. Quippe regnare aliquod opus est quod perijt, non tantū unire quæ dissident: cæterū diuersa ratio hic gignere quod desit, q̃ in cauo. quando hic sanguis, illic caro pro materia sit. Siquidē quod caui est impletur ex gignenda carne, quæ ex sanguine ortū habet. At ad cicatricem perducit quod iam est impletū, ex gignenda cute, quæ ex subiecta creatur carne. Cæterū caro eadem specie cum ea quæ perijt, gigni in cauo ulcere potest. Cutis talis omnino qualis erat quæ perijt, prorsus restitui non potest. sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest: non tamē planè cutis. Ac causā quidem cur sicuti caro adepsq̃ regignuntur, ita cutis quæ prorsus perierit, regigni nequeat, ex naturalibus problematis est petenda.

tom. 4 5 d quem-

quemadmodū autem tum naturā, tum usum cutis imitemur, hinc accipiendū. Eiusq; rei methodum iam tradamus. Quoniam tegere carnem naturali alio quo tegumēto propositū est: quippe id est ducere ad cicatricem ulcus, aut cutis nobis generāda est; aut summa caro cuti similis efficiēda. Verū ut cutis regeneret, fieri omnino nequit, quod superest igitur efficere et tentandū. At quā igitur huius efficiendi est ratio? Nempe alteratio. Quippe ut carnis pars quāpiā nō amplius caro permaneat, sed ueluti cutis euadat, postulamur. Quo pacto igitur (inquies) alterabit? Profecto alicuius alterantiū qualitātū ope. Incidit enī rursus hoc loco, uel nolentibus nobis, De elementis sermo, sine quo nec quod cicatricē inducat inuenire medicamentū licet, nedū quod carnis producēda; aut agglutinādi facultatē habeat. Ergo quoniam cutis carne ipsa tum siccior est, tū etiā densior, si carnē siccabimus & astringemus, cuti etiā persimilē reddemus. Habes medicamenti quod cicatricē inducit, summā. Verū ea nō satis facit, nam et glutinatoria tum siccabant, tum etiā adstringebāt. Ergo quo hęc ab illis differt, id, si ipsam rerū substantiā inspicias, inuenies. Nam quoniam in glutinatione ulcerū siccandum quod adfluit est, quod uidelicet affecta pars superuacuis uacet; in cicatrice ducēda nō modo qd adfluit, uerum etiā humor qui in ipsa carne continetur, est cōsumēdus: multo profecto siccior quod cicatricē inducat, q̄ quod adglutinet, esse conueniet. quādo glutinaturū unum id propositū est ut eius quod secundū naturā est, redundantiā consummat; qui cicatricē inducet, nō hoc modo, uerum etiam ut ei quod secundū naturā se habet, aliquid deradat. Galla igitur immatura hoc loco, & malicoriorū, & Aegyptiac spinæ fructus, modicē siccantia pharmaca sunt. Chalcitis, & es ustum, & eris squama, & misy, & fissum alumē, multo his sunt ualentiora. Misy quidē & chalcitis præcipue, mitior aut æris squama, atq; etiā hoc mitius æs ustum. Quod etiā si lauabis, utiq; minus mordens medicamentum habebis. Porro hoc quoq; ad speculationē de cōponendis medicamētis pertinet, quā sanē medendi methodū ordine sequitur. Nam medicamentorū facultates nosse, id quidē medendi methodū præcedit, tractatq; de his alibi est. Cōpositio uero medicamentorū, medendi methodū sequitur. Quippe ubi hęc uniuersale præcepit, dico aut siccandum, aut humectandū, aut calfaciendū, aut refrigerandū esse: tum uel modice id faciendū esse, uel ualētē, uel leuiter, intelleximusq; cuiusq; simplicii medicamentorū facultatē, hancq; per se & seorsum persēlamus: tum profecto quo pacto quis ea cōmode ad usum miscuerit, cōsiderare conueniet. Existit igitur eo pacto duplex de medicamentis peritiā, altera de eorū uiribus, altera de compositione ac præparatione. Verum ad id quod superest methodi de ulceribus, redeundum est.

6 Superest aut (ut arbitror) de supercrescente carne dicere, quā ὑπερσάρκωσις Græce uocat pleuraq; medicorum pars. Est porro is quoq; morbus ex eo genere, qd in quātitate magnitudinē ue par

tium spectatur. Licet enim pro arbitrio uoces. Ex eodem genere & cauitas erat, de qua iam egimus. Ergo ueluti quod ulcus cauit uocant, non unū est uisū, sed pariter & cauitas et ulcus: ita ulcus quod supercrescentē carnē habet, nō unus est morbus, sed simul caro supercrescens, & ulcus. Indicat aut magnitudo quā præter naturā est, primā indicationem, (quam etiam ueluti metam inueniendorū remediōrū diximus) ipsius scilicet exuperantis ablationē. At hęc sola medicamentorū ope perficitur, non opera naturæ: uidelicet contra q̄ in carne restituenta aut glutinatione se habuit. Hęc enī naturæ ipsius sunt opera, pharmacis tantū quæ actioni eius obstant, summouētibus. At supercrescentis carnis detractio, nullum quidē naturæ opus est, sed medicamētis perficitur quā uehementer siccant. Porro proxima sunt eiusmodi medicamēta, tum ijs quæ ualentē detergēt, tum ijs quæ cicatricem inducūt. sic ut nō pauci interim per errorem medicamentū quod carnē minuit, uel pro eo qd sordē deterget, uel pro eo quod cicatricē inducit, accipiant; ut (ne ab exēplo nostro recedamus) misy, chalcitīm si humidā naturā applicabis, potius carnē demere q̄ cicatricem inducere deprehendes. Vnde si quādo ijs uti ad cicatricē inducēdam in aliorum penuria cogimur, parcissimē ipsis utemur: summū tantum specillum in ea ad exactissimū leuorē tunsa demittētes, ac post uelut tenuissimum quendā pollinē partibus, quæ cicatrice induci postulant, imponentes: quod si minuere quæ supercreuere, studemus, liberalius imponemus. Sanē ærugo magis etiam q̄ hęc minuere carnem potest, ita ut genus eorū quæ cicatricē inducant, omnino sit egressa. At si illa etiā aduras, ut minus acria, sic ad cicatricē inducēdā reddes magis apta. Si uero etiā laues, adhuc fient mitiora. Meministi uero (arbitror) & tu eius qui celebri illo uiridī medicamento sordidum ulcus citra rationem curabat, mel quidem ei admiscens, multis autem deinceps diebus æque sordidum repēiens, deinde inops consilij, nec habens quod se uenteret, (Ac cidebat enim ut non modo non purgaretur sordes, sed etiam ut de subiecta quoq; carne non nihil unā detraheretur, & colliquaretur, propterea quod medicamentū ualentius q̄ pro laborātis natura erat) plus deinde (ut erat egregius medicus) mellis assidue medicamento addiciebat, quod uide licet adhuc ualentius purgaret, ceu nō satis id medicamentū prius adhibitu fecisset. Eueniebat autē planē contra. quippe quantū ille intēdebat medicamentū acrimoniā, tantum caro subiecta colliquabat. Quod uero in ulcere ex liquata carne sordis apparuit, id medico, ceu medicamentum nihil efficeret, imposuit. Atq; huius quidem ignorantiā etiam in discernendi peritiā erat, non solum in medendi methodo. Etenim si quam maxime similiter sordidū ex utroq; medicamento ulcus deprehenditur: certe cauitas maior ex ualētē, & quod colliquat medicamēto efficitur. Quinetiā labijs præaltis, rubrumq; et phlegmone quodammodo affectum ulcus cernitur. Aliquando uero rōtionem quoq;

quoque manifestam ex huiusmodi medicamentis ager sentit. Quod uero minus quam par est siccatur, nec mordetur, nec quicquid efficit eorum quæ restuli.

7 Patere autem & in his arbitror Empiricum etiam si experientia quam maxime distincta discretaque utatur, transire tamen ubi quid non ceciderit, ad id quod expedit artificiose non posse. imò uni illi id licere, qui uera methodus (quæ ipse nunc instituit) medetur. Quippe quæ Thessali istiusmodi methodum profitentur, nomen dumtaxat esse nudum intelligis, omnis effectus uacuum. Qui, cum tanta, tamque multiplex saltem methodus sit in ulcere sanando, neque Empiricorum discrimine ad inueniendâ remedia sunt usi, neque sicut Dogmatici ab ipsa rerum natura indicatione agendorum sumperunt: sed solum id, quod nec uulgares lateat, proponentes, nempe cauum ulcus carne impleri postulare, plenum cicatrice induci, quod carne superescens luxuriat minui, sordidum expurgari, mundum cicatrice induci, recens agglutinari, ulcerum curationis methodum quandam explicasse se putant. tantum scilicet absunt, ut intelligant humidioribus naturis minus siccantes medicinas conducere, siccioribus quæ magis siccant. Ergo quod in tota disputatione nostra manifeste apparuit, id denuo resumendum est: ut & nos illi quam maxime simus ætati, & reliqui omnes qui ueterem methodum corrumpunt, quantum aberraret, clarius intelligat. Incipiam uero ab eo ulcere quod carne impleri postulat, unum id pro exemplo proponens: quando etiam proxime de eo sermonem feci. Ab hoc de omni simul in uniuersum curatione loquar: Ergo illud non ratione modo, uerum etiam experientia considerantibus apparuit, non omnem naturam eadem medicamenta requirere, sed infirmiores mollioresque medicamenta, ualidiores siccioresque ualentiora. Ita uero tum in istis quibus cicatrix inducebatur, se habebat: tum etiam quæ glutinatione egebant. Omnino enim nullum uehementiū pharmacorum ferunt molles naturæ. In eiusmodi uero sermonis nostri decursu perspicuum planè sit, tum ægri naturam esse considerandam, tum cuiusque hominis propriam esse curationem, tum supra hæc illud tertium, nempe quoniam cuiusque naturæ proprietas ineffabilis est, nec exactissima scientia comprehensibilis, hunc esse optimū cuiusque particularis ægritudinis medicum, qui iam methodum quandam comparauit, ex qua & cognoscere naturas possit, & cōiectura consequi quæ sint cuiusque propria remedia. Porro, existimare cōmunem quandam esse omnium hominum curationem, sicuti stupidissimi Methodici putant, extremæ est demeritæ. Atqui illi ob id ita putant omnia medicinæ artis theorematâ, hoc est: iustum id esse quæ scientes homines faciât, firmamque sui notitiâ præstent, ipsorumque artem, notitiâ quandam esse cōmunitatam, non proprietatū, tanquam cōmunem & generalem hominē, non particulares curarent. Ergo sicuti in alijs omnibus statim inter initia sunt lapsi, sic in hoc quoque. Siquidem curatur non homo cōmunis & generalis, sed nostrum quisque, alius uidelicet aliud temperamentum naturamque obtinens. Hi uero unam esse omnium hominum curationem.

Galen.

nem existimant. Ego contra, si cuiusque priuatim naturam explorare ad unguem scirem, utique qualem fuisse Aesculapiū mente concipio, talem me esse putarē. Sed quoniam id fieri nō potest, certe ut quo ad hominē licet, quā proxime accedā, tum ipse me exercere decreui, tum alios ut idem faciant, adhortor. Ac conantur quidem quantum possunt & Empirici, ut à cōmunibus secedere, ita propius ad ea quæ propria sunt accedere. Verū quantum hi quoque ab eius rei perfectione absint, supra est dictum. Non enim hæc in pueris, uel mulieribus, uel senibus, uel mollem carnem albamque habentibus, aliaque id genus, pro certis discretionibus (sicuti illis placet) sunt ponenda, imò quemadmodum in humore & siccitate corpus se habeat. Ac Empiricos quidem medicos, tum ob alia multa, tum ob id probare maxime conuenit, quod accedere quantum licet ad ægri proprietatem conantur. Post enim reliquas discretionēs omnes quas adhibent, etiam quæ à consuetudine sumuntur, adijciunt, tanquam hinc remedium quæ ægro magis sint propria, cōpotes futuri. Dicitur autem à nobis in sequentibus De consuetudine fusius, ubi pro cognoscenda proprietate laborantis nature, etiam discrimen à consuetudine præcis inuentum esse probabimus. Hanc itaque cum reliquis Empirici recipiunt, & præter hanc, ipsum etiam medicum qui sæpe ægrum inuist, quæ cum qui non uiderit, cōmodius curaturū aiunt. Postea tamen cum hæc omnia adiecerint, stabilem se atque scientificam habere notitiā propriæ curationis ægri adhuc nō dicunt. At uero impudentissimus Thessalus illud modo unum intelligens, quod causū ulcus sit implendum, cōstantia tamen & firma dicit esse medicinam tæ remata, quamque hoc saltem omnes (ut ante iam dictum est) homines sciūt, nō in modo qui nūc sunt, postquam Thessalus iste alter uidelicet Aesculapius, in lucem hominum uenit: sed etiam, arbitror, qui ante Deucalionem, & Phoroneū fuerūt, si modo hī rationales erāt. Imò uero præter hoc quod carne esse implendum causū ulcus nouerunt: etiam illud nō ignorarunt, qui medicamenta nosset, quæ tale ulcus carne implerent, hunc medicum esse. Atque hæc si per experientiam sunt inuenta, constat empiricis non his esse curandum: si ratione inuenta sunt, Logice. Non enim profecto aliud inuenit, alio autem nunc cōmode utetur. Verū de eo nobis cum Empiricis lis est. Quod autem dicere cœperam, uera ipsa medicinæ de laborantis natura coniectura fecit. Nominat, arbitror, id uulgos medicorum Græcè ἰσχυροπρασίαν: omnesque id incomprehensibile fatentur, ideoque ipsam ueram medicinam artem Aesculapio, Apollini que concedunt. Pender porro omnis hæc ratio ex duplici principio: Empiricis obseruationibusque ab istis quæ manifeste apparent: Logicis autem, ab ipsis elementis. Nam quod alij aliud medicamentum proferunt, etiam pueri iam ferme sciunt, & ratio pariter quæ ab elementis ducitur, id confirmat. Si namque quindecim differētiās in hominum temperamentis ex minoris in istis maiorisque ratione, idque in humida tantum natura statuas, necesse profecto est medicamentorum etiam quibus sis usus-

tom. 6

d 2 quin-

quindecim differentias noueris, quarū alię magis, alię minus siccant, quo nimirū quod cuiq; naturę congruat inuenias. Quod si etiā in sicciorē naturā alijs quindecim positis, ad has quoque pari modo aliā quindecim medicamēta requiras, habebis in totū triginta medicamēta, quę triginta naturis cōueniēt, quibus uti is demū solus cōmode poterit, qui in corporū tēperamentis diligēter se exercuerit. Nunquid igitur si totū corpus tēperamento sit sicciorē, ab ijs quę magis siccant medicinis iurabitur: si uero pars quāpiā eius, ceteris partibus natura sit siccior, quę minus siccant requirēt? An liquido patet hęc quoq; quę pars siccior tēperamentū obtinuit, hanc etiā quę magis siccet postulare: quę humidius sit sortita, minus siccātia. Atq; hoc totū pręmittitū a methodi isti Thessalij, qui unā omni particulę cōgruere medicinā putāt. Empirici autē quantū in hoc Thessalios istos Methodicos superant, tantum a ueris Methodicis Logicisq; superantur. Habent enim profecto illi quoq; ab ipso scilicet usu edocti, aliud medicamentū ad ea ulcera quę in oculis accidunt, aliud ad ea quę in auribus, aut articulis, aut carnibus, aut sola cute. Ceterum quod nec in ijs se transferre ad aliud possint, ex ijs quę supra diximus, facile patet.

8 Quoniam autē & de his satis iam dictum est, rursus ad disputationis initium reuertamur, miscemusq; ulceri omnes qui simul cum ipso incidunt affectus, ab intemperie primū orsi. Si enim exulcerata caro, uel prius etiā ex quauis occasione uel ipso ulcerationis tēpore iusto calidior frigidior uel est effecta, utiq; medelam exigit, quę non modo moderate siccet, sed etiam intantum calfaciat, refrigeret uel, in quantū subiecta caro a naturali suo habitu recessit, cum fieri non possit, ut in ulcere, uel carnis productio, uel sinus impletio uel agglutinatō, uel cicatricis inductio, recte unq; cedat, nisi si subiecta caro pro naturali modo se habeat. nec frustra dictum supra est, hęc omnia naturę esse opera. Quocirca legitimi ulceratarū partium tēperamēti, quoties eas uel carne implere, uel glutinare, uel cicatrice inducere studes, maior tibi sollicitudo erit. Seruari namq; debebunt naturę motus, quos cōprehēsorū singula comitant. A taliā nō seruabunt, nisi prorsus se pro naturę suę ratione pars habeat. Veluti igitur si phlegmone cū ulcere unā esset, priusquā hęc discussa sit, nemo id uel carne implere, uel glutinare, uel cicatrice inducere tentaret, ad eundem (arbitror) modum etiam si sine phlegmone sola subsit intēperies, nullū horum fore prius sperabimus, q̃ illa sit sanata. Rursus igitur hinc indicatio quādā ad medicamentorum, quę superius cōprehensa sunt, inuentionem oritur. quippe omnia ea siccātia erant, sed dissidebant inter se pro intentionis remissionisq; modo. Ceterū, definitū antea non est, quatenus in calefaciendo frigefaciendoq; se haberēt: sed methodus hoc quoq; inuestigare quodammodo cogit. Non

A enim tantū an siccet, sed an etiam non ualde calefaciat, aut refrigeret, expēdi oportet. Ergo altercū, & mandragoram, & cicutā, ceu supra modum refrigerātia fugies. tamen si siccant ea quoq; quantū sit ulceri ex usu. Resina uero & pix, & asphaltus, quantū modice siccant, tamen immodice sunt calida. Ideoq; eis nemo utetur solis, nec aliter, nisi cū leuiter refrigerantibus admistis unū ex omnibus medicamentū fecerit, quod sit temperatū. Si igitur hęc ita se habent, sicuti profecto habent, insipici etiā conueniet & circūdantis nos aeris temperiem. Si quidem ueluti medicamentū quoddam, is quoq; corporibus nostris forinsecus incidens, ubi immodicus calore uel frigore est, sanationē moratur. Danda igitur opera est, ut medicamenta eius excessui occurrant. Ideoq; Hippocrates in calidioribus anni temporibus, ijs quibus frigidior facultas sit medicamētis utitur, calidioribus autem per frigidiora. Non ignoras profecto hęc quoque ex stupidis Methodicis quendā fateri, quō pacto in calore, & frigore se habeat, qui egrum continet aerem se inspicere, nō tamē anni tempora inspicere permittit: quasi nomina ipsa temporū anni prolixi obliuiscuntur, nō eorum tēperamentū ratio: aut non huius causa ueteres medici ad ea respexerint. Verum quod qui certa methodo curare ulcus debet, huius necesse sit, tum ad prima elemēta uel maxime uenire, tum anni tempora, & corporū tēperamenta nō in toto modo, uerum etiā in singulis partibus considerare, abunde monstratū reor.

C Rursus uero repetendum hoc etiā loco est, quod prius diximus in indicatio, quę a sicco humidoq; sumitur. Nam sicut in illis humidior natura humidiora, sicciora sicciora medicamenta exigebat: ita nunc calidior calidiora, frigidior frigidiora requirit: contrariā scilicet ijs quę preter naturam, & ijs quę secundum naturā sunt, indicatiōē præstantibus. quippe quę secundū naturā sunt similitū sibi indicatiua sunt: quę præter naturā, contrariorū si modo illa seruari, hęc summoueri necesse est. Ac q̃ tum corporū tēperies, tum anni tempora, tum partium naturę, cōsideranda ab eo sint qui probe ulcus sit sanaturus, clare me docuisse existimo. Ad hęc, q̃ prima quidem medicationis indicatio a solo sumat affectu, remedia tamē inde inueniri non posse, nisi prius ad corporū elemēta sit ascensum, & egrī tēperamentū perspēsum, nō corporis modo uniuersi, sed etiam afflicte particule: cum hoc quoq; ambientis tēperie æstimata: quę utiq; cum ad præsentis status, tum uero regiones extēditur.

9 Quod autē contrarię subside in una curatione indicatiōes sint, atq; has quemadmodū tractare conueniat, latius quidē dicitur in sequentibus, non tamen alienum sit nunc quoq; paucis de ipsis egisse. Etenim quod ægrī tēperamentū sit humidius particula ipsa quę laborat, siccior: aut contra quod hęc sit humidior, totius tēperamentū siccior, mirandū nō arbitror. Pari modo in calore, & frigore, quod contrariū tēperamento sit pars cum toto. Veluti igitur si totū corpus medio tēperamēto esset, (quod esse optimum docuimus) nihil plane

planè quantũ ad laborãtis naturã attineret, in medicamentis nouaremus: ita ubi uel siccĩus, uel humidĩus, uel calidĩus, uel frigidĩus iusto cernĩt, eate nus intendere uires medicamentorum oportet, quatenus corpus ad naturalem intemperiem est uersum. Non em̃, arbitror, excidit nobis quæ naturalis intemperies sit, & quæ præter naturã. Dicitur em̃ de ipsa sit in alijs, ac præcipue in libro qui De inæquali temperamẽto est inscriptus. Pone igitur totũ laborãtis corporis temperamentũ humidĩus esse, eoq̃ medicamenta desiderare, quæ minus siccet: ipsam uero ægrã particulam ex earũ numero esse quæ sicciores sint, (qualia esse diximus, quæ minus sunt carnosã, cuius generis sunt, quæ circa digitos, & articulos habent: præterea quæ circa aures & nasum, & oculos, & dentes, sunt: ac ut semel dicam, ubi crebra cartilagine, & membranula, & ligamenta, & ossa, & nerui sunt: adeps uero, & caro, uel omnino nulla est, uel per quã exigua) diuersa in his est ea quæ à patiente particula accipitur in indicatio, ab ea quæ ex ægri sumit natura. Quare si quanto ægri tẽperamentũ iusto est humidĩus, tanto particula iusto sit siccior: nec adijciendum, nec detrahendũ pharmaco quicquid est, sed tale adhibendũ, quale si ulcus in mediũ temperamẽti particula corporis mediocriter temperati cõsisteret, adhiberemus. Sin siccior debito particula tanto fuerit, quãto corporis temperamentũ iusto est humidĩus: utiq̃ in tantũ intendi siccitatẽ medicamẽti conueniet, quantũ particula temperamentũ totius temperamentũ excedit: ueluti si quatuor numeris sit exulcerata pars mediõ tẽperamento siccior, ægri natura gradibus tribus humidior, manifestum est particula quæ nunc exulcerata est, siccioris uno gradu desideraturam medicamẽtum, quæ pars sit temperata. Quod autẽ hæc omnia cõsiderata sint accipiendã, tum quod optime cõscire poterit, qui in ratiocinãdo de his sit exercitatus, si quidõ patet. Ac in talibus quidem omnibus contrariæ subinde indicatiões uno tẽpore fiunt. Neq̃ em̃ est quod de indicationibus quæ à calido & frigido sumuntur, etiam nũ dicã, utpote quæ ad portionem dictorũ intelligi possunt, in alijs uero, etiã temporibus statim indicationes separantur. oportetq̃ in principio præsertim curationis alterã cessare, alteram officio fungi. sicut exẽpli causa, cum ulcus caui simul sit, & admodũ sordidum. quippe affectus præter naturã in hoc triplex est, ulcus, cauitas, & sordes. Ordo uero sanationis à sorde expurganda ordietur, quod uidelicet, nec glutinari quicquam, nec carne impleri potest, priusquã purum fuerit. Secundũ locũ exiget cauitatis sanatio. Sinanq̃ uel glutinabimus, uel cicatricem inducimus, uel (ut summam dicã) curabimus ulcus, cauitatẽ implere nõ poterimus. Pone ergo nõ solũ tria hæc particulam obfudere, sed etiam phlegmonem, aliquid simplicem cõpositam uel. Num nam hic manifestum est, q̃ nisi quis illam prius sanauerit, implere carne cauum ulcus nõ poterit? Quippe dictum supra est carnis generationem ex sana

Galen.

A quæ subiecta sit, ortum habere. Ex ea uero quam phlegmone premit, & intemperata, & uno uerbo ægrota, caro gigni noua nõ potest. Ergo in omnibus eiusmodi complexionibus triplex tibi propositus finis erit. unus ueluti à causis sumptus eius quod post futurum est. alter ut quod rationem obtinet eius sine quo nõ. tertius eius quod ueluti accelerantium, & urgentium nominatur. Siquidem iusta subiecta carnis temperies, causæ rationẽ habet, ut quæ cõcrescere secum quod ulceratum est faciat, & cauitatem impleat. Puritas ulceris rationem eius sine quo non, atq̃ hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet uero & ipsa cauitas ad ulcus rationẽ eius sine quo non. quando nisi cauitas prius impleta sit, induci cicatrice ulcus non possit. Ergo si ad hæc respexeris, ordinem sanationis inuenies. ueluti si phlegmone, & cauitas, & ulcus, & sordes, simul in eadem particula cõsisterint, primum phlegmonem, secundo loco sordem, tertio cauitatem esse sanandam, & quarto ulcus. Ac in iam dictis quidem, tum ordo, tum agentium inuenio ex his sumitur. Urgentis uero indicatio inter ista non habetur: in alijs autem habetur. Nam affectus unde primum maximeq̃ imminet homini periculum, hic primus curari debet: interim uero non primum modo, uerumetiam solus. ueluti si puncto musculi capite, cõuulsio quæ nulla conuenientium medicamentorum uel remittatur, superueniat: quippe præcisio per transuersum toto musculo, cõuulsionem quidem sanaueris, aliquid tamen ex particula motibus uitaueris. C Ad eundem modum cum uena, uel arteria, sanguis immodice profluit, si totum uas per transuersum præcideris, ulcus quidẽ eius sanare postea nõ poteris, periculum tamen quod ex profliuio sanguinis impẽdebat, sustuleris. Iam neruũ punctum sæpe cogimur transuersum præcidere, quoties, uel conclusiones, uel deliria, uel ambo, magna ægræq̃ sanabilia, superuenire uulneratiõĩ cernimus. Pari modo, ubi luxatio cum ulcere in aliquo maiorũ articulorum incidit, ulcus sanamus, luxationẽ autẽ insanatã relinquimus, quando si hanc quoq̃ sanare conemur, cõuulsionem omnino sequetur. Tertius itaq̃ propositus medendi finis est, qui ad id quod urget, dirigĩt: diuersus nimirũ à duobus illis modo dictis. Neq̃ em̃ idem est, aliquid uel ut causam considerare, uel ut id quod rationem obtinet eius sine quo non, uel ut quod urget. Sed & quod urget, tum eiusmodi interdum esse, ut alium insanabilem affectum relinquat, dictum iam est: tum uero affectum ipsum non tanquã à nobis ipsis induci partim in neruo puncto, uel tendone, uel uasorum cuiusquam sanguinis profusione, partim in musculo cuius caput est uulneratũ. Nam ubi luxatio cum ulcere unã cõsistit, non ipsi affectum facimus, sed tantũ eum qui factus est, nõ sanamus. Dicitur uero de his accuratius in sequentibus.

io In præsentia nanq̃ redire ad proprias ulcerum differentias placet, ac propositũ sermonẽ breuiter complecti: quò si qua ex his etiam indicatio remediõrũ sit reliqua, eam nõ prætermittamus. Et

tom .6

d 3 go

go phlegmone laborans, & putrescens ulcus, & quod exedif, & quod gangræna, & quod erysipellate affligit, & cancerosum & dolens, & indolens, quæq; alia id genus ueluti ulcerum differētiās loquuntur, si quis Empiricā curationē prodens, nec aliud cogitans pertractet, non est cum eo contendendū si ulcerū ea differētiās nominat. Millies enim dictū est nō oportere de nominibus cōtendere. Sin tanq; artificiosum aliquid de indicationibus dicturus, docēdus est omnes iam dictos affectus cōpositos esse. alias uero esse differētiās simplicis soliusq; ulceris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus. Nam si ab acuto aliquo facta tantū diuisione forma eius quod uulnerauit, parti diuisa impressa est, existent profecto sic multæ ulcerum differētiæ, obliquorū, rectorū, pampinī modo rectorū, hamī ritu uncorū, aliter quocūq; modo se habentū. Atq; hæc quidem differētiæ omnes à figura sunt. A magnitudine rursus pro maioris minorisq; ratione mille aliæ. Nam & magnū & paruum, & maius & minus ulcus ulcere tum dicitur, tum uero est. Quinetiā breue & longū, in summo residens, & in profundum penetrans. Atq; in singulis horum, tum quod magis tale, minusq; est, siue in spatij, siue in magnitudinis, siue quantitatis, siue quocūq; modo appellasse libet differētia. Quod si hæc ita se habent, omnino profecto & æquale ulcus, & inæquale, penes diuisionis profunditatem, erit. Quippe diffusio, ita fors tulit, per longitudinē femore, potest superior diuisionis pars alte descēdere, inferior in summo corpore herere: aut cōtra, in summo esse quæ superior est, profunda quæ inferior. Iam illa quocūq; nēpe diuisum aliqua ex parte aut ex toto fuisse, & incisum fuisse, & ubi qd uulnerauit, oblique sub cutē se dedit, alteram ulceris partē in cōspectu esse, alterā sub cutē latere, idq; uel ex supernis partibus esse, uel infernis, uel lateraliibus: omnia hæc ulceris differētiæ sunt. Ab ipso tempore rursus aliæ ulcerū differētiæ sumuntur, uetus, recens, exigui tēporis, & diuturnum. Atq; in omnibus his ipsa maioris minorisq; ratio numerosa est. Atq; ab ipsa ulceris natura hæc differētiæ sumuntur, maxime quidē propriæ quæ à substantia rei capiunt. Nempe quæ à figura dicunt, & à diuisionis magnitudine, idq; uel in lōgitudine, uel in altitudine, uel in ambabus dimensionibus: præterea æqualitate in his, & inæqualitate: extrinsecus uero accidētes, & quæ scilicet rationē obtinent eius sine quo nō, tum à tēpore in quo factū ulcus est, (ita em̄ aliud recens, aliud uetus uocatur) tum ex eo quōd totum pars uel cōspectum fugit, uel conspiciendum se præbet. Iam uero & à generationis ratione, eo quōd totum sit incisum, uel totum disruptū, uel pars incisa, pars disrupta. Quōd si quæ in loco quocūq; in quo est ulcus differētiās censeas, ueluti si finis musculi, uel principium musculi, uel medium musculi, uel cutis sit quod ulceratum est, uel secur, uenter uel sit, in quo ulcus cōsistit: fuerint profecto & ipsæ ulcerū differētiæ, nō utiq; à propria ipsorū natura, sed à locis in quibus cōsistūt desumptæ. At cum phlegmone

A quis obfessum ulcus dicit, aut supercrescente carne pressum, aut cauū, deinde similes ulceris differētiās dixisse se ijs quas modo retuli putat, hūc necesse est in medēdi methodo falli. Quippe Græce φλεγμῶνον ἔλκος ex formula dictionis simile habet interpretationis figurā cum paruo ulcere: ceterum, quod significatur, simile nō est. Si quidē profundum, aut summotenus factū, cum de ulcere dicimus, propriam eius differētiā ostendimus. φλεγμῶνον uero omnino ulceris differētia nō est, cum possit phlegmone pars affici, etiam ubi ulcus non sit. Quo fieri arbitror, ut hic immutare dictionem liceat. Si em̄ accidisse alicui ulcus cum phlegmone dixeris, propius ad rei naturā, & clarius interpretatus sis. non aut si alij cum magnitudine, alij cum paruitate factum dicas, quippe cū & magis ex natura rei & clarius loquere, si huius magnū accidisse ulcus, illi parū dixeris. Adeo si fieri possit, ut mutata dictio & rei naturæ cōuenientior, & audientis clarior sit, cōmittendum non est quo minus id fiat. Quippe caput ad effugiendam in rebus deceptionē est, ut definita locutione utare. Quamnam igitur in talibus methodū statuamus? Etenim tradenda quæpiā præceptio est, ac ueluti scopus, quo semper intentis discernere statim liceat differētiām nē alicuius affectus dixerit quis, alterius affectus cōplexum. Esto igitur ubi discernim hoc, Quod consistere seorsum, & per se potest, id nullius unq; alterius fuerit differētia. Ergo magnitudo, paruitas, æqualitas, inæqualitas, tēpus & figura, ex eorū numero sunt quæ alijs accidunt. Vlcus uero, & phlegmōe, gangræna, & putredo, singula seorsum, et per se consistere possunt. Sunt nāq; corporis nostri affectus quidā præter naturā, minime ea quæ affectibus necessario accidunt. Quippe omnibus his necessario accidunt, ut uel parua sint, uel magna, uel æqualia, uel inæqualia, uel recentia, uel inueterata, uel euidenter appareāt, uel condantur, nec uideātur. Phlegmone uero affici, ex ijs quæ ulceri accidunt nō est, ueluti nec putrescere, nec gangræna tentari. Sunt enim hæc omnia ex morborū genere: siquidem affectus præter naturā sunt, & actionē uitiant. Alio rursus modo ulcus crucians, & ulcus sordidū, ceu quædam ulceris differētiæ dicunt. Cæterum cōpositum quippiam hic quocūq; indicatur, sed diuersa ratione q̄ ut phlegmone tentatum, aut putrescens ulcus dicebatur. Quippe hic affectus sunt phlegmone, & putredo: illic dolor, & fordes ex symptomatum sunt genere. Pari modo & cū dicitur cacochymon ulcus, id est uitiosio succo obfessum, aut fluxione uexatum, aut arrosū, causa cum affectu copulatur. Manifestumq; ex talibus est, methodi eius quæ de medendo instituitur, primos ac simplices, lineq; ulla cōpositione morbos, ueluti elementa quædam esse. Quo magis in cōmentarijs qui De morborū differētijs sunt scripti, omnes eos enumerauimus. Sanē nihil referat, primos, an simplices dixeris: quando quod primū est, simplex est: & quod simplex, primū, ideoq; etiam elementare. Indicatio uero curationis ex differētijs fit, sed non omnibus

nibus. Nā recens uetusue ulcus nihil indicat quam
 quam indicare uidet nonnullis. sed hi seipſos fal-
 ſunt non aliter q̄ in ijs quā ad uictus rationē ſpe-
 ſtant, cum aliam inītiā, aliā incrementi, aliam ſum-
 mi uigoris, aliam remiſſionis indicationē eſſe di-
 cunt. De quibus latius in ſequētibz dicetur, nō
 eſt quod nunc ſim uerboſior. Verum quod tantū
 ad rem præſentem ſit ſatis, id adiſciam. Recens ul-
 cus cum omnino ab altero quolibet affectu eſt li-
 berum, nec ſymptoma ullum habet adiunctū, aliā
 putant indicare curationem, q̄ uetus. Id uero non
 ita ſe habet. Siquidem quod ulcus tantum eſt, nec
 quicquā aliud: (eſt porro eiſmodi, cui nec cau-
 itas deſt, nec dolor, nec ſordes: quodq; & omni-
 alio affectu eſt liberū) & ipſam tantū ulceris ſanati-
 onem deſiderat: cuius utiq; propoſitus finis, uel
 unitio, uel agglutinatō, uel cōſtitio, uel cōtinuatō
 eſt. quippe millies diximus licere appelles, ut lu-
 bet, modo rei niſil mutes. eiſmodi igitur ulcus,
 ſiue recens ſiue antiquū ſit ſit, eandem ſemper cu-
 rationē requirit, niſil planē propriū indicante di-
 ſcrimine eo quod a tempore ſumit. At ſi cauitatē
 altere conditam ſub cute habet, cōſiderare oportet
 utrum ea in ſuperiore parte ſit ita, ut ſanies ex
 eo proma effluat: an in inferiore ſit, ut illic ſiſtatur.
 Eius igitur cui effluxus patet, eadem que aliorum
 curatio eſt. Cui non eſt, huiſmodi moliamur efflu-
 xum quendā oportet. Eius duplex ratio eſt, aliās
 tota cauitate deſecta, aliās in fundo tantū aperta.
 Quando uero harū alterutra ſit ineunda, docebit
 tum locorū ipſa natura, tū uero ulceris magnitu-
 do. Sinanq; & loca ipſa periculoſam ſectiōē faci-
 ant, & ulcus magnū fuerit, in fundo aperire magis
 expedit. Sin cōtra ſe habeant, perſcindere preſtat.
 Deligatio uero eiſ inīciat quidem ſuperne, ſed
 ſiniat ſupra, ubi ſcilicet patet effluxus. Quod autē
 differentia ea ulcerum, quā a uulneratis omnibus
 particulis ſumitur, ad indicandā curationē ſit ma-

xime opportuna, id in ſuperioribus eſt dictū. Ve-
 rum ea quidē ut ſimilariū, hæc autē cuius nunc me-
 mini, ut inſtrumentalium eſt indicatio. Sanē dicitur
 de ea quā uel ut ſimilariū corpori, uel ut in-
 ſtrumentalium indicatio eſt, in ſequētibz uberi-
 us. Nunc ad proprias ulcerū differentias eſt redeun-
 dum, ac de ipſo ſeu traſuerſum ſit, ſeu rectum, ſeu
 profundum, ſeu in ſummo corpore, ſeu parū, ſeu
 magnum, definiendū. Tranſuerſa nanq; ulcera, eo-
 q; labra eorū magis diſſident abſuntq; a ſeſe, cō-
 ſungi diligentius poſtulant: ideoq; tum ſuturis, tū
 ſibulis in hiſ eſt utendū. Quæ uero per longitudi-
 nem muſculorū ſunt facta, hæc ſi a duplici inītiō
 deliges, nec ſuturis, nec ſibulis egebis. Sin aliter de
 ligare placebit, uel ſibulis, uel ſuturis utere. Suffi-
 cient autē pauciſſimæ omnino ſuturæ. Et magna
 quidem ulcera, ſi recta ea que prius dicta ſunt, me-
 miniſti, ijs quæ ualentius ſiccant medicamētis cu-
 rabis. Parua uero, uel quæ moderate ſiccant, abun-
 de ſanauerint. Profunda uero ulcera, omnino etiā
 magna ſunt, uoluntq; tum a duobz inītijs deliga-
 ri, tū uero nec labra ſua præpropere glutinari. At
 quæ profunda multū lōgāq; ſunt, ut duplici ratio-
 ne ſunt magna, ſic duplicem quoq; indicationem
 præſtant. Itaq; & quæ ualenter ſiccant, poſtulant:
 & ne immature labra cōiungas, & ut a duobz inī-
 tijs deliges, & ut altis ſuturis conſuas. Ad eundem
 modū & ſi multæ ſimul differentię cōierint, qua-
 rum ſua cuiq; ſit indicatio: ſi quidem inter ſe mini-
 me pugnent, omnibus uti maxime expedit. ſin ali-
 quatenus ſecum pugnent, quēadmodum diſtin-
 guere de talibus oportebit, dictū quidem alicubi
 in præcedentibus eſt: locupletius tamen dicitur
 in ſequētibz. Nunc enim finiendus hoc loco ter-
 tius hic liber uidetur. In quarto qui ſequet, de ijs
 affectibus qui ulcera comitari plurimū ſolent, di-
 ſceptatio erit. Tradentur autē cum hiſ etiam inter-
 narum cauſarum curationes.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI QVARTI.

Cap. 1. Continuitatē ſolutā fieri in diuerſis partibus,
 ut carne, oſſe, neruo, ligamēto, uafiſ & muſculis: & di-
 uerſis nominibz appellari. Simples affectus a cōpoſi-
 tis diſcernēdos eſſe, & cōſiderandū qui nam & quot nu-
 mero eiſmodi affectus cōeāt, poſtremo colligi ſub cō-
 pēdō agere ſanabiliū ulcerū ſpecies quatuor: aut n. pro-
 pter interperatā ulceris carnē, quæ uel in qualitate ſola,
 aut etiā cū tumore aliquo præter naturā eſſicet: aut p-
 pter affectus humoris uel qualitatē uel quantitātē diſſi-
 cilia ſanatu ſiūt ulcera. 2. Quō quatuor iam dictis cau-
 ſis agere ſanabiliū ulcerum occurrēdū ſit. 3. Quod in
 affectibus manifeſtis nō ſit neceſſe ad curationē præno-
 ſci cauſas primitiuaſ ſiue externas: niſi illa præſens ad-
 huc morbu faciat, quā aliqui cōiunctā appellā cauſam.
 Ad noſcēdos uero affectus, externæ etiā cauſæ inueſtigā-
 de ſunt. 4. Indicationē curandī neq; in diuturnis ulce-
 ribz, quæ cacothē potius dicenda ſunt, neq; in ullo
 alio morbo, a tempore ſumendā eſſe, ſed ab ipſo affectu. Et
 q; in huiſmodi ulceribus labra partis exulceratæ non
 ſemp excidenda ſunt, niſi dura fuerint, calloſa, liquida, &
 nigra: tū em excidenda ſunt, non ſtatim tamen ut recēs
 uolnus curādā, cū cauā eſſit ſint, contra Theſalū. Poſtre-
 mo de uera medēdi methodo in uniuerſum: & a qua ge-
 nerali indicatione in quouis morbo auſpicandum ſit.
 5. De uera diuturni ſeu maligni ulceris cura: & q; de

ſiccatio ei præcipue cōmoda ſit. 6. De purgatione &
 phlebotomia quatenus a morbi magnitudine indican-
 tur. Quēadmodum em in ualido morbo, ſi uires con-
 ſtent, pueris exceptis, ſanguis etiā nō redundās detrahi
 tur: ſicciari purgatio propter alicuius alterius q̄ ui-
 tioſi ſuerit abundantiā, ſed morbi uolentiā adhibetur.
 Item quæ phlebotomiæ loco uſurpari poſſint. 7. De
 ulcerum differentijs, a ſitu, forma, acumine aut hebetu-
 dine ſenſus. De alijs eorū diſſerentijs dictū eſt lib. 3.
 cap. 9. & dicitur lib. 7. capite ultimo.

Aliter.

Methodus curatiōis ulcerū malignorū. Quot modi
 ſint ulcerū curatu diſſiciliū. Methodus curatiōis ulce-
 ris curatu diſſicilis ppter carnis intēperie. Vlcus cu-
 ratio q̄ cū tumore præter naturā exulcerata eſt pars.
 Methodus curatiōis alterius affectus q̄ prauū humo-
 res ad particulā deſtuit. Quo pacto in quibuſdā mor-
 bis cauſam præſipientē cognoscere cogamur. Malignorū
 ulcerū curatio ſecundū Theſalī opinionē. Contra Theſalū q; a
 tempore indicatio ſumi non debeat. Curatio ulcerū
 malignorū ex Hippocratiſ ſentētia. Quod ſæpenumero alter
 affectus ulceri adueniens, curationē quæ ulceri debet,
 prohibet adhiberi. Curatio eorum quæ ulceri accidunt
 ex Hippocratiſ ſententia. Quæ in dictatio curatiōis ex
 partiū ſitu ac figura ſumēda ſit.

GALENI METHODI MEDENDI ID

EST DE MORBIS CVRANDIS,

Liber quartus.



XNUM esse morborū genus, ipsam quoq; continuitatem solutam diximus. Hæc in omnibus animalis partibus incidit: non tamen unum nomen in omnibus sortit. Quippe quæ in carnosâ parte, ulcus; in osse, fractura (Græcis *κλάσμα*) dicitur: in nervo, conuulsio. Græci *σπασμα* uocant. Eiusdē generis sunt & quæ Græci *ἀπόσπασμα* & *ἐκρύμα* & *θλάσμα* dicunt. Illud in ligamēto, hæc in uasis musculisq; ex uiolēto ictu, uel graui casu, uel alio quopiam ualente motu excitata. Quæ uero *ἐκχέουσις* Græce dicitur, plurimum unâ cum contusione ruptioneq; incidit. Fit autem aliquando & ex oris uasorum apertione, quam *ἀνέσσωσις* uocant, & ex ea quæ a nonnullis *σπληνδουσις* dicitur, aliud utiq; tunc solutæ continuitatis est genus. Iam uero & ex erosione, quam *ἀνέβρωσις* Græce uocant, soluitur interim in animalis partibus continuitas. Verum is iam missus affectus est, ut qui aliud quoddam morbi genus adsciscat, quod in quantitate partium consistit: ueluti supra cum de causis ulceribus egimus, est monstratum. Est enim horum ipsorum duplex ortus: aliàs ab excisione, sæpe ab erosione proveniens. Verum excisio quo pacto eueniat, non latet. Erosio si intrinsecus ab ipso animali provenit, uitiosus succus soboles est. Sin extrinsecus, aut à ualentibus medicamentis fit, aut ab igni. Et sanè (ut dictū supra est) diligenter attendere oportet, & simplices affectus à compositis discernere; cum simplici morbo simplex adhibenda curatio sit, compositis non simplex. At quam in cōpositis curandis tenenda methodus sit, supra est dictum. Ceterū non tantum generalitatem eius didicisse, sed etiam in singulis eius partibus exercitatum esse oportet: cum in his quoq; alijs non paucis methodis (ut ita dixerim) particularibus sit opus, propterea quod cuiq; morborū speciei sua sit methodi species. Ergo quod reliquum est ulcerum curationis, in hoc lib. exequamur, hinc sumpto initio: Omne ulcus aut solū est, ipsumq; per se, nullo nec cum eo simul inuadente, nec ipsum præcedēte, aut sequēte alio effectu: aut cum alio quopiam uno multisq; consistit. quorū aliq nō modo statim ab initio ulcus excitarunt, sed etiā nūc maius efficiunt: aliq eius sine quo non, ut ad curandū opus, rationē obtinēt. Verum de his prius dictum est. At quæ maius ulcus reddūt, de his hoc uolumine agetur. Ac duplex in his curationis cōsiliū est, ut uel eiusmodi affectus ē corpore prorsus eximas, uel incōmodū quod inferunt, uincas. Verū hoc ubi exiguis planē affectus est, fieri licet. ubi magnus est, duci ad cicatricem ulcus prius nō poterit, q̃ illi affectui remediū attuleris. Ergo quinam & quot numero eiusmodi affectus sint, diligenter nobis considerandum est.

inde nimirum sumpto initio, unde supra est ceptum. Omne ulcus, siue solum sit, siue unâ cum cauitate, & subiectâ sibi carnem naturaliter habere postulat, & ne quid inter oras conglutinatione intersit, quod tamen sæpe fit, ita ut pilus, arena, sordes, oleum, aliud siue id genus glutinationē prohibeat. Cæterum, hæc ceu symptomata quadam ulcerū sunt, & quæ morari sanationē, si sint, possunt efficere, si non sint, nō possunt. Subiectæ uero carnis affectus causæ rationē obtinet ad id quod efficitur. Quippe ex hac, & per hanc, tum quæ dissident, glutinant; tum quæ caua sunt, carne implentur. ea ergo planē pro natura sua se habere oportet, quod hæc utraq; cōmode perficiantur. Atq; ea recte quidem se habuerit, si id quod reliquis etiā omnibus est cōmune, proprium temperamentū tueatur. Itaq; temperatam esse subiectam carnem ad ulcera tum glutinanda, tum carne implenda, prorsus oportet. Nunquid igitur hoc tantum satis est? An etiam sanguinem qui adfluit, & bonū esse & medio crem quantitate oportet? Mihi id quoq; multo maxime uerū esse uidetur. Nam & qui corruptus sanguis est, tantum abest ut ad glutinandū & carne implendum sit utilis, ut etiam ipse nunquam corpus erodat, atq; exulceret. & multus humor cum in ulceribus excrementa creet, sanationē (ceu prius diximus) moratur. Atq; hitres ægre sanabilium ulcerū modi uidentur. qui ex intemperie subiectę provenit carnis. qui ex uitio ad fluentis sit sanguinis. & tertius qui ex mensura cōfluentis nascitur. An non ita facienda diuisio est, sed sic potius? Nempe egre sanabilium rebelliumq; ulcerum, alia propter ulceratæ carnis intemperiem, alia ob adfluentem humorem talia fieri. tum intemperiem rursus ipsam bifariam diduci, cum aliàs in qualitate sola naturæ modum egressa subdita caro sit: aliàs etiam cum accessorio quopiam tumore. Iam ipsum confluxum bipartito etiā scindī. nempe in confluentis succi, tum qualitatē, tum quantitatem. Interim uero misceri dictorum affectuum, aut aliquos, aut etiam pariter omnes. Porro tradenda est medendi methodus non omnium simul, sed cuiusq; seorsim.

2 Ac carnis quidem intemperies si squalens siccaq; uidetur, aqua temperata fouens humectansq; corriges. Quoties autem eo remedio uteris, esto tibi perfusionis humectationisq; meta, ut cum primum rubescit attolliturque particulae moles, tum desinas. Quippe si ultra perfundas, quod attraxisti, id euocabis: itaque nihil profeceris. Quin etiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto, quàm ut in sana carne præceptum est. Si uero humidior quàm pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda, aqua uero nullatenus admouenda: imò si laudum ulcus uidetur, uinū, aut posca, aut decoctum

zusteræ cuiusquam herbæ preparandum. Eodem modo & calidiorem quàm par est carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē calefacies. Agnosces uero horum utrunq; partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu. quippe aliàs uisione sentire se fatentur, aliàs manifestum frigus in particula, gaudentq; uel frigidis medicamentis, uel calidis. Et alijs quidem rubor leuis insidet, alijs color magis albacat. Verum hæc distinguere, propositi operis officium nō est, quippe in quo nō dignoscendi, sed medendi methodum instituimus, sed consequentia quadam sermonis inuitate digressi in hanc sumus. Rursus igitur ad ea quæ proposuimus, reuertamur. Partium quæ cum aliquo præternaturam tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus tumor est. Quæ uero omnis præternaturam tumoris curadi ratio sit, in sequentibus dicetur. Nunc quantum eius res consuetum cum ulcerum curatione est, tractabitur. Cū labra tantū ulceris decolorata duratū plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanā usq; carnē. Cū uero amplius progressus eiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendūne omne id sit quod præternaturam uisitur, an spatio potius curandū. Proculq; dubio est agri animū hoc casu consulendū esse. Aliqui enim longiore tēpore curari citra sectionē malūt; aliqui quiduis subire, dummodo citius sanentur, sunt parati. Aque uero & mali succi qui ad exulceratam partē confluit, ut ulcerās quidē est, sanatio eius hic dicetur. ut malignus succus est, aut copia redundans, in proprijs ipsorum locis tractabitur. Cum ergo qui exulceratis partibus influit succus, nec multo largior iusto, nec multo deterior sit, averti hunc regeſq; cōueniet, adstrictis scilicet refrigeratisq; ijs particulis, quæ ante exulceratā sūt. Inchoanda quoq; deligatio est à laboratē ipsa particula, deducendaq; uersus sanam; ueluti in fracturis osium præcepti Hippocrates: sed & quæ ulceribus ipsis admoventur pharmaca, siccant ualentius oportet, q̄ ea quæ simplici admovent ulceri. Quod si sisti compesciq; medicamentis influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atq; hæc prius adimenda. Ac si quidem ob partis quæ fluxū recipit imbecillitatē aliquā id fiat, huic nimirū medendū est. Fuenit autem hæc ulceratæ quoq; partis propria quædam curatio. Sin propter sanguinis copiam, uitio sumue succum, uel corporis totius, uel alicuius suprapositarū partium, illa scilicet prius sunt corrigenda. Ac imbecillitas quidē partis propter quam plus iusto succorum illi influit, omnino ab intēperie provenit, nō tamen ab omni. Eoq; fit, ut exulcerata caro nonnunq; intēperata tantū sit, non aut imbecilla; nonnunq; utrunq; & intēperata, & imbecilla. Quippe imbecillitas affectæ partis ualentior intēperies causa est. Hanc autem, sicut prius dictum est, curabis utiq; calidam refrigerando, siccam humectando, frigidam calfaciendo, humidam siccando. quod si per coniugationem frigidior pariter humidiorq; locus sit, calfaciendo pariter ac siccando. & in alijs ad eundem modum, uincemtem uidelicet qualita-

tem contraria semper oppugnās. Huius rei ratio hæc est: Quicquid rectū est nō in animalib; modo plantisq; uerū etiā alijs quibusq; id symmetron est, mediūq; & omnis uitiosi excessus experts. Cui enim nec demere quicquā, nec adijcere non partem aliquā, nō qualitatem possis, prorsus id recte se habet. Contra, quod demi sibi aliquid, adijciue postulat, id iam ab optimo statu recessit. Ad quē utiq; redire aliter non est, nisi & quod superuacuum est tollas, & quod deficientis est adiungas. Ac de ijs quidem quibus partes quæpiā abundant, deficientiūq; alibi sermo erit. Vbi uero qualitas aliqua plus iusto inualuit, ibi & continuo uinci contrariam illi necesse, & continuo uitium corrigi ex ea quæ uicta ante est, restituenda. Quippe refrigerās quod immodice incaluit, unā et quod deficit restitues, & quod superat diminues. Quare quæ per intemperiem aliquā à naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per ea quæ contraria uiribus sunt, fieri omnino est necesse. Atq; ad hunc modū caro, aliāue carnosa quæpiā pars quæ fluxione humoris ob imbecillitatem affligitur, sanari debet. Vbi intemperiei affectum iam sanaueris, deinde etiā exulcerationis affectum sanabis; nō aliter planē nunc curata intemperie, quàm si citra ulcus incidisset. Quo manifestum sit, non esse ulceris, sed intemperiei propriam omnem eiusmodi curationem. Ad eundem modum si aut alterius cuiuslibet particulæ occasione, aut etiam totius corporis, cū in eo sanguis mali uel succi redundat, uitiosum aliquid exulceratis partibus influxerit, medendū prius est, uel ei quod fluxionis est causa, uel etiā toti corpori. Ita igitur & uarices quæ sæpe supra exulceratū locū sunt, prius sanabimus, ut deinde mox ulcus sanemus. Etiā qui ex liene, aut alia quauis notabili parte laborant, ipsa prius parte percurata, mox ad ulceris curationem accedemus. Caterum, nulla harum curationum ipsius est ulceris, sed alterius cuiusquam affectus, qui ulcus uel gignit, uel certe auget.

3 Nam illud quoq; iam definiri tempestuum uidetur, nullam externarum, uel (ut nunc loquimur) primitiuarū causarū curationis indicatricem esse, sed huius indicationē ab ipso affectu initium habere, quæ uero particulatim sunt agenda, hæc tum ab eo quod prima indicatio dicat, tum uero ab agræ partis natura, tum ambientis temperie, quæq; alia sunt his cognata, inueniri. Nā (ut breuiter dicam) à nullo eorum quæ adhuc nō permanent, indicatio sumi eius qd̄ ex usu sit, potest. Sed propterea q; ad eū affectū noscendū qui omnino tum rationē, tum sensum lateat, sæpe cogimur de externa causa inquirere: opinat̄ uulgus hanc quoque sanatiōis rationē indicare. Quod planē secus est. Apparet illi liquido in ijs quib; nosci affectus exacte potest. Siue enim ecchymosis, siue ulcus, siue erysipelas, siue putredo, seu phlegmone, in parte aliqua consistat, superuacuum est causam quæ horum quodlibet effecit inquirere, nisi iam etiam faciat. Sic enim simul quod iam factum est, curabimus: simul quod adhuc facit, facere inhibebimus.

Si uero

Si uero fecit illa quidem, ceterum iam abiit: utiq; quod factum est, curabimus. quod adhuc non est, nec si uelimus, summouere id possumus. Quippe rei praesentis est curatio: eius autē quod futurum est, prouidentia. Quod uero nec nunc laedit, nec laesurum timetur, id ab utroq; artis munere, tum eo quod curat, tum eo quod prouidet, excessit. Quare nec indicatio hac ad curationē ulla, nec prouidentiae ratio sumitur: sed uti dictum est, ad eos tantum affectus qui nostram notitiam fugiunt, externae causae cognitio est utilis. Empiricis tamen ceu pars totius syndromes, id est cōcursus, in quo curationem obseruauit, externa causa interim sumitur. ueluti in ijs qui à rabido cane, & omnibus qui à uenenosis bestiis sunt laesi. Quinetiā ex Dogmaticorum quoq; numero ijs qui sine rationali indicatione, sola experientia curare se talia confirman. Quippe his quoq; externa causa seu pars totius syndromes, id est cōcursus, quaeritur. his uero qui ex priore usu uenenosarum animantium uim norunt, atq; ab hac indicatione curationis sumunt: non sanē ad curationis indicationem conducit externa causa cognitio, sed ad praesentis affectus cognitionē. Nam pone sciam scorpionis uenenum frigida ui esse, sumamq; ueluti à frigido remedij indicationem: nullo tamen signo intelligam talem esse in hoc corpore affectum: manifestum est si scorpionū percussisse didicero, quod calcascere tum corpus totum, tum punctam ab eo particulā conabor, nulla amplius expectata experiētia, sed ab ipsa rei natura indicatione sumpta. Monstratū ē in ijs libris est qui De medicamentis sunt inscripti, in quibus exercitatum esse censui quicquid ex his commentariis fructum percipiet, nullam eiusmodi facultatem sine experiētia inueniri. Esset enim profecto felicitatis cuiusdam munus, si quis inspecto lithargyro, aut castoreo, aut cantharide, protinus eorum uires intelligeret. Verum sicut in omnibus peccata, tum ab ijs qui modum excedunt, tum qui citra cōsistunt, cōmittuntur: ita nimirum hic quoq; ac *dis sū πασῶν* (ut in prouerbio Graeco est) nō semel (arbitror) inter se discordāt, et qui neq; in hodiernum usq; diem affirmant sciri medicamentorum uires, idq; post tantam experiētiā, & qui ex una experiētia sciri eas censent. Nā & hoc praecipitanter inconsulteq; dictum est, si utiq; inconsultum est quod fieri omnino non potest: & illud hominum est, aut omnino attonitorum, aut planē litigiosorū. Verū de his plura expectare nunc non oportet, utpote de quibus dictum latius est, tum in tertio De temperamentis, tum in ijs libris, quos De medicamentis inscripsimus. Ceterum, (ut dixi) ad noscendos affectus alii quae externarum causarum conferunt. Vbi uero praesentis affectus nihil latet, nulla iam externae causae est utilitas. Ac diximus quidem in superioribus, non esse in idem coniungendas utraq; doctrinas, sed seorsum empiricē, & seorsum tradendam rationalem. Memoria autem tenendum nunc quoq; est, quod, quoniā propositum nobis in his cōmentariis est solam rationalem tractare, quan-

quam ad quāpiam horum quae dicimus, non apponitur quod absolute uera non sint, sed tantum ea: Methodi corū secte sententia; alique tamē id per se ratioinari, ultroq; apponere debere. Nūc enim ipsi apposimus nullam externarum causarum ad curationis indicationem conducere, sed ad effectus aliquando agnitionem, fatentes uidelicet externam causam ijs qui empirice quiduis curant, unam esse partem totius cōcursus, idq; siue ijs ratione reliqua curant, siue omnia empirice. In ijs autem quae deinceps scribentur, non erit necesse hoc adscribere. Rursus igitur ad propositum redeamus, indubitatū illud principium praesumentes, quo etiam in praecedentibus sumus usi, ubi diximus primum scopum quod medicus tēdat, affectum ipsū qui curari desideret, indicare: ex hoc uero & reliqua omnia sumi. Quod uero cum hoc scopo nulla externae causae societas sit, ex ipsis maxime ulceribus à quibus sermo est ortus, intelligas. Finge enim ex eo quod in partem aliquā procubuerit, narum ulcus esse. Quod si sit, ex utriusq; prouenire succis manifestum est. Ita enim in morbis facere natura solet: cū corpus expurgat, omne excrementum ad cutim trudit. Atq; hanc quidem ulcerari, totum uero corpus purgari accidit. Quae nam igitur est eiusmodi ulcerū sanatio? Nempe quae reliquorum omnium, quibus nullus affectus malignus, quem *κακοῖς* Graeci uocant, est adiunctus. Verum si hoc sic se habet, manifestum est nullam esse ad curationē à causa quae ulcus excitauit, indicationem. Atqui si uitiosus succus remaneret, omnino aliqua ab hac quoq; indicatio fumeretur. Verum alioqui ita absurdum esset, si curationē postulare, quod amplius nō sit, aut si curationē indicaret, quod nullius indigeat. Quare dicere indicationem curationis, ab externa causa sumi, omnimodo est absurdū. Quoniam ergo non ab hac, perspicuū est ab ea quae praesens est, indicationē fore. At qualis tandem ea est indicatio. Nempe ei qui exacte loquetur, quae ad prouidentiam pertinet: (*προφύλακτικῶς* Graeci uocāt) qui abuti uocabulo uolet, medicinalis. Quandoquidē ipsorum etiam ulcerū, siue tantū ulcera simpliciter sint, siue etiam cū cauitate, si quis diligenter aestimet, ex fugiendis prospiciendisq; ijs quae naturae officiet, sanatio perficitur. Et in summa in quibus quod efficitur, naturae ipsius opus est, ueluti ulceris glutinatio, & ex carne impletio: in ijs ad eam quae prouidet artis partē, omnis pertinet cura. Ceterum sanatio uulgo dicitur. Ideoq; etiam huius quae prouidet partis artis in altero genere constitutus est quod morbosum affectum iam praesentē summouet: in altero, quod eum qui nodum urget prohibet. Itaq; hic quoque iuniores medici de nominibus cōtendere se nō intelligunt. Par autē erat, si de rebus studiosi essent, illud inuenisse, diās esse functionum medici primas differentias: Aut enim eos qui nūc urgent affectus, ijs quae mo liuntur curant: aut eos qui non sunt, fieri prohibet. Ergo praesentes iam affectus tollere, siue amouendis ijs quae naturae opus impediūt, id fiat, siue

per medicamēta quid ipsi moliamur, omnes profecto homines curare dicunt; cauere autē ne accidant, prospicere. Et sanē ea quę succorū vitio sunt exulcerata, curatij qui ratione ac methodo artem administrat, simul illos purgantes, simul ea quę naturę motus impediūt, auferētes. Quorū utraq; qui exacte loquit, prophylactica vocat. Verant nāq; (ut in proximo ostēsum est lib.) omnia talia, aut fordem ulceri, aut humiditatē nimīa vitiosam uel innasci. Non est igit de nominib. anxie contendendum, sed methodus potius aliqua sanandorū ulcerum tradenda. qualem (arbitror) ipse tum in proximo libro, tum in hoc præcipio.

4. Ego nāq; uel stupiditatē Thessali demīror, ita de ulcerū quę cacoethē dicuntur, curatione scribentis: Sūt aut perq; necessaria, & cōmunitates ulcerum diuturnorū, ac non sanescentiū, aut post cicatricem inductam redeuntium, ad hoc ut in ijs quę non coalescunt quidē, æstimes quid sit quod prohibeat idq; tollatur. in ijs uero quę post cicatricem inductā renouant, ut cicatricē tenere cogas, ex priore statu transmutans scilicet (sic enim *περὶ τοῦ ὀξέος* uertimus) uel patientē particulā, uel etiā cōmūiter totū corpus: atq; ne facile patiar, id præparans per ea quę hæc faciant præsidia. Atq; hæc quidem Thessalus cum in principio statim libi de chirurgiā proposuisset, postea de ijs ipsis latius ad hunc modum scripsit: Diuturna ulcera & quę non sanescunt, aut quę ad cicatricem perducta denuo reuertuntur, hæc indicant. Quę quidem ad cicatricem nō perueniunt, ut quę coitionem fieri uetāt, auferas, ac lo cum affectum noues. Postquam simile recenti uulnere feceris, rursus ut cruentum sanes. Quod si non processerit: ut phlegmonem mitiges, & reliquam diligentiam adhibeas. Quæ uero ad cicatricem ueniunt, & rursus se aperiunt in accessionibus ueniunt, & exulcerationibus, ut simili modo cures ijs quę recens phlegmone urget, ex ijs quę mitigare solent capta lina inducens, idq; donec deferueat ira. ubi deserbuit, adiues ad cicatricem inducendam. post hæc ut partes circumpositas late complexus malagmate, quod ex sinapi sit compositum, rube refacias, aut alio quopiam quod mutare possit, acutius malo pateant efficere. Quod si ita nō cessent, etiā totius communiter corporis curam habere, ipsum per varias exercitationes, & gestationes, & uociferationes, adhibitis scilicet earum rerum peritis, ex priore statu transmutans: etiā uictus ratione gradatim tum aucta, tum diminuta, principio à uomitione per radículas facio. Vteris etiā albo ueratro, alijsq; omnibus quibus utimur in ijs qui diuturni ægrec summo morbi uictus rationi subiiciuntur. Atque hæc quidem est Thessali dictio. Operæpretium uero est estimare hominis uel stuporem, uel audaciam. utque si recte se dicere sibi persuasit, stuporem. sin conscius sibi nihil dicere, imponere omnibus legentibus sperat, audaciam. Ex diuturnis ulceribus quanam est, o generosissime Thessale, curationis indicatio: Ego sanē neq; ex his, neque ex

A recentibus, nec omnino à tempore in ullo morbo curationem unquam inueni, sed ex ipso quem sanandū mihi proposui affectu. Prorsus enim si tempus spectabitur, tanquā ab eo indicatio sumatur, alteram omnino secundus, alteram tertius dies indicationem dabit, ad eūdem modum, & quartus alteram à quinto, & ab his omnibus sextus, & à reliquis singuli qui post istos. Sic affectus quos curamus, non ultra nobis ad considerationē proponuntur, nec ab his indicatio sumetur: quo tamē ne cogitari quidem magis alienum à ratione potest. Quomodo ergo necessaria sunt diuturnorum ulcerū cōmunitates, ubi nihil indicare tēpus ipsum per se potest? Non enim profecto ubi à malis succis ulcus eroditur, diuersam ex eo post quatuor menses indicationē sumemus ab ea, quā statim ab initio sumpsimus. Ego sanē nec sinerem quidem eiusmodi ulcus diuturnū esse, sed protinus in principio causam eius adimerē. Nam & nosse affectū à principio plerumq; licet, & indicationem ab affectu sumi est necesse. Tēpus uero quid amplius q̄ dierum numerum docere nos possit, non hercle possum cōijcere: nisi id uoluit Thessalus, ad eiusmodi ulcera nocenda tempus omnino esse manendum. Verum sic primum idiota prorsus sit, si uidelicet fateatur nō prius agnoscere se affectum, quā uelcūs inueterauerit. Deinde illud quoq; aperte fateatur oportet, ex alio suggeri sanationis indicationem, ex alijs præberi affectus notitiam. Nam esto cōferat aliquid tempus ad agnitionem, certe indicatio curationis à tempore nō sumitur. Quid enim ad rem pertineat, si quod ulcus inueterauit, adimere quæ coitionē impediāt, & noua re locū qui affligitur? Nam si propter affluxionem malignā, quā cacoethē dicūt, uir inepte ulceris labra hoc uel illo modo sunt affecta: quid cōmodi erit, si ea excideris antequā fluxioni listendā confulueris? Videlicet ulcus latius efficiēs, ueluti nōnulli faciunt eorū qui similiter ut tu ulcera curant. Siquidē causā quæ ea & dura, & callosa, prius redidit, adhuc manente, nihil aliud ex his excidēdis accedet, q̄ ulceris amplificatio. Quippe illa ipsa quæ excideris, perinde et dura, et callosa, rursus erunt, atq; ea quæ prius. Quāq; ne id ipsum quidē adiecit prudēs scilicet Thessalus, callosa, & dura, & decolorata exulceratæ partis excidēda esse: sed absoluto sermone abscondi quæ coitionē morant, iubet ac nouari. Ac si quidem summouere causas quæ glutinationē morantur, uaderet, & uetus ea ratio esset, nec ipse eum accusarē. Præcipitur enim ab omnibus ferē antiquis medicis quicumq; ratio ne quadam, ac methodo de ulcerū curatione scripserunt, causas quæ illa creant, abscondendas esse, æque profecto ut cæterorum omnium morborum. Non enim (arbitror) in ulceribus manente adhuc causā quæ ea excitauit, hæc prius tolli expediat, in alijs morbis nō expeditis: omnino in omnibus in quibus effectrix causā adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est. Quod si, quæ coitionē impediunt, non dixit de omnibus causis, quæ eam impedire possunt, sed de labris tantum, ueluti ex

ijs quæ subijcit, ostendit: plus certe nescire, quam
 scire eorum quæ ad ulceris curationem spectant,
 uidetur. Quippe fieri aliquando potest, ut & hæc
 causa sola sit, quo minus sanescat ulcus, potest eti-
 am (ut dictum est) causa esse, & quæ citra tumo-
 rem præter naturam sit in exulceratis partibus in-
 temperies, & quæ cum tumore quidē aliquo con-
 iuncta sit, non tamen qui omnino sibi labra ex-
 cludi desideret, potest & varix superiacens, uel lienis
 auctio, uel in iocinore uitium aliquod, præterq;
 hæc omnia imbecillitas partis ægræ, quæ ipsa quo-
 que intensa quædam est imperies: quinetiam
 uitiosus in toto corpore succus, caco chymia uo-
 cant, maxima scilicet causarum, quæ in commoda
 re ulceribus possunt. Vexat sanē non minus ulce-
 ra, & succorum æqualiter se habentium exuperā-
 tia, quam plethoram uocant. Horum quodq; si ad-
 mihi Thessalus iubet, laudo hominem, ceu ueteri-
 bus subscribentem. sin labra tantum, unum nouit
 ex multis, sed quod nec opiliones lateat. Quippe
 si opilio ulceris labra dura, & callosa, & liuida, &
 nigra, & alio quopiam notabili coloris uitio uide-
 at, prorsus ea circumcidere non dubitabit. Est em̃
 circumcidere res promptissima: maius uero quip-
 piam, atq; artis egens, medicamentis sanare. Thes-
 salus autem nec quæ labra molliri medicamentis
 possunt, unquam nouit. quippe fatetur eum peni-
 tus hanc artis partem declinasse, ita utiq; ut ipse
 quoq; indicat, nec omnino experientiam rationa-
 lem uel scientiam de ullo medicamēto usus est ha-
 bere, quod ipsum quoque ex libro eius De medi-
 camentis ostenditur. Verum de ijs quæ sibi non re-
 cte ab eo sunt prodita, in progressu operis dice-
 mus. Nunc de diuturnorum ulcerum sanatione,
 quam in prius posita dictione tradidit, paramus
 disserere. Sanē melius fuerat non diuturna, sed ca-
 coethes ea uocasse, tum naturam eorum narrasse,
 & causas generatiōis eorum exposuisse, curatio-
 nemq; cuiusq; primum quidem communem om-
 nium, quatenus ulcera sunt: qualem in tertio lib.
 descripsi. deinde priuatam cuiusq; pro efficientis
 causæ specie: ueluti in hoc libro docui. Hic cum
 nihil horum fecerit, & nouandum locum censet,
 & ubi instar recentis uulneris fecerit, ut cruenta
 sanandum. Hoc sanē quis in operibus artis exer-
 citatus nō euidentissime intelligat ab eo esse scrip-
 tum qui nunquam ulcus curauit? Sanarēne ul-
 cus diuturnum, ut cruentum quisquam potest, ubi
 id simile recenti uulneri fecerit? Vtrum ne labris
 eius fibula adductis, an futura coniunctis, an po-
 tius horum nullo, sed medicamento quod cruen-
 tis sit aptum, & cum hoc sola deligatura fretus?
 Quis est qui non norit ulcus omne cacoethes sta-
 tim etiam cauum esse, utpote ex rosione natum?
 Nunquid igitur insulse Thessalæ fieri potest, ut
 coalescat cauum ulcus priusquam cauitas carne
 sit impleta? an non est hoc ut cruentum sanaret?
 Ergo ipse tu frustra cauorum ulcerum curando-
 rum indicationem nō esse glutinationem, sed im-
 pletionem scripsisti. Quod si etiam non esset ex se
 cauum omne ulcus contumax, certe dum (ut tu

A præcipis) excisis uidelicet labris, ut cruentum effi-
 citur, ex necessitate cauum sit, maximamq; con-
 quirir laborum distantiam: adeo ut non uideam
 quomodo id glutines, & coire ut cruentum faci-
 as. Nam si adducere uolenter labra, quæ plurimū
 distant, tentabis, phlegmonem necessario accer-
 sent, nec coalescent. id quod tantum intelligere
 mihi Thessalus uidetur. Subdit enim: Si non fue-
 rint uicta, ut phlegmonem mitiges. Satis uero
 fuerat scribere: Cum non uincuntur, ut phlegmo-
 nem mitiges: Nā necesse est nō esse uincenda. Ve-
 rum ut hoc quoq; Thessalo donetur, atq; id trans-
 amus, nec ualde anxie examinemus: illud cuius
 apertum est, quod à communitate, quam ipsemet
 tradidit, prorsus recessit. Quippe si quod obstat
 auferemus, nihil amplius de communitate diutur-
 norum ulcerū, qua diuturna sunt, sumemus. Si ad-
 detur hoc quoq; uideamus quæ sequuntur. Scri-
 bit enim ad hunc modum: Quæ ad cicatricem ue-
 niunt, & rursus se aperiunt, hæc in accessione &
 ulceratione similiter curabis ijs quæ recentur ue-
 xata phlegmōe sunt. Post hæc subdit: Malagma-
 te quod ex sinapis femine sit, circumpositis parti-
 bus ruborē excitandum. Quid ais insane, etiam si
 acre & calidū sit quod influit, rubrescenti particulā
 ex sinapis femine oportet: ut quod in multo tēpo-
 re cōtrahere ex fluxione debebat, id statim ex tuo
 medicamēto obtineat, tota uidelicet ulcerata, at-
 que erosa? Nam ueteres eas partiū imbecillitates,
 quæ uel ex frigore, uel plurimo humore citra ma-
 nifestum calorē acciderāt, rubefaciendo curabāt.
 Tu rubefactione in omnibus deinceps ueteris,
 primum nullo facto discrimine, propter partem
 imbecillitatem, an propter fluxionis malitiam nō
 sanetur ulcus. Deinde ordinē inuertis. Nam cum
 sinapi particulam uulseris, nec quicquam profeceris,
 tum ad corporis totius curationē accedis, cum
 cōtra (ut arbitror) tum ratione, tū experimēto de
 ijs sit statutū, ut toto prius corpore à superuacuis
 liberato, tum calidū aliquod acreq; medicamentū
 parti admo uere sit audendum. Quippe eiusmodi
 medicamenta omnia cucurbitarū ritu ad se trahe-
 re à toto corpore sunt habilia. Itaq; nisi id prius ua-
 cuaueris, materiam fluxionis acri medicamento
 relinques. Hoc enim tum Empirici medicifaren-
 tur, tū Dogmatici. hoc philosophorū optimi fen-
 serunt. Nam cum eorum quoq; meminerit Thes-
 salus, non alienum sit eos citare testes. Quod ocu-
 lum recte sanare ante totum caput non licet, neq;
 hoc ante totū corpus sic Aristoteles ac Plato, De
 morborum curatione senserūt, sanē & Hippocra-
 tes, & Diocles, & Praxagoras, & Plifstonicus,
 & ueteres uniuerſi. Thessalus uero solus non sic,
 sed primum ad medicamētū ex sinapi uenit, post
 de toto corpore sollicitus est, ne hic quidem pru-
 denter quicquā docens. Nam cum liceat corpore
 medicamento quod purget semel uacuato, mox
 salubri uictu ipsum reficere, hic uociferationū me-
 minit, exercitationūq; & gestationū, & uictus cer-
 to ambitu mutati, tū uomitionis ex radícula, mox
 summā his imponit, ipsum ueratrū. Idem scilicet
 qui sine

qui sine ullo magno negotio omnia sanare promi-
sit. Ego uero ne intelligere quidē possum quomo-
do quisquā aut deterius, aut maiore tēporis dispē-
dio, aut inani magis opera ulcus sanauerit. Age igitur
sicut usu nōnunquā uidimus, sic uerbis quoq;
hominem fingamus, cui sanari ulcus cōtumax sit
opus. Esto aliquis qui cetera quidem sit sanus, sed
ex scabenda de repente quāpiam particula ueluti
brachio, pustulam statim excitari, mox eadem ip-
sa particula iterum atque iterum pruritu uexetur,
pustulaq; dirupta ulcus decolor in aqualiter ero-
sum gignatur, atque hæc in tribus quatuorue die-
bus à principio inciderint. Dicat mihi hoc loco
quispiam ex medicis, qui Thessalum imitantur,
quānam pacto sanare eiusmodi ulcus conueniat.
Ego nāq; cacoethes omnino id dico, & ob id qua-
lis sit totius corporis affectus, statim considerabo.
Inueniam namq; tum ex ulceris ipsius symptoma-
tis, tum ex notis quas totū corpus præ se feret, cu-
ius maxime generis sit is qui redundat succus. At-
que hunc medicamentō protinus educam, nec pro-
traham dum totus hominis cubitus affectū quen-
dam contumacem rebellemq; curationi cōtrahat.
At Thessali sectatores ipsius uidelicet præcepta
seruant, primum expectabunt dum ulcus inue-
teratum sit, quō in mirificam illam inueteratorum
ulcerū cōmunitatem recidat. quasi non longe me-
lius esset contumaciū ulcerum, nō autem inuete-
ratorum cōmunitatem, quæ curationē indicaret,
tradere. Mox duorum alterū, aut excurrent, & ceu
recens uulnus reddent, ac ueluti ad glutinandum
partes eius adducent. aut primum quod ex sinapi
conficitur medicamentum utentur. Quo non profici-
ente, ad sublatas uoces, & gestationes, & reliquis
exercitationibus, & uictum per circuitus mutandū
confugient, ab ijs uomitionem ex radícula moue-
bunt. Quod si his ulcus non sanabitur, ueratrū da-
bunt. Sin nec id profecerit, hominē in Libyam ab
legabunt. Nā id quoq; adijcere debuit Thessalus,
post eximia illam cōtumacium ulcerū curationē.
Quippe in uociferatiōibus, gestationibus, & alijs
eiusmodi immoratur: quasi malum habitum cor-
poris (quam κακὴσίαν Græci uocant) non uitium
humorū (quam βλαχὺμίαν dicunt) curēt. Et quid
miri si tum facietur se ulcus cacoethes statim ut est
natum non nosse, tum uero dum sit inueteratum,
ac sæpe cicatricē ducat, sæpe se aperiat, expectāt,
quo uidelicet quid facto opus sit intelligant: ubi
etiam eos qui quoquo modo febricitent, accessio-
nem quæ tertio die futura nō futura ue est, transire
oportere censent? Adeo uidelicet ad unguem cō-
templationē de crisi permouerūt, aut summū mor-
bi incrementū futurum prospicere possunt. Quid
igitur sæpe accidit? Nēpe tabescere in lectulis ho-
rum culpa homines, qui statim secundo die expli-
cari potuissent. Quippe nō semel nos, aut bis tē-
ue, sed sexcentis tū ipsi multos febricitates simul
ut prima accessio desit, lauimus: tū præceptores
nostros id ipsum facere uidimus, intrepideq; de ce-
tero uictitare permisimus, ceu post febrī caritu-
ros, quos sapiens scilicet Thessalus, qui primā dia-

Galen.

triton, id est tridui inedia excogitauit, prorsus are-
fecisset, totis (puto) tribus diebus fame cōfectos:
mox dein (arbitror) modice scilicet in quarto die
nutriuisset: ab hoc paulatim reficiēs, uix sexto aut
septimo ad cōsuetam munia qui semel febricitassēt,
dimississet. Adeo semper homines in morbis tabe-
faciunt, à quibus utiq; facile possent liberari. Nam
cum paucissimis diebus sanari ulcus cōtumax in-
cipiens posset, Thessalus id in annum, aut etiā lon-
gius tempus incurrere sinat. Manere namq; dum
id cicatricem sæpe inducat, sæpe etiam se resoluat,
ut scias an contumax sit, mox ubi curationem in-
ceperis, ne tunc quidem corpus statim purgare,
sed primum medicamētō ex sinapi, dein gestatio-
ne, & uociferatione, & certo uictu, post radícula,
ab his uerato uti, hæc quid aliud quam annum ex-
pectantis sunt? An per deum immortalē cum sex
diebus, aut plurimū septem posset homo curari:
multos menses trahemus, quō uidelicet primū an
cacoethes ulcus sit sciamus, dein curationem in-
choabimus? Et quæ demum necessitas erat pro-
priam inueteratorū ulcerum cōmunitatē tradē-
di, præsertim cum nihil ad curationem cōducat: li-
cueritq; nō inueteratorum, sed cōtumacium, nec
horum me hercle cōmunitatem indicatricem, sed
curationem scribere? Quippe accidit quibusdam
tum ulceribus tum morbis, ut contumaces rebel-
lesq; ad curandū sint: nec tamē inde curationis in-
dicatio sumitur, sed affectus ipse primā curationis
indicationē suggerit. Ex ea uero & quæ sunt agen-
da inueniuntur, ad eum modum quem ipse tradidi.
Quare hoc est methodo curare: qđ nos facimus,
ueteres imitantes, si modo methodū esse oportet
unam quandā uniuersalem uiam, quæ omnium par-
ticularium sit cōmunis. Hic uero etiam in hoc falli-
tur, putatq; quicquid omnino in ijs habetur, qui
methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse.
Nam notitiā certe habeat oportet tū similis tum
dissimilis, qui methodo quiduis molitur. nō tamē
ipsum hoc methodus est, similis scilicet dissimi-
lisq; notitiā. neque hoc Aristoteles Plato ue affir-
mat, quos falsō Thessalus citare audeat. Verū hæc
ad præsens refellere non attinet. Quare rursus ad
medendi methodū reuertor, promittoq; ostensu-
rum me tum unum esse eius in omnibus curatio-
nibus principium tum uiam quæ ab eo principio ad
finem usq; ducit, in omnibus particularibus simi-
lem esse. Quare etsi in singulis morbis priuata quæ-
dam methodus sanandi uidetur, cōmune tamen in
omnibus genus unū est. Auspicari nāq; perpetuo
oportet ab indicatione quæ ab affectu, cui mēderi
paramus, accipitur. æstimare uero ac discernere
an causa quæ affectum excitauit, iam desierit. an
nunc quoq; ipsum tum augeat, tum faciat. Dein,
si desit, ad eā quæ in tertio huius operis libro tra-
ditur, methodum est ueniendum. sin adhuc facit,
ad eam quæ hic docetur. Quippe eadē hac metho-
do tum phlegmones, tum febris, tum omnium uno
uerbo morborum remedia inuenias: utiq; si nihil
etiānum sit, de præcedentibus causis non labo-
rans, sed ab ipso tantum affectu oriens. sin nunc

tom. 6

e

quoq;

quoque aliquid sit, duos tibi curationis fines proponens, tum alia deinceps, ut dictum est, facies. Sed enim mirari stupiditatem eorum, qui Theſſalū sequuntur, est operæ precium: non utique quod in talibus delinquit, sed quod dyspathias, & metasyncrises, & imbecillitates, & firmitudines, & alia id genus nomina non pauca proferentes, quæ per ea significentur, ne nunc quidem, si interrogas, respondere possunt. Nam quid sit quod in omnibus diuturnis uerbis. Græce dicunt μετασυνκρίνειν τὸν ἔψιν, nec similiter inter se oēs, nec clare, nec prudenter respondent. Atqui si uel antiquum nomen esset, uel ab ullo Græcorum usurpatum, ex ijs fortassis quæ illi scriberet, intelligi posset de quo id negotio dicerent. Nunc quoniam stupiditatis ipsorum proprium est, utique ex Asclepiadis hypothesei natum, sicut & reliqua eorum placita, æquum profecto est ipsi sua somnia interpretentur: unde scilicet quod Græce dicitur συνκρίνειν, τὸ τὸ πάμαρτα ὡς διακρίνειν, quasi miseri fecerimque corpora dicas, solis ijs qui corpuscula, & meatus, aut indiuidua, & vacuum, aut denique imcompatibilia, & inalterabilia, prima elementa statuunt, liceat usurpare, sicut certe usurpat, & assidue ipsi nominibus utuntur. Quinetiam ipse Theſſalus in canone, cum hæc principia confirmat, nouat quidem aliquid ibi quoque præterea quæ à Themisone & Asclepiade sunt posita; cæterum quod sentit, docet sane non obscure. Non enim prorsus sicut Asclepiades cum in symmetria quadam, id est competentia exiguorum meatuum sanitatem, in ametria, id est, inconuenientia morbum constitueret, reditum ad pristinam meatuum symmetriam sanationem putauit: ita Theſſalus quoque est arbitratus, sed totum exiguorum meatuum statum censet immutandum. Atque ex hac opinione processit metasyncriseos nomen, idem planè indicans potestate, quod Græce μεταποροποιήσεως, id est, exiguorum meatuum ita tus mutatio. Cæterum non decebat ipsum in quibus fugere ab incertis obscurisque iubet, & tantum ijs cõmunitatibus quæ euidenter apparerent, animum intendere, in ijs quoque Dogmaticorum uti nominibus. At noli (inquiunt sectatores eius) cum his utitur, dogmatice eum audire, sed ἀφελῶς, id est, simpliciter. Nam ita ferre suppetias ex sectatoribus eius quidam solent, uidelicet ad aliud rursus nomen nos reuocantes. nempe ἀφελᾶν, quam nos simplicitatem uertimus. quam ne ipsam quidem quid significet, ipse sanè intelligere possum. Si enim sicut ipsi hoc quoque rursus exponunt, ad aliud scilicet magis friuolum nomen nos remittentes, nempe Græce βιωτικῶς, quod ipsum rursus exponentes significari per id dicunt, idem quod uulgo hominum similiter, utique tantum de fuerit ἀφελῶς ei quod non definite, nec exacte, sed line omni tute arte, tum scientia, siquidem loquuntur homines qui magis sunt ad loquendum præcipites, artium nomina sub sensibus quibuscumque qui nullo fundamento nitantur: rogati uero quid significet, ostendere clare non possunt. Quod si hoc Theſſalij isti accidere sibi fatentur, loqui se quæpiam, nec intelligere se exacte quæ loquantur, id ipsum profecto fatentur, quod nos

illis obijcimus. Nam metasyncrises illa, siquidem de immutanda poropœia, id est exiguorum meatuum statu dicatur, certe intellectus aliquid habuerit, si gnificaueritque rem aliquam, cæterum friuola multis modis. nam nec ex corpusculis & meatibus corpora nostra constāt. nec si hoc uerum esset, posset tamē aliquis docere quæ ratione sinapi meatuum illorum statum immutaret. nec si id quoque ostēdere aliquis posset, consentiens eorum sectæ esset, qui se apparentibus cõmunitatibus cõtentos esse dicunt. Ne igitur utantur hoc nomine, nec nobis negocia faceant. Licet enim & sine metasyncriseos nomine, diuturnorum ulcerum curationē alijs uerbis dicere, sicut Empirici faciunt. Quod autem & in ἀτορίας, id est imbecillitatis uocabulo similis modo nugentur, monstratum prius est in secundo libro. Si enim sicut Empirici nomen usurpant; aliud prorsus nō significant, quam quod actio non feruatur. Sin autem facultates aliquas gubernare animal proponunt, quales tum nos asserimus, tum omnes ferè ueteres: præter id quod Asclepiadis dogmatis contradicunt, etiā incerta, & de quibus parum inter auctores conueniat, attingunt, quauis ea fuge re iubeant. Sed dici nobis Theſſale clare, quid sibi uelit illud μετασυνκρίνειν? Si namque exigui meatus mutare: & falleris, & quæ incerta sunt usurpas. Si firmari sanamque reddi corporis particulam, uel hominem totum: nihil hic præter nomen plus quam Empirici docet. Quippe sciunt hi quoque remedijs quibusdam ad motus reddi hominem sanum: cæterum qua ratione remedia id faciant, utique nesciunt. Neque enim an exiguos meatus mutet medicamentum facultas, neque an symmetriam efficiat, neque an totam patientis particulam qualitatem alteret, potest Empiricorum quispiam dicere. Atque illi saltem sunt modesti: ut qui unum se solum scire dicant, huic scilicet morbo in hoc tempore si medicamentum ex sinapi adhibeatur, sæpe notasse se utilitatem secutam. Non tamen methodos loquuntur, nec supercilium attollunt, nec tali sibi notitia placent, nec antiquis maledicunt, nec Hippocratem pro nihilo habent: imò uero ipsum laudant, fereque omnia uere dixisse affirmant. Hic uero Theſſalus qui tui hūc, tum reliquos omnes medicos contemnit, Empirica contumacis uulceris præcepta se scribere non intelligit: quanquam si uel hoc cõmode faceret, utique aliud quod operæ precium faceret. Atqui ne id quidem se cisse uidetur, cum ordinem remedium inuertat, & prius partis remedijs utatur, quod totum corpus præparauerit. Nam hoc insignis incitæ argumentum est, cum in uno eo ferè omnibus medicis conueniat, quauis in plurimis dissentiant, quod totum corpus uacuum purumque ab excrementis ante sit reddendum, quæ ulla pars ualētibus remedijs sit subijcienda. Nam siue experientia iudicare quis uelit, siue etiam ratione tertium enim quo iudicet, neque in alia quapiam arte, neque in ulla uitæ parte quisquam habet) maximum esse in cõmodum deprehendit: cum, toto corpore suam curam requirentem, priusquam illi sit prospectum, afflicte parti acre aliquod & calidum medicamentum sit admotum. Trahit enim ad se cu-

cubitę more, ex toto corpore superna cūa: atq; ita in graui parte affligit, ut aęre auelli possint. Quo magis operae precium est Thessalos istos percontari, unde nam Thessalo in mentē uenerit de contumacium ulcerū curatione talia nugari, cum nec Empiricus quīquam ante, nec Rationalis ita scripserit: sed nec ipse Thessalus, nec eius sequacium quīquam eiusmodi remedium ordinē aut cum experientia consentire, aut cum ratione, affirmare ausit. Adde q; nec docere possunt quomodo tempus indicet, non aut affectus. Sed neq; (quod hoc maius est) quomodo Thessalus, quāz est mandum ceter quid sit quod cicatricem ulcerum moretur, atq; id tollendum, non prorsus sit stupidus: simul cum hoc tantum satis esse non uideat, diuturnitatem aut ulcerum nihil esse ad rem: simul cum non in ulceribus modo, uerum etiā reliquis morbis omnibus id esse faciendū, ueluti ueteres monēt, nō aduertit. Verū ad hęc nobis nihil respondent: sed semper nō recte intelligere nos dicētes, tanq; uidelicet ipsi uel Hippocratis uel ueterū cuiusquā sententiā ad unguem intelligerent, rectē Thessalum dixisse affirmāt diuturnior um ulcerum unam quandam cōmunitatem esse. Ita enim Hippocratem quoq; sensisse in libro De ulceribus, cum ita scribat: Etiam ab inueteratis ulceribus id agere ut sanguis crebro effluat, conducit, quomodo uocunq; uideatur opportunū esse. Fortassis ergo ad rem pertineat, tamen si non prādixerim me de Hippocratis mente hoc loco differturum, uel summam aliquid de ea perstringere. fuerit uero qd dicemus, non minus q; priscorū sensus interpretatio. Hos namq; uiros, ceu nullius adhuc dogmatum sectae addictos, sed pura & simplici mente studentes utile quippiā ad sanitatē inuenire, credibile sanē est quaedam usu, quaedam inuenisse ratione: tum scripsisse quae inuenerant, subinde nō adhibita inuentionis suae ratione, aliquādo uero & adhibita: atq; id fecisse ipsius legentium utilitatis causa. Quippe ubi ad dextrū inuentorum usum conducturū poteris sperabant, si rationē inuentionis nouissent, tum eam diligenter prodiderunt ubi secus, & supernuacuum relatu putauerunt, & propterea omiserunt. Nam quod sermonis cōpendium prisci in primis coluerunt, id omnes uel me tacēte iam norunt. atq; ob hanc maxime causam nō Hippocrates modo, uerum etiā reliqui priscorū medio interitū trāsgressi, primo tertium adnectunt. Si enim primum secundū sit signum, atq; hoc tertium ex necessitate sequitur: ita tertium primo subiūciunt, secundum prae reuertes. Ostēdi uero per se tunc per reliquos antiquos, tum uero maxime omnium Hippocrate talia scripsisse. debetq; qui callere priscorum interpretandi genus uolet, in illis exercitari.

Nunc uero ipsum quod propositū est, tantum exponam. Nam quae uocata, omnibus rite decenterq; factis, tamē non sanantur: ea medici Graeci *λεονόες*, nos maligna, contumacia, rebellāue dicimus. Diuturna autē prorsus fiunt, cum dūtaxat, ut ulcera sunt, curantur. Quae uero sit ulcerum ut ulcera fiunt curatio, in libro quī hūc praecedit, de

Galen.

finitum est. Haec igitur ulcera & cacoethe, & inueterata & diuturna uocant, in differenter his nominibus in ipsis uentes. Quinetiā ad noscendum q; affectus ipse *λεονόες*, id est cōtumax ad sanādum sit, unā cum alijs notis, etiam id q; per actis etiam quae decēt omnibus, diuturna fiant, aliquā portio nō habet. non tamē aut ipsa diuturnitas, aut q; diuturna & uocetur & sint, idoneam curationē indicat: sed ex hoc q; male affecta sit ulcerata pars, licet colligere. hoc uero inuēto, & curationis ratio constabit. Quo, inquires, modo? Nēpe ubi tantum ea partes quibus ulcus insidet, ita sunt affectae, si has sanaueris. ubi totum corpus uitiosū aliquo succo abundat, si hunc uacuaueris. Ac signum quidē uitiosi succi est ipsa ulceris diuturnitas. inuētio autem eius quod expedit, nō ex diuturnitate, sed ex succi uitio suggeritur. Quare tria haec deinceps se habēt, signum, affectus, & curatio. Signum quidē ipsa diuturnitas. Affectus succi uitii. Curatio eius uacuatio. Atq; hac ratione subinde ueteres inuenias medio praetermissō tertium statim primo subiungere: ueluti Hippocrates fecit cum dixit. Tum ab inueteratis ulceribus confert, ut assidue sanguinē effluere facias, utcumq; id opportunū uidebitur. Nō utiq; curationē indicāte uetustate, sed sanguinis uitio. Quippe ipse mox subiūcit: prohibet nāq; maxime quidē eiusmodi ulcera sanescere. Post uero etiam reliqua omnia, putredo sanguinis, & si quid ex sanguinis trāsmutatione est ortum. Quinetiam post paulo cum de ulceribus quae ad cicatricē non ueniunt, differit. Nec si (inquit) quae ulcus ambiunt, nigricēt, sanguine putri, aut etiam uatice fluxionē suppeditante, id genus ulcera coire possunt, nisi quae ulcus ambiunt, sana reddas. Post etiā de uariūm sanatione scribit. Ad hęc etiam purgationis meminit totius corporis, tū in alijs quibusdam uulneribus, tum ijs quibus carīe, quam sphaelon uocant, instare est metus. Praeterea herpetibus, & esthiomenis omnibus, id est quae exedunt. Ita enim graece nominare solet ea quae humori aliquid erodit. Iam uero in ijs quae mox sequuntur, rursus ad hūc modum subiūgit: In quocunq; ulcere erysipelas superuenerit, purgatio totius corporis adhibēda est. Et in summa, si curiosē librum De ulceribus reuoluas, inuenies semper eum ab affectu indicationē sumere. uti uero interim & tempore, sed ad affectum noscendum. Quod uero hęc ita se habeant, ex ipso libri ingressu agnoscas, quae talis est: Ulcera madefacere, quaecunq; ea fuerint, nisi uino non oportet. Tum causam adiūciēs, ait: Nam siccum sano uicinus est: humidum uero nō sano. Et mox: Vlcus enim humidum est: sanum autem siccum. Ideoq; per totum librum cum totius ulcerum curationis scopi siccationē statuatur, mox particularia inuenit, etiā scopi ipsius subinde nos cōmonefaciens. Cum enim ita scribit: Quodcumque ulcus acuto telo casim percussim uel diuisum est, medicamentum quod cruentis statim imponitur *ῥῶαυος* Graeci uocant, ac siccans & quod suppurare uetet, admittit. Fit enim effluēte sanguine siccus: Et rursus: Quaecunq; probe & opportune

tom. 6

c 2

pur

purgata, semper ad siccus promouentur, [ihs caro magna ex parte non supercrescit,] nisi si confusa sint. Et rursus: Si quod coire nequit, humecta caro in causa est. In his omnibus primi sanandorum ulcerum scopi nos admonet. Siquidem ulceris quæ ulcus est sanatio, mediocris siccatio est. Cuius rei demonstratio in libro qui hunc præcedit, tradita est. Verum ulceris quod cum alio affectu cõiunctum est, cuius uidelicet præcedere curationem oportet, eius curatio ut ulceris solius non est, sed prior illius affectus, secunda ulceris. Nam siue phlegmone quæpiam, siue nigritia, siue ecchymosis, siue erysipelas, siue oedema, ulceratam carnem obfedit, primus eius molienda curatio est. At uero quod ulcus interim non solum non commode curatur, sed multo etiam maius redditur, id neminem lateat. Nam siue confusa fuerint circumposita ulceri loca, seu phlegmone, alius uel tumor in his cõstitit; propria eius affectus sanatio inuenienda nobis est; illud pro certo habentibus, fieri nõ posse ut ulcus sanetur, nisi locus in quo consistit, prius sit sanatus. Ac proinde Hippocrates ipse redigens nobis in memoriam ea quæ statim in libri initio traderat, tum quæ reliqua paulo ante sunt comprehensa, tum uero hæc adscripsit: Quodcumq; ulcus casum percussimue acuto telo est diuisum, medicamentum enæmon, & siccans, & quod suppurare uetet admittit. Sin caro aliqua telo tum confusa, tum cæsa sit, huic ita medendum est, ut quamcelesterrime suppuret. nam & minus phlegmone urgetur, & necesse est carnes quæ cõtusa celsæq; sint, putrefactas & in pus uersas liquari, postea nouam carnem nasci. Indicat enim hoc sermone manifeste solos eos ulceratarum partium affectus nõ esse siccandos, in quibus gigni quàm celerrime pus cupimus: utiq; q; cum aliqua putrescẽtia pus fiat, obiter docens. Porro omnia quæ putrescunt, ex calido & humido sic afficiuntur. Ideoq; etiam ea cataplasmata, quæ ex hordei farina componuntur, seu quæ calefaciant humectentq; omnibus ihs affectibus quib; moueri pus expedit, admoemus. Hordei namq; farina ex aqua & oleo, itemq; panis ex aqua & oleo, præterea fomentum multæ calidæ aquæ, & tetrapharmaci compositio, omnia deniq; quæ calefaciunt & humectant, celerrime pus mouent. Ideoq; etiam ihs partibus quæ phlegmone infestantur, ubi uehemẽtis iam pulsant, sic ut iam desperetur de horum citra pus curatione, ueteres omnes eiusmodi applicat medicamentata; ante uero nequaquam. Atque hoc Hippocrates ipse aperte nos docet in memoratis iã uerbis, quibus iubet quæ sine contusione uulneratæ partes sunt, quammaxime siccare, quæ cum confusione quadam sunt læsæ, ihs quamprimum pus mouere. Quinetiam cum dixit: Quæcumq; ulcera non probe & ut conuenit expurgata, semper prius pululare incipiunt, ihs maxime caro supercrescit. que uero probe & ut decet, expurgata, semper ad siccus promouetur, ihs, nisi sint confusa, caro ut plurimum non supercrescit. Quippe hic illud nisi sint cõtusa, quod adiicitur, redigit nobis in memoriã,

A quod in superius proditis uerbis est, est dictum. nepe oportere omnia siccari præter ea quæ confusa sunt. Neq; enim sicubi cataplasmate quod calfaciat humectetq; illinuntur quæ phlegmone infestantur, ex prima ratione id sit, hoc est ut remediũ affectus, sed ut symptomatis mitigatio. siquidẽ ipsius phlegmones remedia sicciorum sunt uirium. Audinamq; loquentem Hippocratem: Cataplasmata oedematum, & phlegmones quæ in circa postis consistit, uerbascum coctum & folia trifolij cruda & epipetri folia cocta & polium. Quippe omnia hæc siccandi uim habent: ueluti in cõmentarijs. De simplicibus medicamentis docuimus. Et compendiarie obfessarum phlegmone partium curatio per id genus præsidia obitur, quæ sanè uel affectum profus summovent: uel si quid exiguum quod suppet, reliquerint: alterum medicamentum accre, quod educere pus queat, requiritur: uel si tenuis circumposita cutis sit, ueliscq; celerrime explicatum agrum, sectio petenda est. cæterũ curatio phlegmones per hordei farinam dolorem lenire studentis est, non medentis, & contra malum pugnantis. Verum de talium differentia in sequentibus plenius docetur. Illa porro mihi demonstrata manifeste puto, Hippocratem tum ulcera quæq; siccanda esse iussisse, tum hanc esse curationis finem sanxisse, ipso scilicet affectu indicationẽ præbete, non tempore. Quod si quis hoc magis etiam mihi persuasum cupit, librum eius De ulceribus totum diligẽtius euoluat. Intelliget enim illud ipsum per spicue, tum unam esse ulcerum omnium generalem curationem, nempe quam nos proximo libro docuimus: tum uero nõ minus illud, nullã esse à tempore nec in ulceribus, nec in phlegmone, nec deniq; in alio quopiã affectu indicationẽ. Quoniam uero in hunc sermonis locũ peruenimus, æquum est ostendere non modo horũ quæ iam retulimus fuisse inuentorẽ Hippocratem, sed etiam reliquorum omnium quæcumq; hunc scire quæ cõmode ulcus sit sanaturus, est opus. Videtur enim is non solum ulcerum quæ citra alium affectum cõsistunt, sanandorum rationem inuenisse, ut quæ in siccando consistat: sed etiã priuatim per species affectuum cuiusq;. Nam aut uitosus succus ad partem cuius inleat, amplius non fluit, aut etiam fluit ac si non amplius fluit, ipsi tantũ quod laborat, succurrendum est, si quidẽ, uel liuidum, uel nigrum, uel rubrum conspiciat, scarificando, ac sanguinem mittendo. mox (ut ipsius uerbis utar) spongia statim sicciorẽ magis quàm humidiorẽ superimponendo. neq; enim, arbitror, ignorabit quispiã particulam illam, q;, negationis hoc loco uim habere, tanquam ita diceret, sicciorẽ, ac humidiorẽ. post hæc uero etiam siccantia remedia applicado, ab his, si res postulet, rursus sanguinem auferẽdo, ac mox iterum talia peragẽdo, donec parta omniõ sanitas sit. q; si labra ulceris dura callosaq; appareant, etiam ea excidendo. Et enim de his quæque ita ait: Circularia ulcerum, si subcausa sint, circulo præcidere quæ disparata sunt, oportet, uel omnia, uel ex dimidio circuli secundum hominis longitu-

dinem. Scripsit uero & de tumoribus, qui conſun-
ſci cum ulcere ſunt, uniuerſis, quemadmodum cur-
rādi ſinguli ſint, ſimili modo & de uariis. quan-
do horum quoque occaſione cōtumax ad ſanandū
ulcus redditur, quoniā aliqua ex his humiditas ad
exulceratas partes deſluit. Ad eundē modum &
cum ex toto corpore humor conſluit, totū purga-
re iubet, nuſquam uidelicet in his indicationem a
tempore ſumēs. Nam & ridiculum planē ſit adeo
multas ac uarias ſape etiam contrarias indicatio-
nes ab una cōmunitate fieri. Nam ſi etiam demus
indicationem aliquam a tempore ſumī: quā tan-
dem ea ſit dicere par eſt, ac ſumma quapiam una
eam cōplecti: ueluti in reliquis omnib. ipſe quoque
Theſſalus facit, nedum nos. Quippe unum illi per
petuo indicat adſtricti corporis affectus. nempe
ut remittatur ac relaxetur. unum rursus ſoluti, uti-
que ut astringatur. Quinetiam in ipſis ulceribus
quod ſordidum eſt, abſtergeri poſtulat. quod ca-
uum eſt, impleri. quod equabile eſt, cicatrice indu-
ci. cui caro ſupercreuit, hanc ſibi detrahi. etiam eo
ipſo autore. Ergo ſicut in horū ſingulis, ita in diu-
turnis quoque alterum aliquid ad portionem oſten-
dat quod unum ſit. uerum non poteſt. Nam & ex-
cidenda ea praeſcipit. At quānā, quāſo, ſit iſta ra-
tionabilis a tempore indicatio, tum remedio ex
ſinapi uti, de quo unum illud nomen metaſyncrī-
ſeos uſurpat. ab hoc ex radícula uomitu. & poſtre-
mo, cum nihil ultra inueniat, ueratro. Verum hec
quidem (quemadmodum dixi) etiam in ſequenti-
bus plenius dicetur, ubi nihil uſquam ullo in mor-
bo a tempore indicari, ſed ſignum id nōnunquam
affectus eſſe docebimus.

6 Verum rursus ad Hippocratem reuortor.
Quem ſanē diligentiae nomine admiror, cum in a-
lijs omnibus, tum uero quod ſcopum, qui medico
ad indicationem nō in uno altero ſed, proſuſus
omni morbo ſit ſpectandus, non omiſerit. Eſt por-
ro ſi qui ab affectus magnitudine ſumitur, quem
non modo Methodici praeſermiſerūt, (non enim
eſt id mirum) ſed etiam Rationaliſt plurimi, atque
etiam Empirici (quanquam alio modo) oēs. Nam
ubi in redundātis ſanguinis (ut illi loquuntur) cō-
curſu, uacuationem a ſe obſeruata dicunt: ma-
niſeſte fatentur ob nullius alterius eorū quā in a-
gro uſuſtur reſpectum, ſe ad uacuationē accede-
re. Neque hoc dico propterea quod etiam purgatio
uacuatō ſit, quam redundantis ſanguinis concur-
ſus nō indicet, ſed quod etiam tameſſi redundan-
tis ſanguinis concuſſus non adſit, ad ipſam tamen
ſanguinis miſſionē interdum ſit conſugiendum:
quando ſi ualens morbus ſit cum uirum robore,
nemo eſt qui ſanguinē non mittat, qui utique in ar-
tis operibus ſit exercitatus. Quippe ipſos Empiri-
cos uidemus cum lapſus ab alto quis ſit, aut aliās
plagas aliqua contuſas uehementer corporis par-
tes habuerit, ad ſanguinis miſſionem conſugere,
quantū idem homo paulo ante ſanus fuerat, pror-
uſusque redundantie ſanguinis expers. Ex quo patet
nō hoc eſſe quod mittendū ſanguinē indicet, ſed ma-
gnitudinem morbi, ac uirum robur, exceptis ta-

Galen.

A menā ſermone pueris. nam & alia ratione ſi quis
etiānum ſanus, nec adhuc quicquā læſus in ſanguī-
nis redundātis concuſſus ſit poſitus, nō ſtatim huic
mitti ſanguinem eſt neceſſe: imō alij ſatisfacitine-
dia, alij cibi parcitas, alij ſoluta aluus, uel purgatio,
uel frequentius balneum, alij ſola exercitatio, uel
multa frictio abunde fuit. Miſſio uero ſanguinis ne
ab ipſis quidem Empiricis, iſs qui ita ſe habent, ne-
ceſſario adhibetur. Ad eundē modū nec purgatio
in ſola uitioli ſucci abundantia cōuenienter luſci-
pitur, ſed ſicut miſſio ſanguinis uel propter ipſius
abundantiā, uel propter morbi magnitudinē: ita
purgatio & propter abundantiā alterius cuiuſque
ſucci, & propter uim morbi adhibetur. Ac de ſan-
guinis miſſione tum in alio libro egimus, tum ue-
ro in ſequentibus agemus. De purgatione in hoc
libro diſſeram. Deſiderant enim ægri hanc nō mo-
do, ut quod noxiū ſuperuacutū quo uigentur, edū-
cat: ſed etiā ut quod tum ad diuerſum trahat, tum
uacuet. Atque ob eam rem Hippocrates tum in reli-
quis omnibus operibus, tum in eo quod De ulceri-
bus prodidit, etiā morbi magnitudinē ad purga-
tionis indicationē conſiderat. Purgatio, inquit,
per aluum plurimis ulcerū prodeſt. praeſertim uul-
neribus quā in capite ſunt accepta. itē quā in uen-
tre & articulis. ad hæc iſs in quibus oſſi caries im-
pendet. Præſertim quā ſumitur, & quā exeduntur,
& herpetibus, & reliquis quā ulcera diuturna red-
dunt, etiā quācūque deligāda ſunt, per aluum pur-
ganda ſunt. His uerbis clare docuit ulceribus om-
nibus & uulneribus quoties præualida ſunt, pur-
gationē eſſe utilē. Cum enim trifariā non hæc mo-
do uitia, uerū etiā reliqua omnia grauia magna-
que reddantur: nempe uel propter afflictæ partis præ-
ſtantiā, uel propter affectus magnitudinē, uel pro-
pterea quod ſunt cacoethe: cuiuſque horū ſeorſum ui-
detur Hippocrates mentionē feciſſe, utique in capi-
tis uentrisque uulneribus præſtantiā læſæ indicans
partis. uentrem autē hoc loco nō ſolum inferiorem
intelligendum eſſe, ſed etiam ſuperiorem, patere cui
uiſ arbitror. Diuiſo namque quod inter collū & cru-
ra eſt trunco in duas capacitates maximas, prior
ſub thorace, ſecunda ſub membrana quā abdomi-
ni ſubtenditur, (*περιγαστρικόν* Græci uocant) contine-
tur. Et ſanē uulnus quod intra thoracem intrā ue-
D etiam peritonæon penetrauit, non paruū pericu-
lum aſſert, poſſiſſimū ſi quid interiorū unā ſit uul-
neratum. Quinetiā cacoethe ſtatim fieri quācūque
in articulis accepta uulnera ſunt, id quoque omnes
ferē ſciunt. Empirici quidē ex ſola ipſa experiētia,
cui ſoli attendunt: qui uero corporis naturæ ſcien-
tiam comparare ſtuderūt, ex ipſa uulneratarum
partiū natura. Vbi enim tendones, & nerui, & car-
ne uacua, atque oſſea loca ſunt: hic doloris, uigilia-
rum, conuulſionis, & delirij periculū inſtat. Tum
hæc igitur uulnera, tum quæ ſumuntur, id eſt quæ a-
deo ſunt magna ut ſuturis indigeant, aut ſi non his,
certe deligatura, purgationē deſiderant. At uero
iam dictum in proximo libro eſt, quæ magna ulce-
ra ſunt, ea uel ſuturis, uel deligaturis eſſe coniun-
genda. Quinetiam quibus corrūpendi oſſis peri-

tom. 6 e 3 culum

culum impendit, ea utiq; cum magnitudine phlegmones sunt. Iam quaecumq; exeduntur, ea tū cacoe the sunt, tum malorum succorum soboles. herpetes quoq; a bilioso excremento ortū habēt, reliqua quae inueterant omnia, ex huiusmodi quapīa causa proueniunt. Quare in omnibus his non sine ratione purgare per alium iubet. In progressu uero hac insuper adiicit: In omni ulcere cui erysipelas superuenit, purgari corpus oportet qua parte ulceri maxime conductit, siue id per superna, siue per inferna sit, cuius etiā ipsius rei discrimen in libro De succis nos edocuit, reuellere nos iubēs ad cōtraria, deriuare uero ad latera. quinetiā cum maxime influit, tum ad diuersa reuellere. dictū uero & de hoc in eo libro est. Quare nunc quoq; si etiā nunc fluxio ualentior irruat, reuellere ad contraria studebimus. utiq; si in superioribus ulcus cōsistat, per inferna purgantes. sin aut in inferioribus sit, superiorē uentrem uacuantes. At si iam fluxio resistit, atq; in mēbro inhaesit, deriuare per uicina magis expedit cum & in propinquiora translatio sit, & purgati medicamēto promptior, tum accessus, tum attractus ē uicino detur. Hanc uero rationem ad aliā quoq; artis partē spectare, nempe quae De succorum medicatione praecipit, neminē latere arbitror. Proindeq; in sequētib; etiā repetere eam erit necesse, ac totam absoluere. Nūc illud docere uolo, tū ipsam morbi siue uim, siue magnitudinē appellare uelis, pro indicatrice quadā sanguinis detrahēdi, uel purgationis adhibendē, statuendā esse: tum uero Hippocratem hanc omnīū quos nouimus primū, indicationē adinuenisse. Ac de alijs quidē morbis in sequentibus libris id ostendā, de ulceribus uero in hoc, qui in manibus est. Ac de purgationibus quidem mihi explicatum iam est. Nam cū triplici genere morbus quisq; sit grauis, aut propter praecellentia partis, aut propter affectus magnitudinē, aut propter ipsius cacoe thian, omniū horum meminit Hippocrates, ubi de purgatione egit. Quid igitur, dicet aliquis, nunquid etiā sanguinē detrahi interdum suadet propter has ipsas causas? Mihi uero id quoq; iubere uidetur, uerum breuiter, ne sine demonstratione: ueluti tum ipsi, tum reliquis antiquis mos fuit. Id ita esse intelliges, primū quidem si haec eius uerba relexeris: Omni recens facto uulnere, nisi in uentre sit, expedit ex ipso statim sanguinē plus minus uel effluere, quippe phlegmone minus tentabitur, tū ulcus ipsum, tum quē circumposita loca sunt. Post haec autem si uerba quae in libro De ulceribus ab eo sunt scripta, tum quae in alijs omnibus libris saepe proposuit, recorderis, debere scilicet imitatorē esse medicū non tantum naturae, sed etiam eorum quae cum sua sponte ueniunt, conferunt, clare iam sensis mentem intelliges de sanguine cum magna sunt uulnera detrahendo. Si namq; expedit in tali bus sanguinem effluere, nō autem effluxit, quod deest, ipse adiicias oportet. declarāt id ea quae subiungit, quippe haec statim cum iā dictis uerbis copulat. Et ab ijs quae inueterata sunt ulcera, ut sanguis crebro fluat, efficere prodest, utcumq; oppor

tunum uidebitur, tum ab ipsis ulceribus, tum a circumpositis ulceri partibus. Nam quoniam praedixit omni ulceri recens facto sanguinē emitti debere, cernens, nisi etiā de inueteratis mentionē faceret, fore ut ab aliquo putaretur de recētibus tantum, ita pronūciasset: idcirco illud recte adiecit, & ab inueteratis ulceribus sanguinē mittendū esse. Ac si perpetuum est, quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam esse, si xam uero iam in laborante particula uacuandam esse uel ab ipsa particula quae affligitur, uel a maxime uicina, in promptu nobis et de sanguinis detractione colligere nunc est, q in principio hac ē longinquo, postea ab ipsis exulceratis partibus sit emoliēda. Quinetiā si ijs, quae iam dixi, illud quoq; adiicias, nempe q ipsum qui redundat succum uacuandam esse Hippocrates suadet, aliās sanguinis detractionē adhibebis, cū uidelicet is uincit: aliās pharmacum quod ad bilem flauam, uel atram, uel pituitam educendam usum habet, dabis. Illius interim in omnibus his non immerito, non esse ulceris qua ulcus est ullam id genus curationē, sed uel uitiosū qui cōiunctus est succi, uel redundantiā, uel phlegmones, uel herpetis, uel eius generis alterius. Sed nec illius oblitus, q aliquid interim ex ijs quae ulceribus accidit, indicationē propriā suggerat, ueluti magnitudo. Dictum autē & de ipsis ulceribus est in libro qui hūc praecedit, ubi ulcerum differentias omnes, & quot, & quae sint, & quae sit uniuscuiusq; indicatio, exposuimus. Praeberi tamē uacuandi indicationem ab ipsa aegritudinis uis, in eo libro non dixi, propterea quod & longiorē demonstrationem requirebat, & totius corporis curam cum ulceribus in eo non coniunxi. hic uero executus sum quantum ad rem propositā erat utile. Nam absolutus sermo de hoc genere indicationis, quam a magnitudine morbi sumi diximus, etiam in sequētib; restat. Pari modo de indicatione quae ab aetate sumitur, praeterea de ea quae ab humoribus sanandis accipitur: Ad eundem modum & quae ab afflictis partibus indicatio exhibet, consumatus in sequētib; libris tradetur. Nunc enim quod ab earum natura, id est tēperamento, & substantia sumi ad curationē potuit, tantum diximus. Quae uero tum a posito, tum a forma, itemq; usu, praeterea sensus acumine, hebetudine ue, indicatio suggeritur, hanc nō artigimus. Dicatur itaq; & de his, quantum sit ad ulcerum curationem utile.

7 Igitur quae acuti sensus pars est, eam quam maxime citra dolorem curare tentādum. Tradita uero eiusmodi dolorem sedantiū materia est in ijs libris, qui sunt De simplicibus medicamētis inscripti. Quae parū acri sensu est: haec, si affectus ita suadet, ualentiora remedia recipit. Et principis quidē membri robur seruari oportet: ueluti latus ubi de phlegmone agemus, docebitur. Quod talenō est, licet huic eam medendi rationem tutō adhibeas, quae relaxando remittendoq; mitiget, *χαλαστικῇ* Graeci uocant. Atq; haec quidem in sequentibus fusius tractabimus. In hoc libro indicationē quae & a posito, & a figura partium sumitur, trademus, atq;

ita quarto huic libro finē imponemus. Hinc igitur excogitatum est ei cui exulceratus uenter sit: hinc medicamenta esse bibenda. Cui gulam se mel, nec tota simul adsumēda, sed paulatim & assidue, quando ex transitu & contactu uulneribus, quæ hic sunt, utilitas accedit, non ex continendo; & diutius adhærendo, sicut ijs quæ in uentriculo sunt. Quintimo & quod crassiora hæc, & magis lenia sint adhibenda, id quoque a positi figuræ est indicatum. Nam quoniam gula transitus quidam eorum bibitorumque est, idcirco remediōrum eget, quæ adhærere, & undique quasi concrefcere, & agglutinari possint, non autem quæ elui ac defluere sint prompta. Ac circa partes eius, ueluti cōcrefcunt quæ crassa sunt; agglutinantur quæ lenta sunt. Quæ uero ulcera in crasis sunt intestinis, ijs quæ per sedem iniiciuntur, remedijs magis egent. quippe qui magis sunt propinqua. Quæ in tenuibus habentur (quoniam & longinquiora sunt, & medio situ posita) ambo requirunt, & quæ superne sumuntur, & quæ per sedem infunduntur. Sanè cōmunis omnium internarum partium indicatio est, ut ea eligantur quæ animalis naturæ maxime sint familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta; fugiantur respicianturque huic cōtraria, quāquam in ijs quæ foris sunt ulceribus, innoxius etiā talium medicamentorum uel usus, æruginis, ærisque uisus, & æris squamæ, & cadmiæ, & pompholygis, lithargyri, & cerussæ. Hæc igitur, & similia interioribus exhiberi non debebunt. Porro proditum de natura horum est, tum in tertio De temperamentis uolumine, tum De simplicibus medicamentis. Eligenda uero alimenta sunt, siquidem ad cicatricem perducere, aut glutinare ulcus studemus, tum austera, tum glutinosa, tum quæ minime rodant. Sin emundare, quæ modice abstergeant. quod munus mel cōtum præter cætera præstat. Austera uero potiones, & eiusdem rationis alimenta cuique sunt nota. Voco austera id quod *σφον* quoque Græce, id est astringens dicitur. Acerbum uero quod intensum austerum est, Græce *σπυρρόν*. Quæ uero medicamenta citra internarum partium molestiam sumant, ea tradita sunt in his libris qui De medicamentis sunt scripti. Dicitur tamen & nunc eorum formula. Ergo internis ulceribus opitulantur hypocystris, & balauftium, & cytini punicorū, & galla, & mali coriū, & terra samia, & lemnium sigillum, & rhois rosarūque succus, & acacia, aliæque id genus quæ ulceribus internis præsidium adferunt, nec ullam uisceribus noxam inferunt. Danda uero hæc sunt ex aliquo adstringentium decocto, uel mali cotonei, uel lentisci, uel summorū rubi uitisue ramorum, uel myrti baccarū, uel denique ex uino aliquo austero. Non latet autem & de uisui, quod cauendum id est ubi phlegmones suspicio adest, aliàs dari nihil uetat. Nec illud obscurum est, eiusmodi medicamina præparāda, ac iam dictis humidis excipiēda esse, tum uero tragacanthæ, & gummi illis admiscenda; potissimum si quis ea ijs quæ in gula sunt, exhibebit. Sed & gargarizare quoque iubendū est ei quia ad fauces et parastib-

miā his utitur. At ad ulcus quod in aspera sit arteria, ut supinus quā diutissime in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos relaxet remittatque, præcipiēdum. Influit enim sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibiliter & manifeste in ipsam arteriā. Nam & cum naturaliter se habet, scire licet potioris non nihil huc percolari. Sed ueluti in secunda uale tudine, ita nimirum in aduersa cauendum est ne largius influat, utpote quod tussim excitabit. Nam quoad humor undique iuxta tunicas arteriæ, ceu iuxta murum aqua descendit, tussim utique non cit. si quid per mediam spiritus uisū incidit, tussis statim excitat. Tum hæc igitur a situ & forma partium omnia sunt desumpta, tum uero non minus illud, quod omnibus medicamentis quæ thoracis & pulmonum ulceribus sunt destinata, mel sit admiscendū. quando si austeriora ijs duntaxat medicamenta exhibebis, ea in uentriculo morabuntur. Ergo digestionis eorū in corpus, instrumentum mel erit, ac celeris transitus, ueluti uehiculum: cum eo que nec ulceri nocebit. Ad eundem modum quoties in uesica, & renibus usitum consistit, non solum mel ipsum, sed etiā eorum quæ urinas mouent quippiam, ulcerum medicamentis misceri oportebit. Illud quoque patere, uel me tacēte cuius arbitror, exulceratas partes, tum ex earum substantia, tum functione, tum utilitate, tum positu, tum figura discerni. Monstratum autem id abunde est in libro De notis affectuum locorum. Verum non est de illis nunc locus. Rursus igitur ad medendi methodum reuertor. Aio igitur non hæc modo, sed etiā alia non pauca ex figurarum partium posituraque indicari. quippe quādo nec deligare commodè ægram particulam possis, nisi prius uel ex figura, uel positura, uel utriusque indicationem sumperis. sed nec immittere in sedem clysteris fistulam cōmode quæas absque eius generis indicatione. Iam per penē iniicere medicamenta in uesicam sæpe necessum est. illud de cathetere apponere opus nō est, quod eo probe uti omnino nequeas, nisi & positum & figuram totius uesicæ planè perfecte habeas. In talibus ergo omnibus clare patet, non parum ad totam curationē affectum ipsum locum indicare. In ruptis aut, quæ *σπυρτά* Græci uocant, plures indicationes in idē concurrunt. siquidem & quæ a positura capitur, recte ad examen uenit. Nam propterea quod & in profundo corporis sunt, & latent, idcirco diuersam curationem ab ijs quæ apparent, postulant. Quoniam uero cum ecchymosi quidem omnino, aliquādo uero & cum contusione circa ipsam præruptam carnem consistunt, idcirco plures curationes indicabūt. Semper enim pro affectu numero, etiam medendi indicationes respondent. Ac docebitur quidem, ubi de phlegmone differemus, locupletius, quod ualentiora medicamenta requirant quæ cumque in profundis partibus laborant, quā quæ in summo corpore sunt affecta. Nunc id saltem arbitror patere, quod solui necessum est prædidiciorū quæ foris applicantur, uim, ubi quod ab his iuuari dum est, in profundo latet. quare intendere hæc

eatenus oportebit, quatenus per transitum ad profundum exoluatur. Sanè ecchymosis omnis uacuationem pro remedio curationis indicat. quare calfacientibus huic & modice siccantibus medicamentis est opus. Quippe quæ uehementer siccant, digerunt illa quidē in principio euidentius, quam quæ sunt imbecilla: cæterum, nonnihil ipsius uitij scirrhosum delictum curatu relinquunt. Ac dicemus de his in sequentibus diligentius: sed & nunc quantum ad rem pertinet, abunde est dictū. Quæ enim humectant calefaciuntq; pharmaca, præterea hæc quæ omnes iam Græce uocare *χλασικά*, id est relaxantia solent, atq; ex his quæcunq; ad siccus paulo uergunt, nec tamen adhuc clare manifesteq; extendentia sunt, quæ *συντεπικά* uocant, hæc omnium sunt ecchymomatum remedia. Curandum uero est ut una cum ruptis quæ in profundo hærent corpore, hæc tum uires magis habeant intentas, tum ipsa magis acria magisq; incidentia sint: tum (ut semel dicam) tanto efficaciora, quanto magis à cute ad profunda ecchymosis recessit. In talibus sanè nec cucurbitæ usus sit inutilis. Id est instrumentum ad uiolentum attractum à medicis

ARGVMENTA LIBRI QVINTI.

Caput 1. Anacephalosis omnium quæ superioribus duobus libris tractata sunt. 2. De solutione cōtinui in partibus carnis antehac dictum est: nunc de illa, quæ in arteria, uena & nervo contingit, solutione. Sed quoniam cum ea inest ulcers, aut instrumentalī alicui parti, cura perfici nō potest, ni prius sanguinem erumpentem sistas, percenter hic causas & modos, è quibus talis sanguinis fluxus originem trahere possit. 3. Sanguinem uulnera tum uenæ tum arteriæ coercere docet parocheuteus & antispasmi, deligationibus & medicamentis.

4. De carne regeneranda postq; erumpens sanguis restitutus est. Et quando escharoticis, id est, crustam indutentibus medicamentis sit utendum: & quando indubitatiū malum, hoc est, secundarium sanguinis profluium sit expectandum. 5. De sistendo sanguinis profluuio è profundo corporis. ut ex utero, uesica, intestinis: Hactenus enim de apparentium partium profluuio dictū est.

6. Curatur hic sanguinis fluxus ex erosionē obortus: dein de diapedesibus, postremo quod uenæ infedit ulcus.

7. Arterias sectas difficultur coire: Non tamen impossibile illud esse, sicut quidam ob siccitatem arbitrabantur: Nequaquā enim de unienda sectione arteriæ esse desperandum, ubi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus natura molle. 8. De curatione ulcerū pulmonis: quæ cura cum difficilis sit propter pulmonū cōtinuum motum, & saniei purisq; uacuationem laboriosam, ea tamen ratione, quam hic præscribit, Galenus percurauit, dum cruentum adhuc uulnus esset, priusq; phlegmone excitaretur: quæ si semel inuaserit, exigua spes est eius postea cōgulinandi, Quia phlegmone soluta, pus & sanies ulceris eluenda sunt, tum præterea elui debent ex ulcerata loca: In pulmone autem neutrum omnino fieri potest. Nam una hic tantum reliqua expurgatio est, ea quæ per tusses fit. 9. Quod etiam transuerſi septi uul-

A excogitatum. Cæterum, cum totum ecchymoma digestum per halitum est, siccare iam uehementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere, omniaq; in summa facere quæ ut ulcus coalescat, efficiant. Ergo si euocatū celeriter ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spatio, sordes multa subnascentes medium inter ulceris labra spatium occupat, ita ut iam coire uertio non possit. Atq; inde adeo fit, ut qualibet leui de causa nos hæc sui admonerent. Nā siue quis obruit, siue parum concoxit, siue febris laborauit, siue se uehementius fatigauit, eiusmodi particulis sit coe dolet. Nō enim in idem coire ruptionis labra, B sed tantū propè sunt admora. Quo fit, ut leue momentū ea facile separet, & medium locū supernacuocuo humore repleat. Et quid quæso, aliud q; aliud nouè ecchymoma his gignitur? & primo illi, cū uidelicet primū caro est rupta, similis nifi quod nō ex tenui magis sanie cōstat, cum in principio è sanguine ecchymoma esset: ideoq; facilius etiam nūc q; intra iniuria digeritur. Hec itaq; quæ hactenus diximus, disputationi de ulceribus satisfaciunt. Finemq; iam quarto huic uolumini impono.

C nera conglutinari possint, quæ in carnosa eius parte sunt: in nervosis autem insanabilia sunt. Similiter leuaret in omnibus, quæ in peritonæo continentur. 10. Perstringuntur Methodici cum Thessalo suo, qui utcumq; externis ulceribus mederi poterunt, neutiq; tamen ostenderunt quibus medicamentis interna uiscera oblecta ulcerationibus queant subleuari. 11. Repetunt quibus laboriosum sit pulmonibus exulceratis mederi, sumisq; hoc tum à forma, tum etiā à situ. Sed neq; medicamenta cōtingere ulcera possunt, quæ etiam per medium interuallum ferè uim suam amittant: adde q; ulcera respirando moventur, & tussiendo lacerantur. 12. Vitæ offensam arteriam asperam, larynga & bronchum, & ueneris uocis spiritusq; meatum persanare docet.

13. De curando profluuio sanguinis erumpentis ex pulmonibus uel ob tussim, uel ob catarrhum eōdem uentem. 14. Quomodo pulmonū ulcers aliquis mederi possit, si modo phlegmone nondum oborta fuerit, nec sanguinem etiam uim reijciunt. 15. Sectionem uenarum in uniuersum sustulerunt, Chrysippus, Aristogenes & Erasistratus: quorū friuolas rationes Galenus partim hic, partim in libro de medendi ratione per sanguinis missionem euulit.

EULITER.

Quæ de ulceribus in carnosa parte accidentibus dicta sunt, breuiter enumerat: & ad ea quæ in instrumentis sunt ulcera transit. De ruptione arteriæ & uenæ. Quo pacto per deriuationē sanguinis fluxus sisti debeat. Medicamentā crustam inducenda, quæ ad fluxum sanguinis ualent. De lacte. De spū sanguinis ex destillatione. De ulceribus in sede & pudendo, & eorum curatione. Diuisa utcumq; uenæ aut arteriæ curatio. De sanguinis reiectione cum ab alijs partibus, tum à pulmone.

CL. GALENI METHODI MEDENDI. ID EST

DE MORBIS CVRANDIS LIBER QVINTVS.

CAPVT PRIMVM.



VE M A D M O D V M quis ulce-
rum curationem optime mo-
liatur, cum duobus ante hūc
libris docuerimus, illud obi-
ter ostendimus, reliquos om-
nes medicos, qui simplicium
in nobis particularū elemen-
tis minime inquisitis artem

adeunt, non posse quicquam certa ratione sanare,
minimeq; omnium qui Thessali dogma profiten-
tur. Reliqui namq; ea saltem ulcera, quę in diuersis
sint partibus, diuersis rationibus sananda censent,
ipsa nimirum experientia docti. Qui uero Thessa-
lum autorem sequuntur, propter excellentem sci-
licet sapientiā, omne ulcus quacumq; in parte ani-
malis sederit, similis egere curationis putāt. Quip-
pe si cauum sit, impleri: si æqualē, cicatrice induci:
si caro supercrescat, hanc detrahi: si cruentum re-
censq; sit, agglutinationē postulare aiunt. ceu ue-
ro qui hæc norit, eum recte mederi sit necesse. nec
sit hæc ratio etiam cūlibet ē plebe cōmunis, cum
nemo sit qui horum quicq; ignoret. Cæterum nec
quę admodū carne implendus sinus sit, nec quem
admodum ad cicatricē perducī quod impletū est
debeat, aut cōprimi quod superauctum, aut coale-
scere quod purum citraq; sinū est, intelligit. Sunt
enim eiusmodi opera tantum medicorū, quę uel
ratione, uel experientia, uel utriusq; ope sunt in-
uenta. Rursus igitur repentes, summam in ea per-
curamus, quō dicendorum caput cum dictorum
copulatur calce. Monstratū est omne ulcus siccā-
tia medicamēta requirere. Cæterum, quod sinum
habet, ut minus sanē quā reliqua, sic ea quę præ-
terquam q̄ modice siccant, etiam abstergendi fa-
cultate obtinere, desiderare. Quod uero cōiungit
sibilibra postulat (cuiusmodi scilicet sunt quę me-
dicis Latine cruenta, Græce *ἐναιμα* dicuntur) huic
tum quę magis etiam siccant, tum uero quę citra
absterisionē leuiter adstringant opus esse. Iam quę
ulcera perducī ad cicatricē postulant, hæc non
solum magis adhuc siccantibus, sed etiā strennue
adstringentibus remedijs egere. Quod si caro eo-
rū præternaturā modū intumuit, acria & demol-
lencia (quę eadem calida siccacō necessaria sunt)
desiderare. Si quod uero aliud symptoma ulceri
adiunctum erat, ab eius natura curationis indica-
tio fūmebatur: atq; ex hac rursus remedium fa-
cultas petebat. Si namq; sordes innasceretur, quę
hanc tollere non opus esse. ea q̄ omnia abstergendi
uim habere multo sanē maiore, quā ea quę car-
ne implerent. Si uero copiosior in his humiditas
cerneretur, etiā quod magis siccaret medicamen-
to opus esse: cæterum, quod propriā speciem non
egrederetur. Ac si agglutinaturū medicamentum
esset, siccans astringensq; id esse debere. si carne
impleturum, siccans et abstergens, atq; in singulis

A reliquorum, uti dictū est. Si uero intemperata sub-
iecta caro esset, primum eius intemperantia suc-
currendum esset: utq; quę siccior iusto esset, hanc
humectantibus. quę humidior, siccantibus. tum
quę calidior esset, refrigerantibus. quę frigidior,
hanc calefacientibus. & si gemina qualitate esset
intemperata, pharmacum quocq; eligētibz quod
gemina qualitate esset contrarium. Quippe id om-
nium quę præternaturam sunt cōmune esse, non
posse ad naturam suam redire quicquā sine ijs quę
ipsi facultatem haberent contrariam. Consideran-
das præterea & intemperantia causas hoc tempo-
re esse, siue hæ totius corporis essent cōmunes, si-
ue quarundam partiū proprię, quę uidelicet per
societatem (quam *συμπύκτωρ* uocant) exulcera-
tum membrum infestaret. Medendum uero pri-
mum esse causę quę intemperantiam adhuc foue-
ret. post hanc uero, ipsi quę iam facta esset intem-
perantię. Quippe hanc cōmunem indicationem
esse omnī, quę ex causa quāpiam oriuntur. Osten-
dimus autem tum ab ulcerum differentijs diuer-
sas præberi indicationes: tum eas quę a laboran-
tis corporis temperamēto sumuntur, diuersam ab
his habere rationem. Si quidem ille eum ex ijs quę
præternaturam sunt, sumuntur, omnes contraria
esse adhibenda dicant: hæ cum ab ipsa natura ca-
piantur, similia. Nam si qua siccior pars est: ea ma-
gis siccari postulat. quę minus talis est, ea minus
est siccanda. Ad eundem certe modum, & de ca-
lesciendo refrigerandocq; est præceptum. Nec si-
lud omisimus, ex præcellentia membri, aut con-
trario statu, itēq; ex sensu acri hebetere diuersum
medicandi consilium peti.

2 Ergo quod reliquum est huius morborū ge-
neris curandi, id nunc apponamus. Nos genus id,
lucidioris doctrinæ causa, unitatis solutionem ap-
pellauimus. nec refert si cōtinuitatis solutionē uo-
ces. Incidit hæc nō in similaribus modo, & simpli-
cibus partibus, sed etiā in cōpositis, & instrumen-
talibus. At uero remedium indicationes alię a
similaribus sumuntur, alię ab instrumentalibus.
Quarū ambas norunt qui methodum Hippocra-
tis consecrantur, propterea q̄ utrarumq; partium
naturam intelligunt: alteram autē duntaxat (nem-
pe quę ab instrumentalibus præbetur) qui Eras-
stratū, & Herophilū sequunt. Quare in ijs qui se-
quent sermonibus quacumq; a calido, frigido, hu-
mido, & sicco corpore morboſe indicationes sum-
munt, nullis certe methodū hi habebunt. quę ue-
ro a forma, positu, præcellentia, acri sensu, aut his
contrarijs, præbent, has non ignorabūt. Illustrius
erit quod dicimus, si partes ipsas proposuerimus.
Quonia igitur de ijs maxime ulceribus quę in car-
nōis accidunt partibus hæctenus abude tractau-
mus, nunc tempestiuū uidet de ijs agere quę in ar-
teria, uena, & neruo cōtingūt: nec de ijs absolute,
sed

sed ut in quouis sunt uiscere, uel deniq; instrumen-
 tali animalis parte. Ergo sicut arteria uenae mag-
 na uulnerata est, & copiosum sanguinis profluuiū
 continuo superuenit, & glutinari id uulnus diffici-
 le quidem etiam in uena est; in arteria uero non so-
 lum difficile, sed etiam quod fieri (sicut nonnullis
 medicorum est uisum) omnino fortasse non pos-
 sit. Dicendum ergo uicissim de utriusq; est, ac prius
 de sanguinis profluuiō: secundo loco De glutina-
 tione. Quoniam autē, & per anastomosis, & per dia-
 pedesin, ut mox docebimus, profluuiū huiusmodi
 sunt, nō alienum sit propterea q; curationē cōmu-
 nem habēt, etiā hoc loco de ijs meminisse: tametsi
 ex alio esse morborū genere uideantur. Sane pro-
 fluit ex uena, uel arteria sanguis, aut referato earū
 ore, aut tunica earū diuisa, aut (ut sic dicā) trāsco-
 latus, siue sudoris modo trāsmisissus. Porro diuidit
 ipsa tunica, tum ex uulneratione, tum cōtusione;
 tū ruptione, tū erosione. Anastomosis accidit pro-
 pter tum uasis imbecillitatē, tum sanguinis qui ad
 os eius impetu ruat copiam. ad hęc, ac rē quam piam
 quæ illi extrinsecus incitat qualitatē. Diapedesin
 uero ex tunica quidē ipsa rarefacta, sanguine uero
 tenuato oritur. accidere præterea interim potest,
 & ex gracilium uasorum ore adaperito. Dicendum
 igitur est de horū affectuū unoquoq; seorsum, ac
 primū de diuisione, quā uel ex erosione, uel uul-
 nere, uel contusione, uel ruptione diximus accide-
 re. Quæ itaq; uulnerāt, ea sunt acuta, atq; ad secan-
 dum habilia. quę contundendo solunt, ea grauiā
 duraq; sunt. quę rumpūt, omnia id tensionis inter-
 uentu faciunt. Est autem ea intensior actionis ue-
 hementia, & succi abundantia, non utiq; uirū re-
 spectu, sed cum a uase suo non continetur. Item ca-
 sus ab alto. & graue quippiam durumq; incidens.
 Quippē eiusmodi aliquid cū uel uasis uacuis, uel
 pusillam omnino rem continentibus in se incide-
 rit: si durum ex opposito obiectum habet, contu-
 sa reddit. at si plenū uas sit, prius id rumpit quā
 contundat. cum sit quod tum accidit, persimile ac
 si utrem uesicam uel impleas, atq; in hanc lapidem
 iactes. uel contra lapidē utrem uiolenter illidas. Sa-
 ne huic persimile est quod accidit in casibus ab al-
 to. Quam nanq; rationem uter habet ad lapidem,
 hanc homo habet ad solum. Quisquis uero ex ma-
 ximo acutissimōq; clamore, in pulmonibus uas
 D perfremit, is uiolentiæ actionis acceptum malum
 referet. Similiter huic, & qui ex eo q; prægrauē o-
 nus, aut humeris imponere est conatus, aut aliā
 manibus attollere, uas fregit. Atq; hoc etiā magis,
 cui ex cōcitatissimo cursu, aut ualentissimo saltu,
 aut aliter particula ulla uiolenter extensa, id acci-
 dit. Est enim id quoq; persimile, ac si funem, aut lo-
 rū, quammaxime distēdas. Porro per rumpi quoq;
 non pauca propterea quod sanguinē quē in se ha-
 bent, non continent; potissimum cum flauulentus
 is sit, indicio sunt tum dolia, quæ sæpe musto rum-
 puntur, tum alia multa ualentissimorū corporum.
 3 Ac si ex uulnere, uel clamore, uel casu, uel cō-
 tusione per rumpit uas est, utiq; in his causa ipsa
 desinit. Si uero ex abundantia, fieri potest ut uas e-

A tiam amplius rumpatur, effeetrix saltē adhuc ma-
 nente causa. Atq; in hoc quidē affectu uacuanda
 quamprimum abundantia est. abhinc sanguis sup-
 primendus. mox ulcus ipsum curandum. Vbiue-
 ro effeetrix causa iam desinit, primū sistere sangui-
 nē expediet, post ulcus sanare. Quomodo igit san-
 guinem sistemus? obturato quidem quod per rump-
 tum est, auerso autem atq; aliorum trāsalo quod
 per id ferebatur. quādo si id eo quo inter initia im-
 petu confluat, osculumq; uasis pari modo pateat,
 citius planē moriatur animans quæ profluuiō la-
 borat, quā sanguis cesset effluere. Porro ulcus ip-
 sum claudet, uel labris eius quæ disident in idem
 adductis, uel osculo eius obstrueto. Adducēt in
 idem labra eius, tum nostrarum manuum opera,
 B ubi sic ad manum ulcus se exhibet: tum per deliga-
 turam: tum uero per ea remedia quæ refrigerant,
 & adstringunt. Necq; enim si uere fas est arteriæ ue-
 næ uel uulnere, ueluti dixerint qui nullam a uulne-
 ratæ partis substantia naturāq; sumi indicationem
 aiunt. Obstruetur uasis osculum, & sanguine ipso
 concreto (qui *λεῖψος* Græce dicitur) & ijs quę so-
 ris illi imponuntur. Possunt autē superimponi tum
 carnosæ ipsæ, quæ circa ulcus sunt partes. tum in
 nonnullis uulneribus ipsa cutis. adhuc quæcumq;
 ipsi cōminiscimur. Ea sunt & linamenta, quos *μάρ-
 τας* Græce uocant, & medicamenta ea quæ deici-
 co quod ex lenta crassaq; substantia cōsistant, mea-
 tus obstruunt, (Græci *εμπύματα* uocant) præte-
 rea quæ crustam, quam Græci *εἰσάγειν* uocant, effi-
 ciunt. Quippe hanc quoq; ceu septum quoddam
 C huiusmodi ulceribus ueteres excogitarunt. Ef-
 ficiunt hanc tum ignis ipse, tum quædam medica-
 mina quibus ignea uis inest. Atq; his quidem re-
 bus obstruitur uasis osculum. Avertitur autem
 sanguis, atq; ad alia membra conuertitur, tum ad
 proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus. Il-
 lud *πυρρὸς ἐλθον*, hoc *ἀνίστασθαι* Græci uocant.
 Nam hæc quoq; Hippocratis inuenta sunt, om-
 nines scilicet immodicæ uacuationis communia re-
 media. Deriuatio ad uicina loca fit, cum id quod
 per palatum uacuatur, per nares deriuatur: re-
 uulsio autem ad contraria cum ad inferna reuel-
 litur: Rursus quod per sedem profluuit, id per uul-
 uam deriuamus, sursum uero reuellimus. Ita nan-
 que & natura ipsa facere solet. Mulier enim, in-
 quit Hippocrates, sanguinem uoment mensēs su-
 peruenientes remedio sunt. Hac igitur de causa si
 uel menses confertim eruperint, uel sanguis abu-
 tero quoquo modo profluxerit, sursum reuelles,
 curbitam maximā sub mammis defigens. Nam
 & hoc Hippocratis inuentum est. Eandem ob-
 causam cum ē natis sanguis erumpit, ipsum reti-
 nent maximā in præcordijs defixæ curbitæ. In-
 sfigendæ autem sunt si ex dextra nare profluuit, su-
 per iecinore. sin ex sinistra, super liene. si ab utra-
 que nare, super utroq; sunt imponendæ uiscere.
 Quod si resolutus adhuc æger non sit, etiam uena
 ex eo cubito inspicenda est, qui profusio nē ē dire-
 cto respōdet. Vbi paulum detraxeris, mox unam
 horam intermittens, rursus detrahes, post iterum

atq; iterum, pro laborantis uiribus. Ad hunc modum & reliquas omnes fluxiones (quippe cōmunis ratio est) tum ad contraria reuocabis, tum per uicina deriuabis. utiq; quæ per aliu fluunt, ea uel per urinas, uel uterum transmittens. quæ uero per urinas, ea uel per uterū, uel per sedē transferēs; pa-
rimodo quæ per uterū erumpunt, uel per urinas, uel per alium, quæ uero in oculis, aure, uel palato fluxiones accidunt, eorum ad uicina deriuatio per uenas est. Reuulsio uero in ijs quæ supra sunt omnibus, deorsum semper agitur, sursum, in his quæ sunt infra. Præterea à dextris ad sinistra, sicut ab his rursus ad illa, similiter ex ijs quæ intus habentur, ad ea quæ foris sunt: cōtraq; ab his ad illa. Ergo frictio contrapositæ partis, potissimum per ea medicamenta quæ calefaciant: præterea uincula ualentius adducta, ijs quæ ad contrarium reuocant remedijs sunt adnumeranda. Non secus profecto & naturalium meatuū qui positi ex aduerso sunt, reclusio. Quæ uero id prestare medicamēta possint, tradita eorū materia à nobis est in libris, quos De medicamentis prodidimus. sed de omni fluxione in sequētib; etiam libris tractare necessum erit. Nunc ad sanguinis profluuium est redeundum. Quippe de genere obturantium quodammodo est, & uinculum ipsi profluentibus uasis iniectū: ipsiq; nostri digiti dum ea cōmittunt, stringuntq;. Est & alia huc pertinens ligatio, quam Græci *ἐν τῇ ἀνῶ* uocant. quanquam ipsum uas circulo non complectitur, sicuti uinculum; uerum cum ex parte complexu suo cōmittat quodam motu uulnerati membri dissidentia labra, & quæ superimposita sunt contineat, merito inter claudientia remedia numeratur. Præter omnia iam dicta, inter hæmorrhagias remedia censeatur, & appositus uulnerate partis situs. Porro appositus fuerit, si ad geometriū hunc finem sit directus: nempe ut & dolore pars careat, & sursum spectet. Si uero uel prona spectet, uel doleat; non solum profluuium non sistetur, sed etiā, si non sit, prouocabit. Ergo qui nec norit, si quando astiterit ei cui ex uulnere sanguis profluit (de his enim primū agā) illico digitū super os uulneris uasis imponat, blandè innitens, ac sine dolore comprimēs: quippe simul tum sanguinem sistet, tum eum cōcrescere in uulnere faciet. Quinimo si uas unde profluitur, alte sit demissum, certius ipsius tum positiū intelligat, tum etiā magnitudinē. præterea, uena ne sit, an arteria. Post hæc iniectio unco attollat, ac modice intorqueat. Quod si ne tūc quidē sistitur sanguis: si uena fuerit, tenet citra uinculum sanguinē supprimere aliquid ex ijs medicamentis, quæ sanguinis supprimendi facultatem habeant. Sanè optima horum sunt emplastica ea quæ ex fixa resina, & farina triticea tenuissimo polline, & gypso, alijsq; id genus, sunt confecta. Si arteria sit, duorū alterum, aut uinculo amplectens, aut totum uas præciciens, profluuium sistes. Sanè uinculū magnis quoq; uenis iniicere interdum cogimur: atq; etiam interdum totas præcidere utiq; transversas. Incidet autem huius necessitas in ijs, quæ ex profundissimo loco rectè affur-

gunt: præsertimq; per angustias, uel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex utraq; parte pars utraq;, celaturq; ac integritur à superficiētib; corporibus uulnus. Tutius tamen est utruq; facere; & uinculū uasis radici iniicere, & quod deinceps habetur præcidere. Radicem uasis uoco priorem eius partem, quæ uel io cinori propior est, uel etiā cordi: hæc in collo ab inferiore est parte: in brachijs & cruribus à superiore; in singulisq; reliquarum partiū, prout ex dissectione intelligere licet, quam nec ipsam amethodi isti Thessalij admittūt.

4 His peractis, implendū carne uulnus quāprimum est prius, q̃ uinculum à uase decidat. Nisi enim producta caro prius locum qui circa præcisam arteriam est, impleuerit: sed locus aliquis uacuuus superfuerit, utiq; quod Græci *ἀνὸς ποτα* dicunt, sequitur. Quam ob rem eo potius genere sanū guinem sistentium utendum suadeo, quod sua lentitia meatu obstruat, (emplasticon uocat) quā quod crustam efficit, propterea q̃ & citius & minore cum periculo post ipsum impletur uulnus. Quippe periculum in altero est, ne si defluat crusta, rursus sanguinis profusus ex uase exciteat. Optimum igitur omnium quæ noui medicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum hæmorrhagias tutissime utemur, est, quod nunc subiiciā: Thuris pars una, aloes partis unius semissi miscet. mox cum utendi tempus instat, cum oui candido tanto subigitur, quantum mellis reddat crassitudinem. hoc dehinc leporis mollissimis pilis excipit. deinde tum uasi ipsi, tum ulceri toti liberaliter imponitur, alligandum autem id forissecus fascia est ex tenui linteo. Cuius fasciæ primi quatuor quinqueue amplexus ipsi profluenti uasi iniiciuntur: abhinc uasis radicē uersus ducentur, in quibus uidelicet partibus radicem uersus ducere licet. Licet autem ferē in omnibus præterquam cerebri membranis. His factis, ubi tertio die solueris, si tutō adhuc medicamen ulceri adheret, aliud rursus superimpones: ac ueluti linamentum id quod ex pilis factum inhæsit, madefaciens deligabis, ita ut initio deligasti. Sin prius sua sponte linamentum decidat, radicem uasis digito blandè comprimēs, quatenus uidelicet nihil confluat, hoc quidem suspensa manu adimes, atq; alterum impones. ad hunc modum quoad carne munietur, curare uas debebis, utiq; à principio ad finem usq; particulam supinam seruans: custodito tamen in hac sita figura, modo. Vitandum enim ne dolor incidat, ac rursus profluuium excitet: cum nihil sit quod profluuium magis, quàm dolor prorit, & phlegmones augeat. Hoc medicamento multifariam utor, aliās (ut dictum est) duplum thuris, aloes admiscens, aliās pari modo ambobus utens, aliās paulo superante aloen thure, aut etiam pluseulo, sed nondum duplo: etiam mannam pro thure aliquando iniiciens. Est autē manna medicamentum, quod magis quàm thus adstringat. Thus uero quàm manna magis emplasticum. Porro constat in duris corporibus plus aloes esse immiscendum, in mollibus plus thuris. Eritq; alterū eorū magis

magis adstringens, alterum lentitia & crassitudine sua tenuibus spiramentis magis inhærēs, quod *ἐμπλάστικόν* vocant. Itaq; etiam magis tenax, ac (ut sic dicā) resinofius deligas thus oportet, ubi magis esse emplasticum medicamētum studebis. id sanē tum mollius est, tum albidius, tum quod mansum ritu aloes & mannæ non cōminuitur, sed partes suas sibi cohærentes defendit, ueluti mastiche. Verū hæc eius tractationis sunt propria, quæ De cōponendis pharmacis præcipit, quam in hoc opere non alicubi attingisse omnino non licuit. Si quidem aut nusquam nobis particularis exempli faciendā mentio fuit, sed ipsis tantum uniuersalibus contentos esse methodis oportuit: aut si particularia poneremus, etiam preparatio eorum fuit attingenda. Verum (ut ante est dictum) eius generis remediorum quæ methodo sunt inuēta, uno alteroq; exemplo hic posito contentos esse conueniet. Id uero semper mihi teneri memoria uelim. Sed reuertamur rursus ad id quod dicendo parum absoluimus. Mentionem enim iam dicti medicamenti idcirco pluribus feci, quod cæteris id omnibus præstare mihi persuasi, mirorq; si cui melius inuenire cōtinget. Ideoq; tum in cerebri membranis semper: tum in colli uulneribus eo utor: etiam ipsarum uenarum iugularium, quas *σφαιρικές* uocāt. utpote cum harum quoq; profluuium citra uinculum sistat. Non est autem in his cōmittendum ut in opere properes, ueluti quidam stolidi chirurgi faciunt: sed altera manu inferiorem uasis partem comprimes, aut complexus tenebis; altera medicamentum uulneri impones, ac blandē ei apprimes, donec concretum adhaerit: mox deligabis superne deorsum, nō (ut in auribus) inferne sursum. siquidem radicem uersus uasorū ducere deligationem oportet, ac quod confluit reprimere. Sunt porro & alia nō pauca pharmaca, quæ citra omnem dolorem emplasticam uim obtinēt: uerū nullum ita carne implet. Expedit autē quāmaxime in eiusmodi casu, ut priore medicamine cadente, caro circum uas ipsum sit producta. At quæ crusta generāt, ubi crusta decidit, magis nudam partem quā pro ipsius naturali habitu dere linquunt. Est nanq; ipsius crustæ generatio ex subiectis circumpositisq; corporibus (ut sic dicam) semiustis: sic, ut cuiusmodi in hyemem extinctos hos carbonēs rem parāt, eiusmodi ipsæ crustæ carnis exustæ sint reliquæ. Quare quantum particularē adustum ad crustam est, tantū profectio ipsi de naturali carne deperditur. Id itaq; omne particulæ decedit, cum crusta cadit, atq; ob eam rem nuda sineq; carne uisitur. Multisq; posteaq; crusta decidit, profusio sanguinis, quæ ægre suppressi potuit, superuenit. Quare in his quoq; quiquis methodo administrare omnia uolet, is tum modos omnes quibus sanguis suppressatur, longe ante considerabit, tum eum eliget qui minus sit cum periculo, utens non minus & reliquis omnibus quoties necessitas urgebit. Maximam autem necessitatem; uel crustificis medicamentis, uel ignitis feramentis utendi animaduerti, ubi ex erotione pu-

rescentis alicuius profluuium sanguinis concitatur. Quinetiam ubi in tali affectu totū quod compuitur est sublatum, tutius est uel ipsius uelutitatem adurere, uel certe crustificis medicamentis uti. Hac uero ratione tum in pudēdis, tum sede ad talem necessitatem sæpe deuenimus, q̄ uidelicet hæ partes tum propter naturalē humiditatem, tum q̄ excrementorum sunt canales, ex leui causa putrescant. id uero quod pro incrustantium pharmacorū defectu consilium diriges, erit non utiq; solus calor, sed cum quo adstringendi facultas sit coniuncta, qualis in chalcitide, & mysi, & atramēto sutorio, siue uisus his siue inuistis utere, uisitur. Quæ uero ex calce non extincta conficiuntur, ea utiq; ualentiora his sunt: cæterum calx adstringendi uim non habet. Exciunt igitur citius quæ ab his sunt crustæ, hærent autem corporibus diutius quæ ab adstringētibz. Quod utiq; longe est utilius: quando ita prius nascitur in imo earum caro, efficitq; profluenti uasi uelut operculum quoddam. Vnde nec nosmet præcipites esse (ueluti nonnulli sunt) ad crustas, ubi hæmorrhagias periculū imminet, detrahendas oportet, nisi in illis tantū affectibus, in quibus propter putredinem candens ferrū corpori hominis admoouere coacti fuimus. Appellāt nescio quo modo eum affectum omnes nūc medicī Græci *ὀνυχ* a uerbo quod pascere significat, propterea q̄ pergere pascendo id uitium ab ægris particulis ad eas quæ integræ sint, soleat; atq; harū semper aliquid ægris adijcere. Quare nō à substantia indicatē rei, sed ab accessorio appellationē indi derūt. Copia materiæ medicamētorū omnīū, quæ hac predicta facultate sunt, in proprijs cōmentarijs dicet. Proprios intelligo, & qui De simplicibz medicamētis, & qui De cōpositiōe eorū sunt scripti.

5 Ergo recensitis huius methodi quæ sanguinis profluuiā quæ ad manū sunt cures, capitibus: mox ad eorum quæ in alto tum corpore, tractationem accingemur. Qui igitur ē uasis profluit sanguis, aut propterea q̄ amplius non cōfluet, sistitur, aut q̄ oclusa diuisio erit, aut etiam propter utiq; simul. id quod reor tutissimū. Porro confluere prohibetur, & propter animi deliquū, & cum ad contrariā reuellitur, & cum ad uicinā deriuatur, et per refrigerationē tum corporis totius, tum uero precipue ipsius partis afflictæ. Hac enim ratione etiā frigida pota sæpe hæmorrhagias suppressit. Idem facit & frigida foris in fotu adfusa. Sed & pusca, & uinum acerbum, aliāq; quæcūq; uel adstringendi, uel simpliciter refrigerandi, uim habent. Clauditur ipsa diuisio, si uel contrahatur, conuiueatq; id quod diuisum est, uel obstruatur. Sanē contrahitur tum adstrictione, tum refrigeratione, tū deligatura, tum uinculo exceptum. Obstruitur uel intrinsecus, uel extrinsecus. Et intrinsecus quidē, à sanguine cōcreto, Græci *θρόμβος* uocant. Extrinsecus tum hoc ipso, tum uero linamenti, & spongijs, & crustis, & medicamentis ijs quæ lentitia crassitieq; sua meatus obferant, (Græci *ἐμπλάστικόν* uocant) ad hæc corporibus ijs quæ circumiacent, propius admotis. Quorum singula quemadmodum

dum perficiuntur, dictum iam est. At quæ de profundo sanguinis profluvia erumpunt, ea uinculo nec deligatura sanes, ueluti nec ignitis ferramentis, nec (ut semel dicā) ijs quæ diuisum ipsum corpus partem uic contingere machinamur: imò per reuulsionem, ac deriuationem ad uicina, præterea cibum potionemq; qui et emplasticam uim habent & refrigerent, & medicamenta quæ adstringant. Habes uero uberem talium materiem in proprijs operibus. Quæ uero à partibus indicatio sumitur, ea cōmunibus quæ iam dictæ sunt curandis indicationibus, ueluti auxilium in singulis affectionibus accedit. siquidem instrumentis aliquando utimur, pro partis ipsius proprietate, alijs ad uterum, alijs ad uelicam, alijs ad omnia intestina crassa. Quippe in hæc, per dysterem, in uterum, per ea quæ *ῥυτίτις* Græci uocant, idoneorum aliquod medicamentorum immittimus. Sic & in uelicam per in directum foratas fistulas. Sanè rariora ex his profluvia sanguinis sunt: sed tamen aliquando fiunt: & quantq; non profusione ipsa, periculosa, at certe ob diuturnitatem nō sine periculo. Si quidē quaternis diebus uidimus ē uulua profluere sanguinem, nec potuisse ullo remedio sisti, quoad quarto die plantaginis succo utentibus nobis prorūs constitit. Est porò id medicamen & ad ea quæ ex erosione excitantur sanguinis profluvia utilisimū, cui etiam ualentius aliquod hoc casu medicamentum, aliàs aliud ei miscere soleo, utiq; ad totum respiciens affectum. id quod semper est faciendū, ac pro maximo do cumēto in omnibus habendum. Nam in his ipsis quæ ex uulua, uelica, et intestinis profluvia citant, estimari debet ipsius profusionis quantitas: ut uidelicet hanc iam uel ut primam, uel ut secundam indicationem curationis habeamus, nec tamen obiter totius affectus non habētes rationem. Nam si perruptum uas aliquod magnum est, ut uehementer reclusum fiat, utiq; adstringentibus medicinis est opus ueluti balauftio, & hypocythide, & rhoe, & omphacio, & acacia, & gallis immaturis, & malicorio. Sin uel exiguum uas est, quod perruptum est, uel modice reclusum, sic ut non multus sit qui in eo profluit sanguis, etiam aloe, & manna, & pini cortex, & lemnii sigillum, & spinæ Aegyptiæ fructus, & crocū, & lapis hamarites, aliq; id genus ex uino nigro austero utilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id uini præstō sit, nec plātago, nec solanum, (quippe hæc quoq; sunt idonea) coquemus in aqua & rubi germina, & cynosbati, id est canini rubi, & myrti, & lentisci, & hederæ, in summam omnium quibus astrictoria uis inest, siue radix sit, siue fructus, siue cortex, siue germē. ideoq; etiam astrigentium malorū, maximeq; cotoneorum, itemq; myrtorum, & mespilorum decoctum idoneum ad proposita præsidium est.

6 Asti ex erosione profluium quoddam incidit, nō est id magna ex parte profusius: sed exiguum & paulatim effluens. eoq; Palionis, uel Andronis, uel Polyæde pastillis utendum est, aut etiam (ut dictum est) nostro, ex charta constante, qui genere

Galen.

A eandem uim obtinet, cæterum magis potentē. Si sunt enim hæc erosionē. si tamē etiā toti corpori sit consultum, ut prius est dictū. Sin profusior hæmorrhagia sit, ijs quæ uehementissime adstringant, utendum medicamentis est, quoad uehementis eius impetus frangatur. mox deinde admiscēdi illis pastilli sunt, postea ad ipsos solos ueniendū, cum aliquo ex ante dictis succis aut decoctis. At uero quæ extrinsecus profluenti particulæ admouentur, tum adstringentia, tum citra adstrictionem frigida, hæc ipse (ueluti pleriq; medicorum) non ubiq; probō: sed mihi cōtra omnino quā fieri res postulat, ipsum sanguinem intrō cōpellere, ac uenas quæ in alto sunt, implere uidentur. Vidimus enim quosdam eorum qui ex pulmonibus sanguinem reicerent, ex thorace refrigerando manifeste lascos: æque ut qui sanguinem uomuerūt, nonnullos, q; uenter foris esset refrigeratus. Eodē modo & eorū quibus ex naribus sanguis profluxit, aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerūt. Ergo nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore, loca quæ circa particulam, unde sanguis profluit sunt posita, refrigeranda suaserim, imò posteaq; in alia prius auerteris: ut exēpli gratia, in naso, ubi sanguinis missioe (ut diximus) sis usus, uel artū frictioe deunctioneq; uel ad præcordia defixis cucurbitis. Quin ne sic quidē ad frontē et caput ilico refrigerantibus utendum, sed prius est ad contraria reuellendum, utiq; affixa in summa ceruice cucurbita. Quippe duplex est in sanguinis ex naribus pfusione auersio: & quæ est ad totius corporis inferna: & quæ est ad capitis posteriora, propterea uidelicet quod ipse nares, & in superiore, & in anteriore parte sunt sitæ. Aduersatur autē id quod supra est, id quod infra: & id quod post habetur, id quod ante. Verū de sanguinis profusio uel hæcenus dictum abunde sit. Patet nāq; & diapedesin quā uocant, refrigerantibus adstringentibusq; esse curandam: & si propter tenuitatem sanguinis aliquando incidat, crassiore uictu. Is uero cuiusmodi sit, dicetur in sequētibz. Dictumq; iam ad quendam modum est in libro qui De attenuante uictu est scriptus. Iam uero ad memoriā affectuum curationē est redeundum. Ergo quod uenē insedit ulcus, ubi ad manum est, eandem desiderat curationem ijs quæ in carne accidunt, de quibus, duobus ante hoc uoluminibus disputauī. Nam siue ex recenti uulnere factum est, id agendum est, ut medicamentis ijs quæ enāma uocant, coeat siue ex erosionē, quæcumq; dicta de rebellium ulcerum curatione sunt, ea prius ratione discernenda. mox ut opere perficiantur, tentanda. Quin etiam ubi uinculo uas sit cōplexus, aut medicamentis sanguinem supprimētibz, aut feramentis ignitis usus, illudq; tibi curationis propositum restet, ut quæ circa ulceris labra sunt, carne impleas, iisdem omnino medicamentis utere, quæ in methodo sinu osorū ulcerū nobis sunt præcepta.

7 De arteria autem uulnerata iam dictum est, nonnullis medicorū uideri nō posse fieri ut coeat. Atq; id asserunt aliqui quidem sola experientia se

tom. 6

f

conten-

contētos professi. alij uero etiam ratione usi eiusmodi. Siquidem durum esse ac cartilagineam aut alteram arteriam tunicam. talium uero nihil posse in unum coire, cum sit mollium tantū corporum in unum coeundi habilitas. ut tum in externis uidere licet, nullo nec lapide cum lapide, nec testa cum testa unquam coeunte. tum uero in nobis ipsis, quando nec cartilago cum cartilagine, nec os cum osse coalescat. Non enim fracta ossa per unionem cohererent, sed per callum eum, quem πῶν Græci uocant, seu glutino iunguntur. Igitur nos quoque ab experientia nostra primum incipiamus, in mediumque proferamus ea, quæ ipsi uisui usurpauimus. Vidimus enim in mulieribus et pueris tū cōglutinatas arterias, tum carne undique circumdatas, idque in fronte, malleolo, & articulo brachij, summæque manus medio. Simile quiddam aliquando & agrestis contigit iuueni, dum sanguinem sibi mittendum ueris tempore curaret, quod nostratibus maxime est in usu. Cum enim medicus qui uenam incisurus erat, brachium hominis deligasset, contigit attolli uelut in gibbum arteriam. itaque hæc pro uena medicus diuisit. Exigua sane incisio erat. sanguis autem flauus & tenuis & feruidus statim eiaculabatur, idque cum quodam ueluti saltu. Ac medicus quidem, ut erat admodum iuuenis, et operum artis parum peritus, uenā se incidisse putabat. Ego uero cum quodam alieno ex ijs qui aderat medicis, utique seniore, ubi quod accidit aduerti, præparato ex emplastrorum genere quod sanguinem supprimit medicamento, tum incisionem curiose cōsumxi, tum super medicamen ilico imposui, ac spongiam mollissimā extrinsecus super hoc deligauī. Mirante uero qui arteriam inciderat, insolitam nostram in hoc casu providentiam, indicauimus homini rem factam, sed posteaquam incisio hominis diuersiorum exiissemus, iussimusque ne, uel soluere nobis absentibus, uel ante quartum diem id aggrederetur: sed ut erat deligatū haberet, spōgiam duntaxat desuper madefaciēs. Postea uero quā in quarto soluentes planē conglutinatam incisionem inuenimus, rursus idem medicamen impone re iussimus, tum simili modo deligare, nec multis postea diebus soluere. Atque ita percurata est huius hominis incisa arteria, sola omnium quas in cubito incisas uidi. Nam reliquis omnibus aneurysma, alijs maius, alijs minus superuenit. Ac quæadmodum quidē aneurysmata curare conueniat, in progressu dicetur suo loco, utique cum reliquorum omnium præter naturam tumorum curatio tradetur. Nunc cœptam disputationem absoluamus. Siquidem arteriæ natura difficultatē quidē durioris tunice suæ conglutinatæ propterea indicat, non tamen eiusmodi quæ euinci omnino nequeat. Neque enim ita est sicca duraque, ut os uel cartilago: imò longe his mollior, ac magis carnosā. Quo utique minus de uiuenda sectione eius est desperandum, ubi tum ipsa sit parua, tū hominis corpus natura molle. Videtur autem experientia quoque ipsa rationi subscribere, cum & in pueris & in mulieribus propter corporum humiditatem et mollietatem, eam ui-

derim glutinari, & in uno iuvene, cui (ut dictum est) exigue erat incisio. Cum uero sanatu difficilior sit arteria quā uena, non tamen est medicamentorum admodum diuersus in utraque usus, imò specie planē idem maioris minorisque ratione euarias. Quippe tanto siccioribus medicamentis eget arteria quā uena, quāto ipsa est suprà natura siccioris temperamenti quā uena. Quod si carnem circa gigni est opus, eadē ambare requirunt. Siquidem ad eundem modum prouenit carnis generatio in his circumdandis, quæ in cauis ulceribus prouenire est traditū. At quæ in utero, uesica, uel intestinis uenæ arteriæque sunt, cum eadem genere medicamenta ubi exulcerata sunt, requirant, etiā instrumenta quibus infundantur, metrenchytas, id est uterinos clysteres, & syphonem rectum, & dysterem desiderant. Ad ea uero quæ in recto intestino sunt ulcera, etiam per uesicam, cui sit fistularetā ad finem annexa, inijcere liquatū medicamentum tepidum licet. Variabitur itaque remedium consistentia pro instrumentorum specie. neque enim fas est eiusmodi instrumentis crassa medicamenta infundere: sed liquidiora postulant, atque idcirco mediocriter plerūque calida. Proinde sicca medicamenta, magis sunt idonea, quā ea quæ liquabilia uocantur, quoniam facile uel plātaginis, uel alterius eius generis succo, misceantur. Eiusmodi medicamenta sunt & crocum, & pompholyx, & aloë, & quæ κηφελινά Græce dicuntur. In ipso autem primo producendæ carnis tempore quod suppressio nem sanguinis continenter excipit, etiam lemmia terra salutare auxilium est.

8 At quæ in pulmone hæserunt ulcera, difficiliora ad curandum sunt. Quibusdam uero nō difficilis modo eorum curatio, uerum etiam quæ pessimi omnino nequeat, uidetur: idque tum ratione coniectantibus, tum experientia. Ratione, quoniam pulmo inter uiscera propter anhelitum perpetuo sit in motu: cum utique quietē requirant ea quæ sunt sananda. Experientia, quod neminem unquam eorum qui ita sunt affecti, sanatum uiderint. Atque de experientia quidē (nam hinc coepisse par est) dubitare fortasse licet, propter agnitionē. Nos enim uidimus alium ex eo quod maxime uocem in clamore intendisset, alium quod ab alto cecidisset, alium in palæstra percussum, non solum statim grauiusse transfusiuisse, sed etiam simul cum tussis alios unam duasue, alios plures heminas sanguinis potisse. Qui uero ita erant affecti, aliqui omnino sine dolore erant, alij in pectore dolebant. Quinetiam sanguis ijs qui doluerant, nec confertim reiectus est, nec multus, minusque tum ruber tum calēs, ceu ē longinquo ueniens. At quibus citra dolorem est reiectus, ijs & confertim, & plurimus, tum ruber feruensque expuebatur, clare docens quod nō procul ueniret. Porro aliam dubitationem facit, nec hanc leuem, ipsa sanguinis ex thorace in asperam arteriam transumptio, proposita uidelicet a medicis, ijs qui transmitti eum per membranā quæ pulmonem inuoluit, possentō putarunt. Fortaque (nisi multis eorum qui ita sunt affecti, tum statim ortus dolor

dolor, tum uero quibusdam eorum phlegmone superuenienti quæ postea suppuraui, manifestum indicium præbuit in pectore consistentis affectus) pronuntiassent sanguinem ex pectore per fauces nunquam reijci. Nunc uero his indicijs confusi, à pectore quidem uenire cōcedunt. Cæterum dum aliam uiam quam per pulmonis membranulam inquirunt, multa eaq; absurda proferre coguntur. quamuis in ijs quos *εμπύρις* Græce uocant, ipsum pus quod medio spatio inter pectus & pulmonem contineri ipsi farentur, uideant (arbitror) apertissime ex pulmone expui. Nos uero in ijs quibus erant in pectore tantus abscessus, ut etiam ossium aliquod carie corrumpetur, manifeste ipsis ostendimus mulsam quæ iniecta in pectus fuerat, ex pulmone expui. Sanè nouimus in urbe Roma, loco profecto fluxionibus maxime obnoxio, eiusmodi affectus in pectore non raro constitisse: ut necesse fuerit ipsum os quod affectum fuerat, excidere. In plurimis uero etiam membrana quæ cohsit intra subterenditur, unà cum corrupta costa inuenitur putrefacta. Solemus ergo in curatione, mulsâ perulcus infusa, subere aliquando quidem ut inclinati in laborantem partem tussiant. sepe uero mollior cōcutere. Interim etiam organo quod pus extrahit (*πυουλόγ* Græci uocant) educere quod intus ex mulsâ reliquum est. Hoc facto, ubi tum pus uniuersum, tum etiam saniem ulceris e-luillie confidimus, mox medicamenta iniijcimus. Ergo in eiusmodi affectibus si quem in medio pectoris ac pulmonis spatium humorem reliqueris, statim hunc tussi eiectionem contemplabere. Mirandi profecto sunt ij, qui de uia per pulmonem hæsitent, quo pacto non magis hæsitent, quemadmodum crassus sanguis in fracti ossis callo effundatur. Nam & ipse qui effunditur, non paulo naturalis est crassior, & cutis substantia longe utique crassior pulmonis inuolucro est. Quod igitur diximus, cum uel casu, uel praua iudicia acutæ uoce, uas aliquod in pulmone rumpitur, citraq; dolorem confertim sanguis feruens floridus multusq; cū tussi expuitur, scire licet in uiscere uulnus esse. Aggredienda uero curatio est, prout nos sæpe sumus aggressi, quibus utiq; non raro successit. Igitur laboranti ipsi iniungendum est, ut nec magno utatur respiratu, ac semper agat silentiū. præterea uena cubiti interna protinus incidenda, à qua bis terq; postea sanguis est detrahendus, utiq; eius auertendi causa. tum artus omnes fricandi uincienti, ut ita ipsi solemus. ubi hæc sunt facta, primum poscatum diluta tum tepida potui esse offerenda. quod si quis in uiscere thrombus, id est cruor concretus latet, resolutus expuatur. atq; hoc nihil uetat bis terq; ternis horis facere. Ab ijs uero etiam aliquod eorum quæ tum emplasticam uim habet, tum adstringunt, medicamentum exhibendum. idq; aut ex posca diluta primum, aut ex malorum myrtorum uel alicuius eiusmodi adstringentium decocto. Rursusq; uesperi medicamen hoc similiter dandum, circumciso, si ualentior sit, omni nutrimento. sin aliter, sorbitionis quod satis est, exhibere.

Galen.

A bēdum. Maxime uero ad rem pertinebit, si etiam postero die, modo fortis cubans sit, parum sanguinis ab incisa iam uena rursum detrahatur. tum uictu medicamentisq; eodem modo in quartum usque diem utatur. pectore interim, si æstas sit, undiq; melino rosaceo uel madafacto: sin hyems, nardino ungueto. Quod si emplastico aliquo uti medicamento placet, habes à nobis optimum, quo etiam ad reliqua uulnera cum fiducia utare. constat id ex bitumine et aceto, alijsq; quæ illis misceri medicamentis solent, quæ enama barbara à medicis dicuntur. Quod si mulieri mederis puero uel auctu deniq; corpori, quod mollis sit carnis, quod ex chalcitide sit, satis habile medicamentum fuerit, cuius uires in primo libro eorum quæ De medicamentorum compositione inscripti, explicauimus. Hac nos ratione multos ad quos statim uti malum senserunt, accessimus, percurauimus. Quippe hoc maximum est, cuiq; te attentum esse magnopere oportet, an uidelicet statim à ruptura uasis facta curationem incipias, quod cruentum adhuc uulnus priusquam phlegmonem excitet, glutines. Nam si ea semel inuaserit, exigua spes est eius postea glutinandi, in longius tamen trahere potest tempus. Quod uero eiusmodi ulcera uel difficulter, uel planè nunquā curari possint: hoc in causa est, quod phlegmone soluta, eluenda pus ulceris & sanies sunt. Atq; ex utero quidem & uesica tum sua sponte excernuntur, quoniā uidelicet pronis delibescit, tum elui præterea à nobis possunt. In pulmone neutrum omnino fieri potest. Quare omnibus quæ huic loco hærent ulceribus, una reliqua expurgatio est, ea quæ per tussis sit. At si recte huiusmodi reliquum omnem quietem suum, tum uero ut sensum respirarent, nec quicquam loquerentur, ut uulnus glutinaretur, iniunximus: quæ potest tussientibus esse sanationis spes? Non igitur propterea quod in perpetuo propter respirationem motu uiscus id est, desperata curatio est, uelut qui ante nos fuere senserunt, sed propter saniei & puris uacuationem. ideoq; si statim quis sit aggressus, ac iam dicta ratione medeatur, coeunt. sin phlegmone prius occupari, difficilem incertamq; curationem recipiunt; quādo pus & sanies prorsus totaq; ex spatijs pulmonis non expelluntur, & tussis agras partes ualde lacerat. At quæ ex pectore educuntur, triplex cōpendium præ ijs quæ ex pulmone uacuantur, habent. Nam & uasa ipsa multo sunt minora, & sanies in spatium interius effluit. et in summa magis carnosum pectus est quam pulmō. Nam asperæ arteriæ substantia, quæ admodum carnis expertis siccaq; est, nulla alia animalis in parte inuenitur. quæ etiam ipsa in eiusmodi reiectionibus rumpi solet, cum si qua reliqua uena uel arteria sit rupta, ipsis asperis illæsis manentibus, per solas osculorum (ut sic dicā) cooperationes translatio sanguinis fit. Itaq; nec calidus in talibus, nec ruber, nec multus sanguis emittitur. Ac uidentur quidem prima saltē fronte leuiore eiusmodi affectus, ut qui copia uacuationis minime terreant. sunt uero uel ob hoc ipsum grauiore. Quippe eo

tom. 6

f. 2

cretus

cretus circa ruptum uas eruoꝛ, cui facilis transitus in asperas arterias non est, glutinationē prohibet.

9 Simili modo & transuersi septi uulnera, quæ foras nō perueniunt, in carnosīs quidem partibus subinde coalescere sunt uisā, eius motu nō obstant. Quæ in nervosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis grauiusq; curatio est etiam eorū quæ in carnosīs sunt partibus, si has iam phlegmone occupauit, Idē non ipsi modo diaphragmati, uerum etiā omnibus quæ intra peritonæon sunt contenta, quod in ea scilicet sanies defluat. Cæterum danda opera est, ut ea quæcumq; ratione siccemus, tum per ea præsidia quæ extrinsecus imponuntur, tum per ea quæ ex aqua uinoſe tenui bibunt. Porro horum maxime idonea sunt, & quæ propterea quod ex feminibus sunt, *σκήνισμα* Græce dicuntur, & quod solenne nobis est, quod in pectore perforato semper utimur, quod ex calia componitur. Cæterū tum hæc, tum irrigationes quædam foris applicanda, quæ eiusmodi uulneribus sunt accommodata, ad tractationē De medicamētis pertinent. Hic methodos tantum tradimus, quæ præsidiorū indicent genus. Quare si quando quædam à nobis particulatim pro exemplis adhibeantur, hæc addita claritatis causa fuisse existimandum.

10 Rursus igitur propositas methodos repetamus, monstremusq; quantum generalis omnium ulcerum curatio per singulas animalis partes speciatim immutetur. Hinc nāq; discemus præcipue quidem id quod in toto opere est propositū, nempe minime in curationibus errare, uelut appendicem uero, etiam eorum qui se Methodicos uocant, audaciam. Qui (si quid mihi, qui nec ad gratiam quicquā, nec ad odium loqui soleam, est credendum) cum omnium ipsi medicorum maxime à methodo sunt alieni, damnant (quatenus saltem scribunt) non solum reliquos ueteres, sed etiā ipsum omnis nobis methodi autorem Hippocratē. Ac Empiricus quidem omnia quæ nos per indicationes inueniri ostendimus, ea dicit per experientiam sibi cognita. Cum uero præter indicationem & experientiam nullum inuentionis organū tertium præterea sit, isti neutro utentes, tamen appellandos se Methodicos censent. Ergo sequantur nos, & nunc saltem ostendant ulceribus omnibus per singula membra curandis unam esse sanationis rationē. Audiamus homines quo pacto ulcus curent, aut quales indicationes ab eo sumāt. Num alias ullas, quam quod planum cicatrice sit inducendum, sinuosum carne implendum, cruentum glutinandum? At quo pacto inueniam quod cicatricē inducat, & quod carne impleat, & quod coalescere faciat? Ne labora, inquit, sunt enim inuenta. At qui haud scio an recte, aut an omnia. Fieri enim potest, ut uel ex dexteriorum nota quædam inuenta sint, potiora inuenta non sint: uel ut quæ inuenta sint, melioraq; esse uideantur, etiam ipsa sint mala. Inde q; adeo accidere, ut quædam ulcera prorsus non sanentur, quædam longiore spatio, & cum dolore, & famis cruciatu minime necessario. Neq; enim audet quisquam nouam aggredi expe-

rientiam, priusquam sibi persuaserit priorē curandi rationem recte se damnaſſe: ueluti in ijs ulceribus quæ in pulmone consistunt, quæ ne agnouisse quidem omnino fas est citra dissectionū actionūq; notitiā, quorum nimirum utrūq; auersantur. Cæterum concedatur ad præsens cognoscibilibus istis Theſſali ſectatorib. ulcus, quod pulmonis infederit. Nunquid igitur ſicuti hoc illis conſeſſimus, ſic etiam & quod ſordidum ſit intelligant, an purū, an æquale, an ſinuofum, an ſaniei, uel puris plenum, concedemus, uidelicet uel ex diuino aſſatu, uel per inſomniū ea uidentur? An hæc quoq; quomodo agnoſcant percontabimur? An uero citra horum agnitiones, pharmacum quoduis exhibere concedemus? Ego nanq; exiſtimo primum expurgandam eſſe immundorū ulcerū ſordem. Implenda uero carne eſſe quæ pura & ſinuofa ſint, rursus pus ſaniemq; expurganda quibus hæc cum hæreant, mox ita cicatricem inducendam. Iſti uero haud ſcio quonam modo talia ulcera ſanauerint. nam Theſſali de his prorsus non ſcripſit, ne uidelicet uel ignorantiam ſuam, uel inconfantiam proderet. Quippe uel rationi parum conſona, & falſa de his dicent: uel ſi quis uera dixerit, eorū indicationē ex membri ſubſtantia, præterea ſitu formaq; accipiat neceſſe eſſe. Nam eſto ulcus in pulmone ſordidum purumq;, & cum phlegmone, & ſine phlegmone, & ſinuofum, & planum dignoſcere norint. etiā illud ſcire eos detur, quoniam ne eius quidem, tamenſi minimi, inuentionem ſibi uident, nempe quod tale ulcus uiridis medicamento expurgetur, Machæroniſ (ſi libet) uel liſdis. nihil enim refert. Reſpondeant igitur mihi, ſi ulcus in uiſcere hæſerit, quid facient? Num uiridis medicamentū aliq̃uid deuorandum dabunt? Omnino ridicula res eſt. Sed dicant, undenam medicamen id in pulmone deferendum ſciunt? Quod ſi id quoq; ſciant, illud certe intelligere non poterunt, an ipſam uim ſuam quam in extrinſecus poſitis ulceribus habuit, ſeruabit. At eſto ſciant hæc quoq;, quod & eandem tuebitur uim quam in externis ulceribus obtinuit, & quod ſordes deterget: certe an tuſſim mouerit, intelligere non poterunt. cum tamē niſi per tuſſim ſordes expurgetur, nullus ſit detergentis medicamenti uſus. Ergo id quoq; iſtis detur. at illud ſaltem effugere non poſſunt, quin diuerſam curationem in ulcere femoris & ulcere pulmonis adhibeant. Si quidem alterum aqua perluunt, alterum tuſſibus expurgant. Pone uero rursus ulcus qd̃ in pulmone ſedit, craſſo eſſe pure circumdatū. Nunquid tum quoq; uiride medicamen exhibebunt, an mel poſius ſingere iubebunt? At id dicant, undenam inuenerint. Non enim proſecto id reſpondebunt, quoniam tenuandū incidēdūq; uim quandam obtineat: cum ipſi ſaſcultatibus eiſmodi diſquirēdis ultro diſſugiant. Sed nec quod Empiricis in eiſmodi notarū conſuſu inuentum eſt mel prodeſſe, propterea iſtis, ſicuti illis, eo uti fas eſt. Primum, quod experientiam contemnunt. deinde quod Empiricis in eiſmodi conſuſu, quæ nam ſit in pulmone affe-

cūo, ignorare se fatetur. ceterum, quæ conducant,
 se per experientiam obseruasse. At Theſſalo non
 ſatis eſt curare quod omnino non norit, ſed ab af-
 ſectuum indicatione procedit. Sanè ſi omnia illi
 ſcire donemus, ſicuti prius, non minus quàm nos;
 at nunquā profecto effugiet, quin in diuerſis cor-
 poris partibus curationis ſpecies mutetur. Non e-
 nim eadē curationis ſpecies profecto eſt, aut mul-
 ſam in uterum propter ſordidum ulcus infunde-
 re, aut mel comedendum exhibere, aut ſpōgia ul-
 cus detergere. Cæterum, hæc adhuc parua; illa pla-
 ne maxima ſunt. Fingamus diutinum ulcus citra
 phlegmonem in multis eſſe partibus, oculo, aure,
 naſo, ore, femore, uentre, utero, ſede, pudēdis. Fin-
 gamus & illud, ſi placet, ulcus eiſmodi uel planū
 omnino eſſe, uel exiguo minus planum. Reſpon-
 deantq; nobis iſti ſectatores Theſſalī, qui hæc nuſ-
 quam diſcreuit, quomodo id cicatrice tegemus.
 Nempe eo medicamine quod ex cadmia confici-
 tur. Id enim ulceri quod in femore conſtitit, belle
 cicatricem inducere poteſt. Sed nunc igitur & ei
 quod in audiendi meatu conſtitit: Dicam fortas-
 ſis incredibile, cæterum dijs iſtis notum. Depre-
 hendi aliquando a quendam ex ſapientiſſimis iſtis
 Theſſalī ſectatoribus ſic ulcus medicamentum diu-
 ranti, cum citius homini auris putuiſſet, ac uer-
 mes creafſet, quàm medicamēto quod ex cadmia
 componitur, inducunt cicatrice fuiſſet; cæterum,
 permiſſo homine pluribus diebus medicamento
 ſimiliter uti, poſtea quàm in dies grauius auris ole-
 ret, & ſanie impleteretur, etiam incredibilius quid-
 dam q̃ prius, auſum uidimus. quippe ratus me-
 tum ipſum in profundo contraxiſſe phlegmonē,
 conſugit ad tetrapharmacum, quod planē multo
 magis augere putredinem partis debuit. utpote
 quod ſiccare ulcus proſus non poteſt, maturare
 phlegmonem poteſt. Ergo ubi hoc medicamento
 ad hæc ſanandum uno die eſt uſus, ut facile ui-
 deres id maxime eſſe contrarium, & multiplicata
 ſtatim ſanie uis eſt, & foetor intolerabilis obor-
 tus. Itaq; qui propinqui laborantis erant, contin-
 gere amplius aurem Theſſalium non ſinebant. Ille
 uero præ impudentia ſtultitiæq; uolebat non mo-
 do medicamentū tetrapharmacū aliquid inſicere,
 uerum etiam extrinſecus cataplaſma relaxans im-
 ponere. At cum eum propinqui hominis abige-
 rent, timerentq; ne in magno periculo æger foret,
 nos unum diem amplius permiſſi Theſſalo aſino
 curationem exorauimus. Erat autem profecto po-
 ſt ridie tum ſanie multo copioſior futura, tum o-
 dor grauiſſimus. quo die tentauit an fieri poſſet, ut
 ſententiam Theſſaliſ aſelli mutare, ne omnes per-
 deret ægros, imò aliquos iam, tametſi paucos, ſer-
 uare aliquando poſſet, tam aliena ſcilicet ab omni
 uera methodo deſerta ſecta. Ergo ſic agere cū ho-
 mine ſum oſus. Nunquid (inquam) phlegmone
 tibi eſſe uidetur in intimo meatu, proinde relaxan-
 tibus uteris auxilijs? Ille tum ita eſſe magnopere
 contendit, tum aliter eſſe non poſſe. An igitur (in-
 quam) aliquando ulcus quod cum phlegmone
 coniunctum eſſet, aceto acerrimo cūm glaucio cu-

Galen.

A ratum uidisti? Minime gentium (inquit) imò ſi
 quis paſtillis andronijs ex aceto liquatiſ utatur, e-
 tiam conuulſionē fortasſe accerſat. Ergo (inqua)
 ſi quis alio quopiam medicamēto, quod ſit andro-
 nijs multo ualētius, ex acerrimo aceto utatur, idq;
 ad aurem ita propinquam cerebro inuolucrisq; e-
 ius particulam, nūnquid planē te autore conuulſio-
 nem accerſet, ſi phlegmone præſertim aliqua ſub-
 ſit? Hæc tum ipſi, tum ijs qui adſtabant uniuerſis
 recte dici ſunt uiſa. Ergo quantum (inquam) ad ip-
 ſarum partium habitū ſpectat, quæ ea quæ ad ſum-
 mum ſiccant, deſiderant, tametſi nunc curatione
 tua ſint ueluti effoeminatæ, iam tali medicamento
 uteretur. Nunc quoniam plures iam dies male ipſas
 aſſuefecisti, transferre eas ad contrarium uno im-
 petu, & ſemel non licet. Nam tibi ac Theſſalo con-
 temnere conſuetudinem licet, non minus quàm
 partium naturam: nobis autem non licet: ſed pri-
 mo die aceto utar cum glaucio: ſecundo utar and-
 ronio: tertio ad ualētius aliquod quàm ipſum ſit
 andronium, tranſibo. Atq; hoc tribus quatuorue
 diebus uſus, ſi mihi uehementius etiā medicamen-
 tum requirere ulcus uidebitur, eo etiam uti nō du-
 bitabo. Extrinſecus uero (inquam) imponam ca-
 piti ea parte qua auris inſeſtatur; nō me Hercules
 ſicuti tu, cataplaſma quod relaxare poteſt, ſed eo-
 rum medicamentorum aliquod quē uehementiſ-
 ſime ſiccare poſſunt. cuiuſmodi eſt quod ex ſalice
 conſtituitur: aut etiam ipſum andronium ex aceto
 illiniam: aut ex ijs aliquid quæ hoc magis ſiccant.
 C Nam quoniam particula cui medemur ſiccifſima
 eſt, nec eſſe ualentifſime ſiccetur. Indicat enim
 ueluti uitium ipſum, ut curetur, ſibi applicandum
 eſſe contrarium: ſic particula ipſa quod ſi ſibi ſi-
 miſſimum. Itaq; & prout dixi, egi: ſanauitq; homi-
 nem, nullo potētiore requiſito remedio. Quibuſ-
 dam uero qui potentiora deſiderabant, quibus u-
 no alteroſue anno ulcus aurem inſeſtauerat, ualen-
 tius omnibus iam dictis medicamentum adhibui-
 mus. Id fuit ferri ſcoria tuſa, cribrataq; tenuiſſimo
 cribro, mox in tenuiſſimum ueluti pollinem leui-
 gata, poſt cum acerrimo aceto ad mellis ſordiq;
 craſſitudinem cocta. Coſtat autem multiplex eſſe
 debere in miſtione acetum. Verū (quod ſæpe iam
 dixi) materiæ medicamentorum copiam ex alijs
 D cōmentarijs petes. Nunc quæ ad methodum ſpe-
 ctant, abſoluantur. Nam audiendi locus quoniam
 eſt ſiccifſimus, idcirco medicamentis eget, quæ ue-
 hementiſſime ſiccant. Quorum nullum reliquarū
 partium cuius applicaſſe expedit, ſed oculo exul-
 cerato collyrium fortasſe quod ex thure conficitur.
 naribus uero quod multo ſanè magis ſiccet, quàm
 ut oculis cōueniat, minus uero quàm ut auris qua-
 dred. Itaq; & prius comprehenſi omnes paſtilli uti-
 les ſunt, & medicamen quod ad Muſam reſertur,
 aliaq; generis eiſdem. Vlcerum uero quæ in ore
 accidit, quæcūq; admodum ſunt humida, ea me-
 dicamētis egent, quæ uehementē ſiccant, ueluti di-
 phrige, tum ipſo per ſe, tum ex melle, & uino, &
 mulſo. præterea ea quæ iris dicitur, & quæ anthe-
 ra, hiſq; uel ſicca, uel ex melle, uel mulſo, uel ui-

tom. 6

f 3 no

no. Vtile uero ad talia est & Musæ medicamē præterea rheis succus, & omphacium, aliaq̃ quæcūq̃ strenue hiscant. Quid enim materias percensendo morer? At quæ simpliciora oris ulcera sunt, hæc sanare commode possunt, etiam medicamenta quæ modice siccant, ueluti hæc ipsa quæ propterea q̃ in alsiudo sunt usu, *somalecta*. Græce sunt dicta. Ea sunt quod ex moris cōficitur, & quod ex rubifrutu, & quod ex succo corticis iuglandium uiridis, atq̃ etiā his magis qd̃ ex musco, & cupressi sphaerulis componitur. Quæ uero in ore admodum humida ulcera sunt propterea ossa, unde carie tentari ossa perdidit, hæc propter ossium naturā quæ sicca est, uehementissimis medicamentis indigēt. Itaq̃ ego iam cōprehensos pastillos semper leuigo, ac siccū ipsū medicamentum superimpono.

11 Porro dicta paulo ante sunt, & ad uelicā, & uterum, & intestina, & pulmonem, idonea medicamentorum genera, quibus sit in singulis utendum. genere quidem medicamenti ab ipsa curandarum partium substantiā desumpto, sed cum affectu prius etiam æstimato: modo uero utendi eius, tum à forma, tum etiam situ. Hinc namq̃ excogitati sunt, & oricularij clysteres, quos *ὀρχήνους* uocant: & uteri clysteres, quos *μυτρειχύνους*: & recti syphones, quibus in uelicam aliquid infunditur, quos *καβηρίους* dicunt: & ipsi clysteres. Hinc rursus quæ in uentriculo, pectore, & pulmone, ulcera consistunt, per ea quæ eduntur, ac bibuntur, esse curanda. Quæ uero in intestinis, bifariā. Nam quæ uicina uentriculo sunt, his per comesta, & bibita succurritur. quæ uero inferius sunt sita, per ea quæ iniiciuntur. quando neq̃ ad ea quæ uicina uentriculo sunt, subire potest quod per sedem infundit, nec integris uiribus ad inferiora pertingere quod per os sit ingestum. Ideoq̃ etiam quæ ulcera in thorace, & pulmone cōsistunt, tum difficilius ijs quæ sunt in uentriculo sanantur, ut quorum situs longius absit, atq̃ idcirco medicamentorū uis remittatur: tum propter hoc ipsum multo ualentiora ea quæ deuorantur præstidia requirunt, quàm si ipsi statim ulceribus admouerentur. Inde q̃ adeo excogitata medicis sunt, ubi expurgādum ex pectore, & pulmone pus est, fortissima, quæq̃ maxime dissecant pharmaca, taliq̃ omnino quæ si ulcus in uentriculo esset, ipsum exacerbarent. Quinetiā q̃ hæc per tussis expurgentur, non aliunde quàm ex forma particularum est desumptū, q̃ he nullum tale exitū habeant, qualē uterus, uelica, sedes, auris, nasus, & os. Hinc etiā sit q̃ uentriculus utrinq̃ expurgari possit, sursum per uomitū, deorsum secundū naturā. Quippe hoc genus indicationū ab instrumentalibus quatenus instrumentalia sunt, est sumptū. sicuti quæ siccandū esse docent, ab ipsarū simulariū substantiā sumuntur. Ab ipsis uero morbis rursus tales, ueluti ab ulceribus (quoniā de his disputatio erat) & q̃ siccanda sint, ut supra est comprehensum. & q̃ qui ē uētriculo eluere pus uolunt, non sine periculo uomitū mouēt, sicuti si aliter infixi illi pituita per oxymeli ac radicalum detergerent, sed tutius deiectione utuntur, cum uomenti

periculū sit, ne & quod exulceratū est, dissaceret, & succū quempiā inutile ex uicinis attrahat. Quo nomine (ut dixi) & ulcera quæ pulmoni insident, difficillima sanatu sunt: ut quæ nec citra tussim expurgare possis: & si tussim excites, laceraueris. Itaq̃ quasi per mutuas operas, malū ijs in orbē redit. quippe cum quæ laceraata sunt, rursus phlegmonem excitent: secundo rursus phlegmonem ipsam maturari, & pus expurgari desiderat. Quare ex omnibus sanandi difficultas his exoritur. & q̃ ea quæ idonea ulceribus medicamenta sunt, contingere ulcus, sicut in uentriculo, nō possunt. & q̃ per medium interuallum ferē uim suā amittunt. & preterea q̃ respirādo pulmo semper mouetur, & tussiendo laceraat. Itaq̃ cum in pulmone ruptū uas est, scire aperte licet, nisi protinus anteq̃ phlegmone exciteretur glutinatū sit, id postea insanabile fore.

12 Caterū, ulcera quæ in asperæ arteriæ interiorē sunt tunica, & potissimū quæ summæ eius parti quam *ἀσπυργα* uocant, sunt uicina, aut etiam in ipsa, hæc & curationem recipiunt, & nos nō paucos eorū qui ita sunt afflicti, sanauimus. Sanæ curationem eorum hinc maxime inuenimus. In grauis huius pestilentiæ initio (quæ utinam aliquando cesset) iuueni cui dam, cum nouem iam dies egrotasset, totum corpus ulceribus scatebat, ueluti omnibus ferē qui euaserant. Eo die etiam tussiebat paululum. Postridie uero ubi se lauerat, ilico & uehementius tussit, & tussi expulsi crustulam, quam Græce *ἰσχυρίδα* uocant. Eratq̃ homini sensus manifestus ulceris in aspera quæ in collo est arteria, prope iugulum natū. Quin aperto quoq̃ hominis ore, fauces eius inspeximus, nunquid in ijs alicubi ulcus esset, sed nec sic inspectantibus apparuit ulcus, & planē laboranti sensus eius aliquis manifestus ex comestorum bibitorumq̃ trāitu fuisset, si illic ulcus fuisset. Quinetiam ex aceto, & sinapi, certioris notitiæ causā, quædā ei deuoranda dedimus: sed nec horū quicq̃ eum momordit, & sensus doloris manifeste in collo erat. Quo loco etiā adeo irritabatur, ut tussire impelleretur. Sualimus itaq̃ reniti quātū posset, nec tussire. Quod et fecit, eo certe facilius, q̃ exiguū erat quod proritabat. et nos omnib. modis operā dedimus, ut ulcus ad cicatricem perueniret, foris medicamentū aliquod quod dissaceret imponētes: tum cubanti supino humidum aliquod ex ijs medicamentis quæ ad eiusmodi ulcus facerent, exhibentes: ac iubentes id in ore continere, paulatimq̃ permittere in asperā arteriā defluere. Sic igitur faciens, sentire se manifeste aiebat adstringentis medicamenti circa ulcus uim: siue ea uis huc per distributionē transmissa est, siue medicamē ipsum roris specie in arteriā ad ulcus defluxit, & tanq̃ percolatū est. Erat autē nec æger ipse medicinē imperitus, sed ex ijs quidā qui ex usu, & exercitatione empirice medicabant. Ergo sentire se aiebat, tū medicamentū in arteriā defluere, tum tussim quoq̃ aliquando mouere. Obluctabā tamē plurimū, ac tussim cohibuit. Ignit ipse quoq̃ sua sponte Romæ quidē ubi correptus fuerat, triduum etiamnum post nonū diem est mortuus.

status post hoc confcensio nauigio, primum per flumen ad mare nauigauit. quarto die post nauiperuenit ad Tabias, usufq; est lacte, quod & mirificaplane uim habet, nec sine causa prædicatur. De cuius usu aliquid dicere oblatum nunc tempus uidetur: nec de eo tantum quod apud Tabias habetur, uerum etiã alio omni. Neq; enim ijs modo qui Italiani incolunt, est succurrêdum: sed quoad fieri potest, qui ubiuis habitant gentiũ. Igitur ad lac quod in Tabijs habetur, cõmendandum multa concurrunt, & locus ipse satis editus, & aer illi circumdatus siccus, & pascuũ pecoribus salubre. Atq; hoc quidem alibi quoq; arte præparare licebit, si quis in colle modice edito herbas fruticesq; serat, qui salubre simul adstringensq; lac reddant, quorum exempla paulo post dicentur. Cæterum, ut ambientem aera similem reddas, fieri omnino nequit. Eligere tamen simillimum ex ea quæ datur aerum copia licet. Simillimus autem is fuerit, cui eadem adfunt quæ illi. Altitudo collis mediocris, uia à mari ad ipsum xxx. stadia, ampliusq; aliquid, sed non multo. Locus autem ipse uersus mare. Nempe Tabia in imo maxime sinu est, qui inter Surrentum, & Neapolim conspicitur: magis tamen in latere quod ad Surrentũ pertinet. Porro totum id latius collis est satis magnus, lōgitudine ad Tyrrenum mare potius cõfusus. Inscritur autẽ leuiter collis hic ad occasum: nec in meridiem in totum planè protrahitur. Ergo hic collis à uentis ijs qui ab ortu flant, Euro, Subsolano, & Borea, tutum defendit sinu. Cõiungitur illi in imo sinu alter collis nō paruus, quem & ueteres Romani in historijs, & qui nunc diligentiores sunt, Vesuuium nominant. Celebre nunc nouumq; nomen Vesbiũ est, omnibus hominibus notum, propter ignem qui in eo ex terra summittitur. Quæ res non parum mihi ad ambientis aeris siccitatem conducere uidetur. & alioqui præter ipsum ignem, nec stagnum propinquum, nec palus, nec fluuius alicuius momenti usquam in sinu habet. Omnibus uero uentis qui ab Arcto ad æstiuum occasum perflant, Vesuuus collis obijcitur, multusq; cinis ab eo ad mare usq; peruenit, reliquæ uidelicet materiæ, tum quæ in eo combusta est, tum quæ nunc etiam uritur. Omnia hæc aerem efficiunt siccum. Licet porro & alibi terrarum eligere collem simili modo siccũ, scilicet nec longe à mari, nec adeo magnũ, ut uentorũ impetui sit expositus: nec adeo humilẽ, ut subiectorum camporum halitum prompte recipiat. Caueatur autẽ ne ad Septentrionem sit uersus, ita enim esset auersus à sole. Quod si etiam in temperato orbis loco collis sit, ueluti is qui ad Tabias cõspicitur, longe magis ad rem pertineat. Hoc in colle sunt o herbæ quidẽ agrostis, & lotus, & polygonon, & melisso-phyllos. Frutices uero lentiscus, & arbutus, & rubus, & hederæ, & cytisus, alijq; his similes. Atq; ita tibi collis præparetur. Pecora uero quæ in colle ad Tabias pascuntur, boues sunt. Estq; eius animalis lac spissum, ita ut afinorum tenue. Ego uero ne qd lacis genus usui desit, ex uaccis crassum, ex asinis tenue, ex capris medium; & boues, & asinos, & ca-

præ in pascua depulerim. Veteres uero etiam mulierem lactantem ijs qui phthoe consumerentur, addare uoluerunt. Quorum sententiæ ipse quoq; accedo, & quod familiare id sit, & quod priusquã ab ambiẽte refrigeretur, id sumi uoluerint. Porro hoc tibi de lacis usu pro maximo præcepto sit, ut ij quibus eo est opus, omnino id astante animali statim mulctum bibant; etiam melle infecto, si cui cogi in uentriculo solet; quod si ipsum descendere ad aluum citius cupis, etiã sale. Atq; ille quidem adolescens cum ulcus in arteria ex pestilenti morbo haberet, sanatus est: ac post eum similiter alij. Alter uero adolescens annos natus circiter decent & octo, cum multis diebus ex destillatione laborasset, primum quidẽ sanguinẽ floridum cum tussis expuit, non sanè multũ; postea uero etiam tunica ipsius partem quæ tegens intrinsecus arteriam, in fauces & os per ipsum arteriæ caput (larynga uocant) ascēdit. Videbatur autem mihi tum ex crassitudine eius coniectanti, tum ægri sensu, ipsius laryngis esse interna tunica. Quinetiã lasa illi ex eo uox est. Atq; hic quoq; longiore quidem tempore, sed tamen sanatus est. Cæterum qui ex pestilentia hoc uitio laborarunt, propterea mihi facile sanati uidentur, quod præscicatũ ijs præpuratumq; totũ corpus fuerit, quippe cum & uomuerint ex ijs nonnulli, & omnibus uenter profluxerit. Atq; cum ita iam uacuati essent, ijs qui euasuri erant, pustulæ, quas exanthemata uocant, nigrae toto corpore confertim multæ apparuerunt, ulceroas quidẽ plurimas, omnibus certe sicca. Eratq; intuenti per spicuum reliquias eas esse sanguinis, qui in febris putruerat, quas ueluti cinerem quempiam natura ad cutim trussisset; sicuti alia ex superuacuis nonnulla trudit. Verum medicamentis ad eiusmodi exanthemata opus non fuit, cũ siderent sua sponte. Ad hunc modum alijs quidẽ, quibus uidelicet exulcerata summa pars fuit, decidit ipsa ulceris crustula, quam ephelcida nominant, deincepsq; quod reliquum fuit, propinquũ sanitati erat. ac post unum duos ues dies ad cicatricẽ peruenit, alijs, quibus scilicet ulcerata summitas non est, exanthema quidẽ ipsum, & asperum, & scabiosum erat: decidit uero ueluti squamma quædam. ac dehinc omnes fuere sani. Nihil itaq; miri si etiam ij quibus eiusmodi exanthemata in pulmone sunt orta, propter ulcerũ siccitatem sunt sanati. Quod namq; in ceteris ulceribus uniuersis supra monstrauimus curationis esse propositum, hoc iam ijs quæ ex pestilentia sunt orta, præstò fuit. Omnia namq; sicca, & aspera fuere, plurima quidem scabiæ, quædam uero etiã lepræ similia. Ergo cum experientia rationis attestetur ulcerum curationem hunc unum habere finem, ut siccetur, poterit quispiam ex ijs qui sanguinẽ ex pulmone reijciunt, seruare permultos, ita, ut nos fecimus. Ac quemadmodum quidem medidum ijs sit qui notabile in pulmone uas fregerunt, inde adeo quod ab alto sint lapsi, uel immodice clamarint, uel pondus supra uires sustulerint, uel qd durum & graue magnitudinẽ aliquid extrinsecus ipsorum pectori insiderit, dictum prius est.

13 Quemadmodū uero qui ex catarrhō sanguinem reijciunt, commodissime trañetur, nunc dicemus, propōita claritatis causa curatione, quā Romē in splendida muliere pereginus. Hęc nam que cum eiusmodi sermones audisset, quales nūc de ijs qui sanguinem ex pulmone reijciunt, habuimus, deinde cum ex catarrho quodam, aut tussis uehemētis, paululū quiddam per noctem exuisset, illico ad me misit, sese obsequuturam promittens per omnia, quicquid tandem ipsā facere uellem. Audierat uero ante id tempus, nisi quis ilico præsidiū strenue afferret priusquā ulcus phlegmonem contraheret, eum operam amissurū: atque hanc esse præcipuā eorum qui sanguinē reijciunt, interitus causā. Igī incidere mulieri uenā, quæ iam quatriduum propter catarrhum propemodū sine cibo egisset, non placuit: sed iussi ut acri utere tur clysteri, tum crura manusq; calcificēt phar-maco plurimum fricaret, & uinciret, mox caput raderet, cui deinde medicamen quod ex palumbium stercore constat, imposui, interpositisq; tribus horis in balneum duxi, ac laui, nullo caput cōtingēs pinguī. Dein caput idoneo pileo cōtexi, & pro eo qui tum erat temporis statu, nutritiū sola sorbitione. Postquam statim fructum aliquem autumnalium austerū dedi. Deinde cum dormitura esset, quod ex uiperis conficitur medicamentum dedi [theriacen uocant] circiter quatuor menses ante cōfectum. Habet enim id ætatis adhuc prævalentem papaueris succum qui in antiquatis ignauus redditur. Ideoq; & somniferū est, & fluxiones tum siccāt, tum leuiter crassat. Finito uero prorsus catarrho, liquido apparebat, tum ex respirandi specie, tum sonitu semel excitata tussis, pulmone purgatione egere. Caterum, exhibere hanc non placuit secundo saltem die. sed in omni taciturnitate & quiete muliere seruata, tum artubus eius perfrictis uinçisq;, iussi reliquas quoq; omnes partes perfricari, excepto capite, quod adhuc ex medicamēto incalescebat. rursus autem uesperī dedi theriaces ceu fabæ nostratis magnitudinē. Erat uero quod pridie acceperat, hoc lōge amplius. Postea uero q̄ hac quoq; nocte probe dormiuisset, tertio die mane mel cōctū exhibui, ac diligenter in quiete seruauī. Procedente uero die totū corpus similiter perfricui, ac præsana cremorē cū pane exiguo pro cibo sumere iussi. Mox quarto die mane quidem dedi medicamentum, quod ex uiperis fit, sed quod iam in ætate uigoris esset, idq; cum optimo melle. Capiti uero mulieris eodē pharmaco (q̄d uehemēter tum siccāt, tum calefacit) imposito, ac deinde ipsa lota, nutritaq; modice ualentius iā pulmone expurgare in quinto sum aggressus. Ac dehinc rursus rursumq; ex intervallo ad caput quiddē cōsuetō cerato quod thapsian recipit sum usus. Totā uero corporis curā, in gestatione, frictione, ambulatione, lauandiq; abstinentia, ac uictu, tum moderato, tum uero boni succi, ad reficiendū direxi. Hęc itaq; mulier recte se habuit, minimelactis opē requirēs. Alteri uero adolescētī, cui nō ex destillatiōe, sed ex refrigeratis spiritus instrumētis or

A ra tussis fuerat, cum sanguinē & ipse ad dimidiā heminam reieciisset, statim uenam incidī, ac bis eodem die ex ea sanguinē detraxi; deinde rursus postridie bis, sed artuum frictione & uinctura priore die usus, ad uesperam dedi pharmacum nostrum quod, dialpermaton dicitur. Secundo die postalteram detractionē imposui toti pectori ceratum, quod ex thapsia conficitur; mox uesperī, nē supra modum calfaceret, id auferēs. Tertio die rursus ad tres horas imposito, hominē laui. Cibauī autē similiter tribus his diebus: prioribus quidē duobus, sorbitiunculis, tertio uero præsana primum cremore, deinde pisce statim aliquo qui & facilis concoctus esset, & simplici ratione preparatus, adiecto. Deinde quoq; medicamentum dialpermaton, & secundo, & tertio die similiter ad uesperā. quippe quod & somnum conciliat, & sensum doloris eleuat, & siccandi uim habet. Tum uero cum & spiritū de-legata partes in naturali temperamento essent, & totum corpus uacuatum, ac nulla phlegmonesuspicio circaruptū uas superesset, expurgare cepimus. Mox bibito medicamento quod uiperashabet ætatis iā uigētis, ad Tabias dimidi. Sic ego oēs qui primo se die mihi curādo permiserunt, sanauī.

14 Qui uero post duos, aut tres, non omnes; sed aliquibus eorum insanabile ulcus fuit. Quotquot autem phlegmone sic occupauit, ut iam febricitaret, horum nullus est in totum persanatus. Sed qui postea sic per omnia præsidia rite transierunt, ut siccaretur ulcus, ij tantum saltem lucrifecerunt, ut illud nec ultra progredere-tur, nec maius fieret, sed siccatum, ac callo duratum, longiore uita frui hominē sineret. Ex ijs uero qui ulcus in pulmone habent, ij demum insanabiles mihi esse uidentur, qui ex succi uitiosi erosione id possident, quorum aliqui ceu salislaginem sputum suum sentire se aiunt. Nam lōgo arbitror tempore omnino opus esse, ut succi corrigitur uictum. In tempore uero necesse est duorum alterum, aut siccando ulcus, ceu callum fieri, eoq; fore omnino insanabile: aut non siccādo, tū ipsum putrefcere, tū quæ circa sunt depascere, atq; ita spatio pulmones putrefacere. Porro multi ex ijs qui eiusmodi succū uitiosum congelessent, cum ex eo tussirent, nō tamen etiānum sanguinē reijcerēt: huic nostræ prouidentiaē compotes facti, prorsus sunt persanati. Oportet autē in principio nullius rei æque esse sollicitū, quā ut neq; tussiat, neq; ex capite aliquid in pulmone defluat. Cauetur id triplici præsidio. purgatione primum, secundo medicamine quod dialpermaton dicitur, tertio ipsi capiti prouidendo. Quod purget, diuersas facultates habeat oportet, cuius generis nostræ sunt pilulæ quæ ex Aloe, Scamonia, Colocynthide, Agarico, Bdellio, & Gummi Arabico conficiuntur, ad plures uidelicet excrementorum purgandas species. Sanē satisfaciāt ad usum, & quæ sine gūmi cōponunt. Postea uero si res postulabit, etiā ijs quæ nigrabilem expurgent, utare. Capiti prouidebitur cerati usu q̄d fit ex thapsia. Atq; hæc quidē in principio peragenda sunt. post uero reficiendus æger salubriter est cibis boni succi

fucci, frictione, inambulatione, & balneo. Traditur autē de his methodus in idoneo operis loco. Porro ijs sunt qui maxime lac requirūt, neglectoq; eo, omnium maxime sunt insanabiles. Caterum, de mittendo his sanguine scire illud licet. Quicumque parū habere sanguinis uidebūt, ijs ad quandam succum probiorem (sicuti prædixi) reductis detrachere sanguinem poteris, tum rursus reficere, eosdem etiam rursus purgare, ac rursus reficere. denuoq; si res suadet, sanguinem mittere, potissimum quibus ueluti limus quidam uitiosus, & crassus totus est sanguis. At qui ualidi sunt, multiq; sanguinis, ijs statim a principio est detrahendus.

15 Horum quæ retuli, uel modo, uel ante, siue ea inueni ipse, siue iuxta Hippocratis uia usurpauit, nihil planē nō examinātū, ac iudicio cōprobatū est, sed per experientiā omnia iudicata, in quibus erroris pericula ipsi perulimus. Fructū ex eorum usu habituri sunt quibuscūq; artis opera sunt cure. Siquidē alij ueri sunt, alij sophistarum sermones. Quanquā quid sophistas memoro? Cum etiā non contemnendorū medicorū aliqui, etiā qui in tegra uolumina De sanguinis reiectione prodiderūt, alia quidē multa, et parua recte perscripserint, maximorū autē auxiliorū nullius meminerint, parum intelligētēs per multa illa & parua quæ recte admonent, longū ipsis ægrotis comparandū interitū. Per hæc autē tria, qui plane deplorati non sunt, omnes seruātur: per sanguinis missionē, & purgationem, & ea quæ caput roborant. Sanē in sequentibus cum de succorū curatione præcipiemus, dicemus de sanguinis missione diligētius. Minime igitur (sicuti medicorum nonnulli cēsent) a paruis incipiendum auxilij est. nec sicut illi dicunt, sentiendum, ista scilicet prius esse tentanda. mox si nihil profecerint, aggredienda maiora, nam in morbis in quibus periculum non impendit, uera ea opinio est. at ubi moriendum ægro prorsus est, si phthoe semel exceptus sit, alienissimum a ratione est a minoribus inchoasse. Nā sicuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita illa quoq; sententia recte est dicta: nempe ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maxime ualere. Quanā igitur inductus opinione Erasistratus in talium affectuum principio segnissimus tardusq; est, post diligēs cum persingit occasio? Nam sanguinis missione cum sanguis reijcitur, nusquā prorsus utitur, uitiosissima ratione inductus, sed nec purgat quēquā, nec caput siccat. Quibus nimirum si quis phthoe occupari periclitātes fraudet, quāuis reliqua omnia probe peragat, nihil plus arctum agat. Nam sanguinē mittere recusat, ac solis artuū deunctionibus ad eum auocandū utitur, quod (ut ipsemet ait) ad phlegmones tempora sat nobis sanguinis superest, nec propter inopiam eius ægrū nutrire cogamur. Sed heus tu Erasistrate, dicat arbitror aliquis, si post ueniam ruptā phlegmone iam pulmonē occuparit, nō est quod speres hominē sanandū, propter ipsas quas paulo ante cōprehendirationes. Quare amplius opera tua non egebit, proditus uidelicet per te in ter initia. Quippe idē facis quod gubernator, qui

ubi per eius incuriā euerla nauis est, uektorū cui piam asserem in manum dat, indeq; salutē comparare suadet. Sed Erasistratus fortasse existimabat phlegmonē esse ex ijs quæ necessario uulnus committentur. Verum si ita sentiebat, in magna planē erat ignorantia, cum uidere cuiq; liceat sexcentis eorum qui quotidie singulari certamine decertāt maxima citra phlegmonē glutinosa uulnera, sic, ut secūdo uel quarto die sint omnino in tuto. Nos uero etiam plurimos ex ijs qui uas in pulmone excasit, clamore, plagā ue rupissent, priusquam phlegmone in uale rupto excitaret, curauimus. Quod si horum quoq; pulmones phlegmonē inuasisse asserit, ipse suis ipsius placitis repugnat, simul princeps uiscus quod maxime uicinum cordi sit, phlegmone laborare affirmans, simul hominē febri carere, itēq; rupta phlegmone nihil expuisse. Ergo a nobis quoq; inuicē audiat, nec fieri posse ut glutinetur ulcus si phlegmone pulmonem inuaserit, omninoq; si inuaserit, febricitaturum, ac purulentum. Ergo si quis nec febricitabit nec tussiet, nec saniem aliquam ex ulcere & phlegmone spuet, quæ ratio est ut huius inesse pulmoni phlegmonē dicas? Itaq; tum hoc maximum certe præsidij nō recte ab eo damnatum est, tum purgatio sine ulla mentione prætermittitur. Ac nec ullum pharmacum quod efficax sit, contra ullum ex cōprehensis generibus ab eo est positū. Quin siue caput fluxionem mirat, eo statu seruabitur. siue ex intemperie ipsorum spiritalium tussis incidat, etiā ipsa sic manebit. Ergo Erasistratus statuatio illi adsimilis uidetur, qui reliquis omnibus partibus scite perfectis, statuat reliquit cæcam. Nam quæ, quæso, reliquæ pulchritudinis gratia, cū oculos desideres? Postea si dijs placet, cum tanti uiri maxime aberraret, egregius uir Theffalus, qui artē ne nouit quidē, Methodicum se censet appellandū. Ac nunc ferme omnes sectatores eius sanguinem mittere uidemus, tum alijs ægrotum non paucis quibus non solum non utile, sed etiam noxium existimare id præsidij oportebat, præsertim si proprijs ipsi hypothesibus staret: tum uero ijs qui sanguinem, siue hunc per uomitum, siue etiam cum tussi reijciunt, modo ualentes uires habeant. Sed quomodo cohærebunt hæc secum, ut uenam ubi sanguis reijcitur, incidere iubeant: & in commētarijs suis scribent remedium id adstrictis uitij conuenire? Ergo ne se Methodicos amplius nominent, sed Empiricos, si eiecta ratione quam esse rectam putabant, experientia utuntur ad inueniendā præsidia. An igitur in ijs quidem clare deprehenduntur nec Methodo, nec omnino ratione aliqua quicquam facere: ubi uero partes inutiles esse ad curationis inuentionem aiunt, non multo magis? At qui si quis ad memoriā reuocet ea quæ de auribus, naribus, oculis, ore, pectore, pulmone, prætere uero, uesica, & uentriculo, diximus: errare eos tota uia uidebit. Talis igitur erat qui ad phlegmonem quæ in pudendo erat macedonico medicamento est usus, ac cum eo etiā cataplasmate quod

relaxandi uim habebat, nempe solenni hoc quod ex pane, aqua & oleo conficitur. Etiam alius quidam illi persimilis, qui ad sedē exulceratū isidem est usus. Verū de talibus ubi de phlegmonis disputatione agemus. Cæterum ulcera quæ citra phlegmonē in pene sedē ue cōsistunt, nullum cataplasma desiderant, sed medicamentum quod cicatricem inducat. nō tamen hecules eius naturæ quæ ulcera quæ in carne sunt inducere cicatrice possit, immo quæ tanto magis siccare possit, quanto hæ partes sunt carne sicciores. Quinetiam quod magis admirare, ipsorum quæ in pene sunt ulcerum magis etiam siccatū postulant, & quæ in toto cole hæserunt, & quæ extra hunc etiam finem eius qui glans dicitur infestant; minus uero quæ in præputio sunt; atq; etiam his minus, quæ cūq; in reliqua sunt cute, quæ totum colem uestit. Cum igitur humidum in glāde ulcus quidam ex amethodis istis medicis, istis inquam Thessalijs, sanare aliquando non posset medicamentis istis quæ epulotica uocantur, id est quæ cicatricē inducunt, adhibuit in consiliū me. Vbi igitur ex me audiuit longe sicciorē medicamentum particulam egere, propterea quod siccioris naturæ esset, primum non credidit. ut uero coactus necessitate est aliquo ex nostris medicamentis uti, tribus diebus sanatum ulcus est. perspicuumq; erat medicum non tam fuisse de salute hominis lætatum, quā inde adeo tristatū quod

in mala disciplinæ secta fuisset educatus. Siquidē medicamentum quod ex papyracea charta combusta fit, hoc scilicet nobis usitatum, id genus ulcerum sanat. sicut etiam anethum usum simili modoinspersum. itemq; cucurbita siccatq; usta ad eundem modum. alia præterea multa ex istis quæ uehementer sicut illa siccant. Si qua uero eiusmodi ulcerum sine dolore sunt, ac recentia, istis sola aloelutare medicamen est. Inspergitur autem sicca, sed in tenuissimū ceu pollinem redacta. hæc uero etiā quæ in sede cōsistunt sicca ulcera probe percurat. Simillimam huic uim habet & cadmia uino elota, & sicca. Ab hac quoq; nō longe absit argentisputum *αργεντιν* Græce dicta. Deinceps uero molibdana sequitur. Omnibus uero tum minus inferēs doloris, tum nullo minus efficax pompholyx est. Sin humidiora sunt, ipse per se pini cortex, itemq; lapis hamatites idoneus est. Quod si profunditas quæpiam ipsi adsit, ubi exiccata fuerint, dictorum alicui tantulum mannæ admiscendum est, quantum sit ad carnem gignendam satis. Neq; igitur horum quicquam uel per somnium norit, qui istius sunt alienæ a methodo sectæ, cum omne ulcus, in quacūq; animātis sit parte, eandem postulare curationem opinentur; neq; etiam quemadmodum fuere quædam ulcera oporteat, uelut ea quæ in abdomine contingunt, de quibus in sequenti libro cum istis quæ restant uniuersis, agetur.

ARGUMENTVM LIBRI SEXTI.

Caput 1. Vlcis indicationem esse unionem: & q̄ in diuersis partibus unionis solutio diuersis nominibus appellatur: in nervo tamē arteria, & uena secūs propriam appellationem non habet. De nominibus nō oportere esse sollicitum. Contra Thessalum. 2. Curatio simplicis compunctionis in nervo, Quod eadem dicamenta postulet, quæ & tepidum calorem excitent & ualenter siccant: quæq; substantia sua trahendi uim habeant, & cum hoc sint partium tenuium. 3. De nervis non punctim sed cæsim uulneratis. Contra Thessalum. De transuerso nervi uulnere. De nervis contusis. Nervus totus præcisus curationem communem habet cum ea quæ aliorum est ulcerum. 4. De medicamentis quæ syndesmi, id est ligamenti solent mederi: & alijs nervæ naturæ partibus, ut sunt nervi, tendones, abdomen, omentum, & intestina quouis modo ulcerata. 5. Prolixo hoc capite Galen. primum tria

osium continuitatis solutionis discretæ nomina (canlidon, schidacidon, raphanidon) interpretatur. Fracturæ curandæ finis primus est unio. Secundus, si per siccitatem partium uniri nequeunt, interuentu alio glutinentur: Quod si hoc etiam fieri non possit, malum est insanabile. Deinde in transuersis & longis fracturis deligatur uim modos proponit, & perspicue tradit qua arte fieri queat, ut fracturæ uel per unionem, uel per porum, uel sine poro coalescant. 6. Fracturæ caluariæ quomodo curentur tum per organa tum per medicamenta apposita.

Aliter.

Methodus curationis quæ debetur nervis, & tendonibus uulneratis, punctis, contusis, & denuclatis. De uulnerib. quæ in peritonæo sunt. De interiorib. peritonæi uulneribus quæ uicq; ab abdomen & omentū pertingunt. Curatio affectū qui ob istibus accidit.

GALENI METHODI MEDENDI, ID EST

DE MORBIS CURANDIS

Liber sextus.



NON dubito fore nonnullos quib. esse prolixo uidebōr, qui unum hactenus morborum genus, quemadmodum methodo curetur, exponam. Par est autem non tam nihil longitudinem hanc imputet, quam istis qui parum intelligentes quæ rectissime ab Hippocrate sint scripta, ea calumniari sunt conati, quos ne quemadmodū ulcus quidem recte curent, scire ostendit: nedum

quod maius sit quicquam. Atq; ipsum quidē morbi genus, cuius una species ulcus est, seu continuitatis, seu unionis solutionem uoces, nihil referat. illud monstratum est, methodum curandi eius, in quocūq; corporis membro sit, quæ quidem ab affectu ipsō sumantur indicationes seruare communes: quæ uero ex partibus præbeantur, alias atque alias habere. Cum enim in carnosis particulis inciderit, nominatur quidem ulcus. habet uero curationis indicationem omnium quidem quæ præter naturam sunt cōmunem, sui scilicet ademptionem

nam quam uero cetera affectus praestat, ut per con-
 traria tollatur. quam ut diuisio est, unionē. Quip-
 pe generatio huius uitij in diuisione unitatis con-
 sistit. Ideoq; in osse uocatur fractura, Graece *λάρα*,
λαρα, in nervosis fibris *καρσγνα*, in musculis, ulcus
 & ruptio, quoniam differentia prius iam dicta est.
 Idem tamen morbus cum in neruo & arteriam,
 & uenam ineiderit, nullam propriam appellationem
 est sortitus. mutuatur aut interdū ulceris, in-
 terdum uulneris uel rptionis appellationē. Cate-
 rum parū esse de nominibus sollicitū debere eū cui
 rerum scientiam inuenire sit positū, saepe iam
 diximus. Itaq; huc potius nominib; neglectis pro-
 pretemus. quando non ex horum exquisita im-
 positione, sed ex appositis remedijs aegro salus pari-
 tur. Rursus igitur reuocandum ad memoriam est
 quemadmodū audacissimus Thessalus, cum nul-
 lam curandi ulceris methodum tradiderit, omnes
 tamen dixisse se arbitrat. Siquidem quod sinuo-
 sum ulcus postulet, impleri, & simplex glutinari,
 haec nec idioris sunt ignota. Quemadmodum ta-
 men methodo quis pharmaca inueniat, quibus
 uel impleatur quod sinuosum est: uel glutinetur,
 quod simplex est, haec uulgus non nouit. at id est
 quod medicis considerandum proponitur, atque
 in eo alius alio est praestantior. Quippe ueluti in
 praecedentibus ostendimus, & inueniet recte re-
 media, & inuentis recte utetur quisquis in meden-
 di methodo est exercitatus.

2 Vtenim iam aliquid persequamur quod
 praecedentibus sit deinceps, fingamus quempiam
 ad nos uenire cui tantū cutis acu sit puncta. Hunc
 hominem, si sit lit cui facile ulcera nascantur, etiam
 si citra medicamentum nudoq; membro ad opera
 consueta dimittas, nihil sentiet mali: sin cui difficul-
 ter sanentur, primum quidem dolebit. post etiam
 tum pulsup particulam infestabitur, tum phlegmo-
 ne. Ac Empiricus quidem examinando percon-
 tandoq; hominis naturā discet. Nos uero tum ex
 eiusmodi examinatione omnibus his, uis quae per
 experientiam inueniatur: tum nihilominus ex ijs
 notis quas de boni succi malisq; naturis habemus,
 praeterea de ijs qui acris hebetisq; sunt sensus, tum
 plenitudine grauitas, modiceq; se in succis habē-
 tibus, nō ignari q; qui uel plethoricus est, uel uitio-
 sis succis premitur, uel acris est sensus, uel horum
 quibuscūq; omnibus ue premitur, phlegmone ten-
 tabitur. qui contra est affectus, nihil mali sentiet.
 atq; hec prospicientes, non equidem medicamen-
 quod glutinet imponemus, cuiusmodi plurima
 sunt eorū quae enagma uocant, (ea sunt quae recen-
 titus statim applicatū uulneribus) imō molle &
 blandum, & quod dolorem mitiget. siquidem ubi
 magna diuisio est, ibi studium impēdi debebit, ut
 magis siccatisq; remedijs labra ulceris uniantur,
 atq; coalescat. ubi aut acu stilō ue facta diuisio est,
 id duntaxat curandum est, ne phlegmone particu-
 la tentetur. Atq; ex hoc manifestum est cruentorū
 ulcerum indicationē, quae à Thessalo est pro-
 dicta, nihil nos maius adhuc docere, quam sit euili-
 bet ē plebe notum. Nō enim scire quid fieri opor-

ter, id magna res est, ut quod omnibus hominibus
 natura inlit, sed quibus rationibus illud efficias, id
 uero scire artificium est. Nam si nauem quispiam
 sit aedificaturus, scimus profecto omnes, etiā qui
 nauium fabri non sumus, quo loco poni guberna-
 cula debeant, quo loco puppis, quo prora, ac reli-
 quorum quiduis. ceterum nihil nobis haec ad rem
 conferunt, utpote nescientibus quemadmodum
 ipsa struantur. Aequē & qui aedes molitur, utique
 nō ignorat nec quod facienda primum parietum
 fundamenta sint, nec quod super his erecti mini-
 meq; inclinantes erigendi sint parietes, nec quod
 super his strui tectum oporteat, nec quod ostia, &
 fenestrae, singulaq; reliquarum domus partū pro-
 prijs collocandae sint locis. uerum haec ad domum
 aedificandam quid conferant, quoad ipse fabrilis
 artis ignarus ea fabricare nesciat. Vni igit Thessa-
 lo omnium hominum sapientissimo, nosse quid
 fieri oporteat, ad artificiosam notitiā satis esse ui-
 detur. Sed nos per superioris cōprehensā monstra-
 uimus id esse operū quae ex artibus expectetur,
 ueluti principium quoddam, nōdum aliquam eo-
 rum propriā partem, sed quae etiam sit cuius ē ple-
 be communis. Quippe primae in omni arte indica-
 tiones omnibus hominibus natura sunt praestō.
 Quare si haec satis sunt ad opifices faciendos, nihil
 uetat quin & naues ipsi aedificemus, & materiam
 fabricemus, promptumq; sit omnibus tum calce-
 os facere, tum uestes, tum domos, sed & archite-
 ctos esse, & cithara personare, & rhetorici. Ve-
 rum non ita serēs habet. nec qui uulneratē parti
 naturalem unionē esse moliendam nouit, is me-
 dicus est, sed qui quibus id rebus perficiat, intelli-
 git. quanquam ne hoc quidē ipsum per se satis est,
 si quis etiam quo pacto his sit utendū nesciat, sed
 qui uiam omnem curationis eousq; percalluit, &
 ipsum consequi destinatū finem queat, is demum
 est qui mederi nouit. Ergo istis amethodis Thessa-
 li amulus illud accidit, ut cum maiora uisibus au-
 deant, nec ad ea quae consequi alioqui possent, ac-
 cedant. Quippe cum dudum stilo quidam uulne-
 rarus in manu esset, ita ut tota diuisa cute aliquid
 neruorum qui suberant, pungeretur, sapiens scilicet
 Thessalius in principio emplastrū quoddā im-
 posuit, quo saepe in maximis uulneribus usus pro-
 sperare fuerat. Putabat em̄ (arbitror) omne uulnus
 eandem curationem requirere. Phlegmone uerō
 oborta, ad cataplasmā quod ex farina tritici com-
 ponitur se conferēs, atq; interim hominē tabefaci-
 ens, intra septimū diem iugulauit. Nec sanē cōpre-
 hendere numero est, quae quot, ubi in Pagonias istorum
 manus incidere, conuulsionē perierint: quo si dijs
 placet, sanctio illa Thessalia seruetur, omne cruen-
 tum ulcus similiter esse curādum, idq; partibus ijs
 quae laborent, nullam indicationē conferentibus.
 Ceterum uera ipsa methodus, non perinde atque
 haec Thessali est amethodos: immo potest uel nūc
 etiam post tot tantosq; medicos non solum melio-
 ra medicamenta quam prius fuisse, sed etiā uiueri-
 sum curationis modum inuenire. Nemo enim sta-
 tim ab initio ijs usus quae nos inuenimus, ex nerui
 uulne

uulnere in conuulsionem incidit. Aduertit namq[ue] ubi punctus nervus esset, ei exsentiendi quod obtinet acumine, necesse esse tum dolore incidere, quam reliquis partibus maiorem, tum ex necessitate phlegmonen consequi: nisi quis et medelam dolori inueniret, & phlegmones generationem prohiberet. Rationabile igitur mihi est usum, cuius quidem uulnus apertum inglutinatumq[ue] custo- dire, quò per id ex nervo uulnerrato sanies efflueret. totum uero corpus superuacuis humoribus liberare, ac ne quis dolor uulnerratam partem urgeret, in primis sollicitudinē habere. Itaq[ue] etiā medicamenta excogitauim[us] nō pauca, quæ uulneri imposita ad utrumq[ue] mire sunt comparata, tum ut dolorem mitigent, tum ut exitum saniei patefaciant. Tutius uero fuerit etiā si quis cutem latius incidat, ac totum corpus sanguinis missione inaniet, utiq[ue] si fortis sit uirtus. Si uero uisiosis succis repletum corpus sit, protinus purget. Aqua uero calida quanquam reliquas phlegmonas ualde mitigat, uulnerratis tamen nervis est inimicissima, cum praesertim eorum substantia ex refrigerata concretatq[ue] humidior materia sit condita. Omnis enim eiusmodi constitutio per ea quæ simul calefaciunt & humectant, resoluitur ac putrescit. Itaq[ue] ab aqua calida eos qui ita uulnerrati fuerant, omnino prohibui, utilius iudicans oleo calente fouere, propterea quòd demonstratum à me est, hoc quoq[ue] si frigidum applicetur, tenues meatus obstruere; sin calidum, digerere. Porro fugi ex huius quoq[ue] generibus & crudum, quòd *ἀσπις* Græce dicitur, & quod deniq[ue] adstringendi uim haberet. Delegi autem tenuissimum, cuius generis Sabinum est, quod etiam utilius fuerit, sibi uim trimum ue sit. Quippe id quam recens magis per halitum digerit, quoq[ue] magis est antiquum, hoc semper magis digerere est potens: uerum dolorem minus sedat. In pharmacis autem huc omne consilium direxi, ut esset eorū facultas tum tenuis, tum modice exca- lfaciens, & quæ siccare citra dolorem posset, cū sola hæc trahere ex profundo saniem, neq[ue] cōtracta neq[ue] demorsa particula possit. usum sum autem primum terebinthina resina, tum per se, tum etiā paulum euphorbiæ admiscens. Et per se quidem in pueris, & mulieribus, & generaliter ijs qui molli essent carne. Cum euphorbio uero in ijs qui dura. Non secus autem & propoli, non per se modo uerum etiā cum euphorbio ipsam molliēs. Quod si durior esset, cum tenui quopiam oleo. Quin & sagapeno in duris corporibus sum usus, utiq[ue] cum oleo & terebinthina id miscens. Sed & opoponace ad eundem modum quo & sagapeno. Mihi uero & lachryma cyrenaica non inutilis fore uidetur, si quis emplastrum ex ea faciat, cuiusmodi est quod nos ex euphorbio composuimus. Verum nondum id experientia, quemadmodum reliqua omnia, cōprobauius. Quippe præcedere oportet eam quæ à uera methodo proficiscitur remedium inuentionem, huic uero experientiam ad certiore[m] etiam fidem subscribere. Si quidem ex tali methodo etiam sulphur, quod ignem exper-

tum nō sit, quodq[ue] lapidiosum nō sit, sed omnino tenuium partium, ei cui nervus uulnerratus esset, conducturum sperauimus, tātum eius tenui oleo miscentes, dum quod ex utriusq[ue] mistum erat, for- dium haberet crassitudinem. In i. ioribus ue- ro durioribusq[ue] corporibus etiam i ad mellis spissitudinē redigas, sic quoq[ue] iuueris. Nam id quoq[ue] comprobatum experientia est. Quinetiam lotam calcem similiter oleo admistam his applicandam excogitauimus. quæ etiam si mari lauetur, magis proficiet. Lauatur optime per aestatem in aestu canicula. Quòd si bis tē ue eam laueris, utilius medicamen efficies. Quo pacto autē talia preparanda sint, ex cōmentarijs quos De medicamentorū compositione edidimus, intelliges. Nisi mihi tantum dixisse sufficit, me tum hæc tum alia multa me- dicamenta aduersus nervorum uulnera inuenisse, cū nec sub aliquo magistro ea usurpata uiderim, nec in ueterū alicuius aut medēdi libris, aut quos De facultatibus cōpositionum ex propria sapien- tia inscribunt, prodita: sed ex ipsa rerum natura in- dicationes sumpserim. Id quod propriū esse medi- ci methodo utētis existimo. Mirificus autē The- salus, cum ne unum quidē medicamentū inue- rit iam pridem materiā eorum notā esse affirmat. Atqui multorum medicamentorū quæ nos exco- gitauimus, non modo Thessalo, & qui ante eum medici fuerunt, materia nota nō est: sed nec ijs qui post eum in hunc usq[ue] diem fuerunt. Si quidē ipse cum accersitis aliquādo essem ad quandam quā Thessalijs istis amethodis medicis putris fuerat fa- ctus, ac cernerem eam cataplasma, quod ex mitea farina sit, impositurum: ubi nullum ad presens mihi medicamentū erat, poposci ex pileario quod- dam quē uideram aegri uicino aquam lixiā: tum coquens in ea farinā hordeacea, non autē sicut illi in oleo & aqua triticeā, imposui. Postea uero fari- nam erui simili modo coctam, iam phlegmone in flammato & putri ex bella horum curatione nervo imponēs, uindicauī ab ea putrefactione hominē. Verū de ijs quæ cū phlegmone putrescunt, alia di- sceptatio sequet[ur], eaq[ue] diffusa in opportuno operis loco. De nervis uero uulnerratis satisfaciāt, quod di- cta iam sunt. Et sanē ex ijs quæ ipsi inuenimus, plu- rimi uno illo emplastro utuntur, quod ex euphor- bio, & cera, & fricta resina est cōpositum. Cuine- scio quomodo aliqui sinopidis aliquid postea mis- cuerunt, aliqui ochrā, quod uidelicet fucatum, un- de componatur, lateret: aegre ferentes, si meum id esse uideretur. Verum non est à principio sic me composuit. Miscuerint fortassis ei nonnulli & e- salis flore aliquid, aut aliud quippiam tale, quod colorem eius immutet, nec uim eius minuat. Po- test quis per ignorantia etiam tale aliquid immisce- re, quod facultatem eius immutet. Verū nos illud ex cera, resina terebinthina, pice, & euphorbio, composuimus, immiscētes ex cera partem unam, ex terebinthina, & pice, utriusq[ue] partis unius dimi- dium, sic ut quod ex utriusq[ue] conflaretur, ceræ par- esset. licet autem interim ut & plus sit quod ex am- bobus miscetur, quam cera. licet rursus et alteram

eorum tantum ceræ admiscere. Quinetiā in penuria terebinthinæ tum liquidam ex dolijs, tum etiam frictam cōmode admisceas, non minus etiam his et abietinā immittas. Strobilina uero duris tantum corporibus idonea est: ad mollia uero immiscenda nō est. Si itaq; liquidā resinā immiscebis tumsum cribratūq; euphorbium reliquis immittes liquatis. Esto uero pondus eius, ceræ pars duo decima, etiam plus aliquādo, ubi scilicet ualentius efficere est in animo. Sin siccam, sicuti quæ fricta est, utiq; olei pusillum desiderabit euphorbiū. Quare ego tum id cum oleo cōtundens, ac ad foridum spissitudinē redigens, mox reliquis post liquationē refrigeratis terens misceo. Sape etiā tantulum aque immiscui medicamēto conficiendo, quantum immistis ipsis liquandis tū absumi, tum euanescere prorsus potuit. Verū omnia huius generis ad tractationē. De medicamētorum cōpositio nemagis attinent. Nunc suffecerit, sicuti antea fecimus, indicatio quale esse debeat medicamēti genus, pauca particulatim exempli causa apponere. Vberem namq; omniū materiā in opere De simplicibus medicamentis inuenies. Preparare autē debebis, ut in opere de eorū cōpositione est traditum. Nunc igitur satis est hoc tantum dixisse, atq; ad alia transire. Vulnerati nerui curatio medicamentis postulat, quæ & tepidum calorem excitem, & ualenter siccent: tum quæ ex substantiæ suæ natura & trahendi uim habeant, & tenuiū sint partium. Sanē non ad medicamentorū modo uictusq; inuentionem ipsa medendi methodus proficit, sed etiam ad ipsum inuentorum usum. Nam ueluti in superioribus ostēdimus, quisquis citra methodū quod ulceri apta medicamenta sunt, molitur, eum ne minime quidem eorum probe uti posse: ita & nunc ostendere licet. Siquidē intellexisse quanto pere affectū uel siccauerit, uel calefecerit, uel miti garit, uel lacerarit medicamentū applicatio, is deum potis est qui methodo quadā curat. idem uero ipse solus etiam intēdere ea quibus inter initia est usus, uel remittere nouit. Cum namq; quod *ali* *supra* *scilicet*, propterea q; euphorbiū accepit, uocant, quidam uulnerato neruo statim imposuissent, idq; subinde prius prospere fuerat expertus, tertio die indicauit mihi uulneratam partem tum dolētem, tum phlegmone tentatam, miratus medicamentū nihil contulisse. Percōtatus igitur laborantē sum, non primo die cum impositum medicamentum esset, calorem quempiam ueluti ex Sole suauem sensisset. is se quicquā eiusmodi sensisse negauit. Rursus itaq; percōtabar & medicū quāto iam tēpore preparatū apud se medicamentū habuisset, ac quos eo sanasset. Ille plus anno apud se habuisset: sanatos uero a se aiebat pueros duos, & adolefcentē unum. Cum autē & de corporis habitu adolefcentē rogassem, albū eum, mollicq; corpore fuisse affirmabat. His ergo auditis, cū intelligerem ut ad propositi adolefcentē tēperiem euphorbiū deesse, postulans tum ipsum emplasticū medicamētum, tum etiā euphorbiū, fumensq; ex his quantū ad ea inter se miscenda satis putauī, iulsi manibus

Galen.

A medicamētum subigere, ac euphorbium diligenter cōtundere, postea q; hæc facta sunt, miscere ea simul fusi. Ipse uero oleum Sabinum utiq; subantiquum modice calefaciens, foui uulneratā partē. Resectoq; leuiter puncturæ quod conuiuebat foramine, imposui medicamē, iniunxiq; hominī in ediam. Medico uero præcepi, ut uesperī rursus eū solueret, ac simili modo quo me uiderat, oleo uere retur. Atq; his peractis apparuit postridie pars ægra & sine dolore, & sine phlegmone. intellexeruntq; qui huic operi aderant omnes, uerissimū esse (quod nos sæpe usurpamus.) non esse adeo magnum quod medicamen præstare possit, nisi nactum sit qui eo dextre utatur. Est autē dexter usus, qui tali planē methodo qualem ipsi iam sæpe in commentarijs qui ante hunc sunt, ostendimus, procedit, omnium medicamentorum usu ad calidum, frigidum, humidū, & siccum, ueluti ad normas relatio. Quam nimirū methodum non solum amethodi Thessali sectatores probe tractare non ualent; sed nec Erasistratus nec alius medicorum quisquā qui corporū elementa, aut prorsus nō inuestigauerunt, aut alia q; quæ comprehensā a nobis sunt, posuerunt. Sed de his hæcenus.

3 Si autem non punctus, sed planē cecidit uulneratus neruus sit, considerandum est quo pacto facta uulneratio sit, utrumne per transfuersum neruum, an per longitudinem eius: tum uero quantū præpositē diuisum sit cutis. Proponatur igitur primum multum esse cutis adaptatū, adeo ut neruus nudus appareat, isq; per directum non per transfuersum diuisus. Huic neruo nullum iam memoratorum medicamentorum quæ ex euphorbio ac si militer acris, emplastri specie fiunt, applicabis. nudatus nanque non feret eorum uim, ita ut cum interposita cutis erat, tulit. Optime igitur eo casu calce elota in multo oleo soluta utere. Salutare uero est & quod ex pompholyge medicamētum sit, si in largo rosaceo sit liquidum. quod utiq; melius fuerit, si tum rosaceum ipsum, tum oleum salis sit expers. Siquidem nudato neruo, omnis curationis consilium huc tibi dirigendum est, ut minima cum mordicatione sices. Possunt uero id præstare planē paucissima medicamenta. Esto igitur hoc casu calx salubri aqua æstatis tempore sepe elota. Esto præterea (ut dictum est) & pompholyx elotus, ita uidelicet ut elotus habetur in eo composito medicamento quo publice utimur, quodq; alia elota in se non pauca continet. Quippe quæ ex metallis consistunt, ea elota esse omnia oportet, si modo citra morsum illum sint siccata. Salubre uero medicamentū est & quod ex melle sub emplastri specie componitur, utique cum ex optimo sit melle. Solui uero & id rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus sit optimū, tum salis omnino expers. Quinetiam ceram quæ eiusmodi medicamentis sit miscenda, elotam esse cōuenit. Aequæ & si quid terebinthinæ resinæ iniicies, hæc quoq; elota sit oportet. atque hac magis si alterius cuiusquā resinæ quid immittes. Quippe medicamentis omnibus quæ laueris,

tom. 6

g acris

acris mordensq; sanies eluitur, atq; abstergitur. Si uero robustus sit qui uulnus accepit, & cui corpus sit à superuacuis humoribus mundum, in hoc fas est etiam ualentioribus remedijs nonnullis uti: ueluti ipse aliquando cum id genus uulneris in carpo accepisset iuuenis quidam philosophiæ studio fuit, alioqui corpore bene habito, & tum in æstiuo sole perusto, ex Polyidæ pastillis sapa solutis, postea super calida aqua tepefactis linamenta imbuta imposui. nam id quoq; uel in primis semper habendum curæ est, ne quid ex ijs quæ uulnus contingunt frigida sit. quandoquidem ipsa laborat pars & sensilis maxime est, & principum partium primati continua, & temperamento suo frigida, quorum omnium occasione & ex facili à frigido offendit, & suâ offensam imperit cerebro. Quod si ex ijs fuerit quæ in musculos perueniant, etiam conuulsione facile accersit. Siquidem monstratum est musculos uoluntarij motus instrumenta esse. Idem fore & in tēdonibus expectabis, ijsdem de causis. Ceterum cum memoratum remedium tum uulneri ipsi iuuenis imposuissem, tum uero partium quæ supra erant, non parum eodē complexus fuisset, quæ circa axillas, collū caputq; eius erant, omnia calente oleo assidue madefeci. Detraxi uero illi & primo statim die sanguinē scarificata uena. In quarto igitur hic quoq; iuuenis recte habuit, adeo ut & rugosum, & paruum, & contractum ulcus iam cerneretur. Veruntamen cōsultius uisum est, usq; ad septimū nihil nouare, post quē diem planē redditus est sanus. Sanē oleo perfundere tale ulcus non oportet, præsertim cum ut nunc cōprehensum est, curæ. Nam oleum pastilli huius uiribus est aduersum, ac sordidū ulcus reddit. Neque enim parum interest, nudōne neruo oleum, an per interpositam cutem admoueas. Abluenda igitur à uulnere sanies est molli lana specillo circū uoluta. Madefacere uero lanam si placet, ne scilicet sicco ulcus attingas, sireum, id est, sapa suffecerit: quam & hepsēma uulgo apud nos in Asia uocant. In hac igitur lanam intingēs, mox exprimēs ulcus detergebis. Esto uero hec quoq; ipsa tepida primis maxime diebus. Quod si omnia ex fentia successerint, etiam uino dulci madefacere citra periculum licebit. uerum dulce id omni mordente qualitate careat, cuiusmodi tum theriū est, tum scybelites, atq; ab his quod caryinū uocant. Quæcumq; uero & dulcia pariter & fulua sunt, ueluti salernum, inutilia sunt. quippe acra sunt talia, ac supra modum calida. Vlcerē uero iam ad cicatricem ueniente, quæ alba planē sunt & tenuia, nec multam aquam tolerāt, nec odora sunt, ea dulcib. præstant. Aquæ uero usum ad neruum uulneratū semper fugies, sicuti etiā relaxans cataplasma. Ad iam dictū uero pastilli usum propē etiā accedit, & medicamētū usus, quod diachalciteos uocāt, quo publice utimur. Liquari uero etiā hoc debet æstate rosaceo, hyeme sabino oleo. Descriptum autē est medicamentū hoc in primo De medicamētorum cōpositione. Polyidæ uero pastillus, uel trochiscus, uel quomodo cūq; appellasse libet, omni

bus fermē notus est. Cuius si copia nō est, Andronis, uel Pasionis, pro eo est fumendus, uel noster, qui etiā omnibus illis est ualentior. Sanē iam dictū est robustis corporib. ualentiora medicamēta, imbecillis mitiora esse adhibēda. Ista & uera methodus inuenit, et experientia cōfirmat. Theſſalus uero cū suis uel sophistis in alto throno residens, & *νεοφυῶν ἀνδράσιν*. i. inter pecunos & brutos homines (ut Cercidas ait) in pretio erit, dū suis rationibus cōfirmat omnis ulceris recentis eandē curationē, neq; hanc ullā ex partū natura indicationem sumere. Vnus tamen magni in eius sapientia nominis, admirandā uulneratorū neruorū curationē excogitauit. nā protinus eos totos præcidit, ne admonito quidē qui uulneratus fuerat, quanq; in hoc quoq; à secta sua desciiuit. Siquidē par erat uel & musculos uulneratos, & arterias, & uenas, & aliud quiduis totum præcideret: uel nec neruū. Alioqui sic qd fugiunt, id facere deprehenduntur, ut diuersam pro discrimine partū indicationem accipiat. Verum hos iam mittamus, ac de transuerso nerui uulnere agamus in quo maior cōuulsionis metus impendit, phlegmone scilicet à defectis fibris ad nō sectas cōmunicata: ceterum cōuulsione ab ipsis nō sectis excitata. Ac quæ ad ulceris curationē attinent, his quoq; sunt eadem. Ceterum, detrahare largius sanguinem, ac tenui magis, quā in illis uti uisū, tum in quiete omnino ac lectulo molli hominē continere oportet, tum oleo calenti ubertim in axillis, collo, tēdonibus, ligamentis, & capite, uti. Quod si uulneratus neruus ex ijs sit qui in crure habentur, sicuti cum in manu erat, alā, ita in his bubones largo oleo imbuendū: tum per totam spinā ad collum, & caput ascendendum. Contusi uero nerui, ubi cum his unā cutis quoq; contusa exulcerataq; est, medicamenta postulant quæ in siccando quidē commune nerui ulcera sanantū cōsiliū seruent, ceterum quæ partes quæ per contusionē à se dissident, contrahere cōstringereq; sint apta. Qui uero absq; cutis simili affectu sunt contusi, hos oleo calente cui euocandi ac discutiendi facultas inest, sapissime perfundere oportet, ac totius corporis similem curam habere. Semel hoc incidere uisū, sannauiq; id mature, ipsa ex oleo perfusiōe. Verum unā cum cute neruos contusos sapenumero uidē & propter eius symptomatis frequentiam atrox ipso usu edocti habent cataplasma quod ex oxymelite & fabacea farina conficitur, quod planē salutare medicamentum est. At si dolor unā cum contusione uexat, etiā picem liquidā immiscere, ac bene concoquere, tum calens medicamentum imponere oportet. ubi uero magis siccās efficere uoles, erui farinā iniicies. Quod si ut amplius quoque siccet desiderabis, irim illyricā immittes, aut myricā. Totius autē corporis cura his quoq; communis est: at si totus præcisus neruus sit, metus prætereā nullus inſtat: mutila tamē particula manebit. Curatio uero eius cōmunis est cū ea quæ aliorū est ulcerum, quamq; unā Theſſali imitatores norunt. Ergo de neruis hec abūde sunt dicta. Phlegmonæ uero

uero quæ his superuenient, quæadmodum curadæ sint, ubi de phlegmonis agemus, docebitur.

4 Ligamenta uero (quæ Græci *συνδεδεµενος* uocant) cum simillimā habeat tendonibus speciem, ualentissimorum remediōrū uim tolerant: quæ nec ad cerebrū pertingāt, & sensus sint expertia. nam nerui omnes alij ex ipso statim cerebro ortum habent, alij spinali interueniente medulla. Tendones quoque quoniam cōpositam eorum esse substantiam ex neruo ligamentoque offendimus, quatenus nerui participes sunt, eatenus ex cerebro oriuntur. Nec uero minus quam ipsi nerui conuulsionem accerunt. Ligamenta uero cum ex ossis ortū habeant, quæcunque rotunda sunt, ea neruis ad similia sunt, duritie tamen plurimum dissident. Verum in eo quod alba sunt, & exanguia, & cavitare carentia, & in fibras diuiduntur, similitudo illis cum neruis, & tendonibus constat. Ergo ubi teretia ligamenta tendonesque uisuntur, qui dissectionū sunt ignari, neruos eos imaginant, potissimum qui multo duriora ea neruis esse nō intelligunt. At ubi lata sunt, ubi ea a neruis diuersa esse intelligunt, quantum nec id quidem omnia. cæterum ipsa a sese discernere nō ualent. Verū tu qui præsertim cuiusque trium partium naturā perspectam habes, tum uero et formam, & quam in toto corpore posituram obtinet: in quocunque membro uulnus fieri contigerit, statim intelliges neruus ne sit quid in eo uulneratum est, an ligamentum, tendōue. Et de nerui quidē ac tendonis curatione iam dictum nobis est. Ligamentum uero uulneratum si id est qui ab osse ad os permeat, & maxime sine periculo est, et quod fissicans quibuslibet medicamentis, nihil hominē offendet. Sin id qui in musculum se inserit, quanto est neruo & tendone minus periculo opportum, tanto utique nisi rite curetur, reliquis ligamentis magis terrere debet. Horum nihil peragimethodo ab ijs medicis potest, qui indicationem quæ a particulis sumitur, utilem esse ad ulcerum curationem negant. nec ab ijs qui id quidem consentunt, sed tamen cuiusque particulæ naturam ignorant, quæ nimirum (sicut offendimus) ex ipso elementorum constat temperamento. Verum ij quamquam nihil aliud, saltem quæ ex instrumentaria partium constitutione indicantur, intelligunt. Thessalus uero, & qui sequaces eius sunt, etiā hæc ignorant. ueluti statim si diuisum abdomen tam alte sit, ut intestinum ex eo procidat, nec quemadmodum id reponere conueniet. nec si omentum exciderit, abscindendumne id sit, an non. nec an uinculo id excipiendum, ac secus. nec an suendum uulnus sit, nec ne. nec si suendum sit, quæ ratione suendum, quicquid intelligunt. ut quæ ne nos quidem intelligeremus, nisi ex dissectionis ratione omnium quæ istic continentur partium naturam didicissemus, quā etiā exponere necessum est, nō claritatis modo gratia eorū quæ dicenda sunt, sed etiam probationis. Cutis intrinsecus omnib. ante fiat hæc uero in membranam finitur. A cute, medio circiter loco, neruæ tenuitas musculorum (quam *ἀρτηροσπασμ* Græci uocant) gemina tendi-

tur, membranarum ritu. Eas plerique anatomicorū duas esse minime norunt. cum & unā cohæreant coalescātque sic, ut labor sit eas separasse, & summa prætereā sint tenuitate. Post hæc deinceps habentur duo musculi recti, & carnosī, qui a pectore ad ipsa pubis ossa perueniunt. Atque hæc quidem memorata omnia, & sibi cohærent coalescuntque, & quod constat ex ipsis est, Græci, qui quemadmodum diuisum uentrem sui conueniat, prodiderunt, *ὠνυάσπιον*, id est abdomen nominarunt. Quod uero hoc deinceps excipit, ab illis quidem uocatur *σπλην*: putantibus uidelicet unum, & simplex id esse corpus, minimeque cōpositum, sed falsū. cum id cōpositum ex duobus corporib. sit, quorum utrunque, & exangue, & neruosum sit. Verum alterum eorum neruosa tenuitas eorum musculorum est, qui per transversum se agunt. Alterum membrana prætenuis uelut aranei tela, quæ utique uere est peritonæum. Ac tale quidē in medio sui est abdomē. partes uero eius quæ utrinque ad latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hæc statim a cute obliquos musculos habet priores quidē qui a pectore demittuntur: secundos qui ab illis ascendunt. deinde post hos transversum musculum, sub quo est peritonæo. Ergo & minus periculi in hoc loco, quæ in medio est, cum tenuem eiusmodi membranam qualē aponeurosin uocant, nullam habeat, & sutura in medio difficulter administrare quippe cū & procidant hac parte maxime intestina, & ægre inibi contineri queant. Qui enim constrinxerant cōtraxerantque ea, recti illi carnosique musculi erāt, quos ex pectore, ad pubis ossa demissos diximus. Ergo quoties horū alius est uulneratus, duplici de causa procidere intestinū est necessum. a partibus quidem quæ sunt ad latus, propterea quod musculis qui istic sunt, cōstringitur. a medijs uero, quod nec musculū eum qui cōtineret, habet etiam ualidum: & quod locus opportune ad procidentiam est cōparatus. Quod si maius etiā uulnus fuerit, tum plura necesse est intestina excidere, tū difficilīus de nouo immitti. porro alia ratione parua uulnera tractata sunt difficilia. Nā nisi quod procidit, ilico in locum suum reponas, inflatur, surgitque in tumorem, quo euenit, ut per angustum foramen immitti nequeat. Minus igitur in eiusmodi uulnerationibus graue mediocriter foramen est. Atque hæc quidem præcisse oportet. Proximū est, ut quæadmodū quis hoc genus uulnerum cōmodissime contrectet, consideremus. Nam Thessali præceptum quo censet enamis ea præsidij glutinanda esse, parum satisfacere manifestius puto, quæ ut quenquā latere qui compos sit mentis, possit. Quoniā igitur principio id agendū est, ut intestina quæ exciderunt in suum locum recondantur, secundo loco ut ulcus suatur, tertio ut medicamenti imponas, quarto ut ne qua præstatio pars simul afficiat propicias, age iam de primo horum agamus. Cum igitur triplex (ut dictū est) discrimē horum uulnerū in magnitudine sit, propria a quoque indicationē sumere tentemus. Esto aut principio uulnus adeo parū, ut inflatū iam quod excidit in-

testinum cōprimi non possit. Nunquid igitur hoc loco alterum ē duobus est necessum, aut flatum educere, aut uulnus ampliāre? Præstiterit autē (ut arbitror) prius, si modo id consequi liceat. At non alia potius ratione id consequare, quā si causam unde excitata inflatio est, summoueris. Ea igitur quæ demum est? Certe ambiētis aeris refrigeratio. Itaq; etiā sanatio ex calfaciēdo petetur. Ergo spongia molli & ex calente aqua madenti, ac mox expressa calfacere intestinum cōueniet. Præparetur uero intērea uinum austerū calidū. quippe id magis calefacit quā aqua, ac robur intestini acquirit. Quod si huic etiā præsidio intestini inflatio non cesserit, incidendum peritonæi tantum est, quantum ei quod excidit reponendo sit satis. Apposita porro ad eiusmodi incisionē sunt ea quæ Græci *συνχορμία* uocant, id est quæ ad fistulas incidēdas sunt cōparata. Scalpellū uero quibus acies utriq; habetur, aut quibus cuspis acuta est, omnino fugiendi sunt. Situs uero laboranti appositus fuerit, cum in inferiore parte factū uulnus est, si sursum uergat. cum uero in superioribus si deorsum. Vnum aut utrobique cauetur, ne quod exciderit, ab alijs quicquā intestinis degraueetur. Itaq; ex hac ratione cōueniet, ut si in dextris uulnus sit, corpus in contrariam partem inclinetur. sin in sinistris sit, in dextram: sic ut quæ uulnerata pars est, semper altiore locum occupet. Atque hoc tum in magnis, tum etiā in mediocribus uulneribus conducibile fuerit. Quippe id omnibus cōmune consilium est. Ceterū, repositio intestinum in suū locū, ubi ex magno exciderunt uulnera, planē ministrū postulat dextrū. Debet enim ubi manibus suis totum uulnus extrinsecus apprehenderit, intrō reprimere, tum cōstringere, ac exiguum semper suētū prænudare. quineā id ipsum quod afflitum est, modice cōprimere, quoad totū persuatur. Iam uero quæ commodaratio suendi abdominis (*γαστέρα* *σίου* uocant) in talibus uulneribus sit, deinceps doceamus. Quoniam coire coalescereq; cum peritonæo oportet abdomen, incipiēdum quidem a cute est, atq; ab externo introrsus acus iniicienda. Vbi uero tum cutem, tum rectum musculum totū transierit, præterito quod ei subest peritonæo, per reliquū peritonæum eam ab interno extrorsum protrudes, atque inde per reliquum abdomen ad interno extra transmittes. Vbi hoc penitus transmisit, rursus ab externo introrsum idem abdomen est perforandū. Mox ubi peritonæum quod illi quoq; subhæret, præterieris, atq; ad contrarium ueneris, hoc quoq; ab interno extrorsum perungendum, unaq; cum eo totū ipsi cōiunctum abdomen. Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum cōtrario peritonæo cōsuendum. ac rursus uicina quoq; cute transmissa, iterū ab ea parte acus introrsus est iniicienda, con-suendumq; abdomen id cum cōtrario peritonæo, etiā inibi uicina cute transmissa. Atq; hac iterū iterumq; faciēda, quoad totū uulnus similiter cōauerimus. Interuallum uero quod futurū interuenit, quod ad compēdēda pertinet ea quæ sub

sunt, breuissimū esse postulat. Quod uero ad firmitudinem ipsius cutis quæ in interuallis futurarum est, necubi rumpatur, breuitas parū tuta est. Quare utriusq; uitato excessu, eligenda mediocritas inter utrumq; est. Iam hoc quoq; omnium ulcerū cōmune quodāmodo est: sicuti etiā ipsius quo sunt tur fili consistentia. Nam quod iusto durius est, eutem rumpat necesse est, quod mollius, ipsum prius rūpitur. Aequē uero si proxime summas oras acum transegeris: quod reliquum est cutis, quoniam minimū est, dum uiolenter adducitur, cogitur percurrere. Si plurimum ab ijs recessus, multū cutis inglutinatū relinques. Hæc tæcti omniū sunt ulcerū cōmunia, maxime tamen fugiēda in abdomine suendo sunt. Ipsa uero abdominis futura, aut iam dicto modo administrabit, utiq; si quis huc studiū dirigat, ut peritonæum abdomini coalescere faciat. uix em cū eo coalescit, utpote neurolūm, aut (sicut nonnulli faciunt) qui quæ cognatæ naturæ sunt ea cōmittunt, utiq; peritonæo peritonæū, abdomini abdomen. Id fiet ad hūc modū. Oportet à uicino nobis abdomine incipere, atq; ab externo introrsum per id tantū acum transmittere, post præteritis utrisq; peritonæi labris, ex aduersa parte ab externo introrsus per utrumq; eius labrū acū reuocare, deinde rursus hanc reuocare, atq; ab interno extrorsum per aduersum abdomen transicere. Hic modus à publico, & exproptō, quo uidelicet uno adactu per quatuor labra acū transmittit, hoc discriminis habet, qd totum peritonæon intra abdomen prorsus abscondit. Deinceps uero de medicamentis præcipiamus. Sanè hæc quoq; eiusdē esse materiæ debebunt, cuius sunt ea quæ enema dicuntur. quæq; aliarum quoq; partū unire uulnera in superioribus cōmentarijs offendimus. Deligatio uero extrinsecus, uel præcipue in his necessaria est. Quarta uero curationis in his pars non paulo ab alijs diffidet. siquidem quod inter hubones, & axillas est, id totū molli lana ex oleo mediocriter calido imbuta circūdare oportet. Sanius item fuerit et si per clyster intestinis aliud simile infundas. Quod siquid ipsorū intestinorū sit uulneratū, quæ extrinsecus fieri debēt, omnia similiter, ut diximus, sunt peragenda. Ceterū quod iniicit, uinū nigru, austerū, & tepens erit, eoq; magis si totum perforatur usq; ad internū meatum sit. Ac crassā quidem intestina facilia sanatu sunt: econtrario difficilia quæ tenuia sunt. Ieiunium tamen omnino incurabile est, tum propter magnitudinē multitudinemq; uasorum, tum quod tunica eius prætenuis nervosaq; est. adde quod tum bilem synecram hoc intestinum recipit uniuerſam, tum qd omnium iocinori maxime est uicinū. Ventriculū uero quæ carnosæ partes infernæ sunt, curare cū fiducia tentabis. Nam fieri potest etiā, ut bene cedat, non solum quod hæc crassiores sunt, sed etiā quod sanantia medicamenta facile hoc loco ipsius subsistant. At quæ in ore eius ac gula ulcerū sunt, duntaxat contactu medicamentorum in transitu fruantur. Quæ uero in ore eius sunt, ijs sensus quoque acumē sanationi obstat. Verum quanā ratione uentriculū

uentriculi uulnerati, aliorūq; exitialium uulnerū Hippocrates sanationē molitur, ab ipso peti est satis. Ego namq; non eo cōsilio ut nemo Hippocratis libros legat, ad hoc opus scribendū accessi. Verum quoniam is mihi primus idonea usus esse uia uidetur, nec tamē eam totam cōpleuisse, cum quædam minime limitata, quædā imperfecta obsecratur; ab eo prodita inuenire liceat, idcirco ipse tum omnia ea lucide explicare, tum quæ parū discretæ sunt distingere, tum quæ deficient supplere studui. Vbi igitur aliquis se in his nostris primitus exercuerit, tunc se ad liberos Hippocr. legēdos cōferat: ac tum eius De ulceribus librum relegat, tum quæ de uulneribus exitiosis scrip sit. Porro simul maximum adiumentum ex his nostris libris habebit, simul certo intelliget neminē methodicæ scētæ quæ nomine specioso se uenditat, re aut maxime est à methodo aliena, cōmodo ulcus sana re possit: sed nec reliquorū Rationalium quempiam, quicūq; parum cognitis similariū partiū elementis, arte aggredi censent. Quippe nesciunt hi quoq; rationale simpliciter animalis partiū curationem, ut qui ab instrumētali b. tantū indicatiōis sumant. Ceterū paucis etiamnū cōtra Methodicos additis de istis quæ in uētriculo accidūt uulneribus, aliō stylū cōferemus. Vulnerato peritonæo excidit subinde omentū, q; primariāne pars sit, an nō primaria, uel ex quibus cōdā, uel quā habeat actionē usumue, hi cōpertum nō habent. Itaq; si familiuē, aut nigricat portio ea quæ excidit, ibi quid faciant, audire est operæ pretiū: utrumne præcident, an intra peritonæon remittent. Omnino enim, uel ab ipsa experientia quid agendū sit, intelligent, uel ab ipsa particulæ natura indicationē sumunt. Arqui refugit hæc utraq;. Eam quidē quā experientia suppeditat cognitionē, dum uenerandum scilicet hoc se scire suæ nomē methodū extollunt, eam uero quæ ex particulæ natura suggerit, q; nec substantiā eius norunt, nec actionē, nec usum, dū à dissectione ceu inutili abhorret. Itaq; ne sciūt siue ex ijs quæ necessariæ ad uitā sint, an quæ necessariæ quidem non sint, non tamen omnino infirmæ notæ: sed nec an cū eius affectu simul afficienda pars aliqua primaria sit, an secus. adde quod necan uasorum quæ in eo continentur, aliquid possit per sanguinis profusionē hominem interimere. nec si quis post nigrū eius abscessum, quod integrū est uinculo cōplectat, quō sanguinis profusum declinet, an id ipsum periculo ulli sit futurum: nam leui saltem intuitu omentum neruosum uidetur. proinde nisi quis exacte naturā eius habeat cōpertam, numq; audebit uinculo uti, cōuulsio nis scilicet metu. Horū cum nihil mirifici isti Methodici intelligant: ubi nigrū redditū omentū est, sanē dicere quid agendum sit, nō possunt. At nos (arbitror) possumus, qui cum usum eius nō adeo esse animali magnū, substantiāq; eius ex mēbrana tenui a arterijs uenisq; cōpositā sciamus, horum tamen initia ex maximis orta, tum arterijs, tum uenis intelligamus: sanguinis quidem profusionem cauebimus, coarctandō uero neruos non tū-

Galen.

A bimus. proinde id quod supra nigricans positum est, uinculo excipiemus, quod post uinculum est, amputabimus: atq; ut in imo sine iam cōprehensæ gastraphiæ uinculi fines pendeant, curabimus: quō nimirum facile eas cū uulnere suppurante computruerint, recipiamus.

5 Ac de reliquis quidē corporis partib. dictū ab unde sit: nunc de ossibus agendū superest. qñ his quoq; de quo nunc agit, morbus accidit, quē uisionis siue continuitatis solutionem appellamus. Huic cū in hanc inciderit partē, propriū nomē inditum græce est *κἀταγμα*, omnibus ferē hominibus qui græce loqui norūt, tritum. *ἀντεγμα* naq;, medicorum appellatio propria est, plebi inusitatum. Solent autē ita nominare quoties ossis finis

B qua parte maxime cū alio cōmittit, abruptus est, sed & ē fracturis ipsis quæcūq; fracti ossis partes iam prorsus separarūt, eas *καυασιόν* factas græce dicunt. Patet uero eiusmodi diuisionē per trāuersum esse factā. ueluti alterā esse, quæ per longitudinē magis sit facta. in qua uero nō omnino separant à se partes sic affecti ossis, sed uelut per rectitudinem finduntur. quod genus *χιδασμόν* fieri dicere solent. Non desunt ex medicis iunioribus qui adeo ambitiosē omnes fracturarum differentias proprijs interpretentur nominibus, ut etiā aliquā *ἀλφισκόλον*, id est ad polentæ speciem fieri dicant: non contenti oratione os quod uarie fit fractū, explicasse. At non Hippocrates huius fuit sententiæ: sed quoad fieri licuit, usitatissimis utens nominibus, oratione interpretari nō est grauatus nō has modo fracturarum differentias, uerū etiā earū quæ in capitis ossibus eueniunt. Ac si ad eum modū de omni uitio egisset, profecto breuis mihi proposita tractatio fuisset. Nunc cū plurimorū uiam qua sit, insistendum indicarit, sed quæ particulatim sunt agēda, inchoata indefinitaq; reliquerit, necessum est in illis immoremur. nec tamen etiā illa præter re iustum fuerit: sed quæ tradita illi perfecte sunt, ea summam cōmemoremus. quibusdā uero demonstrationē adiiciamus, utiq; ijs quæ ab eo ratio ne parū sunt munita. eorū præterea quæ parū sunt definita, quædam definiamus. & quæ inordinata sunt, ea in ordinem disponamus. postremo ex ijs quæ ille parū lucida reliquit, quibusdā lucē addamus.

D Verū si in singulis uerba eius adscripsero, expositorū cōmentarij longitudinē liber noster habebit. Nec deerit fortassis aliquis, qui immodicā lōgitudinē nostrā hic merito accusabit: qui de hac in tertio, & quarto uolumine parū merito est quæstus. In his em̄ necesse fuit mihi multa Hippoc. ex lib. qui De uulnerib. inscribit, loca apponere, quib. reliquis medicis ostēdere cuiusmodi res sit methodo quadā ulcerū curationē conscribere. In libro autē quo De fracturis præcepit, quis adeo est stupidus ut doctrinā eius omnem, ceu lucidā planēq; absolutissimā nō suspiciat? Quod si quis etiā unus uidelicet alterue dicat parū se id opus mirari, his oportunissime respondeatur illud poetæ: hos unum atq; alterum permittē tabescere. Quæ nam igitur sit fracturæ curandæ uera methodus,

tom. 6

g 3

quamq;

quamq; ipsa rei natura praescribat, iam tempesti-
um dicere uidetur: atque hinc sumpto initio.
Quonia fracti ossis soluta partium cōtinuitas est,
utiq; finis quō tendet is qui eas curabit, saltē
primus, unio est. Quod si is per affectarum parti-
um siccitatem perfici posse nō uideatur, restat al-
ter, qui est ut alterius cuiusdam interuentu gluti-
nentur. qui si nec ipse comparabilis aduertitur, in
sanabile esse uitium dixeris. Quod igitur coalesce-
re nequeat, tam durum os, quam id quod in iuue-
nibus & adolescentibus, & uiris, multoq; magis
in senibus cernitur, id profecto uel cuius patere
poteat. Potest certe illud tantū unionē recipere
quod abunde molle est: cuiusmodi conspicitur in
puerulis. Quod aut alia quapiā interueniente sub-
stantia seu glutino quodā agglutinari colligariq;
secum separatae fractis ossis particulae quēat, hinc
maxime speret quipsiā. Monstratū est omnē ani-
malis particulam propriū ac simile sibi trahere ali-
mentum. Id si uerum est, osium certe idoneū nu-
trimentum, & crassius, & magis terreum, quam ali-
ud quoduis nutrimentū in toto animali fuerit. Nō
est igitur nec a ratione alienum, nec quod fieri o-
mnino nō possit, ut quod ex hoc ipso proprio ali-
mento redundat & in labris fracturae concreuit,
suo ipsius interuentu illa quoq; cōglutinet. Quin-
etiam ita usu euenire conspici, subscibitq; spei
quam ratio suppediat, etiā experientia ipsa. Itaq;
considerandum deinceps est quamam potissimū
ratione corpus hoc quod fracturis innascit, quan-
tum qualeq; sit, prouenire possit. Nam quod nec
quantumlibet, nec quaecumq;, sed quod medio-
ritatem in utroq; seruet requirimus, id planē est
euidēs. Porro huius symmetriae, tum qualitate, tū
quantitate inuenta, deinceps est ut qua maxime
quis utrunq; assequat rationē ipsam quaerat. Sed
nec tēpus quo hac efficit cōueniat, minus necessa-
rium quaesitū est, utrumne statim a fractura facta, ue-
luti statim in uulneribus moliebamur unionem,
an id cōmodum tempus non est, sed aptius aliud
requirendum. Sanē inuenias hoc quoq;, sicuti &
reliqua omnia ex ipsa rei natura edoctus. Quanam
igitur est ipsius rei natura? Nempe os fractum sub
aliqua paulo ante cōprehensarū differentiarū. Age
igitur uideamus, nunquid a singulis differentiis
aliquid desumi ad eius curationē possit: ab ea quā
πρόσθρον, id est per transuersum fieri diximus, or-
si. Dissident sic a se in hac fracti ossis partes, ut ē
directo non iaceant. Quare patet primum id esse
agendum, ut in directū agantur: tum eorum quae
deinceps sunt, aliquid geratur. Sanē eum sitū ha-
buerint, si quis ea quae sic dissident, integrā partis
exemplo usus, in contrarium adducat, a qua nimi-
rum certissima indicatio trāspōsitionis eorū erit.
Fieri enī potest ut tum prorsum, tum retrorsum,
tum in hanc partē, tum in illam mēbri facta trans-
latio sit. Quaecunque igitur retrorsum magis sunt
acta, ea prorsum impelli conueniet: nec minus al-
teram quoq; fracti ossis partem modice, ad con-
trarium retrudi. Contra, quae prorsum sunt e-
mota, hęc rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam

A uero partem sensum duci prorsum. Eodem etiam
modo, et eorum quae ad dextram sunt detorta, me-
dicatio est, si ad sinistram ducantur: contraq; eo-
rum quae ad sinistram, si mutentur ad dextram; sem-
per scilicet altera parte modice in cōtrarium acta.
Ceterum in adducendis cōtrario motu partibus,
ne quae frangantur earum extantiae, non leue peri-
culum est. Neq; enim (ueluti in ferra defectis uisi-
tur) leuis est utriusq; partis finis. Nam si illa fran-
gantur, non poterunt ad amissum secum coaptari
fracti ossis fines, duplici de causa. Nā siue ipsa fra-
gmenta inter partes cōiungendas interciderint,
non sinit ea quae adaptantur, se contingere: siue
quid forte osium extra ceciderit, nec sic quidem
eorum quae effinxeris, exacta coniunctio erit, sic
ut pristinam unionem imitentur, quippe quae so-
lum tum demum erit, cum ossis extantiae in suas ca-
uitates fuerint reconditae. Quod si semel cōiun-
te perierint, necessum est inter applicata simul os-
sa uacans interueniat spatium, in quod sanies col-
lecta, atq; in tēpore putrescens, totū pariter mem-
brum secum corrumpet. Atq; ob hac quiddē, quae
dissidēt ossa, ē directo admota esse oportet, quod
cōmode certe fieri nequit, nisi retrorsum prius
sint tracta: *ἀντίτροπον* uocant. Oportet igitur aut
manibus ipsis, utiq; si paruum sit membrū, aut uin-
culis circūpositis, aut unā cum ijs etiam instrumē-
tis, cuiusmodi nos Hippocrates docuit, antistilini
osium facere. Postea uero q; abunde retracta fue-
rint, nec ullus super sit metus ne se in adducendo
tangāt, tum in directū opponere uinculaq; remit-
tere, ac musculis ipsis ductorū in idem commissio-
nem permittere: interim uero te ipsum quodq; ma-
nibus subseruire, ac sicubi aliquid paulum subfal-
tet, corrigere, atq; formare. Ab ijs secundum, quō
dirigit, fuerit, ut immotū prorsus mēbrum consi-
stat, nequid eorū quae effinxeris moueatur. quan-
do ita necesse est ea rursus diffidere. Ac si ipsi qui
dem aegrotant, ut quietudini membri prospiciat,
iniunxeris, uigilans fortassis probe id cauauerit:
at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igitur
non dormitis modo hominis, sed etiam ad de-
sidendum, itemq; cū cubile resternitur surgentis,
eorum quae formata sunt, positura seruet, tuta de-
ligatura completi fracturā oportet, quae fracti
ossis partes secū coarctare adamussim possit. At
uero cū laxior deligatura ossibus moueri permit-
tat, arctior uero cōstringēdo, dolorē exciet; dan-
da opera est, ut uitato ambarū incōmodo, utriusq;
fruemur cōmodo. Id fiet, si quod nimis est, decli-
nabimus. Ergo nec adeo arctare deligaturā debe-
bimus, ut iam cōprimat; nec remittere ut laxa sit.
Ac si quidem aequalis esset crassitudinis mēbrum
quodq;, utiq; latissima fascia esset commodissima,
utpote quae totum aequaliter contineretur ex o-
mnī parte fractum os cōplecteretur. Sed quoniam
id non est, pectori quidem latissimam licet cir-
cumponas, artubus certe & iugulo nō potes, sed
in talib. utilior est angusta, ut pote quae nec rugas
contrahet, & totius membri cū circumdata est, cu-
tem continget. Verum si paucis complexibus fra-

cturam continet, parum tuta est. Quantum igitur securitatis ex angustia deficit, tantū ei ex infectionis numero, & uersus integrū deductione est adiiciendum. Sed quoniam deligationum quæcūq; circa dolorem carnem constipant coarctantq;, id uirum habent, ut ex ijs partibus quibus primū injiciuntur succos exprimant, in eas, in quas ipsæ sunt finitæ reponant, atq; figant: non alienum à ratione arbitror deligaturā principiū super ipsam fracturam injici, abhinc uero ad reliquum membrū dispensari. Etenim qui cōtra deligat, is ab integris ad ægram partem sanguinem compellit. Atqui si ab ægro loco incipiat, in integrum finiat, non solum innoxia eiusmodi deligatura in ijs quæ diximus erit: sed etiam utile quiddam cōtulerit. quippe cum nullam circum fracturā finet excitari phlegmonem, cuius rei curam habere in primis oportet. timendum enim est ne tum ex illa in diuersum retractione, quam membrum in suam formam effingentes administrauimus, tum uel magis ex eo quod causæ quæ fracturā faciunt, plerūq; circum datam ossibus carnē constipando cōtundendoq; prius lædunt, magnæ subsequantur phlegmonæ. Nec sanè mirer, si phlegmones quiddā simile etiā ipsis fractis ossibus ad portiones accidat, quādo etiam quæ parum probe sunt curata, magis humida, q̃ pro natura sua manifeste cernantur, ubi uide licet unā cum uulnere os perfractū sub aspectus notitiam uenit. Quinimmo nec ossis caries, quem iphaelcon uocant, ex alia occasione oboritur, quæ ipsa totius ossium substantiæ corruptela quædam est. Non igitur negligendum quin totum superuacuum humidum ex omnibus quæ circa fracturam habentur partibus, exprimas. Incipies itaq; ab ægra parte, ac cum his ter uel circūderis, inde sanum uersus progredieris. Siquidē qui ita deligat, & ab integris ad laborantē partem sanguinis confluxum arceat, & quod iam collectum in ea est, exprimit. Cum uero duæ partes sint quæ & recipere aliquid à laboratē particula, & trāsmittere ad eam possint, utiq; quæ superiacent, tum propter multitudinē, tum magnitudinē ad ambo magis sunt habiles. Extremæ uero propter contrarias conditiones exiguum quidem aliquid, uel recipere, uel trāsmittere possunt. multum uero nec ægris partibus sumministrare, nec ab ipsis recipere. quocirca cum duas primas fecerit Hippocrates deligaturas, priore quidem tum quod in laboratē particula cōtinetur, ad superposita expellit; tum quod ex his confluit, repellit. reliqua uero primis quidem complexibus, quos super ipsam fracturam facit, itemq; fasciæ ad inferna progressu, eò quædam ex uulnere, quædam ne quid illinc confluat, prohibet. Reliquis deinceps omnibus, quibus uidelicet ab infimis partibus sursum recurrere deligaturā censet, ut eodem uidelicet loco cum priore finiatur: tum ad superiora repellit, tum confluxū ab ijs prohibet. Muniant igitur ac stabiliunt fracturam, nec phlegmonem oriri sinunt prima duo linteæ. non tamē ea quæ dicta sunt, ad ambos hos usus satisfaciunt, præsertim sola. Vnde ad eorū quidem tute-

lam Hippocrates præsidium excogitauit, ut splenia unā cum exterioribus fasciis adhererent, quæ hæc quoq; ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur medicamento quopiam ex ijs quæ phlegmonē prohibet, uti iubet, quale nimirū est ceratū liquidū. Hæc igitur omnia ratio ē ut cōprehensum est dictante, sunt inuenta. & præter hæc ipsa repositionis figura, quæ ipsa quoq; geminæ indicationi subiicitur, priori quæ ex solis communibus notionibus pēdet alteri quæ ex curandorum organorum naturali cōstitutione præstat. Prior igitur eam quæ maxime à dolore abest, eligendam figuram suadet, quò nec phlegmonem particula cōtrahat, & æger persistere in una ea diutissime immotus possit. Secunda quæ ex curandorum sumitur natura, arterias, uenas, nervos, & musculos quām rectissimos poni præcipit. Sed & cōsentiant inter se hæc indicationes: quādo & rectissima cuiusq; partis figura maxime est à dolore aliena: & quæcūq; magis quàm alia est à dolore libera, ea maxime naturalis membro est: brachio quidem angulosa, quæ ἰχθυόειος Græce dicitur. cruri uero quæ paulo minus porrecta est. Porro ad dolorem uitandum non modo naturalis habitus cuius instrumento est utilis, uerumetiam cōsuetudo quoque conducere non nihil uidetur. Atq; hæc quidem figuræ in qua custodire membrū conueniat, inueniendæ ratio est. eadē porro inueniendæ figuræ ratio est & in distensione, & cum in naturalem situm aptantur fracti ossis partes. Etenim expedit, ut in rectissima atq; à dolore alienissima forma membrū tum distendas, tum in naturalem habitum coaptas: multoq; etiā magis ut sub eadem figura tum deliges, tum ad quietē reponas. Siquidem sub alia deligare, in aliam uero mutare, nō dolorem modo incitare potest, uerumetiam ossa intorquere. nam si eorum quæ præcepta sunt in cōmentarijs, quos De musculorum motibus scripsimus, obliuio obrepserit: necesse est ubi figura mutatur, alios musculorū tendi, ac uelut contractos rotundari, alios solui, ac remitti. Ergo ubi tenduntur, tum premi eos à deligatura est necesse, tum ex cōpressionē ipsa dolere. ubi uero rēfio remittitur, ea in parte deligaturū esse laxam, fracturamq; fulcramento destitui. Horum igitur omnium causā tum extendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere una ea figura, quæ doloris minimum habeat, præcipue est studendum. Atq; ad primū quidem opus, quod in fracturis molimur, nullum iam relictum est præceptum. Soluere autē ex Hippocratis sententia tertio die debebis, quò in mēbro præter solitum cooperto, nec dolor nec pruritus creetur, nec eius quod iam infixum fractura est, perspiratio prohibeatur, cuius occasione non modo noxius pruritus quibuscūdam accidit, sed etiam cutem ex acrimonia saniei erosam exulcerari, infundendū igitur tantū tēperatæ aquæ est, quantū ad euocandā eiusmodi sanie est satis. Quod si rursus quoq; simili modo facies, utiq; septimo id à primo die facere debebis. Apparuerint uero iam omnia, modo nihil impediatur, phlegmone libera, ac q̃ pro

naturali habitu magis aliquādo gracilia. Tum igitur licebit & ferulis circūponere, et soluere ex maiore intervallo. Nam antea cū phlegmone scopus uinceret, tutū nō erat ferulis premere. Nunc cum ea desit, ac stabilire fracturā est opus; sanē non in cōmodo his utare. Sed & soluere ex maiore intervallo licet, uidelicet nō desiderātibus pretereā par tibus sanē excernere. Quinetiā callus quē *πάσπον* Græci dicūt, felicius ita prouenerit: quādo ad hūc gignendū (sicut dictum est) cogi cōcrescereq; ali quid proprij osium alimēti oportet. Nō est igitur hoc a labris fracturæ eluendū, aut foras euocādū, quod certe assiduū solutio faciet. At uero nec tan to intervallo intermittendū, ut nescias quēadmo dum fractura procedat. Vidimus enim nō semel cū ualenter siccarent ossa, ægre prouenisse callū. Expediit igit̃ istis tertio uel quarto die modice a quam calidā infundamus, hanc metā finiēdā per fusionis habētēs, cum carnes in rubrū tumore at tolluntur. Atq; in his quidē priusquā subsidere in cipiāt, desistendū est. Contra ubi digeri quid uolu mus, non prius est desistendū q̃ quod ex perfu sione intumuit, subsidat. In quibus uero quo mi nus callus in fractura proueniat, humiditas abun dantior obstat, ibi hanc siccare (sicut prius est di ctū) cōuenienti deligatura, & perfusiōe aquæ quę uel minima omnino sit, uel plurima, conabimur. Quippe minima cū prius desistat q̃ aliquid cōflu at, & qui ad manū humores sunt, per spiritū dige rit; & qui in alto sunt, modice liquat. Expediit autē ita solui liquariq; ea quę per deligaturā sunt expel lenda. Plurima uero digerit, plus q̃ attrahit. Sanē cōstat in ea quidem deligatura quæ exprimet, mi nus esse arctandos fasciarum fines: in ea uero quæ ad nutriendū est cōparata, nec minus hos arctan dos, & uniuersos circunductus laxiores faciēdos. Quoniam autem non solum quo tempore subue niendum callo gignēdo sit, sed etiam quo pacto, est inuentum: reliquum fuerit de uniuersa uictus rationē præcipere. Ac quod in principio quidem sit tenuissime cibandum, id ubi de propria phleg monarum curatiōe agemus, dicitur. Porro mon strabitur, & quod uenam incidere interdum opor tet, & per uentrem superuacua expellere. At quo tempore callus gignitur, nutriēdum corpus est ci bis boni succi, & qui multū nutriāt, ex quibus pro uenire succus soleat non solum bonus, sed etiā tenax, ex quali fieri callū maxime expedit: quippe cū ex serosa humiditate ac tenui gigni prorsus ne queat. Ex crassa uero, sed quæ fragilis sit, ac pingui tudinis expers, gigni quidem poterit nō segniter, cæterum tempore siccescens, friabilior atque ita fractioni obnoxius reddet. Magnitudo calli ea sit quæ & ossibus tuto uinculo sit, nec musculos ta mē comprimat. Nam qui minor iusto est, hic ossa parum reddet tuta. qui maior est, dolore musculi inuehet. Attendendū uero diligēter est, ut uel promoueat si minor iusto proueniat; uel inhibea tur, si immodice increseat. Sūt uero quib. hæc effi cies, ipsius perfusionis, tū quātitas, tum uero qua litas, pretereāq; ciborū quātitas, ac medicaminū

A quæ illi extrinsecus imponuntur facultates. Ac de perfundendo quidem & uictus rationē supra est di ctum. Ex medicamētis uero quæcūq; emplastica substantiam habēt ac modice calfaciunt, ea callos tum promouent, tum uero augent. Quæ uero di gerendi uisum obtinent, ea magnos iam callos dimi nuūt. Si uero nec augere callum, nec minuerē stu des, sed eo sicut ultro prouenit, es contentus: me dicamento aliquo eorū quæ cruetis adhibent un neribus, utere. quæ cum modice siccant, etiā coa gulari ac concrefcere mediocriter callum faciunt. Ac de transuersis quidē fracturis hæc satisfaciāt. Delongis uero reliqua omnia ad eundē q̃ habent modū; cæterum cōprimendæ hæc magis in ipso fra cturæ loco sunt, tum quod recessit, retrudendū in trorsus est. Quæ uero cōfracta multis aliis sunt, po tissimum cum ulcere quemadmodū fieri plurimū solet, ijs splenia circūdādā ac si ritu incurra Hippo crates præcepit, ea q̃ uino imbuta tum austero, tum nigro, æstate potissimū. Quippe putrescunt siue oleo quis utatur, siue cerato: cum postulent amplius quā rem reliqua siccari, ut potē uicio ipso re liquis maiore. Quinetiam medicamentis quoq; om nia ex siccantium sint numerosa: sicuti ille præce pit, sed simul modū ipsum siccationis definiēs. Et enim ex enāmis eiusmodi esse pharmaca uult. Quod si protinus ab initio quis ipsis utat, tale esse debere enāmon suadet, quod imbuti sit aptum. Ac reliqua quidem omnia ex illius præceptis sunt peragenda, non in ijs quæ dicta sunt modo, uerū etiam siue nudatum os defecari ferra postulet, si ue fragmenta quæpiam uel teipsum eximere, uel expellenti naturę subseruire oporteat. De ijs uero quę cruribus supponuntur organis, quos *σπλινας* Græci uocant, quæcūq; Hippocrates addubita uit utendā ne sint, nec ne, & omnes norunt, & lau dandas esse rationes censēo. Quod autem neoteri cis inuentum est glosso comon, quo maxime tem pore gignendi calli utimur, laudādum id quidem quātum aliā quamuis eiusmodi machinarum du cimus. Verum nō uidetur id Hippocrates nouisse, quanquā aliās in organis, quæ usui forent, exco gitandis non indiligens. At uero quod cruribus subijcitur instrumētum, recte illis excogitātū est: quod per unicū axē, qui in fine machinæ ad infer nam eius partē est collocatus, contrariū nexum to ti mēbro gemina tensione efficit. Nominā earum altera (quæ utiq; membrum tendit in directum) Græce *δὲνθ' πορθ'*, id est in rectum procedēs: quæ uero prius sursum, mox deorsum, ea *μεστὴ ἀρσῆσι* Græce dicitur, quasi translatiua dixeris. Obestur ambe per laqueorū circumplexum. Porro aptissi mus in hunc usum laqueus est qui duas habet ap pendices. Hic igitur cum in partibus membri quę infra fracturam sunt, iniectus est, priorem siue euthyporon efficit tētionem, brachijs scilicet ipsius axi circumpositis. Cū uero in partibus quæ supra fracturā sunt, idem laqueus imponitur, metalepti cen tentionem efficit, abactis uidelicet ipsius brachijs prius sursum, mox deorsum. Quippe hæc quoq; circūdanda axi sunt. Porro circūdactum ac

ueluti flexū brachiorū laquei qui à superiorib. par-
tibus ad inferiores agit, per tróchilia fieri oportet
que in lateribus glottocomi sint posita. Licebit &
solena voces eiusmodi machinā & cū adiectione
sic, solena mechanicū, aut glottocomo mechanicū
cum. Verū de instrumentis uberius præcipiemus,
quādo de luxatis agemus, ubi etiā de uarietate de-
ligaturarū quæ superimponunt, non minus dice-
tur. Nunc uero postq̃ de mechanico solene men-
tionē feci, qui plurimū cruri commodat, tum aliās
cum reponit, tum uel magis cum ager cubile mu-
tat, aut etiā ē uentre aliquid excernit, nō ab re fue-
rit, quōd nihil tractatiōi de eo desiderat, multo ma-
gis illud glottocomon laudare, cuius alterū laterū
itemq̃ tabellulā in qua pedem collocat, quō nullū
nō quadret membri magnitudinē, mobilia faciūt.
Ac dereliquis quidē fracturis etiā hæc nosse, cum
ijs quæ Hippocrates præcepit, sat fuerit. De ijs
uero quæ in capite accidunt, Hippocrates certe inte-
grū uolumē scripsit, ubi omīa præcipit quæ in his
sunt agēda. & nos cum huic operi finē imposueri-
mus, enarrāda eius opera aggrediemur. Ad præ-
sens uero quoniā in his cōmentarijs, & quæ supra
ea quæ ille dixit sunt inuēta, adiungimus, & quæ in-
definite dixit definimus, necesse est primū de ca-
uis excisionis scalpris quos Græce *κυκλίσκος* uo-
cant, mox de ijs quos à lenticulæ specie *φακωτός*
uocant, post hæc de angustis scalpellis, demum de
medicamentorū usu, aliquid agamus. Ergo de fra-
cturis caluariæ quædā usq̃ ad secundā laminā,
quā Græce *Ἀπὸλον* uocāt perueniūt. quædā usq̃
ad internā olisum faciē. quædā etiā simplices fra-
cturæ, quædā cōtusiones. quædā uestigia eorū qui-
bus inscripta plaga est. Quæ igitur simplices fractu-
ræ ad secundā usq̃ laminā perueniūt, ijs quos mo-
do diximus angustis scalpellis indigent. Expedi-
t autē hos ut numero multos, ita magnitudinē im-
pares esse, necubi desit quod operis sit commodissi-
mum. postea uero nudato prout fieri solet uitiatō
osse, utendū primo quidē latiore, secūdo loco, eo
quod illo est angustius, mox ita reliquis deinceps
usq̃ ad angustissimum. Hoc uero in ipsa diploe est
utendū. Post hæc tum protinus, tum ad finē usq̃
sicis medicamētis est medendum. Quæ ob id ip-
sum *κεφαλικά* Græce, id est capitalia, sunt dicta.
Ea cōponunt ex iri illyrica, & erui farina, & man-
na, & aristolochia, & panacis radicis cortice. in
summa, omnib. quæ extergere citra morsum pos-
sunt. ipsa namq̃ generatio carnis, naturę opus est.
Itaq̃ agro ad eam rem nihil opus est arte medica.
Vt autē quæ prouenit caro, coalescat, circumhæ-
reatq̃ omni ossis parti, id inde maxime eueniet, si
neq̃ fordes super eo sit, nec oleosa quæpiā pingui-
tudo. Id igitur est quod egris medici ad carnis pro-
ductionem præstant, ut totus locus siccus sit, tum
quælibet uitiatū ossis pars planē pura. Atque hæc
quidē omnīū fracturarū cum caro in his produci
incipit, cōmunia sunt. Ex fracturis uero quæ ad ce-
rebrī usq̃ mēbranas peruenierunt, si simplex tan-
tum fractura sit, iam dictis scalpellis angustis uten-
dum. Sin cum contusione aliqua, quod contusum

A est, excidī debebit, idq̃ uel terebellis prius in cir-
cuitu perforatū, mox deinde scalpris admotis, uel
protinus ab initio cycliscis. Ac quæ per terebellā
quidem ratio fungitur, parum tuta est, propterea
quōd dum audacius eam tractant, durā membrā-
nā quæ ossi substernit, non raro uiolant. Quod ue-
ro per cycliscos opus administratur, ne id quidem
omino uitio caret, cum quatiar immodice caput,
quod potius quietē postulat. Mihi igitur hic quo-
que placet, si magnæ sint fracturæ, & ossa quæ fra-
cta sunt, uehementer mota, cycliscis uti. quippe
paucis excisionibus facies lenticulatis excisionis
locū. Sin firma plurimū ossa sint, foranda terebella
sunt. Quidam autē quo minus usq̃ aberrēt, eius-
modi terebellas excogitant quæ mergi nō pos-
sint, quas ab argumento *ἐκ τῆς σπῆς* dicunt. Circum-
currit enī parum supra terebellæ acutam cuspi-
dem circulus quidam parū extans. Sanē expedit
cōplures id genus præparatas habere, ad omnem
caluariæ crassitudinē. Nam crassiori longior tere-
bra conueniet, (uoco autem ita cuius spatium quod
inter summam est cuspidem, & circulum qui ex-
tans circumcurrit, maius est) tenuiori breuior. est
autem huic quoq̃ quod interest inter cuspidē &
quod circumcurrit, minus. Aliqui uero (siue illos
his timidiores, siue cautiore appellē) etiam ijs
quas *κοινιδας*, id est terebella caua uocant, sunt
usi. Tu uero si neq̃ improvidus eorum quæ falle-
re possunt, sis futurus, neq̃ pluraq̃ satis est timi-
dus, cōmodissime cycliscis utere. & primo quidē
aggressu, latioribus. postea magis angustis, donec
ad crassā membrānā peruenieris. Cæterū quod
excidī oportet, id totum circulo cycliscis nudan-
dum non est, sed ex ea maxime parte qua fractura
est grauissima. Nam præter alia, etiam membrana
ipsa ab ossibus quæ uehementer sunt afflicta, ce-
lerrime recedit: adeo ut nullus sit metus eam, quæ
iam se iuncta est, tetigisse. Si uero unam semel nu-
daueris partē, ac scalprum quī in cuspidē præfixā
habet obtusam leuemq̃ lenticulæ speciem, aciem
uero per longitudinem erectā submiseris: ubi la-
tam partem lenticulæ super membrānā statue-
ris, feries malleolo, ac sic caluariā diuides. Eueniēt
enī ita agentibus quæ requirimus omnia. Nam
mēbrana, ne si dormitās quidē quis agat, late tan-
tum lenticulæ parti occurrens uulnerari potest.
D Quæ si cubi adhæreat caluariæ, huius quoq̃ adhæ-
rentiam innoxie dirimit ipsa lenticule rotunditas.
Subsequitur uero præeuntē eam à tergo ipse scal-
per caluariā secans. Quare nec qui minus cum pe-
riculo, nec qui celerius perficiatur, forādī modum
alum inuenias. Maxime tamen hunc in uehemen-
tissimis fracturis laudabis. quas utiq̃ recentiorum
nōnulli medicorum Græce *ὑψηλόμενα* & *καμα-
ρώσεις* nominant. Eggesomata quidē, quæ in me-
dio sui membranę innituntur. Camaromata uero,
quæ eandem ipsam partem, exaltatā habent. Cæ-
terum qua primum ab integris fracturæ partibus
diduci egra incepit, intrō magis recedunt, ac mē-
brana innituntur. Quippe celerrime in talibus
quod ægrū est, totū exciditur: utpote cum promp-
tius

prius subintret lenticulati scalpri finis in ijs quę plurimū a naturali habitu recesserūt. Quinetiā instrumento, quod *ὀστὴν* uocat, aliquibus ossiū quę uehemētē sunt cōminuta, uel exaltatis, uel cōuersis: ea potissimū parte, ut demittat lenticulatū scalprium pręparabimus. Quo factō, succedunt deinceps omnia quibus est opus, cum securitate simul ac celeritate: ut sermē dixeris celebre illud dictū in reliquis quidē omnibus probe se habere. Dimidium facti qui bene cōcepit, habet. Hic uero non totius dimidiū, sed uel totū, uel paulominus totū habet, ubi lenticulatū scalprium immiseris. Atq; hac optima est fracturā quę in caluaria sunt, manualis tractatio: quam *χειρουργία* uocat. Quantum uero excidere cōueniat eius quod affectū est, deinceps exponā. Quod uehemētē est cōfractū, id totum est auferendū. Sin uero ab eo fragmēta quędam longius excurrant, (quemadmodū aliquādo cernitur accidere) hac persequi ad finē non expectit: illud persuasum habentibus, minime futurum ut ex eo noxa sequatur ulla, modō reliqua omnia rite sint peracta. Nos em̄ non semel aut bis, sed plānē peripse sic facientes uoti cōpotes fuimus. Indicatō uero agendorū hic quoq; ex natura ipsarū partiū affectarū sumministrata est. Nam deligaturam quam in alijs fracturis ceu maxime phlegmonas arcentē ratio inuenit, capiti adaptare nō possis, itaque nec quod affluit reprimi, nec quod in ægris partib; cōtinetur, exprimere queas. Sine quibus præditijs nec reliquorū ossium ullum seruari sanum potest. Nam pone in brachio ad medullam usq; fractum os esse, neminemq; postea pro fracturæ legibus id deligasse, omnino necessum erit saniem, non solum quę foris sub cute & sub musculis est collecta, sed etiā quę in medulla cōtinetur, tum ipsam primū ac maxime corrūpere, tum cum ipsa os uniuersum, quando etiā nunc quoq; omnia huc rite peractis aliquādo talia contingunt. Quomodo ergo nō uel magis in capite ea accidant, cū nec deligaturā quę fracturis debetur admittat, & omnis sanies prona feratur, sic ut super membranā uniuersa coaceruetur? In alijs igitur fracturis deligaturam cum rite adhibetur, tantū abest ut superuacuum aliquā humiditatē colligi in læso osse patiatur, ut etiā gracilius q̄ pro naturali habitu mēbrū reddat. In capite uero ratio quę per deligaturā est excogitata, nec potest ita tum os ipsū cōfractū, tum quę illi circūstant siccare, ut neq; phlegmonen cōtrahant, neq; penitus ullam efficiant sanie; nec medicamentū est ullum, quod uel in alijs quidē partibus citra deligaturā os fractum quatenus nunc dictum est, siccū atq; ab superuacuis purum reddere ualeat. Necessum igitur est nobis primum fracturę aliquid nudare: quo uidelicet detergere & abluere saniem a mēbrana liceat, post uero cum phlegmones tēpus præterijt, omniaq; siccata unguem sunt, carnē producere, ac cicatrice locū includere. Non est hic sermo nudus, rerumq; uacuum, cuiusmodi est ille sophistarū, qui operum artis nescij quærunt cur capitis fracturæ callū non ducant. Ducūt enim, uiri boni, Vosq; tam demen-

tes estis, ut eorum quę non sunt, tantq; sint, causas assignetis. nouimus enim aliquando sincipitis os fractum, quod autē os huic ossi protinus succedit, tēporis os uocatur, in quo ipsas squamatin cōpactas commissuras esse accidit. in eo luculenta fractura longissime pertinebat, quam ipse equidem minime contingens, sed tantū sincipitis os excindens, hominem sanauit, sic ut nunc quoq; multos iam annos uiuat. Quod si sincipitis quoq; os dimisssem, putruisset citius quā illi suberat cerebri mēbrana, q̄ callum fracturā duxisset. Nam si nulla ex læsis partibus sanies intrō conflueret, superfluum esset os excindere. Ergo illi prout solent nugēt. Ego uero in alia similiter se habente fracturā cogitaram supernum os dimittere, ac quod a lateribus erat quod sanies deflueret, excimere. mox cū & crafitudinem eius & duritiā aestimasssem, utilius fore iudicauī supernū os potius excimere, q̄ ob defluxus sollicitudinē cerebrum ualenter concutere. Cogitauī præterea accidere posse ut si a latere magnum fieret in ossibus foramen, promineret fortassis hac parte cerebrū. Est porro & in lateribus non uno in loco etiā nervorū, horumq; non leuīus momenti, quidam exortus: cum in supernis capitis ne minimū quidem usquam oriatur nervus. His admonitus abstinui ab excimendo osse, quod in latere capitis esset. At callum semper duxit, modo rite curaretur. Ac iam quod dixiquamus, hoc ferē superest, quænam sit postquā foratum os est, tum medicamentorū, tum uniuersæ diligentie: nostræ præcipua omniū ratio, utrum ne blandissima, & quæ maxime uoluptati cubantis subscibat, ueluti quæ nunc pleriq; utitur: an quæ huic maxime est aduersa, nempe quæ per medicamenta quæ uehementissime siccāt, perficitur. cuiusmodi & Meges Sidonius laudat, & cuius quidam noster semper est usus, sic, ut etiam emplastrum quod *lin* uocant, illico nudata membrana imponeret, q̄ super hanc foris oxymeli. Sanē is senex erat satis exercitatus in hac artis parte: ceterū neq; alium quempiam his usum uidī, nec ipse uti sum ausus. Tantū tamen testificari Eudemo possum (nam id senio men erat) magis fuisse seruatos qui ab illo curabantur, q̄ qui ab ijs qui blandis utebantur. Aggressus uero fuisssem aliquādo ipse quoq; experiri eiussmodi curationis rationē, si perpetuo in Asia mansissem. Sed cum Romæ plurimū agerē, ciuitatis uorem sum secutus, permissa ijs quos chirurgos uocant, maxima eiussmodi operum parte. Ceterum ipsam rei naturam aestimāns, talem quādam determinationem longa nostra experientia confirmatam cōcipio. Qui auditorius meatus dicitur, non solum usq; ad cerebri duram membranā pertinet, sed etiā neruum contingit, qui in ipsū a cerebro descendit. Is autem quanq; ita positus in uicino, tamen uehementissima (sicut dictum prius est) medicamenta tolerat. Nihil igitur miri sit, si post fortiones crassa cerebri mēbrana anteq̄ notabiliter phlegmone occupetur, ualentissimis gaudeat medicamentis, ceu siccam naturaliter substantiam habens.

ARGVMENTA SEPTIMI LIBRI

Cap. 1. Proœmium. Quod posteriores hos libros aliquid posuissit quod prioribus Hieronis obicitur, cuius nomini priores libros cōsecrauerat, rursus sitū dīstorsit & præcipue Eugeniani flagitioribus uictus in manus reuocari. 2. Nescit hunc librum superioribus rationem reddens ordinis sui, Carpit Brasistratum, qui phlegmonem perperam describat, & causas affectuum non inquirat, sed partium imbecillitatem tantum, cum idioræ cuius manifestam causetur. 3. Intemperiei curatio generatim. 4. Particulatim & per exempla doctor de uentriculi alia atq; alia intemperie curanda. 5. Temperies & cōstitutiones uentriculi in genere inuicē cōfert: & omnium periculosissimam pronuntiat ficcā, utpote in medicabilem si exquisitè talis sit. 6. Prolix hoc capi de scorim intemperie ficcā, sine affluxu substantiæ. 1. sine materia factam, medicari docet. 7. Cura malæ tēperiei ficcæ & frigidæ uentriculi. 8. De curanda intemperie uentriculi calidæ & ficcæ. 9. Cura intemperiei calidæ & humidæ. Fit etiā collatio inter hanc & calidam & ficcam. Item quæ cura medeat humidæ soli: & quā

frigida & humida. 10. Anæcephalæosis omnium dictorum hætenus de prauis uentriculi tēperamētis. 11. Hætenus egit de praua dispositione uentriculi, quæ sine affluxu humoris cōtingit: hoc et sequente capite de ea dicturus, quæ cū affluxu sit. 12. Curatio ueteris intemperiei unā cū uicioso humore in cauo uentriculi eiusq; pelli culis immerso. 13. De cura prauæ cōstitutionis per medicinā, supra indicatiōe ab oblaesa particula corporis.

Aliter.

Curatio morborū qui partibus similarij. cōtingūt, & præsertim uentriculi, quo in uniuersum exēpli loco utitur. Curatio uentriculi mala tēperie laborantis citra humorū multitudinē. Curatio uentriculi mala tēperie uexati ex uitiosis humorib; in eo cōgregatis. De lacte & melle, & quo pacto is, qui ficciorē tēperie laborat nutriendus sit. Quo pacto uentriculus curari debeat, si quando à prauis succis obideatur, qui in eius tunicis sint imbibiti. Vniuersales rationes quæ ad ea pertinet, de quibus ipse particulatim exempli uice disseruit.

GALENI METHODI MEDENDI. ID

EST DE MORBIS CURANDIS,

Liber septimus.



EDENDI methodū, Eugeniane charissimè, quā olim in Hieronis gratiā scribendā suscepērā, posteaq; illum subito longū iter ingredi coactū, non multo post diē obijisse nunciatū, ipsi quoq; persequi delitimus. Tu em̄ mihi conscius es, neq; hoc me opus, neq; aliud ullum, popularis auræ studio fuisse aggressum: sed quod uel amicus gratificaret, uel meipsum simul utilissimā ratione ad rem propositam exercitarem, simul ad obliuionē senij (ut Plato inquit) cōmentarios mihi reponerē. Quippe multitudinis laus, cōmodum ad usū nō nullis instrumentū uiuentibus aliquādo est: mortuis certe nihil prodest, sicut neq; uiuentiū quibuscūq; Nā qui uiuere in trāquillo optarūt, ac fructū ex philosophiā ceperūt, & ijs quæ corpori curandō sufficiūt sunt cōtenti, ijs utiq; impedimēto nō paruo est apud uulgus fama, ut quæ eos à rebus pulcherrimis plus iusto trāsuerfos auferat: uel uti me quoq; non ignoras ab ijs quæ sunt molesta sic nonnumq; tædio affectū, ut bono interim spatio ne tangere quidem librū possim. Ego uero (haud scio quā ratione) ab ipsa utq; adolescentiā mirifice, siue inspiratus, siue furore percitus, siue quomodo cūq; dixisset libet, & uulgi famā contēpsi, & ueritatis scientiæ studio flagraui, nullā esse hominib; nec honore nec diuiniorē possessionē ratus. Atq; ideo nulli librorū meorū nomen meū præscripsi: imò uos (sicut ipse testis es) rogauit me in modice ut (solitis) apud homines laudaretis: nec nomen meū operib; quæ proderēt, inscriberetis. Ob hæc igitur omnia etiā medēdi methodus quā inceperā a me est deposita, cū capitā inuētorū breuiorib; cōmentarijs mihi ipsi scripsissem, nec ullā pleniorē docēdationē etiā mihi adiecissem. Nunc quādo & tu, & alij ex amicis nō pauci exigitis quæ subinde me opere in agris peragere uidistis, ut ea in cōmenta-

rios redigā, adiciā huic operi quod reliquū est.

2 Ergo in horū commentariorū tertio, quarto, quinto, & sexto quædam modū similarij instrumentaliq; partū communē morbū curari cōueniat, scripserā, idcirco nimirū ab eo auspicatus, qd & cōspectior reliquis esset, & euidenter omnes prope modū priores medicos qui certa methodo artem tradere polliciti, amethodi in ipsis curationibus deprehenduntur, cōfutare. Nam cum ab Hippocrate discesseris, qui nobis omnium salutarium præceptorum semina præbuit, reliquorum certe nemo uel conatus est genus hoc morbi methodo curare. Postulant autē & quæ Hippocrates ipse reliquit, non malos agricolas, qui ea tum seminēt cōmode, tum augeant, tum perficiant. Id autē fecisse ante nos neminē, sed plerosq; etiā semina quæ reliquit, corrupisse, ijs qui animum aduerterunt, clare monstrasse arbitror. Itaq; hoc morbi genus uel cōtinuitatis solutionē, uel unionis, uel qualitercūq; est libitū appellare cuiq; permisimus: quando dē nominib; nec in hoc opere nec in alio medicinaliū ullo laboramus, sed quo pacto artis maxime finem consequamur. Reuertamur autem nūc ad morbum eum qui omnium est primus, nempe qui in similaribus nascitur, quibus scilicet primū animantis functiones referunt acceptæ. Si quidem monstratum in alijs operibus est quemadmodum instrumentalium quāq; partū aliquid agere dicamus, ueluti oculum uidere, aut crus ambulare. Esse enim sicuti id quod præcipuum est actionis crurum, non cruris totius, sed musculosi in eo generis: sic uisionem non oculi totius, sed crystalini in ipso humoris, ac in reliquis quibuscq; organis ad portionem. Porro ostensum in secundo horum uoluminum est, genus hoc morbi non solum cognitur esse maxime necessarium, sed etiam neminem ipsum ratione curare posse, qui prima corporis elementa non norit. Præterea non intellige-

re ea quæ dicant, nonnullos eorū qui Rationales se nominant, quos imbecillitate esse dicunt uel uentriculū, uel intestinorum, uel iocinoris, uel oculorum, uel alterius cuiuslibet partis. Si namq; insirmitatem impotentiamq; ad naturale opus, ita nomināt, nihil plus plebeio intelligūt. quippe quem dicere audias imbecillū sibi uentriculū esse. non em̄ concoquere eum uel minima leuissimā quæ fumpsit. Quod si imbecillitatem quæ est in uentriculo, affectum quempiam esse aiunt, interpretentur quæso nobis quem nam demum hunc esse uolunt, quemadmodū in phlegmone fecerunt. nam empirico sat fuerit, si symptomata laborantis particulæ exposuerit. nempe tumore præter naturā, & renixum, & pulsatilem dolore, & tensionem, & rubore, aliāq; id genus. imponitq; nonnunq; breuitatis docendi causa cunctis simul collectis unū nomen, sicuti comprehensū iam phlegmonē. Dogmatici uero non itidem: sed ipsam morbi naturam inspicunt, quam symptomatū illorum collectio necessario sequitur. Siquidem Erasistrato uidetur sanguis qui in arteriis incidit, ubi spīritu impellitur, in exitū earū impactus hære: idq; phlegmone esse. At par (arbitror) erat uel Erasistratū ipsum, uel aliquem ex sectatoribus eius, simili modo affectū qui in imbecillitate cuiusq; partis subest interpretari. Tanquam enim de phlegmone in quid nā trāslatas naturalis partis habitus sit, explicuit: ita ratio exigebat, ut & translatio cuiusq; particulæ in imbecillitatē, ab eo explicaretur. Nō enim cum pro naturæ ratione est affecta, ad propriā actionē est imbecilla: sed accessit omnino aliqua præter naturam occasio, quæ eam dissoluit deicitq;, & mortuæ similē efficit, quā utiq; nec Erasistratus dixit, nec Herophilus, nec alius quispiam medicorum, qui de primorum corporum natura ausi aliquid pronuntiare non sunt.

3 Caterum, immorandū in his diutius non est, cum præsertim abunde prius monstratum sit & genus hoc morbi utilissimū esse quod à medicis disquiratur: & qui cōmode id sit tractaturus, huic ne cesse prius esse de elementis cōsiderasse. itaq; qui nobis habendus sermo est, is totus ex prius demōstratis elementis absoluetur, de quibus unum (ut scis) uolumen edidimus, quod de elementis secundum Hippocratē, inscripsimus. Sanē eadem opinio de corporis natura est tum Diocli, tum Mnesitheo, tum Dieuchi, tum Athenæo, tum probatissimis ferè quibusq; medicorū, itidem ut præstatissimis philosophorum; ut qui ex calido, frigido, humido, & sicco mista putent tum alia corpora uniuersa, tum uero animantium in primis. Caterū ei qui de his omnibus primū pronunciauit, demonstrauitq;, iustum arbitror reddere quod inuenit. Ideoq; & nos ea secundum Hippocratē elemēta uocamus; etiam si maxime Chrysippus, Aristoteles uel aut aliū quispiā medicus philosophus uel similiter de ijs sit opinatus. Ergo quoniā unaquæque animalis particulā propriā actionē edit, quæ tantum ab aliarum actionibus differt, quantū ipsa particulā ab alijs quæ illas edunt, est diuersa; Dif-

fert uero ab alijs particulā quæque eo quod calidior, uel frigidior, uel siccior uel humidior sit, aut quod binis horum quibuslibet sit affecta: qui tueri actionem uult, hic temperamentū earum custodiat oportet. Custodiet autem, si id quod ad calidius est cōuersum, refrigerabit: quod ad frigidius inclinatum est, calfaciet. Pari modo si quod ad siccius est alteratū, humectabit: & quod ad humidius est uersum, siccabit. Rursus quoq; si siccabit pariter ac calfaciet quod humidum est redditū, & frigidum: siccabit & pariter refrigerabit quod humidius simul & calidius euasit: & in reliquis duabus cōiugationibus ad portionem. Semper enim pro eo quod exuperat, inducendum eorūq; contrariū est, quoad particulam in symmetriam, & naturalem habitū uindicaueris. Ac genere quidem, omnis ægritudinis, quæ in similarib; consistit, iam dicta mihi medendi est methodus. Cum em̄ octo earum sint differentia, ueluti in libris De morborum differentia est traditum, octo nimirū erunt & medendi rationes, quarū una (quod medendis consilia dirigunt) curationis meta cōmunis est, ipsius similaris corporis alteratio: quādoquidem etiam morbus ipse ex intemperie & naturalis temperamenti alteratione est ortus. At quæ mēbratim medicatio agitur, ex his duobus cōfiscitur. nempe materię copia, & huius congruo usu. Ac medicamentorū quidem copiam, tum ex libro De simplicium medicamentorum uiribus, tum ex eo qui de eorū compositione præcipit methodo, haurias licebit.

Eorum quæ ad uictum pertinent, rationē hinc sumimus. Sed & quemadmodum cuiusq; particulæ intemperiem agnoscere oporteat, ex tribus operibus intelligas. primo eo quod De temperamentis, secundo eo quod De partibus afflictis, deinde eo quod Ars medica inscribitur. Non est igitur adea quæ nunc ordimur, ijs qui prudentes natura sunt, ac cogitationem in primis exercitarūt, multis prætereā opus. cui neutrum horum adest, huic certe ad præsentem disputationem non parua re est opus. Quod si in præuæ doctrinæ secta prætereā sit altus, hic geminum tempus requirit: alterum in quo prauas opiniones dediscat, alterum in quo melioribus se exerceat.

4. Sanē te scimus & ex ijs quæ in uniuersum dicta sunt, particularia per te inuenire posse: & alioqui multos id genus morbos à nobis percuratos uidisse, sic, ut utraq; ratione particulariū tractatio nem minus requiras. Sed quoniā (ut Plato ait) nō possunt quæ scripta sunt, nō ē manifeste exideret: quod si quando liber in alterius non exercitate rationis manus deuenit, facilius huic doceat, adijci particularium quæpiam oportet: ex quibus etiam protinus clare id quod proxime dixi, intelligen fieri posse, ut per te ipsum particularia inuenias. Si quidem ipse ea per me ipsum omnia inuestigauit, ratione ipsa uiam monstrante: quando si præceptores secutus fuisset, ipse quoq; uentriculo imbecillis fuisset, ut cibis adstringentibus, & subamaris uteretur, uino quoq; similiter austero, prætereā absinthio, & quod ex mali cotonei conficitur

succo, alijsq; eiusmodi quæ deuorantur medicamentis. At uero quod ad ea pertinet quæ extrinsecus applicantur, primū perfundi uentriculum ex absinthio & oleo crudo iussissem: mox hapsum lane, tum ex iisdem ipsis, tum uero ex unguētis melino, & masticino, & nardino imponi: ab ijs cera tum ex iisdem cōpositū: post alia pharmaca, utiq; ceratis ualentiora, quæ à medicis uocantur epithe mae. Ea tum ex dictis unguētis, tum ex ijs quæ simile uim obtinent medicamentis cōponuntur. In quibus est aromatum quoq; multitudo nō parua: spica nardi, & amomum, & calamus aromati cus, & iris, & ladanū, & malabathri folium, & sty rax, & bellium, & opobalsamum, & balsamum, & xylobalsamum, reliquisq; aromatu catalogus. Quod si horum nihil profecisset, cōmune omniū remediū, quibus imbecillitas nocet, in fine adhi buissem, nempe rubrificationem, (*φαιρυγὴ* Græ ce uocant) quæ uel per thapsiam, uel sinapi, uel ta le aliquid excitatur. Deinde ad usum aquarum na tura calidarum ablegassem. Quippe ultra hæc Em piricus nihil nouit, ueluti cōmentarij eorum doc èt. Quintus uero ijs qui de cruditate, aut inappe tentia quererentur, primū quidem exercitari sua debebat, tum esse quæ et cōcoctū quàm facillima es sent, & non multa: quibus hæc nō contulissent, co gebatur ipse quoq; ad Empiricorū dogmata cōsu gere. Nam quis nescit quemadmodū calidum, fri gidum, humidum, & siccū mordere sit solitus, bal neatorum esse nomina dictitans? Sine quibus ta men methodo curare partium imbecillitatem o mmino nō est. Quare per hos nihil obstitit, quo mi nus ipse quoq; eadem instituissem uia in eiusmodi affectibus sanandis. Verum ratio me docuit octo imbecilli uentriculi curatiōes. Vidisti igitur & tu quosdam uno die, uel potius hora, frigidæ potio ne leuatos, quorum alijs non modo aquam dedi fontanā recētem, sed etiam quæ niue esset refrige rata, ueluti Romæ præparare solent, calfaciens sci licet prius, quàm ipsi *διησπικτω*, id est decoctā ap pellant. Cibos præterea ad eundem modum refri geratos identidē me illis permittere uidisti. In qui bus est & quam melcam uocāt, unus is quoq; Ro mæ laudatorum ciborum. ueluti etiam aphroga laled & frigidæ facultatis fructus, similiter refri gerans. iisdem dedi & ptisanam probe coctam, pa riatione refrigeratam: aliāq; id genus fexcēta. In quibus unam rem mihi proposui, ipsam scilicet re frigationem. Vetus autem absinthium & quicquid adstringeret contingere, ueluti alios rursus ad refrigerantibus abduxi. Calfesci autem omni ratio ne, unum uetus ex eorum genere quæ facultate ualde calfaciunt exhibens: (cuius maxime gene ris sunt Falernum, & Surrentinum) tum nutrime tum quod calfaciendi uim haberet, cum largo pi pere. In nonnullis omne consiliū curationis ad siccandum direxi: dabamq; ijs tum cibos qui natu ra essent sicci, ac probe assati: tum prorsus exiguū potum. Inimixi autem & adstringētium omnium usum, quem unum qui illis citra rationem meden tur, norūt. Alium uero non pridem, qui iam adeo

Galen.

A siccatus fuerat, ut simillimū habitum præferret ijs qui marasmo marcescūt, sanauit, cōtrarijs omnino exhibitis ijs quæ egregij isti medici suaserāt. Quip penō ex alia occasione eō periculi uenerat, (cum inter initia exiguā intemperie exsiccitate quæ ma defieri postulabat, habuisset) quàm quod ijs qui etiā curandum susceperunt, tum absinthio potantes, tum amaros asparagos, & bulbos edēdos dantes, itemq; mala cotonea, & cestiana, & punica, post quoq; ubi uenter nihil horum continebat, etiam rhois succum bibere cogentes, tum quæ paulo su pra dixi extrinsecus imponentes, paulo minus o mnis madoris expertem reddiderunt. hunc nos sa nauimus omni ratione humectantes, ipsiq; maie riam inueniētes ex ea methodo quæ in opere De medicamentis est tradita.

B 5 Nam sicuti in libro De demōstratiua inuētiō ne dixi, numerosis medicorū inter se dissidijs undiq; cōsulsus, ubi me ad iudicādum de his cōuertit, intellexi prius in demonstratiua methodo exerci tandum me esse. Quod cū multis deinceps annis fecissem, singula ipsa dogmata subieci: atq; prout inuentorum indicatio me ducebat, ita curationes institui. Verum quoniā id non omnes saltem pos sunt, expedit ipsis scribi per octo curandū indica tiones particularis materiæ comparandę medita tiones, à uentriculo rursus sumpto initio, quoniā huius primū mentionem modo fecimus. Ac facillimā quidem ad curandū alterationes sunt, quæ ex calido & frigido consistunt, propterea q̄ maxi me actiuis qualitatibus corriguntur. Aegrius cu rantur quæ in humido siccoq; habentur, q̄ imbe cillis & (ut sic dicā) magis materialibus qualita tibus eorū curatio perficitur, potissimūq; cum hu mectandū esse requiritur. Ac tēpus quidē calorīs frigorisq; reparādi, par quodāmodo est, securitas tamē impar. Nisi enim cūcta quæ ei quod curatur circundata sunt corpora, ualida planē sint, metus est ne ab ijs quæ refrigerent, noxam cōtrahant nō leuem. In reliquis duabus qualitatib; securitas si milis est. Tempus curationis in sicca intemperie multo amplius. quippe quod senium in sanis est, id sicca intemperies est in ægris. Itaq; etiam insana bilis est, si prorsus sit consummata.

D 6 Est autem prorsus consummata, ubi solida si mulariū partium substantia reddita est siccior. Nam est & altera siccitas, utiq; cum ea quorum substantia ex humore cōcreto cōstat, sicut caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, cum propria humiditas unde partes nutriūtur, omīno est absumpta. Con tinetur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam per eas sparsus, de qua dictum aliubi sæ pe est. Hanc igitur inferere particulis sine nutrime to non est. Ideoq; difficillima est omnium eiusmodi affectuū curatio. Diuersa ab ijs siccitas est, quæ in proprijs cuiusq; particulæ exilibus arterijs uen isq; cōsistit. Prouenit & hæc ex sanguinis penu ria. Omnibus itaq; in his siccitatib; maxime cōtra rius est austerorū usus, siue ea cibi sint, siue potio nes, siue etiam medicamenta, quippe quæ si quid in ijs superest naturalis humoris, id absumunt, par

tom. 6

h. iiii

tim ebibentia, partim in sinu uentris per exiguos meatus exprimentia, partim ad cōtinentes partes trudentia. Curabis igitur ipsas, si meatus qui contracti sint, dilataueris: ac quod in uicinas particulas est compulsum, reuellas. præterea singulas similiarum partium propria humiditate, humectantis nutrimenti ope repleas: ueluti nos quē memoriauimus à medicis siccatum, curauimus. Is in ea cōtrarietate quæ in frigido & calido consistit, nullā euidenter uincentem habebat intemperie, nec in uniuerso corpore, nec in uentriculo: siccus tamen & gracilis admodū est redditus, propterea quod uentriculus eius ex sicca intemperie imbecillus male cōcoxerat. Huic namq; omne curationis consiliū huc tendebat, ut humectaretur tum uētricus ipse, tum reliquū omne corpus. Quibus autem singillatim agendis, quibusq; maxime materijs sim uisus, ut uoti compos essem, non sit ab re dicere. Domū ei parauī maxime balneo uicinam, quales multas esse in diuitum domibus non ignoras. Ab hac statim in balneum super linteis mane intulī, utiq; ne si ipse se moueret, tum siccaretur, tum antequam commodum esset, exoleretur. Horum enim alterum contrariū affectui est: alterum moram in balneo minuit. Longissime namq; in aqua uersari hominē expedit. ideoq; etiā natatiōes utiliores sunt quā parui alui, quos *πυλῶς* Græce uocāt, atq; ex ipsis natationibus potissimū quæ propinquæ sunt foras egressui, quod scilicet illi ab aqua foras non longa sit uisā. Nam aerem balnei in ijs qui ita sunt affecti, haudquaquā desideramus. Esto autē aqua ad unguē temperata. cum quæ frigidior est, latenter frigus corpori infirmo insinuet. calidior autem cogat cōstringatq; tenues meatus, ac denset. At nos eos cū coacti sunt, remitti, laxari, ac dilari postulamus. quod temperatæ aquæ qualitas præstat, utpote quæ succūdisima cum sit, naturam ad explicandum se, atq; ad dulcedinem quam præstat, quoquo uersus extendendā prouocat. contraria uidelicet ratione ijs quæ sunt iniucunda: ab ijs enim recedit, fugitq; ad profundū. Quo minus mi rum est ex offendentiū contactu slipari, cōstringi, ac durari corpora, tenuesq; eorum meatus cogi, ac densari: contraq; ijs scilicet quæ iucūda sunt, succedere contraria, utiq; fundi ac molliiri corpora, dilatariq; meatus. Ab eiusmodi lauacro statim alinum exhibui lac: sed inducta in ipsam qua iacebat domum asina. Quippe sic mihi persuaseram maxime quidem celeriter hominem sanandum, si fieri posset, ut ipse asinam sugeret: sin id grauaretur, expedire ut quā minimo tēpore in aere ambiente lac moraretur, propterea quod celerissime mutari sit aptū. utiq; genitalis feminis ritu, quod nec ipsum aliquandiu extra propria uasa, si modo suas uires seruabit, morari patitur: sed uel in ipsius maris, partibus contineri, uel ipsius foeminae partibus situm esse postulat. Et sanē utilissimum lac est cum ex ipsis mamillis quis hauserit: ueluti Euryphon, & Herodotus, [& Prodicus] cēsent. qui tantam in eo ad corpora reficienda fiduciā habuerunt, ut etiam qui phthoe contabuerāt, ex ipsa mu-

lieris papilla lac sugere iuberēt. Verum cum hoc plurimis non placeat, melius est calens adhuc ex mamillis id in ægri uentriculum, quamocumque transferre. Ac optimū quidem, utpote cognatū, muliebre lac est. Sed quoniam id exhiberi sibi ceu pueris pleriq; recusant, utiq; ceu asinis, alinum ipsis dari conuenit. Id enim reliquis omnibus ad propositum affectum est utilius. quippe cum tenuissimū sit, & minime coagulatur, et quoquo uersus ocyssime in corpus digeritur. Eget autem horum utriusq; cui uentriculus laborat, utiq; ne coaguletur, cōmunis commodi gratia, omibus enim id est incōmodum: ut quoquo uersus digerat, propterea quod & celeriter nutriti est opus, & quod uig per quas alimentum transit, iam cōuenit. Igitur tum lac ipsum per se est his dandū, tum etiam mellis tepidi pauxillum immiscendū. Maxima uero habēda cura est in eiusmodi affectibus deutriusq; bonitate. Quod igitur mel colore flauo est, & odore suauī, tum purum adeo ut totum pelluceat, ac gustanti parum acre iucundissimūq; præterea tam sibi cohærens ut si digito attollatur, continuum sibi nec intercisum ad humum defluat: id omnium est optimū. Si uero abrupitur, nec demissum ad terram usq; cōtinuitatem seruat: id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut partium dissimilium, Græci *ἀνομοιομεγες* uocāt. Voco autem partium dissimilium, (quod sanē & nomen ipsum indicat) quod ex dissimilibus partibus est cōpositum. Deprehendas autem id, si diligentius inspicias, aut crassitudines, aut humiditates habere innatates, quæ nec inter se sint similes, nec etiam toti. Cerofum itaque magis mel est quod & crassius est, & cui tales quæpiā crassitudines innatant. Excrementosius uero ac perfici coneoquiq; difficilius, tum quod totū liquidū est, tum in quo multæ in partibus sparsæ apparent humoris guttæ. Porro in quo uel ceræ qualitas aliqua, uel propolis, uel id genus alia gustu deprehēditur, adeo nō est optimum, ut etiam malum sit. Quippe nullam penitus alterius cuiusquam rei eminentem in se continere qualitatē debet. Quocirca quod thymum planē redolet, non probō. Est enim id concoctū difficilius, nec planē quodammodo mel. Quamquam nō ignoro à quibusdam id laudari, eoq; fieri ut nonnulli uenditores incensum thymum illi inspiciant, quod id redolet, uideaturq; optimum. Ipse tamen quod tam improbe thymum olet, non laudo: multoq; minus si cui insectum thymum sit. Quod autem confusam quandam qualitatē odore gustūque præfert, id non uitupero. Ad eundem modum & lac nullam externam qualitatē odore gustūque præ se ferat, sed esto quamdulcissimū, & sibi ipsi continuū, & prout lacti conuenit splendens. super omnia, quoad eius fieri potest, similes habeto partes. Namq; hāc dotem, ueluti mel optimum, ad perfectionem non recipit. Quo uero tale fiat, & idoneis nutrimentis alendum animal est, & exercitationibus mediocribus admoveendum: & pullus si quem lactat, auferendus. Quod autem ætatis quoq; maxime florentis esse debeat, id ne-

minem latet. Curandū item ut quā optime concoquat, contemptis uidelicet ijs qui si a finis quoque uictus rationem præscribemus, ridebūt. Si enim Veneti, & Prasinī studiosi sectatores, equorum stercora, quō intelligāt quemadmodum alimenta concoxerint, odorantur, tanquam ex eo omnem eorum bonā habitudinem cognitam, multo profecto magis nostrum fuerit pro hominis salute nihil tale non prospicere, atq; herbas animalique quæ non admodū sint humidae, fœnumq; & hordeū quod sit mediocre, obijcere: sed nec illa omittere, ut asinæ corpus siccemus, & fricemus, & detergamus, & mūdēmus. Porro si liquidiora, & grauiolentiora, & flatus plena excreuerit, planū profecto est non concoxisse probe. Quare aut detrahendum aliquid de alimento est, aut exercitatio, aut aliquid adijciendum, aut qualitates immutandas, aut refrigerationis frictionisq; cura uarianda. Sin duriora reddat animalis aluus, ad cōtraria est inspicendum, atq; illorum aliquid immutandum. Nam si ipse omnia quæ considerāda circa animal sunt, cuius lacte usuri sumus, deinceps persequar, totam tuæ sanitatis artem cōmemorem, quam teneat necesse est, quisquis idoneum lac præparabit. nunc uero dici opus nō est, cum alibi de ea traditum sit absolutissimè. Sed ad propositum reuertor. Ac mihi iam rursus memoria reperes hominem, qui & lauatus est, & lac sumpsit. Hunc itaq; ad secundum usq; lauationem quiescere permitte mus, tum modice fricabimus, & pinguius: utiq; si lac quod sumpsit, iam ad unguē confecit, id quod tum ex ructu, tum uentriculi mole licebit cōijcere. Modicū uero temporis inter primam & secundam lauationem interuallum erit, si quatuor, aut quinque æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurimum. Sanè tertio lauabis, si multis lauatiōibus fuit assuetus. Hī namq; & delectantur, & iuuantur, si sepe lauent. Quinetiam post quāq; lauatiōē hominem ungemus priusquam se uestiat. Quippe conducit ad renutritiōem id quoq; sicut & frictio. Reddita uero de horum omnium facultate ratio est in libris, qui De sanitate tuenda sunt scripti. non tamē inutile fuerit nunc quoq; summam ea repetisse. Nam siue cuiuslibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, siue frices, siue laues, siue aliter quomodo cūq; calfacias, idem fieri cemes quod Hippocrates de ijs dixit, quibus aqua calida desuper infunditur. Nam primū attollitur, mox gracile efficitur. Ideoq; ubi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus calfaciendum nobis est, dum intumescat. Vbi uero digerere, & uacuare cupimus, eatenus cōtinuandū est, dum quod prius intumuit subsidat. Sanè qui eiusmodi operibus præficitur, sollicite attentus esse debet, potissimumq; ubi carne implere studeatur. Nam digerendi certe tempus adeo late patet, ut, etiā si uelis, in eo non aberres. At carne implendi planè præceptum est occasio. Siquidem cum primum intumuerit, tum est desistendum. At intumescere hoc singulis corporibus suum est. Non enim

Galen.

fieri potest, ut qui nunc nobis propositus gracilis est, ita intumescat ut illi qui sani sunt: immo postquam leuiter intumuit, protinus digeritur. Itaque attendendū diligenter est, ne clam te elabatur propositus temporis articulus. Siue igitur hominem qui extrema gracilitas est, perfrices, sufficiat tibi solus rubor. siue laues, satis esto mediocris calor. Si quid ultra peragas, resoluēs hominem magis, quā nutries. Vngendum uero post lauatiōem oleo est, ne uidelicet plus iusto digeratur, sed obstruantur exigua cutis spiramenta. idem protinus & siccitatis remedium fuerit: & aduersus incōmodum quod ab aere ambiente contingit ueluti munimentum. Ac si quidem delectatur lacte, post secūdum quoq; lauatiōem id exhibebis. sin aliter, pristinam diligenter cōctam, aut alicui pristinā ritū præparatā. Hinc ubi rursus quicauerit, ad tertiā reducendus lauatiōem est, aut ilico ad coenam. Sit autē præparatus illi panis purus, & qui curiose in fumo sit coctus, & tū fermēt, tum salis quod satis est habuerit. Obsonium quoq; ex laxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus. Præterea alæ testēs que gallinacæ, qui lacte sit altus, idonei sunt. Quorumlibet copia non est, alijs utendum. Ad eundem modum & perdicibus, & auculis montanis, & mollis carnis, uescendum. Vitanda autem & quæ palustria sunt, & quæ carne sunt dura. Et (ut paucis alimenti summā complectar) sit coctus facile, & nutriens, minimeq; glutinosus, atq; excrementosus. Porro omnium quos nouimus, ciborum maxime nutriens nulla caro est. Verum non aque, ac prædicta cōcoctū facile est: præterea glutinosum succum crassumq; generat. Alioquin nec alio esse habitū potest quod in summo sit nutriēs. Quippe adhærere id debet, & firmiter affigi, non autem præ tenuitate diffluere. Non tamen ad propositum affectum uti hac conuenit. Si enim nutrimentum ipsum seipsum cōcoqueret, ac in partes digereret, præterea alendis partibus assimilaret, & quibus alimento plurimo est opus adhæresceret: proculdubio maxime nutriende cibo esset opus. Verum quoniam non aliud est quod nutrimentū desiderat, aliud quod ipsum conficit: sed quod nutriendum est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & cōcoquit, & adiūgit, & adsimulat: ad duo nimirum nobis in opportuno cibo eligendo spectandum esse dicitur: unum ipsius cibi naturam, alterum uires suas proprias insitasq;. Itaque ex his illud paret, nec planè quod maxime nutriat, optimum esse ijs corporibus quæ refici magis egent, utpote quibus concoquendi facilitas non est: nec etiam quod facillimum concoctū est, cum scilicet ipsum nequeat maxime esse nutriens. Cum igitur hæ indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est ut dum alteri nimum sis intentus, alterius omnino obliuiscaris: sed utriusq; memor, quo ad licet utrumq; misc eas, quod mihi præceptū ubiq; memoria teneri uelim. Iam uini tum qualitatem, tum quantitatem memoremus: utpote quod maximam ad talia uim habeat: quando uno hoc in potu utendum censeo omnibus, quibus refici

tom. 6

h 2 corpus

corpus est opus, modo non febricitent. Esto igitur uinum (quod exempli loco dicatur) quale est Sabinum in Italia, Arsinium uero in Asia, ac (ut summa quadam ac generatim comprehendam) quod aquosum quidem alioqui est, ceterum leuiter adstringit. Aquosum natura appello uinum, quod tenue est, & purum, & *διυποφάρου*, ut Hippocrates Græce nominauit. Est autem *διυποφάρου* quod si diluatur, minimam sustinet aquæ mistionem. Id est sanè imbecillissimū, & ut in uinis aquosissimum. Nam quod plurimum aquæ in mistura sustinet, id tum uehementissimū tum ualidissimū est. Eiusmodi uinum Hippocrates *διυνδές*, hoc est (ut uerbū uim exprimam) uinosum nominat. Verum ab hoc cauendū est, quoniā imbecillas uires feriat. At quod aquosum natura est, ceterū austerrum, id percōmodum est, quod & ab aquæ imbecillitate recessit, & uini noxam nōdum habet. Ad hæc itaq; respiciens, tum ætatem eius, tum temperamentum inuenias. Quippe quod nouellum est, id tum aquosius, tum uero imbecillius quodāmodo est quā ut uino cōueniat. Adde etiā quod ægrius concoquitur, ac magis excrementosum est. Antiquius uero, ut uinosius est, ita uehementius est quā ut propolis sit ex usu. Quocirca citius sexto anno nobile Sabinū idoneum nō est, quod & diutissime in stomacho, ac uentriculo innatet, & fluctuationes faciat. Nobile uoco, quod austerum est, non Sabinum modo, uerum etiam Adrianum, & Albanum, & Arsinium, & Titacazēnū, omniaq; id genus. Dictum namq; fufius de omnibus uinis fecimus est. Ad has igitur ueluti metas respiciens, etiam misturam eius cum aqua temperabis. Quin etiam exactius cōiecturam de iam dictis facies, si uitiōrū aquæ capita memoria tenueris. Porro pendet ea ex frigiditate eius omnia, cuius culpa & in præcordiis diutissime morat̃, & fluctuationes excitat, & in flatum mutatur, & corrumpitur, & ita uentriculi resoluit robur, sic ut deterius proinde cōcoquat, sed nec digerendo per corpus alimēto ali quid magnopere conducit. At uero memoratorū uinorum uirtutes, comprehensis iam aquæ uitijs, aduersam quodammodo naturā habent, cum nec inflent præcordia, immo si inflata sint, subsidere faciant, nec inibi morā trahant, propter caloris mediocritatem. Adde quod cum digestionis uias aperiant, & pariter impellant, ac nutrimentum sursum agant, ad celeritatem deductionis in corpus conducūt. Sunt præterea boni succi, & ad miscenda concoquendaq; ea quæ in uentriculo & uenis sunt, idonea. Iam uires quoq; organorū adaugent, & expellendis excrementis uiam faciūt. Eoq; fit, ut etiam talia uina præter cætera urinas moueant, quādo & ipsa totum corpus celeriter transeunt, & impetu cursus sui excrementa secum expellunt. Ac dictum quidem alibi diligētius est de uinorum facultate, æque ac ciborum. Conuenitq; ut quāratem methodo tradi sibi studet, omnis materiæ uires prius prædidicerit, nec expectet ut eas in singulis affectibus audiat, sed simul ac curationis tantum speciem norit, debitam uictus rationem inue-

nire possit. Ego uero ijs consulens, qui ueriat̃ discendā sunt auidi, eiusmodi doctrinam attingere saltem non grauabor; quō scilicet qui minus exercitata cogitatione sunt, uocata à generalibus ad particularia, ueluti manu ducti descendant. Ergo quod reliquum est, apponendum. Potionis modus erit, ut nec in uentriculo innatet, nec fluctuationis ullius sensum inuehat. Ciborum uero, potissimum si siferi potest, ut ne grauēt quidē ipsum. Quod cum difficile sit, uel fortasse eiusmodi quod uitari in imbecillo uentriculo omnino nequeat, proximū est ut quāmcitissime grauis esse desinat. Ab hoc tenso inflatioq; præcordiorū uitandā ijs sunt. Quod si tale quippiam primo die inciderit, pro magnitudine symptomatis ad portionem detrahendum posttridie de cibo est. Sin recte omnia cedunt, paululum adijciendum. Ad eundem modū & in tertio die, uel demere, uel adijcere cōueniet, cum præcedente conferentibus. Atq; ita semper omnia pro renutriendi reficiēdiq; ratione, motionibus, gestationibus, inambulationibus, prout corporis incrementū procedit; administrare etiā reliqua omnia pro refectionis uocata ratione adijciētib;.

Quæ sanè genere à proposita ratione nō differt, sed in eo q; sub illa perinde totum corpus est affectū, sicuti sub hac uentriculus. Accidit autem sic affici corpus in diuturnis potissimū morbis; utiq; cum natura cuiusq; partis humiditas, ex qua prima nutritur, propemodū omnis exhausta iam est. nam ut solidarū ipsarum siccitas corrigatur, id fieri omnino non potest, sicuti nec senium; ueluti in libro De marasmo docuimus. hanc uero humiditatem etiam si omnino sit absumpta, regi nō modo dicta uictus ratione licet. Atq; in alijs refectionibus uentriculus egregie præter cetera nō afficit; in proposito aut̃ affectu morbus est ipsius uentriculi. Tempore uero totū corpus, utpote parum probe nutritum, macefcit. Quo rationabilis est exquisitiorem hos uictus rationē requirere, propter concoctionis imbecillitatem. Ceterū, cum meliores sunt affecti, transferendi sensum sunt ad renutritiā refectioniamq; uocatam uictus rationem, *ἀναλκτικὴν* Græci uocant. Id fiet si pluribus, & fractionibus, & gestationibus, quā ante utemur. Mutanda uero interea est, & ciborum tum qualitas, tum quātitas, sic ut tum plures, tum ualentiores, q̃ prius exhibentur. Ac tempore procedente, cum ad sanitatis statum prope uentum iam est, seponēda sunt ptisana, & lac, præterea sorbitio ex alica, ac ad consuetos cibos ueniēdum. post etiam pisces detrahendi, nisi si in consuetudine fuerunt, ac uolatilibus cibandum, tum fillas carnes esse, à pedibus in ptisana elixis incipiēt, post uero etiā imum crus recte sumant, ab hoc etiā reliquas partes. primū quidem iuuenis porcelli, qui si hyems sit, etiam pridie iuguletur. Nam hesternum, quā recens necatum, facilius concoquitur. Aestate sat fuerit, si mane immolatus porcellus sit, ac circa solis occasum comedatur. Quippe quod in superioribus fuasimus, cum ualentius alimentum uespere exhibendum censuimus, id semper obseruare studēbimus

debimus; utique non leue percepturis cōmodum
 ijs qui ita cibabuntur, quod sane diligentius inspi-
 ciēs agnoscat. Satiū enim est à principio rem cō-
 pisse. Quoniam qui ita se habent, plurimo nutri-
 mento indigent, nequeunt autē uel quod medio-
 cre est concoquere, paulatim hos & sepius cibare
 melius fuerit. Atq; id cōtra fieri non potest, ut se-
 mel eos cibasse sit satis, sed nec his, quoad scilicet
 sunt gracillimi. Atq; hac de causā ipse ter eos ciba-
 re solitus. Verū quando iam manifeste melio-
 res facti apparent, etiam his nutriuissē sit satis. Er-
 go tantam exhiberi primam cibationem est ratio-
 nabile, quāta priusquā secūda sumat, tota prorsus
 erit cōcocta. Id cōtingere ualentiori alimento nō
 potest. Quare primo loco leue sumendū his est,
 quō uidelicet concoquatur celerime, & extremē-
 tum eius discēdat, & uacuum purusq; uenterculus
 secundum excipiat. At quoniam nō solum quies,
 & somnus, sed etiam longius tempus huius natu-
 ralem administrationē excipit, rationabile est ut
 ualentiores ciborū hoc maxime tempore offerant
 eir. Itaq; etiam athletæ omnes sic faciunt, qui eum
 isum non solum aliqua ratione inuenerunt, sed et-
 ziam longa experientia cōprobarūt. Sed enim &
 quod illi faciunt, nihil mali sit, si ij qui cōuale-
 scunt uictu utuntur, etiam faciunt, ut illico post coe-
 nam non bibāt, uidelicet antequā cibus fuerit cō-
 coctus. Si quidem innatant cibi si bibāt, ita ut eos
 uentriculi corpus propter interpositum humorē
 non contingat. Verum si sitibundi fuerint, prohibe-
 re eos in totum ut graue est, ita nec expediens;
 sed tantillum indulgendū, quod & molestiam so-
 leat, & sitim leuet. Postea uero quān nutrimentum
 cōcoxerint, abunde bibere sunt sinēdi. Quip-
 pe celerime si ita faciāt, per corpus digerunt. Ma-
 ne uero post somnum cum deiecerint, & paulum
 inambulauerint, modice sunt fricandi. Est autem
 modica his frictio, quæ eatenus administrat, dum
 corpus incalcat, mox gestationibus utendum; de-
 in rursus tum lauandi sunt, tum fricandi, idq; intra
 meridiē, aut planē circa ipsum meridiem: quō ui-
 delicet inde ad uesperam abunde spatium interue-
 niat. Quod autem & de domibus in quibus cōua-
 lescent nutritur, habenda in primis cura sit, potis-
 simū ne frigidiores calidiores uel iusto sint, super-
 uacuum dicere arbitror: pari modo & de alijs eius
 generis, quæ inuenire sibi quisq; sine nostra ope-
 ra possit, doctus uidelicet non solum ex his quæ
 hic, sed etiam quæ in opere De sanitate tuēda sunt
 dicta. Est namq; conualescentiū uictus ratio me-
 dia quædam inter eam quæ sanorum propria est,
 & quæ agrotantium. Quare difficile non est ex ijs
 quæ de utraq; sunt prodita, ut per seipsum quis me-
 diam inueniat. Nam sicut nec aliarū rerum, ita nec
 uictus una omnibus species in consuetudine est:
 cum alijs semel esse, alijs bis; & alijs citius, alijs ad
 uesperā incepisse cibum, moris sit. Iam cibus ipse
 alijs piscis plurimū est, aut deniq; aliquid ex mari,
 alijs olera magis, aut deniq; hortensia, alijs poma,
 alijs legumina, alijs nuces, alijs aliud quippiā, alijs
 quadrupedum carnes; atq; harum alijs aliæ, alijs

autū, idq; alijs aliarū. Quinetiā caseo & lacte utun-
 tur nonnulli plus, quā cæteris cibis, generaliter
 quidem caprarum, uel boum. Sunt tamen qui &
 aliorum animalū. Bibunt quoq; aliq; calidum, aliq;
 frigidum, & uinum uel liberaliter, uel parcius, uel
 omnino nullū, uel hoc genus, uel illud. Ad ea igitur
 reducēdus quisq; est, quibus insueuit. Scriptū
 autem diligentius de consuetudine seorsum est.
 Nunc illud dixisse abunde sit, nō modo in conua-
 lescentium uictus ratione, sed etiam in morbis ma-
 gnā partem ad totius uictus medicamentorūq;
 inuentionē ex consuetudine sumi. Ratio enim to-
 tum genus indicare potest. Materia cum ex alijs
 quæ retuli, tum uero ex consuetudine nō minime
 est sumenda. Sed & naturarū inspiciedæ sunt pro-
 prietates. Noui enim quosdā, qui si quod uigilan-
 tiū opus nocte obire fuissent coacti, dormire præ-
 terea nō poterant. Talibus igitur ut noctu bibant,
 consulendū nō est: ne uidelicet ea occasione uig-
 ilare coacti, maximā inde noxam sentiāt; Siccat
 namq; totum corporis habitum uigilia, eoq; infe-
 stissima est ijs qui ex siccitate laborāt. Sunt & qui
 si pisanam gustent, protinus nauseant. Eadem in
 quibusdam facile accescit. Esse uero aliquos qui fa-
 cile carnē bubulam cōcoquant, iam unum ex pu-
 blice iactatis est: præterea alios esse qui ad alios ci-
 bos potusq; recte se aut nō recte habeant. Non so-
 lum autem ex his materiæ quæ ad uictū pertinet,
 copia suggeritur: sed etiam ex regione & tempo-
 re. Scriptaq; iam hæc sunt à multis qui me præces-
 serūt, quo minus ipse istis insisto, qui ideo tantum
 ea commemorō, ne quid uidelicet sit ommissum.
 Quod uero ab omnibus iunioribus medicis est o-
 missum, id persequar, nempe quemadmodū affectus
 corporum methodo curentur: eam metho-
 dum uereres (ut ante dixi) probe inchoarunt, ne-
 mo tamē eorum ipsam absoluit. Verum rursus ad
 propositum redeundum. Sicca intēperies ubi so-
 lida ipsa corpora contigerunt, siquidē in una qua-
 ptam parte cōsistant, ueluti nunc in uētriculo pro-
 positum est, nunquam ad perfectionem sanabuntur,
 nec in eum statum quāntē morbū fuit, reuertentur.
 Sed quod dici in consuetudine uulgo solet,
 re scilicet ipsa edocto, id talibus maxime intempe-
 rantijs accidit, morbum uentriculum afflixisse, &
 in reliquā uitam imbecillum reddidisse. Quippe
 senium ij uentriculum obtinent priusquam conse-
 nuerint: quo fit, ut facile ex leuibus lædantur cau-
 sis, perinde ac senes, nec probe concoquere pos-
 sint: quo euenit, ut etiam totum his corpus deterius
 se habeat. Ad eundem modū & si alia quauis
 afficiantur parte. Quod si ipso etiam corde sint af-
 fecti, celeriter arescunt, uocatq; ariditatē siue ma-
 rasum eiusmodi Philippus ex morbo senium. Is
 igitur marasmus breuī mortē affert. Proxime huic
 qui ab iocinore est inceptus. Mox qui à uentricu-
 lo. Qui ab alijs particulis ortum habet: tanto sanē
 tardius, quanto quælibet harum minoris est præ-
 stantiae q; illa. Si uero leuiter cordis corpus sicca-
 tum sit, senescunt quidem celeriter: cæterū plures
 annos trahunt, q; qui uehementē sunt læsi. Ad eum

dem modum in iocinore & uētriculo ceu dictum est: ac in reliquis omnibus ad portionem. Cæterum uictus ratio eadē genere est tum in hac siccitate, tum in illa quæ solam eam humiditatem absumit quæ solidas nutrit. Præterea etiam in tertia quam supra memorauimus siccitate. Facillima uero omnium sanatu quarta est, in qua uenæ succo sunt inanitate. Immo hic affectus ut frigiditas potius habitus curatur, quam ut siccitas: uel (ut clarius loquar) frigiditatis respectus in hac siccitate exuperat, periculumque in ea uertitur. Siccitas secundum locum obtinet, habetque proinde sanationem tum expromptā, tum celerissimam. Siquidem si biduo quis uictus rationem his caute exhibeat, modice calfaciens, & tuto nutriens, statim in tertio plenior uictus circa noxā admittunt: multoque id magis in quarto & quinto. Atque hoc sanè erat, quod Hippocrates præcepit: Quæ longo spatio extenuata corpora sunt, ea segnerit rescire oportet: quæ breui, breuius. Scire autem licet, solidorum corporum siccitatibus, si perdurent, succedere necessario frigiditatem. Quippe permanere siccitas ipsa per se non mutata oppositione quæ ex calido & frigido consistit, non potest. Celerime enim ex nutriendi defectu refrigerantur partes, propterea scilicet quod ex calido succo sanguinis nutriuntur. Sed quod inter initia dictum est, nunc siccitatis curationem executi sumus, & quæ ab initio sola est contracta, & quam nulla diutissime secuta est notabilis frigiditas.

7. Ergo proximū fuerit frigiditatē illi copulare, quæ euidēs quidem habere nossumus, ceterū magna non est. Est itaque curationis cōsiliū non simplex, ut prius: cū non modo tibi ut humectes danda sit opera, sed etiā ut calefacias. Quare intendendum acriter est ad prædiorū materiā, nec ubi imprudentes ijs quæ humectant, ea quæ nimium calefaciant, adiungamus: quippe his uehementer siccandi uis subest. Iam uero quātitas noxæ in utraq; intemperie ad materiæ inuentionē potest uiam ostendere, ut iamiam maxime quidem siccitatis sanationē modo perscripsimus. Modice uero adeo scrupulosa uictus ratione non indiget, quandoquidem nec uires ipsis funditus sunt collapsæ. Etenim nulla alia de causa difficilis redditur ualide siccitatis in corpore cōmoda curatio, quæ quod refici quidem corpus postulat, cuius uero per se coalescere cū eo nō potest: sed eius quod nutritur, operam qua præparetur requirit, quod est imbecillū. Ergo cum id modice siccū fuerit, propterea quod uires nō penitus cōciderunt, uberius cibare licet: nec metus est ullus ne à modo aberres. Quo magis ipsi de difficillima intemperie disserere institutus: ac in ea ueluti exēplo studiosos exercuimus. Hinc namque orsi ipsimet, ad mediocres siccitates corrigēdas idoneā materiā inueniēt. Proponatur autē & nūc siccitas quidem similis priorī, copuleturque ei frigiditas. Ergo calefaciētis materiæ admiſcendū iam dictis tantum erit, quantum particula ad frigus inclinauit. Proponamus igitur eam primum modice refrigeratam. Ergo ijs quæ paulo an

teretulimus, in lactis quidē usu mel uberius adicietur. Vinū uero, quod quidem ad genus spectat idem, cæterum quod minus aquosum quā prius & plurium annorum sit, dabimus. Quinetiā elculenta omnia calidiora exhibebimus, idque nō naturalibus modo ipsorum temperamentis, uerum etiam recētibus qualitatibus. Nardino præterea uento unguento assidue uenter est, sicut nunquam remaneat siccus. Sin id unguentū non adsit, mastichinū satisfecerit: sed & opobalsamo eum perungas, tum ipso per se, tum uero cum iam dictis misco. Quod si corpori ea magis adherere studebis, etiam cerā aliquid admiscebis. Si uero etiā eam biens sit frigidus, lanam ex his imbutā impones. Quinetiā chiam mastichē in opobalsamo aut nardino unguento liquans, lanā inde madentē uentriculo impones. Sanè utilius fuerit, si quod made facies, etiā optimasti purpura: qualis est tyria, quādo et adstringi ipsum modice, et cutis eius meatus obstrui expedit. Siquidem quæ rarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum digerūt succos, tum particulas frigidis extrinsecus aduenientibus obnoxias reddunt. Quæ uero ualent adstringunt, ea siccant. Quo fit, ut medicamentum quod euasmodi corpora excalfaciat, id nec euocantem uim habere expediat, nec adstrictoriam multam sibi immistam. Memineris enim uelim utrum eorum quæ in agris es cōtempatus, tum quæ in opere Demedicamentis es edoctus, nempe acerbā qualitatem sua quidem ipsius uirtute & refrigerare & siccare, quod si cui ualide calfacientiū sit admista, quod ex ambobus compositū est, minus quidē in calfaciēdinumunere efficeret quā alterum: siccandum uero non minus quā utrumque. Maxime contraria faciunt ijs quæ præcepimus, nostri temporis medici: qui sicca parti, & quæ nutrimento male fruitur, compositum sæpe medicamentum ex calida & acerbā materia imponunt. Est autem eorum quæ spūmæ Græce dicuntur, [nos inopia cōmodioris uocabuli acerbā diximus,] nullum profecto modice adstringens, ideoque nec modice siccans: quo uidelicet magis prohibenda ea in iam dictis affectibus sunt. At uero si cum siccitatis intemperie multa frigiditas sit, sic ut fortius calfacere subigat, omnium primū intemperamenti genus ad memoriā reuocabis, quippe quod omnium grauiſsimū esse ostēdimus. Quocirca ad corrigendū quoque esse difficillimum, multaque sollicitudine egere, id minime est ignorandum. Abstinerē uero simili modo à cōprehensio prius materijs tentabis, sperans scilicet fore ut longiore tēpore per tutiores sanetur affectus. Sunt porro tutiores hæc, (nā repetere ea quæ sunt tam necessaria, est satius) In nardino unguento solues mastichem chiam quāpinguisſimā, ac purpura excipiens uteris. Eritque utilius, modo copia eius sit, si opobalsamū adieceris. Dandū præterea uberius cū lacte mel est: sed detracta prius spuma: quod & minus sit excrementosum, & magis nutrit. Quinetiā mel ipsum coctū, per se optimum nutrimentū frigidus uētriculo est, ita ut calido aduersissimum. Atque hæc ambo meminisse in primis oportet.

ret, utiq; plurimis medicis ignota. Ac neque aliquid frigido corpori melle potius expetere, neq; ad calidū magis respuere. Ergo plurimū huic affectui pro nutrimentū mel optimū esto: sed quod prius super prunas ex quercu uitēue ad summū candentes, fuerit decoctum, ac curiose despumatum. Vinum aut eligendum semper est antiquum: eoq; antiquius, quo maior fuerit frigiditas. Tum si res postulabit, totū genus immutandū: ac primo loco Adriānum, mox Tiburtinū, aliudūe similis generis eligendum: uetera quidem omnia: ceterū non adeo ut amara sūt. Siccant em̄ quæ amara sunt, immodice. Sanē optimū medicamentū talibus omnibus sit, quo picatores quotidie utunt; ergo illi nre eo totū ventrem cōuenit, ac post aueli, priusquam refrigeretur. Atq; hoc si bis uno die deinceps feceris, abunde erit, sæpius aut non expedit: quando ita per halitum digerās, non sanguine bono particulā impleas. At nos ex propinquis locis attrahere, nō id quod continetur educere studemus. Idē omnib; particulis quæ ex nutrimento fructum non sentiunt, (*εὐπεπτα* Græci uocāt) mirificum medicamē est si quis eo moderate sciat uti. Sed & calcare uentriculum, ita ut in qualitate calorē eius non intendas, sed q̄ maxime naturale eius temperamentū tuearis, ac substantiam inaugeas: id ex leuissimis in eiusmodi affectu consilijs non est. Efficit hoc in uictu simul cum ijs quæ iam dicta sunt, maxime uinum. Ex ijs uero quæ uentri extrinsecus applicant, boni habitus puellus unā sic accumbās, ut semper abdomen eius cōtingat. Sunt qui catellos pingues in hūc usum habeant, neq; id in aduersa modo ualitudine, uerum etiam in prospera, tales itaq; ijs qui propter siccitatem quoq; solam imbecillum uentriculū habent, sunt idonei. Seruandumq; ante omnia est ne puellus humectat sit cute. Qui enim noctu sudore perfunduntur, refrigerant potius quā calefaciant. Nocent præterea tali affectui & calida fomenta: quæ quidem sicca sunt, eo quod rorem simularium corporum depascunt: quæ humida sunt, quod hūc digerunt, potissimum ubi largius his utimur: præterea quod nimis rarum frigoriq; opportunum corpus efficiunt. Ac de hac intemperantiarum coniugatione hæcenus sit satis.

8 Ab hinc multa ut propositū est, siccitati iuncta caliditas esto non admodū multa. In eiusmodi inceptis primū curatio nō modū seruabimus: sed uini uim, mellisq; copiam diminuētes, non solum non augentes: ita ut mel prorsus non degustetur, uinum uero exhibeat quod minime sit antiquū. Iam cibos apponemus sub lactis tepore: sed si æstas est, sub aquæ fontanæ frigore. Sed & uentriculum ungemus oleo tum crudo, tum melino. Ac multo sane magis si pluscula caliditas sit, ipsum uinum tum aqualius exhibebimus, tum sub eo frigore quod fontis aqua per medium uer exhibet: illud nobis persuadentes, eiusmodi affectum ad portionē esse febrem. Quippe quod illa uel in toto animali uel in corde est, id propositus nūc affectus in uentriculo est. Atq; ipse scio me unā cum

A præceptoribus primū omnium uidisse hominem quandā maturæ ætatis nō paucos iam menses uexatum: sed nec eorum quicquā affectū eius intellexit, nec etiā ipse. postea uero cū iam medēdi [eius affectus] methodū inuenissem, uenit mihi in mentem hūc utiq; illum esse affectū, quē olim fueram cōteplatus. Melius aut est rem etiā exponā. Quippe utilis omnino erit ijs qui audierint, nō secus ac fuit mihi. Homo erat quadraginta annos natus: medio, dum ualebat, crassitudinis, & gracilitatis habitu. Is sit uehementer affligebatur, ac calidam auersari se dicebat, cū illi frigidā nemo daret, tametsi hanc impense flagitabat. febricitare tamē medicis nō uidebatur, & uētricus, quæ sumpserat, tribus aut quatuor horis post excreuit simul cum potioe. Itaq; gracilis iā effectus, est ac periculo, pinguis, minime uidelicet adiutus ab austeris acerbisq; tum cibis, tum medicamētis. Sumpsit uero & post cibum, austerum uinum is homo, cum nec ultra sitim toleraret, ac ut aiebat mori mallet quā in cruciatu uiuere, aquam frigidam simul multam super cibum hauriens proinus sitire destitit, paulo uero post plurimū euomit. Ab hinc horrorem in toto corpore sensit: pluraq; operimēta poposcit, cum prius omnia abijceret. tunc igitur reliquum totum diem id fecit, nō tēmq; totum in quiete egit, cooperimentis se fouens. Venter uero circa mediam noctem semel excreuit, quæ mediocriter erant compacta. Itaq; nec siticulosus præterea erat. Postero autem die tum colorator multo, tum firmitior est effectus. Ac deliberabant iam medici an hominē lauare expediret: alij quidem suadentes, alij dissuadentes. uicit autem sententia eorum qui lauare suaserunt. Itaq; etiā lauatus citra offensam est, ac modice cibatus, tum melius ei quā pridie uenter cōcoxit. Questus autem est qd difficulter transglutiret, uisumq; omnibus est propter uomitum, qui præter consuetudinem incidere, uellicatā illi gulam fuisse, ac proinde male habere. Cæterum ut etiam secutis diebus symptoma permanlit, cōstabat nobis omnibus uentriculi imbecillitatē esse sanatam, gulam autē esse perfrigeratam. Nec sanē mirandum erat, sicut portione illa quod immodice calfactum erat, ad mediocritatē est reuersum: sic quod mediocriter calebat, fuisse refrigeratū. Cæterum gulam eius nemo potuit sanare: sed uitio in uitū mutato, tandem mortuus est. Alium uero huic similē non paucis annis post uidi, cum omnē uentriculi intemperie discernerē iā possem. Visum igitur est mihi statim maiore conatu refrigerandum esse, priusquam homo magis extenuatus simile quippiam priori ex refrigeratioe patereur. Turtius igitur uisum est primū refrigeratiā medicamēta, quæ præcordijs imponuntur, experiri. Quo facto, æstus sanē uētrici est remissus: cæterum homo suspiranti similiter respirabat, tanq; ægre totum thoracem moueret. Quin ipse quoq; interrogatus, talem quampiā sentire se offensam fatebatur. Aduerti itaq; illi transuersum septum refrigeratū esse: proindeq; abiectis refrigeratorijs, foui locum oleo calido. Cum autem re-

spiratio statim naturalē motus sui ordinē recepit, à fouendo destitit. Statui autē hominē longiore spatio moderate refrigerare. Ergo & quæ extrinsecus applicui, infra magis imposui à septo umbilicū uersus recedēs; & cibum potionēq; omnē (excepto lacte) sub fontanē aque frigiditate exhibui. Atq; ita longiore spatio sanatus est, nusquā alibi offensus. Sciri tamē illud ante omnia debet, ubi ualide in ambabus qualitatibus immutata quæuis particula est, omnē eius actionē perire: nec facile quod sic est affectum, ad suam naturā reuerti posse. Vbi uero altera tantum qualitas plusculum immutata est (ueluti nunc siccitate fiximus) reliquārum aliqua mediocriter se habet, utiq; qui ita affectus est, sanari potest.

9 Proponamus itaq; rursus exuperare intemperiem calidam, huic autē adiutam esse modo humiditatem, modo siccitatem, sed mediocrem utraq; ac prius humiditatem. Hanc intemperiem minorem me tu aqua frigida curabimus; quando minime ex ea læduntur uicinæ partes, quæ mediocriter se habent. Nam in siccis affectibus necesse est nō eamodo quæ proxima sunt, sed etiam totū corpus graciosius reddi. Ventriculū autem ipso nondum siccato, ut nūc est propositum, nec totū attenuatum esse corpus potest: quare nec frigida potu lædi. Si cubi uero adeo uehemēs calor intemperies uentriculū occupet, ut usq; ad cor ipsum perueniat, febricitare hominē necesse est. Quō minus mirū est si eiusmodi intemperiem maius periculū insequitur, sanatio tamen genere eadem est. tradetur autē postea, ubi de febrili curatione differetur. Qui autē cum siccitate coniunctus calor est, eadem genere remedia possit; cæterum non adeo securus esse refrigeratiū usus, propter eas quas retuli causas. Humida uero intemperies, siue sola cōsistat, siue cum calore frigoreue coniuncta sit: omnium facillime curatur. Et quoniam tres hæ intemperies creberrime uentriculū affligunt, suntq; curatu facillimæ, harū curationē in memoria habent quicunq; abscq; methodo, hoc est uia & ratione, morbis medentur: ac ad alias eam intemperies (ut dictū est) transferūt, ignorantes uidelicet plures esse. Sunt porro ipsius humidæ intemperantiæ cum sola consistit, remedia, cibi qui citra ualentem calefactionem refrigerationēue siccant: præterea consueta portionis paritas. Eius autem quæ cum caliditate cōiuncta est, adstringentium & ciborum & potionū usus. Sint autē & hi austeri sine calfactione. Quin & frigida potio eis est ex usu. At eius quæ cū frigiditate est cōiuncta, optima præsidia sūt, acris omnia, quib. admisceri debebūt quæ acerbæ, sed citra manifestū frigus sint. Optimū est & his præsidii exigua potio, atq; ea uini cuiusq; insigniter calentis. constat autē id minime nouum esse. Ad portionē uero eorū quæ comesta & bibita sunt, etiā reliqua omnia quæ foris applicantur, adhiberi debent. Et quoniā de his abunde tractatū est: repetitō rursus sermonis initio, capita eius colligamus.

10 Calida ergo intemperies refrigeranda est, frigida uero calfacienda. Similiter humida siccanda, et

A sicca humectanda. Quod si per copulationem aliquam durū qualitatum intemperies consistat, miscenda amborum consilia sunt, ac quæ humida calidaq; est, siccanda & refrigeranda, quæ uero humida & frigida, siccanda ac calfacienda. Ad eundem modū sicca & frigida humectanda ac calfacienda. sicca uero & calida humectanda & refrigeranda. Scire uero licet omnium harum pessimam esse inter simplices siccā, in compositis siccā si mul & frigidā. Atq; hoc loco sinem habeant utriusculi intemperies, quas scilicet intrinsecus nullus alit superuacius humor.

11 Deinceps ad eas quæ ex eiusmodi quapiam occasione sunt, stilum conuertā. Sæpe igit in ipso sinu uentriculi cōtentus humor, qui aut calfaciendi, aut perfrigerandi, aut humectandi, aut siccandi, aut etiā horū aliqua per coniugationē efficiendū naturam obtinet, intemperie creat: interim uero & in ipsas uentriculi tunicas (ut ita dicā) imbibitus siue impactus. Ergo prior affectus si semel cōstituerit, per uomitū expurgatus, facile quiescit. Sin rursus ex alia quapiam uel alijs particulis humor confluat, diligeret discerni indiget. Curatio uero post effectricis causę cognitionē statim se exhibet. Dictum em̄ nobis est tum alibi, tum uero in ijs quæ De differentijs febriliū scripsimus, cōfluere nō nunquam ex alijs in alias particulas id quod in hīs reddat: ueluti ex capite ad oculos. Quo casu oportet curata ea parte, quę transmittit, duntaxat summati prospicere oculorū: quō uidelicet eorum quę ad sese cōfluūt, minus prōpte quicq; admittat. Ita igitur & in uentriculi affectu oportet ubi id quod superuacuum transmittit inuenieris, omnem huc curā conferre: de uentriculo autē tantisper esse sollicitum, ne quæ cōfluant, prōpter recipiat. Id quod duplici (ut arbitror) ratione fiet: una omnium fluxionum cōmuni, quippe quę ab adstringentibus percutiuntur. altera uero nō minus ipsa quoq; omnium partū quæ ad bonam habitudinē reductionis cōmuni: nempe ex ipsarum temperie me diocritate. Ergo primū inspiciendū totū corpus est, an excrementosum; an plethoricon, id est nimia æqualium humorū copia redundans, fluxionem uentriculū immittat. Secundo loco si id nō uideatur, singulæ partes expendendæ. Atq; in toto quidē corpore aestimando, tū redundantia, tum excrementorum notas, & ex opere De sanitate tū enda & ex libro De plenitudine didicisti. Super has tamen illa quoq; æstima bis: primū quidem in mulieribus an naturaliter nō purgetur: mox in uiris an excretio aliqua consueta his retenta sit. Pleuriscq; enim ora uenarū quæ in sede habentur, uacua re superflua sunt sueta. Alijs profluens ē narius sanguis aut uomitus, aut alio quopiam loco in certis periodicis uas aliquod reclusum. Noui em̄ tum in ore, tum in faucibus id multis contingere. Non desunt quibus & per uentriculū sanguinis expulsio certo tempore fiat: potissimū ijs qui cū uehementē exercitationē deposuerunt, à priore tamē uictu nō desisterunt: aut etiam artui toto aliquo sunt priuati, ueluti etiam Hippocrates indicauit.

Sunt quibus diarrhoea & cholerae certis interval-
lis omnem corporis redundantia adducit. Ab his
illud aestimandū, quam uictus ratioe sit usus: ut
tunc frequēti cruditati aut satiēti incedit, idq;
in ociosa uita, ac praecipue praeter cōsuetudinem;
aut cōtra. Illud deinde perpendendū, an aliud mē-
brum corporis certo tēpore circuitu uexari soli-
tum, nunc nō uexetur. Alijs enim articularis mor-
bus, aut coxendicis, aut podagra; alijs cephalaea,
aut etiā fluxio aliqua, quae in oculos uel aures pro-
cubuit, nunc migravit ad uētriculū. Nō paucis
uero catarrhi & coryzae (id est defillationes per
guttur & nares) quae assidue uexabant, conuersae
certo tēpore ad uentriculi loca sunt. His igit omni-
bus consideratis, siquid ex minus momentaneis
translatio facta est, quod superfluum est, rursus ad
eareuelles. Sin ex ijs quae maioris sunt momenti,
ambobus simul cōsules eum semper summouēs
affectū, qui fluxionē excitet. Fiet id si omnes cor-
poris partes ad bonam habitudinem reducamus:
ac omnes naturales expulsiōes fluxiles semper
reddamus. Haec quēadmodū efficere possis, in o-
pere De sanitate tuēda est praēceptū. Nec illud la-
tet, si propter aequalitē in toto corpore succorū re-
dundantia uentriculus fluxione tētatur, totū cor-
pus uacuandū esse. Simili modo si, ppter mali suc-
ci abundantiam eam purgādā esse, atq; hinc ad
uentriculū ueniendum. Prorsum enim cum plu-
res iam dies delata in eū superuacua sint, aliquid
uicij ex malitia eorū contraxit. Itaq; non intēpesti-
ue qui ita laborat, absinthij portione utē. Sed nec
quae postea adhibenda prouidentia sit, quoad uē-
triculū pristinū habitum recuperaris, latere arbi-
tror. Quippe si quo temperamento noxiae fluxio-
nis, intēperie aliquando laboret, corrigi nimirū
per contraria praesidia postulat. Facillimum uero
est eiusmodi noxam corrigere, ubi paucos dura-
uit dies. Nam si inopia eius qui curasset, longiore
spatio permanisset, aliquando tunicae eius malo suc-
co impletur: aliquando ipsa similis earum sub-
stantia intēperata non leuiter effecta, similis cu-
ra indiget ei quam prius De intēperantijs in hoc
libro retulimus. Reliquum igitur est, ut expona-
mus quēadmodum curari succus uiciosus debe-
at, qui in uentriculi tunicis est receptus. Sunt por-
ro ad eiusmodi affectus idonea pharmaca genere
quidem ea quae modice purgant, sic ut eorum uis
super uentriculū & intestinorum loca non ascen-
dat: aut si quid ultra, uasa tantū in mesenterio cō-
tingant. Speciatim uero quae ex aloē componun-
tur, sint aptissima. Etiam si illa praestō nō sint, aloē
ipsa per se. Haec itaq; nō elota ualētius uacuat: elo-
ta purgat quidem minus, sed roborat uentriculū
magis. expedit ergo paratam habere, quam om-
nes medici picram, id est amaram uocāt. atq; hanc
dupliciter confectam: utiq; ex aloē elota & non
elota. Admiscitur autem huic cinnamonomum, et
xylobalsamū, & asarū, & spicanardū, & crocum, &
chia mastiche. Sūto aut horum cuiusq; drachmae
sex. solius aut aloes drachmae centum. Praestanti-
simum hoc medicamentū est ad uiciosos succos

A qui in tunicis uentriculi habentur. utiliusq; est eo
sicco ex aqua uti dum paruorū cochleariū men-
sura, ubi mediocriter ac medio quodam modo eo
uti studeamus. nam maximus eius modus ac abso-
lutissimus est duorum non utiq; paruorū, sed ma-
gnorum potio in aqua temperata cyathis tribus;
minimus unius parui. Vtendum uero hoc tēpore
& pitanae cremore est, qui primus a balneo fume-
tur. Nam medicamen ipsum solito purgantū me-
dicamentorum tempore dabitur. Post id uero ubi
modice inābulauerit, & modice se mouerit, de re-
liqua uictus ratione nihil est imitandum. Sunt
qui reponunt medicamentum, excipientes id de-
spumato melle. Et sit quidem ita durabilius: ca-
terum non perinde ad propositum hoc loco affe-
ctus utile, cum & minus uentriculū roborēt, &
magis alium deiciat. Verum quibus lenta pitui-
ta uentriculo est infixā, ijs prius exhibenda sunt
quaecunq; hanc dissecant. post deinde purgandū.
Quod si ad uomēdū sunt idonei, nō inutile sit per-
radicalem ex oxymelite uomere. Sin uero nec len-
tus humor sit nec crassus, utiq; abunde sit a pitanae
soliū cremore uomuisse, item a mulsa. Quo
casu sumendum utriusuis plus est, quam uel nutri-
menti uel etiam defectionis causa fuerit uer. ido-
neum uero est & si mulsa in qua incoctum absin-
thium sit bibatur. Nam id quoque tenues succos
quicunque uidelicet in ipsius uentriculi ore con-
tinentur, commode deorsum impellit. Sanē com-
munis est totus hic sermo qui De temperie agit,
cum sanitatis tuēda praēceptis, ea scilicet sui par-
te qua de parum firmis actionibus disputat. Non
enim profecto ea qua de perditis, aut uitiose fun-
ctis agit. Quippe pars illa a sanitatis tuēda con-
templatione plane seiumta est. Imbecilla uero a-
ctio prout magis inuasisse talis est, aut ad sanitatis
tuēda; aut ad medendi tractationem pertinet. le-
uiter quidē impedita ad priorē, grauius ad poste-
riorem. Discernitur utraq; ex eo qd a cōsuetis acti-
onibus obeundis propter noxae magnitudinē uel
desistatur, uel nō desistatur. Dictū aut & de his est
in opere De sanitate tuēda: qd utiq; celeritus trāse-
unda eorū tractatio nūc est: praesentim omī metho-
do, qua uētris intēperies sint curāde, itā percripta
sint hē firmius ei ex mora inheserint siue leuius.

D 12 Nec uero illud latere puto, esse aliquando
mistum ex tribus iam dictis simplicibus in uentri-
culo affectum, ita ut & ipsa solida partes intēpe-
rie laborēt, & mali succi ita uētriculo sint infixi, ut
elui ex facili nequeant, & alij in interno eius sinu
cōtineant. Potest nanq; interim fieri ut primus cū
secundo cōsistat. potest & secūdus unā cū tertio.
potest & primus cum tertio, sepe etiā omēs simul.
Pro quibus methodū quam prius De uulneribus
tradidimus, ubi omnes affectus simul coniunxi-
mus, ad memoriā reuocabis. Quā nunc quoq; ap-
ponere nō sit inutile. Primū nanq; in eiusmodi cō-
plexu aestimabis a quo maxime discrimē agro im-
pendere uideat. Secundo loco quid quēuē ex his
causae rationē obtineant, & quae ab ipsis efficiant.
Tertio quae sanari ante alia possint, et quae nō pos-
sint

sint, ueluti de ulceribus quæ unâ cū phlegmonis consistere, ostēdimus. Vbi namq; a quoq; affectuū non leue periculum instat: ad id quod urget, dirigimus primum curantis cōsilio debet. Vbi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur: ipsa causa spectanda. At ubi curari hoc ante illud non licet: ad id quod ordo dicat, est respiciendum. Atq; in eo quidem curationis cōsilio quod ab urgēte initur, affectus magnitudinem perpendenda est. Ea triplex est, alia quæ ex lesæ actionis præstantia spectatur, alia quæ ex propria affectus essentia. & tertia præter has quæ ex facultate, quæ læsum corpus gubernat, æstimatur. In eo uero cōsilio, quod ex causæ ratione initur, animaduertendū est quidnā eorum quæ inter se cōiuncta sunt, augere aut gignere reliqua possit. Quæ rursus uel gignant, uel incrementum ab eo accipiant. In eo uero quod ordo præscribit, quid ante qd, uel quid cū quo, uel quid post quid, sanari possit. Fingatur igitur in uentriculū defluere ex cerebro superfluum quandam humorē frigidiū, atq; eius occasioe intemperie quādā in uentriculo contractā iam esse: quin potius malū iam succē per totū eius corpus media omnia similariū particulārum spatia occupasse. In eiusmodi cōplicitatis dignatioe maior est intēperies, propterea uidelicet qd et ipsa tēperies, propriæ uero essentia ratione quodcūq; utiq; tale fuerit, circa propositū in sermone ægrum. Ac ponatur ad præsens maximum trium affectus esse succorū, qui in tunicis uentris continentur. Esto (si liber) ut idem quoq; affectus morsus sensum faciat, atq; ex eo ipso animi defectum & sudores quosdam cum syncopes dissolutione accersat: ita uidelicet, ut quatenus supra uires est, reliquis sit maior. Constat igitur primam esse adhibendam curam, ut ei qd uires resoluit, occurratur. Deinde quoniam omnium maximum propriæ essentia ratione hoc finimus, utiq; ad id primum te uerteris, ac primū id sanes. Vbi id medicriter se habuerit, ac neq; uires amplius labēt, neq; plurimum uitiosi in uentriculo sit: tum nimis ad causam accedes, illud pro comperto habens, non posse ad perfectionem ullum affectum sanari, manente adhuc ipsa unde natus est causa. Ordo autem curationis, modo contraria inter se remedia, sicut in phlegmōe & ulcere, indicat: (ostensum namque est quæ phlegmonem sanant, ea maius reddere ulcus) modo alteri affectui nihil nocet, sicut in proposito nunc casu. Qui em̄ educit humorem qui in sinu uentriculi continetur, is humorum qui in tunicis continentur, alimentum admittit: æque & qui cerebrū ita sanat, ne quam sensibilem redundantia creet, is ueluti fontē fluxiōis in uentriculo destruit. In his ergo ordo curationis cum ordine causarum cōsentit, quanq; in alijs dissentit. Cæterum, quod ex magnitudine spectatur, id distingui prout dictum est, debet. Ac primum quidem id agendum est, ut ei quod maximum est, propriam medicamentorum materiem accomodes: deinde pro causarum ordine totum cures. Etenim cū neq; copia notabilis excrementorum in uentriculo sit, nec eorum quæ in capaci

tate eius continentur, nec eorū quæ in tunicis, sed neq; mordicatio quæ uiribus officiat: tum omnium primum sanandum ipsum cerebrum est. Ab hoc linus ipse uētriculi uacuandus extergendusq; est: postea ipsæ tunicæ expurgandæ: postremo intēperie est medendum. Dicta uero prius sunt cuiusq; horum medicamēta. Itaq; nec prolixus habendus adhuc sermo est, sed finis iam libro imponendus. Omnium enim reliquarum partium intemperies similiter ijs quas in uentriculo proposuimus, sanantur. Semper enim comparandum remedium est quod sit affectui contrarium: ac illi remediū indicatio quæ a laborantis natura sumitur, adiungenda. de qua dictum in superioribus iam est: dicetur tamen in sequentibus uberius.

13. Necessum uero erit & nūc paucis de ea mentionem facere. Prima quidem indicatio a laborantis loci temperie sumitur, quæ calfaciendi, refrigerandi, siccandi, uel humectandi, uel aliquid horum cōsumēte cum alio faciēdi mensuram præscribit. Secunda ex eo sumitur, qd actio eius omnibus animalis partibus sit cōmunis, aut qd cōmunē uitia sumministrat. Tertia, ab ipsa partis figura. Quarta ab ipsius positura, cuius portio est ad uicinas animalis partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sentiendū, uel acrimonia, uel hebetudo. Ac dicetur quidem in sequentibus de singulis horum latius, nunc paucis ea transcurramus. Quæcūq; calidiores natura partes ex frigore laborant, hæc liberalius & diutius calferi postulat: sicut etiam quæ frigidiores natura sint, si ex calore laborent, refrigerari: & sicciores, si ex humiditate male habeant, siccari. Ad eundem uero modum & humectari quæ humidiora naturaliter sint, ubi ex siccitate laborant, tum uberius, tum diutius postulant. Quippe eatenus redeat ad naturam eorum quodque necesse est, quatenus a natura recessit: ac ueluti quadam uia retroferatur quæ in diuerfum agat ei, quæ facta in ipso est, transmutationi. Contra uero pars quæ calidior natura est, si calido morbo ægrotat, exigua breuius temporis refrigeratione eget: sicut quæ frigidior est calfactione. Ad quem modum in humidis quoq; & siccis se habet. Siquidē paruus est in eiusmodi in id quod præter naturam est lapsus: & rursus in id quod secundum naturam, reditus. Vnde etiam minus periclitantur quicūq; cognato naturæ suæ morbo laborant. Non latet uero & quod sicuti coniugata intēperies inciderit, eatenus hæc reduci ad naturā postulant, quatenus a natura recesserunt. Atq; ita quidē a tēperamento laborantis partis, auxiliorum indicatio sumitur. Ab eo uero qd actio eius omnibus animalis partibus utilis sit, aut paucis quibuscūq; aut uni sibi, in ijs intemperie neribus quæ absque humore infestant, utique nihil ex hac indicatione sumitur. Nam & refrigerari, & calferi, & siccari, & humectari, & per coniugationem quiduis horum pati singulæ particulæ pro morbi portione requirūt. In his tamen quæ ex humoribus sunt orta, si particula soli sibi iniuriat, audacter uacues licet, prout affectus fundebit, sed

bit, sed tamen etiam uirtuti attentus. Sin necessarium opus eius sit omnibus animalis partibus, ueluti uentriculū; & iocinoris, non leuis habenda sollicitudo de robore uirtutis est, ne hanc magna semel uacuatione usus dissoluas. Est porro commune opus, & uenarum, & arteriarū, & cordis, & thoracis, & renum, & utriusq; uelicae, tum eius quae loci uero excipit, tum bilem: cum uasis etiam quae ab utraque procedunt. Cerebri uero opus, cum sani sumus, ad uoluntarias actiones necessarium est, ijs scilicet instrumētis quibus eiusmodi actiones omnibus: Cum aegri sumus, necessarium non est, nisi ijs tantū quae ad respiratū sunt deputata. Reliquorum uero organorum actio certe non est: minime enim tamen est ad uitam necessarium, ueluti pulmonis, & asperae arterie, & faucium. Ergo ex eiusmodi particulis quāplurimum uacuare redundantiam licet, prout uolueris. Ex uentriculo uero, & iocinore utrunq; uacuare non licet: sed cum cautione, ut ne quid uirtuti officias. Quoniam autem non par est actionum dignitas ad aegros seruandas, sed aliae magis his, aliae minus utiles sunt; utiq; ad portionem actionū dignitatis etiam cuiusq; partis prospiciendū est robori. Maxima igitur est cordis officij dignitas, atq; aegrotantibus maxime omnium necessaria. Cerebri uero ad uitam quidem par est momentū: nō tamen par robor eius in aegrotis requirimus, cum necesse omnibus nō sit neruorum ac musculorū opera uti. Itaq; abunde fuerit, si tantum eius seruatum sit, quo respirantis munus sit obeundum. At uero iocinoris opus omnibus particulis per necessarium est: non tamē adeo saltem perpetuum necessitatē habet sicuti ipsius cordis. Ad portionē autē iocinoris, etiam uentriculi opus se habet. Inrelligens ergo omniū particularū, tum functiones, tum usus, quos in alijs cōmētarijs tradidimus: haud difficulter inuenies, quatenus cuiusq; robor custodiri oportet. Ad eundē uero modum & quacūq; partes alijs autores facultatum sunt, harum quoq; robor seruare decet pro facultatis earū usus portione: quo uidelicet animalis partibus subministrant. Sanē de his particulis illud

A (arbitror) didicisti, cerebrum neruis ac musculis, cor arterijs, iecur uenis suppeditare uirtutem. A si gura uero indicatio ipsius modi uacuandi excrementi suggerit, ad hunc modū: Vētriculus uomitu deiectioneq; inanitur. Intestina deiectione tantum, sicuti etiam iocinoris caua. Renes uerō, & uelicae, ac iocinoris gibba, si multo utriusq; succo sunt referta, per deiectiones, & pharmaca deiectionia (κατακλινα Greci uocant) expurgantur. Sin mediocri, per urinales meatus. Cerebrū uero per palatū, & nares, & aures. Pectus & pulmones per asperā arteriam, & fauces. A situ indicatio dabit, ut ad solidariū intēperies, tum autē ad succorū uitium sanē non leuis. Nam qui per sumina corporis intēperie laborant, ijs medicamenta quae intēperies requirit, applicabimus. Quibus autem in profundo corpore intemperies est, in ijs rationem interualli insubimus. Si enim medicamentis ijs utere quae intēperies requirit, utiq; multo imbecilliora, q̄ pro usu tuo ad locum affectū perueniēt. Iam ad uacuationes quoq; non nihil situs indicat, dum societatem laborantis particulae cum alijs docet. Nam si illud compertum haberemus, q̄ cauo iocinoris subijcitur uētriculus, & ieiuniū: tum quod ieiunio ipsi tenue intestinum succedit, id uero colon excipit, ac colon qd' appellat rectum: utiq; inuenisse illud non licuisset, q̄ iecur, & per aluum, & per uomitū expurgari possit. Ceterū aptior sit prior uacuatione, tanq̄ usui iam calentibus intestinis iocinoris superflua tolerare. Nō spernenda uero indicatio est, & ea quae sensus partiū, acutas hebetudoq; suppeditant: quādo omne medicamē contēnunt quae tardi sunt sensus, etiam si non leuiter mordeat. At quae acuti sunt sensus, eorū uires dolore resoluiuntur. Expedi igitur has nec conferim, nec semel ualentibus auxilijs mederi tentes, sed tutō potius in tēpore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire quod iustum est licet, semel usis re medio quod sit idoneū. Verum quod supra dixi de locorū indicatione, latius discēptabitur in sequentibus; idq; eo praecipue loco, quo De tumorum praeter naturam curatione agemus.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI OCTAVI.

Cap. 1. Proponit quādam in genere de ratione mendendi febribus. 2. Exoritur ab ephemera febre, & corporibus huic obnoxijis ppter halituosos uapores nō facile transpirabiles, siue cutis stipationē. Ad hēc sermo nec accomodat & alijs febribus: ac simul diatriarios reprehēdit, docēs quāta pericula fames praesentibz. accersat. De cibus quibz obiter, pusana, alica, piscibus, auiibus, rerrefribus. 3. Quō mendendū sit animae affectio- nibus, frigori, uisioni, lassitudinē, unde diaria febris cōtrahitur, per olea, frictiones & balnea. Meminit etiam in- stitui sui, quo peruenit ad tantā in medica arte cōsum- mationē. 4. Cura diariae facit ex obstructione ppter fuliginosa succorū excrementa, per phlebotomia, purga- tionē, & deterfora medicamenta. 5. Diaria febris curatio, quae ex crapula & ciborū auditatibus contingit, maxime ubi in nidorulenta & fumosa qualitate cibi corripuitur: rarius autē, quando in acidum. 6. Cura ephemerae ex bubone. Contra diatriarios. 7. De dia- triijs quae ingruunt intemperiei calidae & humidae. De ac-

quisito habitu uel bilioso, uel calido & hūido. 8. Quae tēperies plus soleat esse febrī obnoxia quae minus: quae- que faciliore momento uergere possit ex diaria in puri- dam. 9. Victus rationem iumentam esse ex tempera- menti indicatione.

Aliter.

De febrium diariarum differentia, & quas ob cau- sas contingere soleat. Quae naturae promptius ad dia- trias cortipiantur. Quos febricitantes cogamur non- nunquam etiam inter initia accessionum cibo reficere: quibus si a medicis inedia iniungatur, quātum inde la- dantur. De frigidae exhibitione. Methodus cura- tionis eorum quae uentriculo accidunt: Et sunt.

Oris uentriculi imbecillitas. Si uentriculus intus uritur: Si aluius fluit: Si appetentia sit deiecta.

Si uenter omnino astringetur: Si rosione uexetur: Si flatuum copia adsit. Si cruditas in acidum qua- litatem sit mutata. De febrium diariarum dignotio- ne & curatione.

GALENI METHODI MEDENDI, ID

EST DE MORBIS CVRANDIS,

Liber octauus.



VE MADMODVM uero fe-
bres quoq; non secus q; alij
morbis qui ex intemperie in
nobis consistunt, quosq; in
præcedenti libro narraui, me-
thodo curentur, tempestiui
nunc dicere uidetur. Quod
igitur Eugeniæ charissimæ,

simplicium ac primarum partium (quas Aristote-
les similes uocat, natura ex calido, frigido, hu-
mido et sicco, inter se mistis cõstet, uno uolumine
ostendimus, in quo De elemētis secundū Hipp.
disputauimus. Quod uero ex eo quod hæc calidi-
or sit, illa frigidior, uel humidior, uel siccior, uel si-
mul horum aliquibus copulatis affecta, simplices
ac primæ particule inter se differat, id in libro De
temperamentis est assertum. At in libro quo De
morborum differentiis agit, duo in uniuersum
esse morborum genera, quæ in simplicibus anima-
lis particulis oriuntur, docuimus. Alterum quod
etiam secundis, & compositis, & instrumentali-
bus sit commune. Vocauimus autem id unitōnis
solutionem. Alterum ipsarum peculiare, quod in
calidi, frigidi, humidi, & sicci intemperie consi-
stat. Esse autem ex intemperantijs ipsis quæ qui-
dem in una sunt contrarietate, simplices: quæ in
ambabus, compositas. In ea itaq; quæ est inter ca-
lidum & frigidum oppositione, duas esse simpli-
ces intemperies. Alteram, ubi quicquid tanto effi-
citur, quam ante erat, calidius, ut eius lædatur ac-
tio, Alteram, ubi pari modo inualuit frigidum.
In ea uero oppositione quæ est inter humidum &
siccum, alteras etiam geminas, nempe humidam
& siccam. Copulatis uero inuicem simplicibus, a-
lias existere quatuor, humidam & frigidam, humi-
dam & calidam, siccam & frigidam, siccam & ca-
lidam. Traditæ uero sunt & causæ, quæ has intem-
peries generent, in alio libro, in quo morborum
causas reddidimus. Sanè unus quispiam morbo-
rum est quos intemperies creat, & febris: utiq; cū
adeo immodice auctus calor est, ut & hominem
offendat, & actionem lædat: quando si neutrum
adhuc efficiat, quantumuis sit homo nunc quam
ante calidior, nondum tamē febricitare eum mon-
strauimus. Quoniam autem quicquid præter natu-
ram in nobis oritur, siue speciale nomen sorti-
tum sit, siue generale, id extra corpus non est, sed
tum pleuritis, tum phlegmone, tum morbus, tria
simul in uno cõsistunt corpore, uerbi gratia, Dyo-
nisi. Indicat autem & horum quodq; propriam in-
dicationem æque profecto ut eius quod maxime
omnium speciale est, ipsæ differentiæ: ob hæc uti-
lius uisum est seorsum de Februum differentiis tra-
ctare, quod omnibus prius præparatis, sermo no-
bis hoc loco citra omnem eorum qui parum re-
cte de ijs scripserunt, refutationem absolueretur.

Reuocemus igitur ad memoriam discriminis ea-
rum capita, quod propriam ex unaquaq; indicatio-
nem sumamus. Est igitur una earum differentia
illa, in qua causa adhuc adest febrim creans, aut fe-
bris excitata iam desuit. Altera uero qua uel (ut Gra-
ci loquuntur) hectica febris est, quæ iam facta est;
uel etiam (ut aliquis eorum dixerit) schetica.
Nam quoniā eos affectus qui facile discutiuntur,
& ἡέτες Græci uocant: qui tales non sunt, & igitur
concedendū est dilucidioris doctrinæ causa, etiā
februm ipsarum eas quæ ægre discutiuntur, hecti-
cas: quæ facile, scheticas nominari. Dicendūq; fe-
brium alias facile solubili affectū esse, perinde ut
per calidum in sole lignū. Alias difficile solubi-
li, ueluti quod igni eatenus excalfactū est, ut iam
accendatur, & fumū edat. Hæ sunt primæ febrū
differentiæ, quas ubi cum summis primum indi-
cationibus iunxerimus, mox ad magis illis specia-
les ueniemus. Prima enim omnis febris indicatio
ueluti à morbo est, ablationē eius præscribens. Se-
cundo uero ceu abs tali est morbo, quæ non abso-
lute sublationem, ut prior, sed certam quandā sub-
lationem indicat. Nam cum febricitantes ex intem-
perie laborant, necesse est sanationē quoq; eorū
intemperantiæ depulsionem esse. Omnis autem
excessus per contrariū excessum sanatur. Etenim
id quoq; ante est ostensum. Quare febrilis quoq;
intemperantiæ excessus per contrariū excessum
sanabitur. Est aut febrilis intemperantiæ excessus in
caloris abundantia. Huic ergo ad temperamentū
uia erit per id quod refrigeret. Itaq; si iam præsens
febris est, sed causa quæ eam excitauit, iam desuit;
huc tantum sanandæ eius consiliū dirigetur, ut
refrigeretur. Quare querenda nobis talis materia
est, quæ cum redundante calore paria refrigeran-
do faciat. At si in generatiōe adhuc febris est; cau-
sa quæ eā accendit, submouenda est. Sin pars eius
genita est, pars in gignendo adhuc est: utiq; con-
sulendum est. Primum quidem submouendo quæ
eam accendit causam, deinde extinguendo quæ ab
hac accensa est febrem. Ergo nisi quis ad unguem
memoria teneat, & quæ causæ febres generent, &
in quo cuiusq; corporis affectus; is nunquam me-
thodo febris prospiciet.

2 Dictum nanq; est in ijs corporib. meatuum
constipationem febrem excitare, in quibus quod
transpirat halituosum non est (ἀρτυήεις Græci di-
cunt) cuiusmodi uisitur in ijs qui boni sunt succi:
sed mordax & acre, fumi fuliginis uel non absimile.
His igitur corporib. saluberrima est ex aqua dul-
ci, & temperata lauatio, tum frictio quæ rarefaci-
at, & exercitationes mediocres, & uictus, qui
dulces efficiat succos. Aduersissima uero sunt lau-
uatio frigida, & aluminosa, & lauauonis abstin-
tia, & exercitatio acuta, & frictio, uel planè nulla,
uel dura, & uictus mali succi, & uigilia, & ira, &
crassitia

tristitia, & cura, usioq; in sole, & fatigatio. Verū de reliquis post dicam. De stipatione uero meaturum, unde digressus sermo est, liquido scire licet solam eam, si reliqua omnia desint, accendere febrem posse. Si itaq; eiusmodi naturas à cōuenientibus sibi laurationibus prohibeas, protinus febri-
 citant. Vidisti autem profecto quo tempore Roma nobiscū egisti, aliquos ita laborare. In quibus qui misicā diatriton transmittere eos in cibi inedia censent, ipsi difficillimas febres faciunt: quando protinus in primæ accessionis inclinatione, in balneū eos ducere oportebat, ibiq; finire crebro, si uellēt, nedum semel, aut bis lauare. Ego namq; reliquis omnibus omisissis, eum tibi in memoriā re uocabo, qui in aquis aluminosis (quas Albulas uocant) lauerat, ac ex eo cutē densata, post cōperat febri-
 citare. Quippe satisfaciētis pro claritate sermonis nostri, ueluti exemplū. Sanē hominē in uiscēbant medicī quidā non incelebres, alter Erasistratus, alter Methodicus. uisum autem est ambos hominē à cibo cōtinere. Quod tamen nos, cum post illos digressos superuenimus, non permisimus: sed statim in balneū perductū, & tepētī oleo largissime perfusum, tum blādisime perfrictum, quam plurimū temporis in calidi solij aqua uersatissimus. Mox egresso, ac frigida ex consuetudine uiso, tum sindone cooperto, cōsidere paululum ad uires recreandas praecepimus. Postea denū in balneum perducto, ac rursus similiter tum unctō, tū perfrictō, ac in calida morari iussu, dein rursus educto ac frigida merso detersoq; exhibuimus cibum. protinus quidē, ut egressus est, atq; aquā bibi, pitanae cremorē: dein paruo intervallo lactū cācā post hāc ex simplicī albo iure pisciū aliquid eorum quī molli sunt carne: cuiusmodi saxatiles sunt oēs, & afelli quos uocant. Porro non alienum sit, quō nihil narrationi desit, omnia recensere. Tēpus anni erat quo hac agebantur, paululū post canicularēs quos uocant dies. Homo ipse circiter quinq; & triginta annorum, colore nigello, & habitu corporis gracili, atq; hīro: tum qui tangentibus etiā cum ualeret, manifeste calorē exhiberet mordentē. Urinas quoq; habuit abunde flauas: ac si plusculū cibo abstineret, etiā mordentes. Alius assidue sicca erat. Tum quā exercebat, exigua acria, & sicca. Mores animi ad irā & cogitationē propensī. Ipse pauci omnino somni, & qui perpetuo de uigilijs quereretur. Hic quodā loco quo ne gociorū gratia concesserat, albulis (quā haud longe aberat) est usus septima (ut aiebat) diei hora: ac ter quaterq; se lauit, salubriter sibi cōsuluisse ratus. Hinc quoq; ubi rursus in agrum se recepisset, ac cibum sumpsisset, & paululū indormisset, uenit ad urbē sero uespere: ubi destitutus idoneo balneo nocte febricitauit. Cū autē tertia ferē diei hora con-
 templati eum medicī essent, iusserunt nō eum modo diē, uerum etiā posterū totum per inediā transigere: quo tertiā diei noctem obseruaret. Atq; his dictis abierunt. Nos tum lauatō, tum ut praedic-
 tū est, cibato: ministris praecepimus, si medicī uespere uenirent, quiescere hominē dicerent: eosq; sta-

Galen.

tim remitterent, ac postridie mane redire iuberēt. Ut uero abierūt, rursus hominē similī modo lauatū, ac cibatū, ijs ipsis quā egimus, dormire probe fecimus. Accedentes autē mane postridie medicī: censuerunt etiā eo die cibo illi abstinentiū, etiam si quāmaxime sine febris profus esset. Illo uero promittente se facturū quod iuberēt, scis quantus illis digressus rursus sit excitatus, quem nos paulo post superuenientes deprehendimus. Nō fugit uero nec quomodo cum laborāte ipso sit actum. Nā quoniā (inquam) cum ualeres, bis lauare solebas, ac medicī cibum tibi omnino circumcidunt: nec illis iure in totum obsequēdum esse, et aliquid eorum quibus per sanitatē es usus, immutandum arbitror. Eo uero putante me sibi suadere ut lauraret quidē, sed non bis: tum paratum se affirmante quicquid iusserim exequi: ergo (inquam) neq; inedia tolerabis, neq; lauabis bis. si quidē et laborasse mihi uideris iam triduo, et calfactus uehemētius à sole fuisse. Propter igitur laborē (inquā) & usitionem, unā te adiicere lauationē ad duas oportet, ac ter mihi audientē lauari: quoniā id mihi facturum te pollicitus es. Ille subridens, dura (inquit) imperas. Caterum quoniā stare pactis est iustum, faciā quā iubes. Quā uerō medicī post hēc egere, nostri planē quāto erant digni rursu. Bis iā lauatus fuerat, pransusq; dormierat, cum circa occasum solis ministrorum quispiā adesse medicos nunciat. Hic uero febricitare se simulat: ac ueste circumdatus inuolutusq;, quo minus bisfille uinū ab ipsis deprehenderetur, amico cuidā mandat, medicis, si quid percōtentur, pro se respōdeat. Erāt autē de more, ubi inuolutum curiosē hominē etiā cum capite uiderēt, primum illud solenne ipsis rogaturū, quōtā horā accessio inuasisset. Cum autē amicus respondisset, feruēne unā quidē integrā ex quo cōcepisset, intercessisse horā: cum horrorē ne, an frigore cōcepisset, rogant. Eo cum horrore respondēte, tangunt hominē iam corpore propter rissum, & operimentum madentē. Itaq; ubi hominē laudassent q; sibi obtemperasset, nec quicquam ante tertiā diei accessionē deliquisset: ob id ipsum (inquiūt) nunc te deseruit horrore, estq; sudoris indicium, ac multa humiditas circa cutem, quā haud quāq; euenisset, nisi inediā tolerasses, & triduum trāsmisisses. Iussis igitur propinquis, si quā guttula illi manaret, diligerenter detergerēt, ne frigore afficeretur: tum mane se redituros praefati discedunt, ne tum quidem post sudores iussu hominē nutrirī. Visā nāq; sunt illis noctes eo tēpore breues, utiliusq; esse postridie mane nutrire. Digressus igitur ipsis, perfusus sudorē iuuenis, ita ut inuolutus uestibus fuerat, in balneum cucurrit, ac tertio lauit: & similiter est cibatus. Postridie priusq; aduentaret medicī, egressus domo dedita opera est ne se deprehenderent. Itaq; cum paulo post uenirent, & egressum intelli-
 gerent: mirati inter se sunt, quid tantum hominē egredi subegisset iam bidui passum inediā. Ergo si hoc uno male ab eiusmodi medicis agri afficeretur, q; pluribus diebus in cubilibus detinerent, cū liceret sine inreceptua hac inedia multo citius ad-

confueta uitæ munia redire, esset profecto uel id pergrauē. Verū lōge grauius est quod accidit. Cū enim memorata nature ubi sub tali uictu regunt, grauissimis occupentur febribus: qui hanc iniungunt medici, nihil mihi à carnificib. differre uidentur. Nō enim ueluti qui humidī, ac boni succi sunt ubi in febris diaria trāsmittēte mīrificā diatriton coguntur, unū id tantū patiunt in cōmodum, q̄ frustra cruciant: sic etiā natura iam cōprehensā, imō ex longiore inedia acerrimis acutissimisq̄ corripuntur febribus: à quibus promptus est in heclicas transitus: atq̄ ab his rursus in torridū marasmm. aut si os uidentur facile iniurijs patet, in eum qui συκοπιη, id est animi defectu infert. Audisti em̄ subinde nōnullis talium medicorum dicentē me, licere ipsis euidenter intelligere quantum mali cōmittāt, dū eiusmodi naturas in inedia custodiunt, si uelint, tum sani omnino sunt, biduū eos inediā subere tolerare. Cement enim ilico febricitantes, idq̄ ob nihil profecto aliud q̄ famem. Siquidē cui nec suberat prius quicquā in corpore quo grauaret, nec quicquā illi interim accessit extrinsecus noui, is planē ex inedia febricitauit. Quādo enim (ut dictum est) non unus, altē ue sic imtemperatōrū, sed planē oēs ubi inediā tolerarunt, & balnei solio abstinerunt, febris corripitur: ne uel leuis quidē amplius relinquit nobis suspicio potest, quasi ob aliud quippiam & non inediā febricitarint. Quibus namq̄ in corporis temperatura siccū præualet humido, & calidum frigido, his corporis habitus gracilis, hirsutus, et nigrior est, ac reliquis tribus intēperamentis quæ hoc sunt minus calida, tactu calidior aduertit: plurima quoq̄; his flaua est: bilis, urinæq̄, ac deiectio bili saturata, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & animi impetus uehemens. Ergo recte horum Hippocrates, tum generalem uictus formulā cuiusmodi esse cōueniat, tum quot & qualia symptomata in eiusmodi homines incendant, nō solum ubi totum diem in cibi inedia trāsegerint, uerum etiā ubi altero cibo, qui pro prandio datur, abstinerint, prodidit. Quippe in sexto De populatim grassantibus morbis, ita inquit in calida natura refrigeratio, aqua potio, quies. In libro autē De acutorū uictu, quem aliqui ad uersus cni diās sententias inscribunt, cum de ijs disputat qui solitum prandium dimittunt, etiā huius naturæ hominum meminit, *πικροχολος* eos graues, quasi amaræ bilis homines, ab redundantē scilicet succo nominās. Habēt uero eius uerba se ad hunc modum: Sed & qui bis die comedere cōsueuerūt, si si nō prandent, ægrotāt, tum imbecilli & infirmi sunt, ac timidi ad quoduis opus. præterea cordis siue oris uentriculi dolorē sentiūt. Siquidē suspensa illis uiscera uident, & calidum, pallidumq̄ mingunt, & deiectio uritur. Sunt præterea quibus os amaricat, oculi cauantur, tempora palpitant, & extrema partes frigent. Hæc ubi prædixit, mox alia quædā, tum de cœna, tum de nocte, ad finē sermonis ait huiusmodi notæ homines (quos *πικροχολος* uocant) tum unicū in die uictum, tum inediā, q̄ alios homines difficilīus ferre, unā nimirum in eo li-

bro exponens partem eorū, quæ in sexto Epidemion monuit in uniuersum: nempe qd ad uictum spectat. Nam refrigeratio quā calidis naturis suasit, efficitur cum ex alijs quibuscumq̄, tum non minime ex cibi exhibitione. Qui namq̄ originalem temperaturam parum moderatam habēt, horum insitum calorem, si squalens acerq̄ est, cibi mītiorem minusq̄ mordentem reddit. Sanē illud nō laret, & boni succi, & exquilita debere esse quæ his exhibeantur nutrimenta: non tamen ea quæ boni succi, propterea q̄ exiguum huiusmodi substantiæ in se habent, nominētur, ac nutrire nequeant, imō quod utile plurimum in se contineant. Sunt namq̄ & maluæ, & brassicæ, & betæ, & lactucae, & deniq̄ omnia olera, & fructus, nutrimenta, cum substantia in his habilis ad alendum cōtineatur. Verum sicut in his exiguum est quod nutrit, non exiguum quod est inutile: ita in pane puro, & ouis, & carne, & alica, plurimum est quod nutrit, minimū quod est inutile. Quod si id inutile quod admistum utili est, præterquam quod non nutrit, etiam acrem, aut acidam, aut acerbam, aut amarā, aut deniq̄ uitiosā quampiam qualitatem habet: non modo non propriē nutrimenta sunt, sed etiam medicamentoſe facultatis non parum in se habēt. Expedi igit̄ tales homines illis nutrire cibis, quicūq̄ nec medicamentoſam ullam sensu perceptibilem uim habeant, sed nec ipsi quod nutrit plurimum: quando hoc quoq̄ si exuperat, uitio non caret. Principio namq̄ nec quæ in uentriculo eorum agitur concoctio est exacta, nec, si uentriculus ea superet, quæ in uenis obitur, est absoluta. Quod si hic quoq̄; haud magnus sit error, saltem tertiam (quæ singulis partium propria est) difficile fuerit in omnibus illis rite perfici. Cōueniet profecto huic, & ut frigidum humidumq̄ quodammodo ei nutrimentum exhibeas, ubi corpus tum calidius, tum siccius solito est redditum. Quare commodissimus huic est ptisanæ cremor ad unguem coctus, in quo nullum sit superfluum condimentum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac si ne sit̄ seruare hominem potest: cum eo q̄ nechali tuofum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum. Voco halitūosa quæcūq̄ per cutim foris effluere sunt apta: Humida, quæ per uellicam: Sicca, quæ per aluum. Quippe à uincenti in singulis eorum substantia, nomina ipsis imposui. Quod autē nullum horum retinebit ptisanæ cremor, manifestum est. Quæ enim per aluum excrementorum deiectiones sunt, eas adstringentia retinere solēt. Quæ per urinas, & uniuersam exeunt cutim, hæc detinent ea quæ exiguis meatibus inhaerent: *εμπεριφυρα* uocant. præterea quæ ualent adstringunt, ea *σπυγνα* Græci uocant. Pisansa uero nec exiguos cutis meatus obturādi, nec adstringendi uim habet ullam. Ac q̄ non adstringat quidem, uel gustus ipse docet: cuius unius est proprium, quod adstringendi uim habeat, discernere. Quod uero nec cutis meatibus lētitia crassitudine ue sua inhaereat, id ratio cinari ex alijs eius effectibus est promptum. Nam siue sordidum corpus extrin-

cus pitfana defrices, utiq; sicut aphronitrum, & mel deterget. Siue ex uentriculo per uomitum educere medicorem pituitam uelis, nihilominus multa utilem pitfanæ cremorem experieris. Additum tamen in dictionem est, medicorem: quoniam simulita & uehementer glutinosa, & crassa pituita sit, hanc radicula ex oxymelite, nō multa aut pitfana detergere est habilis. Est sanè & aqua multa ad omnes ante dictas expulsioniones idonea. Verum nec sitim restinguit, ut pitfana, & in amara bili abundantibus naturis facile uertitur in bilem. Optimū igitur (ut prædiximus) in eiusmodi temperamentis nutrimentum est pitfana. Proximum ab hoc alica, cui paululū acetū ad faciliore distributionem sit adiectū. Tertium, quæ sine aceto liquida est, non crassa; qualem nonnulli præparant ad similes puli. In hisce uero huius, dum coquitur, aliquid porri satius est. Nam quod tum anethi, tum salis aliquid necessario habebit, neminem latet. Quinetiā in clibano coctus panis utilis est cibis; licet etiā ē piscibus faxatiles omnes. Nec ipsis minus asellini si prope lacum, aut magnum flumē, quod in mare decidat, depasti, humidā magis glutinosamq; habeat carnē. Proxime asellos sunt solea & torpedō, itemq; lupus & mulus, post murgilē pelago. Omnis autē piscis deterior est, qui prope lacum qui mari coniungitur, aut magni fluminis ostium pascit. Ex uolarilibus autē optime sunt perdices, ac montanæ omnes auicule. Ab his galli nacet, & phasiani, & iuuenes colūbae. Sed nec hæc tamen intus claudenda, cum excrementosa sint omnia quæ exercitatione carent. Excrementosa uero non minus sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, ut etiā ex ipsius nullis carnibus optima sit motana. Ab his deinceps hœdi sunt. In omnibus iam dictis fugienda, tum uetula, tum recens edita, sunt. Illa namq; duriora, cōcoctusq; difficiliora sunt; hæc immodice humida, & excrementosa; ac potissimū quæ cumq; ex animalū generib; sunt, quæ naturaliter humida sunt, ut oues, fuesq;. Verum de omnī ciborū facultate alibi præcepimus. Nunc ueluti alia in hoc opere, sic ista quoq; exterū pli causa sint dicta. Siquidem propositū nobis in hoc est, non tanquā in ijs quæ De alimentis, & me dicamētis scripsimus, materias inuestigare, sed solas facultates generales. Nihil autē profecto refert, generalēs ne facultates, an uniuersales, ipsas appelles. Reuertamur ergo rursus ad propositū. Quibus acre aliquid quotidie transpirat, ij, si cutis ipsis stipetur, prompte febrī corripunt. Stipāt uero hanc tum quæ adstringunt omnia, ueluti paulo supra memorauius de Albulis aquis: tū quæ lenitā crassitudinē ue fira exiguis meatibus inherēt. Aliquando autē ipsius cutis immoderatio siccatas exiguos ipsius meatus densat. Proinde qui cenante in balneo utebatur, hunc nos uidisti quo tempore inaequalitē sentire se quereret, uti uetuisse. Simili modo et qui largo uīno, cū oleo exiguo utebatur: itē, qui lentiscino, tum cum densitudinē sentiebat, hunc quoq; de cætero (ut scis) uti prohibui mus. Inhibui uis nō minus & eū qui quotidie in-

Galēn.

A solabatur, & eum qui puluere utebatur. Alteri uero qui iam ad inaequalitē febrilē peruenerat, uehementiā remittere frictiōnis iussimus. Iā aliū (ut scis) curauimus mirantē quō pacto una lauatōe, ac debita frictōe horridā eius multorum dierum inaequalitē dissoluerimus. Vtebatur autē et ille ad stringente oleo; hoc in quā fure propter alios usus celebrī; Hispanū uocant. Hoc igitur mutantes, ac Sabino tū pinguiter, tum molliter uberius perfri cantes, ac his lauantes, ilico sanū reddidimus. Nō solū igitur hæc omnia uitanda ijs sunt qui fumidū & fuliginosum ē corpore exhalāt; sed etiā quæ glutinosum, & quæ crassum gignūt succū, quādo hæc paruis meatibus inhærentia transpirationē morā tur. Retinent nō minus (ut dictum est) transpiratio nē, & quæ cutim immodice siccant. Multos siquidē talium cum sole uerentur, alios uero cū uberiore nitro, alios cum sale, aut exercitationē multa, aut frictiōne dura, præterea frictiōne sicca (Erysipela uocat) & puluere, & horū occasione quotan nis ægrotant, ipse testis es, ut ab his prohibitis, multis iā annis sanos seruauerimus. Sunt autē merito eiusmodi præcepta, tū ualentū, tū eorū qui de ualitudine querunt, cōmunia. Nō enim ei quæ iā facta est febrī cōsulant; sed ei quæ nunc in generatiōne est, prospiciunt, tollēdis scilicet ijs quæ illas excitāt causas. Quippe quæ adhuc in generatiōne febris est, dū auferit causa, ipsa una interit. Quare quæ in libris De sanitate tuēda de eiusmodi tēperamentis sunt prodita, ea omnia ad eos qui febricitare incipiūt, siue id sanationē appellasse oportet, siue puidētia, sunt trāsferēda. Siquidē sanamus id febris qd' iā inuasit, etiā si exiguū est. Prospicimus nequid amplius proueniat, adimentes causam.

3 Veluti uero iā dictarum maxime naturarū, & cum ualent, & cū de se querūt, illud cōmune cōsiliū est, ut fluxile & transpirabile undiq; corpus reddatur: ita illud quoq;, ut tum uigilias, tum iā, tum tristitiā, tum curam, tum uestiōē, tum frigus, tum lassitudinē fugiāt, cū promptissime post hæc, eiusmodi temperamenta febrī capiant. Sanare uero ea quoties ex aliqua dictarū occasiōnū febricitarint, oportet, partim similiter ijs quos ex stipata cute laborare diximus, partim dissimiliter. Quippe in prima accessiōne inclināte ducēdi in balneū oēs sunt: tum pinguiter simul ac molliter fricādi ij quidē, qui ex aliquo quod cutim adstrinxit, laborāt: sicuti dictū est. qui uero ex siccitate, fricādi qui dem & ipsi, sed parcius: lauādi autē ubertus. Respicendū uero semper ad uirtutis modū est in omni bus eiusmodi auxilijs. Atq; ita quidē, & tristitiæ, & uigiliæ, ac curæ, nec frictiōnibus, nec lauationibus multis indigēt. Sed omnibus qui ex eiusmodi occasiōe febricitarint, oleum infundendū tepidū large est, cui minime adstringēs uis infictum paululum fricādi, atq; cōsuetudinē lauādi. Vitiō uero protinus ab initio refrigerationē desiderat, tū crebriorē lauationē: minime uero aut oleum largū, aut crebram frictiōnē. Sint autē quæ refrigerent, & rosaceū, & omphacinū, quod etiā (arbitror) omo tribes, id est crudum oleum nomināt. Vtiliora ue-

tom. 6

i 2 10

ro ex his sunt quæ nihil in se salis omnino habent. Efficiēs hæc magis frigida, si ita uas in quo continentur, in puteo suspendas, ut aquam tangat. Præterea si defluxus frigida aque uasi se illidat, magis humorem refrigerat. Quod si largius refrigeratâ cupis, uas niue circundabis. Infundere autē sincipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum oportet. Hæc usq; ad inclinationem faciens, in balneum duces. Si uero qui memorato est temperamento, de quo omnis hic sermo est, ex frigore febricitet, etiam ducendus ad balneum in remissione est. Si aut cum grauedine & distillatione febricitet, priusq; hæc concocta sint, lauandus non est. At qui ex uestione febricitant, ij uel cū hæc adsint, lauari debent: ueluti in libris De sanitate tuenda ostendimus. Post lauacrum uero, iisdem qui bus ante, madefacienda amborum capita sunt: eorum quidem qui ex uestione febricitant, refrigerantibus: qui ex frigore, calfacientibus. Sunt aut & hæc post balneum mediocria: cuiusmodi sirinum est, & nardinum unguentū. Verum de his immorandum pluribus non est, præsertim in libris De sanitate tuenda iam proditis. Sed succurrat dixisse reliqua simili modo in febricitantibus esse faciendam, quemadmodum in uestis & refrigeratis citra febrem, faciendam præcepimus. Non tamen quouis tempore lauandos febricitantes esse, sed in accessionis remissione. Præterea qui ex uestione febricitant, ijs intendenda quæ ex refrigerantibus constat, curationē esse. ijs uero qui ex frigore, eam quæ ex calfacientibus consistit, remittendā. Reliquū autē fuerit, ut cōmunitatem ac differentiam in uictu omnium comprehendensarum conditionum in proposito temperamento, ubi febri diaria laborat, exponamus. Omnium igitur cōmunis uictus species esto, quæ & boni sit succi, & concoctu facilis, & quæ nūq; exiguis cutis meatibus inhereat. Sed ijs qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret, etiam humectet. Pari modo ijs quos ira male habuit. Iis uero qui refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modice. Iis qui peruigilio, & tristitia, & nimia cura sunt affecti: q̄ humectet ac somnum conciliet. Ad eundē modum ijs qui fatigati sunt, magis nutritēs. Iis qui refrigerati sunt, minus nutritēs. Reliquis qd̄ mediū sit amborum. Vinū uero ipse cōscius es omnibus me eiusmodi [naturis] concedere: sed quod tum aspectu, tum uiribus sit aquosum. Id enim ad omnia utilius q̄ aqua est, utpote quod & cōcoctionē iuuat, & urinas ac sudores prouocat. Constat autē & Hippocrate non in diarijs modo febribus, uerum etiā in acutis, ex ijs quæ De acutarū uictu prodit, uinum dare. At in sexto Epidemion, siue ipse sit, siue Theſſalis eius filius, uinū calidis temperamenti prohibet: idq; non modo cum febricitant, sed etiam per sanitatē. Quippe in calida natura suadet tum refrigerationē, tum aque potio nem, tum quietem. Nisi forte copiosius utendum esse aqua q̄ uino eiusmodi naturis suadere eū dixeris: quemadmodū nonnullis placet. Hoc igitur seorsum per se disquiratur. De potione uero frigida decidendū. Ego igitur censeo eius generis na-

turas, & dum ualent, eiusmodi potione magnopere iuuari: nec in diaria febri ijs quibus in ulu fuit, eā circuncido. Si quis uero non adfuerit, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina plane sanitate prius reddita. Quod si uel propter timiditatem, uel propter consuetudinem a pueris, uel falsam opinionem, frigidam timeat: tum opere homini persuadeam, obseruans in æstate cum æstuat: tum oratiōe post opus. Nā ubi post usum eiusmodi potionis liberatus statim ab urendo æstuat: qd̄ est, uisusq; firmior ex eo stomachū q̄ ante habere, tum uentriculus illi biliosum deiecit, & probe concoxit, ac corpus, cum ea iterum iterumq; usus fuerit, reficitur, tum uero alijs quoq; ei indicatis, quibus simili ratione cōtuli, exposuerim primum quidem illud esse omnium longe uenissimū, q̄ contraria contrariis sunt remedia. Proditum autē mihi de hoc prius est: mox illud, q̄ temperamentum eius sanitatis symmetriā egressum morbo est propinquum. Tum q̄ sanitas eiusmodi corporum dubia est, ac potius in affectu, quam schelin uocant: quā in habitu, quā hexin. Præterea q̄ si boni temperamētī esset, hoc illi omni studio ueretur: cū uero uitiōsi sit temperamenti & natura, in melius immuto. Porro dictum & de his fusi⁹ est in libris De sanitate tuenda. Vnde nec immorandum mihi hic multum est eos imitanti scriptores, qui cum pauca prorsus sciant, ipsa in omnibus libris inculcant. Id enim nō multa est docere, sed multa scribere, & multas chartas consumere, cum liceat paucas: ac multum temporis nulla necessitate cōterere. Itaq; nec notas diariarum febriū hoc loco describo, utpote iam prædictas mihi in secundo De crisi promodū uniuersas: si quæ uero reliquæ fuerunt, etiā in primo De febriū differētij⁹ proditas. Quin etiam in libris De pulsibus, quantū ex ipsis sit utile, exposuimus, soli (ut scis) omnīū qui antenos fuerūt. Idq; adeo (arbitror) clare, ut nec puerū quod tradidimus, lateat: cum Archigenes (ut ostendimus) non docuerit, sed deblaterari plurimum in opere De pulsibus, tum in eo quod De febriū significatione inscribit. Tanquam autem eum qui in aluminosa aqua se lauit, medicī usq; ad tertium diem cibo abstinere iusserunt: ad eundem scis modum neminē eorum qui uel exusti fuerūt, uel lassati, uel alia quapiā ex iam dictis causis febricitanti, lauuisse, aut nutriuisse, priusq; diatriotam transmississent. necesse em̄ profecto est & me diatriot dicere, ne in hoc quoq; nugis eorū me exponā, dicētium aliam esse tertij diei accessionē, aliam ipsam primā diatriot. quippe hæcenus eorū nugæ processisse, ipse aliquando audisti. Sed siue primū diatriot, siue aliud quiduis appellasse uelint, non semel nos bis ue aut ter, uerum sæpius q̄ ut meminisse possimus, tum in primo statim die ad uesperā eos qui diaria febri laborarūt lauimus, tum uel magis in secundo, imō etiā in ipso tertio, ceu paulo ante diximus de eo cui stipata crisi fuerat. Verum hanc causam rarerer uidi febrem accendere (itaq; etiā hanc maxime tractandam desumpti) uestionem uero & lassitudinem, & cæterorum singula

la planē sape. Vidisti autē eos oēs quarto die mane ad solita redire munia: ac medicis qui ipsos tertiu diem prorsus in cibi inedia exegisse fuerant opinati, occurrere. Itaq; etiā mirāti tibi ac querenti quid demū causā esset, cur uel nunc saltē eiusmodi medicū ab ijs quāz perperā opinantur, nō recedant: cō uerūter (ut arbitror) respondi, q; neq; ueram speculationem noscerēt, & nunc eam incipere discere erubescerent. Aliqui tamen (ueluti cōsistentem aliquādo ex ijs quendam, idq; cum lachrymis, ueritate nobis solis audiūisti) nec uitā sibi necessaria aut adfuturā, si qui eos scire aliquid existimāt, discētes iam uideant. Verum tu hoc semel audisti. Deos autē omnes testor, multos id mihi sape soli confessor, idq; lachrymantes, ac infelicitatem suam deplores, q; sub malis præceptoribus tempus perdiderint. Iuroq; tibi rursum deos, illud q; mihi persepe in cōdiscipulis dictū esse, cum essem adhuc atate adolecēs. Nam cum mihi mos esset, ubi aliquis me de secta aliqua nunc sana esset percontaretur, dicere, me responderi non posse, nisi reliquorū omniū dogmata didicissem, ac methodum quāpiam mihi comparassem, quā quod potius esset discernere, nō pauci ex cōdiscipulis qui hac audierāt, mihi responderunt, me & excellenti naturā, & singulari propter patris mei liberalitatem esse eruditione, tum & atatem ad discendum idoneam, & impensas unde disciplinis uacem supeditatas habere: secum nō ita agi, qui & rudes in primis disciplinis esēt, nec acuto ut ego ingenio, nec quod impenderēt habere. itaq; cōtētos esse oportere ijs quāz nunc noscent, qualia cūq; ea forent. Minime igitur mireris cur plerofq; medicorum nō pudeat ditatiron in ore habere, etiā si sexcentes nos præfagire in ægris uiderunt, diariā ne febris laborarent, an ea quāz tertio quarto ue die ac cessione aliquā esset habitura. Illud potius æstima qd Hippocrates monuit, homo aliās ingenio maxime philosophico: Cum peracutus morbus esset, statim cum ultimis labores infert, tum tenui ad ultimum uictus necesse est uti. Vbi uero nō, sed licet liberalius cibare: tantum est de ultimo remittendum, quātum morbus ultimus est mitior. Labores namq; dicūt omnia quāz hominem offendunt: ultimos uero maximos, quales utiq; in summo uigore fiunt. lubera autē referuari in id temporis summā uictus tenuitatem: nihil profecto docēs diuersum ab eo quod alibi dixit: Cū in summo uigore morbus est, tū uictus uti tenuissimo est necesse. Atqui fieri non potest ut summam uictus tenuitatem ad summi uigoris tempus differas, nisi inter initia cōiiceris circiter quotum diem in uigore morbus sit futurus. sed & insanire Hippocratem dicunt, qui hac scripserit: & tamen si nos opere ea ostēdimus, omnia potius putāt q; posse quēpiam in prima aliquādo accessione certam notitiā affectus ipsius ægotantis habere. Ego uero nec in omnibus ægotantibus fateor exacte me scire in primo die affectum, nec ullam diariā me febrem posse fugere. at uero ut nihil in uictus ratione primis saltē diebus pecces, hoc satis est, si discernere diariā a

Galen.

A reliquis queas. Ac propterea quarto die, in quo illi hominem quem iam siccarunt, primum nutrire incipiunt: nos ad consueta dimittimus: ac a diarijs in acutas febres transitū fieri hac uictus ratioe prohibemus: cum si quis aliter cibat, excipient necessario iam dictas naturas ardentissimā febres. Sunt enim aliā naturā quibus aut nihil, aut nō magnō opere in cōmodo tot diuerum inedia: sicut ē diuerso aliā quibus nō modo innoxia, sed etiam utilis est trium dierū inedia. Verum de ceteris naturis post decernam. Propositum uero nunc nobis ab initio temperamentum in edia in summum ducunt discrimen, in quacūq; iniungantur febri, nō solum ijs quas modo commemorauī diarijs.

B 4 Etenim si propter obstructionem aliquando ut dictum est morata transpiratio est: si parua ea sit, qui recte deterserit, secundā fore accessionē uetabit: sin momētanea, nō possis ita promittere. Quod si & multi, & crassi, & glutinosi impacti succi sint, quāz hos excipit febris, fieri nō potest ut intra fines diariarum consistat. quando ex necessitate huic in mali succi naturis ea quāz ex putredine humorum accenditur, succedet. Nam in alijs saltē temperamentis, quāz in sequentibus exponā, excitari ex tali causā potest citra humorum putredinē aliqua cōtinētis febris species. Porro capere eiusmodi sermones omnino non potest, qui prius in memoratis operibus non sit exercitatus: ac potissimum in eo quod De febrium differentia inscribitur. Nam ubi obstructio quæpiā mediocris est, ob quam febricitant quibus uitiosus est succus: in primo die, atq; etiam secundi aliqua parte nullum est in pulsu putredinis signum, eque ut nec cruditatis in urinis. Protracta tamen inclinatione, nec amplius pro ratioe, sicut potest summū uigorē in cepert, cedente, suspectus affectus est: ueluti ē diuerso in quibus ad dissolutionē festinat, uel halitus aliqui uel sudores exierunt, uel multa bona urina, cum si gnis in pulsu bonis: in ijs ꝑculdubio diaria febris est. Sed quæ ex parua oritur obstructio, ea (ut dictum est) saltē inter initia similis diarijs est. Protracta tamen inclinatione, suspecta redditur: quāz uis putredinis indicia in pulsu adhuc nō appareāt. Quippe nisi uitiosus succus penitus transpiret, necesse est putrescat. Ergo ut transpiret, maiore iam auxilio est opus. Ac siquidē uel puer uel senex sit, sanguinē detrahere non licet. Inter has atates: ubi robur ægro nō deest secunda uena est, etiā si plenitudinis signa nō adsunt. Præstat enim uitiosi succi maiore parte emissā ad detergendas obstructiōes accedere: cum alioqui metus sit, si obstructiōibus liberandis priusq; uacuaueris studeas, ne ipsas magis impingas. Ac soluit quidē obstructiōes, quæ deterioria facultatē obtinent, seu foris cuti sint ad mora, seu intrō in corpus accepta. Periculū uero est etiā ne quæ foras trahunt, unā cum ijs quæ obstructuunt, etiā aliud quippiā attrahāt, & quæ ab interno fursum feruntur, aliquid secum ex ijs quæ in uasis cōtinentur, rapiant. Quod ipsum si tenax sit & crassum, obstructiōne planē geminabit: sin alter, multitudo certe sua non parum omnino nō-

cebit. Cernimus enim aliquando etiam quod multum est, cum simul totum confluit, obstruendo herere, insigique, non minus quam ea quae glutinosa sunt & crassa: quod si per meatus angustos est transitus, multo profecto magis retineri. Quod igitur & his iter liberum, & quae foris admouentur, attractio tuta sit, utilissimum est corpus inanisse. Quinetiam fumosa fuliginosaque succorum excrementa quae transpirant, succis ipsis imminutis pauciora restabunt. Quare inde quoque minor reddetur febrilis calor, sic ut foras transpirare si exiguae obstructiones sint, queat. Ergo cum suspicio erit cutim esse ex obstructione oclusam, (id quod tum ex eo conijcies, quod non fuerit in primae accessionis remissione uacuatio satis magna, tum quod similis sibi perdurauerit remissio) si homo ex nulla manifesta febricitauit causa, etiam certius argumentum obstructionis habebit, si ex euidenti aliqua causa, fieri potest, ut duae simul coierint causae. nam si altera tantum causarum nempe quam externa impressit, subesset, imminuta remissio fuisset cum sensibili alicuius expulsiōne. Haud quaque igitur differendum est sanguinis aliquid ita laborantium mittere, scilicet tum ad uirtutis, tum ad obstructionis modi portionem. Discerneretur autem obstructionis magnitudo ex ipsa magnitudine febris: ut quae ex maiore obstructione maior, ex minore minor incidit. Vbi uero modice uacuaueris, haud multo post aut nutrimentum aliquid, aut pharmacum ex ijs quae detergeant, exhibe bis. Sunt porro non multa quae in febris id praesentent. Sed sicut dictum prius est in alimentorum ratione sunt pitana, & mulsae; in pharmacorum, oxymeli, & quaecumque incoquere in mulsalicer, seu calamintha, & hyssopum, & origanum, & serpillum, & irim, & apium. Verum haec omnia iusto sunt calidiora, ideoque febres accendunt, ita utique ut uinum. Oxymeli uero solum nec febres accedit, & strenue deterget, sic ut ea quae glutinosa crassaque sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet. Porro inter mulsam & oxymeli medium locum habet quod *ἐπιόμυλι* graece dicitur: cuius plurimus in Peloponneso est usus. Non immerito arbitror & saccharum inter hec numerandum. Ex hoc uictu seruabis quantum de febrili calore minui. Etenim si tertio die mane uideris minimum esse quod de febre relinquitur, ac neque putredinis humorum in pulsu nota subsit, neque in urina cruditatis, suspecta uero hora qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit, audacter hominem quamocyssime lauabis, longe ante sextam horam. Abunde tamen sit, si intra tertiam horam lauacionem contuleris. Ad eundem modum & si decimam horam suspecta habueris, usque ad septimam laues licet: cum tres aequinoctiales horas quatuor uel inter balneum accessionisque tempus imponi, abunde, sit satis. Debet autem in balneo corpus prius unctum ac moderatissime frictum, mox detergeri extrinsecus, aluique. Sane detergentium materia expositam habes in comentarijs ijs, qui de medicamentis sunt conscripti. Deligenda uero semper sunt, quae ad rem proposita sint accommodata. Quippe distincta in his sunt, tum quae magis, tum quae minus deter-

gent. Sed & nunc exempli causa pauca dicemus. Moderatissime deterget tum erui farina, tum hordei, tum fabarum. Præterea mulsae quae sic aquosae magis uero quam haec, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulsae quae medio cri est mistura: ueluti etiam hac magis, quae meracissima est. Fit haec ubi mista mellis exigua est aqua, sicut liquidum mel exiguum aut meatus facile ingredi possit. Possunt autem uel haec magis detergere tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphonitrum. Sit autem nitrum oportet quod ex tenuibus partibus constet, cuiusmodi Benenicium est. Si uero lapidosum sit, ut id laeuigari diligenter debet. Mel autem purissimum, acerrimumque, cuiusmodi eius Hymettium. Est autem & sapo ex ijs quae maxime detergere ualeant. Atque haec satis multa detergentium materiae exempla sunt. Tempestiuum enim est iam ad ea quae post balneum adhibentur, accedamus. Sunt autem ea minime multa, Nam praeter aquam quae parum apij incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum. Licet quod inter balneum et suspectas horas spatium erit, trimum fore horarum conijciamus. Si uero circa uesperam aut duabus horis citius quam primo die accessio inuadet; tum lauasse mane liceat, tum cibasse, sed tantum pitanae cremore. Deinde si suspectae horae nihil prorsus afferant, & lauare rursus si uelit licet, & cibare, ad eas quas diximus considerationes intento. Sin aliquid eueniat, & conferendum id est cum accessione quae primo die inciderat, & tum urinae consideranda, tum pulsus sunt. Quae omnia profecto medio cri apparebunt, ubi exigua relinquitur obstructio. Quare ipsum et lauari quarto die, et cibabis, ad iam dictas considerationes spectas; sperabisque nihil quinto die superuenturum. At si magna obstructio facta sit, ea febris ex diararum genere non erit. Quare in proximum differatur liberum, cum in hoc de diarijs tantum agere statuerimus.

5 Quoniam igitur diariae febres in propositis corporum temperamentis saepe numero etiam ciborum cruditatibus succedunt, proximum fuerit de ipsis differere. Ergo pessima quidem in eiusmodi temperamentis cruditas est, citissimeque febre accendit, in qua cibi in nidorulentum & fumosam qualitatem corrumpuntur. quando ea quae in acidum uertit, ut raro talibus naturis contingit, ita minus nocet. Dicemus autem de utraque seorsum, incipientes ab ea quae saepius his incidit, & magis laedit. Ea est (ut diximus) nidorosa quaedam ac fumosa. Quae utique si aluius lubrica est, minus est noxia. Sin adstringitur, grauis est. Siquidem ex adstrictione eius uitiolesaturae in febres prompte incidit, ac potissimum cum neglecto consilio in lectulo domi manendi, ad solita conuertuntur opera. Febricitant autem nonnulli & ex ijs, quos diarrhoea ex cruditate male habet. Quibus utique non minime proritur febris ex deturgendi frequentia. Quod si etiam rosio, aut dolor, aut calor immodicus in uetriculo & intestinis sit, hinc utique uel longe magis affectio febrilis increscit. Est autem eorum quibus clausa aluius est, & quibus fluens, non eadem sanatio. Itaque etiam seorsum deturgetur. Apparebit enim sic tractatibus non solum

solum quatenus differunt, sed etiam quantum am-
 ptohus sit cōmune. Si igitur ea tantum quæ corru-
 pta fuere, uacuata esse videntur, tum lauandum,
 tum nutriendū in remissione febris est; sed ijs quæ
 circa ventriculū sunt, prius cōsulto. Sin ita mul-
 ta inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in ho-
 mine duret, ut virtus iam defessa sit, satius est o-
 mnia lauatione cibare: sed cōsulto prius ijs quæ
 circa ventrem sunt. Consuletur ita laborantibus, si
 modo uacuatio amplius non duret, fomento ex
 oleo & absinthio. Expedit autem tingi absinthiū,
 quo minus nidore offendat, feruētī aqua. Quod si
 quis morsus, aut doloris sensus in vētriculo adhuc
 supersit, imponi illi peniculus post fomentū debe-
 bit, qui uel calidus sit & siccus, uel ex oleo in quo
 absinthiū incoctum fuit, madens, ac plurimū ex-
 pressus. Satiatus autē fuerit, si nardini unguētū quod
 curiose fit factū, facultas sit, ex eo peniculū eodē
 modo imbutum uentri imponere. Iam multo etiā
 satius sit, si purpura marina sit; atq; etiā longe o-
 ptimum si optima sit tyria. Quippe tenuiorem ad-
 stringēdi uim habet tum ea purpura, tum optima
 nardus, ita ut uis earum siccando, calfaciendo, ac
 robur inferēdo, in corpora quæ circa uentriculū
 habent, alte penetrare possit. Quod si os uentricu-
 li (quod stomachū appellare solemus, abutētes ni-
 mirū appellatione) imbecillus sit: etiā tanta por-
 tione chīæ mastiches in nardino tunfa, unde for-
 didum crassitudo existat, madefactā ex eo purpura
 imponemus. Esto autē abunde calēs taliū quodq;
 cum primum imponit. Quippe quæ tepida sunt,
 omnia uentriculi firmitudinē dissoluunt. Non au-
 tem te fugit solere me unguenta calefacere in uase
 duplici; utiq; cōiecta prius in uas maius, aqua fer-
 uente, quando aliter calefactis uitiatuor eorum fa-
 cultas. Caterum fluente adhuc aluo, utilius est op-
 timo recentē melino simili modo quo nardino
 uti. Vile autē ad omnia talia est & mastichinum.
 Non in postremis accōmodata sunt eiūsmodi uen-
 triculi affectibus & unguenta ea quæ ad gratiam
 delicatarum mulierum fiunt. hæc inquam pretio-
 sa quæ Romanorum luxus uidetur inuenisse, ap-
 pellationesq; Romanas dedisse. Nominatur enim
 tum spicata, tum foliata. Si uero qui affligitur, pe-
 niculum oleo imbutum, siue ob consuetudinem,
 siue deliciis recuset, licet cerato idem efficias. Est
 autem in eiūsmodi usum optimum, quod ex cera
 fit Thyrenica in unguēto nardo liquata, cui post-
 quam refrigeratum est, aloes ac mastiches mollis-
 simus pulvis est admixtus. Debet autem singulo-
 rum hic esse modus: ceræ ac nardi partes pares; a-
 loes pars octaua; sic etiam & mastiches; uel (si pla-
 cet) huius paulo aliquid plus. Quod si cerato ali-
 quid est sumptuosius his unguentis admisceas, præ-
 stantius medicamētum habebis. Si autem uentri-
 culus intus uritur, ita ut affectus quidā phlegmo-
 nas similis in eo consistere uideatur, utilius est ce-
 ratum quod ex melino conficitur. Sunt porro alia
 medicamenta non pauca. Alia quidem ex cenan-
 the, alia ex hypocisthīde, & balauistijs, & palmula-
 rum carne confecta, quæ uentriculo tum refrige-

ando, tum uero firmando sunt idonea. Horum er-
 go quod ad rem præsentem sit cōmodissimum, id
 deliges, ijs quas memorauimus cōsiderationibus
 intentus. Cibandi uero his sunt: fluente quidē e-
 tiamnum uentre, polenta, & pane quem Græcē
 ὄσολιζα uocant, qui utiq; minimum acetī habeat,
 non sicuti in dysenteria & diutina diarrhœa præ-
 parare solemus. Inspargere autē potentam debebis
 aliās aque calidę ubertim; aliās, ubi scilicet uenter
 adhuc plus iusto excernit, uel mali punici, uel pi-
 rorum, uel malorū succo, potissimū cotoneorum.
 Quod si iucundius laboranti erit, etiā decoctio ex
 piris, aut malis, aut myrtis, præparato, polentā in-
 sperges. Sin uenter non amplius excernit, suffice-
 rit tum alicā similiter prisanā præparatā, hoc est a-
 ceti habēs paucillū; tum ex ea sine aceto sorbitio:
 tum gallinæ corum testiculū, & faxatiles ex albo
 iure pisces: præterea fructuū aliquis ex ijs qui ad-
 stringāt, uel solus, uel cum pane. Hos uero uel ma-
 gis etiam uentre adhuc fluente dabis. Quod si ap-
 petentia careant, sit ut cibos auerſentur (incidit
 nanq; id non paucis eorū quos diarrhœa ex crudi-
 tate male habet) etiam de medicamento quod ex
 succo fit cotoneorū, unū aut duo cochlearia dan-
 da his sunt: aut si huius copia nō est, eius qd̄ ex car-
 ne eorū cōponitur. Tradita uero eius generis me-
 dicamentorū cōpositio est in libris De tuenda sa-
 nitate. Atq; ita quidē in prima remissione, ijs qui
 ex cruditate febricitāt uentre excernēt, mederi
 cōuenit. Si uero omnino uenter adstringit: pertra-
 ctatis prius præcordijs, mox toto uentre, conside-
 rabis diligētē num eibus in gracile intestinū, aut
 in colon, descenderit. Deinde agrū interrogabis,
 qua maxime in parte uel morsum uel grauissimū
 sentiat, qualesuē habeat uetus. Vbi ex his cōper-
 tum habueris, in quantā totius uentris parte nutri-
 mentum cōsistat: si in superioribus partibus pen-
 det, aliquid diatrion pepereon dabis, nō medica-
 mētosiū illius, sed eius qd̄ in opere De sanitate tuen-
 da ceu & simplicissimū, & ijs qui cruditate labora-
 rent aptissimum, laudauimus. Post deinde præcor-
 dia, omnemq; uentrē perfundes. Hoc uero, etiam
 si inferius descēderint quæ uitiosa sunt, facies, plu-
 ris minorisq; ratione id uarians. Siquidem plus &
 temporis & perfusionis exigunt ad præparationē
 eorum quæ deinceps sunt agenda, quibus in supe-
 rioribus uentris corruptum nutrimentum adhuc
 manet. Sin motum id notabiliter ad inferiora sit,
 adiuuandū aut glāde subdita, aut leui per inferius
 infusione est. utiq; si morsus simul addit, hunc mi-
 tigantibus. si flatus, hunc cōprimentibus: sin neu-
 trū fuerit, ex melle, aqua, & paululo olei, id quod
 subter infundet facientibus. Vbi uero uehemen-
 tior morsus urget, Sabinū oleū in quo aliquid seui
 asferini sit liquatum, est utilius. Si uero eius copia
 non est, gallinacei seui. Sin nec huius facultas est,
 caprini. Quod si huius quoq; penuria est, inſin-
 dum oleo parū cere est, potissimū elotæ. Flatus ue-
 ro sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ fla-
 tus discutiunt, fuere incocta: cuiusmodi sunt apij,
 & cumini, & marathri, & sinonis, aliaq; id genus.

Vacuata uero aluo, nutriendum protinus in ceteris quidem ijs quos memorauimus similiter est, amotis tamen ijs quæ adstringunt. Ac si quidẽ primo die ad uesperam hæc egeris, aut etiam noctis qualibet hora: etiam secundo die similem adhibe bis providentiam. In quo etiam si planè desit febris, lauari hominem lines. Ac ubi in sequenti nocte quietus citra offensam dormierit, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si uero qui cruditati successit dies, cum sequente nocte febrẽ attulerit: ueluti in secundo die, ita tunc & accurandus & nutriendus homo est. Si uero & nox tertię diei febrile quiddam paululum afferat, ne sic quidem formidandũ, sed hos quoq; postridie lauabis, nutriesq; ac reliqua omnia in illis ut ante definitum est, ad portionẽ exequeris. Sanè mutationes crudimenti in acidam qualitatem, nec incidere in eiusmodi naturis cernuntur, nisi admodum raro, idq; ex cibis qui prompte acescunt: nec febrẽ accendere diariam, æque ut nec tarditas concoctionis: quando scilicet propter talem cruditatẽ febricitant, quibus amara bilis in temperamento abundat, obstructionis & humorum putredinis suspicio est. De qua postea diligẽtius definiam, cum de putredine agam. Nunc huic de diarijs febribus disputationi hoc adiecto, ad alia transibo. Fumidus uapor ex tarditate concoctionis, aut cruditate in qua ructus sentiuntur acidi, nunquam excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus succis defluunt, hiq; omnino paucissimi: minime autem uapores multi fumidique ac fuliginosi: cum nec in ijs quæ extra sunt aliter aut minus edui aut fuliginem uideas, quam fumum ex materijs (ut ita dicam) semiuisis, fuliginem ex immo dice asis uisitisq;. Est namq; fuligo uapor terrestris. Fumus mistio quædam ex ter restri aqueaq; substantia. Verum non est quod hoc loco audire expectes, aut quemadmodum ijs qui tarde concoquunt, aut ijs qui acidum ructant, sit prospiciendum. Est enim de his tractatio ad opus De tuenda sanitate pertinens. hic tantũ earũ cruditatũ mentionem faciemus, quas febris subsequit. Quoniam igitur diaria febris cruditates quæ cum acido ructant, non cõsequitur: quæ uero ex putredine humorũ oritur ea quandoq; sequitur, non sine ratione in eam tractationem quæ de illis instituitur, distuli de his cruditatibus præcipere: sed ne tunc quidem eo modo quo in Sanitatis tuendæ libris. In illis enim diximus quamnam per sanitatem agenda sint illi qui cruditate laborat: hic uero quænam in ijs febribus, quæ cruditati superueniunt.

6. Dicta mihi fermè sunt de diarijs febribus uniuersa: quando qui ex bubone febricitat, medicos, quid sibi sit agendum, nẽ consulunt quidem, sed ubi tum ulceri quod bubonis occasio fuit, tum postea buboni ipsi prospexerint, in remissione eius quæ in cidentis accessionis, lauantur. Ac si quis tum diatripton uel nomen, omnes irrident, scholasticumq; appellant: natura (puto) ipsa intelligentes id transmittendum non esse, quod omnino non erit. Censentq; etiã in omnibus ijs quæ sensum fugiunt, tales debere esse medicos, quales ipsi sunt in

ijs quæ sensui apparent. Porro in omnibus tales esse, nihil est aliud quam intelligere quando sit in tertio accessio futura, & quando futura non sit. Quinetiam qui refrixerunt, aut uisi sunt, aut fatigati, aut tale quippiam passi, postea uero febricitant: hi ubi in remissione talem statum quietẽ qualis erat per sanitatem sentiunt, ne tunc quidẽ eos qui diatripton nomen, ferre possunt. Quod enim uisurpare sæpe soleo, quemlibet priuatũ qui secundum naturam se habeat, quouis sophista ueriores opiniones habere: hoc etiam in diuinissima istorũ diatripto uidere licet: ut quæ ab omnibus qui naturaliter se habent, sit irrisa. Nuper enim è plebe quidam qui in splendida cœna prolixius sibi epulis potuq; indulgisset, uenit domum errabundus, ac manu deductus. Cum autẽ ea quibus grauabatur, in uentriculo eius flutarent, omnia ea euomit: & pernoctem quidem febricitauit. Dormiuit autẽ in magnã partẽ sequẽtis diei. Postea surgens, ac paululum inambulans, lauit, risitq; eum qui sibi diatripton manendam suaserat. Illo namq; autore etiã postero die in ediam tolerare debuisset. Ut autẽ res ipsa monebat, & ipse sua sponte faciebat) lotus & modice cibatus, post somno deditus, eoq; inoffense fruens, mane surrexisset, ad consuetaq; redisset, etiam in ipsa diatripto in qua eum tolerare in ediam oportuisset, si diatriitarij medicis paruisset, (ita enim eos periculum eleganter nominauit quidam) & quidem cum cœnatus iam ex consuetudine homo esset: accedens facetus ille risum excitauit, commemorans quemadmodũ eum qui tertio ante uespera uomuisset, oportuisset etiã biduo in ediam scilicet, ac anxietate plenũ tolerare, ad horasq; spectantem pro diatriitariorũ iussu decumbere. Sunt enim (arbitror) uel plebi non obscura, quæ præter reũ euidentiam temere audentur. Atq; inde merito alios medicos, alios græce logiatros, id est uerbis tenus medicos esse dicunt. Quomodo enim non iure hac appellatione censeantur, quia ea nesciunt, quæ nemo è uulgo ignorat? Quomodo non meritisime irridendi carpendiq;, qui etiã cũ talia ignoret, Hippocrati se præponunt? Verũ illorũ stupiditatẽ ne Mercurius quidẽ ipse cũ Musis sanauit.

7. Absoluta uero in ijs naturis quibus amara bilis redundat, (in quibus scilicet elementum frigidum uincitur à calido, & elementũ humidũ à sicco) de diarijs febribus disputatione ad aliud corporum temperamentum transeamus, quod nihil minus q; supra dictũ uitioso est succo, in quo scilicet calidũ præualeat frigidũ, & humidũ sicco. Maxime enim omnium putredinis morbis hæc inempries exposita est, propterea q; per ipsam sanitatem proximè putredinẽ accedit: ueluti tum ex sudoribus coniungere est, qui grauiter his olent, tum uero ex urinis, deiectione, atq; etiam ipsa expiratione. Etenim qualis est hircorũ, talis est & talis naturarũ temperies. Ideoq; prõpta est ex qualibet occasione, tum alijs morbis, tum uero febribus corripi. Nã qui hac intemperie sunt: cũ stupida cutis eorũ est, effugere febrem non possunt. Sed nec cum ualentẽ cruditatẽ cõtraxerunt, aut perussi [in sole] fuerunt

fuerunt, aut tale quippiam aliud passi. Ac vitiosis quidem habitibus stipatio cutis plurimū esse incōmoda solet. Ideoq; quibus amara redundat bilis, non minus quā qui ad putredinem sunt proni, (*εργασίαν δὲ*, id est putredinosos Græci uocant) febribus ijs quæ ex stipata oriuntur cure, parēt. At ab nidorosis cruditatibus, quæ humidæ & calidæ naturæ sunt (quas modo putredinosas propterea uocauī, q̄ succi facillime in ijs putrescant) promptius læduntur. Nam de obstructione quid attinet dicere? quam idcirco maxime febres accēdere dēximis, q̄ putredinē in ijs, quæ nō transpirant, corporibus creet. Verū de eiusmodi febribus postagemus. Sanē diariæ omnes promptissimē in iam dictis temperamentis accenduntur; idq; ex qualibet earum causarum quas modo in peramabili uicis naturis retulī; curationemq; per similem illis habēt, ac in paucis omnino dissidentē. Nam cum hæ humidiores naturæ sint, magis ferūt quā illæ famem sitimq;. Itaq; minus læduntur hæ, si quādo fame per diatriarios crucientur, si modo libera ipsi transpiratio nō desit. Atq; idcirco balneum hi, ceu quod cutim eorum laxet, uel magis, uel certe non minus quā qui amara bili abundant, requirunt, ceu quod humectet, nō requirunt. Quæcūq; uero de eiusmodi natura sunt dicta, eadem de ac quilito habitu dicta esse censendum. Aliqui enim quibus boni sunt natura succi, coeuitibus aliquando eodem tempore pluribus siccantibus corpus calcantibusq; causis, in amara bilis uitiosum habitum mutantur. Da enim uenisse hominem æstatis tempore in regionem calidam & siccā, esse præterea eodem tempore statum cœli calidum ac siccum, tum uesci eum cibis calidis siccisq;, cogitare quoq;, ac tristari, & uigilare, & irasci, & quamplurimum laborare; fieri autem potest, ut idem homo per id tempus uenere sit usus frequenti, & in sole, maiore ex parte uersatus, & medicamēta quæ siccant calcantib; biberit: ueluti aliqui Theriacen, nonnulli Ambrosiam, alij Athanasiam. Scimus enim profecto, medicamēta à iunioribus medicis eiusmodi nominibus uocari. Cui ergo omnia iam dicta per æstatem cōtingerunt, hunc necesse est calidum & siccum reddiderint, ac propterea eo habitu qui amara bili abundet, quamuis antea optimi succi fuerit. Itaq; etiā ex omnibus supra dictis causis facile febricitabit. Ad eundem modum & si quis naturaliter boni sit succi, ac locum temperatum incolat: si illinc se in alterum locum qui calidus sit & humidus ueris tempore transferat, idq; statu cœli calido humidōq;, tū omni uictus ratione calida humidāq; utatur: is quoq; similiter illis qui natura sunt putredinosi, tum cæteris tentabitur morbis, quibus illi, tum febricitabit nō solum alijs sicuti illi ex ijsdem causis febribus, sed etiam non minime diarijs, de quibus nunc instituiamus.

8 Cum uero octo interperies in uniuersum sint, ut ostendimus, opportunissima ad febres est calida & sicca. Ac nisi quis hanc, ut dictum est, cibet, ocysime in ea mutatur diaria febris in acutā. Proptinqua huic est, præsertim quod ad febrē attinet,

A quamuis ad alia sit deterior, calida intemperies & humida. Tertia ab his intemperies est simplex illa in qua oppositio altera recte se habet, utiq; quæ ex humido & sicco constat, in altera calidum exuperat. Quippe opportunior est hac quā cæteræ quæ sequuntur, tum ut omnibus supradictis occasionibus lædatur, tum ut ex diarijs in plurium dierum febres transeat: nihil enim alienum fuerit eas sic appellare. Huic proxima est, quæ in calido & frigido debitum modum seruat, cæterum siccum elementū habet humido præualens. Ab hac deinceps media omnium est, scilicet quæ mediocritatē in utraq; oppositione seruat. Quatuor quæ reliquæ sunt intemperies, neq; facile febribus occasione iam dictarū causarū patent: nec diaria tentatæ, si inedia tolerant, in pluriū febres transeunt: imò aliquæ saltē earū ubi redundantia humorū citra corruptelam contraxerunt, (cōtrahunt autem eiusmodi intemperies assidue) utilitatē ex inedia sentiunt: ac potissimū quæ frigida est & humida. Ab hac quæ humida est. Tertiō loco quæ frigida. Quarto loco quæ sicca est & frigida. Siquidē post diarias febres discussas ubi coactus quispiam nulla necessitate est mirificam diatriotē transmittere, alia quidē nulla in frigidis temperamentis ex inedia febris excitabitur; ledetur tamen ipse siccus & frigidus corporis habitus quā maxime: ut nisi longo tempore redire ad naturā qui ea sunt intemperie, non possint. Cæterum, si quod forte fortuna his adsit acquisititium humorum uitium, fieri potest ubi in fame & illoti per triduum custodimur, ut ex diarijs in plurium dierum febres immigrēt. At quæ sicca quidem corporis natura est, sed in altera cōtrarietate temperata: ea in longioribus inedijs gracilescit magis, q̄ quæ sicca est & frigida: reficit tamē facilius, cum idoneū nacta est uictū.

9 Enim uero eiusmodi omnibus uictus ratio alteranda est, multo profecto magis quā ijs de quibus primū omnium est dictū, nempe calidū & sicco, item calido & humido. Quippe qui frigidus & humidus natura est: quoniam calido siccoq; in utraq; intemperie contrarie est affectus, contrario nimirum utetur uictu. Melius tamen est non absolutio sermone contrario dicere, sed ex solius temperamenti indicatione: quādo ex eo q̄ eadem febre febricitant, non diuersam, sed omnino eandem fortientur indicationē. Dictum nanq; sæpenumero iam est, id quod secundum naturā est, similia semper postulare: quod præter naturam est, contraria. Siquidem quod naturaliter se habet, custodire: quod præter naturam est, tollere oportet. Porro febris omnis præter naturā est: ideoq; uictus rationē humidam frigidamq; exigit. Temperamēta uerō ipsa, aliās similia, aliās postulant contraria. Quæ enim uitio carent, similia perpetuo, quæ quæ seruare expedit. Quæ uitium habent (ueluti in opere De sanitate tuenda est dictum) aliās similia, aliās contraria. Idq; merito accidit, cum nec ad unguem naturaliter se habeant, (quomodo enim essent uitiosis?) nec prorsus præter naturam, quando qui sic attemperati essent, perpetuo agrotarent.

Ergo similia desiderant, tū in alijs de quibus mox dicitur, tum uero in ulceribus omnibus. Monstratum enim id sapenumum iam in superioribus est. Contraria uero, in eo uictu qui per sanitatem adhibetur; ueluti De sanitate tuenda docuimus. Sed neq; hæc perpetuo, sed tū cū corrigere intemperie eorum studemus. Quippe duplex nobis in ijs, qui sani sunt, finis proponitur. Nempe uel corpus sanum in pristina eius temperie tueri, uel etiā hanc meliorem reddere. Sic igitur arbitror in ijs qui diu febris laborant cibandis, uel uni febrili affectui contrarium, uel etiam ipsi laborantis intemperamento desumam. In ea tamē natura quæ haud dubie in medio temperamento est, ab ipsa febris contrariorū indicatione accepta, eatenus humidū frigidumq; uictum adhibebimus, quatenus siccus calidusq; quam ante iam redditum corpus appareat. Verum hoc tum perspicuum, tum indubitatum est. Reuertamur autē rursus ad intemperatas naturas. Nam quoniā eas (sicut De sanitate tuenda est proditum) licet & quales accepimus seruare, licet & ad melius transferre: satius arbitror est, cum plane ualent, non cum agrotant, uel de se queruntur, uictus illis rationem mutare. Gaudent enim naturæ cōsuetis semper: ut & Hippocrates euidentissimis argumentis in libro De acutorū uictu adstruxit, & in omnibus qui se secundum naturā habēt, manifeste apparet. Quòd nanq; qui sibi iam displicent, extra cœtum eorum qui secundum naturam se habent, sint ponendi: id nemo qui compos est mentis, dubitet. Cæterum, ij an præter naturam se, an non naturaliter solum habeant, id utiq; quis æstimandum duxerit. Atqui si ex ipsa cōsuetudine indicationem aliquam sumi conueniet: siquidem multo iam tempore intemperatas naturas contrario uictu ei quæ uicit intemperiei cibauimus, ita etiam & cum parū ex sententia se habēt, faciemus. Sin minus, quæ similia temperamento suadet indicationē preferemus. Ita uero et Hippocrates mihi sentire uidetur, ubi ait: Humidus omnis uictus febricitantibus est idoneus; potissimum autē pueris, & alijs qui ita cibari sunt sueti. Febricitantibus enim inquantum febricitant, ex ipsa contrariorum indicatione humidus uictus cōducit: pueris ex similitudine. Eodem autē modo & eam quæ a consuetudine præbetur, quo eam quæ ab ætate datur, accepit. Nam & etas cum ex ijs sit, quæ natura nobis insunt, similem sibi uictum postulat: & quæ a consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est sicut ea quæ ab ætate. Quippe seruare quoq; hanc iubet, perinde ac proprium ætatis temperamentū. Itaq; etiā nos tum ex omnibus quæ circa agrū spectantur, eius quod conducit inuentionem moliri: tum quando indicationes omnes secum cōsentiant, & quando inter se dissentiant, inspicere semper conueniet. Omnibus enim cōsentientibus, unā prorsus uictus speciem cōstituemus. Dissidentibus uero inter se, quæ ualentiores, ac plures sint, præferemus: ut uictus species quam hæc præscribāt, præferatur: sic tamen ut ne contraria sit neglecta. Porro prælatio hæc aliās utriq; in unius auxilij mate-

riam mistis perficit, aliās seorsum sumptis. Accōmunis quidem hæc ratio est omnium quæ inter se cōplicatæ sunt, contrariarū indicationū. Quomodo autē hanc ad usum conferre oporteat, cum aliquando ipsi morbi coeuntes sint cōtrarij, aliquando morbus unus sit, sed qui contrariam indicationem subiiciat, aut naturali laborantis temperamento, aut ei quod nunc acquisierit: præterea ætati, & consuetudini, & regioni, & anni temporis, in ipsa particularim tractatione ostēdam. Nūc ergo cum propositum nobis hoc loco sit unicuiq; memoratorum intemperiei generū idoneum inuenire uictum: cōmunis quem cœpimus methodi modus, ueluti sub exemplo examinetur. Pone enim correptos febris esse duos homines, in regione natos educatosq; temperata, nunc in ea non esse, imò alterum in calida, & sicca; alterum in humida, & frigida. Præterea, eosdē cōferre esse, tum temperamento, tum natura, tum cōsuetudine, tum ætate etiam sub diuerso (si placet) & anni tempore, & statu cœli agrotare: sic ut alter calidus siccusq; natura sit, ac talis uictus rationi in totum insueuerit: præterea iuuenis sit, & hyeme agrotet, idq; in humida & frigida regione, ac statu cœli simili. Alter humidus et frigidus, simili uictu assuetus, tum puer ætate, ac ætate, in calida siccaq; regione, ac simili cœli statu laboret. Quæ nam igitur in utroq; horū indicationes? Nempe quæ a febricitando sumitur, cōmunis amborum est, ac quæ refrigerant, & humectant, desiderans. Reliquorum nulla est præterea cōmunis. Siquidem priori & propter naturam, & propter ætatem, quæ simili sibi uictu fuere assuetæ: siccioris calidiorisq; tēperamenti cibis idoneus est. Idemq; propter & anni tempus, & statum cœli, & regionem, conuenit. Non enim quæ ab his suppleditur, indicatio similia desiderat, sed contraria. Alteri ex propositis, propter ætatem, & naturam, & consuetudinem, similia ipsis exhibēda indicantur, propter ætatem quidem humidā, modicēq; calidā, propter naturam, & cōsuetudinem humidā, & frigida, propter regionem & anni tempus, & statum cœli, contraria: quæ & ipsa nimirum sunt tanto temperatis frigidiora & humidiora, quanto regiones ipsæ sunt calidiores temperatis, & sicciores. A consuetudine enim semper est indicatio similitudinis, quoad scilicet agrotant homines. Arab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu cœli, ubi temperata hæc sunt, similitum semper præsidiorum est indicatio, siue ualeant homines, siue agrotent. Contra, ab intemperatis anni tempore, statu cœli, & regione, contrariorum est indicatio. Cæterū, ab ætate & natura non absolute, sed cum consuetudine. Porro, nihil in contrarijs indicationibus tam conuenit expendi, quā magnitudinē eorum quæ ad indicationem coierūt, quam utiq; in libris De sanitate tuenda duplicem esse ostēdimus. Alteram quæ ex ipsoform, quæ indicantur, dignitatibus censetur. Alteram quæ ex ipsoform (ut sic dicam) proprijs substantijs spectetur. Quas ex conferendo cum mediocri, & quod secundum naturā est, accipēdas esse testati sumus. Nisi enim

ita quis indicationū potestates examinet, nequeat sane mensuram uictus inuenire. Cum enim refrigerandum humectandumq; esse febris perpetuo indicet, reliquorum uero quodq; prout dictū est: ubi concors eorum indicatio est, nullum exhibeat negotium: ubi discors, pro pluribus ac potioribus formari uictus ratio debet. Siquidē in modo propositis, ex eo quod febri cant, cōmunis refrigerantium ac humectantium indicatio praestatur, non tamē ex ceteris. Sed cuius tum aetas, tum temperamentum, unā cum consuetudine, tum regio, tum anni tempus, & coeli status, humectantia refrigerantiaq; exhibēda indicant: hunc haud dubium est nō solum humectandū refrigerandumq; esse, sed etiam nec leuiter hāc, nec ut cuiq; facienda esse, imō planē magnopere ac uehementer omnibus scilicet indicationibus idē dīcantibus. Cuius uero reliqua omnia refrigerantem quidem humectantemq; uictum, quemadmodum & febris non indicant, sed contrarium ipsi, calfacientem scilicet & siccantem: utiq; ambiguitas pugnaq; indicationū inter se oritur, quō casu magnopere opus est, tum numerum indicationum, tum magnitudinem simul conferas. Quippe quā a febris sumitur, ea reliquis, quando omnes cōtrariū faciendum praescribunt, numero quidem inferior est: magnitudine tamen quā ex dignitate, aut potestate, aut quomodo cuiq; appellasse libet, spectatur, utiq; superior est: potissimum si longe a natura recessit. Febris duplex tū magnitudo illi accedit, & quā ex febris genere provenit, quā omnibus est cōmunis: & quā propria, suāq; ipsius est. Siquidem & quia febris, plus ceteris omnibus sollicitis nos habet: & quia praeterquam quod febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit: idcirco contra-

ARGVMENTA

Caput i. Conneſcit hunc librum praecedenti. De transitu diarum in alias duas febrium species. Distinguitur plurimū in hunc modum lib. 10. cap. 2. De synochō, id est, continente febre: & quod ineptum quidem atq; solocum eius uocabulum sit, receptum tamē apud ueteres Graecos, ne in nōminatū hoc genus febris maueret. Diuisio eius in putridam, & nō putridam. Quod nulla obſtructio tam pertinax sit, quin foris effluat aliquid tenuius humoris: unde in febribus quotidie rigores sunt, quotidie febres soluantur. 3. Iterum de synochi diuisione, in non putridam, quā subſici potest naturae ephemerarum: & putridam, cum in omnibus uasīs ac potissimum maximis aequabiliter succi putrescunt. Alia eius diuisio, in acmaſticum, homotonū, & paracmaſticum. 4. Synochi non putridae primum, deinde putridae exempla ob oculos ponit. Iterū de tribus differētijs continētium febrium, & de sanguinis missione. 5. Quir praesentaneū in synochō febre fit remedium misio sanguinis, iterū admonet: secus enim suffocatio, nis, uel animi deliquit latalis periculum esse. Ambien- tis item aeris statum animaduertendum esse diligenter ostendit. Duplicem esse plenitudinem. Item quā salubris, tempestiuus frigidus potus in his affectibus esse solent: & idem intemptiuus quā pestifer. De indicationibus uenae sectioni necessarijs. Ratio ordinis, quē hic in febrium curatione secutus est. 6. Neminem uel- lus arbris scientiam adsequi, nisi & methodo aliquam habuerit per uniuersalia Theoremata, & in particularibus exemplis, nimirū in agris singulatim, sese exerceat.

rias indicationes inducit, atq; obumbrat. Sin parua fuerit, fas est reliquas omnes unā cōiunctas cū ea cōferri, atq; expendi. Ac siquidē parēs uideantur, neq; febris indicatio praefereatur, sic ut humectandum & refrigerandum sit: neq; etiā reliquorum, sicut calfaciendum ac siccandū sit: imō media uictus ratio ubi ita se corpus habet, eligenda erit. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse a temperato & medio uictu par est, quantum ea quae pollent, sua contraria superant. Ergo sumi exercitatum in his omnibus, tum natura prudentem esse medicum conueniet: quō cuiusq; indicationis potestate diligenter cōsiderata, omnibusq; inter se collatis, unam idonei uictus summā, quā laboranti sit cōmoda, comparet. Ac diariarū quidē febrium indicationes ex his generibus capiuntur: raroq; accidit si alibi a laborantis uirium modo: cum febrium quae pluribus diebus affligūt, indicationes, tum uirium respectū necessario adhibeant, (non enim leue in his cōsiliū est, quod a uiribus petitur) tum causarū quae ipsas excitant: exceptis tamen hecicis, utpote quas nulla accendit causa: quemadmodū nec corpus id quod iam habitu calorem ignis in se suscepit, siue id lapsis, siue lignum sit. Illud nanq; cōmune cum diarijs habet, quod uidelicet non amplius fiant. Differunt autem in eo quod diariarū in leui (ut sic dicam) affectu (κατὰ γένος Graeci uocant) calorem habent: hecicarū in habitu, qui aegre soluantur. Licet etiā dicas eam quoq; quā a uiribus sumitur indicationē, tum in reliquis omnibus morbis, tum in diarijs febribus semper adhiberi: nobis tamē in praesenti dispersione opus ea nō esse: propterea q; ex prima quidē ratione nō indicet, ex accidenti uero indicet. De eo uero accidente in sequentibus differemus.

LIBRI NONI.

rit. 7. Euincit contra sophistas a uiribus etiam petendam esse interdum indicationem. Quanquam enim prima statim ab affectu sumat indicatio: opponitur tamen huic interdum ea quā a uirtute sumitur, attendixis inde dicta. Concedit autem non esse perpetuum: sed alias maxime necessariā esse: alias mediocriter: alias exiguū quid conferre: aliquando prorsus omitti, sicut accidere solet in reliquis omnibus quae aliquid faciendum indicant. 8. Hippocratis laudes praedicat (quem aliarum sectarū medici contemnebant) quod inuenerit quidem rationem, sed non absoluerit. 9. Breui hoc capite repetit Galenus, in diarijs febribus indicationē curatiuum non cōsiderari a uirium cōstantia: cum haec nunquam nō satis sint ualida in ephemeris. Proponit item uelut argumenta quadam & numerum earum indicationū, quas in sequentibus capitibus copiosius expedit: Sumuntur autem ex ipsa corporis temperie, cōsuetudine, regione, aetate, anni tempore, & statu coeli. 10. Quatenus indicatio a uiribus petatur: & primum de animae facultatibus in quibus uita est sita, cuius custodia a uiribus indicatio sumpta efficit. Recēset itē q; multos uiderit cū uitae dispendio ad syncopen usq; sectione uenae ab imperitis adhibita fuisse periclitatos. Quid agendū ubi uirtus imbecilis est, affectus autē uacuationē requirit. 11. De peculiari phlebotomia indicatione, praesertim a uiribus. Vile naturae seruandū esse sanguinē, inuitē eliciendū. 12. Hoc etiā per breui capite Galenus cōstantia curationū indicationū submonet. Quadā puta sui custodia indicare, quadā uero amotionē, quod simplex est, simp-

plitem quocq̄ indicationem habere: Non simplex uero, non simplicē. Verbi gratia, Frigidum calefieri tantū potulat: calidum, refrigerari: Calidum & siccū, refrigerari simul & humectari. 13. De summa laude & necessitate uirtutis: & indicationem ab ea sumptam, nō ex curatricium indicationum numero, sed uitalem esse. Quibus modis uirtus conservari possit, quaq̄ serie ab indicatione uirtutis ad alias indicationes peruenire liceat.

14. Colligit indicationes omnes in tres: Primam, à morbo uel constitutione præter naturam, quæ se tollendā indicat: Alteram à corporis temperamento siue cōstitutione naturali, quæ se tuendam indicat: Tertiam ab ambiente nos aere, sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest: ut sit causa sine qua non. Particulatim uero intelligendum est, ægri quidem temperamentum quale sit, ex natura, ætate, consuetudine, & ambiente nos aere. Ambies uero aer qualis sit, ex regione, anni tempore, & cœli statu. 15. Quod etiam tria hæc indicationū genera ad duo redigi possint, nempe morbum & sanitatem: quorū ille se tollendum, hæc se tuendam indicat. Et quia si affectus contrarij sunt necesse est

A per contraria fiat eorum alterius in alterum translatio. Vnde rursum una tantum generalis curationum indicatio erit, nempe contrarietas. Caterum ut contrarium adhibeamus sub debita mēsurā, inuestigare oportet corporum temperamēta: quæ quidem deprehendens partim ex libro de temperamētis: partim ex ætate & antiqua uita: quæ rursum in uita exercitio & uictus ratione consistit: præterea in hac regione, hoc anni tempore & hoc aere & consuetudine: à quibus omnibus facile particulares indicationes petuntur, de quibus plura scripsimus agit. 16. Necessariam & minime leuem esse indicationem quæ à consuetudine sumitur. 17. De indicatione ab ætate & temperamento. Postremum etiam præter alia coaceruat, quicquid indicationum uspiam haberi potest. Ratio ordinis omnium huius Methodi librorum.

A L I T E R.

B Quæ sit utriusq̄ generis febrium synocharum generatio: & qua methodo curandæ sint. De indicatione quæ ab ægotantis uiribus sumenda est. Quo pacto à consuetudine indicatio sumi debeat. Omnes in uniuersum curatios febrium scopos enumerat.

GALENI METHODI MEDENDI,

ID EST DE MORBIS CVRANDIS,

Libri nonus.



I A R I A R V M Eugeniæ curationem, in libro qui hunc præcedit, exposui, totius propositi operis octauo. Est autē huius febrium generis unica accessio, uno plurimū diē ex ipsius saltem natura circumscripta. Quippe quæcūq̄, uel

per medicorum ignorantiam, uel ægrorum intemperantiam, uel ministrantium errorem in eiusmodi febribus cōmissa, in aliud ipsas genus transferunt, hæc non secundum propriam ipsarum naturam eueniunt. Nō enim est profecto mirum, si per ea quæ delinquantur, nō solum porrigatur, aut in aliud genus transeat morbus quiuis, sed etiā cum prius non esset, nunc excites. Nam cum ijs qui integri sunt, delinquere non sit tutū: haudquaquam id ægris sine discrimine contingat. Reliqua uero cum sint genera duo: (ueluti in libro De febrium differentijs est ostensum) alterum ex humorū putredine nasci do cuimus: alterum quod iam solidas animalis particulas occupauit, hec ticū nominant. Transeunt sæpe autem diariæ febres, ueluti ostendimus, in utrumq̄ genus, nisi quis eas cōmode tractet. Veluti autem in ceteris rebus omnibus quæcūq̄ uno genere comprehensæ societatem in naturis habent, ac propterea mutuo in se transire ualent, tertia quædam formula in transitu ipsarū existit, quæ neutrius extremitatum formam planē exhibet: ita nimirum & in diariarum febrium transitu imaginē licet alterū quoddam genus in transitu exoriri, quod neutri extremitatū sit idem. Ac primum quidem de hoc differendum esse mihi uidetur: quod sicuti reliqua etiā ipsum utroque protinus noscatur cum incidit, tum sic inhibeatur in primordio, ne aut ægre sanabile, aut insanabile, postquā actum est, euadat. Caterum, medium id cum inciderit, nec nosse ijs possunt, nec sanare qui extre-

mitatum quarum est medium, speciem ignorant. At tibi qui præsertim non solum diariarum, sed etiam reliquorum duum generum notas intelligis: ubi uel diariarum notæ aliquatenus sunt alienatæ, uel reliquarum notæ simul apparent, haud difficile fuerit iam transitum suspicari. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, uigilia, animi perturbatione, uel bubone qui ex euidenti aliqua sit causa, nunquam ad tertium usq̄ diē progredietur febris accessio, nisi quid delictum circa laborantem sit. At quibus stipatio febris occasio est, ijs etiā ultra hūc porrigi accessio potest. Nam quoniam stipatio, uel obstructis exilibus meatibus, uel conuentibus, uel etiam corpore ipso immo deratis densato accidit: merito (arbitror) diximus ex frigore & balneis quæ uel contactu refrigerent, uel facultate: præterea pharmacis similis generis, pari modo ijs quæ cutim siccant, ueluti sole feruente, nec minus etiam ijs quæ densent, ueluti dura cum ijs quæ frigefaciant frictione, & detineri intra corpus eūcūmida fuliginosaq̄ excrementa, & ab ijs febrem accendi: uerum ex his densationem quamdam corporum ipsorū fieri, ac ueluti exigorum meatuum cōiuentiam: obstructionem uero uel propter glutinosos, uel crassos, uel copiosos succos incidere: quinetiam febres quascūq̄ uel conuiuentia meatuum uel recens corporum densatio excitant, has & desistere post primam accessionē, si quis recte eas tractet, & uere diarias tū esse, tum appellari: at quæ ex obstructione creatur, si hec pusilla sit, solui ipsas quocūq̄ similiter ut alias diarias, si quis eas legitime sanet. Sin ualēter impacti humores sint, sic ut ualentius aliquid quod eos eximat, desideret: eas febres porrigi ultra unum diē necesse est, ac diariarū febrium genus uideri egresas. Quomodo enim dici ultra diaria febris potest, quæ in tertium usq̄ diē extenditur, quando ex ipsa nominis ratione in secundo eam desistere parat

erat: Dictum enim supra est, uiginti quatuor horas esse sic appellatæ diei spatium: utiq; ut cum nomine diei, nox quoque una comprehendatur. Atqui si neq; humor putrescens subsit, nec corpus ipsum febrilem calorem, ut habuit susceperit: a duobus generib; diuersum sit oportet. Aut ergo aliud præter tria iam dicta genus esse in prima febrium distinctione dicendum est; aut appellatione pro nihilo habita diarias ipsas nominare oportebit. Neq; enim profecto de substantia ipsa taliū febriū est diaria uocabulū. Verū cōuenienti nomine destituti, clarioris simul breuiorisq; doctrinæ gratia, ab eo qd̄ sæpius eis accidit, nomē indidimus. Ac natura quidē eadē his est quæ diarijs, nomē autē nō idem.

2 Siquidem in quibus una accessio ab initio ad finē perpetuo manens, in multos dies porrigitur, eas febres synochas, id est continentes appellant; non illi quidem græco nomine usi, ceterum solocissimum cōmittendum potius ratū, quā formam ipsarum sine nomine linquendam. At non sicuti idea una eiusmodi febriū est, à qua synochas eas nominant, ita & natura simplex unaq; est. Quædā namq; earū manifestam habent putredinis notam, quædam prorsus non habent, quas nimirū ex diariarū febrium genere esse diximus. Cum enim accessiones remissio exseruentium humorū transpiratu contingere soleat, non transpirant autē in uehementi stipitatione; necesse est multorum dierum fieri accessionem. Igitur ubi in tali febre nulla subest occasio, quæ alterius accessionis principium excitet, ultra hoc qd̄ multorum dierum febris est, nec inuasionē alicuius febrium significationis facit, sed permanet ab initio ad finē una febris, quæ nec quotidiana, nec tertiana, nec quartana notā præstat. Cæterū cum me audis dicentē, ubi uehementē stipata corpora sunt, cohiberi intra corpus febrilem calorem; non ita factam prorsus densitudinē putandum est, ut nullum ex ijs humoribus qui tenuari admodū sint, effluere foras sinat: cum nec si de ossibus ita dixeris, id uerum sit, nedum carne & cute. Verum cum à feruentibus humoribus uapor attollatur plurimus, effluat autem foras exiguus; hunc qui relictus est, febrem seruare esse necesse. neq; id modo propterea qd̄ ipse manet, sed etiam propterea quod quæ proxima sunt, adurit.

3 Quoniam igitur ex duobus his seruari febris potest, & qd̄ totus uapor non transpirat, & qd̄ idem uapor ea que contingit, etiam exalfaciatur: necesse est tres esse in synochis febribus differentias; nempe uel pari permanente magnitudine ea, quam in prima accessione summam habuit, uel adijciente semper exiguum aliquid, diminuentē: uel: hæc uel æqualiter faciente, uel inæqualiter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit: nec augeri, nec minui febrilis calor cernetur: sed perinde sibi similis permanebit, ac si nihil illi adijceretur, aut demeretur. Quippe ad equalitatis custodiam, nihil interest seruetur ne eadē assidue substantia: an ei quæ uacuatur, par fiat ea quæ adijciatur. Verum si altera earum uicerit, utiq; si quæ uacuatur: minui febrem necesse est. Sin quæ adij-

Galen.

A citur: omnino increscere. Sed nec illud sanē quæquam latet, qd̄ cū ex febribus altera magis minusue quā altera, tum augetur, tū minuitur, id ob exuperantiæ imparitatē necessario accidat. Nam ubi aliās ampliorem mensurā, aliās minorem uel febrium generatio, uel transpiratio exuperat, nec ijs quæ aut gentur omnibus par esse auctio, nec ijs quæ minuitur demptio omnino potest. Imò plurimū esse, tum excessus, tum defectus differentiā est necesse. Atq; unum quidē hoc (siue genus, siue speciem, seu quiduis aliud appellare libet) *σωχων*, id est continens febrium est, quodq; ex eadem cum diarijs natura cōstat. Alterum est ubi in omnibus uasis, ac potissimū maximis, æqualiter succi putrescunt. Eiusmodi febriū in gracili & frigido corpore neutra consistere solet: sed plurimū in ijs qui sanguine abundant, & corpulentis gigni cernuntur: quando nec obstructio citra putredinem excitare febrem ualet, nisi id quod non transpirat, & copiosum sit, & calidum: nec humorum putredo in omnes quæ inter inguina & alas interfunt uenas, æqualiter ac cito porrigi in frigido habitu potest. Debent enim quæ putrescunt, tum calida humidatq; esse, tum uero difficilem transpirationē habere. Eoq; sit, ut nec in frigida ætate, nec in frigido corporis temperamento, siue id ab initio constitit, siue modo frigidum sit factum, continens ex ceteris febris: sed nec in gracilibus, uel qui raro sunt corporis habitus. Imò tum ætate, tum natura, tum acquisitio temperamento, quæ calida sint, ac præcipue si & carnosus, ac multo sanguine affluens, & denso corpore æger sit, aut etiam calidis excrementis refertus. Proinde sit, ut qui ita febricitant, ijs & pulsus maximus sit, & æqualis, & uehemens, quibus etiā arteriæ habitus, nec durior quā pro natura est, nec mollior: celeritatis tamē frequentiatq; eò peruenit, quod febris ipsa magnitudinis. Atq; hæc quidē ambarū sunt cōmunia: alteri uero priuatim putredinis insunt notæ: idq; tum in lotio, tum pulsū, tum caloris ingrata qualitate.

4 Ac tibi exempli causa redigā in memoriā adolescentes duos, quos una mecum uidisti. Erat alter eorum liber, & palæstra peritus, alter seruus, haud inexercitatus ille quidem, cæterum in palæstra parum uersatus, nec tamē ad quotidiana quæ seruum deceant, tum exercitia, tum opera tractanda, non idoneus. Porro liber continenti citra putredinē febri laborauit, seruus continenti cum putredine. horū utriq; quenam sit adhibita curatio, non intemptium dictu nunc arbitror, quando quidem in exemplis exercitari quiduis discentes maxime expedit. Neq; enim satisfaciūt ad exactā cognitionē uniuersales methodi. Sunt autē exemplorū ea pro portioribus habenda, quæ ipsi oculis usurpauimus: quando si omnes qui docere scribe reūe aliquid sunt aggressi, ea prius operibus ostēdissent: prorsus pauca quædam falso dicerentur. Nūc uero pleriq; alios docere tentant, quæ nec ipsi si unquam fecerunt, nec alijs ostenderunt. Cætera uulgus medicorum nihil miri est, si cōtemptis bonis moribus, opinionī sapientiæ magis quā u-

tom. 6

k

ritati

ritati inhiat. Verū non sic fuit ratio nostra. Non enim heri, aut nudius tertius, sed statim ab adolescētia philosophiæ studio capti, primū nos ad eam cōtulimus. Mox patris euidenti in somno moniti ad medicinæ studium excolendum uenimus, ac per totam uitam operibus magis quā uerbis utriq; studio incubuimus. Quo minus mirū est, si in quo tempore alij totam urbem salutando lustrant, & cum diuitibus cōnant, ac eosdem comitātur, hoc omni sedulo nos laborantes, primum quidem omnia quæ ueteribus pulchre sunt inuēta, didicimus: mox eadem opere tum indicauimus, tum exercuimus. Ergo qui palæstræ peritus iuuenis erat, ubi febricitare hora prima noctis coepisset, postriedi eū mane circiter horā diei tertiam uidimus. Cum autem inuenissem febrē admodum calidam, sed pulsus æquales, & maximos, & celeres, & frequētes, & uehementes, tum caloris qualitātē quæ tactum minime morderet, iam uero & urinas tum crassitudine tum colore à naturali habitu non multum alienas; audiens præterea hominem circiter triginta dies exercitationis consuetudinē intermisisse, pridie tamē exercitasse se uehementius, cæterum non multum, fumpsisse autē solitos cibos, atq; eos concoxisse, quamuis tarde & ægre, utpote cum febris uespere occupasset, cum igitur rubicūdus plenusq; homo appareret, atq; etiā plenitudinis sensum se percipere diceret, faciētē interim quodam eorum qui aderant, de uena secunda mentionem, uisum nobis est eius auxiliij considerationem in aliud tempus remittere, simul ut certius sciremus cuius generis febris esset, simul necessariō propter eam, quæ præcellerat, cōcoctionis tarditatē. Cum autem uespere similem uigorem tueri febris est uisā, ceu nihil sensibiliter remittēs, suspicio iam erat synochon esse, hancq; ex obstructione, & sanguinis abundantia, & præ carnis copia stipatione. Ac cum parem magnitudinem per totā noctē febris seruaret, postero die uisum est medicis omnibus, qui eum inuiserant, sanguinē esse mittēdum. Discordia uero orta de tempore, & uincētibus qui id insequentem diem differendum suaderent, febris per totū eum diem euidenter uisā est uigorē suum augere. Mox tertia sequente nocte, alia quidē accessio minime incidit, quæ primæ ad portionē responderet; erat tamen altus ipse laboranti intolerabilis: urgebatq; tum tensio totius corporis, utpote repleti; tum capitis pulsatio: atq; ob hæc grauis uigilia: iuuenē in aliam alias se figuram iactante. Itaq; cum ultra ferre non posset, hora noctis circiter octaua mittit ad me ministrū, rogatq; ad se ocycus ueniam. Ipse annuo, atq; ab eo: inueniōq; febre calidissimā, pulsumq; qualem prædixi. Quoniam autē nec in hoc, nec in lotio, nec in ipsa caloris qualitate indicium aliquod humorū putrescentium apparuit: optimū factū uisum est uenā incidere, anteq; putredo inciperet. Aufero itaq; ab homine eo usq; de industria sanguinē, quoad animo linqueret: maximū planē ubi ualentes uires sunt, continentium februm remediū. id quod tum ratione, tum experientia didici. Primū namq; in con-

trarium statim agitur corpus, celerrime ex animi defectu refrigeratū. Hoc uero nemo inuenire potest neq; quod ipsis ægris, neq; quod naturæ quæ animantes gubernas, iucundius uisū sit. Postmodum in eiusmodi corporibus, necessariū superuenit alui defectio, nonnunq; etiā bilis uomitio. Quas res statim à toto corpore maiores sudores ue excipiunt. quæ nimirū omnia cum huic quoq; contigissent, protinus febrē extinxerūt: sic ut quidam ex ijs qui aderant, iugulasse me febrē periculum dicerēt, unde omnes risimus. Verū quō narrationē omnē absolua, nihil mali erit pauca addidisse. Post duas nāq; à sanguinis missione horas paulo nutrimenti dato, ac iussu quiescere, discessi, Quinta uero hora reuersus, tam profundo somno indormientē inueni, ut tangentem me proflus nō sentiret. Cum uero & ministri adeo illi altum somnum fuisse dicerent, ut nec cum maiores eius abstergerent, expergilceretur: suasi ita facerent: esse namq; hominē iam proflus à febris liberum. Reuersus autem & decima rursus hora, etiam tunc dormientem inueni. Egressus autem iterū ad alios uisendos ægros, redeo hora prima noctis, non tamē ut ante tacens, sed uoce de industria subalta, quō ægrum à somno excitarem. Quod cum ita accidisset, ubi solo ptisanæ cremore ipsum nutuiui, abij. Cuius modum postero die augens, tertio lauatum dimisi. Ac quæ ad hunc pertinebant infirmum, ita sunt gesta. Quæ uero ad alterum, nunc dicam. Is cum toto die multum laborasset, deinde lauatus pauca comedisset, coepit nocte febricitare, totū etiam cōtinuans sequentem diem. Hunc nos post secundam noctem uidimus in cæteris quidē omnibus iam dicto iuueni similiter affectū: uersiputrescentium humorum euidentes præbentem notas. Itaq; uena quoq; huic protinus incisa, usq; ad animi defectum uacuauimus. Post id, idoneo interposito spatio, cibauimus primum mullā, deinde una interposita hora, ptisanæ cremore. Atq; hæc omnia intra quintam acta sunt horā. Cum autem similis sibi perseveraret febris, synochō eā fore ex putredine expectauimus, itaq; accidit. Quippe cum eam secunda noctis hora pari magnitudine cerneremus, tertiæ diei accessionem, futura ne esset, an secus, diligenter obseruare uolebamus: cuius in septimā horam noctis suspicio erat. Itaq; cū summo mane superuenissem, inueni quod expectarā. Nam nec tertiana inciderat accessio, Febrisq; remissior paululo q̃ uespere fuerat, apparuit. Ut autē rursus hominem meridie uidī, eratq; iam certissimum & febrē decreuisse, & synochon febrē esse, sed quæ [assidue] decrederet: satius uisum est tum quoq; hominē similiter nutrire. Quarta uero exacta nocte, manifeste minor etiā quarto die erat. Quo rursus quoq; ad eundē modum homine cibato, aduertimus tum illo die toto, tū quæ hunc secuta est quinta nocte magnitudinē remittere, sic ut quinto die liquido planē appareret minor esse febris q̃ ante. Itaq; ad portionem minuentis se febris, urinae quoq; concoctio procellerat. Eratq; haud obscurum septimo (id quod factum

est) finiendā. Hanc igitur planē continētē ex hu-
morū putredine febrē, & quę alsi dūe decresceret,
uidimus. Multas uero alias continētes conspexi-
mus: quarum alię crescentes, alię similes tenorem
seruantes erant. Illas *παγκυανκας*, has *ακυανκας*
uel *αποτονας* Graci uocant. Alię, ceu quam modo
memorauimus, decrescentes, quas *παρὰκυανκας*
dicunt. Alię rursus in primo die putredinis notas
habuerunt, alię in tertio, aut certe ad summū quar-
tidū; aliās medicorum ipsorum inscitia, qui san-
guinē nō miserant: aliās laborantium ipsorum ti-
miditate. Siquidē eorum qui ex sola obstruktiōe
febricitarēt, nemo in putredinis febrē incidit, qui
prius sanguinē miserat, quē ubi ualida uirtus sub-
est, & ætas permittit, usq; ad animi defectū mitte-
re expedit. Vbi horum alterum non fatis respon-
det, tutius est quantum satis usum fuerit, tantum
principio detrahēre: quod defuit, iteratione sup-
plere. Etenim hoc praelidīo omisso, qui ita febricitan-
t, in summū discrimen ueniunt: nisi si eos uel ui-
rium robur, uel largum sanguinis profluuiū, uel
sudor copiosus ex manifesta perniciē eripiat. Et ta-
men nonnulli ex medicis sunt, qui tamen manifeste
siuissime uideant naturā sanguinis profluuiū non
paucos eorū qui sic periclitētur, seruare: tamē san-
guinis missionē fugiant, nullam nec experientiam
nec uerā rationē secuti. Cæterum hos mittamus,
disputato præsertim contra illos abunde inō inte-
gro libro, qui est De sanguinis missionē cōtra Eras-
mū scriptus, ipsi uero ad propositū reuertamur.

¶ Erat uero in præsentī disputatione propositū
de ijs febribus disserere, quę ex stiptis per obstru-
ctionē meatibus oriuntur, quas, si sine putredine
cōsistant, ex diariarū esse genere dixi. Sin ijs putre-
do aliqua uel ab initio statim, uel postmodū super-
ueniat, ubi in omnibus uenis, ac præcipue magnis
ea cōsistit, cōtinētes excitari febres, ubi in uni-
ca animalis parte, accessiones quæ certo ambitu
repetant. Verū de his postea. Quod autē & his ar-
bitror, & ter, & sæpius, iterumq; dicendum est: qui
ita laborant, si recte curabuntur, ijs sanguinis mis-
sio est adhibenda: quando quibus corpus ex suc-
corum abundantia inabile ad transpirationē iam
redditum tantum caloris congestis, ut inde iam fe-
bricitet, ijs tantū sanguinis est detrahendū, quan-
tum uires tolerant. Pro certo quoq; habendū, nisi
ijs qui hoc per naturam sunt habitū, ad adhibeat
prælidīum, fore ut non suffocentur, id certe synco-
pe prehēdi omnino periclitentur: nisi (ut dictum
est) eos uel uirium robur, uel plurimus sudor, uel
largum sanguinis profluuiū, à morte uindict.
Ac illud uel me tacente cōstat, ijs præsertim qui li-
brū De plenitudine studiose perlegerunt, quanq;
& nunc quoq; à me dicetur, nō esse nunc nobis de
ea abundantia sermonē quę ad uirtutē cōparatur,
(quippe quę nec sic obstruit uenarum ora, ut resir-
gationē prohibeat, nec tunicas earum distēdit,
nec ruborē, nec tumorem inuehit, multoq; minus
uel carnis uel cutis trāspirationē moratur) uerum
de ea quę cōtineri à uasis ultra nō ualet, quęq; ob
id ipsum tum perumpere uasā tum recludere so-

Galen.

A let, reliquaq; modo dicta symptomata inducit, ob-
structionē, distentionē, tumorē, ruborē: de hac in-
quam mihi omnis sermo tum habitus est, tum ue-
ro nihilominus habēdus. Siquidē copia hæc dum
bonitatem suam seruat, ut pariter augeri cum ro-
bore uirium est nata: ita si quando has grauat, nec
de cætero augebitur, & bonitatē naturæ amittet.
At si naturalem femel bonitatē amiserit, fieri ne-
quit, ut non putrescat: quandoquidem nec aliud
ullum ex ijs quę foris sunt, humidū calidūq; cor-
pus manere imputrescibile cernimus. Ergo festi-
nare ad sanguinē detrahendum oportet, quod ua-
forum natura ex transpirando uentilandoq; natu-
ralem temperiem seruās humoribus eo quo inter
initia modo dominetur: quādo si ad intemperiem
uersa laborabit, metuendum est ne hi putrescant.
B Excitatur autē intemperies in ea ex febris calore,
quem si quando rudis quispiā medicus auxit, non
uacuata stiptationis causā, in incerto reliquum om-
ne remedium est. Vbi nāq; emitti abundantia pos-
sulat, calor autem refrigerari, pugna discordiaq;
inter ipsā sanādi oritur remedia: scilicet ijs quę re-
frigerent, quamuis temperiem naturæ concilient,
saltem abundantiam intra corpus detinentibus:
quæ uero rarefacienda cute hanc educant, omni-
bus calfacientibus: sic ut si abundantiam emittere
uelis, febrem augeas: si febrem refrigerare, abun-
dantiam moreris. In hanc consilij inopiam deue-
niunt, qui statim à principio non uacuauerunt, Eras-
mū strati persuasionē inducū, qui nec spontanea san-
guinis profluuiā potuit imitari. C Optimū igitur fa-
ctu est (id quod nos semper in re quæque facere ui-
disti) statim non numero dierū, sed uel uirium ro-
bore, in febribus eius generis attentum esse: quip-
pe quod si seruati est, nō solum sexto septimose,
sed etiā sequentibus diebus sanguis est mittēdus.
Quod si curare aliquādo infirmū cogaris cui non
solum antea secāda uenæ remediū prætermissum
est, sed nūc quoq; uel per medicorū ignorantiam,
uel ipsius laborantis propinquorum uel eius timi-
datē procedente tēpore mittere sanguinē prohi-
beris: ad frigida exhibendam accedes, sed diligen-
ter ante discernens, quantum ex ea nocuentū con-
tingere possit. Nam si id aut exiguum erit, aut nul-
lū: offerēda potui est, quæ prorsus sit gelida, quan-
tum bibere ægro libet. D Quinimo magis id aude-
bis, si frigida potioni infuseris. Sin magnū time-
tur incommōdū: ab hac quidem abstinentiū, atq;
alijs auxilijs quibus obstructio eximatur, & abun-
dantia uacuatur, & febris seruo deferbeat, uten-
dum. Porro incommōda, quę frigidā potionem
intempestiue immō diceq; exhibitā sequuntur, in
his consistunt, quod lentos crassosq; humores, si-
ue hi obstruktiōes, siue putredinē, siue phlegmo-
nen, siue qualis erysipelas, aut scirrhus, aut cede-
ma est, affectū creauerint, attenuari digeriq; prohi-
bent. Ergo quoties ex his febris accēdit, atq; ad
eos uacuandos frigida data nō conducit, ad præ-
sens quidem non paruū affert leuamen, propterea
q; iam accensam febrē extinguit: uerum cum cau-
sa eius adhuc persistet, aliam denuo accendi est ne-

tom. 6

k 2

cessē

celle, atq; ea quæ præcessit, nonnunq; difficiliore, propterea quod densatum ex frigida corpus est. Atq; hæc una noxæ species est minime cõtēnenda. Altera talis est. Multæ laborātis imbecillæ particula, siue ita se ex naturali intemperie habeant, siue ex uitio adscititio, à frigida ledunt. Alij nanq; gula adeo uehementer est affecta, ut uix deglutiret. Alij uentriculus, sicut uix concoqueret. Alij ipsum uentriculi os, aut secur, aut colon, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes, aut uelica, aut tale quippiā aliud à frigida percussum, ad proprium opus infirmum est redditum. Nonnulli autem ex interpestiua immo dicaq; eius potione, non multo interposito tēpore, nec postmodū, sed slico difficultate spirādi, & cōuulsione, & tremore corripuntur: ac toto (ut semel dicam) nervoso genere lædūtur. Nec ignoro quin formidolosum te ad frigidam offendā ijs quæ memorauimus redderem, nisi ea me usum subinde uidisses, semperq; cū successu, nec agrū in ullo manifeste læsisse. Quibus cūq; enim in principe particula tumor aliquis è phlegmone, œdematos, aut scirrhi genere constitit, ijs frigidam offerre nō oportet. Sed nec ijs quibus obstructio putridus humor non cōcoctus in cōmodat. Quod si euidentes percipis absq; iam dictis tumoribus concoctionis notas, illud dumtaxat æstimabis, sit ne pars aliqua temperamento adeo frigido, ut in hanc noxam procubāt. Porro erysipelas, quod uerum erysipelas sit, non aliter sanaueris. At si mistum cum phlegmone sit, in hoc cōcoctionis expectandæ sunt notæ. Atq; hæc latius q; pro re nunc proposita, cum postmodum etiā forte necessum erit de frigida exhibēda mentionem facere. Nunc enim altera continentiū febrium ex sola obstructione est orta: altera uero etiā cum putredine per omnes uenas. Cum ergo cōcoctionis humorum in ijs notas uideris, de quibus dictum abūde in libris De crisi est, audacter frigidam dabis; quippe solidatam animalis partium natura roborata, prætenuatos iam humores aggreditur: ita ut qui utiles sint, atq; ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat, inutiles uel per uentrem uel per cutim eiciat. Quod si etiam frigida assuetus æger fuit, magna cum fiducia frigidam exhibebis: ipsa scilicet experientia iam doctus omnia uiscera eius occursum familiariter tolerare. Omnino nāq; si quod frigidum adeo esset, ut ab hac offenderet, id per sanitatis tempus euidenter offensam suam ostēdisset. Nulla uero per sanitatē particula quicquam ab hac læsa, nec etiam inter febricitandum quicquam lædatur. Vbi nanq; nonnulli a quæ frigida potioni non assueti, tamē propter ardentem febrem eam bibere coacti, nullum incommodum senserunt: multo profecto minus eorum qui assueuerunt quicquam lædi debet, cui etiam quasi promunimento maximo accedit ipsa caloris copia. Hic nanq; cum in uasorum sinibus plurimus continetur, utpote tum aërea in his subtilitas, tum etiam succis omnibus inflammatis, quantum ab frigido patitur refrigeratus, tantū rursus calfaciendo in ipsum agit. Ideoq; minus tūta ijs qui exigū san-

guinem carnemq; obtinent, frigida potio est. Celeriter nanq; ad solidas animalis peruenit partes, nulli quod eius uisum frangat occurrens. Eo etiā, si hec tica febres nec perinde eam quæ prorsus sit gelida, nec multam desideret; ceu quæ extenuatis omnino, exiguiq; sanguinis corporibus incidant. Verum de illis post agetur. Maxima uero cõtinentium febrium remedia, hæc duo sunt, detractio sanguinis, & potio frigida. Verum illa nullo non tempore, modo uires sustineant. hæc cum & in pulsu, & urinis, cōcoctionis euidentes cernuntur notæ, febris autē est maxima. Attendenda uero cum uenæ secundæ indicationibus sunt, tum quæ eā præcedant, tum uero quæ omnino excipiant. Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tēpore differre uenæ sectionē iubebis, quantum satis facere tum ad eorum concoctionē, tum ut excremēta descendant, uidebitur. Sin sequetur necessario uacuatio quæpiam, tantū illi de eo quod superfluum est relinquendum, quantum est per eam uacuandum. Itaq; si tempore mittendi sanguinis menses moueri contigerit, siue etiam hæmorrhoids sit reclusa, si inspecto fluentis impetu, ipse satis fore uidebitur qui solus, quod requiris, uacuet, naturæ uero omnem permittes: sin minus, tantum ipse detrahes, quo ex coniunctis ambobus perficiatur quod potestas. Veluti autē in his ad ipsam naturā uacuationē, quæ sensu usurpetur, nō leuiter attentū esse oportet: ita alibi uel ad naturam ipsam, uel atatē, uel cœli statum. Sunt enim nonnulli ad exhalandos digerendosq; corporis succos natura propensi. Pueri certe propter atatē perpetuo. Cœli uero status ubi calidus nimis est & siccus. Voco cœli statum ipsam ambientis nos aeris temperiem, sub qua & anni tempus, & regio cōprehēditur: quando horū quoq; utrunq; ex ambientis temperie indicationem mutatur. Propensi autē ad digerendos corporis succos sunt, quicūq; natura sunt humidis, magisq; si accedat caliditas. Præterea qui raro corporis sunt textu. Ad hæc, quibus os uentris aut amara bili abundat, aut imbecillum est, aut supra modū sensile. Atq; hæc quidē indicatiōes sunt, quæ sanguinē detrahendū dehortant. Contra potestulant, unā cum affectu cuius causā primū requirebat, habitus durus, densusq; & uno uerbo qui haud facile digeritur: tum ambiens humidus frigidusq;. Sanē merito quædam sanguinē mittendum adhortant, quædā dehortant. Si quidē ea pro uacuatione omnino suscipiuntur. At eorū quæ comprehensa sunt, quædā transpirationes morant, quædam promouent, & quædā ad uacuandum prompta sunt, quædam secus. Sanē transpirationem corporum prohibent, tum meatuū stipatio, tum circumdantis nos aeris humiditas & frigiditas. Contra promouent ea quæ his sunt cōtraria. Eorū autē quæ uacuant, quæ calida humidaq; ac tenuia sunt, ea celerrime digeruntur. Contra quæ crassa, glutinosa & frigida sunt, ægre transpirāt. Atq; hæc quidem ad rem propositam de missione sanguinis, ac frigida aque potione, nō ignorasse expedit. Quærum utranq; metuentes non paucos medicos uidi-

disti, utiq; imperitos. Quorum alteros *deuopqobus*, id est, sanguinis mittendi timidos; alteros *Lyxopqobus*, id est, frigidae exhibendae formidantes, sic graece nominamus: sicut qui a rabido cane sunt morsu, *Lyxopqobus*. Sunt enim proculdubio horū quoq; aliqui praedogmatis sui studio, non leui in rabie. Ergo relicti his, quod initio institutum nobis fuerat, prosequamur: ad memoriā reuocantes, quem admodum sermo noster occasione communium quorundam in ipsis accidētum, a diarijs uenit ad continuatas. Quoniam enim obstructionis affectus, cum & ipsa exilis est, & rite curatur, diariam febrem efficit: cum uero uel propter magnitudinem, uel medicis incitiam, confuetum diarium tempus excessit, aut continentem, aut aliquam earum quae certo ambitu repetunt; merito nos de ea quae diarijs cognata est, continenti febre disputatio exceptit: propter has uero protinus & de hac quae cum putredine humorū erat. Visumq; satius est uel caritatis, uel exercendi legētis causa, uisus ægroti in utroq; febrili genere mentionē facere.

6 Igitur quoniam haec nobis peracta sunt, ac per ea demonstratum euidenter est (id quod in praecedenti hunc libro ad calcē est dictū) oportere in alijs febribus quae amplius diariae non sunt, nō modo ab ijs rebus quae in illo praecipiantur, faciendum indicationes peti, sed etiam ab ea causa quae febrem excitet, ac laborantis uiribus, ad uniuersalem denuo exercitationem reuertamur; pro comperto habentes non licere ullius artis scientiā nancisci, nisi & methodum quandam habueris per uniuersalia uocata theoremata, & in particularibus te exemplis exercueris: cum neq; fieri possit, ut sine multiplici in agris singulamentum exercitatione, quod ex usu sit facias, nec sine uniuersalium cognitione probe exercitatio procedat: quippe cū in uniuersalibus methodus, in particularibus exercitatio consistat. Tanq; igitur qui iter aliquod ingreditur, utroq; inuicem utuntur crure: qui altero claudus est, uno duntaxat utitur, & longo spatio, & saepe errans, uiam peragit: ita sanē & qui sine cuiuslibet artis cōsequei parat, duobus his ueluti curis, uel instrumentis, uel quomodo docuq; appellasse libet, uti debet in uniuersalibus theorematibus, methodo; in particularibus, exercitatioe.

7 Reuersi igitur ad methodum, nūc age de ægrotantis agamus uiribus, conferant ne ad curationē haec quippiā, an planē nihil, ceu nonnullis est uisum. Videtur tamen eorum qui inutilem uirtutem esse ad curationem inueniendam dicunt, non propria operū artis disceptatio esse, sed logica potius, ac sophistarum. Asumt enim ab eo quem curamus affectu, faciendorum indicationem praestari, haudquaquā a uiribus. Ergo & anni tempus, & regionem, & statum celi, & aetatem, & consuetudinem, & corporum temperies inutiles esse eadem scilicet ratione dicunt. Postea cum mutare curationē propter haec coguntur, immemores eorum quae inter initia dixerant, quaedam eorum contraria aliquādo indicare aiunt ijs ad quae curantis consilium dirigitur; quaedam ad praesidiorū materias

Galen.

A esse utilia, quemadmodū & animalis partes. Etenim in illis quoq; eadem utuntur strophae; in principio sermonis inutiles eas esse ad curationis inuentionē asserētes: post ubi redarguuntur, ad curationis quidem indicationē inutiles dicētes, ad materię tamen mutationem, uel inuentionem, uel differentiam, uel qualitatem (nam nec nominant eodem omnes modo) necessarias esse fatentes. Itaq; quod modo dixi, nunc quoq; repetam: nempe q; egressi ex eo quod in arte est utile, in logicam disceptationem ueniunt. Est namq; artis utilitas, auxilia quibus æger sanetur, inuenire, quo illi relicto, de nominibus litigant *quidē dē dē & dē rē uel dē dē dē* (quasi indicationes, & indicationū contradictiones dicas) item cōmunitates, & scopos, & auxiliorum materias, aliq; similia loquentes: scilicet hac nominum diuerlitate purgasse se, pro ijs quae falso affirmauerant, arbitantes. Ego uero minime ueto nominibus quibus libitum sit uti. Meminisse tamen eos uelim eorum quae ab initio proposuerunt. Ea sunt auxiliorum inuentiones. Ad quas quicquid conducere quomodolibet uidebitur, id fatendum est ad curationē esse necessariū. Sic igitur & uirtus necessaria ne consideratu in ægris a medico sit, an non, indagemus. Ego enim saepe maxime esse necessariā aio: sic ut quae circa ægrū administrantur, omnia ferme eius uirtutis causa fiant: aliquidando mediocriter necessariam, sic ut aliquid ex hac quoq; ad ea quae facienda sunt, consilij petatur, non tamen praecipua faciendorum ratio huc omnis referatur. Possum rursus ostendere tibi, uirtutem adeo exiguum ad inueniendam remēdā conferre, ut propter exilitatem etiam lateat. Alias uero praetermitti, ac silentio praeteriri, quasi prorsus ex utiliter considerandis non sit. Verum quod accidit in uirtute, id in reliquis omnib. quae aliquid faciendū indicant, usu uenit. Nam aliquando aliud eorū alio minus aut plus ualeat. Aliquando adeo est ualens, ut solum indicare uideatur: aut ita imbecillum, ut omittatur.

8 Hec igitur dum doceo, adsis animo uelim, illud habens in memoria, quod nec in alijs ullis curatione, quae per methodū agitur, consistit; nec alius ante nos quisquā omnia ea ordine definiuit: quam etiam ab Hippocrate uia est inuenta. Haec enim ipsa quae ego nunc enarraturus sum, ille curationem indicare primus omnium scripsit: uerū, ceu primus inuentor, nec debitum omnibus ordinē dedit, nec cuiusq; indicationis dignitatē ad unguem finiuit, & quasdam in ipsis discretionēs omisit, obscureq; plurima pro antiqua dicendi breuitate est interpretatus. Præterea de cōplicatis affectibus paucissima omnino precepit. Ac, ut breuiter dicā, omnē ad medicationē uia aperuisse mihi uidetur, sed ita tamen, ut ea curā diligentiamq; ad absolutionem desideret. Veluti nunc quoq; uideamus quasdam ueterum in terris uiarū, quibus pars quæpiam est uel lutosā, uel lapidibus sensibus impedita, uel moleste ardua, uel periculose prona, uel feris obfessa, uel propter magnitudinē fluminum inuia, uel longa, uel aspera. Itaq; cum sic se

tom. 6 k 3 haberent

haberent omnes in Italia uisae, eas Traianus ille refecit, quae quidē earū humidā ac lutosa partes erant, lapidibus sternens, aut editis aggestionibus exaltans: quae senticosae & asperae erant, eas expurgans; ac flumina quae transiri nō possent, pontibus iungens: ubi longior quā opus erat uia uidebatur, aliam breuiorē excindens: sicuti uero propter arduum collem difficilis erat, per mitiora loca deflectens: iam si obsessa feris, uel deserta erat, ab illa transiens, ac per habitata ducens, tum asperas complanans. Itaque mirari nemo debet, si cum uiam rationem quē medendi ab Hippocrate inuentam esse sim testis, ipse tamē hoc opus scribere sum aggressus. Neque enim ceu ea planē nō esset inuenta, sed ueluti quae proxime diximus desideret, ad hęc cōscribenda uenimus: nemine priorū qui eam methodū abfoluerit, ante me inuento: quādo alij omnino eam nō nouerant: alij cū nollent, nō potuerūt tamē quod defuit adijcere. Nō decrant qui incognitā esse umbram inducunt, ac profus ē medio sublataui uoluerūt. nō uero qui fuerint, in sermonis pgressu diceat.

9 Nunc quod promissi, aggrediar, omnesque deinceps medicandi indicationes exponā. Utile autem ad claritatem eorum principium sumetur ex reuocatis ad memoriā ijs quae in proximo libro differuimus, cum de diarijs ageretur. Videbatur enim in illis prima, ac (ut sic dicam) maxime praecipua faciendorum indicatio esse, quae affectum aegrotantis amouendū suadet: aequē ut in sanis prima esse quae statum eorum seruandum monet. Verum hic sicut per similia seruatur, ita per contraria perimitur. Conferre praeterea ad auxiliorū inuentionem diximus, tum ipsam corporis temperiem unā cum cōsuetudine, tum regionē, tum anni tempus, tum coeli statum. In quibus uero morbis egregius aliquis in una parte animalis affectus subsisteret, ueluti ex aduersione in capite, a parte quoque ipsa aliquam faciendorum indicationē sumi. De uiribus tamen, uel causa quae affectum creet, in eo libro nihil est dictum, propterea quod nec uires in diarijs febribus egregiam ullam prouidentiam requirant, utpote quae omnino ualidae sint: nec affectus ullus in uera diaria subsit, qui eam uel gignat, uel augeat. Nam utroque modo loqui licet.

10 Verum nunc prius de uiribus praecipiam, deinde ad causas quae febrem excitant, accedam. Gubernat animal (ut in libro De Hippocratis & Platonis dogmatis est monstratū) tres diuersi inter se generis facultates, toti corpori ex suo quodā ueluti fonte quaeque distributa, eas Plato animas uocat, propriam cuiusque substantiam inueniens. Est enim earum quaedam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus cōmunis, quae secur ueluti pro fonte habet: canales uero ab hoc in totū corpus sparsos, ipsas uenas. Hanc seu appetitricē, seu naturalem, seu altricem uoces, nihil interest: ueluti nec si animam, aut facultatē. Altera est quae non modo ut stirpibus, aut uita praeditis, sed etiam ut animalibus anima est insita. Hanc sedem in corde habet, ipso quoque insiti caloris quodam ceu fonte. Ab hoc fonte canales arteriae sunt. Vocaturque haec

A multis sanē nominibus. Nam & facultas siue uirtus uitalis, & facultas siue uirtus animosa, & anima animosa ac uitalis dicitur. Tertia animatrix in cerebro domicilium habet. Ea uoluntarijs actionibus unā cum sensibus praesidet. Vitur & haec particulis quibusdā ceu canalibus, nempe ipsis nervis: sensum motumque per hos in totum animal transmittens. Ergo has facultates seruare, nihil planē est aliud quam uitā seruare. Siquidem monstratū est, qualibet earum amissa, necesse est reliquas quoque unā perire. Ac propterea in opere De sanitate tuenda, huc omne consilium direximus. In hoc uero quod est De methodo medendi, primū propositū & ei quod in opere De sanitate tuenda proponitur, ad portionē respondens, morbi est sublatio: quando cuiusmodi in illo sanitatis est uitio, eiusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorū utriusque unum est commune, ipsa scilicet uita custodia. Quae nimirum in illo De sanitate tuenda opere, sanitatis custodiam sequebatur. Quod enim secundae ualitudinis tuendae gratia geritur, idem statim & uitā tuetur. At in hoc opere aliter se habet, propterea quod quae affectiones praeter naturam in nobis discutiunt, ea non omnino uitam custodiant. Quippe aliqua eiusmodi praedita sunt facultate, ut si immoderate aut intempestiue utare, uitam adimant. Siquidē in sanguinis missione (quā usque ad animi defectum faciendam esse paulo ante diximus, quod flamma in cōtinentibus ex meatuum clausura febribus extingueretur) non paruum merito subsequetur incōmodum, nisi oportuno tempore, aut debita mēsurā fiat. Duos namque in ipsis medicorum manibus perire uidē, qui postquam animo linquerentur, nunquam reuixerunt. Multi uero etsi non protinus, at postea propter uirtutis infirmitatem perierunt. Quos si quis citra eius resolutionem uacuasset, minime perissent. Quinetiam aliqui in morbos inciderunt longos postquam immodica inanitione resoluta naturalis uis fuit. Alijs, cum immodicā uacuationis noxam sarcire non potuissent, in omne reliquum uitae tempus totius corporis temperamentum reditum est frigidius. Ex qua refrigeratione facile ex quaui occasione laesi, alij decolorati, ac malo corporis habitu uixerunt: alij ex eo ipso in morbos deciderūt exitiales, aquam intercutem, & orthopnoeam, & icinoris ac uentriculi imbecillitatem, & apoplexiam, & deliria. Ergo cum uirtus tantopere necessaria sit, eam autem laedant omnia uacuantia remedia, si quis scilicet ijs parum modestate utatur: utique aduersa inter se faciendorū indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus quod expugnetur, notabilem uacuationē desiderat: uirtus autem hanc ferre non ualet. Verum cum saepe ex uacuatione uirtus nihil laedatur, hinc sumitur inconsideratis & temerarijs medicis occasio ut eam praeterrmittant, ceu nūquam quicquid indicet. Falluntur autem (ut dictum est) propterea quod non intelligunt alterius cuiusdam rei causa uirtutē esse spectandā, nec quicquid ad affectū amouendum indicare. Quemadmodū igitur in ijs qui

ualent, semper ea comitatur, quæ sanitatis gratia administrantur, nec est quicquam inuenire quod sanitatem tueatur, quod idem vires corrumpat: sic in ægotantibus aliquando ijs succedit, quæ uelut in perniciem morbi administrantur: aliquando ab ipsis soluitur. Si namq; abundantia paulo uiribus superior fuerit, utiq; ex moderata uacuatione adeo nullum accedit uitibus incommodum, ut etiâ maximum comparatur comodum, quod eas premebat sublato. Sin quò affectus sanetur, multa uacuatione est opus, resoluatur autem ex tâta inanitione uirtus, non modo rursus homini non proderit, sed etiam maximum illi periculum afferet. Porro in ijs continentibus febrilibus, quæ ex stipitatione meatuum acceduntur, quoniâ ualida plerumq; uirtus est, citra periculum uacuatîo adhibetur. In alijs uero morbis maxime est periculosa, uelut si ea forte incidit in corruptela humorum. De qua tempestiuum est mentionem facere: quod omnes mittendi sanguinis indicationes in hoc libro dedimus. Ergo quod corruptum est, id alienum à natura est. quod tale est, id se auferendum dicat. Si igitur cum uiribus imbecillis corruptela incidit, utiq; quod affectus remedium est, id cum uirtutis custodia pugnat. Si quidem affectus uacuandum esse præcipit, idq; uel uena incisa, uel purgatione. Harum autem neutram ferent imbecille vires. Quoniam igitur in omnibus eiusmodi repugnantibus in certa succurrêd ratio est, aliâs insanabilis omnino affectus relinquet, aliâs spatio, & ægre, idq; si magnum nactus sit medicum, sanari poterit. Oportet namque ubi indicationes ita sibi aduersant, et paulatim quod uitiolosum est uacuare, & paulatim inuicè quod salubre est pro eo rationere. Vocat medici eiusmodi uitioli succi curacionem *græce ἐνὶ πύλω*.

11 Memineris uero mihi ad ea quæ dicenda sunt, etiâ quorum causa uenæ sectio petitur. Nam quoniâ hæc sanguinis uacuandi causa adhibetur, sanguis autè utilis naturæ est: utiq; probe hanc ad ministrari cōueniet, sic ut quod inutile naturæ sit, emittat. Fit autè sanguis naturæ inutilis bifariam, uel cum propriâ qualitatè ad unguè nō seruat, nec amplius nutrire sicut prius, cum utilis esset potest: uel ita multitudine creuit, ut aut vires premar aut tum uenas, tum arterias, uel distendat, uel findat, uel obstruat. Ac in his quidem misis sanguinis utilis est, ceu uacuantium præsidiorum una: in alijs, ceu quod humorum uehementiorem impetum ad diuersam partem reuocet, uel ad latera deriuat. Postulat autè semper ualentes vires, quæ modo uacuationis eius respondeant. Ad hæc igitur respicientes sanguinè detrahimus, aliâs semel, aliâs bis, uel ter, uel sæpius, ueluti in sequentibus patebit. In præsentia uero illud manifestum fecimus, uirtutum uacuantiâ remedia aliquândo citra noxam ferre: utpote nec adiutam ab his quicquâ quod sit æstimandū, nec uero lafam. Sæpe uero magis minus ue, tum iuuari, tum lædi. Præterea, quoties notabilis illi ex uacuantibus auxilijs noxa incidet, toties patere ipsam quoq; tunc utile aliquid ad considerandum indicare, æque utiq; ut cum manifeste

ste iuuabitur. Vbi uero ex ijs quæ affectum summo uent, nec comodum illi accedit ullum, nec incommodum: ibi uelut inutilis præternittitur.

12 Porro una semper est quæ ab hac præstat cōferentis indicatio, ueluti etiâ reliquorum omnium. Nā quicquid pro natura sua indicat, id unum semper indicabit, ceu quod unam habeat naturam. Atq; id unum, si quod indicationem facit, simplex est, ipsum quoq; simplex erit. Sin illud est compositum, hoc quoq; erit compositum. Sanè quædā sui custodiā indicat, quedam amotionē. Siue autè hæc indicet, siue illa: quod simplex est, simplicè quoq; indicationem habet: quod non simplex, etiam non simplicem. Idcirco in superioribus semper simplicem intemperiem simplicè indicationem præbere diximus, ueluti in frigiditate caliditatem. Nō simplicem uero, etiam indicationem suggerere non simplicem. Calidam enim siccamq; intemperiem curacionem sui per ea quæ humectent & refrigerent, moliendā indicare. Ergo uires quoq; unam rem semper indicabunt: utiq; sui custodiām.

13 Quibus ergo (roget quis) rationibus seruabitur. Nempe potissima ratione ex eo quod de substantia earum uel inanitum, uel alteratū est, corrigendo. Secundo loco ex prohibēdis ijs quæ ipsarū substantiam uacuare alterareue possunt. Comprehensa uero inter ea quæ alterant, breuitatis causa sint, & quæ earum unitatē distrahunt. Hæc itaq; cum vires perpetuo indident, in ualentibus (sicut dictum est) consensus agendorū omnium ad ipsarum perennitatem est: in ægotantibus autem non semper. Quo tempore æstimari debet, quod uel magnitudine, uel dignitate (ut prius est dictum) præualeat. Maxima igitur dignitas ipsarum est uirium, quādo uiuere ipsum nobis ex harum custodia constat, utpote cum uitam aut ipsas esse vires, aut earū actiones sit necesse. At uita ipsa nihil esse prius in animantis corpore potest, propterea quod nec sanos esse citra uitā licet. Virtus ergo omnium prima custodienda hominibus est: seruabitur autem si nec eius substantia inanitur, nec tanta altera ratione alteretur, ut ea corruptioni sit propinqua. Atq; huius custodia pars est, ubi uel temperiem ipsam præsentem seruamus, uel absentem inducimus. A uirium indicatione proxima est, quæ ab affectibus, quos curare proponimus, datur: postea deinceps reliqua. Quicquid igitur indicationi, quam vires præbent, aduersatur, id secundū est loci, ac posterioris ijs quæ illæ præcipiunt. Quæ uero cum ijs quæ uiribus cōducunt, in idem competunt: hæc utrunq; calculum referunt, & eorum quæ primæ (ut ita dixerim) sint notæ, & eorum quæ secundæ. Itaq; hæc citra controuersiam sunt faciendā. Quæ uero aduersantur, aliquando ad ministranda prius non sunt, aliquando paulatim. Quippe si quem curare studes affectum, is uacuationem requirit, vires autem extrema imbecillitate laborant, toto illo tempore quo vires reficimus eorum quæ affectum sanent, nihil planè ægotanti exhibebimus. Vbi uero eò roboris peruenisse eas cōiicimus, ut nihil aut parum ex uacuandis sint

lædendæ, tum est ad affectus quoq; curationē accedendum. Prima igitur omnium indicatio est, quæ à uirtute sumitur. Verum non sic prima, ut quæ curationem doceat: cum ex numero curatricum indicationum non sit; uerum (ut ita dixerim) uitalium, [siue quæ ad uitæ custodiam pertinent.] Nā neq; ut ualeamus, nec ut à morbis liberemur, ab ea quicquam primum desumimus: sed ut uiuamus. Additum autem in sermone est illud, primum, quod ex accidente aliquando uirtutis roboratio ad affectus curationem conducit. Verum id in sequentibus docebimus.

14. Nunc ad pensum rursus redeamus, in paucas summas compendij causa rem omnem cogentes. Medicatoriarum indicationes à morbo ipso sumuntur, à corporis temperamento, & tertio ambiente nos aere. Quod si aliæ quædam antea sunt positæ, uel postea non hæc modo, uerum etiam alię dicuntur, omnes tamē ex ijs in partes diductis naturæ uidebuntur. Si quidem corporis temperies quæ illo tempore fuit, quo ægrotare id cœpit, quæq; ad inueniēda remedia est utilis: ex natura, ætate, consuetudine, & ambiēte nos aere ortum habet. Ambies uero ipse eiusmodi est redditus propter tum regionem ipsam, tum anni tempus, tum cœli statum. Ergo cum unum sit eorum utrumq; ex pluribus tamen tale efficitur. Affectus uero hauquaq; in causas diduci est aptus, sed in differentias. Nam aut in similaribus consistit partibus, aut in instrumentarijs. Ac in similaribus quidem, uel simplex est intemperies, uel composita. In instrumentarijs circa simplicium partium, uel posituram, uel formam, uel numerum, uel magnitudinem, tum quæ horum singillatim traditæ sunt differentia, consistit. Hæc itaq; tria illa prima sunt, quæ curationem indicant: nempe ambiens ipse cum geminis corporis, siue affectionibus, siue constitutionibus libitum est appellasse: una naturali, altera quæ præter naturam sit, quæ sanæ morbus est. Nō posse autem plura esse genera indicationum, quæ ad medendum pertineāt, quàm tria quæ modo diximus, ex ipsa rerum substantia scire licet. Nam morbus & sanitas, corporis sunt affectus; ille se tollendū, hæc se tuendam indicās. Ambiens uero is est, sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest. Hic igitur causæ sine qua non, obtinet rationem. At uero cum id quod ægrotat alteramus, nisi constat quousq; sit mutandum, utiq; quando sit ab alterando desistendum, non intelligemus. Generatim igitur in omni curatione agendorum indicationes in his ad summum tribus consistunt. Membratim uero (ut supra est comprehensum, aliquæ simplicium particularum sunt propriæ, aliquæ compositarū. Eorum ergo quæ in simplices incidūt partes, unū est intemperies ea quæ in calido consistit. Hæc cū in totū diffusa corpus est, febris nominatur, ideoq; omnis febris quæ febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola hæc sit, ad refrigerandum humectandumq; omne medentis consilium ueluti ad finem dirigitur: ita ut nihil sit quod præterea ad curationē desideret, nisi ut materiæ inue-

niantur, quæ huic proposito sunt idoneæ; materia uero inuēta, ut opportunitū tempus ex quatuor febribus temporibus captes: quantitatē uero, ex cōferendo cum naturali habitu morbū. Quippe quantū is à naturali habitu recessit, tantū opus est ægrū refrigeres & humectes. Sanē ambiens si contrarij morbo tēperie habet, ē præsidiorū numero unus est: sin similē, ægritudinaliū causarū est unus. Quoniam aut reliquas materias, tum deligere, tum fugere licet, quam aut ambiēs præstat, fugere non licet, imò necesse est præsentī cœlī statū uti, idcirco huic quoq; attentī esse cogimur: qui utiq; sape cū ijs quæ morbus faciēda suadet, (ut diximus) est cōcōrs, sape discōrs, & qui cōtra moliat. Habitat ergo (ut diximus) ambiens rationē modo materiæ sanantis, modo causæ morbū fouentis. Quippe cum humectari refrigerariq; morbus postulat: si hæc præstat, sanitatis materiæ rationem obtinet. Sin calefaciat & siccet, morificis causis est annumerandus. Vbi igitur cū medendī indicationibus cōsonat, pro gratia est habendū. Sicubi aduersat, inhibēda eius noxa est: scilicet reliquorū auxiliorum humiditate, ac frigore intensis adauctisq;. Sedulo igitur agendū est, ut ambientem, quoad fieri potest, qualē esse expedit, præparet: scilicet humidiōres frigidioresq; domos, tum deligens, tum uero præparās: sicut ē diuerso si frigida sit humiditas morbi species, quæ calfieri siccariq; postulat: & eligēda, & præparēda domus sunt, quæ calfaciat, & exiccet. At deligendas quidē dico, quæ ex se ipsis eiusmodi sunt. Præparādas uero, cū arte nostra molimur per æstatē subterraneas eas, & adfēptentriones uersas, ac pauimentis earū assidue humore aspergētes: tum ut ex euripo aliquo aura inspirēt, machinantes. Flores præterea, ac germina, quæ frigida, humideq; facultatis sint, per aerē proijcientes: per hyemē uero cōtraria horū molientes, præsertim ubi morbus (ut prædictū est) suadet ubi non suadet, excessus tantum utriusq; temporis remittentes. De quo mihi aliquid necessariō postea est dicendum. Nunc auxiliorum materias indicare non decreuimus, sed methodos docere.

15. Quare rursus ad has dispositiones reuocemus, doceamus quæquāmodū & pauca & multæ pro diuersa sectione curatoriarum indicationes sint: quando & tres uniuersas (ut proxime docuimus) facias licet, in pauca capita tota summa reducta: et qualibet earū rursus diuisa, ex ipsis multa efficere. Id quod etiā iam monstratū est. Quin & ipsarū sectionū quālibet rursus diducas in membra licet, donec ad insectile uenias. Iā primas q; illas tres, quas memorauimus, fieri potest ut redigas ad pauciores, sic ut duo eorū quæ curationē indicēt, omnino capita sint: nempe præsens affectus, quē morbum nominamus: & qui prius fuit, quem sanitatem & naturalem habitum diximus. Neque enim aliud est ipsa sanatio, quàm præsentis in corpore uitiosi affectus in naturalem habitū mutatio. Cum autem contrarij hi affectus sint, necesse est per cōtraria fiat eorum alterius in alterū translatio. Atq; ita rursus una sola erit curationum maxime generalis

neralis indicatio, nempe contrarietas. Ergo hinc rursus sumpto initio, age particulares indicationes disquiramus. Quoniam id quod ægrotat, ei quod ualet, est contrarium: utiq; per contraria est ab illo in hoc uia. At quomodo (inquies) in contrariis inuenitur modus? Nō enim satis est calido affectui admodum frigida, nisi id debita fiat mensura: cum aliqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quippiā relinquatur: sin modum excedas, contrarium genus morbi inducas. Qui enim supra quam par est, calidum morbum refrigeratis sanitatis mediocritate transmissa, alium excitabit morbum, qui sit frigidus. Quod quō minus accidat, naturam curandi corporis scias oportet: quō quantum morbus ab illius symmetria discesserit intelligens, mensuram refrigeranti præsidio imponas. At fieri non potest, ut quantum à se inuicem distent inuenias, nisi compertū habeas quā esset corpus, aut humidum, aut frigidum, aut calidum, aut siccum cum ualeret, quantumq; ex his excesserit postquam ægrotauit. Quippe quod plurimum a naturali habitu recessit, id uehementibus eget contrariis: quod non plurimum, leuibus. Sanē plurimum recessit frigidus morbus à corpore natura calido ita ut ē diuerso calidus à frigido. Minus recessit tum calidum à calido, tum frigidum à frigido. Quare ex utrisq; indicatio curationis præstatur. Verum cum materiæ reliquorū præsidiorum omnium electio in nostra potestate sit, eius uero quam ambiens præstat, in nostra manu non sit, ratio est ex hoc quoq; propriam quādam indicationem sumamus. Cæterum, quoniam nosci ad unguem oportet corporum temperamēta, id uero est planē difficile: utiq; tentandum est, tum ex ijs, quæ in libro De temperamētis sunt scripta, ea inuenire: tum uero ultra hæc, quō magis scientifica notitia sit, ex ætate, & tota antea cta uita, quæ nimium in uita exercitio, & uictus ratione consistit: præterea, in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc statu cœli, conuersatione. Si namq; natura gracilis, & tangenti calidus, & biliosus, & propensus ad irā, & hirtus sit: calidus hic siccusq; natura est. Non tamen necesse est, nunc quoq; cum ægrotare incipit, eundem planē habere affectum. Fieri enim potest, ut in delidia uixerit, idq; cum frigidis humidisq; portione & cibis; ad hæc etiam cum balneis post cibos, & multo somno: præterea in regio ne humida & frigida, & hyeme in qua frigidus & humidus exuperabat cœli status. Rursus fieri potest ut horum præcesserint contraria, id est calfacientia & siccantia: idq; per singula dictorū iam generum. Ergo si quo ad præsens temperamētum noscendū deficiamus, id ex præuentibus ipsius supplebimus. Ex illo uero inuento, administrandorum indicatio suppediabitur.

16 Ad dictum quidem prius est ubi de frigida exhibenda præcepimus, illud quoq; ex ijs unū esse, quæ consideranda tum essent, nunquid particula quæpiam cui frigida natura esset, ledi magnō pere ex eius portione posset. An igitur fas est in ægrotante homine cuiusq; particule temperamen-

tum inuenisse absq; ijs notis, quas in libris de ipsis retulimus? Atq; illi quidem nec inquirunt, nec norunt, sed iuxta prouerbii, uno calapodio omnes calceant. Nos certe (quibus inquirendi cura fuit) illud inuenimus, qd per plures ac cognitū difficiles notas cuiusq; membrī temperamētum coniectura potius qd scientia inueniatur. Si igitur notis multis & paruis aliqua certior apparuerit, nōne abiectis illis hanc pro omnibus arripimus? nemo id, arbitror, qui mentis est compos, negabit. Atqui si omnes temperamētorū notas in unum colligas, hæc longissime absunt, ut parem ei quā consuetudo præstat, fidem faciant. Si enim antea per sanitatem quispiam frigidam perpetuo hiberit, ne utquam nec in iocinore, nec uelica, nec uentriculo, nec alio quopiam talium offensum, planum est & ualida illi esse hæc omnia, nec nunc à frigida ledēda. Non est igitur qd parū quiddā, atq; ad spectandū leue ad inuentionē remediōrū consuetudinē existimemus, ueluti nec ad sanitatem tuendā. Nemo enim adeo est stupidus, ut magnopere ex frigide portione læsus, hanc in diutinum usum duxisse uelit: propterea qd læsus interim, atq; ab ea euidenter ægrotans, omnino abstinebit. Ergo sicut alia non pauca quidam medici præter cōmunes sensus, ita illud quoq; effuderunt, qd nulla nec salubris inueniendū uictus, nec ægrotū curationis, ex consuetudine fumatur occasio. Videtur enim nō sicut alia quædā exigua leuēmiq; sed maximā, ac maxime principālē uim habere: ut quæ singulorū corporū naturā ostendat. Sanē ipsi uia ratione qd ab ea procedentes fatemur nos partiū affectū inuenire, deinde ex illo rursus ad faciendōrū indicationem uenire. Empiricus uero præterire se naturæ inquisitionem proficitur: quippe quod per eā cōsecutus fuisset, id iam se habere: intelligere scilicet se, nō ledi à frigide portione ægrotātis corpus: id uero esse quod nobis ab initio proponatur, nō ut naturam noscamus. Post (arbitror) nos quidem ueluti ambages frustra secutos merito taxet, eos uero qui iniorum inuilem esse consuetudinē dicunt, ueluti cōmuni sensu alienos iuste accuset. Quid igitur, inquires, eis respondēbimus nos qui methodo artem cōdimus? Nempe quid aliud qd qd uera dicunt de ijs cōsuetudinibus, quæ adeo euidentē utilitatem offensam ue ostendunt, quippe quas nemo uel ante methodū non nouit. At reliquarū quasdā, quæ scilicet paulatim magnū cōtrahunt in cōmodum, nō aequale licet per experientia inuenire. Dictū autē fusiū de eiusmodi cōsuetudinibus est in libris De sanitatē tuēda. Vnde si in frigida quoq; exhibitione cōsuetudo citra methodum satisfacit: nec nos profecto experientia fugimus: imō omnē quā illi utilitatem ab ea capientes, etiā extrinsecus præter hanc adiicimus, (qui saltem id possumus), eam quæ ad rerum naturā suggeritur indicationē. In hoc uero libro methodi rationē sequētes, fatemur longiore uia idem inuenire, quod breuius inuenire ei tra rationationē liceret. Siquidem cum sæpe iam uidimus non paucos ex ijs qui febribus ardentibus premerentur, cum iam mediocriter concocti humo

humores essent, statim ex frigida potione febre liberatos, quauis ei potioni parum assueti fuissent: multo (arbitror) magis in ijs qui assueuerunt, utilitatem fore citra noxam ullam sperabimus.

17 Habes itaque nunc etiam de consuetudine rationem et si ex incidenti oblatam, tamen satis de finitam. Est enim ea quoque unum quiddam eorum quae curationis ratione per corporis aegroti naturam intercedentem indicent, quemadmodum & aetas. Siquidem ipsa quoque temperamenti interuentu indicationem praestat, ueluti puerorum: quae cum humidam & calidam temperiem habeat, facile digerit. Adhuc enim animo uelim ad ea quae de corporum diuersitate hoc loco dicam. Lapidum substantia constans stabilisque propter siccitatem & frigus est. Ad eundem modum aeris & ferri, & aurum, & uno uerbo omnium, quae ex terra sunt corporum. At quae humida calidaque sunt, eorum substantia celerime in ambientem dissipatur, alias in halitum sensibilē soluta, alias in perspirationes quae uisum fugiant, sed ratione deprehendantur. Atque haec corporum natura ueluti ex diametro, (ut Gregorius loquuntur) id est longissimo intervallo a se distant. Reliquarum omnium illae quae frigidae ac siccae proxime accedunt: aegre quidem per halitum digeriri possunt, minus tamen aegre quam ferrum, & lapis, & adamas. At quae calidae & humidae sunt uiscinae: haec promptius quidem digeruntur, atque exhalant: ceterum, minus haec quoque aqua calfacta. Nam citra calorem non potest in halitum digeriri corpus ullum, substantia eius coacta densataque manente: sed nec per calorem omne, imò quod habile est in halitum resolutum: tale porro est quod humidum est. Ergo puerorum substantia omnium facillime digeritur, ac dissipatur, propterea quod est omnium humidissima: nulla uero frigidior. Quo minus uacuantis praesidiū eget, cum habeat ex se ipsa unde naturaliter uacuetur. Fit autem profecto & propter calidam siccamque regionem, & tempus aestiuium, & statum coeli impense calidum & siccum, notabilis per cutim uacuatio. Itaque etiam huius causa ijs qui sanguinis detrahendi egent, aut prorsus uenam non secabimus, aut parum detrahemus. Sanè erit in hac quoque detractioe multi scopi a medico spectandi, natura ab initio, consuetudo, aetas, locus habitationis, anni tempus, coeli status. Ad haec, aegritudinalis quem curamus affectus, aliaque ratio ante hunc laborantis uires. Cum uero affectus

ARGUMENTVM

Caput 1. Quod tria praecipua sint, quae in febribus praecipue hec uti agendorum indicationem nobis praebant: una, febris ipsa: altera, effectrix causa: tertia, uis ipsa naturalis. Haec tria inter se conferas: & si eadem remedia desiderent, ea adhibeto: sin contraria, & indicationes pugnent (ut cum ea quae causam adimerent, febrem exasperarent, & contra) unam de tribus praeferas, quae sit ualentior, reliquis interim non neglectis. 2. Re petit transiunt diariarum febrium in putridas ob medicorum imperitiam. Deinde obstructionum modos, quibus diaria gignitur, recense: simul cum his expones, ubi uirium imbecillitas uacuationum auxilia prohibeat aut admittat. Contra diatriarios. Indicatio à ui-

numeroli sint, cuiusque eorum sua est curationis indicatio. Quippe a calido indicatio est refrigerandi: à frigido calefaciendi, ac à reliquorum quolibet contrarium applicandi. Quare cum octo intemperamenta sint, octo etiam erunt morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulares indicationes. Ultraque has una eius affectus, qui etiam instrumentalium est communis, cuius nullum apud priores nomen fuit. Sed nos qui eum interpretari sumus coacti, continui solutionem appellauimus, ostendimusque communem curationis indicationem hic quoque esse unionem. At uero quae ex hoc rursum in partes diuisione particulares consistant, haec quatuor uoluminibus sunt prodite, nempe tertio, quarto, quinto, & sexto huius operis. At nunc quidem institutum De intemperamentis sermone, etiam in sequentibus libris persequar. Hoc absolute, ad instrumentalium partium morbos conuertar: ostendamque secundum eandem methodum in ijs quoque tum primas omnium curationis indicationes (quas utique generalissimas appelles licet) tum quae ex harum sectione nascuntur, deinde rursum quae ex illis oriuntur, donec ad eas quae ultra sectionem non admittant, peruenero. Hanc etenim omnis constituenda artis methodum Plato nos docuit. Verum De instrumentalibus postea (ut promissi) dicetur. Nunc (si prius, in qua parte propositi operis sumus, admonuerimus) praesenti iam disputationi finem idoneum imponemus. Est igitur unum morbi genus, quod similes, & simplices animalis uexat partes, quam intemperiem uocat. Huius aliquas differentias ex corporibus nuda qualitate alteratis prouenire docuimus: Aliquas cum materia quapiam, quae in ipsa conluit. Rursumque ambas incidere, uel in unicam animalis partem, uel plures, uel etiam totum corpus. Ergo cum in operis huius libro septimo intemperies eas, quae alteratis tantum qualitatibus in partibus proueniunt, pertractarim: in duobus deinceps libris ad eas quae in totum se animal extendunt uenientes, primum agere de febribus placuit. At quoniam harum ipsarum aliquae adhuc sunt, manente scilicet in corpore causa quae eas excitauit: aliae factae iam sunt, sed quae eas accendit causa iam absit: facilius uisum est de ijs primum sermonem facere, utpote simplicem primam curationis indicationem habentibus: deinde illas quoque stilo aggredi, quarum in corpore causa subsistit.

LIBRI DECIMI

ribus. 3. Iterum contra triduanū ieiunium, & historia febricitatis calidi siccique & biliosi iuuenis, à diatriarum in extremum periculum deducti, ab ipso restitui. 4. Adhuc de noxis intempestiuae inedia: & quod febricitantes nonnullos (de illis loquitur qui calida & sicca corporis constitutione sunt: non illis qui ob copiam vel obstructionem uel phlegmonem uel humoris alicuius putredinem februnt, quos neque in accessione, neque circa inclinationem febris tuto nutras) ab initio accessione cibare conueniat, uel paulo ante accessione. Obiter etiam causas reddit concussione, horrore, ulcerosi sensus siue inaequalis. 5. Perstat in dogmate corporis de febribus ex calida & sicca causa, ad similes etiam na-

cura & temperamento: quibus aduersissimam doctet
se mediam: & historias quasdam refert. 6. Pergit in
prescribendo uictum calidi & ualde siccū temperamen
ti febri obnoxij. Cōtra diatriton. Conuenire pūsanā
cremorem & ex farre sorbitionem adhibere idēdem,
& panem, & aqua frigida potum: nisi phlegmone, aut
putris humor facessat negociū: tum enim frigida absti
nendum est. Hæc omnia ferē repetuntur infra, lib. 11.
cap. 15. 7. Per capita colligit quomodo medendum
sit hecicæ febri, per sex remediorum genera: quorum
tria foris adhibentur, nempe aer qui nos ambit, phar
maca quæcūq; humectandi & refrigerandi uim obti
nent, & tertium dulcis aquæ solium. Intro sumuntur,
cibus & potus, & inspiratus aer. Hæc omnia ordine
traduntur per sequenda huius libri capita. 8. Primū
aerem prescribit hecicis, nempe frigidum in uniuersū
tum quatenus per anhelitum inspiratur, eo q̄ calorem

A qui est in corde refrigeret. cor enim primū est quod affi
citur. Vitandum autē ne extrinsecus circūambiat agri:
Quia cum denset cutem, putrescentiū humorū effluxus
transpirare prohibetur. In calore, quādā signa propo
nit quibus hecica cognoscitur. 9. Extrinsecus hecica
laboranti applicanda sunt quæ humectant & quæ citra
uehementē adstrictionē refrigerant, si nōq; corporis sub
stantia tenui. Cuiusmodi medicamen simplex cum in
uentri non queat, necessario nolimus uelimus composi
tionem pluriū efficere cogimur. 10. Balnea q̄ egregie
conferant hecicis, prolixè docet. 11. De uictu & nutri
mento hecicorum. Carnis nomenclatura. De collis
quantibus febribus.

Aliter.

Vnde febres hecicæ oriāt, & quā ratiōe curari debeāt.
Quæ ad balnearū vires pīnēt, omnia in uniuersū enū
B rat. Quæ sit remedia refrigerādo & humectādo idonea

GALENI METHODI MEDENDI, ID EST

DE MORBIS CURANDIS

Liber decimus.



R G O in diarijs febribus sim
plex quidā est in corpore pre
ter naturam affectus, utpote
causis quæ primum eas exci
tarunt, iam ademptis. In qui
bus uero causa quæ eas accen
dit, adhuc manet, in ijs nec af
fectus simplex, nec sanatio
est. Si quidem quod febris iam receptum in corpo
re sit, id ex propria ipsius curandi indicatione dis
tinctum oportet. quod adhuc est futurū, id propul
sare, ac ne fiat uetare. Verabitur autē, si quæ id exci
tat causa, prorsus sit summota. Itaq; in diarijs faci
endorum indicationem ex ipsa febre maxime ca
piemus, sed cum illa, naturā, & ætatem, & consue
tudinē, præterea anni tempus, coeli statum, & re
gionē, & vires simul expendent. In reliquis quæ
accessionis suæ causam intus habēt, prima indica
tio ab ipsa sumetur causa. Itaq; si febrium quæ mul
tos dies cōtinuant, recte ostendimus putredinē
esse causam, hæc nimirum sananda est prima: sed
nec interim extinguendæ febris, quæ per eam ac
censa est, ratio nō habenda. Ac si quidem in idem
consentiant, & quæ febrē extinguunt, & quæ
causam oppugnant; in quod utraq; conspirant, cū
unum sit, sine cunctatione agēdum est. Sin febris,
quæ iam accensa sit, sanatio, causam quæ hanc exci
tauit, est auctura: aut quæ causam summovent,
febrē exasperabunt: diligens habenda conside
ratio est de remediorū specie. Sanē diligenter con
siderauerit, qui totam deliberationem in tria hæc
æstimanda diuiserit, febris ne sola curanda sit, non
solicito de causa: an causa oppugnada, minime cu
ranti de febris: an plurimum quidem remediorum
ad alteram earum sit adhibendum, non tamē alte
raneglecta. At quod primo quidē loco est dictū,
probare nō debemus: quando si quibus præsidij
id quod febris semper gignitur, oppugnamus, ea
effectricem eius causam auxerint: planē nec gene
rationem eius aliquādo inhibebimus, nec magni
tudinem minuemus. quippe & generatio eius, ef
fectricis causæ speciem imitabitur: & magnitudi

cum illa pariter inaugecet. Quod secūdo loco di
ximus, si id distinguemus, poterit esse non in com
modum. Nam si intolerabilis ægro magnitudo fe
bris sit, committendum non est, ut per ea quibus
causam adimimus, febrē augemus. Simul enim
arbitror utrumq;, & febrim sustulerimus, & homi
nem. Sin ita mediocris sit febris, ut quo tempore
contra causam tantum pugnas, obruendē interim
vires ægrotantis non sint: utiq; contemnendus is
modus nō est. Non contemnendus autem nec ter
tius est, qui contra id cuius maius momentū est, in
stare iubet; nec tamen alterius omnino negligētē
esse. Sanē plerūq; causæ maior est vis. Fieri tamē
aliquando potest, ut ea sit febris magnitudo, quæ
præsentem perniciem, nisi occurras, afferat: quō
casu oportebit hac prius summota, deinde ad cau
sam accedere. Atq; hæc mi Eugeniāne decidenda
tibi inter initia statim de cōtrarijs indicationibus
sunt. Cum autem in ijs examinandis nō parum uti
sa est ad hominis salutem momentū habere vires ipsa,
utiq; de ea quoq; non leuīs ad agendorum inuer
sionem consideratio est habenda. Ita sit, ut tria pri
ma sint quæ in propōitis iam ob putredinē febrī
bus agendorum indicationem nobis præbeant.
D Vnā febris ipsa. Altera effectricis eius causa. Tertia
vis ipsa. Cæterum, priora duō summoenda sunt;
tertium est tuendum. Exit igitur rursus hic quoq;
eadem tibi consideratio quæ paulo supra, ut cum
uiribus, tum febrē, tum causam inuicem confe
ras. Mox si eadē ambo remedia requirēt, ea prom
pte exequaris. Sin indicationes pugnabūt, unam
præferas, uel quæ a uiribus sumitur, uel quæ a cau
sa, uel quæ a febre: ac quæ cæteris sit ualētior, hæc
magis sequaris, nec tamē cæteras negligas. Ex hæc
nanq; discretionē doceberis primum causam, fe
brēq; profligare, ubi uidelicet cōiijcis harū re
media vires posse ferre: rursus primam roboran
dam uirtutem esse, ubi hæc imbecillior est, quā
ut causæ febrisq; præsidia sustineat. Quinetiam o
mnia pariter sub cōiecturam agi licet, ueluti pau
lo supra De febris, & de causā monstratum.

2 Ergo cum tria hæc sint, ad quæ attentum

te esse in propositis febribus curandis oporteat, febribus ipsa, huius efficiens causa, & ægrotantis vires: inuentiq; præterea sint generales indicationis modi, quos etiam generales uniuersalesq; dicimus: transeundum arbitror, nunc est ad præliodiorū differētiās, quæ specialia particulariaq; sunt: sed mentione de diarijs repetita, quandoquidem ab ipsis in eas quæ plures dies continentur, aliqui transeunt. At uero cum in has trāscāt, una quidē ratione maxime cōmuni, ipsa medicorū inscitia: duabus magis priuatis, quod ipsarum febrium uel causa effectrix iam abiit, uel etiānum manet: de utriusq; seorsum esse dicendum. Porro abiit effectrix causa, quoties ab ira, dolore, uigilia, cura, æstiuo sole, fatione, & bubone iam sedato excitata citra stipationem febris est. Manet quoties uel ab externa causa, uel ab ipsa febre stipatio aliqua facta est. Nam & frigiditas, & adstringentium usus, per mediā stipationem semper febrem excitant. Vt si præterea nonnunquā corporis habitum constipat. Iam ipsum febris principium, ubi cum horrore inuasit, stipationē subinde fecit. Quinetiam glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi succi, ubi mediocriter obstruxerunt, diariam aliquādo febrem accendunt: utiq; cum idoneum sortiti sunt medicum, ut supra est indicatum. Sanē dicuntur idcirco id genus febres omnes diariæ, quia solui (quod utiq; ex ipsis est) uno die sunt aptæ, cōputata cū hoc una & nocte: quæadmodum cum dicimus, mensem esse triginta dierū, & annū trecentorū sexaginta quinque, & hoc gestum esse ante tres dies, aut gerendum esse post quatuor. Cæterum nō est idem ipsarum omnium affectus, sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est, ab aliquibus minime inseparabilis, sed uel ut plerūq; simul adest, uel ambigua sorte, uel raro. Inseparabilis stipatio est ijs qui ex aluminosa aqua, uel chalcantode, uel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut leui obstructione febricitant. Plurimū uero ijs adest, qui ex unctione febricitant. Ambigua sorte, ijs qui ex fatione. Quicumq; uero ex ira, uel tristitia, uel uigilijs, uel pertinaci studio, uel cruditate, uel bubone febricitāt, ijs raro adiuncta stipatio est. Atq; harum omnium febrium nulla (quod utiq; ex ipsa sit) ad secundam usq; accessionem perdurat: sed intra quatuor & uiginti horas omnino desinit. Aut si quando earum aliqua (quod tamen rarius fit) longius trahunt, due ijs accedunt causæ, quæ ipsas solui uetant. Earum una frigus est, quod uel ex ambiēte aere, uel ex unctione quapiam extrinsecus admota proveniat. Altera, egregia ista diatritis est, si quis uidelicet hanc transire medicorum inscitia coguntur. Quod si & ambiēs aer calidus sit, & nemo ex medicis qui diatriton suspiciunt, ad ægrotantem accedat: febris quidē post primam accessiōnē finietur, idq; cum sudore, uel madore, uel transpiratu qui halituosus sit. Aeger autem ubi se liberatū à febris senserit, ad cōsuetā munia redibit, laurās, ungensq; se: aut etiā, si agrestis quispian mōticola sit, his omīssis comedens. Ac uulgus quidē, sicuti multa alia, utiq; ab ipsa rerum natura edoctū, melius quā sophistæ

agit: ita & in diarijs febribus omnia sibi ipsi præstare sufficit, præsertim ubi citra ualentem stipationē cōstitere. Vbi uero cum eiusmodi inuasione, qui infirmati sunt, in medicum aliquē incidunt eorum qui diatriton efferunt. Qui fortunati, in eum qui ipsos & lauabit, & nutriet, cæteraq; omnia præstabit, quibus stipatio soluitur. Sæpe namq; (eudictum est) ex leui obstructione cum latis latente densitudine, quæ uel ex uitiosa lauatione, uel alio quopiam est contracta, diarijs nonnulli febribus sunt correpti. Quo tempore nisi quis celeriter obstructionem summouerit, in plurium dierum febres transeunt. Est namq; eiusmodi febris (quantum ex ipsa est) earum quæ plures dies infestant, & quæ diariæ sunt, communis. Cæterum propter causæ paruitatem, unius diei efficitur: sicut etiam propter magnitudinē, multorum interitum dierum. Verum accessio eius ab initio ad exitum usq; una est, modo ne ipsam excipiat ea, quæ ex putredine humorum nascitur. ergo quoad nec in pulsu, nec in calore, nec lotio, putredinis adhuc aduertit nota, atq; ex sola obstructione ortum habet, utiq; ipsa obstructionis solutio eius est sanatio: quemadmodumq; hanc soluere cōueniat, ante est dictum. Multa igitur apparēt diariarum esse febrium particulares differentia. Vna quando iam prius abiit effectrix ipsarum causa, ueluti uisio. Altera, quando hæc etiam adest, sicut stipatio, cuius duæ mōstrate sunt differētiæ: nempe exiguorum meatuum densitas, & de qua nunc agimus obstructio. Sanē densitudo ipsa aliās ex siccitate provenit, ueluti post feruores, aut fatigationes, aut iras. aliās ex frigore, eoq; uel simplici, uel cum adstrictoria ui. Quæ quæadmodum inter se differant, in libro De medicamentis est præceptum. Iā uero obstructio ipsarum alia est, quæ ex abundantia, alia quæ ex qualitate succorū, scilicet qui aut lēti, aut crassi sint, incidit. Præferetur autem inter remedia, in ea quam copia facit, sanguinis missio. In ea quæ ex humorum qualitate cōsistit, attenuantium usus. Quæ uero ex uiribus consilij petatur, ut in diarijs sanē est exiguum: ita in ijs quæ pluribus diebus urgent, satis magni est momēti, eoq; maioris, quo hæc sunt longiores. Enim uero ubi naturaliter se uires habent, ne minimum quidem in plurium dierum febribus uacuationum usum morantur. Vbi non naturaliter se habent, (uoco autē nō naturaliter cum infirmiores quodāmodo sunt) pro magnitudine imbecillitatis impediri uacuationum auxiliorum usus. Sanē rarius accidit ut protinus in primo secundo uel die uires imbecillæ cernantur. Accidit tamen interdum, uel propter ægrotantis malum corporis habitum, uel propter senium. Nonnullis etiā fatigatio, ubi tristitia uigiliaq; præcellerunt, et inedia per totum secuta est diem, dein febris priusq; homo cibaretur, circa uesperā occupauit, & nox in somnis est acta, uires magnopere resoluunt.

3 Nec alienum sit, si tibi talem ægrotum describā, in quo primum ausus sum ratione ipsam mihi uiam monstrante, & diatriton contemnere, & uiriū rationem habere: posteaq; alios, quos in simili casu

calu uidi, audacter eodem modo quo illum, curare. Si quidem primum periculum postquam ijs quæ ab indicatione sunt inuenta, subscriplit, ad secundum usum reddit magis animosos. Ergo iuuenis qui febris est correptus, annos natus erat quinque & uiginti, gracili corpore & musculofo, uelut canis: tum sicco calidoq; omnino temperamento. Iam idem exercitatione quodammodo delectabatur, & alioqui cogitabundus, & industrius erat. Is peregre agens, cum nuncium parum gratum accepisset, & tristatus est, & propere se accingens ad urbem festinauit. Ac priore quidem die & fatigatus est modice, & lotus cœnatusq; in quodam diuerforio quieuit, sed maxima ex parte sine somno. Postera die etiam magis festinauit, ac longa uia, & sabulosa, & squalente, tum sub feruente sole confecta, hora propè septima & semisse peruenit in urbem. Ibi cum ea quorum causa maturasset, meliora audiret: in gymnasium lauaturus proficiscitur, dein unctus, unâ cum quodam eorum qui aderat iuuenem perfrixit. Est. A quo cum ut paululum dimoueret, prouocaretur, orta inter eos contentione, (qualia sæpe incidunt ijs qui exercitationibus indulgent) plus iusto est exercitatus, eratq; iam immo dice siccus. Egressus uero gymnasium, inuenit amicorum quosdam pugnantes, quos dum dirimit, imprudens in aliam exercitationem non leuem incidit, dum alios eorum diuellit, alios impellit, alios complectitur medios, alios ut iniurios increpat, ac pro ijs qui iniurijs affecti essent, irascitur, adeo ut domum se in summa siccitate reciperet, lassitudinem, inæqualitatemq; sentiens. Aquam igitur ex consuetudine bibens, ubi nihil se leuatum, sed inæqualitatem sibi intendi sentit, hanc quidem uomuit. Ratus autem utilius adhuc cibo abstinere, accubuit, ac qui et se dedidit hora fermè diei undecima: quod cum fecisset, ac nocte tota febre diuexatus uigilasset, post tri die quocq; quieuit usq; ad meridiem, sperans se somni aliquid consecuturum. Quo tempore cum eum medici quidam diariton colentes, inuissent: tum quidem homini satis magnâ esse febrem aiebant, uel periri autem se illum reuifuros. Itaq; & uesperum cum rediret, ac febrem inclinatam cerneret: ne tum quidem nutriendum censuerunt, quamuis etiam id alius quidam medicus suaderet, immo strenue resisteret, ad iucientes, si quidè sine febris esset, fortasse cibum daturus: sebricitante adhuc minime id facturos. Quinetiâ cum tertio die manere dicerent, etiâ tertie diei accessionem transmittendâ censuerunt. Erat (ut prius dictum est) suspensa hora illius die undecima. Ergo digressis illis, ipse accessit, ac facie iuuenis cõtemplatus, uidit talem esse qualem in Prognosticis Hippoc. his uerbis pingit: Nasus acutus, concaui oculi, ac reliqua quæ deinceps ab eo dicta scimus. Itaq; cum omnino mihi persuaderem fore, ut tum in hæcquam febrem, tum quam *μαρμαρυγή* uocant, homo nisi cibaret, incideret, forbitione ex alica quamprimum paro, atq; exhibeo. Et tamen quamuis hac sumpta, cum accessio suo tẽpore circa undecimâ inuaderet, sic

Galen.

A extremis partibus perfrixit, ut calfieri hæc uix possent, & pulsus illi parus rarusq; quâmaxime fuit. Qua ex causa illi etiâ quarto die tum mane tum uesperum cibum dedi, quo scilicet & uires reparare, & corpus humectarem. Erat namq; cutis eius ceu corium arida. Vbi autem febris tenuis, & similis perseuerauit, statui deinde quinto die non simpliciter forbitione hominẽ cibare ut ante, sed alica ex aqua calida, citraq; cõditura, iniectione in eâ mali punici granis. Est namq; is optimus cibus bilioso stomacho, nam & roborat hunc malum punicum, & alica cum diutissime in uentriculo citra corruptione maneat, sensim concoquitur, nec acescens, nec innatâs. Quæ uitia accedere forbitionibus aliquando solent. Incidit uero, & in ipso quinto principium accessionis simile. Itemq; cum & sexto & septimo eum simili ratione cibassem, in octauo rursus simile principium præcedentibus fuit. ubi nimirum uel amentia, uel pertinacia, uel haud scio quid dicam, eorum qui in principio hominẽ transmittere tertie diei accessione sine cibo iusserat, posius intelligere licebat. Nam cum cunctis euidenter appareret nunq; peruenturum eum ad quartum fuisse, si nutritus ante accessione tertij non fuisset: illi & tunc eum, & secutis etiâ diebus non recte nutritum aiebant. Ceterum cõmittendū nō erat, ut eorum redarguendi studio, ægrum quis non exhibito in ipso accessiois die cibo proderet. Igitur nono die similiter hominẽ nutriendum, cernensq; in accessione pulsus eius redditusq; prius erat firmior, ceterum imbecillitatem illam adhuc præferentem cum extremarum partium frigore, nō potui sustinere medicorum illorum meras nugas, sed undecimo die præfatus prius ægrotantis amicis fore ut ipso die intelligerent hominem hæcenus nostra opera fuisse seruatum, permisimus illi præterire accessionis horas. Ego cū & sine pulsus omnino in ipsis esset, & frigus uemehens totius corporis premeret, sicut nec loqueretur amplius, & uix impellentem sentiret, conuocati in unum medici omnes qui ab initio uideramus, ab ægrotantis propinquis prope modum sumus discerpi. Ego quidẽ q; ob pertinaciâ ultro ægri salutẽ prodidissẽ: qui diariton colebat, propter ignorantia & stupiditatẽ. Ac illi idem pallidiores frigidioresq; quam ipse æger, cõsilium quoddam fugæ captabant. Quod ego prospiciens aule ostium obserari iusseram, & simul alicui cuidam clauem seruare. Post medius eorum stans, iam inquam uobis constare planè arbitror, quis hæcenus hominem seruauit. Seruabitur autem & nunc nostra opera. Neq; enim si periturum omnino in hac accessione putassem, à cibatione destitissẽ. Sed quoniâ ex præcedenti iam uisum tantum illi roboris superesse noueram, ut tolerare accessionem possẽt, permisi accessionis horas sine cibo transmittere. Ac satius quidem fuisset multo ante hominem nutrire. Verum quò & istos redarguam, & quibusdam his auscultantium, qui confici à nobis iuuenem, q; illam occasionẽ omiserim dicunt, persuadendam, nunc illis ostendam, uel in accessione ipsa ægrotantes quosdam nutrirẽ debere;

tom. 6

I

nedum

nedum ante hanc. His dictis, ac diductis hominis maxillis, infundo ex angustis oris uasculo, cremoris ptisanæ tres cyathos: paulo autem post albi & tenuis uini, modiceq; calida diluti, duos cyathos. Post quos & suscituli oculos, & tum audire, tum loqui, tum præsentis nosse cœpit: cum ante ueluti lignum aridum porrectus sine uoce ac sensu iaceret. Rursus itaq; dato ex uino quo dixi modo diluto, pane ad comedendum exiguo, prius hominem reuocaui, quem ut rursus ad institutam ab initio uictus rationem reduxi, & tertij decimi diei accessiōnem facile tolerare uidi: in quartodecimo rursus mane cibauī, ac post circiter horam octauam laui: deinde rursus liberalius cibauī, ac mox uinum bibendum exhibui. Idem uero & in duodecimo & tertio decimo fecerā. In quinto aut decimo rursus cibauī mane. Cū uero facilius tū quoq; accessiōnē ferret, in sextodecimo denuo laui. Cæteraq; circa hominē peregi sicut in præcedentibus diebus. At ubi in decimo septimo minime grauis paruaq; accessio fuit, audacter hominē de cætero sub cōualefcentium uictus ratione habui. Hic æger non paucos seminalorum, ac non penitus alinorum docuit etiam ante accessiones ipsas nonnunq; esse cibandum, uel si duarū horarum intercedat spatium: ac multo magis ante accessiōnē tertij. Ostēdi aut tibi & in prima ipsa accessiōnis inuasiōne eiusmodi homines nutriendos. Dico aut eiusmodi homines, in quibus corporis intemperies ad siccū & calidum conuersa febres accendit. Porro hoc quoq; plerisq; medicorū fortasse sit incredibile. Sed si ueritati ipsi fides est adhibenda, siue operibus, nos fidem ambobus facimus. Operibus quidem, dum homines ijs monstramus, qui si biduo pariantur inediā, necesse est febricitent: ita scilicet ut nonnulli ubi concitati ad iram sunt, uel mœrore uel uigilijs affecti. Euidētissime enim tum in conualefcentibus ex diutino morbo talia fieri cernuntur, tum ijs qui calido & sicco sunt temperamēto. Quā uero ratio ipsa fide huic rei facit, alibi iam dicta est. Dicentur tamen & nunc eius rei summa.

4 Mordēs halitus & succus ubi per sensibilia corpora fertur, horrores & inæquales totius corporis cōcusiōnes (*ῥῆγν* Græce dicunt) facit in ijs quibus cute stipata, quæ prius transpirabant, iam sunt retenta. Quoties enim fuliginosa sunt, febres accendunt. Ergo eiusmodi halitus & succos, tum multa & uehemens dimotio, tum uigiliae, & ira, et dolor, & cura, augent: tum proxime ab istis unum illud per se interdum augere eos sufficit, utiq; si cibum quis non sumpserit. Efficitur enim corporis habitus in ijs naturis, quæ facile amaram bilem generāt, ex longa inedia biliosus. Si igitur tum id in cidat, tum æger motu quopiam ualentiore quā pro uiribus usus mordentium excrementorū impetum confertim foras excitari: necesse est (ueluti in Symptomatum causis ostendimus) uel concusiōnem quam modo dixi, uel horrorem subsequi. Ac concusiō quidem ista succedet propter eorum quæ feruntur excrementorum, tum mul-

titudinē, tum acrimoniam, tum impetus celeritatem, tum laborantis uirium infirmitatē. Nam & quæ multa paucis, & quæ qualitate sunt insigni, ijs quæ non sunt, mordent magis. Pari modo & quæ cum celeritate feruntur, ijs quæ tarde. Iam uires ubi ualentes sunt, omnia contemnunt ac tolerant: ubi infirmæ sunt redditæ, uel abs quouis offenduntur. Horror fiet ubi & qualitas eorum, & impetus uelocitas est remissa, tum copia minor: ac potissimum cum uires tristanti obliuiscunt. Si uero iam dicta largius remittantur: ne horror quidem fiet, sed uel ulcerosus quidam sensus, uel tantum inæqualitas. Ergo coeunt ibi omnibus iam dictis, quod uehementissimum est oritur: utiq; supradicta totius corporis concusiō. rursus remissis omnibus, nullus ex transitu excrementorum fit sensus. Quod si quedam sint, quædā non sint, & quedam maiora sint, quædā minora: in eiusmodi mistionibus mediata latitudo omnis, quæ inter id quod maxime est, quod *ῥῆγν* Græce uocari diximus; & minimū, qui est nullus omnino excrementorum sensus, efficitur. Itaq; nihil mirū est, si dictarū causarum quæ libet uel per se, uel cum alijs iuncta, alij inæqualitatem, alij ulceris quempiā sensum, aut horrorem, aut dictam concusiōnem afferre uideatur. Nam pone uires imbecillæ sint; corpus ipsum admodum sensibile, (quippe id quoq; ostensum est non parum ad eiusmodi symptomatū generationem conferre) habitus autem corporis gracilis, & temperamentum biliosum, stomachusq; similiter bilis affectus: tum his omnibus accedant inedia cibi, & uigiliae quæpiam, & tristitia, & sollicitudo: ad hæc progressus ad domo, qui ex urgente quæpiam causa, sit necessarius: postea his ppositis (id quod aliquāto fieri uidisti) det sedulo operam, ut plus itineris per urbem re ita postulante festinus peragat: nūquid huic ex eo qui excitatus est mordentium excrementorum motu, primum quidem inæqualitas quedam, mox uero etiam horror prompte incidet: quod si motum quoq; continuet: uel cibum sumere non anteuerat, protinus etiam febris: Equidem ita febricitantes aliquos ostendi tibi, maxime ex ijs qui elōgo morbo conualuerat. quorum cum uni forte fortuna occurrisset, qui mox ante horrescere cœpisset: utrū exposuisset, dato ex uino diluto pane, continuo horrorem inhibui. Verum hunc (ut scis) per uiam in officinā quādam perductum, febricitare prohibui. Alios uero qui prius se domū suam recepissent, in ipso principio horrores, uel paulo posterioribus cibauimus. Atq; ut semel dicam, quibus incipientibus ad huc accessiōnis aderant symptomata: ijs omnibus panē ex uino diluto ac calente mature exhibēs, et horrorem statim inhibui, & febrem prohibui. Quanto uero hos citius cibaueris, tanto scilicet magis febrem prohibueris. Quod si paululum aliquid quādo morere, utiq; febris ne tum quidem, calor tamen multus ijs aduenit: simillime plane ijs qui per uehementē frigus facto itinere, reuersi domū, calidis sunt nutriti. Quippe si plusculum morere, maiorem calorem sentient, talemq; ac tantum, ut dubites

dubites an hunc febrem appelles. Sin duæ horæ ab initio inæqualitatis interpolatæ sint: nutries tunc quoq; modo horror adhuc duret, prædicens tamen q; hi febricitabunt, cæterum innoxia febre & cui cutis mador succedet: quo facto tum lauare tum rursus nutrire debebis. Quod si horror præterierit, ac iam planè febricitent, cibandi id tēporis non sunt, sed decreſcēte iam accessione, ilico sunt nutriendi, integritate nō expectata. In nullo nanq; squalido affectu cōmode finitur accessio, priuſq; illi uel ex lauacro, uel humido uictu, humectatio accesserit. Hæc ergo omnia cum operibus indicarem: quime uel laudabant, uel amulabant, scilicet quod supra eorum opinionem erant quæ egeram, *ἡ ἀδύναμις* quod paradoxa facerē, (ut scis) uocabant. Cum uero ratione de iſdem differens, docerem aliquos ante accessiōē esse cibandos, aliquos in ipsa, idēq; uel inclinare iam incipiente, uel etiā in ipso summo uigore: tum *ἡ ἀδύναμις* me, quod paradoxa dicere uiderer, appellabant. Ergo quid facias his hominibus, quibus nec opere, nec ratione persuaderi potest? At, inquit, fieri nequit, ut eiusmodi affectus quis agnoscat, quo modo igitur nos eos agnouimus? Videturne cuiſpiam fieri nō posse, ut calida & sicca intemperies agnoscat, uel quæ ab ortu usq; fuerit, uel quæ in præſenti tempore talis sit reddita? Mihi sanè tam uidetur facile, quàm has ipsas agnouisse literas. quid illud uero, si huic non sit adhuc in succis putredo ulla, illi uero sit, non posse uobis uidetur hoc discerni? Mihi posse uidetur. Nam & expulſus, & urina, & ex ipsa nonnunquam quæ in calore est qualitate, euidenter id discernimus. Quod si propterea quod nec ipsi quicquam discere uolunt, nec sese exercitare, ſcientibus parum credit: quid uetat quo minus tum geometris ipsis, tum arithmeticis, tum reliquis artificibus omnibus nihil credant? Miſſo igitur hoc genere hominū, rursus seriem sermonis nostri persequamur.

Calidis ac siccis naturis aduersissima res inedia est, ac febrili paratissima causa. Voco naturas calidas & siccas, nō solum quæ à primo ortu tales ex proprio tēperamento sint, sed etiā quæ postea rursus ex calido siccoq; uictu, & plurima dimotiōe, & uigilia, & cura, & tristitia, & regione calida siccaq; & tēpore æſtivo, & cœli statu calido siccoq; sint acquiritæ. Sanè licet & citra tēporis anni mentionem, in eiusmodi sermone statum cœli solū nominare. Verū si altius repetam, id quod dico magis credes. Calida & sicca tēperamenta, siue ea ex prima origine talia sint, siue ex uictu, & immo-dico labore, et animi perturbationibus, & regione, & cœli statu, inedia uehementē lædit. In hac dictio-ne, ipsis saltē uerbis, omiſſum est anni tēpus: pote-ſtate tamen omiſſum nō est, utpote quod in cœli statu comprehenditur. quando calidus in summo siccoq; cœli status iam dictā tēperaturā efficit. Hic autem status alio anni tempore quàm æstate planè incidere non potest. quando nec autumnō, nec in uere, multoq; minus in hyeme fieri potest, ut calidissimus simul siccissimusq; cœli status si-

Galen.

at: sicut nec humidissimus pariter frigidissimusq; in alio quàm hyeme. Ob hæc igitur ipse quoq; ali-quādo prætermiſſo anni tempore, cœli statu sum contentus. Liceat tamē cuiq; nominibus quibus uelit uti; modo à rerū natura non discedat. Est por-rō rerum natura, qualem & modo diximus, & ni-hilominus nūc dicemus. Nam quæ maxime sunt ad curationem nec necessaria, eademq; maxime igno-rata; nec Hippocrates ipse idēdētem repetere gra-uatur. Igitur inedia siccis calidisq; corporibus, ua-lentibus quidem noxia est: iſs uero qui in calida & sicca æstate febre laborant, quæ scilicet ex uſtio-ne, aut labore immo-dico, aut uigilijs, aut cōpre-henſis iam animi motibus sit contracta, non tan-tum noxia est, sed si quicquam aliud, planè pernicio-sa: quippe uel in febres ardentes ex ea incidit: à quibus nisi prius mors occupet, in hecticas mi-grant, atq; ab his in marasmi: uel proinus ab ini-tio ardentibus præteritis, in hecticas. Maxime ta-men (ut dictū sæpius est) siccos calidosq; affectus statim à principio hectica corripit: sicuti mulieri accidit, quæ autumnō ex tristitia & uigilijs febricitare cœpit: perseuerauit autem ad plurimū hye-mis. Hanc quarto die (ut scis) uidimus, deprehen-dimusq; statim hecticam esse febrem, cum alia quā humores excitant coniuſctam. Curatio autem una tum fuerat, ut frigida tempestiue & modera-te daretur, conſuetæ scilicet hanc perſanitate bi-beret. Verū alijs curatio huius erat cōmiſſa: quare nobis ſilere est uisum. Alteri uero qui eodem tem-pore ægrotarat, & se nobis cōmiſerat: quoties nu-tritus est, fontanæ planè gelidæ dedimus interim binos cyathos, interim temos: quando frigidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra no-xam non ferunt. Quocirca utilissimum est, ubi fe-bris ideam perspexeris, in prima statim accessio-ne minore cū periculo, copioſiore frigida uti, cor-poribus ad ualidam siccitatem nōdum perductis. Qui enim in feruoribus sub canicula ex ira febrici-tauit, (iuuenis autē hic erat siccus & calidus) ubi in prima accessiōe duas frigidæ heminas bibisset, statim quidem uomuit flauissimā bilem, non mul-to autē post etiā deorsum excreuit. Deinde cū rursus post cibum aquæ circiter heminam simili-ter sumplisset, iam febricitare deſiit. Non deſuere tamen medici, qui cum nullam à principio febris speciem agnoscerent, sed postea cum iam præter-riſſet occalio, intelligentes uel in hecticam, uel et-iam in marasmodē febrem ægrotantē incidisset: frigidam bibendam, nos imitantes, præbuerunt. Sed nemo metam attigit. Nam magna sollicitudo habenda est in iſs qui ita se habēt, de frigide potio-nis mensura, de qua paulo post dicemus, ubi pro-poliſte diſputationi finem impoſuerimus. Quippe æger is quem ante descripsimus, exemplo omni-bus est quibus propter siccitatem à principio sta-tim dari cibum debet, etiā si febricitare iam inci-piant. Nam cum accenditur in his febris propter mordentem acrimoniam excaſtati attenuatq; ex sole & inedia & laboribus succi, maximū eius remediū est humidum nutrimentū: sicuti è di-

tom. 6

I 2

uerſo

uerso ubi ob copiam, uel obstructionē, uel phlegmonem, uel (ut semel dicam) humoris alicuius putredinem febris est orta, maximo malo est cibus. Atq; hos quidē nec in inclinatione febris citra noxā nutrias, nedū ipsa accessione inuadente: illos uero omni certe tēpore, sed potissimū per inclinationē. Me quoq; subinde uidisti eos qui ex abundantia, & qui ex phlegmone laborarent, sub lōga inedia tenuisse sic ut prorsus ante septimum diem non cibare, sed sola mulla contentus essem, uiribus scilicet ualētibus. Quosdam eorū, quibus uidelicet uires ualidae non fuerant, aut stomachus biliosus, aut imbecillus, aut plus iusto sensilis, solo ptisanā cremore usq; ad septimū diem traxi, quo morbus in summo esse incremento debuerat, aut etiam omnino per crīsum discuti. Sunt igitur tibi a primo statim die in omni egro spectāda duo illa quæ Hippocrates iussit: à quibus cibandi consilia petas, morbi summus uigor, & ægrotantis uires. Postea si transiri summum incrementum sine omni cibo potest, in cibi abstinentia hominē seruabis. Sin exiguum adminiculum requirat, abunde erit sola mulla. Quod si maius desiderat quā sit ex mulla, ptisanā cremor satis erit. At si fas non est summū morbi incrementum, aut tenui uictu, aut inedia transmitti: id agendum, ut homo statim in primæ accessionis inclinatione cibetur. Aliquos uero eorū (ut dictū est) & cū inuasura adhuc est, & cum incipit, cibus. Sint porro hi sicco temperamento ac calido, aut à primo ortu, aut certe illo tēpore oportet: tū uiribus necessario imbecillis: neq; em fieri potest, ut abunde siccū calidūq; corpus cū febricitet, uiribus sit ualentibus. Si tamē cū eiusmodi febris ac corpore, momentanei membri phlegmone sit coniūcta, omnino æger morietur. nam id quoq; prædixisse me semper, nunq; uero falsum, ipse testis es. Magisq; id certum est, si pulmonis, uel membranæ quæ costis subtenditur, uel uentriculi uel iocinoris phlegmone sit. Etenim quæ has partes phlegmone occupant, non modo ijs qui tam imbecillis sunt uiribus, sed etiam ijs qui ualentiores ipsis sunt, mortifera esse solēt. Vnaq; salus tum pleuriticis tum peripneumonicis, adde etiam synanchicis, id est qui angina laborant, est ipsum uirium robur. Nō secus uero & quibus uel iecur, uel uentriculum, phlegmone obsidet. Nam quod ad phlegmonem quæ in ijs est paribus spectat, mimine planē est cibandum. quod ad uirium infirmitatem, utiq; sæpe. Ita necessario aut uires resoluentur, aut phlegmone augebitur. Atq; hæc mihi latius fortassis q; pro re pposita sunt dicta, quæ præsertim hoc libro statuerim de febribus quæ absq; phlegmone infestant, disserere. Ceterum translationis conuenientia fecit, ut quatenus necessarium esset, digrederemur.

6 Denuo igitur redeamus ad febres, quæ iam comprehensis febribus sunt affines, quas nominare heclicas solemus. Nam qui supra scriptus à me iuuenis est, hectica febris laborasset, si mirificā diatriton transigere fuisset coactus: nisi tamen prius ab ijs qui absq; methodo uictus rationem ordina-

re consueuerunt, fuisset interemptus. Proponatur igitur alius quispiam cui cum supradicto cætera quidem omnia sint eadem, uires tamen tanto sint ualentiores, ut tridui inedia tolerata duret. Necessesse est hunc, si modo ita cibetur quemadmodum cibant qui diatriton extollunt, in hecticam incidere. Nam hi primū in quarto ipsum cibarent, post in sexto, mox in octauo, deinde in decimo: quippe talis est (ut sæpe uidisti) eorum cibandi formula. Prima quidem cibatō post primam diatriton, reliquæ alternis diebus. Protinus autem (arbitror) & ex artomelide, id est pane ac melle siccassent eius præcordia: nam id quoque ex legibus eiusmodi medicorum est, siue phlegmone uel secus aliquod laboret, siue secus. At quemadmodum quidem eos cibare qui ita laborant, inter initia conueniat, supra est dictum: sed nihil tamen fecius nunc quoque summam repetetur. Quoties uel ex lassitudine, uel ira, uel pluribus curis, uel uigilijs, uel tristitia, uel longa inedia, uel uniuersis unā (sicut in supra descripto iuvene) coeuntibus, siccatum corpus est, ac febris inuasit, quæ & arida reddat cutem, & igneum habeat calorē, utiq; hunc talem timor est febris hectica correptū iri, potissimū in estate, ac celi statu calido siccōq;. Oportet autem quamprimum ptisanā cremore, & sorbitione ex alica nutritum, panēq; post oblatō, ac quæ frigida potione hominē cures: quippe protinus extinguitur ac cessat omnino febris, modo (ut dictum est) nec phlegmone aliqua ei lirad iuncta, nec putridus humor. Nam si horū uteris sit, attendere diligēter oportet ac discernere, quoprimū tēpore aquam frigidam dare homini sit audendum. Ego enim talium quoq; nō paucis de di, tutius esse ratus plegmonas in presens augere, quā sinere hominē hecticam febrem incurere. Vbiq; igitur (ut semper dicere soleo) curatio dignotionem prænotionēq; cōsequitur. Siquidē & dignoscat quod presens est, & provideat quod ex eo futurū est, oportet, qui uolet notabilis efficacæ remedio uti. Si tamen magnum fore incōmodum uel humori putri uel phlegmone conficis, à frigida quidem danda abstinebis: refrigerantibus autem remedijs quæ foris applicantur, uteris, modo ea super os uentriculi aut tota præcordia, modo super pectus imponens: ubi scilicet plurimum subesse caloris maxime iudicabis. Sanē diximus ijs qui ita laborant, balnea quoq; esse nō incōmoda. Dico ijs qui siccato plurimum corpore sunt, et ex aliqua earum quæ dictæ sunt causari, citra humoris putredinē febricitāt. Monstratū uero nobis est in ijs quæ De febribus scripsimus, phlegmonas quoq; propter putredinē humorū qui in ipsis habent, febres subsequi. Quocirca si quando dicam febribus quæ ex putredine accendunt, tale quippiam conducere uel non conducere, etiā eas quæ à phlegmone excitantur, in communi putredinis genere cōprehensas intelliges. Sicubi uero deinceps utrasque nominare uideris, scias eas quæ ex phlegmone, ab ijs quæ ex sola putredine ortū habent, tū discerni. Cuiusmodi autē sit phlegmones affectus

affectus, tum in libro De inæquali intēperie, tum uero in eo qui De tumoribus præter naturam est inscriptus, docuimus. Admonuisse tamē & nunc tenet non sit inutile. Cum sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partē procubuit, maiora eius uasa protinus distendunt, utpote abundantia continendā non sufficientia. Ab his deinceps quæ minora sunt. Mox ubi nec in ijs satis continentur, exeat foras in ea ampla spatia quæ inter uasa sunt, sicut etiam omnia quæ in composita carne habentur, loca occupet. Atq; hæc quidem est phlegmones affectio. Possunt uero & sine hac in ipsis uasis humores aliqui putrescere, idq; aut in una animalis particula, in finibus ipsorum impacti, aut etiam in totis eorum capacitatibus quæ inter bubones & alas sunt, comprehensi.

7 Cum igitur (ceu diximus) citra putredinem sequenti corpori febricitare contigerit, caput totius curationis, in ijs remedijs quæ refrigerent & humectent, statuere oportet. Porro duplex genere est harum rerū prima materia. Vna eorum quæ foris incidit. Altera quæ intro in corpus sumuntur, quæ sanē & *πρόσθεσις* id est, sumenda uocantur. Extrinsecus corpori incidunt tum aer ipse qui nos ambit, tum pharmaca quæcunq; humectandi refrigerandiq; uim obtinēt: & tertium præter hæc, dulcis aqua balneum. Intro in corpus sumuntur quæ eduntur ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab his generibus tentandū est propositis hoc loco febribus tum humiditatem, tum refrigerationem cōparare. Verum refrigeratio quoniam per efficacissimam qualitatem in ducitur, et parui temporis est, & periculosa: cōtrā, siccitatis per ea quæ humectent curatio, ut longi tēporis est opus, ita minus est quā refrigeratio, periculo expolita.

8 Igitur dictas sex materias differētiās deinceps iam examinemus, ab ambiente exoriri. Hic igit si tēperatus est, qualē se exhibet, utiq; tali nobis est utendum, nihil amplius de eo sollicitis. Sin admodum calidus est, uel admodū frigidus, pro calido inducendus arte cōtrarius est, subterraneis inuentis domibus, quæ & frigidissimæ sint, & maxime persæ, & ad septentrionē uersæ, tum auris quibuldam, quæ ipsis sint iucundæ, opera nostra paratis: aliās ex euripis, in quos se deiciāt multi aquarum torrentes: aliās aqua frigida de uasis in uasa translabente. Iam hoc statim etiā somniferum est. Præterea domo assidue aqua quæ prorsus frigida sit, aspersa, ac ros plurimis humi fusis, aut uitium capreolis, aut ruborū summitatibus, aut lentificamentis, aut deniq; reliquarū quæ refrigerēt stirpium aliquibus. De quibus etiā prius est dictum. Turba quoq; hominū ingredi prohibita: nā id quoq; domum calefacit. Atq; ita quidē calidissimū aerē refrigerare, qui scilicet in æstate calida & sicca accendit, est tentandū: quandoquidē in hyeme calidissimus esse nō potest, sicuti nec frigidissimus in æstate. At si quis modice frigidus est, hoc esse contentos oportet, nihil aut machinātes, aut de tēperie eius alterantes. Qui uero frigidissimus est, utique quatenus respirādo attrahitur, admittēdus est, ut

Galen.

A qui calorē qui est in corde, admodū refrigeret: nō tamen quatenus extrinsecus ægrū cōtingit: quippe densat cogitq; cutim, ac putredinosis humorum effluxum transpirare prohibet. Si quidē per pulmonem, quod rarum uiscus est, difficile nō est ut tū qualitas ipsius, tum etiā substantia ad cor facile perueniat. At per cutim fieri nequit, ut eius uel qualitas, uel substantia ad cor perueniat, utpote prius densata. Nam quod in libris De simplicium medicamentorum facultate, de ijs quæ uehementer adstringunt, est dictum, id hic quoq; reuocari ad memoriam debebit, ac sciri qui nimium frigidus aer est, hunc cutim densando, semper sibi ipsi uia præcludere. Scire tū licet maius fore ex frigida inspiratiōe cōmodū, q̄ ex cute densanda in cōmodum: præsertim cū operantis hæc calfacere licet. Porro utēdum maxime eiusmodi aere est in ijs hecticis quibus primum quod afficitur ipsum est cor, æque ut si uētricus primū esset afflictus, ipsi per comesta & bibita esset succurrendū. Huic enim illa cum integris adhuc uiribus occurrunt: si cuti cordi inspiratus aer. At si cōtrā ex inspirato aere nulla certe utilitas accedit, ac comesta uero et bibitis minor planē quā uētriculo: cæterū, aliquando non obscure aduenit. Cōmunis autem omnium sanatio est per ea quæ extrinsecus applicata refrigerant & humectant. Atq; ob hæc quidem uiscera magna ex parte hecticas marasmodosq; febres accidere cōtēplati sumus. Superueniunt tamen aliquando & pulmonum sicco calidoq; intēperamento. Attamen opportunum eiusmodi febribus id uiscus non est, utpote humidū laxumq;. Incidunt præterea & pectori, & pingui mēbræ, quod *μεσαστοιον* dicitur, & ieiuno, & colo: interim uero & utero, & renibus. In septo uero transuerso marasimum non uidi: hecticam sanē febrem uidi, & hanc semel quidē planē absolutam, sæpe uero citius interimentem quā planē esset completa. Eiusmodi nanq; affectum & spirandi difficultas, & delirium excipere solet. Ex quibus magna ex parte prius moriuntur, quā hectica prorsus sit perfecta. Est autem eorum agnitio facillima, tum ex pulsus duritia, tū ex eo quod præcordia plurimū trahuntur sursum, tum ex difficultate spirādī, quæ illis est & inæqualis & uaria: quippe aliās quāmaxime paruum & frequens spirant: rursus aliquando manifeste spiritum tardant: dein subito quem admodū gementes respirant, quem duplicē spiritus intromissionē, quasi superinspirantes, uel duplicem foras missionem faciunt, uelut superexpirantes. Respirant uero hi sæpe & reliquo thorace toto, non sensibiliter modo, uerum etiam notabiliter, tum operas scopulas quas *ὠμόπλοιστες* uocant attollētes aliquādo admodū raram et magnā respirationē edunt: utiq; cum delirij malum præcipue dominatur. Verum presentis instituti nō est, uel laborantium partium notas, uel earum causas referre. Quare denuo ad curationē reuertamur, æsthi memusq; quas uires præpositæ sã materie aduersus hecticas febres habeāt. Sanē diximus iã non nulla de aere, tum calido, tum frigido, qui præci-

tom. 6

1 3 pue

pue quidem est utilis, cum quod primū afficitur, ipsum esse cor: quamuis confert & in reliquis febribus non parum, quandoquidem in his quoque necesse est cor similē intemperie recipiat, citra quam nec marasmus, nec hectica, nec reliquarū ulla febriliū cōsistere potest. Quo facile apparet etiā pulmones, ubi scilicet ij sunt qui primū patiunt, plus ceteris omnibus refrigerantē aerem requirere.

9 Sequitur iam ut de ijs medicamentis agā, quę extrinsecus admota humectēt, & refrigerent. Porro horum quoque ea deligenda esse, quę citra uehemētem adstrictionē refrigerent, neminem latet. Talia em̄ præterq̄ quod nō humectāt, etiā demittere frigiditatē suā alte nō ualent, propterea q̄ cutim cogunt, ac coarctant. Optima uero sunt quę non modo citra adstrictionē refrigerant, sed etiā corporis subtilitātia sunt tenui. Ac quę quidē absolutissime tenuitū partium sit substantia, exacte frigidam inuenisse, fortasse non est. Dixi exacte, propter acetum, quod cum omnium (quę nouimus) potestate refrigerantium planē tenuissimarum sit partium; admissa sibi aliquam caliditatē habet. Præterea corpora quę contingit, siccat, quamuis ad imaginationē sit humidum. Quo fit, ut ad eos affectus quos humectari & refrigerari expedit, solo eo nō utamur, sed tanto aquę frigidę admissio, ut possit bibi. Ceterum quanq̄ corpus quod absolute tenuitū partium sit, & simul frigidum, inuenire non est: attamen deligi materiās oportet, quę ad eiusmodi medicamenti compositionem maxime sint idoneę. Ac dictū quidem latius de his est in opere De medicamentis. Dicitur autem in exemplis non nihil & nunc, quō in hoc quoque genere membratim sis exercitatus. Incipiam autem ab eo medicamine quod omnium quę humectēt ac refrigerent, est simplicissimū, quo etiā aduersus erysipelata uis, & phlegmonas in pudēs, utiq; inter initia, priusq̄ depascens aliqua subindicetur putredo. Debebit autem ad id preparata esse cera quam optima, & elota. Sanē optima fuerit, uel alba pontica, uel quę ex atticis sit fauis. Esto autē & rosaceum, quod ex oleo sit: si nō nullis uocato omphacino, ab alijs crudo, quodq; citra salem sit confectū. Maxime uero ad rem pertinebit, si & ipsum oleum tenuiū prorsus sit partiū, cuiusmodi Sabinum est. Cum uti uoles, ambo mista liquātor in uase duplici. Factoq; liquido cerato (cuiusmodi scilicet erit quod triplum aut quadruplum ad ceram rosaceum habet) postquam ipsum fuerit refrigeratum, misceto ei paulatim in mortario tantū aque quantū in se, dum cum ea mollitur, accipere possit. Expediit autē & ceratū ipsum prius admodum esse refrigeratū, atq; etiā quę huic miscēbitur aquam esse frigidissimā. Abūde autem ceratum refrigerabis, si cum modice coiuist, totū uas in quo cōtinetur, in aquam frigidissimā dimittas. Quod si acceti quoque admodum tenuis ac clari paululum adijcere uelis, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficiēs. Non debet autem medicamentum hoc eo usq; super ægrum corpus manere dum manifeste incaleat, sed

A assidue subinde mutari. Aliud medicamentum. Oxalidos, aut oxylapathi succus cum exigua polenta affatim excipiat duplicato peniculo dentito, affatimq; frigidum & ipsum imponat. Quod si eiusmodi peniculi occasio nō sit, tum lintē duplicatum & madefactū refrigeratā particula impones. Quinetiam portulacę, & semperuiui, & uirę immaturę succus, similiter polentę miscetur. Ad hæc lens palustris, & uiridis tribuli, & polygoni, & lactucę, & intybi succus, aliq; quęcunq; refrigerare est dictum, cum tenui polenta. Præterea si nō polenta licet integris herbis tunsis uti. Iam uero quod epithema ex pinguib. sit palmulis, quas *πρωτὰς* Græci uocant, salutare medicamen est. Porro coquere oportet harum carnē, omnīmembrano exempto, aliās ex solo claro aceto, aliās aqua ipsi admista: atq; hac ubi tenera satis reddita est, tunsā uti. Quod si parū molli crassitudine uidebitur, præstiterit iam dicti aliquid admiscuisse cerati. Quod si rosacei quidpiā dictorum singulis aliquādo miscere uolueris, nihil inutilis pharmacum habebis. Esto autem quod admiscet, tum minimum, tum & simplex & perfrigidū, & quod factū ex oleo sit salis experti. Sanē quoties simplex rosaceum, aut aliud quiduis id genus dico: quod sine aromatis est cōfectum intelligi uolo. est uero salutare ad talia medicamē & rosarū succus frigidus, unā cum polenta. Salutares uero sunt & ipsę rosę tunsę. Præterea stirpium quę moderate adstringunt, germina trita. Ad quem modum uti aliquādo licet & herbis quę mediocriter adstringūt, ueluti solano. Verū eiusmodi medicaminū materiam in alio opere reddidimus uniuersam. Nunc abunde pro exēplis sunt quę iam dicta sunt. Porro utendum his est, nō (sicut uulgus facit) toti impositis thoraci, aut toti uentri: immo illi maxime quod primo est affe ctū. Neq; em̄ necessum est, ut aut cū eo quod refrigerari ualēt desiderat, etiā id refrigeres quod prorsus non desiderat: aut ante iustum tempus refrigerare desistas, timens uicinā aliquam particulam ledi. Ego nanq; hominē scio, qui imposito præcordijs refrigeratē medicamentum, difficultate statim spirandi laborarit. Alterum uero qui protinus tussierit. Atq; paulo post utriq; finitū symptoma, ubi quod refrigerauerat, est ablatum. Quod si adeo strenue refrigerare non studebis, habes quę id modice efficiant, adherentū medicaminum, ac cerati speciem referētium, magnam copiam, quorum non materię modo uim, sed etiam compositionis methodum didicisti. Verum ego cum iam sentiam mēsuram præsentis instituti me excedere: ad ea quę tractionis series proxima exhibet, conuertar.

10 Proxime uero se ē iam dictis exhibet consideratio de balneo, tū ipsius rei causa, tū uel magis propter Philippū, qui hecticas quas *μαρμαριδις* uocant, ipsum noxiū putat. Ipe igitur quid tum de omī balneorū uī, tum etiā quę ad eos qui hectica & marasmo laborant, uel (ut semel dicam) omnibus est accommoda, in hoc maxime libro quid sentiam explicabo. Memini nanq; me & supra in diarijs

diarīs febribus illa laudare, & in septimo huius operis libro, in ijs quī cruditate propter siccum uentriculī interperiem laborabant atq; extenuati erant, saepe utendas iubere. Cæterū de uniuersa earum uī, nullo alio libro disserui, sed in hunc seruauit ubi et de ijs agitur quibus efficacissimus earum est usus, & quibus Philippus ea interdicit. Atque prius quidem ubi de ulcerum curatione egimus, indicata causa est cur propriæ cuiusq; morbi indicationes sint ignoratæ. Dicitur autē nihilō secius & nunc, utpote tum ad ea quæ nūc paramus, tum ad ea quæ dicenda sunt, utilis. Cum enim unus in corpore affectus est, eius curationem inuenire, si non ratione, certe experientia haud difficile est. Vbi uero connexi duo tres uel sunt, præsertim qui maxime cōtraria inter se auxilia requirunt, fieri nequit ut experientia, quod agendum sit, inueniatur, imō nec facile ratio. Siquidē et substantiā cuiusq; affectus ad unguē nouisse oportet, & propriā curationis indicationē à quoq; affectu cepisse. præterea quem primū omniū, aut magis: quem rursum minus, aut secūdo tertio uel loco curare cōueniat. Hæc igitur causa est cur uulgo medicorum ignotum sit, & quod febrium omniū, qua febres sunt, propriū remediū refrigeratio sit, siue ea talis actus sit, siue potestate: & quod alia multa ex accidente refrigerando, febrium sint remedia. De quibus & dictū non nihil in præcedentibus est, & in sequentibus dicitur. Quædam nāq; remedia cōplicitam quodāmodo duplicemq; facultatem habēt, ita ut & primariōe proficiant, & ex accidente. Quod genus & balneū est. Nam frigide potio per se quidem proficit, utpote actū refrigerans. Succus autem uivæ immaturæ potestatem refrigerans medicamentū est. Atq; hæc quidem ambo refrigerat primum, id est per se ipsa, nec intercedēte alio. At san guinis missio (ueluti prius indicauimus in febribus cōtinētib; quas synochos uocat) nō primū, sed ex accidente calidam aliquando intēperiem sanat. Ad eundē modum & clyster, & purgatio, & fomentū [ex calido liquore], et cataplasma quod digerat, ac conicoquat. Vtrāq; uero facultatē in se cōprehensam habet propositū nunc in sermone balneū, utpote ex partibus uariā facultate præditis cōpositum. Quippe ingredientiēs in aerē uersantur calido, postea in aquā calidam descēdunt, mox ab hac egressi in frigidam, postremo sudorē detergent. Potest autem prima eius pars materias per totū corpus, tum calfacere, tum uero liquare; præterea quæ inæqualia sunt æquare, & cutim rarefacere, & multa quæ sub hac ante detinebātur, uacuare. Secūda eius pars ubi quis in sicco corporis affectu ea utitur, potest madorem utilem solidis partibus immittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida utitur, & totū corpus refrigerare, & cutē densare, & uires firmare. Quarta uero corpus per sudores citra refrigeratiōis noxā uacuare. Ergo cum hæc omnia cūcā hominis corpus effice re ualeat dulcis aq̃e temperatum balneū, & præter hæc etiam si quis intēpestiue lauetur, tum horrores, tum cutis densitatem, tentandum nobis est

A omnia deinceps distinguere; ac primū de illis sermone facere, qui cum in balneo se lauant, horrore tentant. His em̃ una (ut sic dicā) cōtinens excitationis symptōmatis causa est. Aliæ quæ hanc præcedunt, multæ. Sanē horrores causam esse dico mordentiū excrementorū cōfertim a cōtoriū citationem motū. Proinde quibus horū est abūdantia, caro uero, ac cutis densa, siue balneū sit ingressi, siue steterint in sole, siue quoquo modo, uel gestati, uel perfricti, uel exercitati, uehementius sint dimoti, utiq; ijs horror incidit. Contrā, quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus, ut remittitur laxeturq; à balnei calore, promptus, ij nō modo nō horrent, sed etiam meliores redduntur; utpote excrementis per id uacuatīs. Quo rationabilius nec in febrilib; significationis principio, nec in incrementō cuiq; agrotantem lauit. Quippe densata est hoc tēpore coarctataq; & cutis ipsa, & quæ sub hac habet carnea substantia. At in febris inclinatioē, uel incipientē, uel procedētē, uel amplius progressā, & nos sæpe, & alij medici nōnulli multos sæpenumero ægrotos lauantes nō parū his cōtulimus. Porro quando inclinatione incipiente, aut iam progressā, aut etiā in summo incrementō (interdū enim id quoq; accidit, tametsi rarō) æger in balneū sit decedens, in sequentibus desiniemus. Nunc cum de generali facultate singularū partiū disserere institui unū omniū primum exponā. Dicoq; multos eorū qui cruditate laborant, plures uero eorum in quibus mordentiū excrementū abūdantia subest, omnes præterea qui uel in febrili significatione, uel in ascensu, etiam omnes qui summo sunt incremento, præter admodum paucos, siue hi sint in balneū ingressi, siue steterint in calido sole, siue exercitationes, frictions, gestationes uetentauerint, merito horrescere. Singula namq; horum cōfertim & impetu agi excrementa subigunt. Cum igitur tam adhuc densa lauantis cutis sit, ut ad primū ambientis aeris occursum nequeat naturalem suum habitum recipere, sed maiore ad id spatio indigeat, excrementa uero foras uersus ruant uniuersa, & reuerti illi ea est necesse, & qua sub cute sunt a ceruata, & qua per carnes feruntur, mordere. Porro in illis De causis symptōmatū indicauimus mordentia excrementa, ubi per sensibilia corpora feruntur, tum cōcusiones, quas *πύρι* uocant, tum horrores excitare. Ergo quamobrē horreāt in balneis omnes qui ante sunt comprehensi, iam causas inuenimus. Pari modo, & cur nō horreāt quibus aut nullum est in corpore excrementū mordens, aut tantillum ut facile uacuatur. Ergo de his deinceps loquamur, propter quos etiā de ijs qui horrent, meminimus. Si quis enim balneū ingressus nō inhorruit, sed remissa est illi rarefactaq; cutis, huic planē necessario prædicta succedent; excrementorū uacuatio, æqualis per totū corpus calor, exiguorum meatuū rarefactio, tenforū relaxatio, densatorū fusio. Ac uacuatio quidē excrementorū, omni febrī est utilissima. Pari modo, & rarefactio, & relaxatio. Fusio tamē & calor non itē. Sed calor omni febrī est inimicus: quando refrigerari, non cal fieri

brum affectus postulat. At fundi æqualiter, id solidis quidem animalis partibus non est alienum. Succis certe non perpetuo est utile. Sed quoties in animalis, uel phlegmone quæpiam, uel affectus phlegmone similis constitit, uel utrauis abundantia, siue ea quæ ad uires cõfertur, siue ea quæ ad uasorum capacitatem, omnium profecto inimicissimum. Ac phlegmone quidem, cum calefacti, & liquati succi ad ipsas cõfluent, augentur. Tunice uero uasorum impares abundantia, quæ iam ex liquatione spiritus est impleta, distenduntur, ac uires hoc ipso male afficiuntur. Ergo calidis his siccisq; affectibus, de quibus agebamus, emissio mordentium est salubris: liquatio enim eorum est citra periculum: calefactio tamen noxa non caret. Atque hæc quidem ex prima balnei parte ipsi qui ita laborant prouenire, modo tẽpestiue balneo utantur, memoria teneamus. Transseamus modo ad secundam eius partem, quæ erat id quod proprie lauacrum uocant. Ergo in hac sicut ex humectatione iuuantur, sic ex calore nihil illis cõmodi accedit. Accedamus & ad tertiam, in qua & refrigerant innoxie quæ fuerant excalfacta, & uires firmantur. Si qua uero & laxata, & iusto plus sunt remissa: ea in naturalem redeunt mediocritatem, id quod quarta balnei pars indicat. Quippe quibus omnia rite sunt adhibita, ipsi post frigida usum adhuc sudant, & omnia ipsis excrementa uacuuntur. Itaq; ex omnibus quæ de balneis retulimus, una summa colligitur: quod uacuatur quidem quicquid in corpore, uel fuliginosum, uel humidum fuit. cõsistunt autem in naturali symmetria, tum caro ipsa, tum cutis, solidarum partium ariditas corrigitur: & calor non modo is qui ex lauacro accessit, uerum etiam qui prius fuit ex frigida usu summouetur. Maximo huius rei documento est status, qui ex eiusmodi balneo redditur, postq; in sole feruente iter fecerimus. Quippe accedimus ad id, ne loqui quidem, præ lingua, & faucibus ariditate, ualentes, totumq; corpus stipulari ritu aridum habentes. At egressi est frigida, ilico omnia pro naturæ habitu recipimus: nec febrili calore uexati, nec siccitate afflicti, proutq; loquentes, ac plurima sitis parte leuati. An igitur euidentius adhuc balnei uires in siccis & calido corporis affectu cognoscere desideras? Ego sane non arbitror. Licet autem cui placet, experiatur. quod in cõmodum sequatur, ubi tali peracto itinere non lauerit. Aut enim statim febricitabit, aut multo plenus tẽdio, grauato scilicet capite, perseuerabit: potissimum si frigida calorem nondum extinxerit. Multum tamẽ iuuenes eiusmodi cõfectis itineribus, ubi sileo se in aqua frigida profecerint, iuuantur: ac potissimum qui ualentibus. sunt uiribus, & frigido solio assueti. Ita uero & ruri faciunt, ubi q; balnea non sunt, in stagna, uel flumina se ipsos cõijciunt, nullo medici suasu, sed ipsa gubernante corpus natura ad id quod conducatur impulsu. Quæ eadem etiã ratione carentibus animalibus. instinctu inserit ad eorum quæ offendunt cõtraria. Siquidẽ ea quocq; ubi aestu uexant, frigida se lauant: sicuti etiã ubi frigore urgentur, calida cubilia sibi inueniunt. Eodẽ cõtrarietatis studio, etiã cum esuriunt, comedunt: & cum sitiunt, bi-

unt: reliquaq; omnia naturæ impulsu obeunt. Ac si certam febricitantium naturam notitia haberemus, non (arbitror) dubitaremus eorum aliquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare. Nam q; sint quidam qui eam desideret, uel ex ipsis quos iuuat, cõstare potest, ut quibus frigida lauatio haudquaquam cõtulisset, nisi eo tẽpore recte ad eam dispositi fuissent. Verum quoniam exacta nobis dispositionum notitia non est, ac maxima ex errore impendunt noxa: utique eiusmodi præsidia recusamus, potissimum in febris hecticis, quãdo per has, & pauci sanguinis, & nudus carne, & expers adipis, redditus corpus est. Nullum enim hi solidarum partium munimen habent, quod frigida occursum sine noxa excipiat, sed prius similibus ipsis partibus. occurrit, a quibus omnes animantium actiones obeunt. Iuuenis uero cui abunde sit carnis, estatis tẽpore, atq; in febris summo uigore, modo nulla uiscerum phlegmone subest, si in frigida se cõtulerit, sudabit. Quod si frigida lauatio sit assuetus, securus remedio utetur. Verum de eiusmodi corporibus. post age. Qui autem ex calida, & sicca intemperie, hectica febricitat, ac potissimum qui iam marafmodos sunt, ipsi ubi tale præsidium petunt, tutum non est in tota cõijctione: neque ut nec gracilibus & imbecillis, qui estate calida & sicca longa uia peracta, refrigeratione indigent. Nam neq; his tutus est frigidi solus usus, nisi prius fuerint in balneo equaliter excalfacti. Quippe simile quiddam nobis accidere uidetur, cum in frigido solium post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit cum tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur: quæ admodum & illud, ubi candens iam redditus frigida mergitur. Atque huius rei causa ad imbecilla corpora inueniuntur: balnea, quæ ea præcalfaciunt, atq; ad frigidum solum præparent. Non dissimile quiddam faciunt & qui sine balneo frigida utuntur, cum scilicet se ab exercitatione in eam saltu demittunt. Siquidẽ cuiusmodi nobis est balneum, eiusmodi illis est exercitatio: ut quæ non tantum calfaciat, sed etiã insiti caloris motum a profundo corpore extrorsum cõtinet, sicut & frigida impetui occurrit, & quo minus uiolenter in profundum ruens uiscerum aliquod feriat, aduersetur, atq; prohibeat. Nam neq; ipsam frigida substantiam, neq; eius qualitatem omnino integram usq; ad uiscera pertingere, est salubre: imò & satius & tutius est solam eius qualitatem per distributiuum modum, citra substantiam ad profundum permeare. Iam qui hectica febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint demissi, nihil iuuantur. Qui enim aliter febricitant, eorum solidæ partes nondum difficile separabilem calorem obtinent. Itaq; etiam ex sudoribus, una cum insensibili transpiratu, abunde his remedium est. Et sane diariarum febrium ipsam propemodum substantiam uacuari per hæc contingit. In ipsis uero qui ex siccitate & caliditate febribus hecticis urgentur, solidarum partium affectus cãdenti ferro est similis. Quo utiq; minus eos in balneis callescere dũtaxat humectasseq; cõtenti esse debemus. quippe cum sic alimentum, incrementumq; febri præbuerimus. Immo melius erit, ut meris in frigida extinguiamus calorem. At in hoc metus est ne corpus in

diuerſa transferas, ac frigidū reddas. Quis hoc negat? Nō tamē propterea uitio dandū eſt quod proſpere ex præſidio ſuccedit. Nec propterea q̄ mēſura eius deprehendi eſt difficilis, propterea q̄ defendendum. Siquidē ſi aliſiter liceret, tum ceteras hec̄ticās febres, tū maraſmō desanare, cōſultius eſſet tū tiorē uia inſiſtere. Nunc quoniā totum curationis momentū in refrigeratō humectandōq̄ coſiſſit, omnibus uero refrigeratibus auxilijs propter corporis horū gracilitatē noxa imminet, neceſſarium arbitror Thucydidis eſſe conſiliū, agētes aliquid uel periclitari. Quibus em̄ alia ſalutiſ ratio nō eſt, & quæ unica uidetur, ea dubia eſt; neceſſum arbitror hiſ eſt aduerſos periculū ire. Sed nec error ipſe, aut mortiferuſ eſt, aut irremediabilis. Siquidē quos in extingueſcēte febre aqua frigida in contrariū affectū tranſiit, hiſ licet in toto quod ſequitur tēpore calfaciēdo ſanare. Iam nec periculū par eſt, nec frigidi affectuſ, nec etiā ipſius remediorū. Indicauiſ nāq̄ tū priuſ in huiuſ operis ſeptimo, tum in lib. De maraſmo, tum ante hoſ in libris De tuenda ſanitate, fieri nō poſſe ut ſolidarū partium ſiccitas cōſummata ſaneſcit. Quod ſi fieri id poſſet, utiq̄ fieri poſſe ut nō ſeneſceret qui ea uiciuſ ratioē ueretur eſt. Si iugiter inſana bilis ſolidarū partiuſ ſiccitas eſt, tum expeditiſſima in eam per hec̄ticas febres uia patet, meliſ eſt hominē in frigidā intemperiem trāſferre, ac cui curationē adhibeamuſ habere. Quippe quid fecerit poſtea noxā oppugnauerit. Qui uero peſtiferā inſiſtere uiam ſinet, eſt deſperatā ægrotanti ſalutē fecerit. Quanto itaq̄ ſatiuſ eſt aliquid nō nulla fiducia, uel cum periculo facere, q̄ ipſe adempta certo perire; tanto proſectio ſatiuſ eſt potētibuſ præſidijs pugnare, q̄ nihil agere. Ergo illico eoſ qui hec̄tica febricitat, omni ratioē refrigeremus, ante q̄ progreſſi in maraſmū peruenerint. Quæ aut̄ maraſmū planē iam occupauit, hunc ſanare ne tētaueriſ. Nam etſi calorem eiſ extinxeriſ, attamē ſiccitas, quæ reſinquit, ſeneſcutiſ ritu hominē cōſiciet, tantū per nimirū uiciuſ quoad ſolidę eiſ partes reniti aduerſuſ ſumma ſiccitatē ualebūt. Atqui maluerit fortalle propinquorū ægrotantiſ aliquiſ, atq̄ etiā ægrotantiſ ipſe, aliquo ſpatio in ſenſu habitu uiuere, q̄ ſilico mori. Itaq̄ curare hoſ quoq̄ cū præſatione expedit, ac in alterū tranſferre maraſmū, quē iam nominare ſenſu ex morbo inſueuimus. Licebit em̄ hiſ non tantū plures dieſ, uerū etiā meſeſ uiuere. Ego nanq̄ cū iuuenē quendā qui ita laborabat, ſanallē, reſiciens deinde, ac ſenilē eiſ imbecillitate pro ſenū ratione tractans, non ſolū in meſeſ, ſed etiā annos uiuū ſeruauit. Nec eſt q̄ hic eiſmodi maraſmi curationē audire deſideret; ut potē tū in huiſ operis ſeptimo, dum ſiccā & frigidaſ intemperieſ ſanauimus, traditā poteſtate; tū operis De ſanitate tuenda ea in parte quæ ſenibuſ alēdiſ eſt delegata. Præſens aut̄ liber nō maraſmorū, ſed hec̄ticarum febrū curationē docendam promiſit. Ex quo genere ſunt & quæ *καρπομεδίου* græce dicuntur, de quibus tū alia nō pauca diximus, quæ non modo rationiſ, ſed etiā uſuſ iudicio pro-

bauiſ, tū illud ſcilicet non oportere balneū (ut Philippuſ facit) formidare; qui cauſiſ ſolemiſ eo utitur, ad eum modum quo in cæteriſ ſolemiſ febribuſ, quas uel phlegmonæ, uel putreſcentēſ ſucci accēderunt. In hiſ enim niſil offendeſ, etiā ſi in frigidā ægrum non merſeriſ, ſed eum (ut moſ eſt) profunduſ primū tepida, poſt ea quæ ueluti ex ſole tantū aſtutuo tepet, mox hoc etiā paulo q̄ illa frigidiore. In hec̄ticis uero febribuſ, id quod re medium affert, calidā ſolium non eſt, ſed frigida, ad quam balnea ægrotantiſ præparāt corpus, æque ut reliquorum omnium qui per ſanitateſ lauuntur. Porro nō propter id modo uidetur mihi Philippuſ ignorare, q̄ ſalubriſ reſ balneum ſit in iſiſ qui maraſmo de hec̄tica laborat, q̄ tam extenuatōſ in frigide ſolio tingere nemo audet, aut ſaltem ultimā aquā ipſiſ frigida inſundere; ſed etiā quod ſæpe altera cōiuncta febris eſt, quæ uel ex humoribz putreſcētia, uel phlegmone ſit excitata, tū uero quod talī hec̄tica laborantiſ mortiferū eſt uitū. Ac propterea quidā non recte omniſ quæ hiſ exhibentur, culpāt, cū non ſit illiſ imputanda culpa; ſed affectui. Ergo recenſitiſ denuo quæ diximus, huiſ diſputationi ſinē imponemus. Quicunq̄ hec̄tica febre laborat, atq̄ ex hiſ præcipue qui iam maraſmo de hec̄tica febricitat, modo hiſ alia nulla febris uel ex ſolo putreſcente humore, uel cum phlegmone ſit adiuncta, eoſ omneſ audaſter lauiſ, ſed proſuſ citra omnē laborē; ne uires reſoluat. quod ipſum cū noceat uehemētē ocaſio ſit balnei culpandi. Quod citra laborē dixi, id ita intelligo. Volo eger in balneum ſuper lectulo deportetur, paratamq̄ ad manum habeat calentē ſindonem, ſuper quam, in prima trium domorum balnei nudatuſ trāſportetur. Sint autem quatuor qui hanc teneāt, à quoque ſini unus. Ac ſi quidē prima domuſ ſatiſ calida ſit, æger in ea nudatuſ, in ſecundam portetur; ſi tibi frigidiſ uidetur, non nuduſ, ſed coopertuſ, uel alia ſindone minime ſitigida, uel talī alioq̄ inuolucro. Conſtat autem & ſindonem eam qua portabitur, eſſe ualentiorē oportere. Aut ſi imbecilla per ſe ſit, duplicari eam erit ſatiuſ. Eſto autem media domuſ non tantum ſitu media, ſed etiā temperiant, ſcilicet, prima calidiſ, quanto eſt tertia frigidiſ. In hac domo oleum tepidum eſto, quo æger ſuper ſindone illatuſ protinuſ perfundatur. Hoc factō tertiam ingreſſiantur domum, ducantq̄ hominē ubi ſolium eſt. Sic ut per treſ balnei domoſ duntaxat tranſierint; Per quas nec celeri gradu tranſibunt iſiſ qui ægrum portāt; ſed tantū per in prioribuſ domibuſ morabuntur, dum in altera trāſferatur tantum à lectulo. In media uero dum perfundatur oleo. Eſto autem & aer cuiuſque domuſ, nec ſummo calore, nec etiā frigēſ; ſed ad modum temperatuſ, & modice humiduſ. Id fiet, ſi aqua temperata ex labro ſit liberaliter proſecta, ſicut perſuauit per omneſ domoſ. In ipſa uero ſoliſ aqua medioꝝcriter moretur, idq̄ in ſindone ſuſtentuſ, nulla inſuſione aquæ, cuiuſmodi in alijs uti ſolemuſ, adhibita. Immo nec capiti eiſ inſundi quicquam ue-

lim: cum sit satis id quoque bis terue una cum toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter deorsum sindone, acrumum per quatuor iuvenes qui eum portant, leuata. Mox hinc eductus, in frigidā semel totus tingatur, ne uel breuissimo quidē spatio illic moratus. Porro qui eum portat, tum reliqua omnia curiose esse edoctos cōueniet: tum celeritate tingendi, nō documēti modo, uerumetiam præcepti loco præter cætera habere. Protinus uero alter paratam habēs sindonē ipsi iniiciat. Tum in lectulo collocatus, primū spōgijs detergeatur, deinde mollibus linteis. Nec committent qui eum detergebūt, ut uiolentius eū cōtrecent, sed quoad fieri potest blandissime. Post hæc unctū ac uestibus amictū, rursus super lectulo in domū ubi ci batur, reducent ac nutrit. Sanē dictum supra est in horum commentariorū septimo, ubi sicca uentriculi intemperie sanauimus, domū balneo debere coniungi. Ac de balneis quidem satis (quod ad rem propositā spectet) hæc enus.

11. Sequi prædicta uidetur, ut de nutrimenti facultate præcipiam. Sanē humidū esse, ac frigidum quod hectici febribus sit conductū, nemo nescit. Eiusmodi uero sunt, tum ptisanæ cremor cum frigidus sumitur, tum alica similiter ptisanæ cremori condita. Id uero est ex aqua, & exiguo porri, & anetho: tum sale, oleo, & aceto. Cōmodus præterea ijs qui sic laborant est, & exiguis in aqua frigida panis. Ceterū, nullius horū pura frigiditas esse debet, sicuti potioris. Quippe hæc maturē tum incalescit, tum per corpus digeritur. Illa cum plussimul teporis in uentriculo morent, ipsum fortassis refrigerant, si fuerint immodice frigida. Vbi uero febris iam diu moram traxerit, dandum quoque asininū lac est, sed diligenter obseruato ne in uentriculo cogat. Id uero interim ipse nos eger docebit, ut potest suæ ipsius naturæ peritus. Interim id a nobis inueniendū est, paulatim ad eius usum accedentibus. Ac expedita quidem ratio est ad symptoma declinandū, si mel illi admisceas, aut salis quo uescimur exiguum. Ceterū abstinendū (quoad fieri potest) in hectici febribus a melle est: atque idcirco etiam a mella. Quippe protinus uertitur in bilē, & sicciore acriorisq; calor febris reddit. Dandus itaque principio est asinini lactis non plus cyathus, uel uti à me datū uidistis: sed inducta in ipsum cubi culum asina, quo nullum tēpus interponatur, sed æger id protinus bibat, contēplanibz diligenter nobis, ac cōferentibus arteriæ motū qui à sumpto lacte agitur, cū eo qui ante id sumptū fuit. Si enim corruptū sit, paruos & inæuales inuenies pulsus, cuiusmodi in oris uentriculi cōpressionē accidere nosti. Sin aut corruptū nō sit, et maiores et ualētiores redditos inuenies. Itaque etiā licebit, cū postea exhibebis, modū lactis dimidio cyatho adaugeas, ac deinde rursus aliū dimidiū adicias, sicq; sensim usq; ad mediocrē modū addas. Modū uero non lactis tantū, sed etiā reliquorū ciborū omnīu metæ quibus attentus eris, in septimo huius operis, ubi uentriculi sanauimus intemperies, sunt traditæ. Nam cum primū in eo libro sicca eius intemperie hæc

anus inueteratā proposuerimus, ut totū iā corpus gracile reddiderit: indicauimus quo pacto quis si mulambo probe sit sanaturus, tū uentriculi intemperie, tū corporis gracilitatē. Ideoque fortasse sit satis, quod minus multa scribamus, ad illū telibrum pro reliquis omnibus cibis remittam. Cum enim similes affectus sint, similia nimirū remedia postulant. Verū quāto hectici febrili affectus est calidior, tāto utiq; frigidiora requirit auxilia: & simul maiorem sollicitudinē ne ualētibus auxilijs uteres quicquid lædamus. At qui iam marasmo urgeat, eos sicut dictū est, lauabis. Quos uero hectica premit, nondum tamen marasmo tentantur, eos licet etiā sine sindone subiecta laues, utpote uiribz adhuc ualētibus. Inferri tamen & hos in domū uel super lectulo, uel saltē alio quopiam ferculo conueniet. Mox ipsos seipsis ingredientes ad calidam duci, quod in ea morent. At qui ex his minus sunt ualentes, eos nō tutū est permittere in frigidā natationē descendere: sed foris potius ipsos perfundere, primū tepida, secundo frigida. Esto aut tunc preparata in labro aqua frigida (quanta, sex eo semel hausta perfundere simul totū iam lauatum possit) ea frigiditate ut nullā evidentē qualitatem nec prius frigidarū nec tepidarū aquarū præferat, sed qualem ea quæ fontana uocatur, quæ & frigoris quod ferit, & teporis quod resouit, est in medio. Ac si liquidē omnia curiose administrabunt, tum quod ad balneum, tum quod ad nutrimentā spectat: utiq; sanandi iam eius quem marasmo cōsumit, spes est. Sin error uel in uno committatur, is reliqua subuenit omnia. Quippe cum extitialis horum affectus sit ne leuissimū quidē errorem tolerat, ac si quis talis est seruatus, huic carnosam portionem marasmo occupauerat. Ipsi uero solidis siccatis fieri nequit, ut homo prorsus peranesset: sed omnino uel statim eū febris ipsa iugula uenit, uel postq; in eū affectum est translata, quæ senitū ex morbo uocamus. Nam primū eiusmodi febris propriā partium humiditatem, ex qua nutriuntur, depascit. Hinc uero ad carnosum genus transit, quod circa uenit fibrosam tum mēbranofas partes solidorū corporum hæret. Ita deinde ipsas solidas populatur. Siquidē in singulis simpliciu ac primarum quas uocant partium (ut in dissectionibus es contemplas) alia portio substantiæ eorū est ueluti fibrosa, alia mēbranosa, alia carnosā, sicut exēpli causa cum uenā unam tunicā habeat, & eam tenuē, licet fibras in ea inuenire multas, quæ sint araneosis quibusdam intersitis cōtextæ, quibus utriusq; ipsa propria uenæ substantia adnascitur. Hæc alia in alijs partibus habetur, nec ullum commune nomen est nata. Cæterum docedē causā nihil uetat eam carnosam substantiam uocare: uel certē huius particule quādam carnem, quæ in uentriculo quidem sit alia, in iocinore alia, similiter in arteria & musculo. Vocatur aut caro tātum ea quæ in musculo est, reliquarum nullam homines carnem uocāt præterquam admodū pauci: sed quæ in uisceribus, cetero iocinore, renibus, liene, & pulmone uiuantur, eas ægyptij *μαρμα* (quasi affluōes dixeris) græce uocāt. Quæ in

intestinis, uentriculo, stomacho, & utero sunt, si-
ne nomine relinquunt. Tu tamen de nominibus
non laborabis. Illud potius intelliges, singularum
particularum substantiæ molem ex tali maxime
completam esse naturā, quæ utiq; (ut in sinuosis
uisceribus uidere licet) & perire, & regigni potest.
At uero nec fibrosa, nec nervosa membranosaue
natura eandem generationē habere cernitur. Nec
contingit eiusmodi singularū partium fibras à ma-
lignis febribus liquari, sicuti carnes; quando ani-
mal ipsum priusquam hæc prorsus sint siccata, inte-
remerint. Sanè sunt & quas marasmodos febres
uocant, uniuersæ ex earū genere quæ colligunt.
Sed in eo differūt, q̃ quæ portio carnis in his col-
ligatur, ea semper uaporis uice digeritur; in illis
defluit in uentrem. Cernitur hoc etiā in carnibus,
dum in craticulis torrentur, euidenter fieri. Si-
quidem ab aliquibus plurima liquatio defluit, deci-
ditq; in prunas largiter. Aliquādo nihil omnino,
quod utiq; sentias, defluere uidetur, etiā si par sit
prunarum subdita copia. Quippe feris suisbus, aut
nihil omnino, aut planè minimū est quod defluat;
cicuribus uero plurimū. Quantoq; magis uel adipe
uel carne animal abundat, tāto profectò quod
ab ipsis carnibus, dum in craticulis torrētur, defluit,
cernitur copiosius. Ad eundē itaq; modum in cali-
dissimis febribus si carnes humidæ ac molles cum

A adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehen-
das. Sin sine adipe & siccæ sint, in marasmodos fe-
bres transeunt. Clarissimò huius rei argumento
sunt infirmi, qui per alium, quod liquatur, excernunt,
qui nisi prius uel morbi uolentia, uel medicorum
inscitia moriantur, in marasmodos febres
incidūt. Si quidem quoad materiā uberem habēt,
hanc colligāt ubi illis tum adeps, tum caro mol-
lis defecit, duras & egre liquabiles carnes siccant,
à quibus propter siccitatē nihil defluit: ueluti nec
ab ijs quæ sale sunt siccata, si quis has quocq; torre-
re parās pari cum alijs igni admoueat. Nam & sic-
ciores earum carnes reddentur, & corij ritu dura-
buntur: nec defluet ex his ulla sensibilis liquatio.
B Hæc igitur cum scias; etiā colligantium febrium
ijsdem methodis curam ages, tum ad frigidam ex-
hibendam quamprimum proptans, tum ijs quæ
humectent & refrigerent nutriendis. Multam uero
inimicissimam censēbis, qua tamen uti plerosque
medicorum in eiusmodi febribus uides. Verū de
colligantibus febribus differere in posterum li-
cebit, æque ut de ijs hecicis febribus quæ in pesti-
lentijs contingunt, cuiusmodi ea est quæ nunc pu-
blice grassatur. Dicitur namq; & de hac inter pesti-
lentes febres. Reliquarum uero tum hecicarum,
tum quas marasmodos uocamus, abunde mihi sa-
nationis methodum tradidisse uideor.

ARGUMENTA VNDECIMI LIBRI

Cap. 1. Argumēta trium præcedentium librorum &
præsentis. Inquirir curatorias indicationes febriū, quæ
ex putrescenti humore excitātur, & duas statuit: unam
ab affectu, alterā ab ægrotantis temperie. Cap. 2. Ex-
emplis declarat quo pacto in usum accomodari debeat
indicationes speciales, ex magis generalī sectione inue-
ntæ, & ab effectu sumptæ: ut in paradiigmate febris. Potes-
enim dicere absoluto sermone, febrem per contraria sa-
nandam esse: siue per ea quæ sunt contrario tēperamen-
to, aut per frigida: Vel diuidendo dices febres sanandas
esse per ea quæ effectu frigida sunt, aut per ea quæ pote-
stiate, aut per ea quæ ex accidenti refrigerat, aut enā ista
omnia coniungendo. Cap. 3. De iudicationibus quæ
à uiribus febrientis in putrida febre sumi possint. Et pri-
mum in genere, quod uirtus sui custodiam per similī
exhibitionem, ut morbus ablationē per administrationē
contrariorū præscribat. Cap. 4. Viam præstruit
curandæ febrei ex putrefactione: cuius etiam causas hic
delinat, ut supra lib. 9. cap. 3. Nempe quæ putrescūt ca-
lida humidatq; esse, & difficilem transpirationē habere.
Cap. 5. Quæ à uiribus in febre proposita indicatio su-
matur; Nempe si uires ualentes sint, audacter uacuatib.
prædictis utendum esse. Item etiam tenuissimō uti uicē
licere: Dum uero sint infirmiores, non licere sine graui
noxā. Infituit etiam continua febrei laborātī tempus
cibi offerendi; & inter alia nō interdicit frigida potione.
Alter. De nutrimenti in febribus quantitate, quali-
tate, tempore. Cap. 6. Continūā febrem accensam ex
putredine humorū aliquo docet conuenire cum diaria
quidem, quod unicam habeat accessiōnem: cum inter-
polata uero, tū quod similiter ex putredine oritur, tum
quod pluribus diebus perdurat. Synochi autē lib. 9.
cap. 2. & 3. dicat febres, duo cum diarijs communia ha-
bent, nempe accessiōnem unicam, & putredinis absen-
tiam. Cap. 7. Febrium putridarum differentia gene-
rales & propriæ indicationes ad curā earundē febriū,
quæ ex putredine nascuntur. Cap. 8. De generatione

& natura putredinis: quomodo ei inueniendū sit reme-
dium, & quomodo causæ transpirationis prohibita op-
pugnentur. Et primum de calore natuo. Cap. 9. Fe-
brium continuarum cum putredine cura per cibū, po-
tum, pharmaca, potiones, lauacra calfacientia & refrige-
rantia. Conferendas esse indicationes à febre, putre-
dine, & eius causis. Cap. 10. Inuenitis iam indicationi-
bus, per methodum resolutiuam, quod ad curationem
pertinet sic administrandum est. Duæ statim indica-
tiones se offerunt putridam curātī, una à febre ipsā, alte-
ra à putredine: utraq; duplex, respectu scilicet, ad id
quod præsens est curandum, & altero ut inhibeatur id
quod in generatione est. Iam putredinis quod in gene-
ratione existit perspiratio obstrukione impedita facit:
quam caribus & quod retentū est uacuandū per ea quæ
obstruktionē aperiunt, & quod retinendū est prohiben-
do per ea quæ cōspellunt affluxum. Cap. 11. Curandū
nem celierem futuram, si nullum symptoma oboriat-
tur, quod contrariam priori sanationi præcedentis capi-
tis exigat. Sin minus, uel periculosa, uel tarda erit cu-
ra. Plurima sanandi instrumenta paranda esse: uix e-
nim unum aliquod inuenias quod citra ullam noxā ma-
gnifice proficit. Cap. 12. Per digressionē autem uerisim-
mam esse hanc sententiam, Quod contraria contrariorū
sint remedia. Cap. 13. Persistat in repetēdis morborū,
causarum, & symptomatū generibus: quibus exactius
intelligendū tertius & 4. de symptomatis liber legen-
dus est. Glutinosi opponendum quod detergat.
Quando contraria, quando rursum similia adhiberi
conuenit. Continentiū ex obstrukione febriū in uni-
uersum septē indicationes producēdas esse. Cap. 14.
De phlebotomia usu in cōtinua febre priuata. Cap. 15.
Cōtra diatriarios. Localib. medicamentis non esse præ-
terquā in corpore uacuato & puro utendū. De reper-
tientiū & resolutiū cataplasmatū usu & loco. Ven-
triculo & iecur in omni febre astringentibus esse cor-
roborandum, quod sequenti etiam capite prosequitur.

Ignauia prodesse aliquando imperitis, ueluti cum li-
neamentis seducti, affectum iocinoris tribuant praeor-
dijs aut contra. Cap. 16. Multa medicamenta, & fer-
me uniuersi humani corporis insignibus uisceribus opi-
tulanti, ponit ob oculos. Quibus cataplasmatibus doctio-
res etiam nostri saeculi medici fouere pergunt affectus in-
ternos uentriculi, iecinoris, splenis atque aliorum curados.

Cap. 17. De uictu instituendo in phlegmonis uentri-
culi & pectoris: & cataplasmatum consideratio quae con-
gruat membrum spiritualibus: Et de cucurbitis. Cap. 18.
Cucurbitulas ante totum corpus uacuat phlegmonis ce-
rebro uetat adhiberi. Reprimenda uero (cuiusmodi est ro-
faceum) ab initio admitti: quibus commodum admiscet,
ut altius descendat, acetum: Quod etiam hodie medici
imitantur. Cap. 19. Qui meatus aut qui pori sint ape-
riendi & fluxiles reddendi, pro quorumuis uiscerum apo-
stematum superfuitibus expurgandis. Cap. 20. Bre-
uitatis suae tractationis in phlegmonis interna cura da-
rationem reddit. Deinde balnei in febre curanda maxi-

A mam utilitatem recenset: quod in quatuor febri uisum
dum decernit, si horum trium nullum obstat, horror, im-
becillitas alicuius praecipui uisceris, multitudo crudi
humoris in primis uenis, nempe quae circa iecur, & melen-
terium sita sunt. Aliter, De balnearum & cataplasma-
tum relaxantium usu noxaque. Cap. 21. De tempore ui-
ctus administrandi in febribus capita quaedam: ut, Vbi
phlegmonem iecur aut uentriculum praehendit, pernicio-
sum est ante accessione cibare. Vbi calor siccus &
squalens est, statim humectare uictu oportet: Vbi co-
tra siccitatem urens, expectandum donec calor se re-
mittat: & cetera.

Aliter.

Febrium curatio quae ex humorum putredine oriun-
tur. Quo pacto curanda sit humorum redundantia,
& eorum crassities. De cataplasmatibus & perfusio-
nibus, quae uiscerum inflammationibus applicantur. De
balnearum scopis.

GALENI METHODI MEDENDI ID

EST DE MORBIS CURANDIS,

Libri undecimus.



FEBRIVM quas putrescens ac-
cedit humor, primae remedio-
rum indicationes dictae prius
sunt. quo loco eas quaedam-
modo & duas & tres efficias, do-
cui, etiam si uelis unam. Nunc
uero quod in alijs febribus se-
cimus, ut ex primis generibus

diductis, ad ultimas usque species diuidendo perue-
niremus, idem & in proposita differentia facere ten-
temus. Illud prius admonentes, quod etiam in li-
bris Depulsorum differentia ostendimus, siue pri-
mas differentias, siue prima genera, siue maxime
generales ideas, siue quomodoocumque aliter appella-
re libeat, modo exactam rei notionem serues, nihil
interfuturum. Ac febrium quidem ipsarum quemadmo-
dum eas, quas diarias uocamus, cures, in horum
commentariorum octauo exposui. pari modo & quae-
admodum continentes, in libro qui illum sequitur.
atque etiam quemadmodum tertias, hec tamen scilicet, in
eo qui illi succedit, qui totius operis est decimus.
In quibus non propria modo cuiusque, sed etiam com-
munium pleraque explicauimus. Nunc quemadmodum
quae ex putrescentibus humoribus excitentur, me-
thodo sint sanandae, aggredi statui. Quae curatio-
nem indicant, prout in duo diuiduntur, affectus
quem curamus, & partium aegrotantis temperies
sunt. Licet autem ea (ut dictum est) & una summa
interpretemur, dicentes unam esse omnium morbo-
rum communem curationis indicationem. nempe co-
trarietatem ipsam, qua rursus diuisa, duas existere:
morbo scilicet ex his qui sibi contrariae sint, adhiben-
da remedia indicant: laborantis uero temperie, u-
na cum ipso morbo, contrarietatis mensuram desin-
niente. Porro dictum in illis est ambientem quoque
nos aerem unam efficere indicationem posse. & cum
prima sectionem in duo tantum facimus, ambien-
tem uel aegritudinis causis, uel sanitatis annume-
randum esse. At uero cum sanitatis causae sint om-

nia quae sanitatem efficiunt, una certe earum est quod
auxilium remediumue uocatur, quod pro uarijs
rationibus & ultima & prima sanitatis causa recte
dicitur. Quippe tempore ultima erit, propterea quod
tempore & natura & ars & fortuna priores eo san-
nitatis causae sunt. Prima uero est, quatenus id labo-
rans corpus tangit, alteratque eius affectum, ac pro-
pter alterationem quam id facit, cum aegra corpo-
ra ad sanitatem perducuntur, ars & artifex sanita-
tis causa sunt, non quod hanc morbos primam sum-
moueat, sed quod alia materia ad id comoda inter-
cedente, quod auxilium appellatur. Siquidem san-
guinis missio, quam phlebotomiam uocant, ipsa
quidem per se hoc quod iam dictum est, nomen pos-
sidet. At cum homini malum affert, ex causis sit mor-
bificis: contra cum prodest, ex sanis. Ac propterea
cum proficit, uocatur auxilium, sicut profecto om-
nis materia quae quomodolibet corpus alterat,
quo tempore iuuat, auxilium dicitur. Adeundem mo-
dum & ambientis proprium pro natura sua nomen
est aer. Relatus tamen ad nos: aliam auxilium, & sa-
nitatis causarum una efficitur: aliamque contrariam,
nempe morbificam. At quoniam aerium ex praesente
coeli statu, tum anni tempore, tum regionis
natura, suae in humido, sicco, calido, & frigido mu-
tationes accedunt: ex illorum rursus uno quoque
aliam particularem indicationem oriuntur. Ac fortuna
quidem, & ars, & artifex, materialium interuentu agunt:
natura uero per se ipsa. Ea ex tribus his partibus
constat, ex spiritibus, & earum partium, quae uere dictum
solidae, substantiae, (quas alibi ex semine genita-
li conditas esse monstrauimus) & tertia ab his car-
nosa, quae cuiusque particulae est sua. Singulae autem
dictarum trium propriam pro natura sua tum qua-
litate habent, tum quantitatem. Ac qualitas qui-
dem earum ex congrua temperie humidum siccum, calidum
& frigidum consistit. Quantitas uero solidarum par-
tium par semper manet, sed his qui adhuc in auge-
ntur, numero duntaxat: qui uero absoluti iam sunt,

etiam magnitudine. Carnosa uero substantia magnitudo uariatur, etiam si præterea non augeatur animans. Pari modo & spiritus substantia tantum non quolibet momento, tum minor, tum maior conspicitur. Ergo etiam supra ea quæ indicationes præstare prius diximus, uirtus uel sola ijs tribus substantiis, quas modo comprehendimus, simul enumeratis additur: uel si temperamentum seorsum sit discretum per se. Atque hoc ipsum rursus bifariam quoque, ut ostensum est, scinditur, & in originalem naturam, & in acquisititium affectum: sic nimirum, ut existis, & alij quæ prius dicta sunt, propria quædam cuiusque remediorum sit indicatio. Sæpe autem adscita temperies ad efficientes causas reducta, illis indicationem concedit.

2 Ad hunc itaque modum ex ætate, uitæ studiis, & consuetudine, indicationem remediorum suggeri diximus, consentireque inter omnes iam dictas indicationes. Si quidem in ijs quæ magis sunt generales, contineri semper quæ magis sint speciales. Agi uero in usum quæ magis sint particulares, scilicet ex magis generalium sectione inueniatur. Prima namque omnium curationis indicationum quæ ex ipso qui curat morbo accipitur, contrarietatem præscribit. At quoniam morborum plura sunt genera, cuiusque eorum sua erit contrarietas. Verum cætera in præsens omittatur. Proponatur autem nobis ad præsentem disputationem duxat, morbi quæ curamus genus in intemperie esse positum. Id igitur per contrariam ipsi intemperiem sanabitur. At quoniam uniuersum febrium generis intemperies est calor, nimirum per frigiditatem curabitur: sic omnes indicationes inter se concordant. Nam siue dixerimus absolute sermone febrem per contrariam sanandam esse, siue adiecerimus, per ea quæ contrario sunt temperamento; nulla pugnantia in sermone erit. Similiter nec si per frigida sanandam febrem esse dixerimus. Sed nec si diuidentes id dicamus aliquando sanare nos febrem per ea quæ actus frigida sunt, aliquid quando & per ea quæ potestate, aliquando & per ea quæ ex accidenti refrigerant; aut etiam ista coniungentes, nulla pugnantia cum ijs quæ dicta sunt in sermone erit. Pari modo nec si quis dicat, quæ actus, potestate, uel ex accidenti calfaciat, ea febres deteriores reddere quam prius fuerant. Contra quæ actus, potestate, uel ex accidente refrigerent, ea febres sanare. Quippe indicatio quæ ab affectu sumitur, in tot numero particulares indicationes est diducta. Hæ uero rursus ipsæ particulares indicationes materias inueniunt, iuxta eas methodos quæ in opere. De medicamentis sunt traditæ: quando illarum principium id est, in quo finita est curandi affectus diuisio. Ac maxime quidè propria in soluendo morbo intelligitur curatio, sed per abusum etiam circa missum genus, tum ex uera curatione, tum prouisione, quam *προφυλακῶν* appellant. Ac diarium quidem febrium, & hecticarum, uera & propria curatio est. Earum uero quæ ex putrescentibus excitantur humoribus uocata curatio, *προφυλακῶν* quoque sibi adiunxit, cuius officium est causam, quæ morbum creat, adimere. Sanè nomi-

Galen.

natur hæc ipsa quoque artis pars, curatrix, quæ utique ab ea quæ pure syncerèque prophylactice dicitur, in eo distincta est, quod sub hac iam sensibilibiter ex ipsa causa morbus est genitus, in prophylactice uero est futurus, atque nominibus quidem quisque prout uolet utatur: (id enim semper monere oportet) sed remediorum indicationem quæ a rebus singulis præstetur, seruet: quando si uel unam aliquam earum prætereant, ad portionem tum magnitudinis illius, tum facultatis, curatio claudicabit.

3 Porro quemadmodum ab affectu ad materias præsidiorum peruenimus, eodem modo ab singulis reliquorum generum primorum descendendum ad eas est, ueluti à uirtute. Nam ea morbo ceu aduersatrix est opposita. Propositumque medico est huic omni ratione opitulari ac subuenire. Ergo quis primus est à uirtute scopus, aut quenam indicatio prima? Nam hic quoque loqui pro arbitrio possis, scilicet ut uirtutem ipsam unum scopum ac primum statuens: quod uero ab ea indicat, alterum & secundum. Itaque cum monstratum sit uirtutem sui custodiam præscribere, sicuti morbum se tollendum, erit rursus in uirtute secundus scopus, ipsius custodia, sicuti in morbis, ipsorum sublatio. At uero custodia similium exhibitionem indicabit, sublatio contrariorum. Quoniam uero uirtutum substantiam ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis completur: ex ijs quæ similia sunt, moliri cuique suam *σπουδῶν*, id est custodiam conueniet. Spiritui ex respiratione ac transpiratione, & qui ex sanguine attollitur uapore. Liceat uero hic quoque uolenti, uel græce *ἀερωσις*, quasi aerationem dicas, uel sanguinis attenuationem, uel in halitum solutionem, uel utcumque libuerit appellare. Solidorum uero generi, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturam quæ in medio humidorum ac solidorum corporum est. Porro cuiusque horum modum ex conservando hæc substantia modo inuenies, qualiter uero ex ipsius temperie. Cum uero horum cuiusque uel optima temperies sit, uel aliquatenus uitiata: quæ quidè optima est, semper seruari debet: quæ uero omnino uitio non caret, hæc in sanis quidem uel seruanda est, uel alteranda: in ægris uero seruanda est, ea ipsa scilicet ratione qua prius ostendimus maximam esse à consuetudine indicationem, quippe uel temperamentum originale ipsam seruare, uel adscititium inducere. Præstari uero (ut prædictum est) modi auxiliorum indicationem ex eo temperamento quod iam præsens sit: ita nimirum sicut ex ætate, non quam æger prius habuerit, sed quæ nunc habeat. Cum uero diuersitas non parua sit in partium animalis temperamento, propriam quoque mensuram fore eorum quæ ipsi sunt similia. nēpe ei quæ terrea magis est, eorum quæ magis sint terrea. & ei quæ humidior est, eorum quæ sint humidiora. Ad eundem modum & ei quæ magis ærea est, eorum quæ plus huius substantia in se habeant: sicut calidiori, eorum quæ magis substantia ignea participet. Hinc uero iam materias particulares omnes in cibis, potione, aere, & omnibus peragi solitis, inueniendas esse. Vbi uero se-

tom. 6

m cum

cum pugnaverint indicationes aliquæ, superius comprehendens methodo ad ea quæ agenda sint inueniendâ utendum esse: perpenſis ſcilicet eorum quæ indigent, tum magnitudine, tum dignitate. Oſtendimus enim eligendas eas indicationes eſſe, quas digniora maiora quæ indicantia præſcribent ac dignitatem eorum, uel uitæ uel ſanitatís reſpectu iudicandum. Magnitudinem uero duplicem eſſe, uel propriæ ſubſtantiæ ratione, uel declinationis à naturali habitu. Ergo ab his iam methodis ægredum exercitemur in genere febrium, quod ex putredine naſcitur.

4 Quoniam putredo uel æqualiter in omnibus ſubſiſtit uariis, uel in maximis, maximeq; principa libus, (ea porro ſunt inter alas & inguina) uel una quapiam particula quæ uel phlegmonen in ſe habet, uel etiã citra phlegmonem, ueluti in foco quodam principium febris in ſe cõtenet, in ſingulis his differentiis ſeorum exercitari conueniet. Ac primum eam tractandâ proponemus quæ uel in maximis uariis, uel ſimul omnibus conſiſtit. Quæ igitur ex tali affectu oritur febris, planè neceſſum eſt ſynochon, id eſt continet eſſe. Nec fieri poteſt ut ea ſanetur, niſi inhibita prius putredo ſit. Porro ea inhiberi, cauſa manente, nõ poteſt. Quare ſumouenda ipſius cauſa eſt: ſi modo putredo ipſa prior, mox poſt ipſam febris ſanari debebit. Ergo quæ cauſa putredinis eſt, quæ ſe per omnia uafa æquabiliter diffundit: Sanè reuocare in memoriã prius cõueniet quanam aliàs putredinis indicata ſit cauſa; ac deinde cur pari modo in omnibus animalis partibus fiat, inquirere. Ergo oſtenſum eſt, ubi morborum cauſas reddidimus, illa tantum putrefcere corpora, quæ cum calida humidaq; natura ſint, neq; perſolata, neq; uentilata, in calido humidoq; loco maneat. Quod ſi in motu ſint, uentilenturq; ac perſent, poſſe ea non putria integrãq; ſeruari: poſſiſimũ quæcumq; corpora ſua ipſorum natura reguntur, ut animalium & ſtirpium. Ea nanq; (ſicut in opere De naturalibus, facultatibus eſt prodiſtum) ab initio congenitos ſecum motus habent, quibus ſuperflua excernant. Oſtenſum nõ minus & in alijs duobus libellis eſt, quanta ſit tum reſpirationis, tum pulſum utilitas ad perſectum uentilationemq; corporis, atq; eius natũ calorẽ tuendum. Itaq; ſi quid in eo manifeſte putrefcere debet, dictas ſpirationes impeditas eſſe oportet. At uero qui fieri poteſt, ut illa per totum animal ſiſtantur, niſi uel ſinibus uaforum ſtipatis, uel tota cute: Porro accidere in ſinibus uaforũ ſtipatio poteſt, uel ex uehementi extrinſecus refrigeratione, uel ex ſuccorũ qui contenti in ipſis extrorſum cõferſim ruerint, craſſitudine, multitudine, uel lentitia. Accidit hoc illis & ex ijs exercitationibus, quæ in palæſtra uel aliàs obeuntur, & itinere laborioſo, uel ambientis ſtatu, cum ex rigore in æſtum ſubito eſt mutatus. Nonnullis uero ſeruantes ex ira ſucci, ac foras ſimul impetu ruentes, dictas ſtipationes effecerunt. Quiſquis igitur propoſitam ſanaturus eſt febrem, hic ſimul cauſam eius adimat oportet, ſimul calorem qui in animali excitatus

ab ea eſt, refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille ſit refrigerandus, prius eſt dictum. Cauſam uero adimi oportebit propriã cuiuſq; naturæ inuenta contrarietate: utique ſi ex frigida cauſa ſtipatũ denſumq; redditũ corpus eſt, relaxato eo, omni ratione rarefacto: ſin ex obſtructione ita eſt affectum, hac recluſa. Quod uero recludet, hic quoq; ad contrarietatis indicationem attentus inuenies. Vbi nanq; abundantia humorũ eſt, hos uacuabis. Vbi craſſi ſunt & glutinoſi, tenues eos ac fluxiles efficies. Si plures cauſæ aliquando coibunt, omnibus per contraria occurras. Siquidem fieri poteſt, ut & coarctatum corpus ſit, & exigui meatus denſati, & multi ſimul ac lentĩ humores ſubſint. In eiuſmodi autem cauſarum complexu, ſi recte quæ prius comprehenſæ ſunt, meminimus; cepiſſe à ſanguinis miſſione conueniet: ac abundantia uacuata, tum ad extenuandos humores uenire: ab hoc ad remittenda quæ ſunt conſtricta, & rarefacienda quæ ſunt denſata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicatiue ſunt ſumenda.

5 A uiribus autem (quoniam has cibi, potiões, & ſpiritus certa menſura & apta qualitate exhibita, ſeruabunt, inuentus autẽ eſt quantitas eorum modus ex uirium ſubſtantia; qualitatis uero à temperamento) nimirum æſtimari debet, quemadmodum uires quæ corpus regunt, in his ſe habeant. Quippe ſi ualentes ſint, audacter uacuatiões preſidijs uteris. Hæc autem ab affectu morbi ſuerecepta. Sin infirmiores ſint redditæ, uacuatiõem re media cautius adminiſtrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi eſt deſumendus: Quippe cum uires legitimũ robur ſuum habent, & morbi ſummus uigor breui futurus expectatur, tenuiſſimo uictu licet uti. Cum ſint infirmiores, non licet ſine graui noxa. Sed adſicere ad nutrimenta tantum oportet, quantum eſt de robore uirium imminutũ. atq; ex his ſcopis accipiendus eſt nutrimenti modus, qualitas uero, ex morbi affectu, unã cum ſolidiorũ corporum, quod tum eſt, temperamento. Ab affectu, ſi is obſtructio eſt, quæ extenuet. A naturali ipſorum temperie, unã cum conſuetudine, prout etiam prius eſt deſinitum. Tempus uero nutriendi, quod quidem ad reliquas ſpectat febres, quæ ex putredine oriuntur, in progreſſu ſermõis dicitur. Quæ uero unicam tantũ à principio ad finem acceſſionem habent, (de his nanq; præſens eſt ſermo) in his facilis toleratio & conſuetudo ſpectari debebunt. quando cibus illis eo tempore eſt offerendus, quo facilius quàm in cæteris morbum tolerant: eoq; poſſiſſimum diei tempore, quo prius in ſanitate cibari erant ſueſi. Etenim facillime cibũ ferent, ſi ex his conſiderationibus aſſumẽt. Quod autẽ frigida quoq; ijs qui ita laborant, ſit exhibenda, cum ſcilicet iam ſucci concoquantur, & craſſitudo eorum extenuata eſt, id ex ijs quæ prius ſunt comprehenſa, manifeſtum arbitror.

6 Siquidem cum eiuſmodi febres communia quædam cum ambabus habeat, tum ijs quæ ex humorum ortæ putredine circuitibus quibudã accceſſionẽ habet, tum ijs quas diarias uocamus, me

rito in utroq; genere de ipsa mentionem facimus: cum unicam accessiōnem habeat ut diariæ, cæterum ex putredine orta multos duret dies. Itaq; unum cū diarijs cōmune habebit, duo cum ijs quæ ex putredine ortæ multos durant dies. Reliquum continentium febriliū (quas synochos uocant) genus duo habet cum diarijs cōmunia: nempe & q sine putredine sit, & quod absq; circūit. Tertium uero commune non est, cum subinde in quintum porrigitur diem. Atq; harū quidem cōtinentium febriliū prodita prius curatio est. Cōtinentium uero quas putredo excitauit, curatio, cum utriq; generi communis esset, etiam nos in ambobus locis de ipsa differere coegit. Cæterum substantia earū totaq; natura ex eo est genere, quod nunc nobis proponitur. In uno autem eorum quæ ipsis accidunt, cum diarijs conueniebant. Id fuit, quod una in totum totius morbi accessio erat. Ergo & curatio earum, unum hoc duntaxat cōmune cum diarijs habeat oportet: in reliquis autem omnibus bifaria diducat. Atq; aliæ quidē curatiōis indicationes, ex cōmuni genere earū quæ ex putredine sint ortæ, accipiantur: aliæ ex propria earū substantia. Ad eundem uero modum & cæteras natarum ex putredine febriliū differentias sanari conueniet: nempe (sicut sæpe prius dictum est) indicatione tum à communi ipsarū genere, tum uero à cuiusq; propria differentia desumpta.

7 Ergo denuo repetētes dicamus primū quot sint febriliū, quas putredo accēdit, in uniuersum differentia: deinde quæ nam sit ipsius generis earum cōmunis utilitū auxiliōrū indicatio: mox quæ sit singulatiū cuiusq; propria. Par est enim profectio & quod omniū earum cōmune est, cōmunem habeat indicationē: & quod in singulis est diuersum ac propriū, quātum à reliquis eiusdē generis est diuersum, in tantū & diuersam ab illis sortiatur indicationē. Sunt igitur natarū ex humoris putredine eiusmodi differentia. Vna ex eo quod causæ ipsius putredinis adsumt, uel non adsumt. Secunda ex eo quod per totum animal, aut eius partem aliquā, diffusa putredo sit. Tertia quatenus cū phlegmone est, aut citra hanc. Igitur considerandū nobis est quid nam commune habeat indicatio, quæ à causa sumitur adhuc manēte: quidnā ea quæ putredo ipsa prestat; ab his deinde, quid indicatio putredinis quæ per totū diffunditur animal, aut certe maxime principalia in eo uasa: quid eius quæ in una consistit parte: mox deinde earum, quæ in una quadā parte sunt, æstimabimus differentias. Quippe aliam esse indicationē eius, quæ cum phlegmone cōiungitur, ratio est: aliam eius quæ sine hac cōsistit; rursum in his etiam ipsis, aliam esse præsentē adhuc effectrice causæ: aliam uero hac summota. postremo cuiusq; causæ adhuc manentis differentias, per omnia quæ in specierū diuisione sunt inuenia. Siquidem hiciam destināt necessum est in indicationes, quæ ex curandis sumuntur affectibus. post has uero eas nimirum quæ ab ipsis curandis suggeruntur particulis, pro iam dicta methodo sumemus. Quibus si eas quæ à uiribus præbentur, adie-

Galen.

A cerimus, absoluta nobis methodus de febris omnibus à putredine incensis sanandis erit.

8 Ergo ordiamur ab eo quod primum in diuisione indicās fuit. Ea erat humorū putredo. Accōsideremus quibus maxime indicātibus, quibusq; indicationibus usi, curationē eius inuenire possimus. Principiū uero inuentionis, ipsa erit rei natura, qua de agitur. Etenim id quoq; in demonstrandis methodis didicimus. Quæ nam igitur est putredinis natura? Nempe mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelā, à calido externo. Non enim profectio à proprio calore corrumpitur quicquā: imō cōtra proprius quicquid in rebus subsistit, id gliscit, roboratur, sanū est, ac uiuit, dum proprio calore regit: ueluti nimirū ipsa animantium corpora tametsi plurimam substantiæ suæ portionem humidam & calidam sunt sortita, magnum tamen annorū numerum sine putredine, ac sana uiuāq; exigunt, si seruetur (ut mōstratum est) eorū proprius calor: in cordis quidē corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per cōmunitatē quā habent cum corde, tum per aliam quādam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutē, & transpiratio perspirationē dicitur. His uero latis, unā etiam naturalis calor læditur. Alter uero quidā alienus, ac præter naturam in corporibus excitatur, primū quidem ipsos succos propter humiditatē & putrefacit & corrumpit, spatio uero tum adipem inuadit, tum etiam carnem. Tanquam igitur in ijs corporibus, quæ non uiuunt, ac putrescunt, primum quātum eorum iam computruit, separant, dein ei quod reliquū est, in frigidū aerem sublatō, perspirationē refrigeratē moliantur: ita utiq; & putredinem, quæ in uiuis est orta, sanabimus, id scilicet qd iam corruptum est, omni ratione uacantes: quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante per spiratu, ad exactam symmetriam reducētes: ac uacuationē quidem illius per urinā, deiectiones, uomitum, ac sudores, moliamur. Post hanc dimotiones mediocres, unā cum ambiētis bona tēperie adhibebimus. Quæadmodū autē horum quodq; recte administrandū sit, paulo post æstimabimus. Nunc ad secundum in diuisione trāseamus: nempe quemadmodum quis causæ quæ putredinem excitauit, adhuc manentis remediū facillime inueniat. Est autem neq; in hoc difficultas ulla: quippe cum per contraria tollatur. Itaq; quoniam transpirationis prohibitio, putredinis occasio fuit, hanc arbitror summouere oportet. At ea cum uarijs generibus est orta, & densatis exiguis meatibus, & constrictis corporibus, & humoribus tum abundantia, tum crassitudine, tum lentitia sua obstruentibus: singulæ harum affectionū curandæ per contraria sunt. Densitas per ea quæ rarefaciunt. Constrictio per ea quæ fundūt. Abundantia per ea quæ uacuat. Crassitudo per ea quæ dissolcant: & lentor ijs quæ detergent. Ac si quidem totum corpus dictorum iam singula occuparint, etiam toti corpori per contraria est succurrendum. Sin unam partem quampiam putredo inuaserit, illi adhibenda

iam dicta sunt remedia. Sanè non eisdem omnes partes uacuationes medicamentare requirunt: cum & temperamentis, & posituris, & forma, & omni denique constitutione naturæ inter se dissideant.

9. Ergo quemadmodum singulis sit opitulandum, id postea pro conueniente sermonis ordine disquiremus, cuius initium à putredine, quæ totum corpus occupet, quæ ipsa còtinuas quoque febres, quas synochos uocant, excitet, faciemus. Ergo à corporibus, quæ sic afficiuntur, expellenda quæ putrescunt, per urinas & aluū & sudorē sunt, quod si ad os uentriculī aliquando sua sponte impetum capiant, etiam per uomitiones. Aliter autem nō est quod ea præter naturā irrites. Ac eorum quidem quæ iam dictas uacuationes promoueant, nō parua materiæ copia est: sed maior eorū porciō, cum calida siccatæ facultate sit, febrem auget. Itaque deligenda medico sunt ea quæ citra calcificationem siccationemque valentē supradictas uacuationes præstent: cuiusmodi sunt cremor ptisanæ, & aqua mulsa, & oxymeli, & apomeli, & apij radix in aqua, quæ potui datur, incocta. Hæc autem ipsa uentri quoque sunt idonea. Quis nihil reddat, inijcienda per clysterem aqua mulsa cum oleo est. Sanè totū corpus, priusquā id uacuaretur, rarefacere non expedit, ubi uacuatum est, utique licebit id medicamentō aliquo, cui calor tepidus inest, rarefacias: cuiusmodi est quod ex chammælo conficitur. In hoc tempore si uinū quoque aquosum bibatur, id omnes uacuationes promouerit, idem faciat & temperatū dulcis aquæ lauacrum. Quod si appositū aliquando in dictione uocabulum dulcis non sit, utique id subaudire debebis, certo sciens de eo nos in febri- ciantibus lauacro semper loqui, nō bituminoso, aut sulphureo, aut aluminoso, aut chalcanthode, aut falso, aut ex marina ipsa. Cæterum, ubi magnitudo febris obstat, sicut in continentibus: nec uinū est utendum, nec lauacro, nec ijs quæ habitum rarefaciunt unctionibus, sed aqua frigida, sicut prius diximus pota, in his febribus est aptissima: nisi tamē aliquid eorum quæ prædicta sunt, hanc quoque prohibeat. Quippe ipsius febris frigida pota perpetuō est remedium: non tamen putrescentiū humorum per aluum, urinas, uel sudorem uacuandum. Quo magis exercitatu esse in ijs, quas nunc tradimus, methodis oportet: ac in ægrotantibus cōsiderare, & quæ sint ipsius febris remedia, & quæ ipsius, ubi per se sola subsistit, putredinis: quæ rursum efficientis hanc causæ, atque huius quoque, cum per seipsam subsistit. Quippe non semper inter se consentiunt hæc omnia, sed plerūque aduersantur. Quo casu memores eorū quæ didicimus, id quod maximum omnium est aggredi oportebit, atque ei uel soli, uel magis quam cæteris subuenire. Sanè scire licet, difficile esse, acrius iudicio indigens, febrem, putredinem, & effectricem causam, ubi scilicet ipsa quoque adest, inter se cōferre. difficilior tamen est si uires quoque cum illis unā conferre uelis: quod utique sicutante cōprehensum est, propter uitę ipsius respectum semper est necessariū. Aliquando uero & ex accidenti, sicut ad morborum sanatio-

nem. Hoc uero me ostensurū promisi. Siquidem quod putrescit, si uestis esset, aliud uē inanime corpus, utique ex ijs duntaxat quæ prædicta sunt, indicationem caperemus. Nunc cum in uiuente corpore putredo concipitur, quod tum alterare potest, tum concoquere, tum utile reddere quicquid putrescentium ueluti semiputrescens seminaliumque est: utique facultatē eius, qua naturaliter cōcoquit, excitans firmansque, quæ putrescētia sunt, lēnabis. Itaque etiā tum maxime eos cum fiducia, uel in balneo lauamus, uel ijs quæ habitum rarefaciant, medicamentis utimur, uel aquam frigidam, uel uini bibendum damus, cum notas humorum concoctionis cernimus. Neque enim pulsus duntaxat uires ad eiusmodi agenda, firmas requirimus, ueluti nec eius facultatis, quæ uolūtarium motum præstat: sed sicut est dictum, ipsius potius concoctionis. Ergo si & uires cunctæ ualentes sunt, & febres ardentissimæ, & concoctionis notæ planē euidentest, frigidam hominī dare audacter debebis. Constat namque talem hominem senem nō esse, ex quo omnes illi uirtutes ualentes esse proposuimus. Quod si etiā bona corporis habitudine sit, quod *ὁστρον* Græci uocant, tum status cœli calidus, ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquā lædetur. Eiusmodi namque temporis opportunitate uis qui sese in frigidam coniecerunt, & protinus omnes sudarunt, & nonnullis eorū aluus biliosa reddidit. At si mediocris est febris, & uires non ualidæ, sed cum notis cōcoctionis: ijs qui ita se habent, balneum prodest, & uini potio, tum uero ex unctionibus eæ quæ rarefaciunt. Idque multo magis cum ambiens est frigidus. Neque enim aut frigidam in balneo lotionē, aut frigidam potionē, in eiusmodi cœli statu ferē expectant, utpote inspirationibus ipsis assidue refrigerati, cum si quando in frigido ambiente uehementer uri ægrotum contingat, exigua salutaris habenda spes est. Si uero nec concoctionis habearisigna, nec uires ualidas, seruari is planē non potest, quo minus aut idem lauandus in balneo est, aut medicamentis ijs quæ rarefaciant utendus, aut uinum illi dandum, frigidam offerenda. In quo enim desperata omnino salus est, imprudentis consilij fuerit, apud uulgum infamare præidia, quæ multis fuisse salutis. Ipse siquidem aliquos noui ex amethodis istis medicis, qui cū ea quæ nos gelissimus, essent imitati, iisdemque præsidij in ijs qui prorsus morituri erant usi, adeo nihil profecerunt, ut etiā tempestiuū eorū usum suspectū formidolosumque reddiderint. Verum nos tempora præidia que ijs quos seruari spes est, scribimus: quando ægris qui insanabiles sunt, ijs nec tempus ullum opportunum, nec præsidium est. Atque hoc mihi per omnem sermonē teneri memoria uelim: quo minus præcipua illa primaque omnium curationis indicatio cōuelli aliquando posse uideatur. Quippe cum dicat Hippocrates, contraria esse contrariorū remedia, quid uetat omnibus febricitantibus frigidam uno ordine exhibere? Verum nec exhibenda est, nec subuertitur eo tempore generalis omnis cura-

tionis indicatio. Vnum enim ex ijs quæ actu refrigerant, aqua frigida est. Sed & alia plura sunt, quæ partim potestare (ut dictum est) refrigerent, partim ex accidenti, quorū alij propter concursum pugnantium inter se indicationum aliās utimur. Porro tradita iam methodus est, eius quod conducat, ante alia semper deligendi. Offensum præterea est, ipsius febris, prout febris est, aquam frigidam semper esse remedium. quod uero ad alia spectat, non semper; ueluti cum ex obstructione glutinosi & crassi humoris putredo oritur. Ponatur uero & cum hoc redundantiam in toto esse corpore, tum uirtutē non imbecillam. In eiusmodi namque complexionibus cum multa præternaturam in corpore sint, quedam eorum præcedentes causæ erunt, ueluti redundantia cū glutinosi & crassi humoribus. Horum enim uitio obstructio est orta, quæ morbus instrumentalis est eorum quæ obstructa sunt corporum. Hanc symptomata secutum est ipsa transpirationis retentio; quam rursus putredo humorum excepit, ipsa scilicet febris antecedens quedam causa.

10 Ergo qui febrem curare uolet, necesse est putredinem inhibeat. Ita duæ indicationes se exhibent: altera à febre, altera à putredine. Atq; à febre rursus duæ, scilicet ut portio febris quæ iam accensa est, percuratur; quæ uero in generatione est, inhibeatur. Aliæq; duæ rursus à putredine erūt indicationes: ut & quod putredinis iam factum est, sanes; quod in generatione adhuc est, listas. Porro quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoq; aliæ duæ indicationes nascuntur, tum ut quod retentum est, uacuetur; tum quod retinendum est, prohibeatur. Sanè prohibebitur ijs præsidij quæ obstructioni medentur. Cuius rursus ipsius quod iam occupauit, sanandum est quod futurū est, propulsandum. At curabitur quidem quod obstructio iam factum est, per ea quæ obstructa liberat. Propulsabitur quod futurū est, si affluxum obstructuentium succorū compescas. Ergo quod ultimum in ipsa resolutiua methodo est inuentum, id primum omnium in curatione est peragendum. Ostensum enim in prioribus libris est, ijs auxilijs quæ obstructiones eximant, uti non uacuata prius abundantia uelimus, fore ut nō modo nihil proficiamus, sed etiam affectum maiorem reddamus; pugnantibus scilicet inter se indicationibus. At si uacuata prius multitudine ad curandam obstructionē accedamus; medicamentis ijs quæ obstructiones expedit, erit opus. Verum quoniam horum plurima calida sunt, metus est ne tum putredinem, tum febrē augeant. Itaq; ijs quæ citra calorem liberare obstructiones ualeant, utemur. ubi aut quæ obstruit, deterfa dissectaq; sunt, per aluū, urinas, & sudorē, ea uacuare tētandum. Cum uero materia quæ hæc efficiant, etiā calidæ sint, necesse est interea, tū putredinē augeri, tum febrē. Quare quoad licet, id agendum, ut quæ minus calfaciat, materia deligatur. Aut si qua inueniri potest, quæ nō calfaciat, quemadmodū in hoc casu balneum, utiq; ea est petenda. Hoc uero tem-

Galen.

A pore etiam uires roborare, quod putredinē superantes, succos cōcoquant, studebimus. Quod uero se febris ipsius iam accensum est, id refrigerabimus. In auxiliorū enim inueniendorum ordine, ultima est quæ ab hac sumitur indicatio, quāuis alia ratione sit prima, quippe cum à febre cōperit inueniendum præsidiorum methodus.

11 Ac si nullum quidem interim uehemens incidat symptoma, prohibeatq; quo minus auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant, celerrime finietur febris. Sin tale quippiam incidat, quod totam ad se curationē reuocet, necesse est serius adueniat curatiōis finis. Si quidem quod ita interuenit, omnino uel contrarium est remedijs, quæ ante dictum causarum affectuum & symptomatum ordinē sanent, uel omnino nihil saltem confert. Enim uero si eius quod interuenit sanatio antedicto præsidiorū ordini sit cōtraria, necesse est interrim cuncta deteriora reddi. Si nihil originali affectui interuenientis obiter mali correctio, nec officit, nec prodest, totius curationis celeritati in mora erit. Si autē nocet, necesse est aut uniuersam medicationem in longius spatium trahi, aut aliquod subsequi periculum, aut etiam fore utrumq; Fingē nāq; exēplū gratia, afflicto interim stomacho syncopen incidisse, cui succurrere coacti cibum intēpestiue dederimus, ac uinum cum frigida. Ex horum em̄ usu, tum obstructionē, tum corporis coarctationē, tum putredinē auctas esse necellum est; atq; ex harū auctu, ipsam etiā febrē. Verum ubi tū uirtus satis ualens est, nec quicq; interuenit, cuiusmodi quā modō diximus ex uitio stomachi ortam syncopen: sed nec quæ aliquando accidere possunt, aut sanguinis profluuium, aut uigilia, aut dolor, aut error aliuq; uel ipsius ægrotantis, uel eius familiarū; ubi inquā nihil tale accidit, totus qui proxime dictus est remediōrū ordo, hominē profectō sanabit. Sed nec ipse tamen quocunq; remedio omnia quæ præter naturā sunt, sanat. Nam aqua mulla, quod ad crassos succos extenuandos, & glutinosos detergendos, & excretionem promouendū attinet, optimū planē medicamen fuerit in ijs syncopis, quos habitus coarctatio, & putredo excitauit. Quatenus uero calorē febris adauget, est noxia. unde si hic immodicus sit, parcedum aquæ mulsæ est, utendum pitisanæ cremore. Quod si difficile est contumaces esse obstructiones iudicaueris, etiā oxymelite. At hoc ipsum rursus si immodice utare, & intestina radit, & tussim excitat, & neruosa lædit. Adeo scilicet difficile est eiusmodi aliquod auxiliū inuenisse, quod citra ullam noxam magnifice proficiat. Id accidit (ut dictum est) ex cōplexione ortorum in corpore, præter naturam affectuū, unā cum præcedentibus eos causis, & sequentibus symptomatis.

12 Nunq̄ tamē propterea præceptū illud, quod contrariorū contraria sint remedia, aliquando uerum erit, aliquando falsum: imō id perpetuō uerū est, quando fieri non potest, ut eorum quæ præter naturam sint quicq; per aliam ullam remediōrum speciem curetur. Non tamē ex usu est semper omni-

tom. 6

m 3 bus

bus quæ præter naturam sint, mederi, sed cum sola per se subsistunt. Nam si cum alijs unâ incident, alijs sæpe est ante illa medendum; sicut in cauis ulceribus, ubi ea simul cum phlegmone sunt cõmista. Quippe uerû in his quoq; manet, quod per ea quæ carne implent, curantur. Cæterum, his ut priusquã phlegmonen curaueris, nõ licet, At inter dum hæc sanatur, ulcus cauum adeo non melius quàm fuit redditur, ut etiã fiat magis cauû. Quod si ijs quæ carne impleat medicaminibus uti uelis, neq; ipsum impleueris, & phlegmonen auxeris. Quæ namq; carne implent, ea demû implere possunt quæ phlegmone uacat, nõ quod phlegmone adhuc sunt oppressa. Hoc itaq; quod in dictione tam est breue, nempe cõtraria contrariorû esse remedia; potestate deprehenditur maximû. Quippe omnem medendi methodum confundit, quisquis hanc indicationem neglexerit: cum omnia quæ præter naturã sunt, ab ijs quæ ipsis sint cõtraria, curentur. Cum autẽ eorum quæ præter naturã sunt, duplex prima differentia sit, alijs per se subsistentibus, alijs in ipso (ut sic dicam) fieri essentiam suam habentibus, ac umbræ ritu affectus comitantibus, sanatio quidem affectuû ipsorum est sublatio: hanc uero symptomatû amotio sequitur. Quibus quanquam ipsis nihil prima ratione adhibetur, attamen in ijs quoq; perpetuum illud præceptum manet, quod contraria contrariorum sunt remedia. Quippe cum affectus, quos symptomata sequuntur, sanamus, symptomata nimirum ipsa in contrarium statum perducimus. Quare quæcûq; symptomata exiguo rum meatuum densitas inuexit, ea rarefactione tollentur. Quod si ipsi quoq; symptomati quod ex densitate spiramëtorum est natum, hoc est pauciori quàm iustum sit defluxui, quem paulo ante perspirationem impeditã diximus, symptomatum genus aliud contrariû opponere uelis, ne sic quidem desit quod dixeris. Sunt namq; plura iusto defluuia, iusto paucioribus contraria. Adeo si cui etiã in symptomatis ipsis libet cõtraria contrariorû remedia dicere, in ijs quoq; fiat immotus primus ille omniû quæ præter naturam sunt, curationis index. Verû satis est (ut præ diximus) eorum quæ uere & primum curatur, id est affectuum in corpore qui uerè sunt subsistentes, cõtraria esse remedia existimes. Quippe actiones eorû, atq; etiã offensas, esse quidẽ tales ut fiat, fatendum est: non autem simpliciter quod sint, dicendum est. Nam manum extendere, aut flectere, ex ijs quæ absolute sunt, dici nõ possunt, sed ex ijs quæ fiunt. Multoq; minus ipsius immobilitas: quæ ipsa quoq; symptoma est eius qui in muscularis neruisue subest affectus. Sed affectuum qui ex subsistentiû numero est unus, cõtraria postulare remedia: hunc uero solum contrarium sequi statum, quæ sanitas est. Atq; hanc rursus quandã naturã actionem, quæ symptomati iam finito sit contraria. Sed nec nominibus falli, quæ sæpe alia forma proferunt, q̃ ut contrarijs cõueniant. Sæpe enim planè non sunt, sed ex ipsa rerû natura cõtrarium inuenire, habens scilicet quod pro illo discernendo

A spectes, confessum illud, contraria esse quæ sub uno genere plurimû inter se distent. Ergo si in illo genere quod mediocriter est, intellexeris, id uero est, ut sæpe monstrauimus, quod inter extrema est medium, infinitam quandã cõtrariarum rerum multitudinem, quæ maioris minorisq; ratione inter se dissideant, ex eo inuenies. Verbi gratia, In affectibus tenuiû spiramentorû symmetriã intelligens, ex utraq; parte duo immodica, quæ inter se sint cõtraria, inuenies. In actionibus uero symmetriam uacuatorum considerans, ipsi quoq; ex utraque parte ametria respõdet. Verum in parujs spiramentis nomina excessibus non desunt, nempe dẽsitas & raritas. In uacuatjs posita nõ sunt. Eoq; fit, ut cogamur plures paucioresq; effluxus dicere: ita nimirû ut si densitatis raritatisq; nominandũ essent, spiramenta etiã ipsa, alia minora iusto esse, alia maiora, dicere cogemur. Ergo (sicut diximus) hoc maxime cauere debemus, simul etiã in eo nos exercitare, quod celerius cuiusq; sic dicti cõtrarium inueniamus. Non enim in corporum modo qualitate, uerum etiã in quantitate eiusmodi contrarietatem inuenias, quã utiq; Aristoteles oppositionem uocat, non cõtrarietatem. Neq; enim magnû paruo uult esse cõtrarium, sed in eo quod ad aliquid dicẽ, oppositû, neq; multû pauco, sed nec rarum densò, neq; relaxatum contracto, neq; ipsi quod secundum naturam est, id quod præter naturam est. Verum Hippocrati omnia id genus contrariorum habent appellationem, sicuti etiã C Platonĩ, qui generationes ex contrarijs esse dicit. Offensum quoque à me in alijs est, nec Aristotelem ipsum, suam ipsius legem in nominibus seruasse, quo loco principia eorû quæ natura reguntur, materiam, speciem, & priuationem statuit. Verum quod diuinum Platonem secuti semper testamur, cõtemnere nomina oportet, minime autem scientiam rerum. Ea namq; ad salutem hominũ pertinet: erroris que in ea finis est perniciēs. Nominibus siue proprie siue improprie utare, ad ægrotos id parum attinet. Intelligas id clarius, si nõ contrariorum contraria, sed quemadmodum illis placet, opposita sibi inuicem esse remedia dicas. Siquidem copiam sanat uacuatio, defectum nutrimentarum in summa, quod exuperat, ablatio: quod deficientis est, adiectio. Itaque etiã in alio opere recte arbitror à sene dictum: Medicina appositio est & detractio. deficientium quidem appositio, redundantium detractio. Porro deficient redundantq; quædam in quantitate, quædam in qualitate. In quantitate cum sanguis immodice est auctus, aut rursus minor redditus. In qualitate cum uel calidus, uel frigidus, uel crassus, uel tenuis plus iusto minúsue est effectus. Siue igitur contrarietatem, siue oppositionẽ nominare libet, eius indicationis medendi quæ ab omnibus, quæ præter naturam sunt, præbetur, semper meminisse debetis, eiq; esse intentus: potissimum quidem, ut dictum prius est, in affectibus: sed tamẽ & in symptomatis, quamuis horum nec primum curatio sit, nec proprie contrarietatis, sed curatio quidem simul

simul cum affectibus, ex accidenti: contrarietas A
uero, lucidioris scilicet breuiorisq; doctrinæ cau-
salloquentibus abusiue.

13 Verum ad medendi indicationes propositi
nobis febriū generis reuertamur. Repetamusq;
singula genera, quæ in nobis præter naturā sunt,
non causarū modo, uerumetiā morborum & sym-
ptomatum. Et causarū quidem genera, sunt multi-
tudo, & crassitudo, & lētor humoris. Causa simul
& symptoma est transpirabilis excrementi reten-
tio. Simili modo causa pariter & affectus est ipsa
putredo. Morbus uero, tū obstructio, tum febris
Symptoma uero est ipsa transpirabilis excre-
menti retentio. Ergo indicabit (ut dictum est) præ-
cedētium causarū quælibet propriū aliquid, mul-
titudine ipsa quæ ex eorū est numero, quæ sunt ad B
aliquid prædicamēto quantitatis, uacuationē. len-
titiā uero & crassitudinem, quæ sunt in qualitatis affe-
ctu, sanationem quæ per contraria perficiat. Cum
uero in plerisq; oppositionibus consueta nomina
non sint, accidit ut qui in rerū scientia minus sunt
exercitati fallantur. Cum enim uno nomine ne-
queunt quod animo concipiunt, nominare, id,
ceperunt non sit, dimittunt: quemadmodū pro-
fecto in glutinosi & crassius succis faciunt. Quip-
pe crassius succus ex aduerso oppositum habet re-
tentionem. Glutinosus uero (sicut ipse primus Græce
nominauit) *ἰσχυρὸς*, quasi detergium dicas, si-
cuti uero aliquis dixerit qui a solidis corporibus
nominandi occasione acciperet, friabilem. Si-
quidem hoc pacto semper uidetur Aristoteles op-
positionem facere: uerum non in succis (ut dixi)
sed in solidis ipsis corporibus. Quod si glutinosi
humoris naturam sub ea ratione intelligas, quod
quicquid tetigerit, huic ægre dissolubilis adhæ-
ret: non immerito (arbitror) eum qui nec adhæret,
& ea quæ adhærent deterget, contrarium ipsi sta-
tues. Et accidentium quidem causarum contrarie-
tates abunde sunt dictæ. In instrumentali uero mor-
bo, qui est obstructio, contrarium ei est Græce
ὑποψήφιος, quam reclusionem (puto) dixeris. Sym-
ptomati uero quod est transpirabilem retentio,
excretio ipsorum contrarium est. At uero in hu-
morum putredine, & excretio, & refrigeratio, &
uentilatio, & semiputridorū concoctio, ex aduer-
so respondent. Ipsi uero febris refrigeratio op-
positio est. Porro quibus methodis materiā, quæ
singula modo memoratorum perficiat, inuenias,
iam diximus. Pugnantis igitur his (sicut dixi-
mus) aliis aliæ tum indicationes uincunt, tum ma-
teriat. indeq; factum est, ut quidā cum ignorassent
unam semper dari ex re quæ indicationem, ac si
præter naturam sit quod indicet, cōtrariū id sem-
per indicare: sin secundum naturā se habeat, non
contrariū, sed simile: nec medendi hī, nec sanitatis
tūc dæ methodū cōstituere potuerint. Si quidē cū
in primis ipsis indicationibus sunt lapsi, multo pro-
fecto magis in ijs quæ secuturæ erāt, decipi debe-
bāt. Debēt em̄ (arbitror) ædificijs fundamēta faci
firma, & scaphis poni idonea carina, si quid ædifi-
ciorū pangendorūq; in ijs futurū est firmū. Vbi

enim prima ipsa basis statim ab initio debilis fuit,
quā fieri potest, ut quod superstruxeris, futurū in-
firmum non sit? Itaq; quoniam in continentibus
ex proposita stipitatione febribus, (neq; enim gra-
uari debemus iterum, atq; iterum sermonē repetē-
re, quod nunc saltē medicorum uulgus ueram me-
thodum cōdiscat) quoniam inquam septem præter
naturā posita sunt, a quibus indicationes sumun-
tur, humorū multitudo, crassitudo, lentor, obstru-
ctio, transpirationis retentio, putredo, & febris cā-
rens intermissio: atq; hæc cōtraria omnino esse
adhibenda docebant: præter hæc uero ab ijs quæ
secundū naturam se habebant, posita indicatio-
nes sunt, ex temperamento, tum ipsius laborantis
partis, tum reliquarū omniū quæ principes sunt,
ex substantiæ ipsarum quātitate, & ex spiritus ip-
sius substantiā, tum quantitate, tum qualitate, ho-
rum uero indicationes non contrariorū erant, sed
similium, ad ista uero (sicut diximus) dignoscen-
da, tum etas, tum cōsuetudo, tum omnes quæ ex-
ternæ inter morbo causas fuere contulerunt, utiq; ortus
hinc quoq; indicationib. nō paucis: oēs profectō
inspicere simul medicum decet: quod .i. intelligat
quoniam primum ac magis, quoniam minus & se-
cundo, quoniam adhuc & tertio, atq; deinceps quod
post quod præsidio sit utendum.

14 Quippe si uires eius qui ex putredine humo-
rū (ut posuit est) sebricitat, ualentes sint, mittēdus
statim sanguis est. Si cruditas uētris nō sit, statim
morbo incipiente. Sin uires infirmæ sint, aut etas
dissuadeat, incidēda uena nō est. Porro dictum sit
præ est eiūsmodi febrem in uirtutē imbecillam nō
incidere. Quippe synochos bene habiti corporis,
ac calentis ætatis propria est. At si in puerum inci-
dat, qui quartum decimum annum hæctenus non
attigit, mitti illi sanguis non debebit, propterea
quod tantillis, cū præsertim calidi ac humidi sint,
plurimum corporis substantiæ quotidie defluat,
ac digeratur. Ita quod ex incidenda uena molien-
dū nobis fuerat, id ultro nobis ex curati corporis
natura præstat. Quod si corpus quartūdecimum
annum excesserit, æstimandū est qualis nam eius
natura sit, tum gracilis & spissa & dura & copiosi
sanguinis, an contrā. Atq; ita in priorī missionem
sanguinis adhibebis: in secunda nequaq;. Quin-
etiam modus uacuandi sanguinis ex ipse indicā-
tibus sumetur. Si enim cui sanguis mittitur, trigin-
ta annos natus sit, sed laxus, & mollis, & pinguis,
& albus, & gracilib. uenis, huic aut planē sangui-
nē non mittes, aut parū detrahes. Et omnino qui-
dē non mittes in tēpore æstatis, & regiōe æstuosa,
& cœli statu calido ac sicco. Parū detrahes in reli-
quis, tum anni tēporibus, tum regione, tū cœli sta-
tu. Etenim si neq; obstructio subesset, nec putre-
do, sed sola succorū redundatiā, protinus a missio-
ne sanguinis, pro naturæ suæ ratione se haberet.
Itaq; tantū succorū in omni tū corporis tempera-
mento, tum regione, tum anni tempore, tum statu
cœli detrahi par erat, quantū supra naturālē statū
fuerat inauctum. Verum quoniam nec obstructio,
nec putredo curari per sanguinis missionem pos-
test

test, ut quæ alia remedia (ceu prius est monstratum) desiderent, reponi sanguinis aliquid ad curationis spatium debeat, quò minus in tempestiue nutrire necessitate ulla cogamur. Quantum namque ad eiusmodi pertinet febrem, prorsus nutriendum non est. Siquidẽ ostensum prius est solum uirtutis respectum esse, qui de nutrimento indicationẽ præbeat. At uero quantum ad id, quod inanimatum corpus est, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterum, aut febrem si nutris augere, aut uires si non nutris desiccare. Satiùs itaq; fuerit (ut dictum est) aliquid sanguinis quod propriũ partibus animalis nutritum sit, relinquas: ac ipse paucissimas sorbitiones potionesq; exhibere sis contentus, quibus utiq; ceu medicamenti potius q̃ nutrimenti egemus.

15 Nam id quoq; supra (quò minus multa de iisdem adhuc loquamur) est ostensum. Imò de cataplasmatis ac præcordijs perfundendis est loquendum. Quippe pleraq; medicorũ turba unũ quiddam hoc quoq; ex methodicorum istorum curandi sanctionibus statuit. Omnesq; sicuti post tertium diem nutriunt, ita etiam oleo prius perfundunt. In de uno die interposito rursum nutriunt, cataplasma prius imponentes. Quòd si cui alius est adstricta, etiam hanc clystere ducentes. Itaq; his saltem autoribus ordinandi uictus artem, una hora quis didicerit: Verum non ita se uera res habet. Sed cũ ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars est scientia ordinandi uictus. Quæ utiq; ex his maxime remedijs constituitur, cibo, potione, perfusione, cataplasmatis, & clysteribus. Quippe iisdem medicis cum sanguinis missione in principio etiam solam adhibuerint, reliquam omnem ægri curationẽ uictui mandant. Itaq; (ut dixi) unius horæ est uictus eorũ disciplina: quòd si qui dicit, ingenio ualeat, ne huius quidem integræ, sed minimæ eius partis, in qua. s. quæ nunc dicam audisse liceat. Qui febricitant, si ualentes uiribus sint, omnibus sanguinem ab initio mittes, perfusosq; oleo post tertiæ accessionem, uel nullâ cum alicuius nutritione, uel sorbitione. Deinceps uero alternis cibus diebus, sed cataplasma ex artomelle prius imponens. Si cubi uero alius adstricta fuerit, clystere hanc duces. Atq; illorum quidem uniuersam ordinandi uictus artẽ, in his uerbis iam audisti, non utiq; in sex mensibus, sed sex uersiculis. Veram autem diæteticen, id est uictus ordinandi artem, nunc audies. Calfacere præcordia cataplasmatis, aut perfusionibus, non est perpetuò tutum: sed in ijs tantum ægris, quibus in toto corpore nullum erat superfluum. Ceteris omnibus extrema est perniciēs. Nam siue redundantia uel uicinis sit, uel quæ ad uires, uel quæ uasorum continentiam comparat, siue etiam in una parte pluribusue uitiosa excrementa sint, omnia ad partem excalfactam trahuntur. Quoties enim uidisti præcordia cum planè phlegmone carerent, intra quatuor dies quam ea gregales isti medicis perfundere cepissent, phlegmonem contraxisse, cum ego etiam id ipsum tibi prædixissem, iussissemq; diligẽter ad phlegmo-

nem futuram attentus esses. In quibus id maxime intellexisti, quantum malum sit uisui, qui alienus a ratione sit, insuadescere? Quippe hic cum ex ijs quæ ipsimet faciunt, phlegmonas semper excident, id non animaduertunt, sed iisdem semper erroribus implicantur: ueluti Hippocrates ijs accidere dixit, qui hinc & inde ossium fracturas cum ulcere deligant. Etenim illi cum phlegmonas in ulcere crearent, non tamen desisterunt: rati id adeo non ex deligatura, sed alio quopiam errore incidisse. Et quomodo, quæso, ad aliam curationis rationem se transulissent, qui usum sine ratione profitebatur, ex ijs quæ tum ipsi semper facere essent assueti, tum præceptores suos ante se facere contemplati. Siquidẽ huius generis homines ne tantum quidem cõsent, ut ex indicatione quicq; sumant, sed sola experientia sunt cõtenti. At Hippocrates ab ipsa rei natura idoneũ curationis modũ inuenit. Quo postea in usum ueniente, cognitum est quantus esset in priori error. Quin si quis in eiusmodi affectibus, cataplasmatis & perfusione ex oleo relictis, uelut ad curationẽ quam ratio docet accedere, ipse quãtopere aberrant, qui plethorica & quæ parum pura sunt corpora sic curant, haud magno negotio experientia ipsa iudicabit. Sanè accidit ut in eiusmodi morbis diuites potius quàm pauperes perperã curentur. In his enim propter ipsorum delicias duplex peccatũ nõ raro committitur, & quòd sanguis non mittitur, & ad medicis impensior. Adhibetur diligentia, ut quotidie aliquid circa ægrotantis corpus fiat. Ac inter initia quidẽ sanguinis missione maior eorũ pars propter molliorem nõ admittit, tametsi magis q̃ pauperes redundantia sanguinis affectibus sunt obiecti, ut qui magis tum cibus se impleat, tũ in ocio uiuant. Medici uero qui eos curant, ubi summum remediũ est omissum, aliorũ usũ farturos se quod deficit, putant. Huc accidit quod ipsi quoq; ægri, si quis uictu contra morbũ minore cum negotio instet, negligentia rati, si quis rursum quiduis agat diligentiam, cogunt eos præcordijs aliquid quotidie admouere, sed nec inuitis profecto ipsis medicis: ut qui facere semper aliquid uideri uelint: ita sic fe maiorem mercedẽ accepturos sperant. Itaq; accidit, ut illo ipso tẽpore phlegmonæ diutius incipiãt, quo iam pauperibus morbus propemodum perductus est ad finẽ. Quippe missio in propositis febribus inter initia sanguine, non pauperibus modo, uerum etiã diutius feruis, plurimis quidem quinto, aliquibus septimo crisis contigit, nemini serius. At diuites, qui & sanguinis copiam, & excrementorũ plus q̃ pauperes & ferui habent, cum sanguinis mittendi prætermisere remedium, ac quotidie tum calido oleo perfundantur, tum laxantibus cataplasmatis utantur: phlegmonen mirum aliquam uel in iocinore, uel uentriculo, uel reliquorum istius uiscerum aliquo contrahunt, alijs in quarto, alijs in quinto, omnes planè in sexto. Nec oblitus arbitror es eius qui dum perfunderetur, difficultate spirandi laborauit: omni superuacuo ad septum transuersum caloris uel tracto. Ergo nõ

hic modo perijt, sed alij quoq; infiniti quotidie pereunt, cataplasmate ipso cucurbitulæ ritu corporis superuacua in uiscera trahente. Nō defuerūt profectio & qui cucurbitula quoq; ipsa sunt usi, eo tantū consilio, ut circa ægrotantē aliquid semper morari uiderent. Saluberimū autē (ut prædiximus) est in febribus ueniam incidere, nō cōtinentibus modo, uerumetiam alijs omnibus quas putrescere humor concitat; ubi præsertim nec ætas, nec uires prohibent. Leuata namq; quæ corpus nostrum regit natura, exonerataq; eo quo uelut sarcina premittitur haud ægrè quod reliquum est, uincet. Itaq; proprij muneris haud obliuiscit, & coquet quod concoqui est habile, & excernit quod potest excerni. Horū enim quæ in medio sunt corpore (ut isti uocant) prouidentia, ubi detractus sanguis non est, maximū planè est malū: ubi detractus est, nō maximum. Quamq; sic quoq; noxia esse in synochicis febribus potest, quippe deusta immodico calore uiscera etiā amplius deurrunt ac torrent. Ergo eiusmodi prouidentia illi dumtaxat requirunt, quibus in una particula putrede constitit, si tamē hi quoq; sanguinem prius miserint. Prouidebitur autem his, non sicut truales isti medici prouident, qui statim inter initia relaxat; sed in plurimis prorsus contra. Relaxantia namq; remedia sicuti quod in membris cōtinentur, euocant; ita si in principio sint admodum, pro eo plus attrahunt. Cum enim ad hanc ad affectū locum fertur fluxio, reprimere remittetq; hanc expedit, non ad ipsum attrahere. Quæ uero reprimentia dicuntur, quæ adstringentes eorum uim obtinent, in principijs idonea sunt duplici ratione, & quod robur affectis partibus infertur, (unde minus prompte affluxum extremorum in se recipiunt) & quod eorum quæ in ijs iam contenta sunt, tenuissimum extrorsum exprimant. Quod si tum fluxio humorum per ea remedia cōpescitur, tum densitas quæ ex adstringendo in affecta particula relicta est, crassiora detinet, iam tempestiua relaxatio est, quod ea quæ retenta sunt uacuet. Præcipue autem adstringentibus est utendum, ubi in iecur aut uentriculum superuacuum profluit; quando & è primoribus admodū hæ partes sunt, & munus suum obeant uel in ipsis morbis est necessum. Porro est non exiguum eorum munus, qualesq; reliquarum partium, quibus illud modo negotium est, ut id quo nutriatur cōficiant; uerum quod tantopere animalis intersit, ut si neq; in uentriculo probe alimentū fuerit cōcoctum, nec in sanguinem in iocinore mutatum: utiq; quod in fame nobis accidit, ut cibi penuria exagere in abstinentia cogamur, idem tum omnibus animalis partibus accidat. Non enim ex ijs quæ deuorant quis, sed ex ijs quæ in iam dictis uisceribus confecerit, alimentum toti corpori suppeditatur. Atq; ob hæc nimirum impensius quam cætera membra, uentriculus & iecur adstringentia desiderant. Ergo cum ea quæ iam infixa sunt, euocandi tempus est: tum quoq; modice adstringi potestulant. quod enim adstrictionis in principio largius ijs quam cæteris partibus adhibetur, id fer-

uandum assidue est, nimirum manente, qui id indicet, usu. Vfus uero est (ut paulo ante testatissimus) nutrimenti confectio. Si igitur per imbecillitatem parum recte cōcoxerint, non modo assumpti cibi nulla est utilitas, sed etiam uentriculo non raro ex eius corruptela lacescit, expellitur quoq; aliquid prioris. Ita fit, ut duplex iam noxa toti corpori accedat: cum nec ex cibo sumpto nutriatur, & aliquid ex eo quod sibi reperfuera, amittat. Huc accedit & quod ciborum concoctio, siue ea in iocinore siue in uentriculo sit impropera, febres intendit, ac succi uitio exacerbatur. Quod magis in omni febrili, ciborum concoctione prospicere magnopere oportet. Atq; eius rei causa roboris quoq; instrumentorum quibus perficitur, nō leuis habenda est cura. Sanè aliqui sunt (ut Hippocrates ait) qui ex eo quod ignorant, nō parum lucrifaciunt. Arbitrantur enim iocinoris se phlegmonem relaxantibus præsidijs curare, ex eo scilicet famam sibi cōparantes, quod in agnitione falluntur. Si quidem uidentur nonnunquam lineamenta musculi, qui à costis thoracis ad præcordia peruenit peristilia iocinori. Mirum autē minime arbitror, eos qui nec aliud quicq; in arte probe didicerunt, nec in agnoscendis affectis partibus se exercuerunt, sic laudem aliquando consequi.

16 Verum istos mittamus. Nos uel si minima suspicio sit iecur uentriculū uel laborare, abstinere protinus oleo concoquemus, ac eas particulas perfundemus. Cum autem duplex in omni absinthio facultas & qualitas sit, ueluti in libris De medicamentis est traditū, utiq; in pontico adstringendi facultas non parua est. In reliquis omnibus amara quidem qualitas est uehementissima, adstrictio uero (quā saltē gustu agnoscas) aut planè obscura, aut prorsus nulla sentit. Proinde ponticum ad iocinoris & uentris phlegmonas eligi præstat. Porro id est tum folio, tum flore longe cætera absinthia minore odor quoq; huic nō modo nō infauis, uerum etiam aromatum quid præferens, reliquis omnibus planè est scædus. Quare hæc fugere conueniet, ubi autem semper pontico. Etiam reliquorum medicamentorū in quibus mixta cum amaritudine adstringendi uis, aliquid in oleum cōmiscere, atq; ad eundem modū uilicet. Ostendimus namq; in opere, quod De medicamentis inscribitur, amaram qualitatem præferre, ac uiam adstringenti facere. Quod sit, ut medicamentum id genus, omnibus quæ tantum adstringant, sit præstantius. At si quidem intendere adstrictionem studeas, etiam oleum ipsum adstringendi uim habeat, cuiusmodi est & quod Hispani uocant, & quæ cum frondibus oleæ preparare solent, uel quale est crudum, quod Græci *ἐμπυκνιστον* uocant. Sin leuiore uti adstrictione placet, aliud olei genus præparabis, præcipue quod tenuium sit partium, quod genus Sabinum est. Optimum tamen ubi adstringere uehementius est opus, Histricū oleū est, ut quod ambas in se uirtutes habeat, & amarā, & quæ adstringat. In penuria uero absinthij inter initia uel melinum, uel mastichinum, uel len-

tiscinuo satisfecerit. quod si exigua febris sit, etiā unguentum quod ex nardo componitur. Esto autem optimum id quodque neque enim parum interest inter id, & quod uitiosum est, cū id quod Neapoli in Italia conficiunt, nomine tantum nardinum unguentum sit, si cum eo quod in Asia fit confecturatur. Id antea Laodicea tantum componebatur, nunc etiam in multis fit oppidis. Quod si inclinatio febris in qua ista moliris, non admodum sit mitis, abstinebis a nardino, uteris autem hoc tempore rectius melino: aut si id non est, lentiscino, ab hoc uero mastichino. Omnibus namque his nardinum unguentum ualentius exalfacit. Quare si reliquorum copia non est, rosaceum illi admiscebis. Sanē myrtini adstrictio idonea non est, cum crassiorum sit partium quam ut alte descendere possit. Atque hæc quidem exempli gratia protulimus, nam magnam eorum copiam deligere ex medicamentorum libris licet. Ad eundem uero modum & cataplasma compositam uim habeat ex ea quæ tenuium sit partium, ac relaxet, tum uero ex amara & adstringente. Superet autem in ijs, ubi scilicet tū reprimere, tū robur addere studeamus, quod adstringat: ubi tenuare ac detergere, amarum: ubi euocare, quæ ex relaxantibus tenuium maxime sint partium. Si quidē quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus mouentibus monstrauimus esse accommoda. Cum autem definitum in opere De medicamentis sit, & quæ uel solam obtineant adstringendi qualitatem, uel amaritudinem, & quæ ambas possideant qualitates, maxime deligenda sunt quæ ambas habent. ubi ea non adsunt, ipse amara ijs quæ adstringant, miscebis: ita nimirum uti nos in iocineris phlegmone, ex copijs præsentibus componere cataplasma uidisti. Erat enim is qui ægrotabat, medicus, quē iam lucernis accensis inuisimus, quo tempore ab ijs qui talia uendunt nihil emi potuit. Ergo cum inclinam notabiliter febrē inuenissem, utendū occasio ne quam primū censui: eo certe magis, quod superetam horam quæ gallicinio futura erat, alterius ac celsionis initium illataram uerebatur. Incoxi in oleo quidē absinthium, in aqua uero malum cotonium. Dum autem hæc coquebantur, myrobalani expressæ retribuent, & treos radicem, quæ in tus inuenerā, cōditū cribrauit: dein olei & aquæ, quæ parauerā, portionē in lebetem immisi, ac ubi modice coxerā, myrobalanū & irim unā cum exigua cera iniēcī. Coquimus autē cotoneum non in aqua modo, uerum etiam persepe in austero uino. Ac omnibus eiusmodi cataplasmatibus, de ipsa quoque cotonei carne inter dum admiscemus. Quippe ubi & quod cōfluit copiosum est, & particula ipsa infirmior, adstringentē uim (sicut scis) inauge mus. Vbi uero tum corpus totum purum est, nec membrum ipsum imbecillū, nec ultra quid cōfluit, ibi in ijs quæ miscēt materijs, minimū quidem sit quod adstringat: copiosius uero nō solū quod relaxet, sed etiam & quod amarum est, & quod acre. Quod si exigua febris sit, ac phlegmone non adeo calens, tum æger ipse inediā tolerare ualeat:

hoc casu digestoria quidē curandi speciē intendes, adstringentē autē remittes. Neque enim amplius ipsi saltem phlegmonē cōducere possunt, quæ adstringunt: ubi nec affluit quicquam, & crassus humor affecto loco tenaciter est infixus: sed (sicut prædictum est) trahendæ parū curationis, ac quæ adstringant miscendi cōsiliū probamus, quo robur membrorum tueamur. Vnde nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum quouis, nec musculis qui in præcordijs habentur, aut ipso peritonæo, miscenda adstringentia sunt. Sed nec cum uesica male habet uterūque, modo (ut dictum est) nihil ultra ad locum fluat: nec sanguinis redūctia, nec excrementorū copia, in toto sint corpore. Porro renes & pectus in mediā prædictorū conditione sunt: quantum scilicet a uentriculi iocinorū sollicitudine absunt, tantum reliquorum supergressa. Si quidē in uentriculo ac iocinore resoluti robur est perniciosissimum: in illis minime est periculofum. In his uero est quidē periculofum, non tamen perinde ut in illis: nisi si pus educere ex pectore, aut pulmone aliquando sit opus. De liene pronunciare absolute nō est, nec nisi prius definita tum corporis totius natura, tum uero affectu, qui curationis tempore occupauit. Nam si uel æger ex ijs sit, qui atræ bilis excrementū naturaliter congerant, ut etiam eo tēpore succus is in eo abundet, necesse est in liene curandō adstringentia reliquis admisceas, quo uisceris robur custodias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & cum corpus expurgarit, ipse rursus per uentriculū excernet: ueluti in Naturalibus commentarijs de ijs est proditum. Sin nullum omnino sit atræ bilis excrementum, aut omnino adstringendum non est, aut parcissime. Obseruandum uero diligenter est nō in liene modo, uerū etiam in omnibus partibus in quibus humor putrescit, quod symptoma maxime sit uehemēs, quod secūdo loco, aut tertio, quod uidelicet affectu ex ipsis planē inuenio, idoneam ei curam adhibeas. Aliās namque in membro affecto calor superat: aliās tumor, qui uel propter abundantiam humoris, uel propter crassitudinē sit durus. Si igitur calor præponderat, id agendū, ut sensim per ea quæ tepentem calorem obtinent, digerāt: quod genus est tum lini semen, tū chamæmelum, quibus adijci uel hordei uel fabarū farina debet: quippe quorū neutrum exalfacit. Sæpe autē (ut nō ignoras) quod medici artomeli uocant, pro cataplasmate eiusmodi phlegmōes præparamus, atque aquæ aliquid miscemus, ad lienem uero etiā aceti aliquando aliquid. Si uero laborātis phlegmonæ partis calor nō multum a natura excesserit, sed magnitudo eius notabilis fuerit, digerere haud timide sine aqua debebis, etiā fœnigræci aliquid supra dictis immiscens. Si ueluti scirrhosa duritie phlegmone sit propter humoris quē cōtinet uel crassitudinem uel lentorē, tum aceti aliquid, tum amara medicamēta simul immiscenda curabis: potissimum in liene. Etenim uiscus hoc propterea quod ab iocinore crassum humorē trahit, eiusmodi humoris occasione plerumque laborat. Quo magis cataplasmata

plasmata, quæ ex oxymelite & absinthio & capari fiunt, illi sunt idonea. Hæc igitur cum medicorum ualguis ignoret, omnes oleo perfundunt, & cataplasmatibus relaxantibus curant, priusquam corpus uacuetur: omniumque maxime diuites, qui huius non solum in talibus obsequuntur, sed etiam eos lauari in balneo permittunt. Ego uere nec eorum qui ex putrescente humore febricitant, lauem quæquam: nec relaxantibus cataplasmatibus priusquam superuacua purgarim, utar. His uacuat, non solum audacter lauem: sed etiam cataplasmatibus utar: in alijs quidem membris, ijs que relaxant: in iocinore uero ac uentriculo, additis etiam quæ mediocriter astringant.

17 parcius uero ad pectus quæ ad ea est adstringentibus utendum: quando talia humores qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor nonnunquam reprimunt. Ac cibis potius horum firmitudini est consulendum. Neque enim sicut in iocinore & uentriculo, ita hic quoque tenuissimo uictu est utendum, in illis namque alimentum concoquit: me tusque est ne ipsi phlegmone laborantibus. nec nutrimentum rite concoquant, & phlegmone augeatur. In pectus uero tantum alimenti iam concocti peruenit, quantum uni ipsi particulae nutriendæ satisfaciat. Ac longe quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab adstringentibus est: quando in eo ipsi quoque relaxantibus admiscendum aliquid actium quodammodo & euidenter calfacientium est. Quippe foras trahere potius, quam reprimere, in eo debemus. Itaque etiam cucurbitula uulter ijs qui sic laborant, si prius sint uacuat, applicabitur. Si uero abundantia fucorum (quam uocant *μαλίσσαρον*) in his sit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transferet, quam ex toto corpore attrahet in utrumque.

18 Eadem ratione nec in cerebri & eius membranae phlegmonibus, cucurbitulis in morbi initio utemur: uerum ubi nec influit adhuc quicquam, & totum corpus prius est uacuatum. At reprimentibus in his quoque inter initia utendum. Sed cum ossibus cranij medium occupantibus, in altum descendere reprimentium uisum cupimus: eorum quæ præire ac deducere ea possunt, aliquid reprimentibus admiscebimus. Ea sunt quorum substantia ex tenuibus partibus constat. Sanè acetum non modo tenuium partium est, sed etiam non mediocrem reprimendi uim obtinet. Quo profecto rationabilis in principijs affectuum ipso utuntur, iofaceo admiscentes. Procedete uero tempore etiam spodylij ac ferpilli (quibus iam non modo partium tenuitas, sed etiam calor inest) aliquid admiscet, quo scilicet tempore transire ad ea quæ concoquant ac digerant conuenit, atque hæc utraq; ualētiora quam postulet ipsa pars phlegmone affecta deligere: ceu uiribus. eorum per ea quæ intersunt ossa remittēdis. Sanè ad eum modum & castoreo utimur: cum tamē eo in alijs phlegmonis minime utamur, quamuis etiam in summa inclinatione sint: est enim calidius id quam ut phlegmonis sit idoneum. At uero locis circa cerebrum phlegmonis ipsis iam inclinantibus est utilissi-

imum: quoniam non continuo his, sed ossibus interuenientibus occurrit. Inest autem eiusmodi pharmaco & partium tenuitas, quod ipsum ijs quorum per densum obicem transmitti uim oportet, est accommodum.

19 Illud te profecto non fugit, nos singularum particularum meatus qui ijs ad superuacuorum emissionem sunt proprii, fluxiles reddere. Intestino, uentriculo, & mesenterio, & concavis iocinoris, iate finum rectum. Renibus, uelice, iocinoris gibbis, uenæ cavae, & arteriæ magnæ, & omnibus quæ in lumbis habent, eum qui urinis est delatus. Pulmonibus, & pectori, ipsam asperam arteriam & fauces. Cerebro & eius inuolucris, eum qui per palatum & nares descendit. Paritur fluxibilitas ijs quidem quæ per sedem externi habent, multa & cibis ijs qui uentrem liquant, & pharmacis quæ modice proritare possunt. Quæ enim acriora sunt, uitare oportet: quoniam phlegmonas exacerbent. Ad uentriculum uero, secur, & lienē, siquādo phlegmone sint uexata, nec multa ipsa est utilis, quoniam illico in bilem transseat, ac uiscerum phlegmonas augeat. Excrementa uero ut cum urinis excernant, ijs medicamentis quæ urinas mouent (*διεγγρα* Græci uocant) promouebis. Non secus quæ in pectore & pulmone continentur, tussi (per ea scilicet quæ hanc moueant) uacuabis. Porro in opere De medicamentis cuiusque materiam didicisti, non eorum modo quæ iam comprehensa sunt, sed etiam quæ cerebri membranarumque eius superflua per nares emittunt. Etenim horum quoque omnium uberem materiam suppellectilem in illis commentarijs habes.

20 Quare abunde sunt ad rem præsentem, quæ hætenus de phlegmone laborantium partium differentia disputauimus. Dicturus enim plura de ijs sum in ea methodo, quæ omnium tumorum qui præter naturam sunt, curationem comprehendet. Neque enim in præsentia dedita opera & studio hunc sermonem sum ingressus, sed præter pensum in eum, & sequela quadam rerum inuēiente, diuertit. Siquidem propositum nobis in hoc lib. non fuit, ut te partis cuiusque phlegmone obsessæ optimam curationem docerem, immo ut noxam eorum ostenderem quibus cataplasmata in febris. non uacuato prius toto corpore imponuntur: potissimum ubi intra corpus aliquid phlegmone infestatur. Quippe si ambies ita calet, ut materias ualēter liqueat, maior noxa eiusmodi cataplasmatibus succedit quam lotioni in balneo. Quamquam autem qui quotidie præcordia perfundunt, & cataplasmatibus inducunt: non modo nullam ex ijs noxam, sed etiam magnam utilitatem ægris comparari: contra ex lauando non modo nullam utilitatem, sed etiam maximum incommodum: scilicet ignorantes sicuti reliquorum omnium quæ circa ægrum administrant, ita & balneorum naturam. Ego uero de uniuersa earum ut in superioribus disputauimus plenissime. Nunc tantum dixisse est satis, quibusdam prorsus nihil nociturum balneum, quibusdam minus quam cataplasmata. Quod enim in præcordijs relaxantia (quæ isti uocant) præsidia faciunt, id balneum in toto efficit corpore. Eoque cum

in remissione febris adhibetur, corpore iam mediocriter transpirare, non exiguum affert commodum, omnia ex eo tum fuliginosa excrementa, tum fumida educens. Et siquidem nullius visceris imbecillitas subest, proficiet agrotanti: si tamen horror inter exhibendum non incidit. Tribus enim his in balneo quod in quacumq; febris adhibebis, intentus sis oportet. Vni quod citra horrorem sit admistratum. Secundo quod nullum primum notae viscus sit imbecillum. Tercio quod multitudo crudi humoris in primis uenis non contineatur. Horror namq; (ut prius dictum est) non solum intendere iam presentem febrem potest: sed etiam cum non fuit, eam interim excitare. Partes uero imbecillae liquatos iam humores magis recipiunt quam antequam liquarentur. Crudorum uero copia in totum corpus digeritur. Horum si nihil obstat, ex balneis duobus hac aegro compendia accedant: & quod redundantiae humorum aliquid uacuabitur, & quod multum febrilis caloris transpirabit. Quod si praterquam quod nulla princeps pars imbecilla sit, etiam inferioris notae partium aliqua sit in ualida, ueluti podagricis pedes, & ijs qui articuli uisio laborant (*αρθρίκους* Graeci uocant) uniuersi corporis articuli, maxima salutis pars aegro ex balneo comparabitur ipsis infirmis partibus quae superuacua sunt, excipientibus. Assolent enim non nunquam & citra balneum superuacanea in partes infirmas confluere. A balneo uero magis: utpote tum succis ipsis per id liquatis, tum uis per quas meent patefactis. Ambo enim hac ex modo rato calore proueniant necesse est, tum ut humores liquentur, tum uia dilatetur. Proinde sit ut cum iecur, uentriculus, pulmones, pectus, uel principium id genus partium aliquod imbecillum sit, maxime laedantur quicunque se lauerint, si illis superuacua in corpore sint: iidemque ipsi cataplasmate usi, duplex incommodum sentiant, nullo commodo. Quippe balneum tum corpus totum uacuat, tum quod humidum est ac fuliginosum digerit. Relaxantia cataplasmata, ac similis facultatis perfusiones ut nihil boni afferunt, sic superuacuum omne ad imbecillius, quodcumque id circa medium corpus sit, contrahunt, siue iecur id, siue uentriculus, siue septum transversum, siue mesenterion, siue ieiunum, siue colon, renesue sit. Quod si diligenter assuetare uolentes, etiam pectus una excalcifiet: ut in ipsum uel etiam in cor, uel in pulmonem superflua rapiant. Voco imbecillam partem uel quae natura est intemperatior (alij namque alia sic se habet) uel quae ex praecedente aliquo morbo intemperiem contraxit, uel quae in praesenti tempore in hanc sit perducta. Non enim partium omnium quae aut phlegmone laborant, aut putrescentes humores, aut obstructions continent, uirtus statim infirma est: proprius tamen in ijs quoque superuacuum qualecunque id sit, in aegram partem propter calorem quem affectus excitat, fertur. Quippe particula quam obstructio, aut putredo, aut phlegmone obsedit, febris ipsius ueluti focus est. Ergo cum huic propter calorem sua sponte trahenti alia quapiam oc-

calio extrinsecus ex eis quae potestate excalcifaciant, accessit, necesse est affectum intendi. At uero si quis uti praedictum est, toto corpore prius uacuato relaxantibus curet, ubi scilicet maxima febris non adest, utique prodesse aliquando potest. Tum uero ceu dictum etiam est, lauare citra noxam licet. Cauendum tamen ad frigidum solio his est: quando & crudi & putrescentes succi, difficiles concoctu redduntur, si quis in eo moretur. Sane officit ijs etiam si aqua admodum sit frigida: quando sic affectorum tum corpus, tum uel maxime afflicta particula diffilari euaporari que postulat. Quo fit, ut uel perfundere illos aqua idonea soleamus, uel si moderate quae in naratione est friget, ingredi permixtos celeriter exire iubere. In progressu tamen morbi, quo tempore & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia concocta, cataplasmatibus relaxantibus, & balneis sine periculo utare.

21 Porro aptissimum in febribus quae intermitunt, & repetunt, tempus est cum (uti dictum est) exhalare iam coeperit febrilis calor. Statim enim corpus ad nutrimentum praeparant, huius quoque opportuno tempore ex duplici coniectato respectu: nempe summo praecedentis accessionis uigore, & futurae principio. Ad haec namque spectantes, operam dabimus ut quam longissime ab utroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter summum prioris accessionis uigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inuenire. Sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, ut aut aegrum admodum adhuc calentem nutrias, aut sequentis accessionis inuasionem iam iam affutura. Quo magis praesagio medici eiusmodi febris indiget, qui primis statim diebus quanto spatio duratura febris sit, conijciat. Quippe si continens fuerit, constat breui finiendam. Si itaque ultra septimum progressura non uidebitur, prius continendus a cibo aeger est: utique si uirtutem non defecturam conijcimus. Sin ad nonum, aut undecimum, aut quartumdecimum usque progressura uidetur, aut etiam in septimo finiendam, ceterum aeger uires infirmiores habere quam ut in tantum tempus sufficiat, necessum erit nutrire ac deligere sicut in re ancipiti conuenit, quod minus sit noxium: distinguendo id discernendoque ab eo quod magis sit nociturum, idque tum ex loco afflicto una cum affectu, tum accessionis & principij & summi etiam uigoris consuetudine. Siquidem ubi uel iecur uel uentriculum phlegmone prehendit, perniciosissimum est ante accessionem cibare. Vbi haec abest, quibus infirma est uirtus, utilissimum. Assolent enim eos qui ita se habent, iocinare quidem afflicto, alui deiectiones una cum accessionibus inuadere: ore autem uentriculi uexato syncope. In alijs uero animalis instrumentis, quod iam dictis portione respondeat, tum ex sitis eorum ratione, tum dignitatis, aestimabis. Ageturque de ipsis postmodum. At summi uigoris & accessionis principij morem sic consideres, censeo. In summo uigore notabis, an citra magnitudinem febrilis calo-

ris siccus sit & squalens, an citra siccitatem urens. A Priorē namq̃ humectate uictu madefacere quam primum oportet. In secundo, dum plurimum calor is se remittat, manere. In principij uero accessio- nis more aestimabo, an corporis extrema perfrige- ret, & magnam sanguinis reuocationem ad inter- iora corporis faciat, in omnino corpus non pre-

ARGVMENTVM LIBRI DVODECIMI

Caput 1. In genere differit de symptomate, quid sit, quot partes habeat quae uel illorum sint effectus: ostendens primum non esse febrium genera aut differentias, quae cum huius generis symptomatis consentiant: (ut er- rent recentiores qui febrium syncopalem ceu genus per- se statuunt) De dolore item summouendo obiter docet.

2. Generatim attingit duo symptomata, quae cum fe- bres nonnunquam comitentur, à nostris appellantur fe- bris syncopes ex humore, & febris syncopes imminuta, ut sit quasi à pauca materia prognata. Seriatim autem curationem eorum sequentibus duobus capitibus exi- git. 3. Febrem syncopes ex humore primum absoluit, quam fieri aiunt à pituita cruda in uentriculo aut pro- pinquioribus illi uentulis abundante aut putrescente, quod sit dum cibum non concoquitur, aut immoderate ingurgitatus est. 4. De altera syncopes febre, quae à iu- moribus dicitur minuta, hoc est ab exigua materia ori- unda. Fitenim à bile subtili, putri, particeps uenositatis ueloci & mobili: nonnunquam tam subito & cum ma- lignitate tanta, ut uires aegri tantum imperum perferre non queant ad quartum, sed praemorianitur. Et quoni- am lapsu scule exigua panis mica, apto uino irrorata, a- nimum alioqui interituro reddat illico: infinita penè uia recitat Galenus, quorum obiter naturam & qualita- tem indicat. 5. Adhuc de syncope, eiusq̃ causis. 6. Syncopalem febrem minutam (ut uocant) quomodo demoliantur: & quod utraq̃ uitae periculo coniuncta sit, si quod uiscus phlegmone laboret. 7. Subnequit ordine reliquas causas, unde potissimum syncope possit con- flari: primam, dolorem: secundam, uigilias: tertiam, im-

mat. Quippe secundū hoc, ceu facile mansuetum ue, contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absq̃ uisceris phlegmone, aut succorum redun- datia, motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendens paulo ante cibās. Sin uel phlegmo- ne, uel redundantia subsit, cauenda est ante acces- sionem cibatio, ceu res maxime noxia.

modicam uentris inanitionē: quartam, motum eorum qui aliena loquuntur: quintam, intemperiem principio- rum. Et quod sola sint dolorifica, quae uehementer uel ex- calfaciant, uel refrigerent, & quae substantia conuulsa tem soluāt. Postremō quibus artibus dolores mitigan- tur. Obiter etiam historiam narrat quod dragenarij cu- iusdam coli dolore ob acres humores affecti: & aliam al- terius colici. 8. Prolixius hic indicat uariorum cura- tionem dolorum, & mitigationem, quos uel sanguinis copia, uel flatuosus spiritus tantum, uel spiritus simul & humor quispian crassus glutinosusq̃ excitauerint: uel moles aliqua, uel mordens humor. De narcoticis.

De coli remedijs, cū historia alio liberati. De oculo rum & aurium doloribus. De cucurbitula cum copio- sa flamma. De tenuibus & acerbis humoribus, & quae noceant ori uentriculi. Remedia dorum ex siccitate.

Conuulsionis species 4.

Aliter.

De febribus, quae una cum symptomatis accidunt. Symptomati tantū obistere, & ipsum symptoma dum morbum curamus auferre, diuersa admodum esse. De dolore. De febribus, quas crudi & crassi humoris co- pia gignit, quae quidem agro syncopen minantur. Cu- ratio eorum qui in syncopen inciderunt. Vini plures differentiae: & quoniam his uia coherant, qui syncop- pe urgentur. De his quibus ex tenuibus humoribus syncopes periculum imminet. De his, qui uel ex dolo- re uehementi, uel uigilia, uel immodica euacuatione, aut mentis alienatione, in discrimine sunt ne syncope corripiantur.

GALENI METHODI MEDENDI, ID EST

DE MORBIS CVRANDIS

Liber duodecimus.



ON sunt, sicut nonnulli autu- mant, ex quae cum sympto- matibus consistunt febres, aut febrium genus ullum, aut spe- cies differentiae: sed ueluti tū alius morbus alij morbo, tum symptoma symptomati uno tempore, eodem in cor- pore copulatur: sic & cum febre incidunt quaedam grauiora symptomata, quibus prospici maiore medentis sollicitudine debet. Nam de leuioribus quae febrium generationi necessario succedunt, adeo omnino non meminerūt, ut etiam ceu prorsus nō sint, innominata ea reliquerint. At quae uel rarerent febricitantibus incidunt, uel cōmunem magnitudinem excedunt, seorsum ab alijs traden- da censent. Sunt porro eorum primae differentiae tres. Aut enim in actionum offensā consistunt, aut in retentorum uacuatorum ue immodico excessu, aut corporum ipsorum affectu. Quartum enim ge- nus numerādum inter symptomata non est, etiam si inter symptomata quammaxime non pauci id

Galen.

posuere: sicut erysipelata, ophthalmias, ulcera, pa- rotidas, reliquaq̃ id genus. Ex praedictis uero tri- bus actionum quidem offensae si contristant, soli- citudinem medici ad se cōuertunt, affectumq̃ de- serere cogunt. Idem faciunt & eorum quae retinen- tur uel expelluntur excessus. At genus symptoma- tum quod in affectibus consistit, alterius quidem quem curare oportet, affectus est signū: ipsum ta- men nullam seorsum curationem exigit, utpote cū affectu unde nascitur, una cessans. Ut enim in summa dicam, nullum symptoma, quā symptoma est, nec curationis rationem indicat, nec primum immutat. Monstratum enim est, ex morbis ipsis, curationis indicationem praestari, ueluti ex causis ipsis, prouidentia. Dictum praeterea est & quomo- do prouisio ipsa cum medendo simul sit mista. Ex accidenti tamen symptomata quoq̃ curandi ratio- nem aliquando mutant: causae scilicet locum eo tempore habentia. Eorum omnium cum ueluti cau- sae curationem immutant, unum caput est. Dico id unum laesionem: siue ea ipsius uirtutis sit, siue affectionis: quando si nihil ipsi officiant, curationē

tom. 6

fi

non

non interpellant. Lædunt autem vires uigiliæ, dolor, & immodica uacuatio. Affectui uero eadem non utiq; semper, cæterum magna ex parte non cent, ac potissimum cum fuerint immodica. Ob hæc igitur sola, curandi ratione quam ab initio institueramus, ad præsens mutata, symptoma summouere primum cogimur. Ergo si labant vires, non tamen uehementer sunt iam resolutæ, sed adhuc resistunt, ad symptoma tantum sumus attentî: atq; id quam primum summouere maturamus. Sin iam resolutæ uehementer vires sunt, non modo symptoma sedare, sed etiam illas firmare properamus. Quod si uno remedio tum symptoma leniri, tum morbus curari queat, id utiq; non fuerit symptoma respicere, aut symptomaticis causâ remedia sumere: sed omnino eiusmodi auxiliorum species planè morbi curatio est. Neq; enim cum lateris dolorem in pleuritide, misso sanguine, uel corpore purgato, sanamus, nec cum abcessum distentum, & cum dolore pulsantem diuidimus, ac pus emittimus, eiusmodi curatio symptomaticis est: sed cû exempli gratia in dysentericorum diæctionibus, ubi uehementer rodunt, uel tragi succû, uel hircinum feuum, uel rosaceum ceratû per inferius indimus, quibus utiq; præsidij ipsa exulceratio intestinorum non sanatur, maxime si putrescens aliquid habeat: sed vires interim conuiescunt. Atq; id est contra symptoma instare, morbo ad id tempus neglecto. Quippe ubi uirium roboris fiducia est, adeo nunq; contra symptoma pugnamus, ut contra prorsus per eam non unquam præsidia quæ dolorē afferunt, morbos ipsos curemus: ueluti profecto dysenterici ipsi, mordentibus maxime medicamentis, tum potissimum medemur, cû utiq; est grauissima. Quippe medicus quidâ quin quagenarius, cum iam septimâ noctem egrotaret, nec uiribus admodum ualentibus esset, dolore illi capitis uehementi in dextro potissimum tempore oborto, non expectâs dum amicos quispâ ad se ueniret, sibi ipsi nocte uenâ incidit. Itaq; dolor illi protinus cõquieuit. Cæterum longo tempore tum decolor, tum uiribus imbecillis, tum exilis mansit, aliquid corpus eius desit, (*ἀποσιναί* Græci uocât) sic ut uix pristinum habitû receperit. Est porro hic quoq; duplex medicorum contra dolorē instantium ratio. Altera, qua delicijs cubantium subscribunt: altera, ex artis ratione. Quippe si licet egrum doloribus obniten tem ualentibus remedijs uno die per sanari, qui tota neglecta curatione dolori tantum est intentus: nō id ex artis ratione, sed in ægotatis gratiâ facit. At si ex dolore vires resoluuntur, atq; ex eo periculū impendit, & mitigari dolor, & roborari vires debent: quod & morbo resistere, & curationis spatium sufficere ualeat. Equidem noui quosdam, tum medicos, tum ægros, qui dum animosi uideri uolebant, ob id ipsum perierunt, q̃ fortiter & uiriliter contra dolorem semper sunt renixi, nec quod eum leniter quicq; ceperunt, sed in asperis & (ut ipsi interpretabant) affectû destruentibus auxilijs perseuerarunt. Quos sanè spatio longiore curatos esse satius fuisset, q̃ breui uiriliter mori. Quidâ autem (ut sibi est usus) generose dysentericos uehemen-

tissimo medicamento curans, multos uno sanauit die, quosdâ uero iugulauit. Erat namq; eius medicandi ratio eiusmodi. Cepas id genus quod Græci *κᾶπροι* uocât, uno die comedendas cum pane dabat, tum potum parum, postridie mane muria acerrimâ per inferiora infundebat: secundum hanc etiam pharmacum ualidum. His igitur tolerâdis quicunq; sufficere potuerunt, prorsus sunt sanati: aliqui uero cõuulsionem, aut animæ ex dolore defectu, unâ cum madore cutis oborto interiere. Esto igitur terminus in ægotantibus, quem non transibitis qui ex arte generose contra morbum pugnat, ut tutò medicetur. Ei uero qui dolorē mitigat, ut vires custodiat, ubi ultra pergitur, crudelis hominis officium facit, qui unâ cum morbo uitam quoq; homini aufert. Qui uero cubantibus delicijs subscribit, eiusq; uoluptatē non sanitatem pro meta gerendum habet, adulatoris. Committunt medici eiusmodi excessus cû in alijs quoq; remedijs generibus non paucis, tum uel maxime in ijs uocatis anodynis, quæ ex papaueris succo, uel alterci semine, uel mandragoræ radice, uel styrace uel tali quopiam fiunt. Nam & qui ægris gratificantur, in eorū medicamentorum usu modum excedunt: & qui inter pestiue immo diceq; sunt animosî, dum prorsus horum usum refugiant, doloribus ægros iugulât. Ergo ueluti in omni totius uitæ, tum habitudine, tum actione, ita hic quoq; cõsiliū illud sapientis, qui Nequid nimis, dixit, cõplectemur: habentes profine, quò tendamus, cubantis utilitatem. Quippe si fas est ijs remedijs quæ morbum sanent, utendo, quod optamus efficere, abstinentium ab ijs somniferis medicamentis est quæ uocant *ἀνὰ λυα*. Sin ex uigilijs, & uiribus resoluēdis, ad morbis discernim æger tendat, tum profecto tempesiue eiusmodi medicamentis utare, scilicet nō ignarus corporis habitum non nihil ex his lædendum: læsionem tamen quàm mortem potius optandam. Nam si hæc admodum magna nō sit, saltē postea spatio longiore eâ sarcire licebit. Sin ita est immodica, ut nec prolixo spatio per sanari queat: at certe hæc ipsam eligendam potius remur, q̃ ut homo pereat. Hac nimirum persuasione ipse quoq; tamēdi omnium maxime ab usu grauitur fopientis abhorret, aliquando tamen ea & colicis exhibeo, & ijs qui uel oculorum, uel aurium, uel aliarum partium uehementissimo dolore cruciatur. Interim uero & cum æger ex tenui defillatione, uigilijs, & uehementius urgetur, pauxillulum eiusmodi medicamētum offero: facile noxam eius, si quis semel est usus, spatio emendatū iri ratus. Porro dissident inter se ipsa medicamēta. Quippe quæ plurimū torporem inducentium in se habent, ea ad præsens quidem magis sunt efficacia, cæterum ualentem, & remedijs rebellem, in ægotantis corpore frigiditatem relinquant. Quæ horum in se habent minus, calfacentium uero sibi admiscitur plurimum, ea quanto sunt ad præsens minus efficacia, tanto in futurum minus sunt noxia. Omnia tamē id genus magis sunt salubria, si post annum à cõpositione sumantur, ueluti quod ad Philonem referunt autorem, quod ad

dolores ex sensus torpore sedandos, nullo minus est celebre. Sunt sanè & alia medicamenta nō pauca ex seminibus confecta, Græce *ἐκ σπέρματος* & *σπέρματος* nominata, quæ sicut ad torporem in præsens inducendum mitiora, ita in futurum sunt tutiora. atq; hæc quoq; omnia utilius annotina sumuntur. Philonis uero medicamen etiam si duorum, trium uel, aut quatuor annorum sit, multo sanè est melius; sed nec inutile tamen sequētib; annis ad decimum usq;. Quod em̄ ultra inueterauit, tanto quidem est minus noxium, quanto est uetustius; cæterum languidis est uiribus, eoq; parum nauiter, cuius gratia paratum est, perficit. Ergo si cuti cauendus est, quoad fieri potest, eiusmodi medicamentorum usus ita si necessitas urget, nec admodum noua sunt offenda: q̄ frigida quæ in his sunt, præualescentes uires adhuc habeant, nec ita antiqua, ut spem nostram frustrentur. sed uti comprehensum est, tandiu dimittenda sunt quoad uis sentia refrigerantium, ab eorum quæ calfaciunt uis mitigetur. Et talium quidē medicamentorum usus, eorum qui aduersus symptoma pugnant, est proprius, potissimū ubi ex frigida causa dolor est excitatus. obfunt enim talia plurimum toti affectui, ac curationi contumacem eum reddunt.

2 At sanguinis missio, quæ scilicet uires non deiecit, symptoma spectantis medici opus nō est, sed eius qui totum affectum adimere studet. Ad eundem modum & balneum & purgatio, & formula calida, & uini portio, quorum omnium Hippocrates in Aphorismis, ubi De oculis dolētib; loquitur, his uerbis meminit: Oculorum dolores meri portio, lauatio, fomentum calidum, uenæ sectio, uel purgatio soluit. Hæc nanq; omnia dum affectus sanant, unā etiā cum ipsis dolores sedant. Eodem modo nutrimentum (ut in superioribus est dictum) ubi in sicco & squalente morbo, stomacho laborāte exhibetur, dum affectum ipsum sanat, etiā syncopæ prehendi prohibet. At non ea quæ ex redundantia frigidorum humorum incidit, siue resolutio, siue stomachi syncopæ est, alimentum ceu medicamen desiderat: quanquam etiā in eiusmodi affectibus non solum nutrimentum, sed etiā uini aliquid non raro ægrotanti dare cogimur: non utiq; quod affectum curemus, sed quod periculum in præsens depellamus. Quippe uacuatio potius, q̄ adiectio, est hoc genere laborantium curatio. Licet q̄ quotidie uidere sic ægrotantium plurimos medicorum ignorantia perditos, de quibus agere nunc mihi tempestiuū uidet.

3 Ergo febrecitate incipiunt nonnulli, ubi maxime crudorum succorū copiam unā cum oris uentriculī (quod sanè stomachum uocant), offensione, uel ex cruditatibus, uel alia quapiā occasione congeglerunt. His & præcordia inflata, & totum corpus ampliore mole quam pro natura modo cernitur, rum color alijs quidem ad albidius q̄ pro naturali habitu, & intercute aqua laborātium magis simile, est mutatus. Nonnullis etiā ad nigrius, aut liuidius, quos quidem medici plumbei coloris appellant, omnibus pulsus minores sunt

A quā pro caloris ratione, præterea obscuri omninoq; inæquales, sæpe ea inæqualitate, quā ex pluribus ictibus collectam *συσσώματις* Græci uocāt: semper uero ea quæ in uno est ictu. Nulli taliū sanguis mitti sine maximo dispendio solet; cum tamen uacuacionem desiderant: uerum nec sanguinis missionem, nec purgationem sustinent: utpote quos sine his syncopæ subito adoritur. Quenam igitur est ratio talibus medendi, qui cum uacuari postulent, uacuancia præsidia nō ferunt? Sanè nullam aliam his [idoneam] uacuacionē inueni, præter eam quæ ex fricōne paratur. Incipere uero in principio statim morbi oportet: ac primū a cruribus, superne deorsum, idq; linteis non admodum mollibus, sed aspredinis mediocriter quid habentibus. Debet enim radi ab his cutis, cum simul & calesceri per eam & digerī ægrotus postulet. Dehinc tota brachia, ab humeris usq;, atq; superne deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi uero artus omnes abunde calere uidebuntur, & metus fuerit, ne quis ex multitudine frictionis confusa iam carne, lassitudinis sensus ipsis superueniat, oleo relaxante uteris, quod genus est Sabinum: ab adstringente uero abstinebis, cuiusmodi Hispanū est, Histricumq;, & quod unā cum germīnibus, uel ex oliua adhuc immatura conficitur. Hyems uero si fuerit, nihilò deterius sit si ad digerentiū aliquod transieris: cuiusmodi sicyoniū est, aut quod cum chamæmelo cōponitur, aut quod apud Aegyptios est in pretio. Quod si horum copia nō sit, oportebit accepto relaxantiū oleorum aliquo, & in quo nulla sit adstrictio, potissimumq; quod est antiquius, immittere ipsi anethi quod uidebitur satis. Mox (ut ipsi solemus) ubi inuase duplici tatisper calfeceris, dum mediocriter qualitate herbæ imberit, unge re hoc artus & fricare tunc quoq; quā plurimū debebis: postea oleum, quoniam tædium afferat, detersere atq; ad spinā dorsī trāsire, hancq; totā pariter fricare, primū sicca fricōne, post oleo. Ab hac rursum ad crura te conseres, & ab his ad brachia, exin denuo ad spinā: ita totum agens diē in domo pure lucis, nec madente. Esto eius domus & calor mediæ temperiæ. Sanè multa in qua coctum hyosopi fuit, his est aptissima. Seruandumq; ne uel cibum, uel sorbitionē, uel aquā exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi multa tribus primis diebus duntaxat uti: ipse quas dixi partes ordine fricans, eoq; solū tempore intermittere, quo somnus hominē occupauerit. Ad quē etiā alliciendum, & fricō uberior facit. Itaque uel hoc nomine utile præsidium fuerit, nedū qd inaniat. At uero nūc uberior somnus his est salutaris: cū nec crudos succos digerī sinat, & uiscera grauiora reddat. Sed si quis alius affectus est qui somnū et uigilias modicas desideret, hic profecto in his est. Quippe somnus coquoq; uigilia digerunt: quorū utroq; est opus ijs qui ex multitudine crudorū succorū ægrotant. Ergo inuicem mediocriter adhibiti, iuuare se mutuo utiliter poterūt. Atq; si pulsus his paruus admodū infirmusq; sit, aut etiā supra hæc uehementer inæqualis, scire licet extremum periculum esse: facien

da tamen nobis quæ retuli sunt, nec aliud quicquid molindum. Sin pulsus robore mediocri sit ac magnitudine, preterea minime intercisus, & equalis, considera quæ ad alium spectant, ac si sua sponte comode non deiciat, audacter per inferius aliquid infundes. Accidit namque post aquam mulsam, ut quæ in primis uenis, quæ scilicet circa iecur & mesenterium sunt, colligi superuacua solent, hac comode deiciantur. Quod si maior iusto superfluum impetus ad alium citetur, principio quidam percoquere mulsam amplius oportebit. Eam namque sicut minus alium subducit, ita magis nutrit. Contrà, cruda ut minus nutrit, sic magis subducit. Post hæc, si superuacua largius descendat, ne sic quidam sistenda, sed exhibendus pro aqua mulsam pristinam cremor est. Si uero fluere pergant, aliam sorbitione nutries, pulsuum interim ratione obseruata. Aliquando enim subito ad imbecillitatem, uel inæqualitatem, uel puritatem mutantur. Quo tempore panem ex uino diluto exhibere conueniet; utique si nec uenterculus, nec iecur phlegmone laboreat; quando si hac infestetur, iam corpore crudis succis referto, plane desperata salus ægro est, pulsibus sic mutatis. Ergo in eiusmodi ægri casu te ipsum à culpa immunem præstabis, si morituum prædixeris, ac nullo generosiore medicamento usus fueris. Quibus uero spes est salutis (est autem omnibus, qui ita citra phlegmonem ægrotant) maximè medico, qui utique ipsos in principio suscepit, uidetur mihi dedecus esse, si in syncope incidere: quamque per insectam medicorum quotidie fieri cernitur. Verum non est quod hos spectemus, aut cum his nosmet cōseramus, sed cum eo qui cum re uera peritus in arte sit, secundum putet ægrum animo extemplo linqui, ipso nec symptoma prædicente, nec ad id præparato, aut id prohibente. Sane dictum à me etiā in superioribus est, qui cataplasmatibus & perfusionibus assidue præcordia uexat, ipsos in eiusmodi affectibus phlegmonas excessere. Minime igitur est his utendum, priusquam superuacua magna ex parte partim uacuata sint, partim concocta; tum uero etiā his utaris licet, non tamen duntaxat relaxans, sed ex absinthio medicoriter perfundens; si tamen febris non plane sit magna. Si uero medicati tibi tres primos dies, ut dictum est, nihil occurrat incommodum, ipsi de ipsis utaris usque ad septimum, aqua duntaxat mulsam, in qua incoctum hyssopum sit, contentus. Siquidem longissimam, qui ita sunt affecti, cibi abstinentiā ferunt, corpore scilicet ex crudis ipsis quos continet succis concoquendis alto. Quod si non modo crudi succi sint, sed etiā eo corruptionis peruenerint, ut concoqui ad perfectionem non queant; qui sic ægrotant, eorum desperata est salus. Sed qui, si nullus præsertim committatur error, seruari possunt, si aqua solū mulsam ad septimum usque sunt nutriendi; aut si tibi id res exigat, uel alio fluere, uel ægro mulsam fastidiente, ad pristinam cremorem effe transeundū. Sin hunc quoque auersetur, alicui ad eundem quo pristina modum ei præparabit. Neque enim his qui ita sunt affecti, acetum incommodum est; imò si tibi crudos affatim succos esse animaduertis, oxymeli pro-

mulsam exhibere assidue debebis. Quod si huius assiduus usus tædio esse coeperit, transire inuicem ad mulsam & pristinam conueniet; dein rursus ad oxymeli reuertitur. Maxime uero quibus tum paruus, tum tardus ac rarus pulsus est, his frigidus subesse succos putandum. Iisdem protinus & color uitatus in toto corpore manifeste cernitur; qualis nimirum prius est traditus. Sed fieri fortasse quod dictum est, non posse cuiquam uideatur, cum nulli feblicitantium aut tardior, aut rarior pulsus fiat. Cæterum, duplici ratione uerum esse quod dictum est, comprobetur. Vna quod euidenter in accessionibus appareat & tardiores & rariores, quam pro naturali ipsorum habitu pulsus fieri. Altera quod reliquis præter accessionem temporibus horum arteriæ, tum rariis, tum tardius, quam aliorum quorūvis qualitercunque feblicitantium, pulsant. Ergo si æstas sit, & æger frigidæ potioni assuetus, frigidum huius oxymeli dabis. Sin hyems sit, omnibus calidum, tum his qui calidæ, tum his qui frigidæ insueuerint, offeres; æque ut si immodicus æstatis tempore æstus sit, etiam qui calidæ adfuerint tum, frigidum; utique si nullum sit his uiscus ad iniuriam opportuni. Sanè propositis aduersissima sunt, tum balneum, tum aer ambiens, quoties uel nimium calidus est, uel frigidus. Itaque ut lauandi hi non sunt, sic & reclinandi in domo sunt; æstate quidem, quæ friget; at hyeme, quæ caleat. Læduntur namque non parum ab utroque excessu: uidelicet in balneo, æstate, & omni caloris incremento crudis humoribus liquatis, ac per omnes corporis partes fluentibus; ita ut metuendum sit, ne ad pulmones et corferantur; aliquid quoque etiam ne ad cerebrum subeant; cum longe præstet, ut circa iecur & primas uenas adhuc ipsis subsistant. In domo uero immodice frigida, & hyeme, et denique ambiente frigido, succi qui crudi sunt, & inepti ad concoquendum manent, & iocinoris obstructions, si leues sunt, augent si nullæ sunt, eas crassitudine sua hæretes impactique creant; atque hæc quidem agenda sunt, ubi primo die ipse curationem suscepis. Si autem ad eos quos syncope iam premit, his accitis, si ea quæ retuli loca phlegmone uacent, panem exhibebis non multum: huncque ex uino aliquo quod celerè in corpus digestionem adiuuet; statimque ad frictiones uenies, quas etiam pro tradito iam modo administrabis. Ac si quidem æstas sit, & regio naturaliter calens & æstuans, aut status coeli uehementer calidus, cum frigida uinum dabis; si nihil eiusmodi sit, cum calida. Quæ tamen secundo & tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendam curabis. Quippe ad uniuersam eam curationem, cuius gratia frictiones adhibuimus, calidum præstat: utpote crudorum succorum concoctionem adiuuans.

4 At quibus ex flaua bili quæ os uentriculi infestet, syncope incidit, his frigida exhibenda potio est. Vinum tamen quod & calidum natura sit, & deductionem in corpus promoueat, omnibus quos syncope male habet, offerre conueniet: distribui namque per corpus nutrimentum quod sumptum

putum est, non in uentre manere uolumus. Constat autem ex uinis ea deligenda esse, quæ & fluau sint colore, & substantia tenui, & ætate uetera: talia nimirum & boni odoris continuo fuerint. Quin etiam ipse si postquam biberis, modico temporis spatio retenta fuerint, senties calorem per totum corpus transmitti. Cæterum amara præ uetustate, uina ne sunt: præsertim quæ ijs exhibebis, quorum stomachus flaua bili urget. Talia namque simul laudabilem ac nutriendam uini succum iam amiserunt: simul insucunda cum sint, hoc ipso stomachum offendunt. Commodissima igitur his uina sunt, quæ cum naturaliter austera sint, sensilem iam adstringendi uim propter uetustatem non amplius exhibent: calorem tamē admodum euidentē habent: omnia enim quæ requirimus in ijs quorum stomachus amara bili uexatur, efficient: cum & iucunde sumantur, & tum concoctionē, tum digestionem in corpus promoueat, & succi uitium mitigent, & corporis habitum excalfaciant, & stomachum ipsum firmet. Huiusce generis uinorum optima sunt Surrentinum, Signinum, Sabinum, Tiburtinum, Marsum: omnia quidem Italica, & adstringentia; non tamen pari modo omnia. Nam Surrentinum cum mediocriter adstringat, tum calidius cæteris, tum iucundius est. Ab hoc nobile Tiburtinum. Est enim & aliud quoddam imbecillum Tiburtinum, quod etiam sicut Sabinum, leuiter potest adstringere. Signinum uero austrius est: sicut etiam Signino multo magis Marsum. Hæc omnia uina stomacho qui amara uexat bili, salubria sunt. Ideoq; illis utendum quoties is uel ex ardenti febris offensu syncopen attulerit, uel alias multa in eum bilis fluxerit, uel multam imbiberit. Quibus tamen ex crudis humoribus syncopes periculum imminet, sanè Falernū tanto iam memoratis præstat, quanto melioris est succi, tum etiam calidius, utpote quod & uelocius illis per corpus digeretur, & crudis succis cōcoquēdis auxilio erit. Quæ cum dictorum singula aliud magis aliud minus faciant, omnia tamen Falerna magis stomachum roborant. At quoniam ipsorum Falernorum aliud dulce admodum est, (quod Faustianum uocant) aliud si cum hoc conferas, austerrum: si cum Signino & Marso, dulce, deligendum ad talia secundū est. Si uero cubans per sanitatem dulcibus uinis in fureit, huic nihil prohibet dulcius Falernum exhibere. Verū in Asia, & Græcia, & nationibus quæ his sunt uicinæ, ubi copia iam dictorum uinorum aliquando non est, ex ijs quæ illæ regiones suppetant, aptissima ad digestionem in corpus sunt Ariusium & Lesbium. Hoc quidem, ueluti ex ipso nomine patet, in Lesbo natum, Ariusium locis quibusdam in Chio provenit. Cum uero tria sint in Lesbo oppida, minus certe tum odorum, tum dulce in Mitylene gignitur, magis & odoratū & dulce in Erefo, dein in Methymna. Porro fumen da ex his sunt, quibus marina aqua admixta non est: raris, maximū futurum incommodum ex ijs quibus est admixta. Alioquin nec assolent in Lesbo nobilibus uinis, de quibus nūc agitur, marinam aquam

Galen.

A immittere: ueluti nec Ariusium in Chio. Prouenit & in Hellepontii Mysia, uinum Surrentino non ab simile. Myrsinum per eminentiā uocant. Hæc omnia uina flaua & calida & odora sunt, & substantia quæ inter aquosa crassaq; sit media. Aquosæ porro substantiæ sunt Adriani, & Sabinum, & Albanū, & Gaurianū, & Thuscum, & Neapolitanū amineum: quod scilicet in locis Neapoli uicinis gignit: unde etiam ita id nominant. In Asia uero & Tibecinum, & Titacazeni, & tertium ab ijs Arsyini. Cōtra, uero crassa ueluti sapa sunt, & Scybellites, & Thereum, & Albates. In Asia uero Aegætos, & Perperinū. Ergo quibus ex abundantia crudorum humorum syncope incidit, ijs crassa uina ceu noxia, aquosa ceu parum efficacia, sunt fugienda. Deligenda uero eorū sunt media, quæq; ut prædictum est, flaua sint & calida. Neq; enim inuenias ex albo uinorū genere calidum ullum: quando etiam austera & mediocriter alba, cum inueterauerint, fuluora quodāmodo reddantur. Quod si aliter nominare fuluū colorē uelis, licet uoces igneum pallentem. Quotquot autē in ipsis calidissima sunt, omnia certe flaua sunt: cuiusmodi in Italia est Cæcubū. Quod etiam unū quoddam genus eiusmodi uinorū ab initio, sicut aliqui putant, non est, uerum ex uetustate eod peruenit ut igneum colorem contrahat: unde ipsum quoq; nomen est sortitum. Non tamē eō omnia perueniunt, cum prius crassentur, q̄ in perlucido flauorem accipiāt. Reliquorum uini generum, austera quæ mediocriter alba crassaq; sunt, certe nullū ad digestionē in corpus est idoneū. Si tamē abunde inueterauerint, nec aliorum copia sit, uti illis licebit. Sunt uero eiusmodi omnia cū inueterauerint, stomacho utilia. Quod uero habeas horū quoq; exemplū, tum eius quod ex Nicomedia afferit, memineris uelim, quod omnibus hominibus est notū: tum Siculi aminei, qd in magnis reponitur dolijs. Quod enim in paruis seruatur lagunculis, maxime huic est contrariū: cū & malum stomacho sit, & capitis dolorē excitet. Ac semper quidē est id agendū, ut optimū eligas. Si id non est, quod illi pro iam cōprehensis notis est quam simillimū. Aptissima namq; ad deductionem in corpus sunt Ariusium, & Lesbium. Sed si ea desint, minusq; in Asia, aut Aphrodisiense petemus aut austerrum Tmoliten, aut aliquod his similitum quod & colore sit fuluū, & sileo cum bibitur, manifeste excalfaciat. Considerandū uero ante omnia est, qualis nā egrotantis natura sit. Nam si imbecillum illi caput est, & quod facile calentibus uinis impleatur: quæ minus caleant, potius sunt offrenda. Sin firmo admodū capite est, & talibus uinis delectatur, aut etiā citra noxam ea ferre est solitus, haud timide his utetur. Porro uina quæ odora fluaq; sunt, quantū ex ipsis est natura, omnia caput grauant. Eoq; tum Falernū, tum Tmolites, tum Lesbium infirmo capiti noxia sunt. Qualis autē in Falernis tradita nobis differētia est, talis profecto & in Tmolitis habetur. Alterū enim admodū est dulce, alterū austerrum, si cū illo cōferat. Calida tamen admodū ambo sunt, eoq; caput gra

tom. 6

n 3

uan

uantia. Austeri uina uentriculū roborant, caputq; inter omnia uina minime tentat. Caterū, digestio nem in corpus nō promouent, quo magis fugienda tibi in syncope prehensū sunt, nō secus q̄ aqua. Habile uero ad faciē in corpus deductionem, & Hippodamātū cū inueterauit est, ipsū quoq; ex ea specie cuius tū dulce Faleinū est, tum uero Tmolites. Inest huic & adstrictio manifesta, quæ tamen in neutro illorū est. itaq; etiā salubrius sto macho est. In penuria uero uini quod accommodū utriq; syncope sit, ei in quā quæ ex multitudine cru di succi orit̄, & ei quæ ex bili incidit, coactus prorsus uino uti, fugere (ut prædiximus) oportebit omnia tum austeri, tum noua, itemq; crassa; diligere uero aquosa, magisq; si sint antiqua. Talia nāq; tamen non ualenter excalfaciūt, tamen facile in omne corpus deducuntur. Proinde cū celeritas digestionis in corpus sit his cū fuluis cōmūis, differe ntia rursus in his erit, q̄ concoctioni quæ uel in uētriculo, uel uenis agitur, fulua magis cōducunt, propterea q̄ magis excalfaciūt. Præterea tempera mentū inducunt, & nutriunt; eoq; ad succi bonitā tē opportuna utiliaue, quorū omniū nihil in aquo sis uinis est. Minimū enim ex horū substantiā in san guinis mutatur speciē. Sed cū fulua caput feriant, quæ aquosiora sunt, nusq; id contristāt, urinas aut præter cætera uina mouent. A quibus secundū lo cum obtinent, quæcunq; fuluorū maxime sunt te nuia, quæ etiā ad syn copas potissimum sunt deli genda. Tardius his deducuntur in corpus, quæ ful ua sunt, & crassa; quanquā ea quoq; austeris omni bus magis sunt penetrantia. At uero nutriunt hæc magis q̄ tenuia, ac uitiosos succos omniū uinorū celerrime bono sanguine generādo corrigunt. Er go institutum sermonem denuo repetamus.

§ Quod syncope præceptis uirium lapsus sit, id ab alijs ante me dictum est. Sed cum essentia uirium quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporū temperamento consistat, hæc nobis & ubi integra sunt, seruari; & ubi corrupta sunt, ad integrū reuocari omnino debent. Ac quæ admodum tueri ea per sanitatem cōueniat, in ope re De tuenda sanitate est præceptū. Quemadmo dum uero et in morbis, traditum iam aliquatenus, & in præcedentibus cōmentarijs est. Non tamen adhuc res tota ad talem qualem exigit contempla tionem est perducta; nec talem methodū habuit qualem priora. Quod igitur deest id nunc adijcia mus. Spiritus substantia unā cum solidis corpori bus sic nobis custodienda in morbis sunt, ut tum qualitate, tū quantitate, quoad fieri licet, naturali ter se habeat. Ac siquidē sic prospici hic posset, ut nec substantiæ eorum quicq; aut uacuaretur, aut prorsus immutaretur, id esset antiquissimum. Sed quoniam in cōmentarijs De sanitate tuēda osten dimus fieri nō posse, ut id generabili corpori unq; contingat, id agendum est, ut quæ substantiæ por tio defuit, hanc apponendo faciamus; quod alte rascit, in debitam temperiem per contrariam alte rationē uindicemus. Si igitur tum uacuatio, tum alteratio sensim paulatimq; fiant, etiā correctio

A utriusq; sensim administrabitur. Quod munus ad artem sanitatis tuendæ spectare est monstratum. Sin confertim & semel ac magna aliquādo uacua tio, uel etiā adiectio incidat, & morbus ita effi ciatur, & medendi methodum ad eorum sanatio nem requiremus. Veluti enim mutationem in nō naturalem habitum, quæ sensim paulatimq; irre pit corrigere, sanitatis tuendæ artis sunt partes; ita eam quæ multa simul irruit sarcire, ad medendi pe ritiam spectat. Ergo animalis spiritus cerebrū ue luti fontem esse, clare ostendimus, qui partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur atq; alitur. Vitalis spiritus nō æque euidentis demonstratio erat. Sed tamen in cor de eum & arterijs contineri existimare, alienum à ratione non est; eundemq; nutritum maxime quidem ex inspirādo; sed tamē & ex sanguine. Quod si naturalis quoq; aliquis spiritus est, utiq; is quo que in iocinore & uenis continebitur. Sanē dictū fufissimē de uirium essentia est in libris, quos De Hippocratis & Platonis placitis scripsimus. Soli dorum uero corporum substantia certa esse quan titate proculdubio desiderat, eoq; nutrimenta mor tale genus tuentur. Sed nihilō secius & elementa ex quibus componitur, mediocri esse temperie re quirat, dictumq; subinde est quemadmodū tempe ries ea sit tuenda. Caterum uirium lapsus, de quo nunc agere institui, qui quidem solidorum corpo rum substantiæ dum discutitur succedit, in longis simis morbis subinde incidit; animāte ex frequen ti atrophā, id est nutriēdi defectu, extenuato. Præ terea in ijs febribus acutis quæ corpus liquāt. Qui ex substantiæ tēperie mutata prouenit, cum uel im modice ipsa fuerint calefacta, uel frigefacta, uel madefacta, uel siccata, aut horum aliquibus copu latis affecta. Alteratio uero in spiritu, tum ex uitio sis prouenit succis, tum ex ambientis aeris mali tia, qui aliās alia de causa in hanc est mutatus; præ terea uenenatis facultatibus, aut animalium quæ uirus eiectant, uenenis. Verum hæc à præsentī in stituto seponātur. Ipsi uero essentia spiritus cor ruptio, & quæ futura timetur, & quæ iam adest, quæ tum ex affectu animi incidit, tum ingenti do lore, tum pluribus motibus, cuius generis & uigi liæ sunt, tum ex immodica eius tenuitate & conti nentium eum corporum raritudine, tum uero ante hæc omnia ex ipso respiratu prohibito, & nutri menti defectu, diligentius corrigi profecto possit. Sunt porro affectus animi, timor subitus, & ue hemens, (quem *ἐκπληξις* Græci uocant) præterea quæ contraria huic timori est uoluptas maxima, Græci *παράφρων* uocat, quasi excessum gaudiū di xeris. Scimus em̄ amorū occasioe perisse quos dam. Iam reliqui quoq; magni timores omnes, & cum his maximæ uoluptates, etsi non iugulant, at certe facile resoluibilē infirmumq; spiritū reddūt. Tristitia uero, & anxietas, & ira, & cura, eo gene re sunt noxiæ, quo frequētes uigiliæ, quoniam uires resoluāt. Ac in ijs quidem omnibus ipsa per se ip sam mouetur anima, in corporalibus aut actioni bus ipsa corpus mouet. Resoluitur autē eius robur

utroq; motuum suorum genere, si modum excedant. De laboribus uero quid attinet dicere, quo pacto & uehementius aucti quosdam iugularint, & omnes certe laeserint, tametsi non sustulerunt. In omnibus eiusmodi casibus manifeste uidentur agrotantes, tum animo linqui, tum uiribus resolutis esse: nonnulli uero (ut dictum est) etiā mori: scilicet aliis spiritu ipso deperdito, aliis alterato, aliquando ex parte digesto, non raro hec utraq; perpesso. Tractatum autē fufius de his est cum in alijs libris, tum uero in ijs quę de Hippocratis & Platonis dogmatis prodidimus. Ad rem uero propositam, modum quo singula lādere sunt nata, disquirere necesse non est: imō q; lādunt, ab ipsa euidentiā accipere, ac eo ad uires tuendas in morbis salubriter uti. Pari modo et si spirituum qui nostrum corpus regunt, substantiā aliquandā plus iusto extenuetur, utroq; profecto modo imbecilla fuerit, & tanq; teperie alterata, & tanq; dissipabilis, uel exhalabilis, uel quocūq; modo libet appellasse, redita. Eadem nimirum ratione & si totum corpus transmutatum in immodicā raritudinē sit, facile spirituum substantiā digeretur: q; & ipsa tenuiū partium sit, & corpus eam non cōtineat. Ergo nec rarefaciendum immodice agrotantis corpus est, si spiritum retineri in ipso studeas: sed nec quā in eo sunt, per comesta & bibita ualenter extenuanda. Iam uero quod ipsorum quoq; ciborum ac potionum non leuis habenda sit cura ad robur uirium tuendum, ut uidelicet tum quātitate modici, tum qualitate exacti exquisitiq; sint, id neminē latere arbitror: sicut illud profecto cuiq; perspicuū, q; etiā substantiā quam inspiramus, habenda sit cura, uti scilicet tum optima temperie sit, tum ab omni inquinamento purissima, nec aliquid ex metallis, aut caminis, aut barathris sibi admisceat, aut ali quid ex putredine leguminum, uel olerum, uel animalium, uel cuiuscūq; rei cōtrahat, aut halitus exsagnis, uel paludibus, uel fluuiio recipiat. His itaq; omnibus prospiciat oportet, qui uires illas eas curi uolet. Ad hęc etiā ipsorū corporū solidorū, in quibus utiq; uel maxime consistere uirium substantiā uidet, non parua habenda prouidentia est, ut scilicet sano temperamento sint, atq; hoc quidē omnium partiu cōmune cōmodum est. Ad robur autē uirtutis conferandū, & ad syncopālē accessiōne quo minus de repente incidat cauendū, singulare presidium est temperamenti custodia: ante omnia quidem trium principiorū: mox uero reliquarum partium quācūq; in confortiū affectus, principia secū ex facili trahunt: cuiusmodi est uentriculos, quod propter exquisitū sensum tum alia symptomata non pauca, tum uero syncopas accersit. Porro memoratus iam crudorū humorū affectus, si & copia sua hi uires premant, & propter tū multitudinē, tum crassitudinē exiguos animalis meatus obstruant, iam multis nominibus exitialis est: ac syncope opportunos reddit, nempe & q; animal sub eo non nutriatur, & suffocet, & q; mediocritas temperamenti eius nō solū alteretur, sed etiā corruptatur. Quippe crudi succi nutrire pri-

usquam sint cōcocti, nequeunt. Iidemq; cū multi sunt, grauant. Si uero spiramenta quibus perspiratio agitur, obstruant, calorem extinguūt. Quod si nec obstruant, nec onerent, syncopē ij certe non inferūt, sed animi deliquia, quas *Λαποϋχίας* Græci uocant. Si quidē resoluūt eiusmodi agrotates, nisi frequētius nutriant. Porro exhiberi eis oportebit, non copiose semel, nec quā crassa frigida uel potestate nutrimenta sint, sed sicut dictū prius est, quā ex genere extenuantiū calfacientiumq; sint. Ad eundem modum & medicamenta, quācūq; saltem medicamēta sumere febricitans homo potest, extenuantia calfacientiaq; sunt offerēda. His & aquosum uinum idoneum ab initio statim est, si tamen uehementer nō febricitat: quod temere in hoc affectu fieri non assolet, magis etiā si qui laborant, senes sint, prebendum ijs inter quāq; cibationē uinum est, magisq; etiā si interposita quietis spatia mediocria sint. Sanē qui ex eiusmodi succis laborant, hos quotidie accessiones exercent, præcipueq; ad uesperā, et noctū, nō mane, nec usq; ad meridiē. Atq; de his quidē haecenus abunde.

6 Age modo transeamus ad eos qui contrariō quidem huic laborant affectu, sed tamen syncopē similiter opprimunt, nisi quis sedulo sit attentus. Hi sunt qui prætenues succos habent, sicut uocysime exhalent. Itaq; etiā diuersa à iam dictis ratione sunt curandi. Illos nanq; paulatim & assidue uacuauimus, propterea quod multam simul uacuationem ferre non poterant. At qui sic habet, hos paulatim & assidue nutriemus. Quod si à principio hos uiribus adhuc ualentibus, curandos suscepimus, nec paulatim eos cibabimus. Possūt nāq; ij uel quod liberius semel datum est nutrimentum superare. Tanquam autem eos qui ex crudi humoris multitudine syncopē periclitantur, prorsus periclitari diximus, si uel secur his uel uentriculum phlegmone obsidet: itidem de quibus nunc agere instituiamus, insaniabiles sunt existimādi, si uiribus iam languentibus aliquod eorū uiscus phlegmone infestetur, quando nec assidue hos nutrire fas est, sed tantum in remissionibus, nec seruare eos si non nutrantur licet. In eiusmodi affectibus mortifera illa species in facie celeriter apparet, nasus acutus, oculi caui, & reliqua quæ deinceps sunt adscripta. Nam siue multum excernant, siue uigilent, siue tristentur, siue non cito nutrantur, proutinus eiusmodi faciem habent. Porro si alicuius horum, aut etiam plurium occasione, tales esse uidebuntur, minus esse malum putabis quā si absq; ijs essent emaciati. Sin absq; his tales appareant, planē pestiferū iudicabis, atq; hoc amplius, si à principio morbi eam habent speciem. Neq; enim dum concoquatur, sufficiēt. Atq; ob id Hippocrates dixit si quid eiusmodi cōsenserit, minus abesse periculi putandum. In morbi nanq; principio (ut prædixi) etiam si cum aliquo dictorū in eo sint itaru, haudquāquam id bonum est: ceterum minus id periculū minuitur, quā si cum horum nullo, imō ex spiritui ipso prompte digesto. Non solum aut extenuatis ad eum modum spiritu horum & sanguine, di-

gestio sæpe incidere assuevit, sed etiam expultrice ui per uniuersum corporis molem immoderatus concitata. Id quod incidere maxime ex imbecillitate retētriciis solet. Sanè nutrire quicquid horum inciderit, est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quàm priorū rarefacere. Cum enim maxime ij affectus inter se dissideant, etiam præfidiorū speciem diuersissimam requirunt. Ergo frigidum ijs aerem adstringentemq̃ comparabimus: qui quemadmodum fiat, prius est dictum.

Vngendi præterea sunt adstrictorijs unguentis, tum cibi ijs dandi qui non admodū prompte diffuant, non aqua mulsā, nō prisanæ cremor: sed panis, & sorbitio ex alica, et fructus austeri, et qui nō facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane, etiam alica quæ in aqua sit cocta. Dabis uero aliquādo ijs & oua, præcipueq̃ eorum uitellos. Album enim eorum ægre concoquitur. Præterea gallinaceorū, qui lacte sint alti, testiculos, iteq̃ suillum cerebrum: sed uel diligenter assum, (quando si crudum detur, summopere lædit) uel in albio iure legitime elixum, porro & aneto iniectis. Deniq̃ omni ratione agendum, ut & succorum materiam crassiore reddas, & cutim denses, & exhalationem inhibeas. Vinū uero ijs aquosum necessarium inter initia est, sumptum inter cibū. Quod si ex sententia nobis omnia responderint, etiā carnei ijs aliquid nutrimenti post alia dabimus, potissimum post quartum diem, succis qui febrem excitauerunt iam ad cōcoctionem uenientibus. Tali affectu laborantis iuuenis, in decimo libro meminimus, quem (uti dixi) quotidie nutriui, idq̃ ante accessiōem potissimū, tum quemadmodū semel dedita opera non exhibito illi cibo, accessio cum syncope inuaserit, memorauimus. Ergo in omnibus eiusmodi curationibus, si iam deprehensus syncope cubans est, omnis sollicitudo medentis ad symptoma uertitur. Sin nondum ea premittitur, utriusq̃ curā habebit, & ut symptoma non incidat, & ut morbus paulatim discutiarur. Celerius autem hunc discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe qui multitudine crudī succi grauatū, hunc, si modo iustam semel uacuatiōnem ferre posset, nec metus aliquis syncopes impenderet, semel arbitror uacuātū a morbo explicaremus. Eum uero cuius spiritus et succi facile exhalant, si ante accessiōem cibare nō cogeremur, longiorem illi morbum certe nō redderemus. Ac de ijs quidem hæc mihi dixisse sit satis.

7 Nunc reliquas occasiones quibus syncope succedunt, deinceps referemus. Hæ sunt numero quatuor: dolor uehemens, uigilia, immodica uentris inanitio, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquando motus: sed & quintam, si non displicet, addas: nempe principiorum intemperiem, de qua in calce libri agemus: idcirco maxime q̃ dupliciter prouenit, uel in nuda qualitate particulis alteratis, uel uitioso succo in has recepto. Deinceps igit de omnibus quæ memorauimus, est agendū, initio a doloribus sumpto. Ergo si causam ipsam, unde dolor excitatur, adimere possis, ita utiq̃ contra sympto-

ma non pugnaueris, sed ægritudinem curaueris. Sed si qua occasione prohibitus, affectui summouendo intentum esse non licet, uehementiam doloris mitigabis. Verum quoniam nec dolorū causas summouere, nec uehementiam eorum remittere fas est, nisi intellexeris cuius uitio is dolor in cubantis corpore excitetur, perpēdenda prius tum causæ dolorum sunt, tum uero signa quibus hæc dignosci queant. Nam cum sensui plerūq̃ parū pateant, hominem qui in tali speculatione sit exercitatus, nimirum postulant. Itaq̃ cum nobis in alijs operibus nō pauca de dolorum generatione sine præcepta, ipsorumq̃ omnium opportuno tempus iam uenerit, necessum arbitror totam eorū rationem summariam percurrere. Quoniam igitur in animalis corpore omnibus cōsentientibus sectis, non omnes partes sensiles sunt, manifestū est quæ prorsus sunt insensiles eas non dolituras. Igitur cum sensilibus duntaxat dolor accidat, sequens est ut estimemus eiusmodi ne corpora perpetuo sint dolitura: an uno aliquo tempore, cum uidelicet ortus in his crucians affectus sit. At si ipsa euidētia nos docet multū temponis, quo nihil omnino doleamus, non obscurum est certo aliquo tempore, quo scilicet excitatur in singulis quæ dolent, crucians affectus, necesse esse ea dolere. Ergo si inuentum nobis fuerit quænam affectio ea sit, quæ in sensilibus corporibus orta facit ut animal doleat: utique & quod querimus, iam fuerit inuentum. Hic igitur ab ijs naturalibus notitijs quæ omnibus nobis sunt cōmunes, procedere methodo ad id quod considerandum proponitur, conueniet. Porro naturalis notitia nos docet uitium id corporis ex quo sit doliturum, aut continuitatis diuisionem oportere esse, aut alterationem aliquam. Itæ etiam non in cōmode dictum ijs est qui ex insectilibus, uel insensilibus, uel incōpactilibus elementis corpus componunt, affectum unde dolor nascatur, prorsus inueniri nō posse. Quippe quæ tantummodo rangunt, eorū nihil uidetur dolorescisci. At talia corpora tantū se inuicem rangunt. Quod si non contingant modo, sed etiā se inuicem in concursu collidunt, ad dolorē creandum nihilo plus conferunt, si quæ colliduntur, insensilia statunt: nisi etiam lapides cum diuiduntur, dolore affici dicemus. Verum de his latius tum alibi, tum in quinto De Asclepiadis placitis differuimus. Nunc autem cōfessum hoc principiū sumētes, necesse esse ut affectus qui dolorem excitet, uel diuisio sit, uel alteratio: illud etiam memoria repetamus, ne alterationem quidem ipsam sensum irrepentem, dolorem afferre animali posse: sed quæ dolore animal afficiet, eam mutationē tum conferent factā, tum uero uolentā esse debere. Videntur enim corpora non solū cum in non naturalem habitū conferunt aguntur, tristē mutationē sentire: sed etiam in ipso ad naturalem statū suum reditu (nisi eum paulatim accipiant) cruciari. Scimus enim qui in uehementi frigore iter fecerunt, eos cum sese non sensim, sed semel calfacere pperarēt, dolore circa unguum radices adeo uehementi affectos, ut ferre

non possent. Illud uero inquirere an ipsum quod uehementer excalcificat aut refrigerat, diuisionem aliquam cōtinuū efficiat, longiore fortasse disputatione eget. Et utiq; demonstratū à nobis est in cōmentarijs De simplicium medicamentorū facultatibus. Verum quid agendo, quæ uehementer uel excalcificiunt uel refrigerant, dolorē inferant, querere, ad rem propositam minime est necesse. Siue enim ut substantiæ sensibilium continuitatem diuidentia, siue ut eam semel & cōfertim alterantia, id ad eorum inuentionem quæ dolorē leuabunt, nihil refert, modo sciamus, quod uiolenter uel excalcificat uel refrigerat, id sententiā corpora dolore afficere. Ergo si coepisse ab euidentibus cōueniet, euidenter autē uidentur eorum quæ corporibus nostris propinquāt, hæc sola esse dolorifica & quæ uehementer uel excalcificiunt uel refrigerēt, & quæ substantiæ continuitatem diuidant (hæc autē sunt quæ uel cōtundunt, uel incidunt, uel distendunt) utiq; curationis eorum inuentionē quæremus uia aliqua insistentes, quæ à querendorū natura sit accepta, quæ methodo appellatur. Rursus igitur supra repetentes dicamus. Quoniam id querimus, quemadmodum in morbis dolore affligamur, ubi nihil nobis extrinsecus triste appropinquat, necesse est aliquam talem causam in corpore queramus, quæ scilicet uehementer excalcificans & refrigerans, uel substantiam sensilium alicuius corporis diuidens, nos excruciet. Ac primū illud speculabimur, cuiusnam esse naturæ debeat, quod continuitatē diuidit. Necesse igitur est uel ruptionē uel conuulsionem, uel erosionē esse affectū eum qui diuisionem cōtinui faciat. At uero ruptione ex diffinitione quadam, cōtursio ex grauātē, erosio ex morden te provenit qualitate. Ergo cum nihil extrinsecus sit quod uel distēdat, uel grauet, uel erodat, sed ex seipso horum aliquod corpus sentiat, neminē late re potest diffinitionē ab aliqua intrinsecus substantia, quæ multitudinē suā corpus se cōtinens distendat, aut immodica siccitate provenire: cōtusionē, ex eo quod aliquod corpus ab externo supercēcidet, ut quod uel durū, uel magnū, uel graue, uel simul ambo fuit: erosionē uero, ex succo aliquo cui moriens natura insit. Igitur ubi uehemēs dolor urget scrutandum nobis est, an succus plurimus, an spiritus cui nō sit exitus, an grauis moles, an mordens humor, an siccus affectus subit. Ad hæc, ueluti in istis est definitū, an aliquid quod ualenter excalcificat uel refrigeret. Quorum ipsorū quoq; rursus causa, uel in spiritu, uel in humoribus, uel in solidis ipsis sunt statuenda. Quicquid enim eorū uehementer excalcificatum refrigeratumq; sit, quādo quod uicinū est tangit, graue illi molestumq; redidit. Igitur quemadmodum singula quæ cōprehēdimus agnoscere possint, tum uero quod tum omnium habeamus manifestas notas, quodq; si aliud quicq; etiam causarum & affectuum quæ sensum fugiunt agnitio, ex multa exercitatione, & curiosā omnium perpenione nobis tandem parjatur, alibi monstratū est. Nunc uero id cōsiderare propositum nobis non est, imō solam ipsam meden-

di methodum persequi. Ex quā sciētē perspecta, quantum auxilium compendiumq; medicis non ad præsidiorem modō curationumq; facultatem, sed etiam ad affectus aliquādo agnitionem comparetur, sæpe uobis in ipsis ægrotantibus manifeste ostēdi, quorum iam duos tresq; qui haud pridem sunt sanati, referam. Vnus enim, ut scis, quædragenarius erat, qui cum colo laborare putaret, non modo nihil est à fomentis tum humidis tum siccis leuatus, sed nec cataplasmatibus nec clysteribus, quibus scilicet publice uti in eiusmodi affectibus solent: uerumetiam à plurimis eorum exacerbat. Nam à rutaceo oleo per sedem infuso deterrius habuit, itemq; à castoreo: quinetiam ubi mel coctū cum pipere assumpsit, extremis doloribus est afflictus. Iam cū cremorē cocti foenigraci unā cum melle accepisset, uehementer est irritatus. Ipse igitur ubi mordentes succos in tunicis intestinorum immeros conieci, qui scilicet secum unā corrumperent, tum ea quæ per inferiora essent infusa, tum ea quæ per os sumebat, exhibui homini nutrimentū, quod non facile corrumperetur. Deinde cū minus eum cruciatū intelli, uitiosos humores purgandos indicaui. Cū uero aptissimū ad eiusmodi uitiosos humores esset medicamentum quod ex aloë componitur, quodq; iam uulgo piscran appellant, utiq; acervatum hominē iuste purgare nō sum ausus, quod doloribus & inedia duobus mensibus confectus esset. Verum ex quibusdam intervallis moderate id faciens, quindecim circiter diebus hominē (ut scis) prorsus sanauit: idq; nullo præterea adhibito præsidio. Atq; hic quidē illo primū tempore sic est uexatus, nunquam prius intestini dolorem expertus. At alius iuuenis huic quidem ætate propē par, sed qui sæpe ante colico cruciatu fuerat affectus, accepto scammonia succo fuit purgatus. Cum autē bene largiter fuisset uacuatus, primo quidē die uesperī in balneo lotus, mox piscanē cremorē sumens, post piscē quoq; comedens, nocte ea quæ ceperat euomit. Secundo die itidē lautus, comedit primum lactucā, mox autem carnis aliquid in albo iure elixā, hac alicā ex aqua sumplit, uino austero iniectō. Vbi uero ab ijs mediocriter se habere est uisus, etiam tertio die nutritus similiter est. Reddidit tamen per aluū plura q; pro ciborū portione, eaq; cum morfu. Deinde quarto die etiam magis dolere sibi uentrem sensit, & cum se in balneo alicubi frigus accepisse imprudentem putasset, rutaceum sibi oleum per sedē infundens, non solum uehementissime est uexatus, sed etiā liquidā defectionē copiosissimā excreuit, quod facile declarauit aliquid à toto corpore ad loca uētris deferri. Post deinde per circuitus similis redibat cruciatus. Audientes autē eius symptomata, intelleximus noxam ex scammonia in illis maxime intestinis procubuisse, quæ prius etiam fuerant imbecilla: sic ut quasi fluxionis quidam exortus esset affectus. Ergo quemadmodum hunc quoq; sanauerim, scis. Abijcere em̄ iussī præsidia colica, alicaq; calēte, quæ cocta in aqua esset, nutriti, immisissis ei mali punici granis. Cū autem

tota nocte citra dolorē dormiuiſſet, miratus profe-
cto eſt remediū nouitatem: rogauitq; quid eſſet bi-
bendum. Deditūſ itaq; bibēdum dilutum rhois
cremore, quō uidelicet ſiue aliqua eſſet in ſummo
intestino facta exulceratio, eam adſtringeret, ſiue
etiam ex conſuetudine aliquid ex ſuperioribus lo-
cis in partem afflictiā conſlueret, id reprimeret:
prandioq; eodem uti ſuiſimus: deinde ad ueſperā
cenare pane puro madefacto in uino aliquo na-
turaliter quidem aſtremo, ſed ueteri. Conceſſimus
præterea ut aſtremum quemcunq; uellet fructū ſu-
meret, ſiue malum, ſiue pyrum, ſiue puni-
cū. Simili ratione etiā tertio die cibatus, in quarto theriacen
bibit, ſanūſq; omnino eſt redditus: ac de cetero ad
coſueta reuerſus, nullum ſenſit inco-
modum. Simi-
li genere & alteri cuidam in aſtate affecto, cum ſi-
tibūdus admodū eſſet, ſupra alia quæ memorauī,
etiā frigida portione uti permiſi. Ergo ne requiras
in omni affectu eiufmodi notas, quales in pleuri-
tide uel dysenteria apparēt. Quippe ſcientifica eſt
morborū id genus agnitio, certis uidelicet defini-
tiſq; notis cōparata: cū eorū quæ proxime ſunt di-
cti, coniecturalis agnitio ſit, ac ſolis ijs inueniri po-
tis, qui exacte cuiuſq; morbi propriam curationē
norint. Quare quoniā de hac propoſita nūc diſpu-
tatio eſt, ipſam per ſe abſoluamus. Nec affectuum
agnitiones attingamus: maxime quæ ex coniectu-
ralibus notis incipientes, cum eorū quæ profectū
obſuntq; cognitione ſunt cōiunctæ. Methodum
enim in ijs, atq; etiam exercitationē, in morborū
agnitionibus ſeorſum per ſe fecimus: quō ſcilicet
arte quis inſtruitur, in omni ægro tum locum qui
affligitur, tum ipſius affectum, ſicuti nos inueniat.

8. Ergo reuertamur ad affectus, qui dolores ex-
citant. Si ſanguinis abundantia ſit, quod diſtendat
ueluti proſecto in phlegmone fieri ſolet, protinus
ubi uires ægri ualentes ſint, ſanguis mittendus eſt.
Sed ſi is uel ſanguinis miſſionem timeat, uel ſimbe-
cillis uiribus ſit, tum reuellendus in diuerſum ſan-
guis eſt, tum per propinqua deriuandus. Dictumq;
nobis prius eſt, quemadmodū hæc fieri cōueniat.
Quod ſi his peractis dolor etiā perſiſt, patet pro-
fecto in ægotatē particula impa-
ctū eſſe quod cō-
triflat. Patet uero non minus & q; curatio ipſa per
digeretia medicamenta ſit molienda. Pari ratione
& qui ex flatuofis ſpiritu dolores ſiūt, curabimus:
ſed ſimul in his potius tum extenuantibus cibis,
tum portione, tum per ſedē iniectionibus, tum ca-
taplaſmatis, tū humidis ſiccisq; fomentis auxilian-
tes. Sin moles aliqua grauadō cōtundēdo ſiue dolo-
rē excitet, moli ipſi eſt medendū. Sin mordens hu-
mor eſt qui affligit, aduerſiſſima huic ſunt quæ ex-
tenuā & calfaciunt. Poſtulat namq; huius generis
affectus, ſi modo curandus eſt, ut ea quæ cōtriflāt,
uacuent, ſi id omnino fieri nequeat, ut per epira-
ſin, id eſt contemperamentū ſanē: ſin id quoq; fie-
ri nō poſſit ut quæ torporē inſerāt, medicamenta
exhibeant. Quæ quanq; ſunt reliquorū cōmunia,
minus tamē hos affectus q; alios lædunt. Quippe
tenuis cōſiſtentis, & calidarū uirū plurimi talium
humorū ſunt, quæ autē ex papaueris ſucco, & al-

terco, & eo modo frigidis cōpoſita medicamenta
ſunt, ſimul omnino & refrigerāt & ſiccāt, quara-
tione nō ſolū ut ſenſui torporē inducētia ſalutaria
ſunt, ſed etiā ut humorum tenuitatē cogentia atq;
crasſantia, præterea uehementē calorē refrigeran-
tia. Vbi uero craſſi glutinoſiq; humores habētur,
alieniſſima ſunt quæ torporē inducunt, cauēduſq;
magnopere in eiufmodi affectibus eorū uſus eſt.
Sed nec alioqui comitat eiufmodi ſuccos, modo
ſoli ſint, dolor uehemēs. Si uero ex accide-
nti aliquo cōiunctus his halituoſus ſpiritus eſt, qui ex ijs qui
bus cōtinetur corporibus erumpere proſus non
poſſet, grauiffimis omnino doloribus, qui ita ſe ha-
bent cruciant. Porro accidit id illis duplici ex cau-
ſa, uel obſtructione, uel calore. Nam & obſtructio
ſpiritu cōhibet, nec exire permittit, & craſſa glutino-
ſa q; cum caleſcunt, flatuoſum ſpiritu gignere ſo-
lent. Eiufmodi ſanē affectus ijs qui ſe cibis natura
frigidis, & cōſiſtentia craſſis ac glutinoſis referē-
rūt, quādo in ipſis inteſtinorū tunicis flatuoſus ſpi-
ritus cōtinetur, potiſſimū incidit. Nam cum he du-
plices ſint, ubi medio earū ſpatio eiufmodi colle-
ctus humor eſt, in flatulentū mutat ſpiritu. Sanē
& craſſus, & tardī motus, & frigidus eſt. Vbi igitur
tum retineſ, tum tunicas diſtendit, tū ſuccus unde
oriſtur, inteſtini partes quas cōtingit, uehementer
refrigerat, duplici occaſione affligunt qui ſic labo-
rant. Ac ad tēpus quidē, ubi torporē facies medi-
camentum biberūt, proſus in dolētes reddunt, ceterū
affectus his omnino ſit maior. Nā & inteſtinorum
tunicæ medicamentorū frigiditate denſiores, mi-
nusq; flatui tranſmittendo habiles reddunt, & hu-
mor ipſe tum craſſior, tum ad motū ineptior eua-
dit. Itaq; & ſpatio longiore ad ægri curationem, &
medico qui egregie in arte ſit exercitatus, eſt o-
pus. Nifi enim certa ratione poſtmodū curationē
aggrediet, uerendum erit ne ſucci ſecundo in fla-
tuoſum ſpiritu uerſi, eundē dolorē renouēt, unde
rurſus ſtupefacientiū aliquid medicamentorū ex-
hibere ſit opus: eadem ſcilicet neceſſitate urgēte.
Ac pari modo tertio & quarto & ſæpe deinceps,
quoad homo inſanabilis effectus, in malū totius
corporis habitū perueniat, & poſt longa tandem
tædiā pereat. Quo pacto igitur dolores eos, quos
frigidus humor in medio inteſtinorū intercluſus
excitauit, ſanare conueniet. Sanē non perſuſioni-
bus & cataplaſmatis quæ ualenter exſolant.
Quippe lenti omnes craſſiq; & frigidi humores,
ab ijs quæ calfaciunt, niſi etiā ualenter digerant, li-
quant, ac in flatū mutant. Oportebit igitur eos inci-
dere ſimul & cōcoquere, quas res tenuantia medi-
camenta præſtabunt: potiſſimū tamē ſi calida ue-
hementer non ſint. Quod autē horū quoq; ipſorū
ea maxime deligenda ſint, quæ magis flatū diſcu-
ſant, magisq; ſiccant, nemini poſſet dubium eſſe.
Sæpeq; ex plebe nō paucos audias minus ſibi do-
lere colon affirmantes, cū nec ipſas cataplaſma im-
ponitur, nec oleo aliquo perfundunt, nec per dy-
ſterē aliquid inſunditur. Et ſanē qui generoſi ani-
mi fortesq; ſunt, ſi mediocri utuntur uictu, tutius
longiore in tēpore percurant, q; qui uiolenter (ut
dicunt

dicum est) calfacientibus utuntur. A nullo enim in eiusmodi succis tam est metuendū, q̄ a calore, qui eos liquet, atq; in flatū uertat, sed digerere non ualeat. Vidimus nāq; ex agrestibus operarijs quempiā qui ubi colli dolore sensit, protinus se cinxit, cum cingiente nō soleret, comedit autē cū pane alij, nullum dimittens consuetū opus, nec toto die quicquid bibit, sed uesper meracius; ab his & tota nocte dormiuit, & mane ab omni dolore planē liber surrexit. Est enim profecto aliū ex eorū ciborum genere, qui & flatū discutiāt, & minime sitim inferāt. Sunt qui parū id experti existiment maiore q̄ capas sitim excitare; sed planē errore, cū non modo nō maiorē q̄ cepae, sed nec omnino sitim faciat. Idē omniū planē eduliorū maxime flatū discutiit. Itaq; ipse certe agrestium theriacen id appello. Ac si quis uel Thracas, uel Gallos, uel deniq; qui frigida regionē incolunt, uesci alijs uetuerit, nō leuiter ijs hominibus nocuerit. Ac quos ex supradicta causa uehemēs intestinorū dolor citra febrē exercet, ijs & aliū esse licet, & theriacen bibere: quippe quae eiusmodi affectibus magnopere subuenit. At si cum febris unā talis dolor aliquādo incidat, principio quidē, si id ferunt, fomentū siccū ex milio est adhibendū. Si ab hoc nō quiescant, semen aliquod quod flatum dissipet, in oleo quod tenuiū sit partiū, coquere, mox per lintheū, quod purum sit, oleum colare, deinde anferis seuū in oleo liquare, & per sedē infundere oportebit. Si anferis seuum nō sit, gallinaceo est utendum, in primis q̄ curandum, ut sit expers salis. Esto autē nec admodum uetus. Licet uero & recentū uti: praefertim anferino. At si neq; ex hoc remittunt dolores, secundo rursum inficiendum id ē, adiecta etiā nūq̄ castorei & papaueris succi, utriusq; fabae nō amplius magnitudine. Olei uero hemina modus esto, excipitur & lanula ex hoc medicamēto aliquid. Debe hinc appēso fortī filo, q̄ penitissimē in rectū intestinum dimitti, quō utiq; & cum libet ea facile recipiāt, & euidentē conferat utilitatē. Ad eundem modum & oculorū & aurīū dolores qui ex huiusmodi humore, aut spiritū flatulento in febris excitant, sedare cōueniet, ita ut tum fomēto ex milio, quoniam id omniū & leuissimū est, & maxime siccans: quodq; ab eo defluit, innoxiiū expersq; morbus est, utamur: tum auribus medicamētū id quod ex castoreo & papaueris succo conficiē, infundamus, quō scilicet ad talia uti solemus. Liquor quo haec liquantur, sapa esto: quod apud nos uocant *ϰαυα*, pleriq; medicorum *σικαυα* graece appellāt. Quod si imponi cataplasma res aliquando suadebit, papauerum capitibus in aqua coctis, ac sceni-graci uel hordei uel lini seminis farina aqua immixta, cataplasma conficies. Scire autē licet medicamentū quod castoreo recipit, nō solū aurīū fedare dolore, sed etiā oculorū & dentiū, si auribus infusile. Iam uero collyria quae ex opio sunt, uehementissimos oculorum dolores remittere, omnes norunt, utendum q̄ (ut praediximus) his est, cum maxima necessitas urget. Illud minime ignorantibus particulas ipsas nōnihil laedendas, imbecillio-

resq; in reliqua uitā ex refrigeratione futuras, caeterum salutū hominis in praesens ipsam futurā postea noxā posthabentibus. Siquidē nō paucos eorum qui his sunt usi, eō infirmitatis uenisse, ut alij ferē nihil omnino uiderent, alij propemodū surdi forent, id omnibus iam notū est. Itaq; nos si quando cogimur his uti, postmodum in sanitatis tēpore particulas ipsas excalfacimus, nepe auribus oleum id quod solum castoreū habet, infundentes: oculis uero collyria quae tantum excalfaciant. Ad quod scilicet munus maxime id probamus, quod ex cinnamomo conficiē. Ac de doloribus quidē, qui ex crasis glutinosissime aut frigidis succis, uel etiā flatuoso spiritu excitantur, haecenus abunde.

Similis nāq; est eorū omniū curatio, & quae per cōprehensam materiam perficiat, nisi q̄ is qui spiritum flatuosum comitat, propriā quandā curationē est sortitus, ex cucurbita cū flāma copiosa subinde admota. Videbiturq; tibi praesidium hoc in huiusmodi affectibus, incantamētū cuiusq; simile quid efficere, siue hi in intestinis, siue in quauis corporis particula sunt excitati. Illico enim cucurbita admota qui spiritu flatuoso cruciantur, tum a dolore liberi, tum omnino sani reddunt. Quos uero nō spiritus modo flatuosus, sed etiā humor quispian unde is oritur male habet, ijs illico ad tēpus dolor sedatur, redit tamen uel in sequente nocte, uel postridie, uel etiā tertio die similis dolor, ac potissimum ubi in uictu aliquid deliquerint, aut importunius particulas excalfecerint. Tibi uero hoc q̄q; maximū indicium affectus erit, ac curationē proratione prosequeris, nec impēse particulā excalfaciēs, & tenuatoria curationis ratione utēs. Quod si in uentre quoq; talium quippiā incidat, mirifice hi ex acrim per clyster iniectione leuantur. Sed percurāda in his primum doloris accessio est, admota scilicet cucurbita, quō uentosus digerat spiritus. Post id uacuandus humor est, infuso per sedem eiusmodi medicamentorum aliquo. Ego uero oleo quopiam tenuis substantiae uti assueui, rutam incoquens. Porro aliqui in tali curandi ratione, ubi oleum acceperunt, maximo dolore cruciantur, postea exiguo interposito spatio excernūt humorem uitreum, atq; ex hoc protinus simul & a dolore & ab affectu liberantur. Quippe sublata causa quae spiritū flatuosum gignit, omnia coquiescunt. His humoribus contrariam maxime naturam habet, qui tenues sunt atq; acres, fed similem dolorem inferunt: nonnumq; autē & cōuulsiones intentas accersunt, utiq; cum in ore uentriculi sunt collecti, ueluti dudum illi contigit, qui paulo post aeruginosum humorē euomuit. Satis uero sit nō aeruginosum ipsum dicere, sed exactam planē aeruginem. Talis nāq; erat qualis pulcherrima est aerugo. Verum huic adolescenti cum cōuulsione & syncope, etiam guttae quaedam frigidae, & pulsus in summo gradu parui erant. Ex quibus cum conijcerē in ore uentriculi, quem publice stomachum uocant, mordentē aliquem cōtineri humorem, dedi illi aquam tepidam bibere, post quā protinus tale id euomuit, quale si ipse facere uelles, florī-

floridissimam æruginem aquæ misceres. Cum igitur talis humor in uentriculo consistit, uomitu est expellendus: cum in intestinis inijcere per sedem conuenient, quod eluere eiusmodi humorem sit apertum. At id deterium sit omnino oportebit. Cum autem talium plerumque mordeant, cōmodissime ex his aliquod deligitur cui morsus absit. Eius generis maxime est ptisanæ cremor. Cibi uero exhibendi his sunt, qui & boni sint succi, nec facile corrumpantur, quorum exempla in priore libro iam tradita habes. Quoniam uero etiam eorum qui ex siccitate uehementi tendunt crucianturque, mentionem feci, non alienum fuerit de his etiam aliquid apponere. Scire namque licet eiusmodi affectum, si modo curabitur, humectationem poscere: ceterum, curatu perdifficilem esse, uel potius qui curari omnino non possit, si febris occasione est contractus. Succedit maxime exitiali phrenitidi. Nec sanatum quempiam ita conuulsorum aut ipse uidi, aut alium narrantem audiui. Nam plerumque

ARGVMENTA

Qui librum hunc in capita seuerunt, in tres Tomos discernunt, & sua cuiusque capita adscribunt: quorum primus & secundus satis breues sunt, tertius longissimus. Poterit autem aliquis eodem numerorum processu uti, ut in superioribus, sine Tomorum respectu.

Tomi primi.

Caput I. Quod in præcedentibus libris curam solutionis continui & temperaturæ uitæ docuerit: posthac de tumoribus præter naturam dicturus: quorum primam facit phlegmonem. II. De generatione phlegmones, de qua supra etiam lib. 2. cap. 6. III. Methodus curandæ phlegmones.

Tomi secundæ.

Caput I. Hoc tomo differt de phlegmonis quæ in adenois & non adenois partibus oboriuntur: Primo autem capite generatim tantum species atque curatiuas indicationes tumorum præternaturalium indicat. II. Phlegmonas adenum omnes in ordinem digerit: primum quando hi intumescunt occasione longinqui ulceris: deinde illas quæ adenes primo infestant. III. Rediit ad curationem phlegmones partium non adenosarum. Numeratis autem repletionibus adiungit harum cuiusque medicationem suam: de quibus etiam lib. 4. cap. 4. De auersionibus. Tempus adstringentium & relaxantium medicaminum in phlegmonis. Quæ medicamina methodo quæ ex experientia sunt inuenta.

Tomi tertij.

Caput I. Hoc tomo agit de phlegmones curatione, per indicationes inuestigandas secundum membra: & primo unam indicationem à similibus partibus accipiendam instituit, alterâ ab instrumentarijs. De prioris satis dictum est antea ubi de ulceribus lib. 3. cap. 8. II. De instrumentariæ partis indicatione agere incipit, & pergit ad finem usque huius libri. III. De phlegmonarum curatione à quatuor organorum membrorum indicationibus. IIII. Obiter proponit quasdam curandæ phlegmones indicationes, quæ tum instrumentalibus tum similibus partibus sunt cōmunes. V. Plurimum membrorum phlegmonas curare docet per sectionem uenæ, indicans quæ cuiusque membro affecto in cisa uena oportere possit. VI. Quatenus phlegmonis à principio refrigerantia & astringentia ad mouere & non ad mouere cōueniant. VII. De uisum in phlegmonis artuum aut glandularum: quem non necesse sit exquisita bonitatis esse: In phlegmonis autem iecinoris aut uentriculi, exquisitissimū uisum desiderari. VIII. Adhuc de phleg

monis, uel ex repletionē nervosarū partium incidit, (qua ratione eos quos magna phlegmone premit, adortur) uel ex mordente & tenui humore qui nervosa corpora rodant, uel ex ingenti frigore quod tale quippiam quale gelu efficit. Atque hæ tres conuulsiones subinde percurantur. Sed quæ ex nervosarum partium siccitate prouenit, infansibilis est. Quippe etiam in libro De marasmo docuimus solidorum corporū siccitatē omnino esse insanabilem. Quo minus adijciendum quicquid eiusmodi symptomatis præterea puto, sed nec de his quæ uitio immmodica uacuationis, uel per alium, uel per uomitum, uel sanguinis profusionem, incidunt, quod et antea de his mediocriter sit dictum, & posthac dicere sit necessarium, potissimum cum mihi de tumoribus, qui præter naturam incidunt, erit agendum. Itaque librum hunc iam claudam, quando de symptomatis his quæ utique tractatu maxime erant necessaria, & præcipue quæ cum febrium affectibus ipsis sunt connexa, abunde differui.

LIBRI DECIMITERTII.

mone iecinoris: quæ uitanda sint alimēta solida & obstruentia, utendum autem aperientibus ut oxymelite cum aqua, & ptisana quoque. Adstringentia obstruere caua hepatis, quamuis his quæ in gibbis eius consistunt mutata ueniant, & non usque adeo adstringant, mordeant, aut lenta sint: utpote prius cōcocta, & sanguini iecinoris immixta. IX. Phlegmone laboranti hepati non nuda relaxantia, sed adstringentia aliquo admixto medicamina esse applicanda. Contra Attalum Thessalum medicum.

X. Sequētibz capitibus indicationes describit, quæ à laborantibus membris sumuntur: addens quæ remissibile à cibis crassis & lentis succi scirrhus obnoxij fiant: facilius lien: omnium facillime iecur. Horum medicaminum sunt quæ disciscat, dissoluūt, & cōmuniunt. XI. De supercollatione indicationum discrimen, quæ sunt possunt à iecinore & liene phlegmone aliqua laborantibus. XII. Membra omne phlegmone laborans excernere foras aliquam saniem, nisi durissima cute sit obuiolatum. Crassa excrementa collecta in medio pectoris deputatis ad hanc rem medicamentis educendo ostendit. XIII. Quid faciendū sit phlegmone tum in summo, tum in alto corpore oborta. Cucurbitularum uilitas.

XIIII. Medicaminū naturā respectu particularū altius et diligenter cōsiderandam esse iubet: & à paribus affectis indicationē petendam. Aloen uiscere aliquo phlegmone affecto non exhibendā. XV. A paribus sumendam indicationem esse, ostendit in uitij capitis & caliditatis & frigidis. Cor non esse animæ sedem contra Thesalos. XVI. Qui potissimum loco in phlegmonis uel alijs uitij capitis, medicamina sint imponenda, nempe circa suturā coronalem. Quæ cōueniat parte ophthalmica inijcere phlegmone laborante oculo: deliquere oculi: de triplici doloris oculorum causa: curatio morfus, repletionis, & crassorum humorum & statui spiritus. Cōmunia præcepta. Valoris excisio. Enarratio apborismi, Dolores oculorum meri potio, &c.

A L I T E R.

De tumoribus præter naturam. Quæ sit phlegmonarum curatio. Phlegmones glandularum, atque iecinoris, curationē prosequitur: quo exemplo methodum uniuersum phlegmonarum curationis indicat. De principe animæ parte, ac de phrenitide & lethargo. De indicatione quæ à particula affecta sumitur: Quo in loco & de liene, nec non de membris respirationis nonnulla adducit. Methodus curandæ oculorum phlegmones, & de arteriarum incisione.

GALENI METHODI MEDENDI.

ID EST DE MORBIS CVRANDIS,

Liber tertiusdecimus.



VO Iā genera morborū quē A
admodum quis methodo san-
net docuimus, alterum in in-
temperie positū, cui antiqua
est appellatio: alterū, cui nos
nomen indidimus, Continui-
tatis solutionem. De qua pri-
ma in tertio, quarto, quinto,
ac sexto horum cōmentariōrū præcepimus. Post
eam de ijs quæ in intemperie consistunt, usque ad
duodecimū egimus. In hoc uero totius operis ter-
tio decimo de tumoribus quī præter naturam inci-
dunt, differere incipiemus, in quibus. s. partes à na-
turali habitu in quantitate recesserunt. Sanē sani-
tatem, an naturalem habitū dixeris, ad ea quæ nūc
paramus, nihil interfit. At cum plures specie affe-
ctiones in his sint, primum agemus de phlegmo-
ne. Expedit enim ab hac cœpisse, & q̄ frequentis-
sime incidit, et q̄ febres, aliāq̄ symptomata pericu-
lissima excitet. Cū autē ueteres φλόγωση (quam
inflammationē interpretere) subinde phlegmonem
appellent, sciri uolumus, non hoc loco nos de hac
phlegmone differere, sed ea quæ supra inflamma-
tionē, tensionē quoq̄ in particula facit, quam non
modo ipsi tactu deprehēdamus, sed etiam ipse æ-
ger proprio sensu aduertat. Quinetiam pro tensio-
nis modo tangenti quoq̄ renitur pars phlegmo-
ne obfessa, auctior ē est q̄ pro naturali habitu, nec
dolor illi deest, maior minorū. Cū quo nonnumq̄
et pulsationis est sensus, cum. s. malum amplius in-
creuit, ac potissimū cum suppurat. Rubor quoq̄
in parte quæ phlegmone laborat, maior minorū
semper uisitur. Semper autem omnia partibus in-
flammati insunt, adeo ut siue in ipso pedis uestigio,
siue in parte interna manus, magna phlegmone
incubuit, hæc quoq̄ magis rubra uidentur q̄ ante.

2 Etenim demonstratum est, phlegmonem om-
nem ē sanguinis confluxu consistere. Qui alijs sta-
tim calidior est q̄ pro natura fuit, omnibus certe
in ipsa parte quæ phlegmone uexatur, calidior ef-
ficatur. Atq̄ hoc omnium sectarum cōmune est,
siue impactum tantum sanguinem in finibus uo-
lorū, phlegmones causam uelint, siue interciden-
tiam eius (σπέννησιν uocant) in solis arterijs, siue
obstructionem aliquam, siue in raritatibus ratio-
nis cōtemplabilibus resistentiam. Quo fit, ut etiam
curationis indicatio omnibus sit cōmunis, nempe
uacuatio redundantis in particula phlegmone ob-
fessa, sanguinis. Phlegmones uero quæ in genera-
tione adhuc est, duplex indicatio est, ueluti in re-
liquis morbis omnibus quicūq̄ in gignendo ad-
huc sit, necdum absolutionē sunt nacti, ostendi-
mus. Nam quod eorū generatū iam est, id medici-
næ artis parti quæ morbos curat, subiicitur. Quod
in generatione adhuc est, parti quæ futurum mor-
bum præcauet. Atq̄ idcirco diximus nō simplicē,

Galen.

sed cōpositam esse totā de ijs ægritudinibus quæ
in generatione adhuc sunt, medentis sollicitudinē,
ex ea. s. quæ prouidet, & ea quæ curat, sicuti etiam
si omnino phlegmone laborare adhuc non cœpe-
rit, sed tamē appareat iā subesse in corpore genus
aliquod eorū quæ phlegmonem excitare possint,
in talibus quoq̄ omnib. sola prouisio indicat. At
si nulla adhuc in corpore causa subalitur, ijs qui ita
se habent, ea quæ sanitatis est tutrix, prouidet. Er-
go quæ causæ phlegmonem accersere uident, has
cum iam in corpore sint conceptæ, sed tamen exi-
guæ adhuc & incipientes, utiq̄ ne maiores fiant,
inhibere conueniunt. Atq̄ hoc præcauentis phleg-
monē est officium. Cū uero ea magnitudine sint, ut
iam phlegmonē creent, eas summouere oportet,
ac quantum iam phlegmones genitū est, sanare.

3 Accōmunis omnium phlegmonarum gene-
ratio, ex sanguinis influxu est, copiosioris. s. quam
pars postulat, ueluti tum in libro De tumorib. præ-
ter naturā ostendimus, tum in eo qui De inæquali
intemperie est inscriptus. Sanē copiosior sanguis
influxit, alia quapiā alijs uel particulis aliquando eū
mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare inci-
pit, recipiente; aliquando particula quæ affligitur,
hunc ad se trahēte. Partes quæ mittunt, aliās ut co-
pia superuacuum, uel ut qualitate molestum, aliās
utroq̄ nomine, succū propellant. Quæ attrahunt,
ea morbofo calore trahūt. Porro in doloribus in-
cipit quidē causa ab eo quod affligitur, sed quic-
quid est phlegmones, id superpositæ partes effici-
unt. Ergo quod ad partē excaflatam uel trahūt
uicini succi (ut nos cēsemus) uel cōflunt (ut As-
clepiades putabat) euidenter cernitur. Et constat
hoc loco ex ipso quod cernitur, sermoni fides. At
uero quæ dolent, cernuntur ea quoq̄ phlegmonē
ex dolore pati, sed causam eius quidam omnino
non assignant, quidam nullo modo probabilem.
Nostra uero sententia talis est. Docuimus in eo o-
pere quod De naturalibus facultatib. edidimus,
unam esse naturæ facultatē, quam excretoriam di-
cimus. Ea suo munere tum fungitur, cum triste alī
quid sentit. Vnū uero quiddam est ex ijs quæ eam
cōtristant, ipsa quæ dolorē excitat causa, quæ cūq̄
ea sit. Hæc igitur eijcere dum properat, phlegmonē
interdū in particula cōcitāt. Cū em̄ primis suis co-
natibus nihil profecit, uehemētius aggressa quod
insest expellere, sanguinis aliquid & spiritus ex
superpositis partibus in afflicta simul exprimit.
Atq̄ hinc fit, q̄ ex dolore particula pro portione
cōfluentis in eam humoris, in tumorē atrollitur.

4 Quinetiam omnium tumorū quī præter natu-
rā sunt, uarietas ex eius quod influit, natura na-
scitur. Vbi enim flatulenta materia copiosior ac-
cessit, flatuosi magis tumores fiūt. Phlegmonæ ue-
ro magis similes, ubi sanguis: sicut erisypelati, ubi
flaua bilis: & cedemati, ubi pituita. Similiter scri-

tom. 6

o

rhoss

rhosi, ubi uel crassius, uel uehemēter lentus humor est, qui parti est infixus. Sanē crassius humor, quodammodo iam melācholicus magis minusue est. Lentus autē ex glutinosis prouenit cibis, sed & ex ipsis aliquando neruosis partibus, utiq; cum multum excrementi genuerint. Verum de cæteris tumoribus post dicitur. Nunc de phlegmone agemus, ac prius, quæ omniū sunt cōmunia, ad dispositionem expropositis: sic deinde quæ solius eius utiq; sunt propria, adijciemus. Cum igitur particula aliqua phlegmone urgeri cōperit, uidendum est an propter calorē aliquem qui in illa præter naturam sit ortus, an propter dolorē, uel ipsius, uel propinquæ alicuius partis, hanc contraxerit, quō scilicet adempta causa, phlegmone non amplius increfcat. Post hanc cōsiderationē proximē illa cōtēplabere, nunquid uicina aliqua particula sanguinē largius ad partē phlegmone obfessam transmittat; deinde nūtotū corpus aut sanguine, aut humoribus omnibus æqualiter abūdet, *πλεθωρὰ* uocat.

5 Nam tibi (arbitror) non excidit, utpote sæpe à nobis monstratū, superuacanea, quæ à ualentioribus partibus ob redundantiam, uel qualitātē expellitur, ea in imbecilliores procūbere, atq; hinc accidere ut glandulæ, quas adenas uocant, facile fluxiones recipiant, & maxime quæ rariore natura sunt. Quippe ualentius est arteriarum, & uenarum, & neruorū, & musculorū robur, imbecillius autē ac in totū impar, corporū quæ glandularum sunt nature. Sic igitur fit, ut & propter ulcus quod in manus aut pedis digito sit, eiusmodi glandulæ in inguinibus & alis tum intumescant, tum phlegmone occupent, cum defluentē ad ultimos artus sanguinē priores exceperint. Quinetiam in collo, & secus aures, sæpenumero glandulæ, ijs quibus in collo, capite, uel aliqua uicina parte ulcus est natum, intumescunt. Nominant autē ipsos adenas, cū sic intumuerunt, bubones. Quod si scirrhosus earum partium phlegmone aliquando fuerit, hec & agrē sanabilis est, & struma dicitur. Quānā uero sit strumarum curatio, in proximo dicitur libro. Nunc de phlegmonis, quoniā de ijs differere proposuimus, denuo repetētes, dicamus q; inhibiti earum incipientium, ex generante illas causa tollenda præstatut: primūq; de ijs quæ ulcera sequuntur agamus. Postea enim quā prope magnam arteriam, aut uenam ulcus ortū est, celerrime bubones excitant. Cernitur autē aliquando ipsa quoq; uena, per totū membrū rubra, & calens, & distenta, ac si quis eam tangat, dolens. Ergo si uel totum corpus sit plethoricum, uel malo succo redundet, difficilis curatio reddit: Sin sanū planē sit, facilis. Quippe ex calfacere & humectare modice totum membrū, quod dolor mitigetut, oportet (nostri autē eiusmodi præsidiorū materiā) ipsi utiq; ulceri tetrapharmaco in linteolo imposito (liquaē id oleo potissimū rosaceo, uel si id non adsit, relaxanti aliquo.) Toto uero membro, hapso lanæ ex calente oleo imbuto circumdato. Quinetiā ipsi ulceri calidū imponi medicamentū oportet: ac super ipsum, calidū extrinsecus cataplasma dare, quod ex fari-

na uel hordeacea, uel triticea, uel ambabus mistis, constat. Humorē autē habeat aquam cum pauco oleo. Nō secus uero etiā ipsi adeni quæ phlegmone urgere cōcepit, ut mitigetut, imponi debet prius die lana ex oleo calente madens: non autē, sicut nonnulli faciunt, statim addito sale. Post enim sale utemur, cum & tumor per totū membrū fuerit remissus, & dolor ulceris sedatus. Quinetiam Macedonicū quod uocat pharmacū, similiter sicut tetrapharmacū, ipsi ulceri imponere licebit. Etenim similia inter se sunt, solo thure tetrapharmacū Macedonico superante. At si uel plethoricū corpus sit, uel malo succo redundet, curatio per ea quæ sic calent, fluxionē ad membrū citat. Atqui nec alia ulla uti datur. Cogimur ergo aliās sanguinē mittere, idq; aut uena incisa, aut mēbris ijs quæ laesa non sunt, scarificatis. Manu enim laborante, scarificabis crura. Altero crurum male habente, reliquum. Has nanq; uacuationes indicat ipsa copia, sicut etiam succorū uitium, redundantis succi purgationem. Ac plerūq; post hæc præsidia, glandularum phlegmone definit. Sæpe tamē uel ipso qui curat, ac corporis totius uacuationem segniore: uel ipso qui laborat, præuollit eam non admittente, earum phlegmone maior efficitur, sicut ad suppurationē perueniat. Sed & quæ *φύματα* quoq; græce appellāt, memoratis glandulis sicubi fluxio in eas procubuit, citra ulceris occasionem accidunt. Vbi ergo distentæ uehementer glandulæ sunt, aut alia deniq; particula quæuis quæ phlegmone premit, cogimur toto corpore prius uacuato ipsam scarificare. Sanē uacuum totū corpus (sicut in libro De plenitudine monstrauimus) nō modo cum in redundantia succorū esset habitus: sed etiā cū medicritatē succorū continet, si morbi magnitudo suadeat. Siquidē dolor, & mēbris in quo phlegmone sedet, calor, etiā si purū ab excrementis totū corpus sit, fluxionis causæ sūt. Expedi igitur parcius id, hoc casu facere, ac uacuare prout maxime tum ætati laborantis, tum naturæ congruere uidebitur: æstimatedis præterea tum anni tempore, tum regione, tum egrotantis ipsius consuetudine de quibus sæpe iam in multis diximus, sic ut etiā si adhibita in sermone nō sint, subaudire ea cōueniat. Vbi uero phlegmones ipse ueluti seruor iam subsedit, mitigatorijs cataplasmatibus dimissis, ad ea quæ digerunt, paulatim est transeundum: ac primū cum mitigatorijs paulum mellis miscēdum. Mox triticea farina in totū prorsus auferenda, cōtēntis hordeacea cum melle uberiore: deinde ad aliquod eiusmodi digerentium medicamentorum est ueniendum, quæ uel liquida consistentia sint, similiter ijs quæ in lineamentis, uel linteolis excipiuntur (*ἡμῶν* græce uocant) uel cerati specie. A duris autem abstinentū est, qualia plerāq; emplastra sunt. nam & phlegmonarū reliquias cōtrahūt, et rursus phlegmonē in ægra parte excitāt. Quin si pus aliquod notabile in fuppuratione particula sit cōtēntum, nō expedit (quod nonnulli faciunt) protinus incidere, imō exhalationē moliri medicamentis ad id uel lentibus, quorum usus ex affectu sit coniectatus.

Quippe cum phlegmones naturæ quicquid in membro adhuc restat, acrimia medicamenta magis iritantur quæ digerant. Cum uero quod ex phlegmone restat quicquid, scirrhosum effectum uidetur, fideret iam ualentibus medicamentis uteris; sed obseruato bis in die quæ præsentent effectum, primum mane, secundo uesper. Quod si balneo quoque utatur, etiam in eo tempore. Si quando ergo ægræ partem medicamentis acrimonia irritata uideris ita ut tumescat, aut rubicundior sit, aut magis indoleat, mitigabis eam interea fomēto, quod per spongiā administrabis. Id autem aliquando ex aqua dulci esto, aliquando etiam sal habente, ubi. scilicet scirrhosiores phlegmonæ sunt. Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea uideantur tibi totum digerere posse, secare id quod sic abscessit, eo potissimum loco oportet, quo est editissimum. Quippe tenuissimam etiam illic inuenies cutim. Memineris præterea in sectione & alterius indicationis quæ ad fluxum pertinet, atque ad ambo respiciēs, ita quod suppurauit incide, ac deinceps medicamentum aliquod eorum quæ sine morbo succent, impone. Quod si coputuisse portio aliqua suppurantis partis uidebitur, excidi eam est necesse. Sanè quidam in ijs quæ in axillis & inguinibus suppurant, in myrti folij specie semper excidit cutim iubent; quoniam in ijs laxa ea naturaliter sit, ideoque omne quod ipsi aduenit prompte recipiens; præterea ipsa ex leui occasione phlegmonem facile contrahat. At maximas aliqui sectiones facere solent, quarum occasione particula ubi ad cicatricem est perducta, non solum turpissimam reddidit, sed etiam sit imbecillior, & quæ sæpe homini ad motum sit in mora. Hæc igitur ipsi uitantes, sapissime certefola incisione, & medicamentis ualenter siccantibus, huiusmodi affectus sanauimus. Quod si aliquando excidere aliquid propter multitudinem, non puris modo, sed etiam corruptarum partium fuit opus, contenti eramus sectione quæ myrti folium imitatur, planè non magna. Cum autem in ea excisione longitudo maior quam latitudo sit, esto in inguine longitudo per transversum ducta, non autem per membri rectitudinem. Quippe ita cum membrum inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur, post excisam cutim, medicamentum quod Græci *μαύραι* uocant, affectam partem implebimus. Est autem ea purgamentum thuris, leui adstrictione prædita, atque hoc nomine etiam thure ipso ad nonnulla utilis. Tus enim puris tantum mouendi facultatem obtinet; utpote nullam adstringendi uim habens. Magis quæ id facit quod pinguius ex eo est, & magis albicans; sicuti etiam quod flauum ex eo magis est, ualidius siccatur. Manne uero, etiam corticis thuris paululum est admixtum; unde, adstringendi uim habet. Ipse uero cortex thuris tum adstringit, tum siccatur insigniter. Itaque etiam ad moderatiores sanguinis perfusiones eo utimur solo: sicut etiam ad ualidiores, solo isto, & cribrato, & in mollissimum puluerem redacto. Quinetiam mittere prius incisam partem (sicut dictum est) quantum poscere uidebitur, oportet. fomentis primum, dein cataplasmate, mox humectare aliquo medicamentum, aut non siccante: singulis. extrinsecus imposi-

Galen.

tis. Nam in ipso ulcere tum mannā (ut dictum est) tum ex præditijs quæ lintheolis excipiunt, primum ea quæ pus citant, dein ea quæ expurgant, sunt imponenda. post quæ, si cauitas etiam non sit, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cicatricem inducunt: (græce *συναλωπικὰ* & *επουλωπικὰ* uocant) ueluti quod ex cadmia cõficitur. At quoniam in horum quoque usu plurimæ medicorum non paruum quiddam peccatur, non ab re fuerit etiam de ijs disserere. Tum namque ducere ulcus ad cicatricem incipiunt, ac idonea illi rei medicamenta applicant, cum iam penitus sit impletum, nec quicquid illi restat cauit. Hinc illis accidit, ut cicatrices efficiat circumposita cute magis eminētēs. Quod igitur illi cuti sint equales, conueniet id genus medicamentis uti, priusquam ulcus ad æqualitatem prorsus sit impletum, impositum super ipsas ulceris oras ex specilli mucrone medicamentum aliquo siccum, ex ijs quæ in ulcerum curatione retulimus. super reliquum, linamento dato, quod aliquo medicamento ex ijs quæ cicatricem inducant, & liquida sint cõsistentia, fuerit silitum. Cedente autem prospere curatione, etiam id amoueas, ac postea siccum tantum medicamentum uteris, lato specilli mucrone [ex eo] super toto ulcere uolutato. Foris autem suffecerit linamentum uel siccum, uel ex uino madens, ac potissimum quod ex mollibus sit elychnijs, cuiusmodi Tharsensia sunt, quoniam quoque ad ulcera quæ supercreuant submittenda, uim aliquam obtineant, atque hæc ducente nos rerum societate, diximus.

C 6 Nunc ad sermonem De phlegmone reuerſi dicamus cõmunem omnium phlegmonarum curationis indicationem esse uacuationem. Quæ uero adhuc in generatione sunt, in ijs prior uacuatio est confluentis ad affectum locum sanguinis inhibiti. Inhibebitur is cõmode, si ipsam fluxionis causam inuenierimus. Sanè ea duplex est, aliquando enim ex ipsa parte quæ phlegmone uexat, oritur, aliquando ex alia quapiam alijsue. Ex ipsa quoties aut calidior est facta, aut dolore (sicuti ante diximus) urget. Non ex ipsa, quando uel ab alia quapiam, uel ab alijs superfluum illi transmittitur, uel etiam ex totius corporis affectu. Fit igitur calidius uel propter immodicum motum, uel aliquæ ex sole, aut igni tempore, uel acre medicamentum. Dolore uero angitur & propter intemperiem, & uulnus, & contusionem, & distorsionem, & tensionem, præterea obstructionem quandam, & spiritum flatuosum. Intemperies modo extrinsecus illi puenit, modo ex suis qui in ipso habentur corpore. Et extrinsecus, uel ab aliquo uenentorum animalium, uel pharmaco quod uehementer excalet, aut refrigeret, etiam ex ambiente nonnunquam. Ex ipso uero laborantis corpore, cum id utiſos succos, qui facultate sint dissimili, cõgessit. His igitur omnibus æstima, quæ phlegmone adhuc in generatione sunt, earum causas prius abscondes. Quæ uero iam factæ sunt, has utique curabis solas. Ergo quid nā medendi agendum sit, si torum corpus male sit affectum, & dicta prius tum in his non pauca sunt, tum in libro De plenitudine, & nunc summās eorum

tom. 6

0 2

quæ

quæ dicta sunt, recensēbimus. Vbi enim æquabili-
ter inter se succi sunt adaucti, id est *πλῆθος* & *πλη-
θος* Græci uocant, non plenitudinem, & succo-
rum redundantiam dixerimus. Vbi uero uel flaua
bili, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus re-
fertū corpus iam fuerit, eum habitum *καρροχυσίαν*,
quasi succorum uitium dicas, non plethoram no-
minant. Ergo plethora tum sanguinis missio cu-
ratur, tum frequenti balneo, tum exercitatione,
tum frictione: præterea digerentibus medicamen-
tis, & præter hæc omnia inedia, de quibus in ijs quæ
De sanitate tuenda sunt prodita, dictum abunde
est. Succorum uitium purgatione, quæ cuiq; supe-
ranti succo sit accommodata, corrigitur. Dictū por-
rò & de hac est in ea parte operis De sanitate tuen-
da, quæ De uitandis morbis est instituta. Illinc igitur
huc ea transferas oportebit, ac consideres quo-
nam ex ijs uti maxime expediat. Siquidē si iam
febricitat ager, nec exercitatione uacuare exupe-
rantia licet, nec unctione quæ excalfaciat: sed nec
multa frictione, nec balneo, imò sanguinis missio-
ne, unā cū inedia, uel purgatione aliqua. At si nō
dum febricitat, omnibus iam dictis utare, optimū
quodq; ad id quod instat deligens. Illud enim pa-
tere uel me tacente arbitror, eum cui crura phleg-
mone laborant, nō esse uel ambulatione, uel cursu
exercitandum: sed nec stare illi esse iubendū: imò
sedenti plurimū fricari, mox manuū motu exerci-
tari illi est satius. At si cui in supernis partibus cœ-
perit pars aliqua phlegmone tentari, huic motus
ex inambulatione aut cursu est salutaris. Similiter
& frictio his quidem ea potior est, quæ cruribus
adhibetur, illis, quæ in supernis partibus admini-
stratur. Quippe præceptum in contrarium reuul-
sionis, in omnibus talibus commune est. Neq; igitur
cum uel circa sedem, uel aliquā huic uicinam
partem initium phlegmones incidit, aluum deij-
cias. Neq; cū in uesica, uel cole, uel renibus est cœ-
pta, pharmaca quæ urinas prouocent, bibenda da-
bis. Nec si mulieri in utero, uel pudendo insedit,
menses huic prouocabis, sed ad partes quæ maxi-
me longinquæ sint, semper reuulsionem facies: æ-
stimata. tum phlegmones magnitudine, tum cor-
poris totius statu. Nam si plurima succorum abun-
dantia sit, nec exercitatione, nec balneo sine peri-
culo utare. Sin exigua sit, licet & per hæc uacues.
Cæterum, (quod dixi) hæc tum in ea parte operis
De sanitate tuenda, quæ morbos præcauet, sunt
scripta, tum in libro qui De plenitudine inscribitur,
tum in his quæ De phlebotomia, siue incidenda
uena, tum quæ De purgantium medicamentorum
facultatibus edidimus. Sed quod ad cōmonefaci-
endum tantum de ijs sit satis, nunc etiā abunde est
dictum. Itaq; ad propriam de phlegmone disputa-
tionem nunc est ueniendum. In qua primum me-
rito uerba faciemus de phlegmone, prout ab affe-
ctu partis cui insedit est orta. Quippe satis constat
affectum illum principio tibi esse sanandum, mox
quicquid iam phlegmones est factum. Porro inte-
rim iisdē præsidij ambo tolluntur, ueluti cum ex
flauulento spiritu & dēlitare particulæ dolor quif-

piam est ortus. Hoc enim casu eorum quæ modice
calfaciūt, (quæ etiam *χαλαστικά*, id est relaxantia,
siue remittētia uocamus) usus est cōmodus, ut qui
pariter & cōiuentia corporis laxet, & flauulū
spiritum tenuet, & quod phlegmones iam consti-
tum est digerat. Ad eundem modum & si ex frigi-
do dominantē intemperies sit oborta. Nam tunc
quodq; calfaciēdo, non solum intemperantia, sed
etiam phlegmone unā medebis. Itēdem si calor
uehementior intemperiem fecit: refrigerantibus
præsidij ambo sistes. Siquidē intemperantia con-
traria semper requirit. Vacuatur autem quod im-
pletum est, non modo medicamentis ijs quæ dige-
runt, sed etiam quæ adstringūt & refrigerant. Ma-
gisq; profecto ad incipiētes phlegmonas frigidis
adstringentibusq;, quā ijs quæ digerunt est uten-
dum. Atq; etiam nū magis ubi crassum quod con-
fluit, non est. Sed si sanguis in particula quam phle-
gmoneprehendit, uehementer est impactus, non
est amplius repercutientibus utendū: sed cum di-
gerere est tempestiū. Vbi autem ex animalis
punctu morsuue dolor incidit, duplex sedandi
doloris ratio est, uel uirū ipsū uacuando, uel
quod dōlorem excitat, alterando. Sanē uacues id
eorum medicaminū ope, quæ uehementer attra-
hant. Alteres ijs quæ sunt cōtraria, idq; uel qualita-
tibus, uel tota substantia. Monstratum nanq; est in
libris De medicamētis, quædam esse totis substan-
tijs inter se contraria, quædam solis qualitibus.
Sed & illud indicatum æque est, qd eorū quæ con-
traria qualitate sunt, methodus quæpiā sit. eorum
quæ tota substantia sunt aduersa, methodus non
sit, sed omnia sint per experientia inuenta. Uigi-
tur quæcūq; methodo curandi explorentur, hinc
disces. Quæ experientia tantum deprehēdit, ea in
his operibus quibus De medicamētis agitur, sunt
collecta: uno quod De facultate eorum inscribitur:
altero qd De cōpositione: & tertio qd De facile
parabilibus inscribitur. In quibus operibus ostē-
dimus quænam ex sola experientia, quænam ex so-
la ratione, & quænam ex ambabus inuēta sint phar-
maca. Ergo methodus quā hoc opere tradere in-
stituit, in doloribus uniuersis qui uel ex animalis,
medicamentorum uel noxa excitantur, duplicem
indicationem habet, nempe eius quod dōlorem
creat uacuationem, atq; alterationem. Vacuant id
tum calfacientia omnia, tum quæ citra calfaciē-
tiam uehementer trahunt: ueluti & cucurbitulæ,
& caua cornua quædam, quibus nonnulli cucur-
bitularū uice utuntur. Sunt autem & qui ore suo
uirū extrahunt: ægre uidelicet particulæ admo-
ti, ipsamq; labijs cōplexi. Huc sane pertinet & cau-
terium, & medicamenta quæ cauterijs similiter es-
scharam efficiunt. Atq; hæc omnia totā eius quod
infestat, substantiam exinaniunt. Alterum auxilio
rum genus est eorum, quæ qualitatem per contra-
ria alterant: scilicet exhibentibus nobis, si uehe-
mentem calorem ager uel in ipso demorfo loco,
uel in toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia: sin
frigus sentiat, calfacientia. Docuimus aut utraq;
in ijs operibus quæ De medicamētis sunt scripta.

Atiales quidem, omnis phlegmone communes medicaciones sunt. Variantur autem pro laborantium particularum ratione. Etenim id iam quoque ostensum est, ubi de ulcerum curatione egimus. Nec longo sermone est opus ei qui meminerit eorum quæ ibi sunt dicta: sed fat erit paucis ea transcurrere.

7 Vna itaque indicatio ex ipsius similibus accipitur partibus altera ex instrumentariis. & ea quæ ex similibus sumitur, modum calfaciendi, refrigerandi, siccandi, ac humectandi determinat. Quæ vero ex instrumentariis, tum locum ipsum per quem vacuare oportet, tum uacuationis rationem, tum vero in similibus speciei medicamentorum usu ipsum pluris minorisque modum. Ac de similiarum quidam partium indicatione supra, ubi de ulcerum curatione est tractatum, diximus; de instrumentaria uero hic agemus.

8 Cum enim phlegmone duplici ratione a natura recessit, & quæ pars ipsa multo sanguine sit repleta, et quod eadem sit calidior, utique uacuationis indicatio refrigerationis indicatione uincit: contra. Inquam in erysipelate. In illo namque refrigerationis indicatio magis urget quam uacuationis, quamquam utriusque affectus curandi commune caput est infestantis humoris uacuatio. Ideoque postquam refrigeratum erysipelas est, ad ea quæ digerunt medicamenta, conuertimur. In phlegmone igitur tantisper est refrigerandum, quatenus & ad incrementum eius sistendum inhibendumque est cōmodum. Etenim cum immoderatus calor dolorē excitet, atque etiam aliquid ad agram partē attrahat, utroque nomine augescere phlegmonē accidit. Ergo quantum refrigerationis phlegmonæ, ceu calido morbo congruit, tantum certe & incrementū eius inhibere est aptum. Idem parem gratiam præstat & cum repercutit id quod affluit. Quantum uero ex eo quod in laborante membro continetur, quidpiam in proximis partes repellit, hoc phlegmones iam genitæ medela est. Simili modo & quæ modice excalfaciunt, utraq; interdum ratione profunt, quoniam & dolorem sedent, & quod cōtentum in laborante particula est, digerant. Quippe dolorem mitigando, augeri phlegmonas uentant: digerendo, quod earum iam conceptū est, sanant.

9 Quoniam igitur momentum omne curationis laborantis phlegmone partis, in redundantis in ipsa sanguinis uacuatione consistit, uacuatio autē hoc genus affectuum excogitata est duplex, aut translato ad alias partes qui in ægra continebatur sanguine, aut foris a corpore expulso, satius profectio est utraq; uti: obseruantibus diligenter ne qua ex accidenti læsio sequatur. Ergo cum gemina sit dictarum uacuationum utraq; quadruplex in unum uersum nascitur uacuantium auxiliorum genus, Translationis enim sanguinis ad alias partes alterum genus est, ubi ipsa pars quæ phlegmone laborat, sanguinem abigit. Alterum cum ea quæ integræ sunt, ad se trahunt. Eius autem quæ extra corpus educit, alterum sensibili effluxu, alterum ratione tantū cōtemplabili perficitur. Atque id quod sensibili effluxu peragitur, alias per ipsam sit partē in

Galen.

A qua phlegmone residet, alias per ea quæ una cum hac aperitur. Proinde etiam dissectionū notitia ad eiusmodi confortum intelligendum est opus. 10 Ergo tum hæc indicationes phlegmonarum curationē immutantes a partium natura præstantur: tum supra has quæ tum ex positu, tum figura sumuntur, quas nimirum laboris locus, quæ instrumentalis, non quæ similis est, indicat. Sunt etiam alia quæ tum instrumentalium, tum similiarum cōmunes sunt: sicuti cum a cōtione earum inspicimus, præterea an rara pars sit, an densa, an acutisens, an hebetis aut omnino torpentis.

11 Ad quæ omnia intentū esse oportet, qui recte curare studet. Quoniā uero (ut semper testati sumus) non satis est ipsa tantū uniuersalia nouisse, nisi quis etiam in particularibus se exerceat, ita utique & nos nunc faciamus: non tamen omnia particularia pereurrentes, sed ea tantum quæ nobis satis esse lectori uidebuntur. Proponatur itaque iecur iam phlegmonē cōtrahere coepisse: tum quæ nam mali eius cōmodissima sit curatio quaeratur. Omnium ergo primum ab ijs quæ retuli incipiens, an totum corpus inanitione indigeat, considerabis. Quod si indigere inueneris, mox ægri uirtutē æstima-
B mabis, possit ne confertum uacuationem tolerare. Primum ergo ualida esto. Ab hac æstima-
B bitem. Nam si puer sit, quæ per dissectam uenam sit (ut supra est monstratum) uacuationē non feret. Verum cum pubertatē attigerint, iam pueri missionē sanguinis tolerant. Ergo pariter tum reuel-

C lendus, tum educendus qui ad iecur fluit sanguis est, interna in dextro cubito insecta uena: propterea quod & directo & ampla uia cum uena quæ caua dicitur, societatem habet. Hac non apparente, mediā secanda est. Quod si nec ea se ostenderit, reliqua ac tertia est incidenda. Modū uero uacuationis tum ex redundantē modo, tum ex reliquis quæ in superioribus diximus, inuenies, ætate, natura, tempore anni, regione, & consuetudine. tum ante hæc, ipsa laborantis uirtute. Hæc enim in omnibus sunt cōmunia. Illud uero, interna ne, an mediā, an humeralis uena secanda sit, an ea quæ iuxta malleolum est, an quæ in poplite, id uere ex laborante particula indicatur. Ac definitum iam est in ijs quæ de incidenda uena scripsimus, de uacuationibus id genus omnibus, diciturque nunc quantum sit ad rem propositam opportunitum, primūque hoc ipsum, nō esse. solū illud satis, quod uacuum dum sit inuenisse, ueluti sentiunt qui a methodo sectā colūt, quibus nulla de laborantium locorum differentia habet ratio. Non enim ratio solū, uerum etiam usus ipse indicat aliam alij parti uacuationē congruere. Siquidem ex ijs quibus oculi tentari phlegmone cōeperant, nonnullos sola purgatio neper aluū, uno die sanatos uidisti. Quam rem si quis facere in iocinore cum phlegmone laborare incipit, tentet, maximam excitabit phlegmonem: æque ut si cū in renibus aut uesica incipit, quæ uirinas cient, medicamenta exhibeat: aut si cū uterus phlegmone laborat, menses deuocet. Siquidē longissime a tentata fluxione parte quod reducat re-

tom. 6

o 3 uellere

uellere, nequaq̃ ad eā trahere conuenit. Hac itaq̃ ratione, nec si uentriculum aut intestina phlegmone occupare iam cœperit, medicamine quod aluū deſciat, uti cōueniat. Eandem cum his indicationem & uterus forſitur, ſicuti cum urinae uas, pudenta. At uomitu uti pudibundis laborantibus, in diuerſa reuellens auxilium eſt. Græci *ἀνωμασικόν* uocant. Eadem ratione in omnibus quæ circa caput accidunt, medicamentum purgatorium deorſum, reuulſoriū auxilium eſt. Si qua uero circa fauces, & palatū, aut linguam, aut deniq̃ in ore, phlegmone laborant inſeperint, in his omnibus cauenda ſunt quæ pituitā per os euocant, & *ποφλεγματισμός* uocat, quippe cum id ſimile ſit, ac ſi deſcere aluū inſteſtinis agrotantibus uelis, aut urinas mouere, cum renibus aut ueſicæ ſit agere, aut uomitum laceſſere, cum partes ſtomachi ſint afflicte. Satiſ igitur ſit, ubi partes quæ in ore ſunt, phlegmone accereſcere cœperint, deriuare ad nares. Pari modo uenam quoq̃ ubi hæ partes ſic laborant, incidere humeralem in manu, ſi ea non cernitur, mediā ubi iecur, pectus, pulmo, aut cor ſic afficiuntur, internā. In angina, quæ *συνδύχνη* græce uocant, primas in manibus ſecundas eas, quæ ſub lingua habentur. At ijs quæ in occipite ſunt, afflictis, etiā eam quæ in cubito eſt, necnon eā quæ habet in fronte. Renibus uero, & ueſica, & pudendo, & utero ſic habetibus, eas quæ in cruribus ſunt ſitæ, ac potisſimū quæ circa poplitē ſunt. Sin minus, eas quæ iuxta malleolū, ac perpetuo quidē in omnibus, eam quæ eſt directio eſt. Vbi iecur phlegmone inuadit, quæ in dextra ſunt manu, ubi lienē, cōtrā. Itaq̃ ſtatim prima uacuationis diuerſitas pro particularū diuerſitate uariatur, cōſtatq̃ cōmunē indicationē nō magis eſſe utilitatis q̃ noxæ cauſam. Siquidē q̃ uacuandū ſit, id cōmunis indicatio eſt, unde autē, aut quomodo uacuatio ſit faciendā, id æger ipſe docet locus. Ad eundē nanq̃ modum, ubi pectus, aut uentriculus, aut partes circa collū caputue phlegmone laborant, excogitatum eſt artus uincire. Quippe ipſum quod phlegmone inſeſtatur, uincindū non eſt. Sed ſi in manibus phlegmone eſt orta, crura; ſin in cruribus, manus.

11 Sed nec refrigerare inter initia, aut adſtringere, citra laborantis particulæ indicationē, utilitatis magis quā noxæ ſunt cauſæ. Nam in particulis quæ circa artus ſunt, ſat fuerit etiam ſpongiam uel ex frigida aqua, cui paululum acetū ſit immiſtum, uel aqua ſola madentem imponere, ſicut etiam ex uino aliquo auſtero. In iocinore uero, ſi phlegmone laborare cœpit, nemo compos rationis his utatur, imò nec ſi melino inſundas, aut myrteo, aut maſtichino, aut nardino, aut lentifcino, aut aliquo oleo quod adſtringat, aut etiam alio quopiam cui abſynthium ſit incoctum, ne horū quidem ullum cōueniet frigidum, ſicut nec ullum cataplaſma frigidum. Sed ſi mala, præcipue cotonea uino incoquens, cataplaſma ex eo præparaueris, ſi iecur phlegmone laborare adhuc incipiat, ne id quidem admovebis frigidum, ueluti nec oleum, ut dictū eſt, præparatū, uel oculis, uel oris partibus, ſicubi hæc

tentari phlegmone cœperint. Auri uero etiam ſi acetū cum roſaceo inſundas, nil offendes. At non eſt hoc oculis laborantibus utile, ueluti nec medicamen quod ex moris cōſtitur, aut aliud quippiæ eorū quæ *συνεπνικῆ* græce dicitur. Sunt enim eiſmodi omnia oculis triſtia, quanq̃ genere ſunt ex ijs quæ indicētur. Glandulis uero phlegmone tentari cœptis, ſæpe ſolum oleum calens ſat fuit.

12 Sed & reliquis uictus ordinādus iſt quibus glandulæ aut etiam aliquid circa artus phlegmone tentatur, unam tantum indicationē habet, quæ tot ac talia exhiberi iubet, quot & qualia facillime concoquantur. Nec quicq̃ refert, alicam, an ptiſanam, an muſſam, an puniçū, an malū, an tale quippiam, exhibeas. At ſi iecur phlegmone inſeſtatur, exquiſitiſſimo uictu eſt opus. Aeq̃ proſecto & ſi uentriculus ſic laborat, quippe munus eorum toti animali eſt cōmune. Acceditq̃ omnibus animalis partibus maximum incoctum, ſiue non probe concoctū alimentū ſit, ſiue non rite in ſanguinem cōuerſum. Artuum uero partes, tantum alimenti capiunt, quanto ſunt nutritæ. Quò ſit, ut ſiue ex malo quod probe in uentriculo ſit concoctū, alimentum ad eas perueniat, ſiue ex alica, ſiue ex ptiſana, non multum interſit. In iocinore uero quantum referat nutrimentorū differētia, tum q̃ maximam in utrāq̃ partē uim habeat, hinc diſcas licet.

13 Nam expelli eſt iocinore oportet, quicquid in eo tum amaræ bilis, tum ſanie quæ ex phlegmone provenit, eſt collectū. Id uero fieri nequit, niſi & uafa quæ ſunt in uifcere, detergeantur, & meatus qui ad ieſumum pertinet, ſit apertus. Ergo alica cum & huic inhæreat, & uafa quæ in uifcere ſunt condita obſtruat, præcipueq̃ eorum ora, & bilem in inſteſtinum deſcendere, & alimentum in totum corpus digeri prohibet. Poſcit ergo tum iecur ipſum, tum os meatus qui bilem tranſmittit, cibos & pharmaca quæ obſtructa recludant. Talia uero omnia ſunt, lenta quidem minime, ſed tenui conſiſtentia, & qualitate mordente. At uero ab his, utpote mordentibus, phlegmonæ irritantur. Quare quæ citra morſum ea detergeat, indigemus, cuiusmodi ſcilicet muſſa eſt. At nouimus dulcibus omnibus, tum iecur, tum lienem maxime intumefcere. Superſunt igitur quæ culpa uacent, ut in cibis ptiſana, quippe quæ ſine morſu deterget, ut in pharmacis oxymeli aqua miſtum. Nam & puniçum malū & cotonei & cætera quæ adſtringunt, dū bilis meatus os arctant, bilē ipſam excerni prohibēt. Atq̃ inde iocinoris phlegmonis ſunt incoctum, præſertim ijs quæ in cauo uifceris cōſiſtunt. Quibus ad anguſtias quas facit ipſa phlegmone, etiam ea quæ ex adſtringentibus & lentis ſit cibis, accedit. ac quæ mordēt, ea phlegmonas ipſas, quæ in cauo ſunt uifceris, magis irritat. Quippe ijs quæ in gibbis eius cōſiſtunt, mutata ſam ueniūt ea quæ aſſumpta ſunt, ita ut nec quæ adſtriçtoria ſunt, ſimiliter adhuc adſtringant; nec quod mordens eſt, ſimiliter mordeat; nec quod propter lentorem in anguſtis uasibus hærebat, ſimiliter etiamnum maneat. Eſt autem his occaſio mutationis duplex, &

& quod prius sunt cōcocta, & quod sanguini qui in iocinore prius erat, sunt admista. Cauo aut iocinoris phlegmone oblesso, protinus etiam uenas quæ in melenterio sunt, una phlegmone laborare esse necesse, quando ex ea quæ ad portam pertinet, omnes sunt ortæ, protinus etiam quæcunq; oculis earum incidunt, uim suam ostendere.

14. Antibi ad cōmunem phlegmones curationem parua ex particulis ipsis accedere differētia uidetur: Mihi sanē maxima uidetur, quāuis ij qui Thessali stupiditate æmulantur, cōmunem indicationem solam satisfacere putēt. Placet autem nunc ad memoriā reuocare tibi egregiā eorum curationem, quam Theageni philosopho Cynico adhibuerunt. Si quidem hanc norunt plurimī, propter uirī famam, ut qui publice disputare in Traianis circo quotidie sit solitus. Erat qui hominem curabat, unus ex Sorani discipulis nomine Attalus. Is imposuit quotidie iocinori cataplasma ex pane & melle, haud intelligens uiscus hoc mediocriter adstringi debere, propterea quod animalibus altricis facultatis principium sit, et uenosum ab hoc oriatur genus. Igitur uiscus curauit, sicut bubonas, meris scilicet, & solis relaxātibus utēs, cataplasma ex pane & melle imponens, ac prius oleo calente perfundens, tum forbitione ex alica cibans. Hæc nanq; tria fermē omnibus nunc amethodis istis Thessalijs ad acutorū curationem sufficiunt. Visum aut est mihi seorsum Attalum monere, ut adstringēs aliquid admisceret, nec nudis uteretur relaxantibus, ac de uisceris quidē natura nihil eram homini dicturus. Id enim fuisset planē asino fabulam narrare. sed quod me persuasurū hominī arbitrabar, ut cui omnes homines facillime assentire uideo, id tantū exposui, nempe longā experientiam medicos docuisse, ut iecur mista medicamentorū materia curent. Eam aut scriptam inuenturū in ijs medicorū libris, qui sint De medendi ratione conscripti. Si ergo, inquā, tibi uideat, misce aliquid de absynthij coma diligenter tussa, cataplasmati. Oleo uero, totius herbæ aliquid, modice id quem admodū alios cernis in illo incoquentes. Cataplasmati uero, myrobalani expressæ recrementum, & irim, & iussī florē, aut narditidos herbæ radicē, aut cyperi miscabis; nō inutile sit & ex uino ea aliquādo preparare, ac miscere interim etiā de facie ipsa. Quinetiā aliquid adstringentiū incoquere malo- rum, cuiusmodi cotonea sunt, & quæ uocatur struthia. Præterea quæ Romæ abundāt, uocata cestiana. Oleum uero (nā id quoq; uideo miscere te) nō quodlibet esto, sed uel hispanum, uel histriciū, uel crudum, uel lentiscinū, uel myrteum, uel melinū, uel nardinū unguentū. Porro aliam materiam plurimam esse dixi eorū quæ incoquere liceret. Nam & leuisci tenera germina, & myrti, & rubi, & uitis præsertim syluestris, à qua cenanthen uocamur de cerpyni. Non alienū etiam sit, & atticū cœsypum tum cataplasmati, tum etiā ceratis miscere. Nam & cerata quæpiam illi ex eiusmodi materia imponere post cataplasma suasi, & apponere illi tentabam uniuersam deinceps curationē, quod scilicet

A etiam quæ à medicis græcè επιθεματα uocantur, ex mista materia componeret. Nam melius inquā est sublatō cataplasmate aliquid super uiscus esse. Attalus uerō sermonem meum interpellans, Nisi multum (inquit) tibi tribuerem, nihil horum tolerassem: nam in quibus superiores medici passi naufragia sunt, priusq; uera medicina inuēta à nostris esset, ea mihi ueluti ignaro suades. Cætera tres (inquit) aut quatuor dies sine me Theageni ex mea sententia prospicere, & sanum eum penitus cōspicere. Sed quid, inquam, si cum subito pauci, & hīlenti, apparuerint sudores, moriatur? recordaberis ne quæ promiseris, ac de cætero sententiam mutabis? Atq; Attalus post hæc abiit iridens, nec quicquā præterea respondens, sic ut neq; de alica quicq; me consulere permitteret, sed nec quod ex ijs quæ urinas ciet, miscere aque paulo post oporteret, quod scilicet iocinoris gibba essent afflicta. Nam sicuti iocinoris cauum per aluum purgatur, ceu paulo supra diximus, sic gibba eius per ea quæ modice urinas mouent, cuius generis est apium. Procedente aut tempore, ubi phlegmone iam cōcoquitur, etiam ualentioribus uilicet, assaro, & celtica nardo, & phu quod uocant, & petroselino & smyrnio, & mio. sicut etiam per uentrem uacuare, si caui afficeret, cnico cibis admisto, & urtica, & mercuriali, & epithymo, & filicula omnib. præterea quæ modice aluum desiciunt, magisq; in remissionibus tum his ipsis audacius q̄ ante utendum, tum uero quæ his sunt ualentiora, partim in ptisana incoctis, partim tussis, ac in mollissimum puluerē redactis. exhibenda uero & hæc sunt uel ex ptisana, uel ex aqua. Ego nanq; etiam filiculæ aliquid in ptisana aliquando incoxi, & nigri ueratri corticem. Etiam clystere uacuare eos cōueniet, inter initia uel sale, uel nitro, uel aphronitro aquæ mulse admisso contentis, in remissione uero, potissimumq; si quid scirrhusum relictū est phlegmone est, etiā ualentiora medicamenta miscentibus. Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, & organum, & colocynthida, & minus cetaurium. Opportunissima nanq; ad scirrhum sunt iecur & lienis, siue quis parum habita de his ratione, glutinoso cibo utat, (sicut Attalus qui Theageni quotidie alicam exhibuit) siue nihil offerat quod tum obstructions eximat, tum detergeat. Verum quod contigit Theageni, uel potius Attalo, dici est tempus. Ut enim promiserat, post tres dies daturum se hominem à iocinoris phlegmone liberatum, tum magis quā prius calente oleo uiscus plurimum perfudit, tum cataplasmate frequentius est usus, hac diligentia felicius sibi curationem cessuram sperans, responditq; percontantibus de Theagene gloriabundus meliora. Cæterum contigit prout ipse prædixeram, subito hominem mori. Et quod omnium maxime dignum risu fuit, ducebat Attalus secum ex ijs qui de hominis statu rogassent quosdam, quibus ostenderet adeo recte eum se habere, ut iam esset laundus, latusq; cum multis ingressus est domum in qua iacebat, cum Theagenem mortuum quidam

ex amicis, qui & Cynici quidem erant, & alioqui philosophi, laiare ex more pararet. Itaque etiam usque ad mortuum accedere, idque una cum spectatorum coetu Attalo contigit, utpote cum nemo intus lugeret. Nam Theageni nec seruus erat, nec puer, nec mulier; sed cum eo soli amici philosophantes uersabantur, qui iusta quidem mortuorum, citra tamen omnem luctum obibant. Atque haec laudem Thessalius asinus inter multos spectatores est consecutus, offendens explicatum a phlegmone hominem intra quatuor (ut pollicitus est) dies. Reliqui uero methodici cum innumeris quotidie iugulent, adeo rationem curandi mutare adhuc nolunt, ut quae a medicis sunt scripta, qui artis operibus uere insudarunt, ne uel semel experiri uelint; adeo indelebile uitium uehemens ignominia est, praesertim si cum superbia sit coniuncta. Eiusmodi igitur in omnibus sunt Thessali sectatores.

15 Nobis autem uitandi eiusmodi errores sunt. At si nihil aliud suppetat, saltem ipsi experientiae credendum. Id quod ipse perpetuo suadere non desino ijs qui circa rationem parum sunt exercitati. Nam melius profecto ijs est, quando & rudes sunt, & simul in rationabili methodo, quam nos non prodimus, minime exercitati, ut nihil penitus ex ratione cinando accipiant. Quippe iocinoris substantia, scirrhosis maxime oportuna est: utpote quae natura liter lutosum quippiam continet, ueluti medicus quidam nostri temporis per iocum dixit. Lienis uero rarior substantia, quam iocinoris est; ceterum crebrius scirrhosis uitij affligitur, propter nutrimenti quo utitur speciem. Monstratum namque est quod crasso nutritur sanguine, qui ueluti limus purioris est, facillimeque nigra bilis efficitur, ideoque etiam ipsam melancholicum siue atrum appellamus excrementum, atque haec duo uiscera scirrhosis tumoribus tentari, uel experientia ipsa clare indicat. Re uero, quod conditi sunt, tactum effugiunt. Ceterum hos quoque facile scirrhosis deprehendi ratio docet. atque idcirco nephritidas alias omnino solui non posse, alias aegre solubiles esse: cum renes ambo habeant quae in uiscerum utroque predicta sunt inesse, tum substantiae qualitatem, tum excrementorum quae per ea dilabuntur uitium. Quo fit, ut qui crassi succi cibis uescantur, calculi uitio uexentur. Ergo quanto trium horum uiscerum scirrhosis affectus difficilius curatur, tanto magis esse solictos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborantibus, ijs cibis utuntur, qui crassos lentosque succos efficiant. Quinetiam eiusmodi affectuum medicamina inter omnes conuenit, ea esse quae dissecant, & dissoluant, & frangant. Quae utique ex eorum sunt genere, quae obstructions erunt & detergant; ceterum uiribus ualentiora. Horum non solum materiam, sed etiam facultatem in opere. De simplicibus medicamentis exposuimus. Itaque etiam breuior nunc ero, contentus generali facultate, & sola methodo, cum paucis exemplis. Nam cum et facultatum materiam iam habeas praeparatam, & quae curationem una coincident sint praedicta, ni-

hil nunc aliud superest, nisi ut proprias cuiusque morbi indicationes commemorem. Coincidentia igitur uoco uirtutem, naturam, aetatem, anni tempus, regionem & consuetudinem, & si quae sunt id genus alia. Proinde de ea quae a particulis sumitur indicatione, deinceps dicam, initio a iocinore sumpto. Quippe ubi id phlegmone laborat, quae extrinsecus applicatur, ea misistae esse facultatis debere postulat; idque non in generatione phlegmones modo (est enim id omnium phlegmonarum commune, quando etiam si quis repellentibus tantum illo tempore utatur, non peccat) sed etiam cum nec affluat, amplius quicquam, nec repelli quod in laborante particula continetur, possit. Accidit enim hoc quoque multis de causis. Sane in principio tum parum est quod affluit, tum magna ex parte non ita crassum, tum partis ipsae quae recipit uirtus nonumquam ualentior, utpote nondum lassata; tum quod in afflicta continetur parte, nondum uiolenter impactum. At cum phlegmone in uigore suo iam consistit, tum multus in ea sanguis continetur, isque crassior subinde, ac uehementer impactus; tum uirtus partis iam est debilior, quam alioqui ualentem requiramus, quo scilicet a se superuacua amoliat, quandoquidem uis uisum potens est adstringenti praefidiorum uis, quae sola totum efficiat. Quippe post haec cogendis ac confringendis, & ueluti densandis, & exprimendis corporibus quae tenuiora consistentia sunt, ad circumpositas partes expellere. Ceterum nisi etiam laborantis particulae uirtus aliquid auxilietur, nihil adeo magni efficiat: tum igitur quae a phlegmone sumitur, una duntaxat agendorum est indicatio. Haec graece *διαφύσσις* uocant, latine digestionem, euaporationem uel dixeris. Haec humorem qui in phlegmone obessa parte continetur, per meatus insensibiles educit. Quae uero ab ipsa sumitur parte, ea in diuersam nos partem trahit, scilicet robur eius seruari iubens. Coeuntibus igitur una contrariis indicationibus, compositum quoque esse medicamentum oportet. At semper si phlegmone laboreat, aut tibia, aut cubitus aut brachium, aut qui in his sunt adenes, causa non est cur horum robori consulas. Haec tibi communis indicatio sit in omnibus ijs partibus, quarum munus eiusmodi est, ut toti corpori sit ex usu.

16 Ergo nec lienem penitus relaxantibus curare oportet, cum hic quoque ex iocinore quicquid limosum & melancholicum est expurget, propterea scilicet, quod ex eo humore nutritur. Idcirco quoties obstructio quae in eum incidit, aut phlegmone, potissimum tum scirrhosa sit, tum ea quae obstructions eximant, tum quae dissecant, uehementiora exigat. Nam quale medicamentum iocinori est absinthium, tale est lienis capparis cortex. Quale rursum iocinori quod uocant eupatorium, tale est lienis scolopendrium. Si quidem similia genere medicamenta, ambo uiscera postulant. Ceterum tantum ualentiora lienis, quanto crassiore utitur alimentum. Scirrho igitur laborantibus ipsis conuenientia nutrimenta sunt genere quidem eadem, sed maioris minorisque rationis differentia. Itaque & si cappa-

nis ex oxymelite edatur, utilis sanè est utriq; visceri, ceterum nec ipsa pari modo nec similiter misculum habens oxymeli. Nā & ipsa copiosior, & ex minus diluto oxymelite lieni erit utilis. Atq; hæc differētia est quæ ex maioris minorisq; ratione accepta est. At similitum genere, uel specie, aut quomodocumq; dixisse libet, prædidicimus, ex actione & forma indicatio sumpta est. A societate uero cū vicinis partibus, quod idem cum situ est, illa capiuntur, quod gibba iocinoris per renes expurgari oporteat, caua uero per inferiorē uentrem. In lienē uero alteram duntaxat esse superflui uacuationem: cum quæ per renes agatur, nulla huius visceri uacuando uia pateat. Proinde ubi phlegmone premitur, deiectionis id medicamentis tum detergemus, tum lacesimus: quod dimittat deponatq; superuacua. Sanè duplex ratio est eiusmodi medicamentorum usus: cum partes superius posite laborant, per ea quæ eduntur ac bibuntur: cum inferiores, per id quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem quæ eduntur ac bibuntur, eorū uis antequam ad inferiores partes perueniat, resoluitur. Quæ infusa sunt, ea omnino ad ieiunium usq; ascendere nō possunt, imò etiam si admodū nitaris, fortasse tenue tantum intestinum cōtingant. Ergo illud quoq; ex partium positura didicimus, nempe inferioribus intestinis aliquid esse per clysterem infundendū: superioribus uero, atq; etiā ipsi uentriculo, lieni, & stomacho, superne aliquid exhibendum. Voco hoc loco stomachum, gulam, quā proprie Græci stomachum appellant. Nonnunquam enim ita etiam uocant os uentriculū, ueluti cū stomachice anima linqui aliquos dicunt. Verū in gula, quæ proprie uocatur stomachus, cataplasmata super spinā dorsi imponimus, nō parte anteriore, quemadmodū cum os uentriculū phlegmone urgetur. Siquidē spina gula superiacet, per collū & pectus deorsum usq; ad uentriculum porrecta.

17 Neq; igitur hæc nouere qui Thessalū imitantur, ideoq; omnes una ratione curant. Neq; uti que illud, quod omne membrum phlegmone laboras nisi cum sibi circumdatam habeat spissam, tenuis sanie foras aliquid dimittit, ac laxat. Eo fit, ut ex ijs quæ in ore, & naso, & faucibus, & stomacho, & intestinis, & uentriculo, & uisceribus omnibus sunt, aliquid foras effluat. Ad eundem modum etiā ex interna facie pectoris, cum phlegmone premitur, excernitur aliqua sanies. Quæ admodum igitur lien ipse, & iocinoris caua per intestina, gibba uero iocinoris & renes per urinas purgatur: ita pectus ubi interna eius phlegmone tentantur, per membranā qua tegitur (ὡς περικλυμένη uocant) aliquid in mediū sui pulmonumq; spatium transmittit. Id autem expurgari per eandem quam pulmo uiam debet. Dabimus igitur ijs qui sic laborant, medicamenta quibus tenuioria sit uis, quibus & uis aperiant, & quæ deferenda per eas sunt dissecantur [ac dissipentur] præsertim cum uel crassæ substantiæ sunt, uel glutinosæ, qualia in ijs sunt quos empyos uocāt: deligenda tamen ex ijs sunt, quādiu adhuc phlegmone inualescit, quæ

A mediocria sunt. Cum uero planè iam decreuit, aut penitus cessauit, & educi excrementa postulant quæ ualentiora sunt. Ergo mediocri in hoc genere est tum ptisanæ cremor, tum mulsæ. Valentiū autem & urticæ semen, & mulsæ in quam coniectum fuit paululum aliquid actium herbarū, quales sunt origanum, & hyssopum, & calaminthe, & pulegium, & syllyricæ ireos radix. Quod si uel plus horum admisceas, uel irin in mollissimum puluerem tunsam cribratamq; in mulsam immittas, maxime incidens medicamen habebis. Ad eundem modum & quod ex marrubio cōficitur oxymeli, aliaq; eiusmodi ualenter crassiora excrementa quæ in pectore et pulmone continentur, incidere possunt, omniumq; eorum copiam inuenies in operibus ijs quæ De medicamentis edidimus.

18 Non solum aut iam dictam remedium differentia ex laborante loco didicimus, sed etiam illud, quod quæ in summo corporis phlegmone laborant, ea proprijs phlegmones remedijs curentur, quæ in alto sunt corpore, si cum his aliquid acrium medicamentorum sit immixtum. Resoluitur enim eorū uires, dum alte descendunt. Hac ratione & cucurbitula (strenuū planè auxilium) est inuenta: tum ut foras euocentur, quæ sunt in alto: tum ut eximantur atq; eruantur, quæ iam in scirrhum abeunt. Verum utendum cucurbita in ipsa parte quæ phlegmone urgetur, inter initia nō est, imò postea q̄ totū corpus uacuaueris. Ac necessarium est eorum quæ in inflāmata parte continentur, aliquid educas atq; eruas, aut etiā foras uersus attrahas. Generādis aut adhuc uitij, minime ipsis membris quæ laborare incipiunt, sed ijs quæ continuata his sunt, cucurbita imponi debet, auelendi in contrarium causa. Sic namq; ad mamillas cucurbitas imponimus, cum sanguis ex utero profluit, defixio maxime in ipsis cōmuni bus pectoris et uteri uasis, eius ore. Sic si ex naribus sanguis profunditur, præcordijs maximas cucurbitas affigimus. Sic & omne aliud sanguinis profluium, ad cōtrarium per cōmunes uenas auertimus. Quem admodum rursum & sanguinem (si ita est opus) attrahimus. Siquidem cum menses euocare in animo est, in pube & inguine cucurbitā figimus. Prætereā cucurbita in occipite defixa, efficax est remedium, ad oculorū fluxiōes. Vacuari tamē prius totū corpus expedit. Nā si plethoricū refertū sanguine & humorib; æqualiter corpus sit, in quacūq; parte capitis cucurbitā defixeris, totū ipsum implebis.

19 Ergo hæc omnis phlegmones cōmunis indicatio, haud quāq; similiter in qualibet parte administratur. Accedit ad omnia quæ prædicta sunt, pro non leui portione, ipsius exhibēdi medicamentī natura. Neq; enim absolute si adstringere incipientem phlegmonē est opus, quidlibet adstringēs in ijs quæ deuorāda sunt, adhibebimus: sed ea quibus nulla corruptrix admista uis est. Nam chalcanthus inter præcipua adstringit, sicut etiā misy, & sori, & chalcitis, & diphryges, & as uisū, & squama eius & flos: uerū hæc medicamenta noxia deuorata sunt, quocirca stomaticis ea miscere tutum

non est. defuit namq; interdum ex his aliquid ad uentriculum, sed nec aloen probe miscueris ijs medicamentis quæ phlegmones alicuius causa quæ intus confisterit, deuoranda sunt, quâdo huic quocunque admista purgandi uis quædam est. Cæterum ubi phlegmone prorsus inclinauerit, si quis paululum aloes admisceat deijciendi uentris causa, qui prorsus nõ deiecerit, nihil lædet. Verum satius est mercuriali, aut urtica, aut cnico, aut talis alioquo, aluum sic laborantium subducere. In summa uero, si quis eam quæ à partibus ipsis præstatur indicationem adimat, nihil obstat quo minus medicinam non ex mensibus, sed sex diebus totam perdisceas. At uero nec si quæ à partibus sumitur indicationem adijcias, iam totum quod exigitur ad curationem, habeas: nisi etiam methodos de medicamentis didiceris. itaque eas aggrediatur oportet quisquis consummate sanaturus est morbos. Nos enim si alicuius medicamenti meminimus, id (ut sæpe testati sumus) exempli causa fecimus.

20 Sed adijciamus adhuc ea quæ de indicatione quæ à partibus sumitur, nondum attigimus. Theffaliorum istorum sectam euidentissime præcipitantes, qui cum nec dissectionis rationem attigerint, nec partium actiones, usus uero norint, tam cum floccos carpentem quenquam cernunt, & festucas legentem, audent oxyrhodinum caput madefacere, nostro exemplo. Nam cur, quæso, non thoracem potius? Siquidem ex indicatione remedia inueniunt. Sanè fieri potest, ut etiam corde affecto, phreniticus quis efficiatur. Empiricus namque ab experientia se ait eiusmodi medicamento rum nactum inuentionem. Qui autem & hanc utuperat, & inquisitionem de actionibus refugit: huic unde, quæso, succurrit, ut pro thorace caput in phreniticis madefacere eligat? Cæterum, hoc ipsum oxyrhodinum quod capiti phreniticorum applicamus, ceu quidam ex amicis dicere solebat, non solum amethodos istos Theffali sectatores, sed etiam reliquos manifeste redarguit uniuersos quicunque principem animi partem in corde statuerunt. Nam cum aliquando uidissem quendam ex Athenæi discipulis caput aceto & oleo mistis perfundentem, prohibui, iussiq; pectori admo uere id remedium: quippe læsam in delirio esse partem principem. Eam autem esse autorem Athenæo in corde. itaq; non recte reliquo pectore, caput eum integrum præsertim membrum uexare, eiq; negocium facessere, nunc oxyrhodinum infundendo, nunc radendo, tum spondilium, aut serpillum, aut id genus aliquid admo uendo: imò uero si malum traheret, etiam castoreum, aut certe etiam cucurbitam. Quippe id esse per simile ac si cui in femore phlegmone sit, calcaneo remedium applicet. Quinetiam in lethargicis, nemo est qui non capiti applicet auxilia. nam & id uitium contrarium quodam modo secundum speciem phrenitidis est. Gignitur autem in capite, in quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo cum humor qui in capite redundat, frigidus est, insensibilitas immobilitasq; hominem opprimunt, cum uero calidus est, perpetuus po-

tius motus, una cum rationis noxa. Accidit enim ueluti demonstratum in libris de his est, ex frigore segnitia, ex calore immodicus motus, ex humoris uero uitio dementia. Itaq; incidenda in talibus affectibus uena est statim ab initio, si modo tam ualens uirtus sit, ut line noxa missionem sanguinis toleret, ac nihil prohibeat eorum quæ de secunda uena retulimus, sicuti uti crudi humoris copia, uel puerilis ætas, uel anni tempus, uel regio in qua sit extremus calor, aut frigus. Atque hoc quidem commune utriq; uitio, & ei quod cum sopore, & ei quod cum uigilijs incidit. Commune præterea utriusq; est, ut oxyrhodinum in principio admo ueas. Nam repellendus à capite humor est, quisquis is fuerit. Quæ sequuntur contraria sunt. Nam quæ cum uigilijs cõiuncta sunt, ea lenire expedit: quæ cum immobilitate, excitare. Iure ergo cum in summo incremento sunt, ijs uitij quæ per uigilio & delirio infestant, perfusiones ex papauerum capitibus applicabimus, odorem quoq; naribus obijciemus: ac narium alas intus, uel frontem ex similibus medicamentis illinemus. Quippe sopore ac stupefacere principem facultatem oportet: cerebrum scilicet, quod supra modum incaluit, refrigerando. In contrarijs autem uitij excitare: ac noxij humoris qui citra putredinem, & citra febrem altos sopores inuehit, crassitudinem incidere, atq; excalcacere. Tales nimirum altos sopores *ἄπνοια, ζῆλος, & κῆρος, & κατὰ χεῖρας* grece uocant. Quod si ali quando humor putrescat, utiq; cum febris incidit ea genera uocaturq; morbus græce *ἁλῆα γῆ*. Incoquentes igitur in aceto thymum, & pulegium, & organum, aliaq; id genus, naribus sic affectionem admo uebimus, quo uapor ad cerebrum sublaris crassitudinem humoris dissecet. Mox etiam palatum ualentibus & acris medicamentis ungemus. Ab his uero etiam sternutamentis utemur, tum capiti similes præsidiorum facultates impone mus, aduacta semper eorum etiam ad ipsum usq; sinapi uehementia, si uitium diutrahatur. Quinetiam cucurbitis ad utrunq; uitium, si diuturnum sit, utemur: itemq; castoreo, quippe quod ipsum probe concoquit, si debito tempore sit assumptum. Quæ hic ad cõmunem rursus curationem redeunt lethargus & phrenitis. Ergo in eiusmodi affectibus manifeste redarguuntur & qui Theffalum sequuntur omnes, & quisquis medicus principem animi facultatem statuit in corde. Non solum enim iam dictorum præsidiorum destituentur copia, sed etiam cui ea parti accomodabunt, non intelligent. Neq; enim tanquam in ophthalmia, uel pleuritide, uel angina, tum ab ipso ægro affectus locus sentitur, tum nobis partim tactu, partim uisu innotescit: sic in lethargo, & phrenitide, & epilepsia, & delirio, & conuulsionibus, & tetanis, præterea eo quod proprie uocatur catoche, se habet. In quibus omnibus præsidiorum formula ex affectus inuenitur natura: locus uero cui maxime sint applicanda, ex præfocendis tum actionibus, tum partium usibus. Illud autem quamuis in sermone aliquando omittatur, sæpenumero prius dictum est, meminisse

minisse oportere nos eorum quæ simul indicent.

21 Caterum in præsentî eam quæ à partibus sumpta est indicationem, proposuit est persequi: ueluti statim in ijs quæ ad caput pertinet, etsi non aliud, saltem illud nosse cuius est promptum, obiectam nobis ante cerebrum esse crassam membranam, quæ corijs istis externis sit assimilis: post hanc etiam cranium. Itaque resoluti in densis obiectibus & duris, præsidiorum quæ imponuntur uim esse, necesse, ac nisi futuras in capitis ossæ naturæ ipsa fuisset molita, nihil adeo æstimandum efficeret pharmacum ullum extrinsecus impositū. Sed quoniam etiam futura, & in his præcipue coronaria, non solum impositi medicamenti qualitates, sed etiam substantiam, si tenuis est, facile intro transmittit: merito multa circa cerebrum uitia ab extrinsecus applicatorum remediōrum facultate iuuantur. Ipse enim in meipso expertus memini, cum infunderetur rosaceum frigidum, citissime clarissimeq; sensisse me in syncipitis loco eius intro penetrationem. Quinetiam plurima diuersitas futura huius in hominibus, si inter se conferatur, etiam ante dissectionem manifeste apparet. Vidimus enim in ijs quibus rasum caput fuerat, inter mandandum, commissionis ossium in coronali futura manifestum motum: sic ut facile apparet hominibus illis laxam esse eiusmodi ossium capitis compositionem. Merito igitur ad hanc maxime partem applicant omnes medici capiti infusiones: uidelicet accepta quasi per manus à primis inuentoribus ratione, ad id opus ueniente. Sed & ipsi quicunq; non negligēt ijs quæ fieri assolent, attendunt, cernētes & quemadmodum futura ea liquido moueri appareat, & quemadmodum celerime homines hac parte, siue ab externo admotu quoapiam refrigeretur, siue exalciat, id sentiāt. Nam præter reliqua etiam tenuissimum est hoc loco cranium, & rarissimum. Ergo quoties medicamenti cuiusquam uim uehementē descendere uoles, hoc maxime loco impones. Cōmodius etiam fuerit, si & cum infractione id facias, aut tonsis capillis, aut etiam planè abrasis. Quod si humidum sit quod applicandum est: si id ex alto effundas, ac ueluti fontis ritu illidas, quippe penitus intro ab ictu magis cōpellitur. Sicut autem hic uehementior humoris casus conducit, ita in oculis est contrarius. In capite namq; os est quod feritur: in oculis membranosa quædam imbecillaq; corpora. Et in capite quidem aliud est quod ictum excipit, aliud quod curatur: quodq; ut ictum non sentit, ita facultate quæ ex incussu ad ipsum peruenit fruittur. At in oculo non est quod feritur, diuersum ab eo quod curatur: sed idem ipsum quod est curandum, ualētè icitur. Ad hæc os capitis sensu caret: oculus acerrimi est sensus. Ergo infundere huic medicamenta oportet, primum superiorem genam blandissime attollentes, mox minime quemadmodum in capite incutientes. Inueniendi præterea humores mitissime minimeq; mordentis naturæ, qui cum medicamentis sint infundendi. Ac mi-

A hi quidem magna cum consideratione uidentur ueteres ad oui deuenisse humorem, electo scilicet ex eo quod & mordens minime esset, & glutinosum. Nam ex eo q; minime mordet, modo dictam indicationem ijs compleuit. Ex lentore autem, ad indolentiam non nihil confertur. Quippe lenire eiusmodi humores possunt asperitates oēs quas-cunq; acris fluxio excitat: accedit q; crassius medicritè ac lentus humor constantius, q; tenuis & aquosus, in loco permanet. Sanè q; lentū id quod absq; morsu sit, cum modice incaleat, dolore maxime leniat, id profecto ex mordentibus in alio deiectionibus didicisti, in quibus iniectū seum ilico morsum mitigat. Quod autē permanere quoque in laborante particula eiusmodi humidū expedit, manifestum est. Siquidem in ijs quæ in uentre accidunt, per clysterem assidue infundere molestū est. In ijs quæ in oculis, genam attollere. At uero exquisitus membri sensus læue esse quod iniiciendū, nihilq; debere in se asperum sabulosum ue habere, omnino indicat. Hinc igitur excogitatum comode est, tum humido oui utēdum, tum quæ terrea corpora ophthalmicis, id est ocularijs medicamentis miscenda sunt, ea esse cum summa diligentia ad unguem leuiganda.

22 Quoties tamen dolores his accidunt uehementes: repetitis ijs quæ de omnium dolorum generatione accepisti, disquires quonā ex his affectu dolere oculos in phlegmone, de qua nunc sermo proponitur, contingat. Nam aut ex uehementiacris confluentis humoris morsu, aut quod eorum tunica plenitudine distēduntur, aut propter crassiorum humorum flatuosi uel spiritus extensionem, uehementes in his excitantur dolores. At morsum quidem tum purgantibus medicamentis, scilicet & deorsum reuellendū & uacuando curare conuenit: tum ipsi particulæ oui humore infuso, quod per eum acris fluxio sine offensa eluatur. Vbi autem concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus uacuum, tum utiq; lauaciones in balneo his sunt aptissimæ. Nam & dolorem statim sedant, & fluxiones quæ ad oculos feruntur, sistunt: maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliquo uero con-temperato. At uero distensionem quæ ex repletione non provenit partis, misione sanguinis, & alui diiectione, & infernarum partium frictione, curare conueniet: q; si necessitas aliquando urgeat, ligandis artibus: mox fomentis ipsi laboranti particulæ ex aqua dulci modice calida adhibitis. At humorum uel flatuosi spiritus extēdiones curabimus, uacuato prius in his quoq; toto corpore, sed & humorū momento deorsum auerso. Mox localibus remedijs (Græci τριὰς uocant) utendum: non tamē medicamentis ijs quæ repercutiant acrepri- mant, imò ijs quæ euocent ac discutiant. Fouendi igitur sunt sicut modo diximus, ac foenigraci decoctum ijs infundendū, sed lauato prius curiose foenograco, ne quid illi, uel pulueris, uel sabuli adharens clam lateat. Est namq; medicamen hoc ma-

xime omnium quæ oculis applicantur, sine offensa digerēs. Meminisse uero in omnibus quæ membratim docentur, communium præceptorum oportet. Quorum unum id est, dirigentia medicamenta, ubi redundantia in toto corpore subest, si particulis quibusdam applicetur, implere potius quam uacuare. Ergo tum reliquos morbos, tum uero phlegmonas (de quibus agimus) sicubi curas, nullo euaporante auxilio prius fidenter uteris, quam totum corpus purgaueris. Illud quoque attendas in omni uitio, nedum phlegmone, oportet, aliquando totum corpus mediocri habitu esse in humorum, tum qualitate tum modo; unam autem aliquam, aut duas earum, quæ supraposita sunt partium, redundantiam suam ad agram transmittere: ueluti non raro, sed planè sæpenumero accidere in oculis uidere licet, capite his fluxionem mittente. Manifestum igitur arbitror in ijs quoque esse, ipsum prius caput sanandum esse, explorato eius affectu, quem superfluum generatio comitatur. Et diuinas quidem oculorum fluxiones curamus oculis ipsis dimissis, atque ad capitis curationem conuersi: cuius uitium si ex genere intemperantiarum sit, curationem ex sibi contrarijs, sicut prius monstratum est, adhibendam in dicat. Plurimum igitur, uel frigida intemperies caput uitiat, uel humida, nec dubium est quin etiam ambæ congregiantur. Rariores sunt quæ propter calorem acrem oculis fluxionem immittunt: in quibus haud expedit ijs quæ ex thapsia & sinapi fiunt medicamentis uti; imò contrarijs omnino, oleo crudo, & Hispano, & rosaceo, tum frequent ex aqua dulci in balneo lauatione. Atque aliquando cerebrum ipsum fluxionem transmittit, debetque huius intemperies totius capitis epithematis corrigi. Aliquando uasorum ipsorum uitium est: cum uenæ, uel arteriæ imbecilliores sunt: sic ut aliorum uasorum superuacua recipit. Quo casu aliqua earum parte excisa, aut etiam totis bene alte præcisis, dura cicatrice quod interest intercipimus. Quæ disiectæ incisæ uasis partes, continuæ præterea non sunt, nec ex altera in alteram confluere aliquid possit. Cæterum cum eorum uasorum quæ in profundo sunt recondita, ac è superio read oculos unà cum neruis perueniunt, uitium est, nihil horum agi licet. Proinde ægre curabiles omnes eiusmodi fluxiones sunt. Quæ uero extrinsecus posita uasa sunt, ea uel sine chirurgiâ robore licet: illitis medicamentis, quæ robur inferant. Græci *τονωτικὰ* uocant. Est & quando calidus sanguis, ac uaporum plenus, ad caput ascendit, ac maxime in arterijs redundat. Cui uitio excogitatum saluberrimum remedium medicis est, ut ipsa incidatur arteria. Oportet autem deorsum capite curiosè tangere, tum quæ retrò, tum quæ secundum utranque aurem sunt arterias: præterea quæ in fronte, & quæ in temporibus sunt. Quorum quæ calidiores alijs apparebunt, ac maiorem exhibentes pulsus, hæc sunt incidendæ. Quæcunque uero & paruæ & prope cutem resident, ha-

rum uel si partem aliquam excideris, ueluti facere in crurum uaricibus solemus, aptius erit. Notroque tempore quidam ex ocularijs medicis non minimus, ex arterijs quæ in temporum summis musculis resident, non exiguam excidit partem. Ac ferè quidem cum excisa est arteria, reliquæ eius partes ad sibi cõtinuas retrahuntur. Euenitque id magis in ijs arterijs quæ tum minores sunt, tum minorem exhibent pulsus. Quod si inter nudandum appareat tibi uas magnum, aut magnum exhibere pulsus, tutius fuerit uinculo id prius excipere: mox quod in medio est præcidere. Sumto autem eiusmodi uincula ex materia aliqua minime putrescibili. Talis autem Romæ est ea quæ Galetanorum dicitur, ipsa ex Gallijs aduecta: uenita uero maxime in Sacra uia, quæ à pacis templo descendit ad fora. Ac horum quidem Romæ facilis est copia. Vilissimè enim uenduntur. At si in alia urbe artem exerceas, comparetur solum ali-quod ex ijs quæ serica nuncupantur. Habent enim ea diuites mulieres in multis sub ditione Romanorum locis: potissimum in magnis urbibus, in quibus multæ sunt mulieres id genus. Sin huius facultas non est, ex ijs quæ inueniuntur in regione quam incolis, deligito materiam quæ minime sit putrescibilis: cuiusmodi est græciū chor-darum. Nam quæ facile putrescunt, ea cito à uasis decidunt. Nos uero postquam undique sunt carne impleta, decidere uincula uolumus. Quæ nanque caro in abscessis uasorum partibus coalescit, ea pro operculo est, ac osculum eorum cludit. Postea uero quàm id factum cernitur, decidere iam uincula secure possunt. At uero cum uenarum partem aliquam excideris, non est opus eas tam imputrescibili materia deliges, sed suffecerit alia quæpiam. Siquidem in arterijs perpetuus motus insecti uasis ora resouit. In uenis autem posteaquam semel sunt utuncque clausæ, siue per deligaturam cõstrictæ, siue per medicamentum adstrictæ, permittunt circumpositam carnem circa coalescere: potissimum si qui curatur, immotam partem seruet, magisque etiam si toto corpore uacuato ipsam attollat. Quippe etiam uarices ita curamus. Vocatur autem uarix uena dilatata: porò dilatatur in testiculis & cruribus omnino. Sed quoniam cum hos adhuc scriberem cõmentarios, non pauci amicorum rogarunt, ut in fine totius operis omnia quæ ad chirurgiam pertinent, deinceps morem, idcirco tractatio de uaricibus nunc differatur. Cum uero non pauci speciatim sint oculorum morbi, qui magis specialem curationem desiderent, ne de his quidem hoc loco pluribus est agendum. Nam qui curiosè quæ prædicta sunt, legerit, & naturali prudentia fuerit, huic omnia inuenire, eorum rationem sequenti, nullonegocio licebit. Qui autem tales non sunt, ijs satius fuerit omnium uitiorum, quæ oculis incidunt, curandi rationem priuatim scribere: maxime cum amicorum non pauci ita possulent.

Cap. 1. Rationem reddit discuffa phlegmone prius quam tumorū aliorum: deinde de eryſipelate, quod generatur a bile feruenti & tenui ſanguine, uel a ſanguine & bile calidioribus. 2. Quo pacto differant inter ſe phlegmone & eryſipelas. 3. Eryſipelatis curationem ſuſuliſſime monſtrat. Quæ ſit cum corpore primum a bile macuato, repellētia mox, deinde per halitum digerētia adhibemus. 4. De œdemate eiusq; cura. Ad calcem capitis numerat quædam medicamina articulis morbis conuenientiſſima. 5. De ſcirrhis curandis per mollitiā, quibus incidentium aliquid admiſceatur, cum ſcirrhus in tendonibus aut ligamētis eſt. Hinc tranſit ad ſanādos carnoſos mūſculos & lienem ſcirrho obſeſſos, omnesq; alias particulas ſcirrhoſis uicijs affectas. 6. Anacephalaſis prædictorum, & tranſitio ad flatuolos tumores. 7. Partes designat quæ flatuoliſſis ſpiritibus poſſint eſſe obnoxie: & indicationes curatorias adiungit. Colli inflati medicamen, De facultatibus lixiſſi, uini maxime rubri, & aceti. 8. Exemplo probat cōmune præceptum, quo in omnibus morbis, quos uitioſus ſuccus creat, conſulit in fine calcſcentibus & ſiccantibus eſſe utendum. Quia hæc quod reliquum humoris eſt proſus abſumunt: ab initio uero refrigerātia admo-
uemus ut plurimum. 9. Humores qui in cauſa ſunt a coloribus tumorum cōtemplandum eſſe. De cancri curatione. De adſtringentium relaxantiumq; medicaminum adminiſtratione. 10. De anthraxide iſt carbūculo. 11. De ſtrumarum cura, ſeu chœradem. 12. De pituitoliſ illis tumorib; quos recētioreſ nodos uocāt, in quibus diuerſæ materiæ cōtinētur: unde etiam denominantur, ut ſteatoma, meliceris, atheroma. 13. De diuerſis alijs tumoribus, ut uerrucis, mola, hernia, thymoma, &c. Quæ in hac conſideratione chirurgi opem poſtulant, ad calcem libri ſeruaturum ſe promittit. Morbi omnes qui toto genere uel tota ſubſtantia a natura recedunt, ſui ablationē indicant. Si uero locus affectus una aliqua naturalium partium eſt, prima indicatio eſt, ut affectus ſanctur: ſecunda, ſi inſanabilis iſt ſit, ut cum utroq; pars quoq; excidat, ut in cancro. 14. Explicat uo-

cabula quædam, ſecundum naturam, utilis, cōueniēs, ſecundum naturam habere uel agere. 15. Corpus ſupra modum craſſum ac obefum quomodo eliquāduſ ſit, & expurgandum: nempe exercitijs ualidis, uictu ex tenuante, medicamentis extenuantibus, animi curis, balneis aquarum quæ diſſipandi uirtutem habeant, de nūq; arte & inſtutia inducta febris. 16. Macie conſecti & admodum graciles, reſciēdi ſunt uino craſſo, cibisq; craſſioriſ ſucci, exercitationibus lentis, friſtione medio cri, picatione, in ſumma, omnibus quæ in præcedente capite enumeratis ex diametro pugnant. 17. De his quæ finitiuæ generatiſ colligendiſ tumorum generibus quæſi ſpecies ſunt: ut herpete, ophiāſi & alopecia, ptiloſi, carie oſſis, uutiligine, ſcabie, lumbricis, nome, Chironiſ & Telephiſ ulceribus. 18. Generatiſ docet curationem amiſſorum pilorum, ut in caluitie, alopetia, ptiloſi: & unde uacuandi ratio ſit ſumenda.

19. De tumoribus & uitijs quibuſdam oculorum: quæ parua quidem & mollia detergentibus curanda ſint, alia uero per uehementius exicantia, ſi tamen ea quæ in oculis ſunt collirijs digeſta fuerint: alia deniq; magna & dura chirurgiam poſtulare.

Aliter.

De eryſipelate & œdemate, & ſcirrho. De tumoribus præter naturam inuicem complicatis. Dein ſtationibus, inter quas & priapiſmus adnumeratur.

De liquidis tumoribus. De cancro. De carbunculo. De ſtrumis. De abſceſſibus. Methodus curationis tumorum præter naturam, inter quos & ſteatoma habetur, & atheromata, & melicerides, & myrmecia, & acrochordones. De nimium obefis corporibus, & immodice extenuatis. De his quæ toto genere ſunt præter naturam, ſicuti lapis eſt, & hypochoy-
ma, & mola: partus in mulieribus, & huiuſcemodi.

De affectibus qui in numero & magnitudine & figura inſtrumentarijs partibus accidunt. De herpete & ei proximis affectibus. Quemadmodum aſcarides & helminthes curentur.

GALENI METHODI MEDENDI ID

EST DE MORBIS CVRANDIS,

Liber decimusquartus.



De tumoribus qui præter naturam in corpore cōſiſtūt, quot numero, qualesq; ſint, proditum a nobis ſingulari uolumine ſeorſum prius eſt. Quemadmodum autē hi methodo curandi ſint (quod utiq; docere propria propoſiti operis

profefſio eſt) in horum cōmentariorum tertio de cimo præcipere coepimus. Et quoniam in ſuperioribus de omni februm ratione ſermo erat habitus, aptius mihi uiſum eſt de phlegmone primū diſſerere, ut quæ & frequentiffime incideret, & febris ſubinde accenderet. Ac dictū quidē nonnihil fuerat in ſuperiorum curatiōe inter cæteras earū cauſas, etiā de phlegmone. Verū abſolutus ſermo, & qui proprie illi debebatur, in libro qui hūc præcedit, eſt traditus, in quo methodū curandæ eius, qualis nam eſſe cōueniat, tradidimus, nequaquā tamen auxiliorum materiā, niſi tantū exēpli gratia, ſicut

Galen.

in ſuperioribus fecimus. Haud longe uero a phlegmone abeſt & alius morbus, quē Græci *ερυσίπελας* uocant. Iſ, uti mōſtratum eſt, ex biliſo ſucco naſcitur. Sed præſtiterit fortaffe eum pluribus uerbis a phlegmone diſtinguere. Ergo cōmunia amborum ſunt, tum tumor qui præter naturā ſit, tum uero calor. Diſſident inter ſe primum & maxime colore: quando ſi iſt ruber ſit phlegmonen uitium appellant ſin pallidus flauuſ uel ex pallido flauoq; colore miſtus, eryſipelas. Propterea pulſatio magna phlegmōſe propriū eſt ſymptoma, quippe quæ alte magis in corpus demittitur. Eryſipelas uero in cute potius cōſiſtit, quā alte deſcendit. Tenuis namq; ſubſtantia eſt pallidæ bilis humor. Itaq; facile ad ipſam cutim trāſiſſus, carnoſis rariſq; corporibus tranſmiſſis. Cutis uero denſitas non æque hūic bili peruiā, niſi ſi admodū tenuis aquoſa ſit. Talis namq; maxime eſt etiam quæ quotidie cum ſudore exit. Licetq; multorum qui in balneis ſudorem ſibi ſtrigilibus detergent,

tom. 6

p hunc

hunc eius uidere coloris cuius lotiū est, ijs qui diutius cibo abstinerunt. Neque enim ignoras eorum, qui inediā diu tolerant, pallidius ex aquoso lotiū reddi, mox uero etiā flauum, nisi quis prius humectante nutrimento potioneq; squalorem corporis irroret. Ac corpore quidem pro naturā modo gubernato, amarā bilis succus inuisibiliter exhalat. Præter naturam uero se habent, tum alijs (de quibus post agetur) utijs redundat, tum uero eo de quo nunc agitur, quod erysipelas uocant. Cum enim uel longe copiosior, uel crassior quā pro naturā modo redditus, uniuersus ad cutim compulsus fuerit, eam tum perurit, tum in tumorem attollit. Sed satius est ueluti semper nō dicimus modo, sed etiā facimus, ita nunc quoq; à rebus non à nominibus initium faciamus, alterumq; principium, priore scilicet commodius eiusmodi sermoni demus. Cum sanguis copiosus in aliquā particulam procubuit, sic ut ab eius particulā ualis nequeat contineri, exilitq; aliquid instar roris ex ipsis uasis in ea musculorum spatia quæ similibus corporibus ex quibus cōponuntur, interueniunt, utique tumor ex plenitudine oritur: cui succedit cutis tensio, & in alta carne cum pulsu dolor, & tangenti renixus quidā, & rubor, & calor: ipsa nimirum cute ea, quæ subiecta sibi caro patitur, sentiente. Similis iam dicto & in uisceribus affectus oritur. Est em̄ his quoq; sua quædam caro, quam aliqui *πρωγμα* Græce uocant: in quam uidelicet sanguis ex refertis uasis halitus specie exudans, iam dicta symptomata efficit. Atque hic unus affectus est sanguineæ fluxionis febiles, in carnosa corpora maxime incidens. Secundus alter biliosæ fluxionis germen est, ac circa cutim maxime cōsistens, tum hanc externam, quæ omnium partium commune est tegumentum, tum membranofam & tenuem quæ singulis internarum est circumdata. Ergo sicuti prior affectus etiā cutis aliquā apprehendit, ita hic quoque aliquid subiectæ sibi carnis occupat. Quod si crassior humor acriorq; sit, summam cuticulam (Græci *ὑποερυσίδα* uocant) excoriat, spatiumq; ad profundum aliquādo cutis exulceratione peruenit. Atq; hic quidem affectus erysipelas nuncupetur, duplicem (ut iam dictum est) habens differentiam: quod uel absq; exulceratione, uel unā cū hac incidat. Prior autē affectus unius rationis est, uoceturq; phlegmone. Cum ergo nec planē biliosa nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mista: utiq; ab eo quod in mistura exuperat, nomen ipsi indatur, ac dicatur de eo id quod exuperatur: sic ut uel phlegmonem erysipelatosam id uocemus, uel erysipelas phlegmonosum. Vbi autē neutrum uincit, ibi uisum phlegmones erysipelatosq; medium nominetur. Curationis uero methodus sicuti in alijs compositis, ita & nunc tradatur: initio à simplicibus sumpto.

2 Ergo omnibus qui sic præter naturam consistunt tumoribus, cōmunis indicatio uacuatō est. Adieci uero illud, sic, admonens te multitudinis humorum qui eos excitent. Nam si quis eos ua-

cuet, naturalem habitum membrum recipiet. Iam uacuatō pari modo in omnibus duplex est: una repellentium ad alias partes, altera foras digerentium per eum qui sensum fugiat halitum. At quoniam erysipelas non quātitate modo affligit, sed etiā ex uehementi scilicet inflammatione qualitate ipsa cruciat, ampliorem refrigerationē quā phlegmone requirit. Nec tamen non periculosa toti corpori est eiusmodi cūratio, propterea quod bilis interim ad aliquod princeps membrum fertur: quippe cum si uel sanguis ipse abundet, haut tutum sit ex minoris notæ membris fluxionē eius repellere. tanquam igitur in illa post totius corporis uacuationem repellentibus auxilijs usi sumus, ita nunc quoq; faciemus: sed pro sanguinis missione, medicamento quod bilem trahat purgantes: ipsam uero afflictam particulam refrigerantes. Esto autem refrigerationis terminus, ipsa coloris mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim cum hoc quiescit. Quod nō purum est, sed iam quodammodo phlegmonodes, si pusculum refrigeres, liuidam cutim præfert. Sinne sic quidem quies desistat, nigricat, potissimum in senili corpore, sic ut quædam ita refrigeratorum, ne digerentibus quidem medicamentis ad perfectionem sanentur: sed scirrhosus quidam tumor in particula relinquitur. Ergo satius est, ubi laborantis particula alteratum colorem uideris, à refrigerantibus adstringentibusq; ad contraria transire priusquam uel liuida, uel nigra prorsus fiat. Porro refrigerantium materia in opere De medicamentis est tradita. Solanum, & semperuiuum, & portulaca, & umbilicus Veneris, & psyllium, & alceruū, & lactuca, & intybum, & lenticula palustris, & cerata ex aqua admodū frigida, & alia id genus. Vbi uero inflammatio ægrotantis membri iam desit, cataplasma illi priusq; liueat, ex hordei farina (*ἀμύλον* Græce uocant) est imponendum. Quod si iam liuor occuparit, in cūcta cute cataplasma superponendū est, perfundēdusq; locus plurimū quidē ex aqua calida, sed & marina aqua, & muria interrim conducet. Quinetiā ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, uel acetum, uel oxale miscetur. Hoc tempore etiā coriandrū cum polēta quidā esse salubre erysipelatum medicamentum scripserunt. Alij rursus eodem inter initia usi magnæ noxæ occasio laborantibus fuere. Sed & rosaceum ceratum cui immixtum sit calcei aliquid, eodē modo sunt qui prodiderunt erysipelati prodesse, aliaq; si milis generis nonnulla ex ijs quæ ualenter exalfaciant. Quorum nullum est erysipelatis medela, antequam uidelicet mutatū desinat esse id quod ab initio fuerat, atq; alterum iam, illiq; cōtrarium euaserit. Quomodo enim quæso, nō sit cōtrarius calido affectui frigidus: aut ei qui flauo aut pallido colore est, is qui liuidus aut niger est? Sicuti autem subinde phlegmonæ admiscet erysipelas, ita etiā aliquando cedemat. ac uocetur quod ex ambobus tum est conflātū, erysipelas cedematosum: non secus quā ubi ex refrigerando durū ægreq; resoluibile redditur, uocabitur erysipelas scirrhosum

sum iam curatio quoque ueluti in omnibus compositis, ita in his administrabitur, ac potissimum quidem contra exuperans pugnabitur, non pratermissa tamen nec ea quae ex admisso praestatur faciendorum indicatione. Sicut enim ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituita constat oedema ipsum, rarus quida atque indolens tumor. Equidem scio aliter quoque oedema peruenire: sicut in pedibus, in intercutis aquae affectibus, & phthois, alijsque, qui uehementes sunt, malis corporis habitibus. Atque in illis quidem oedema affectionis eius quae hominem premit, est symptoma, nullam seorsum propriam curationem requirens. Nam satis erit, (si modo curatione egebit) ipsa tum crura perficere, alias oxyrodino, alias oleo cum sale, aut etiam oxyrodino sal habente.

3. At si ex pituitoso humore in particulam influente oedema constitit, abunde aliquando satisfacit spongia quae ex aqua, in qua sit aceti aliquid, maduerit. Porro haec ita attemperabitur, ut uel bibi possit, uel ut non multum supra hoc aceti habeat. Deligare uero spongiam debetis, ab inferiore parte incipies, ac supra finiens. Esto autem spongia, si modo conductura sit, omnino noua: huius si copia non est, cuius erit, hanc detergebis expurgabisque nitro, & aphronitro, & aqua lixiuia. Quod si sub his oedema non subsidat, ubi rursus deligabis, pusillum aliquid aluminis coniicies, ac nouam spongiam admouebis. Si quae copia non sit, melius est eo quod uulgus uocat *ἀλγυρον*, utare. Id uero ante omnia molle esto, quod genus Tharsicum est. Cuius si facultas est, audacter utitor: utilius enim experere quam spongiam. Madeat uero ex pusca, quae aliquid habeat aluminis, tum (ut praescriptum est) deligetur ab inferiore sursum. Sit autem arctatio mediocris: ueluti in ossis fractura, ac primae quidem fasciae infectiones, quae scilicet inferne incipiunt, magis arctandae: quae deinceps sunt, sensum remittendae. Ceterum, non adeo ut laxa sit aliqua deligationis pars. Porro idoneum medicamentum ad haec & glaucium est, tum ipsum per se liquatum in pusca, tum uel magis medicamentum nostrum quod ex eo compositum est, cuius compositionem habes in eo opere quod De medicamentis est inscriptum. Sane haecenus a me scripta fuerant opera tria, unum De simplicibus, alterum post hoc De compositione medicamentorum, & tertium De facile parabilibus. Quartum autem adscribere constitui: quandoquidem multarum medicamentorum ita suadent. In eo de communibus & proprijs cuiusque partis & utij medicamentis agetur. Verum medicamentum illud quod glaucium habet, non oedemata modo, uerum multo etiam magis tum erysipelata, tum phlegmonas incipientes sanat, ac potissimum calidas. Manifestum autem quod erysipelatos phlegmonas, & erysipelata phlegmonosa idem medicamentum sanat: at non eas phlegmonas quae in scirrhum iam transierunt, aut erysipelata quae iam refrixerunt, aut denique ullum scirrhosum affectum sanauerit, de quibus utiq; in quinto De simplicium medicamentorum facultatibus aliquid est proditum: dicetur uero & nunc. Siquidem humor unde eiusmodi vitium nascitur, aut glutinosus est, aut crassus, aut utriusque rationis participes. Curandi uero eius

Galen.

A communis indicatio est, ut quod praeter naturam in particula est, totum uacuetur. Modus tamen uacuationis eius proprius est. Nam detergere id ubi contumaciter inhaeret, oportebit. Quod si quis ijs quae acuatim trahunt, digeruntque, medicamentis uacuare tentet, nec ijs quae humectent & excalfaciunt molliat ac liquet, huic paucis primis diebus egregie processisse curatio uidebitur: ceterum quod de affectu restabit, id insanabile erit: siquidem toto quod in eo tenuium partium erat digesto, quod reliquum est, ueluti lapidosa coctio linquet. Quippe etiam qui in articulari morbo uiuentur pori, ex humore crasso glutinosoque proueniunt, quando is non paulatim est digestus, sed uolentis medicamentis totus simul siccatus. Ad eundem modum & calculi generantur in renibus, alio scilicet in his crasso glutinosoque succo. Haec igitur de causa ad scirrhosos affectus nullum uehementer excalfaciens siccansue medicamentum est aptum: sed ea tantum quae cum molliore digerere possunt: cuiusmodi sunt tum ceruina medulla, tum uitulina, tum seum hircinum, & taurinum, & leoninum: ad haec, ammoniacum thymiana, & bdellium utrumque, magisque scythici, quam uelidelicet est humentius. Pari modo & styrax qui humentior est, sicco utilior est. His igitur indicationibus attentus, etiam complicatos affectus sanare poteris, pro subinde iam dicta in omnibus compositis utijis methodo.

4. Mihi uero iam tempestuum fuerit de affectuum partium differentia mentionem facere, quam semper in omnibus tum morbis tum symptomatis, in memoria habendam censui. Diximus autem non pauca de omnium earum indicatione in lib. qui hunc praecedit. Siquidem omnium qui praeter naturam sunt tumorum, in quibus utique adhuc non sunt geniti pori, prima indicatio uacuatio est.

5. Earum uero partium quae iam scirrhum contraxerunt, uacuatio per iam dicta medicamenta perficitur. Vocareque ea Malactica, id est mollientia, medicis solent. Quoniam autem membrorum alia rariora naturaliter sunt, alia densiora: etiam uacuatione eorum diuersa specie remedia postulare est necessum. Haec igitur de causa tum in tendonibus, tum in ligamentis, [cum scirrhosa fuerint] uisum mihi satis est ei curationi quam per mollientia medicamenta molimus, aliquid incidentium admiscere. Ex quorum numero uel in primis acetum est. Interim uero & in alijs partibus quas scirrhus affectit, eo utimur: ut paulo post dicam. Verum in tendonibus & ligamentis in hunc modum. In aceto acerrimo candentem igni lapidem extinguo: ac si liquidum haberi potest, qui ceret in magnis urbibus rarus non est, pyriten. Sin eius copia non datur, molarem, Graeci *μυλτην* uocant, scilicet ex quo molas quibus molimus, faciunt. Deinde ascendente post infusum lapidi acetum uapore calido, in hoc dimoueri scirrhosum ligamentum uel tendonem cogo: atque exinde rursus medicamentum quod molliat, impono. Oleo tamen principio curationis non aqua quotidie omnino laborantem particulam perfundo. Esto autem id oleum haudquaquam adstringens, sed plane tenuium partium, cuiusmodi Sabinum est. Incoquimus autem, oleo interdum althaeae radicem, ac syluestris cucumeris, & si qua est eius ge-

tom. 6

p. 2 neris

neris alia Atq; hoc utor (ut dixi) quotidie. Caterum curatio quæ per acetum administratur, utilis est uti-
to iam adulto, & cum præparata iam submollienti-
bus pars fuerit. Excoctavi autē & composita qua-
dam ex aceto medicamēta, quæ inter mollientium
usum, ad unum diem impono. Siquidem aceti vis,
modo ea quis modice & debito tempore utatur, sa-
lutaris eiusmodi affectib. est, ceu crassos & viscosos
humores diffecans ac dissoluens; sin uel immodera-
tus, uel in tempore nō idoneo, tenuiores partes ui-
olenter absorbens, id quod reliquū est, lapidescere si-
nit. Sed & si quis eo diutius utat, substantiam ipsam
neruorum delibauerit. Ob id igitur nec sæpe, nec in
ter initia, nec longo tempore, medicamentis quæ ex
aceto cōponuntur, ad ligamenta & tendones est u-
tendū. At in liene & carnosis musculi partibus scir-
rho affectis tutus eius est usus. Quippe rara sunt na-
turaliter hæ partes, nec est quod metuas, ne quis ner-
uus eius uelædatur. Ac ammoniacū quidē thymia-
mate cū aceto, etiam alijs nō pauci liquidi imponentes
utuntur, ad luti scilicet crassitudinē quod ex utriq;
mīstū est redactio. Idq; solū ei curando sæpe satis fuit.
Ad musculum uero alium sanē nō uidi. Ego uero etiā
sæpe sum usus, utiq; mollitiū usui interponēs. Atq;
sub illis nulla cernitur euident utilis. Sed posteaq;
mollitus per ea scirrhosus tumor est, maximū certe
usum ammoniacū aceto liquatū cōfert. Sufficit autē
eo uno alterōue diuinos, rursus ad mollitiā reuer-
ti. Ac rursus his pluribus diebus usus, denuo ad me-
dicamē qd' ex aceto fit redire, siue id ammoniacum,
siue quid aliud habeat eorū mollientium quæ paulo
supra sunt comprehensa. Neq; enim aliud quicq; est
admouendum; cuiusmodi scilicet pleraque sunt eorū
medicamētorum quæ ab eo quod aceti recipi-
unt; oxera uocant. Siquidem inter initia medicamē-
tum probabis. Sed id insanabiles affectionis reliqui-
as relinquit. Ego namq; eius rei causa in medio tem-
pore cataplasmate ex althea sum usus. Vocat autem
hanc uulgus *ἀναδενδρομαλῶχη*. Huius igitur radix
seuo liquata, salutare ad talia medicamētū est. Esto
autē seuū, si fieri potest, asnerinum. Sin id non sit, gal-
linaceum. Sin nec huius facultas sit, suillo utendum.
Sed & syluestris maluæ quæ passim nascitur, folia,
cum supra dictorum aliquo tusa proficiēt. Meliora
tamen crudis sunt quæ modice acuti sunt decocta.
Ac eiusmodi quidem auxilia, & curationis uariatio
qualis iam comprehensa est, omnium particularum
quæ scirrhosis utiq; sunt affectæ, cōmunia sunt. Ad
eundem modum cœdematur curatio, quam paulo
ante memorauimus, comprehensis iam differentijs
per particulas uariatur. His enim quæ in præcordijs
sunt cœdematis, nemo frigidam ex pulsa spongiā
applicuerit; ueluti nec alijs qui in his sunt tumori-
bus. Iam quis ablinthium oleo incoquēs, genu un-
quam perfudit? Quis oculum aut aliquid eorum
quæ intra os sunt, qualitercūq; affectum? At iocino-
rī ægotanti & leni subinde cum maxima utilitate
adhibetur. Docet id ipsum & experientia, quæ uim
eorum euidenter indicat, non secus quam ratio.
Nos tamen nunc hoc opere solam eam remedio-
rum inuentionē, quæ methodo paritur, qualis nam
sit differimus. In operibus De medicamentis am-

bas miscuimus, omnia medico cognoscēda esse rati;
tum quæ solo inuenta sunt usui: tum quæ sola ratio ē;
adhæc tertio loco quæ cōferentibus ad inuentionē
utriq;. Omnibus autē his ille solus commodè utetur,
qui in hac methodo est exercitatus.

6 Ac de phlegmone quidem, scirrho & cœdema-
te satis sunt, quæ hætenus sunt cōprehensa; illo nō
omisso, quod scirrhum nominamus tumore dūrum
qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu, ta-
lis enim sanabilis nō est, reliqui omnes sicut ægrius
sensilem ipsam partem affectā reddunt, ei omnino
insensibilem non faciunt, utiq; si sensilis natura sit.
Ligamēta namq; scimus insensilia esse. Quod si quis
eos duntaxat tumores, qui & præter naturam sunt,
& omīno insensiles, scirrhos appellados cēseat; reli-
quos nō scirrhos, sed tumores scirrhosios; & se dispo-
nibilibus litigare sciat, & nos quousque cum eo dispo-
tabimus, ita quoq; affectum nominabimus. Siqui-
dem is mos noster est, quibus quicq; nominibus de-
lectatur, iisdem in disputatione cum illo uti.

7 Nunc tempestium est, ut de inflationibus
differamus, quibus diuersa ab cœdematis curatio est.
Illa namq; ceu diximus, ex pituitoso succo ortum ha-
bet; proinde prementibus nobis cedunt, digitiq;
admodum alte in ipsa descendunt. Inflationes uero
ex flatuoso spiritu collecto nascuntur, aliās sub cute,
aliās sub membranīs quæ ossibus circumdantur, aut
musculos uiscerūque aliquod includūt. Porro col-
ligitur aliquando non parum etiam in uentriculo &
in testinīs, itemq; in medio spatio horū & peritonæi.
Differunt quoq; hæc ab cœdematis, quod & pressa
digiti non retinent uestigium, & sonitum ueluti
tympanum reddunt. Itemq; quod in cauitate sensi-
bili subinde continentur, atque hæc nonnunquam
maxima. Indicatio autem curationis omnium cōmu-
nis est: ut quod præter naturā est, uacuetur in quo-
cūq; id contineatur. Propria uero post hanc cōmu-
nem est, ut tenuissimis & calidis potestate medica-
mentis. Atque in uētriculo quidem & uisceribus o-
leum quod tenuium est partium, quodq; rutam ha-
bet incoctā, aut aliquod calidorū seminū, cuiusmo-
di sunt cuminī & apij & petroselinī, id præstabit. Ali-
quando uero & cucurbita magna bis tertē sine inci-
sione medio uētri affixa. Tanta uero ac taliter appli-
cata etiam totum umbilicum comprehendet. At in
artibus & musculis qui sub cute, ut etiam mem-
branīs quæ ossa uestiunt, inflatione orta, si citra do-
lorem sit, liquore aliquis tenuissimarum partium, cuius-
modi est lixiuium noua spongia exceptum, satis
fecerit. Sin dolor quoq; urget, ungenda pars est oleo
quod relaxandi remittendiq; uim habeat. Incidunt
porro ex percussionibus eiusmodi affectus, ubi scilicet
uel musculis uel membrana quæ os circuit, est
confusa. Ac super membranā quidem quæ os am-
bit, antedicta imponenda est spongia. Ad mus-
culos uero (namq; hi aliquando dolent) medicamen-
tum quod magis mitiget, est adhibendum. Quos fit,
ut ad hos solo lixiuium non utamur, sed immixta ei
tum fapa, tum pauculo oleo. Sarius autem fuerit in
principio nō addidisse lixiuium, sed fapa cum uino
& exiguo aceto uti, ac quod medio cre sit olei adijce-
re, ubi mista sunt, modice excalfacere; ac lanam non
lotam

lotam, quam succidam uocant, ipsi imbutam im-
 pery. Quod si eiusmodi lanx facultas non sit, ipsius
 celsus insciendus miscellæ supradictæ est. Quod
 aut Atticus celsus cæteris omnibus præstet tam-
 etiā me non dicatur, ipse scis. Quinetiam ceratum
 quod ex celsopo componitur, medicamentum est
 omnibus notum. Vtuntur plurimi eo ad phlegmo-
 nas, quæ in præcordiis sunt. Ergo huius quoque ali-
 quid ubi celsus præstet non est, recte inieceris. De-
 bent enim contuli musculi leni medicamento, cui
 mista facultas sit, quæ simul concoquat, digerat, &
 modice adstringat. quando si nihil habeat adstric-
 tio nis, augeat aliquando phlegmonas: ac maxime in ijs
 corporibus quæ sunt plethora, sanguine abund-
 dat. Ergo trium iam comprehensarū indicationum
 in inflatis ex plaga quadam musculis memor, ubi
 dolor maior urget, mitigatiua magis ratione uteris:
 ubi æstet, maiori ui instabis. Maiorē uim intelligo,
 cum breui uia pperatur ad finem. Porro brevis uia
 sit per ea medicamenta quæ ualentes habent uires:
 hæ maxime in lixiuio et aceto habent, post hæc in ui-
 ni. Quoties igitur de mitigando non laboras, horū
 plus in mistorum coniijcis. Rursus ubi repellere stu-
 des, uini plus quæ horum immittes. porro id optimum
 in hunc usum fuerit, si nigrū austerumque sit. At si di-
 gerere malis, lixiuij plus indes. Acetum uero si his
 miscbis, adambo erit utile, propterea quod mistas
 (ut monstratū est) habet facultates. Vbi uero muscu-
 lus sine dolore est, siccet sanē in lixiuij penuria pro eo
 aphronium immittes. Esto autem id minime lapi-
 dosum, sed magis spumofum. Est uero quod lapido-
 sum est, durū, & spissum, ac ægre liquabile cum di-
 ctis liquoribus miscetur. Spumofum uero molle est
 & laxum, itemque cædidius quæ lapidosum. Hoc itaque
 tum celerime ab humore soluitur, tum iuuat maxi-
 me, utpote tenuiū partium. Quæ uero huius generis
 inflationes neglectæ inueterarunt, primo quidē lo-
 co his ea quæ ex lixiuio componuntur (ut prædictū
 est) adhibeas: secundo loco emplasticum aliquod.
 Dicam autē & horū exemplum. Strigmēta gymnasi-
 orum seruēfacta percola primum, sic ut pura sint: de-
 inde rursus in cacabum immisissis, calcem uitam in
 farina speciei tunfam insperge ad luti usque crassitudi-
 nem. Salutare his est & medicamē quod ex sycomo-
 ro cōponitur, aliaque id genus. Nunc enim (ut dictum
 est) exple tantū eorū medicamentorū scribo: quorū
 generalis facultas per medicandī methodū inue-
 nitur. Tanquam uero medicamentorū hoc loco po-
 nuntur exempla, tum ut tota hæc methodus clarius
 intelligatur, tum ut magis nobis ad inueniendā ma-
 teriam facultas suppetat: sic etiam et affectarum cor-
 poris particularū proponunt. Statim enim affectus
 quidam est quem iuniores priapismus nūcuparūt,
 propterea quod ijs qui sic sunt affecti, etiam inuitis
 pudendum arrigitur: quod ubi uidērit quispiam qui
 in his commentarijs est exercitatus, protinus intel-
 liget ex inflationem esse genere. Qui enim memo-
 ria tenuerit, tum omnia quæ in dissectione eius mē-
 bri apparent, tum quæ de functione eius & usu in
 Naturalibus libris sunt prodita, is nullo negotio in-
 telliget quod cauernosus nervus, qui propriam co-
 lis substantiā constituit, halituoso spiritu impletus,

Galen.

A affectum hunc excitat. Porro halituosum spiritum
 in animalis corpore ex succis, qui lente exsiccant,
 sensim nasci didicimus. Quippe ubi tum insitus ca-
 lor ualidus est, tum partis humiditas ad summum
 concoctæ, utique in tenuem halitum soluta insen-
 sibili transpiratur in ambientem effluit. Contrā, ubi uel
 ingenuus calor imbecillior est, uel naturalis humo-
 rum semicoctus, tum crassus, tum glutinosus, ibi
 crassior excitatur habitus quā ut transpirare possit,
 ac potissimum sicuti particula ipsa densior est red-
 dita. Nonnunquā uero humor qui in membro con-
 tinetur, subfrigidus est, præterea crassus & glutino-
 sus: auctior uero calor in halitum uero crassos resol-
 uit. Quæ res profecto magnopere tibi ad curationē
 æstimāda discernēdaque est. Siquidē principium am-
 bobus affectib. cōmune est, nempe totum prius cor-
 pus uacuare, modo id capax uacuatiōis sit. Dictum
 uero à nobis sæpe est de uacuantiū auxiliorum fa-
 cultate. Ea sunt missio sanguinis, & purgatio tū per
 ea medicamenta quæ subter expellunt, tum per ea
 quæ supra, siue ea uomitoria dicere mauis: præterea
 multa frictio, & omnis dimotio: itemque balneū, po-
 tissimum quod ex aquis sit digerētibus. Sed & acria
 medicamēta illita per halitū digerunt, omniaque uno
 uerbo quæ calcasciunt & siccant. Ex accidenti etiam
 uacuare indicauī & cibi abstinentiā, potissimū ubi
 ambiens calē. Ergo quicquid horū sustinere cubas
 aptissime potest, eo est uacuandus, imponendumque
 ipsi laboranti particulæ medicamentum, si ea calidi-
 or sit effeeta, quod ad portionem caloris abundan-
 tis refrigeret. Sin aliter, inter initia quidem omnino
 quod modice refrigeret: postea uero id necessum
 nō est. Pari modo & quæ circa lumbos sunt particu-
 læ omnes, eiusdem facultatis medicamento sunt com-
 prehendende, etiam reliquos uictus exhibendus
 qui & statui aduersetur, et siccet. Incidit uero uitium
 hoc nō sanē multis, sed iuuenibus magis quā alijs
 ætatibus. quo magis his sanguinis missio præcipue
 est salutaris, ceu nec ætate eorū eam recusante. Scio
 enim ipse quendā à me curatum tribus diebus, natu-
 ralem habitum recepisse, sanguine primū missio, de-
 inde medicamēto hoc adhibito. Ceratum ex simplici
 rosaceo factum ita liquidū, sicut ad fracturas uti sole-
 mus, aqua frigida imbuēs, ac simul cum ea subigēs,
 (nam æstatis initium erat) pudendo ac lūbis imposui,
 atque ita quidē hunc percurauī. simili modo & alium,
 qui post missum sanguinē humido medicamēto, quod
 ex chamæmelo cōficitur, est usus. Porro istis etiam
 nymphaeæ aliquod potandum exhibeo, saltē in prin-
 cipio, rux falicis amerinæ semē, ac si traxerit adhuc
 uitium, rota semen copiose comedendū. Est em̄ illud
 cōmune præceptum omnium fermē quos uitiosus
 succus creat morborū, quod in fine calcasciētibus &
 siccantibus sit utendū, quippe hæc quod reliquum
 humoris est, prorsus absumunt.

8 Sanē linguam ita tumefactā cuidam uidimus
 ut ore hominis contineri nō posset. Is nec uenam in-
 ciderat unquā, & sexagenarius iam erat, horaque diei
 ferē decima erat, cum ad eū primū accessi et uidi. Ac
 uisus mihi est usitatis mihi pillulis, quæ ex aloë, scam-
 monia, & colocynthide constant, uespere datis pur-
 gandus: ipsi tamen particulæ afflictae suales refrige-

tom. 6

p 3

tantum

rantium aliquid imponere, saltē in initio. Post enim, inquam, applicabimus prout suadebit euētus. Verū id uni medicorū non placebat: ac propterea pilulas quidē sumpsit; de locali tamen remedio deliberatio in diē posterum est dilata, quo tēpore etiā efficacius aliquid pręstaturū quicquid probatū fuisset, sperabatur, & purgato scilicet iam toto corpore, & humoribus ad inferna reuulsis. Ceterū eā noctē euidentissimum per quietē in somniū, nostrū homini cōsiliū approbauit: ac materiā ipsam medicamētū definiuit: lactuca succo collui tubēs, quo ille solo usus, pręfuit sanatus, nullius alterius genus. Quod aut in priapismo uomitorijs medicamētis potius q̃ subducen-
tibus sit utendū, in linguae uitio cōtrā: id ex partiu si-
tu indicari manifestū est. Nam auersionis in cōtrariū, (quæ ab Hippoc. antisphalis dicit) non a substan-
tia, sed a curādī mēbri positu, inuētio pręstatur.

9 Iam uero tempus monet, ut ad aliud tumorum genus transeamus, atq; a re potius q̃ nomine initū faciamus. Ea nanq; est haud dubie uereq; scientifica doctrina. Quod igit omnis eiusmodi tumoribus succus aliquis influit, id in lib. quem De tumoribus pręter naturam scripsimus, indicatū est. Quod autē non idem in omnibus sit, ipse sensus euidentē docet: differentibus nimirum ipsīs tumoribus non colore modo, uerum etiam ijs quæ ex calore, frigore, molli-
tie, duritiēq; spectantur differentijs. Ac ruber quidem tumor euidenter subesse sanguinis indicat humorem: sicuti flauus & pallidus persimilem ipsi bilem: subalbidus uero & laxus, pituitam. Sunt autē & pręter hos tumores quidam, qui colore sint inter rubrum & nigrum medio, cuiusmodi color fuscus est. Hunc cū in corporis partibus sæpe incidat, plurimi medicorū liuidū, Græce *πλιδν* uocant. Renixus autē his quoq; tumoribus ualens est: ac si uenas euidentiores membrum habet, exaltatas eas a crasso & nigriore quodammodo sanguine, cuiusmodi per alium aliquando nō paucis hepaticorum excernitur, uidere licebit. Suntq; medici qui mihi eum non absurde uidentur feci, quæ in uinis subidet alsimilare. Ergo hic humor, ubi amplius incaluerit aut propter putredinem, aut febrem phlegmonodem, nigram efficit bilem, quam nullū animal, ne ipsi quidem mures gustauerint. Terra quoq; raditur ab ea: ac partes quæ radunt, omnes in altum attolluntur, uocaturq; is affectus (ut Plato quodā loco inquit) tum feruor, tum fermentatio. Est nanq; is humor talis, quale esse acetum docuimus. Ex quo ipso quoq; si in terrā effuderis, idem effectus uisitur. Quo minus alienum est, si ueteres eiusmodi humorem acidum nominarunt, æque ut pallidæ bilis amarum. Sanē non raro etiam in uomitionibus talis apparet. Verū sicuti paulo ante dixi, unū quoddam uitium esse propriū uerumq; scirrhum, qui pręter alia etiam insensilis sit: reliquos tumores, qui uidelicet nondum sunt omnino insensiles, dupliciter esse ad medicis uocatos, nempe uel scirrhos, propterea quod generis scirrhorum sunt, uel scirrhosos tumores: sic & in humoribus quæ quidem haud dubie nigra est bilis, ea talis est qualē modo pinximus: certe acida, & terrā fermenti ritu eleuans: tum omni animanti iniucunda. Quæ uero fieri talis est idonea, hæc bifariā nuncupat: uel melan-

A cholicus humor, uel nigra bilis: scilicet qui sic eam nominant, affirmaturis aliam esse nigram, quæ dum animal naturaliter se habet, quotidie gignit: aliam quæ ex uestione ac uelut assatione constat. Quod autem semper præcipio, ut nominibus contemptis, ipsam naturæ rerū scientiā exerceas, id nunc est faciendum: ac nominandū quidē prout fuisset, ceterum oratione sic interpretandū, q̃ quidam pręter naturam tumores ex eiusmodi naturæ succo proueniunt, cuiusmodi est fæx in uino, & amura in oleo: & q̃ hisipati tēporis putrescente humore, propterea q̃ in uasis sit impactus, exulcerant. Ergo sicuti reliqua omnia uitia plurimā habēt particularē in maioris minorisq; ratione differentiam: sic etiam hoc uitium habet. Quippe phlegmones alia quidem admodum rubra est, alia paulo magis quam pro naturali habitu rubra. At species, siue genus, siue quomodo libet appelles, ambobus est idem. Nam & rubriores q̃ pro naturæ modo sunt, & dolor omnino cum ipsis est qui ipse quoq; magnā habet in excessu defectuq; differentia. Ad eundem modū nec renixus nec cutis tensio omnibus est æqualis. Cōmune tamen eorum est tum quod pars magis renititur quam ante, cum naturaliter se haberet, tum quod in tumorem quandam attollitur: extenta scilicet attemptaq; eatenus curte, quatenus tumor affluerit. Simili ratio ē uitium quod modo describimus, aliās confusa exiguāq; & quæ uulgum fortasse latere possint, asert symptoma-
ta: aliās ita uehementia & magna, & cunctis euidentia, ut ne puerum quidem clām sint. Verum communē illud in omnibus particularibus, quod intelligentiā ad se trahit, unus id morbus esse ostenditur: & unam libi appellationem imponi cogit. At ubi magna quidem omnia sunt, nemo de appellatione ambigit, sed nominatū amo assensu omnes eiusmodi affe-
ctum, cancrum. Cum autē adhuc incipit, nihil mirū est si uulgus lateat, nō secus, pfecto q̃ stirpes quæ eter-
ra iam exeunt: quādo hæc quoq; peritis tantū agnolis agnoscuntur. Ergo quēnā in cancro tum communis, tum propria curationis indicatio sit, opportune nunc dicetur. Cōmunis igitur est, ut humorē, unde uitium est natū, ilico uacues simili uacuationis genere, ut quæ in alijs tumoribus supra est comprehensa. Mox prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cætero eiusmodi fucus in uenis colligatur. Sin id fieri nequit, saltē eum omnino ex interuallis reducere, & simul particulā firmare, ne quid humorū redundantiæ ad eā confluet. Veluti ergo amara bilis humorē medicamēto quod eū humorē trahere sit aptū, educimus: sic & melancholicū educemus, uel simpliciter aliquo, cuiusmodi est epithymū pondo drachmarū quatuor in sero lactis mulsæ exhibiti: uel compositorū aliquo, cuiusmodi nostrū est, quod ex duobus & triginta simplicibus medicamētis est cōpositum. Sed horū materiā in alijs traditam habes. Hic autem quæ ad propositam methodum proprie pertinent, dicamus. Post nanq; purgationem illud de omnibus eiusmodi affectibus prius est præceptum, quod uel retro regere humorē, qui in membro procubuit, oportet, uel ipsum digerere: pręterea q̃ in principio quidem tam in ipso purgationis tempore, q̃ ante id repellere: ubi iam totum corpus exquisitè purgauerit

ris, digerere. Vbi tamē mediocris tantum purgatio præcessit, missū esse quod applicabis pharmacū, ex repellente digerētēq; facultate conuenient. Sanē ad crassum humorē inutiles sunt tū imbecillē, eo q̄ nūllum operæpretiū efficiāt: tum ualentes, q̄ uehementer teniores quā in uenis sunt sanguinis partes uel digerāt, uel retrudāt: crassas uero & melancholicas, quas feci alsimilauimus, nec euocēt, nec repellant. Ergo si his inter initia utere, utiq; minutus aperte tu morerit. Ceterū quod reliquū eius est, cōtumax ad soluendū reddet. Quare mediocriū uirum medicamentis est opus: quā nec propter imbecillitatē uincēt, nec propter effectus uehementiā ualenter sanguinem crassabunt. Ad hæc item quē omnino haud mordeant: quandoquidē uitij malignitas ab ijs quæ mordent irritatur, ac ut dici solet, effertur. Propter hæc igitur quæ uiribus quidē sunt mediocria, qualitate uero minime mordentia, eiusmodi affectibus sunt idonea. Materię uero copia, sicuti in libris De medicamentis est traditum, ex uisitis elotisq; metallis habebitur. Quippe quæ medicamenta ex his cōponuntur unā cum purgationibus, ad sanandos incipientes cancros magnā uim habent. Maiores uero sat fuerit, si his prohibeantur augeri. Prospicere uero ut qui iam sunt sanati, amplius non regenerentur, id artis de tuenda sanitate est opus, cuius sanē portio est ea quæ de cibis præcipit. Ceterum si quando cancrum per chirurgiam curare debebis, coepisse quidem ab uacuando per purgationem melancholicum humore oportebit. Vbi uero rotum quod uitiatum est, prius excideris; sic ut nulla supersit radix: fines effluere sanguinē, nec prope eum inhibebis: immo premendo potius quæ circum sunt, uenas, exprimes ex his crassiores sanguinem: mox alijs ulceribus similiter curabis.

10 Est tamē & aliud uitij quod ex humore crasso feruētēq; nascit. Incipit hoc plerumq; à pustula: alij quando uero & sine hac. Ceterū inter initia quibus hoc insit, scabunt particulam omnino. mox oritur pustula quædā, qua rupta, ulcus cum crusta gignit. Sæpe uero non una oritur scabentibus pustula, sed multæ exiles ueluti milij semina, crebre in particula residentibus, quibus perurit, similiter crustosum ulcus prouenit. In carbunculis uero qui per Asiam potius sunt grassati, etiam citra pustulas nonnullis excoriata sitam cutis est. Omnibus tamen, ut dixi, crustosum ulcus fit, modo crusta ipsa cineris colorem præferēt, modo nigrorem. Omnibus præterea his circumposita caro in summā peruenit inflammatio nem, non tamen colore aspicitur erysipelatis, immo qui adhuc phlegmone colore fit nigror: ueluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Quod autē necessario febricitet qui ita sunt affecti, id quē nō minus, imō magis q̄ illi quibus erysipelatis est phlegmone, id utiq; latere neminē potest. Sed & incipiedam ab incisa uena curationē esse, id quoq; neminem latere arbitror, qui præsertim meminerit quæ in curatione febriū de sanguinis missione diximus. Nec illud obscurū, sanguinis uacuatiōē quæ ad animi delectum usq; sic adhibita, magis his etiā collaturā: nisi tamen aliud quippiā obstat ex ijs quæ uenam in cū uerent. Imponi uero sibi laborans particula quod

ad humorū inflammationem spectat, refrigeratiā celsiderat. Ceterū propter humoris crassitudinē atq; etiam malitiā, nec flexionē auertere unq; poteris: & si quando id feceris, aliud quippiam quod in alto sit corpore, offendes. Atqui nec adfluere is permittendus est: quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cum modice reprimendo etiā digerere possint. Tale profectio est tum cataplasma quod ex plantagine conficitur, tum quod ex cocta lente, scilicet miscetibus his nobis micam panis tenerā qui clibano sit coctus. Esto aut panis nec omnino à fursure purus, nec nimium eius habēs. Siquidem qui omnino purus est, eius substantia in cutis meatibus hæere est apta; *καταστικτόν* Græci uocant. Fursurae uero autē crassiorum est partium. Super ipsum uero ulcus, ualens aliquod imponendum est medicamentū: cuiusmodi est Andronis, Pasionis, uel Polydia, liquanq; id cum uino aliquo dulci ad sordium crassitudinē debet. Porro cōmodissima ad hunc usum uina sunt tum Thereum, tum Scybelites. In quorū inopia sapienter utendum, quæ apud nos *εχμα* dicit. Quæ autē pharmaca reliquis adhiberi ulceribus solēt, nempe quæ cōcoquant & pus moueant, ea nunc adhibenda nō sunt: quando ita putredinem particulæ auxeris. Quin etiā scarificare eiusmodi tumores post sanguinis missionē, alienū non sit. Sinto autem incisiones medicoribus altiores, propter infestantis humoris crassitudinē. Cessante uero iam inflammatione, ulcus ad cicatricem similiter reliquis ulceribus perducet. Atq; hætenus de carbūculis dixisse sat arbitror.

11 Deinceps de reliquis agam tumoribus, oris à strumis, *χρησίδας* Græci uocāt. Exsunt hæ glandulis in scirrhosum affectū mutatis. Estq; curatio earum, qd ad ipsum attinet uitium, ijs scirrhis qui in alijs partibus nascunt, cōmunis. Ceterū quod ad ipsius partis naturā spectat, in quibusdā glandulis alias geminas curationis indicatiōes adiiciūt. Præstiterit fortassis hoc loco de nominib; aliquid clarioris doctrinæ gratia distinxisse. Quippe glādula quæ quod in medio uasorū in diuersas partes ductorū habetur implent, eiusq; ductiōnis pro firmamento sunt, earum haud magnus usus animantibus. est: sed ex abundantiore providentia sicut alia quædā, sic has quoq; glādulas natura fabricauit. Earū uero quæ uel saluā, uel lac, uel genitale semen, ad hæc quæ pituitosum quendā humorē in mesenterio, uel faucibus, uel larynge, generāt, earū maior est usus. Atq; aliqui has nō glandulas, sed glandulosas uocāt corpora, ut quæ non paulo q̄ reliquæ glādula & rariore sint & magis spongiosa substantia. Quinetiā in has tum artēria, tum uenæ sensibiles perueniunt. Atq; hæ quidē cum in scirrhoso sunt affectu, nō aliter q̄ ceteræ omnes partes sunt sanandæ. At quæ in medio uasorum spatio cōsistunt, in ijs alia curationis indicatio præstat: qua simul cum uitio etiā pars ipsa tollitur. Est uero duplex ea quocq; nempe uel totū quod uitiatum est, scalpello excidentibus nobis, ueluti in cancro, uel putrefcere id medicamento cogētib; Porro quæ eiusmodi medicamentorum materia sit, id in opere De medicamentis est proditū. Mihi uero tēpe situm est de alijs tumoribus docere. Quorū se primum abscessus offert, *ἀπύημα* id Græce dicitur.

12 Huius duplex item genus est. Vñ cum phlegmone in pus uersa, pus ipsum tanq̃ in sinu aliquo est collectū. Alterū cum nulla precedente phlegmone, humor aliquis statim ab initio, isq̃ aliā specie alius, ceterū omnino acris, in parte aliqua colligitur, porro excoriat hic circūposita corpora: spatū uide licet sibi molis, uel inter duas tunicas, uel sub certis mēbranis. Excoriat autē omnino ipsa copia distendens: interim uero acrimoniā quandā à putredine tempore contrahens. Sanē inueniunt in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt diuisi, proprietates quādā nō pauce, nec humorū modo, sed etiā solidorum quorundā corporū. Siquidē unguis, pilorum, osiū, testarū, lapidū, & toforū fragmentis similia inuenta in his corpora quēdā sunt. Ac humorū ipsorū alius ueluti lutū, uel coenū, uel olei quidā limus, uel uini fex, alius adeo grauiter olens, ut omēs auerſentur. Verū hæc rariū incidunt. Frequentissima uero huius morbi sunt tria genera, quorū singula propriā appellationem Græce sunt sortita. Ea sunt, ἀθρόωμα, *staphyloma*, & *μυλινγες*, à similitudine contentarū in tumoribus substantiarū dicta. Est etiā alia ipsarū ueluti seuū, alia ueluti mel, alia pulicula, quam *ἀθήρυ* uocāt, similis. Curationis uero eorū indicatiōes sunt cōmunes; nempe id quod continetur, uel digerere, uel totū putre reddere, uel excidere. Aliqui igitur eiufmodi tumorū triplicē curationis rationem admittūt, quotquot scilicet ex tenuiore humore constant, ut meliceris. Aliqui duplicem tantū, ueluti atheroma: quippe quod tū excidere, tū putrefacere licet. Steatoma uero solā manū opera curat: cum nec putrefieri possit, nec digeri. In ijs uero abscessibus qui in alto corporis consistunt, ac potissimū in uisceribus medicamenta que ex aromatis cōponuntur, maxime sunt utilia: utpote quorum uis collectum humorem, tum in halitū resoluat, tum digerat. Sunt profecto & alia eius generis, non pauca, quorū laudatissima sunt, tum antidotūs quæ ex uiperis componitur, (theriacē uocant) tum quæ athanasia uocāt, tum ambrosia: atq̃ hæc quidē sumptuosiorū sanē optimū est nostrum, quod ex Cretica calamintha est cōpositum. Omnia uero id genus in opere De medicamētis colligimus: quod uti paulo ante diximus, satius arbitror ijs tribus quæ supra memorauī, quod nihil desit, subijcere.

13 Quoniam uero eorū quæ per chirurgiā fiunt, curationis indicationes aliquid cōmune habent, aliquid propriū, satius nobis uisum est eā nō distrahere, sed uniuersā in calce huius operis apponere. Nūc porro tantulū etiā de tumoribus, qui præter naturā consistunt, est adijciendū, quod quicūq̃ ex his toto genere præter naturā sunt, si fini ablationē indicent: cōmuniori scilicet indicationi, quæ per omnia quæ totis substantijs à naturæ habitu recesserunt extenditur, subiecti: ueluti in steatomatis & atheromatibus habet. Huius certe generis est & quæ *μυρμηκία* Græce uocatur, & quæ *ἀκροχολδυ*, præterea in uelica calculus, & *καρχυμα*: & in mulieribus mole in utero gestatio. Ita uero appellat infirmam carnē. Omnia nanq̃ talia summouere in totum properemus. quorum uero etiam locus ipse affectus una quæpiam naturalium partium est, prima indicatio est, ut affectus

A sanetur. Secunda ab hac, si insanabilis is sit ut una cum uitio pars quoq̃ ipsa excidatur: sicut in cancro & omnibus ulceribus quæ curationē respiciūt. Econtrario uero in suffusione quod hypochyma uocant, uicti in prima indicatiōe, ad alium eam locū, qui minoris sit momenti, transferimus. Non desunt qui hæc quoq̃ uacuare sint aggressi: sicut in ijs qui chirurgiā tractant, dicā. Nunc illud dixisse sufficiat, quod humor qui in hydrocelis uisitur, alienus à corporis substantia tota natura sit: sicut etiā quæ in ascitis hydrodropis continetur aqua, quarum certe uacuatiōnem, uel medicamentis quæ digerant molimur, uel chirurgiā: in hydrocele quidē immisso siphone: in ascite uero adhibita punctiōe, quā paracentesi uocant. Porro exciditur una cum affectu ipso, ueluti in ijs quæ ante cōprehensa sunt, etiā pars affecta: ita & in herniosis aliquid peritonæi. Pari modo & columella aliquādo una cū uitio ipso exciditur. Idemq̃ in cruribus & testiculis, una cum uaricibus ipsæ uenæ. Ad hæc tunica in naso cum polypo, & foratus dens cum foramine, uerū ex his nullum est quod ad naturalem habitū possit reduci. In columella uero id omnino est conandum, nec properādum ad eam excidendam: sed quādo gracilis est, et ad lori tenuitatem redacta, tum est auferēda. Porro talem eam reddet longius tempus, at qualē Hippocrates in præfatijs descripsit, paucorū dierum numerus. æque uero & cætera quæ in magnitudine naturalem habitū exceſſerūt, in quibus innumeranda sunt omnia quibus supercreuit caro, & encanthides, & quinsede C thymi dicunt. Sunt ex istiusmodi, & quæ ambigua sunt specie, ueluti cicatrices quæ supra circūpositam cutim multum exstant: item quæ in oculis sunt pterygia. Curationis tamen eorū indicatio manifestata est. Siquidē talia omnia amouere oportebitatq̃ id semper agere, ut rationibus quibus id fiat pensatis, optimā semper earum deligas. Sanē optimæ rationes tripliciter iudicantur, tum ex temporis curandibreuitate, tum ex curando citra dolorem, tum ex maxime tutō curādo. Rursus ut tutō cures, tria propria sunt, quibus intentus sis oportet. Vñ primū, ut omnino abſolutionem operis consequaris. Alterum, ut sicubi hanc non consequaris, saltem cuban tem non lædas. Tertium, ut uitium non facili reuertatur. His cōsiderationibus si optimā curationis uitā iudicaueris, inuenietur in omnibus quæ nunc proposuimus, quādo potius chirurgiā, & quando potius medicamentorū opē sit curandum. At chirurgiæ quidem studium in ijs præsertim quæ nunc sunt proposita, ad interemptionem eorū festinat: ut quæ quod in animalis corpore toto genere præter naturam habetur, id prorsus tollendum sibi proponat. Quod si perficere nequeat, proximū illud consilium habet, ut uitium trāsferat, ueluti in hypochymatis. Quod uero ex medicamentis petitur, primum huc tendit, ut quod præter naturā est, tum uacuet, tum digerat: quod si per membri naturam, aut etiā uitij rebellionem fieri non licet, ut id tum in pus uertat, tum putrefaciāt, hoc uero secundo loco destinat. Quippe ita in columellæ uitio facimus: pri mū scilicet ad naturalem habitum eam reuocare tē tantes: id si cōsequi non est, prorsus amputātes: idē

uel chirurgiæ opera, uel per causã medicamentã. uerum medicamentũ melius est in tractationem de ijs differamus, (quãdoquidem tribus iam proditis, aliam quoq; quartã adijciendam statuiimus) ac chirurgiam in calce huius operis apponamus.

14 Non est igitur qd in his amplius immoremur; sed transeundũ ad ea quæ similes ijs quæ cõprehensa sunt, curationem desiderat. Ea sunt tum quæ in numero & magnitudine cõueniunt modũ excedunt; tum quæ in ambobus ijs deficient. Dixi hoc loco conuenientẽ; quod si cõferentem, uel conducenẽ, uel secundũ naturã, uel utilem alibi usurpauero, eadẽ sermõis uis erit. Ac dictũ quidem de his alibi latius. Ceterũ redigere in memoriam summam omnia, etiã hoc loco alienũ non fuerit. Omnũ ergo quæ in corpore habetur, primũ cuius maxime indigemus, est ipsa particularũ minime impedita functio. Hanc uero quia possidemus naturã, idcirco publice dicimus expetere nos secundũ naturã agere. Et quia hoc ipsum cum eo quod est secundũ naturã, [uel naturaliter se habere,] est cõiunctũ; merito profecto nihil interesse arbitramur, secundũ naturã habere, an secundũ naturã agere, dicamus. Quin & sine additõ interim Gracẽ dicimus expetere nũc non qd quicquid, utiq; subaudio in dictione, uel habere uel agere, uel ambobus [Latinitas propter articuli fortassis inopiã, ea figura desituit.] Atq; hæc quidem causa est cur medicis recte usurpata uox hæc secundũ naturã sit de omnibus, quæ in corpore ex sententiã nostra esse cupimus. Scire autem licet in ijs quibus natura deficit, nec primũ, nec propter se ipsum, secundũ naturã à nobis expetitis; sed secundũ, & ex accidente. Si quidẽ sextus digitus nonnullis ab ipso statim ortu est congenitus, & quintus defecit; & alia quædam similia, aliqua in numero, aliqua in legitima quantitate uitiõta. Ac si quidem hæc plurimum, rectã uero rara fierent, cõtra quam nunc de nature operibus statuermus, utiq; nõ tuentes ut nunc, sed auferentes ea. Hæc ratio memoria tua nũc quam excidat; cum sit ad nominũ usum utilis, quæ tum fallere inconsideratos possunt, tum discordiã phantasiã excitare, scubi alter dicat totum quod præter naturã est, esse tollendum; alter quod nocet, aut inutile est, aut incommodat actioni. Ergo de nũc repetentes, de rebus loquamur, quando de nominibus est nobis definitum; hinc orsi.

15 Coniuncta comprehensis iam morbis sunt ea quæ uel magnitudine, uel numero, à debito naturæ modo sunt aliena, in quibus amputare quidẽ conuenit quod magnitudine, uel numero redundat, reficere autẽ & fingere quod desit; ubi uel licet fieri id licet. Quintũ namq; digitum, aut tale aliud membrũ, medico certe gignere non licet, sed unius naturæ opus sunt omnia talia. Verum in totũ tollere quod numero redundat, aut præcidere aliquid eius quod magnitudine modum excessit, hæc nobis quoq; licent. Si quidẽ ex medicis officijs unũ est, nec id leuissimũ, ubi in corpulentiã eò deuenit corpus, ut nec ingredi sine molestia, nec sedẽ propter uetris molem cõtingere, sed nec respirare libere possit; hanc liquare ac tollere, æque nimirũ ut cum corpus ali. desinit (æpo-
Greci uocat) quod genus quos tabes male ha-

bet, patiunt; hinc quoq; reficendõ prospicere. Sape autẽ euenit, ut nõ totũ corpus, sed una quæpiã pars ex atrophia tabescat; quã scilicet uel neruorũ resolutio, uel ipsius partis intemperamentum præcessit. Opportuneq; iam de curatione horũ cõsiderabimus, ubi si hab ijs qui corpulentia nimis oneratur. Ostendunt uero in libris est qui De temperamentis sunt inscripti, quod calidior sicciorq; teperies exile corpus reddat. Ergo id agendum, ut nimium obesi corporis temperamentum tale esse faciamus, si modo ad debitiũ modũ redibit. Sanẽ docuimus tum in illo opere, tum nũc hinc fecius in opere De tuenda sanitate, quod acuta exercitatio, & tenuans uictus, & id genus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentũ totum nõ solum calidius, sed etiã siccius, ac propterea corpus exilius reddunt. Igitur in exercitationibus celerissimus cursus est idoneus. Tenuatis uerò uictus materia, seorsum singulari libro est prodita. Quod si medicamentã tenuantia quoq; requirunt, etiã hæc in operibus quæ De medicamentis conscripsimus, sunt edicta; quanq; referetur eorũ nunc quoq; quæ sunt efficacissima, quibus ubi demere nimis obesitatẽ studeas, utaris suadeo. Ergo quæ ad articularia uitia quidam exhibere solent, quæ scilicet ualentem incidendã facultatẽ habent, ijs tu quoq; cum nimis obesitatẽ curabis utitor. Sunt porro talia, rutæ semen, præsertimq; syluestris, unã cum ipsis corymbis, & aristochia rotunda, & minus centaurium, & gentiana, & polium. Præterea ex urinam cientibus, ea quæ polientes habent uires, ueluti petroselinũ. Vnũquodq; eĩ talitũ tum ipsum per se, tum uero alijs mista, uniuersa, & extenuare potest succos, & uacuare sunt habilia, partim quidẽ insensibilem per urinas, partim per insensibilem transpiratũ. sed & sal quod ex com bustis sit uipers, potest extenuat. Multicũ cum uel graciliores, uel mediocrius habitudinis essent, ex eiusmodi medicamentorũ potione perierunt, sanguis ne ipsorũ excocto. Ruerant autem ad ea, propterea quod liberatos aliquos articulariis uitijs uiderunt nime scilicet æstimantes quod teperies eorũ qui sanati fuerãt, humidior pituitosiorq; erat, qualis nimirum obesorũ est. In quibus eiusmodi medicamentorum securus est usus. Ipse nãq; iuuenẽ quendam quadraginta circiter annos natũ, oppidoq; obesum percurauĩ usus tum antidoto quæ aduersus articularia uitia est cõposita, tum sale theriaco, ipsaq; theriacẽ, ac reliquo extenuanti uictũ, & pro exercitatione cursu ueloci. Porro preparauĩ hominẽ ad cursum, perficando primũ linteis asperis, quoad cutis ruberet, dein statim cum oleo quod in se digerens aliquod medicamentum habebat, quo etiã post cursum rursus utebar. Talia medicamenta sunt, tum syluestris cucumeris radix, tum althæa, tum gentiana, tum aristochia, tum panacis radix, tum polium, tum centaurium. Per hyemem uero etiã à balneo iam dicto oleo hominem reuixisse profuerit. Verum cibum exhibere non statim à balneo, sed interposito somno conueniet. Quod si uelit etiam rursus ante cibũ lauare, permittes, Magis etiam ad tem pertinebit, si aqua ipsi digerendã facultas insit. Ac si quidem talem aliquam sponte natã habemus, ipsa utemur; cuiusmodi in Lesbo uisitur, à Mitylene sta-

dijs quadraginta; sin minus, ipsi similem aliquā molliorem. Est porro ea quæ in Mitylene conspicitur, & uiribus & colore talis qualis utiq; fiat, si quis siccis rem salis aquæ marinæ miscet. Hæc ipsa aqua etiā hydropicis, & reliquis tumefactis, idonea est: ut pote ualentem desiccās, ita profecto ut præpinguibz ac præciperuis si quis ipsos cogat in ea celerrime natare, nec post largā lauatiōē protinus esse, biberēue, sed somno interposito, aut omnino saltē quietē. Sanē illud est sciendū, atq; ab eo qui oblesatē curat prædicendum, quod aliquando ex multo simul obito moru, & febris hominem tētari est credibile, & quod febris ad rem propositam non aliena erit; utiq; si medicus recte omnia faciat. Etenim perspicuū est, ubi ex lassitudine febricitarint qui ita curantur, quod sopit eorum febre, rursus ad eandem curationis formulam redibunt. Sanē fugere in ijs curādīs conueniet, & uina quæ multum nutriunt, cuius generis crassa sunt: uti uero uel aquosius, id est colore albis & substantia tenuibus: uel quibus mare est admistum.

16 At ubi eos qui extenuati sunt, reficere in animo est, ijs uinū exhibebimus crassum: cibū uero qui succū efficiat crassum, exercitationes paucas, frictio nem mediocrem: ac ut summa cōplectar, omnia iam comprehensibilia contraria moliemur. His uero etiā picari commodum est: idq; tertio aut quarto quoq; die. Quippe id ad carnem instaurandam egregium medicamentū est: adeo si quod singulare membrū hoc uitio laborat, id hoc præsidio restituetur. Ac nobis quidem in omnibus ferme hoc unū satisfecerit: siquidem humectat & calefacit, sanguinis multitudine accita. Ergo nec assidue id egrotati corpori ad mouere conueniet: nec cum conueniet, sape illinire, uerum in hyeme bis, in æstate semel id fecisse est satis. Quibus uero à natali die gracilia sunt membra quædam, ijs etiā mangones puerorū hoc ipso præsidio succurrunt, unā cum certa percussione, quam Græce *ἰσχυρὸν* uocāt. Est porro & illius mediocritas quædā: ut scilicet nec plus iusto, nec minus fiat. Ea talis est. Ferulas paruas ac leues modice illitas, gracilibus partibus incutit, donec modice attollatur: quippe in hoc summa rei est: ueluti Hippocrates de percussione aquæ calidæ dixit. Primum quidem pars intumescit, post gracilescit. Ergo quibuscunq; particulis bonā habitudinē reddere studemus, has & fricare, et perfundere, et percutere, et picare oportebit, tantisper dum intumescat, hoc ubi factū est, protinus desistere priusq; digerit cœperint. Etenim quæ calefactū omnia, sicuti attrahere, ita etiā digerere sunt apta. Si ergo perfes dum quod attractum est, digestū sit, operā luseris. Ad hunc modū mango quidam proxime nates pueri fame consumptas, breui auxit, percussu mediocri quotidie usus, aut saltē alternis diebus: item moderata picatione. Ceterum, quibus totū corpus est extenuatū, ijs lauare quoq; post cibum est idoneum. Veluti autē metus erat, ne tenuantibus auxilijs febris succederet, corpore scilicet immodice per hæc calefacto: sic ijs qui à cibo lauantur, timendum est ne sibi iecur obstruatur, potissimum propter ciborū speciem: quippe cum aliter quoq; obstruere soleant quæ succum crassum gignūt, si quis his liberalius utatur. Vbi igitur aliās id

A efficere solent, multo profecto proprius idem post balneum facient. Incidit tamen ex tali uictu diutius exhibitō, etiā calculi in renibus generatio, quod utiū cur omnibus nō cōtingat, satis patet. Quippe incredibile non est quibusdā, uel densos admodū esse renes, uel perangusta uenarum in iocinore ora: quibusdā cōtra esse habita. Horumq; dignotio nulla planē certa est: sed percontādum assidue ab eo qui iam dicto modo est cibatus, num quis illi grauitatis sensus in dextris præcordijs & circa lumbos sit. Quod si quid tale aliquando senserit, protinus cappari ex oxymelite in principio cibationis, donec cōstiterit grauitas, dabitur. Ad mēbra uero quæ agere reficiēbātur, ac pluscūlū iam refrigerata erāt, usus aliquando & thapsia sumat: aliās ea ex melle membrū liniet, aliās etiā em cerato. Siquidē attrahit ea quoq; partibus quibus superposita fuerit, sanguinis copiam. Quibus autem exiguum aliquid pudendi præputio de naturali deest quantitate, ijs non raro citra thapsiam sola tentione debitum modum reddidi, membranulam mollem firmāq; cuti gūmi illitæ circumuoluēs. Saris autem constat quod etiā membranulæ finē parti subiectæ agglutinari gūmi oportebit. Siquidem & siccatur cito, & sine dolore adstringit. Porro cuti præputij ex interna parte rotundū aliquid ac medio cre supponi prius oportebit: qd uidelicet posteaq; agglutinata mēbranula est, facile eximas. Eorū uero qui thapsia præputiū adducunt, quidam rotundum id ē plumbo fecerunt, ueluti solenarium quoddā. Mox illi extrinsecus præputij cutim circumtendunt, ac molli loro deligant. Fueritq; & id nonnunq; utile, utiq; quibus multa desit cutis. Quibus autē exiguū est quod deest, ijs (ut cōprehensum est) sola mēbranula circumdata sufficiat: ubi autē circumdabitur cuti, & agglutinabitur, subtus imponi solenariū prius oportebit. Ego uero cum nihil horū pressū est, modicum chartæ inuoluens, immittere pro fulcimento præputij soleo: ut postea cum planē cohauserat, facile meiat is qui curatur. Constat uero hoc quoq; uitū ex eo morborū esse genere, quod naturale magnitudinem est egressum, aliās putrescente præputio incidens, aliās ab ipso ortu minore q; par erat cōgenito. Subijcitur autē duplici chirurgiæ rationi: interim in superna pudendi parte circulo inci-

D dute, quod uidelicet eius unitate soluta, eatenus deorsum trahat, quoad glandem cooperiat. Interim uero scalpro ex interna parte qua glandis initiū est, excoriata, mox deorsū tracta, ac deinde (ut supra cōprehensum est) molli quopiā deligata. Dicemus autē & de eiusmodi rationib. in sermōis progressu, æque profecto ut de curtis id genus, quæ *κατὰ τὴν ἰσχυρὰν* Græci appellāt. Quippe ita uocāt quæ in labijs, aut nariū alis, aut aure deficiunt. Nam methodo quādā curantur hæc quoq; primū quidē excoriata utrinq; cute, deinde adductis coniunctisq; inter se cutiū oris, ac utriusq; qd callosum est detracto, mox quæ reliqua sunt adsutis atq; agglutinatīs. Eiusdem generis sunt & quas in maiore oculi angulo *φωιδας* Græce uocāt, utiq; uel impensius minuto, uel prorsus perditō ipso angulo. At prorsus quidē perditō eo, omnino insanabile relinquit uitū. Minuto uero, ijs quæ modi-

ce ad-

ce adstringunt curatur, si tamen totum corpus prius ante purgaueris, dein caput. Sunt mediocriter astringentia medicamenta & quæ & glucio componitur & croco, & quæ nardina vocantur, item in primis quæ ex uino sunt confecta. Ut uero summa complectar, quibus perit aliquid substantiæ, maxime quidem id agendum, ut ei quam simillimam faciendam curemus, si id fieri nequit, saltem aliquid quod eundem præstet usum machinabimur. Erit autem profecto & id eatenus simile. etenim cum ossis tibiæ sæpe excidere portionem magnam cogimur, ad alteram loco eius substantiam producendam, carnem gignentibus medicamentis naturam ipsam prouocamus. Quæ utique inter initia uelut dura est caro: postmodum calli durioris firmitudinem accipit: ac temporis spatio robustior, ad ingressum ossis loco fit habilis. Quinetiam ubi internodia digitorum excidimus, in excisorum loco alteram (qualem prædiximus) naturam prouenire cernimus. Quod autem uenas quoque sensibiles generatas aliquando uidimus, prius est dictum: uerum has non tam similes ijs quæ prius perierant, quam eandem renasci dixeris: ueluti in capitis ulceribus carnē. Cicatrix uero quæ in hac calli modo durata gignitur, ac cuti quidem est quam simillima, cutis tamen non est: quādo & densior ea uisus tactusque sentitur: & ratione, ex eo quod pilos non edit, intelligitur. Hæc igitur si præstō tibi ad manū semper erunt, quæ tibi in curationibus peragenda sint, minime requirēs.

17 Mihi uero iam tempestiuū est ad alia morborum genera transire, sed quibus est cum supra comprehensis societas. Ergo serpens ulcus, quod *εγγρα* Græce dicitur, is eiusdem est generis cum exulcerato erysipellate. Ramex uero, quam *σκιρκα* uocant, cum scirhis. At uitia quæ *δερματις*, & *πικρία*, & *πύλωσις* appellant, ex eo sunt morborum genere, in quibus naturalē aliquid est amissum: æque nimirum ut myrmecia eorū est quæ toto genere sunt præter naturam. Porro triplex omnium horum est differentia. Quædam namque ex mutatione consistunt solidarum partium, sicut myrmecia, & leuce, & uiriligo, & ossis caries, quæ sphacelon uocant, & elephas, & scabies, & lepra. Quædam cum prius omnino non fuerint, postmodum sunt orta: ueluti meliceris, & atheromata, & steatomata: atque alio modo elmyntes, & acarides, & ceria: (ita enim uocant longam latamque elmyntia) omniaque quæ supra diximus in abscessibus quibusdam callosæ substantiæ, aut lapillis, aut ossibus, aut pilis, aut alijs quibusdam id genus similia inueniri. Itaque attentius esse semper oportet in omnibus quæ præter naturam habentur, atque diligenter advertere ex quo ea genere sint, si modo illud recte à nobis dictum est, primā faciendorum indicationem, unde ad omnia quæ deinceps sunt administranda initium capietur, à genere ipso sumi. Herpetas namque biliosis procreat succus. Quo fit, ut eatenus eiusdem sit cum erysipellate generis, atque huius quoque magis etiam cum eo quod exulceratum est. Differt autem ab erysipellate humoris tenuitate. Est enim admo-

dum tenuis qui herpetem excitat, adeo profecto, ut non solum omnes interiores partes, quæ utique carnosæ substantia sunt, transeat, sed etiam cutim ipsam ad summam usque cuticulam: (*ὡς δὲ περὶ αὐτῆς* Græci uocant) quam solam propterea quod ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit, quando si hanc quoque sudoris uice transiret, haudquaquam ulcus excitaret. Quippe id ulcerum quæ ex mordente humore exoriuntur, quæ nimirum spontanea uocant, commune est quod humor qui ea facit, sistitur in exitu ac tardat. Porro ex eo quod alter humor altero sit tenuior crassiorue, ulcerum differentia quæ ex profunditate spectant, proueniunt. Huius certe generis est & quæ *φανερά* Græce dicitur, & exulcerati canceri, quorum omnium communis curatio est, ut inhibeat primū humoris confluxio, post sanetur ulcus. Propria uero cuiusque tum ex membri inuenitur natura, tum ex humoris non solum specie, sed etiā quantitate. At tenuissimus quidem in eiusmodi humoribus est is, qui exulceratū herpetem excitat, crassissimus qui cancerū. Proximū ab his locum occupat quod ad crassitudinē attinet, qui phagedænas creat. Harū species quædam sunt, quæ *χαγώνια* & *τγλέφια* Græce dicuntur. Iam aliæ quædam eiusmodi appellationes sunt, sed inutiles & superuacue. Si quidem ad curationem pernoscit oportet humoris tum copiam, tum crassitudinis tenuitatisque eius modum, tum potentiam: ueluti statim in herpete, quoniam humor tenuis est (ut qui ex genere flauæ sit bilis) ubi summam cuticulam in transitu perripit, utique cum digestus is est, permittit cicatricem ulceri induci. Itaque si quis toto prius corpore purgato, mox quæ influentem humorē reprimant regerantque medicamentis utatur, iam herpetem curauerit. Sin neutrum horum fecerit, sed tantum ea quæ cicatricē inducunt adhibuerit: utique exulceratā iam cuticulā ita sanauerit: proxima tamen illi quo minus exulceretur, non consulerit. Postmodum uero illa quoque cicatrice inclusa, quæ ipsi continua est, exulcerat: idque longo spatio ceumalo ipso serpente fit, donec humor unde oritur, sit uacuatus. Etenim Romæ mulier quædam illustis cum herpete in malleolo haberet, primum quidē medicamento quod algam recipit, est usa, Hoc cum protinus cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis est excoriata, ueluti ex desquamatis. Cui cum deinde superpositū idem medicamentū est, rursus illi continua est exulcerata. Idque ita assidue perrexit, donec ad genu exulceratio perueniret: cū interim quiduis potius pati quam medicamentū quod bilē traheret, purgari parata esset. Itaque etiā, quod fieri in talibus afflueuit, quoniam plerique culpant non culpanda, damnato ex alga medicamentō, aliud admoueri iussit. Deinceps igitur quod ex sandice componitur, utebatur. Ut uero id quoque quod exulceratum iam fuerat, sana uir: quod uero nunc exulcerabatur, non inhibuit, sed iam ad bubones usque uitium ascēderat, ipsa necessitate coacta, serum se lactis sumpturā annuit. Immittentes igitur clanculum minimū scammoniæ, inuisitā purgauimus, ac sanauimus. Ergo cuius

gratia hæc dicta sint, denuo repetamus. Postquam communem omnium quæ sub eodem genere uitiorum sunt, indicationē acceperis: utiq; nō hanc in particularibus exsequeris, sed reduces semper ad differētiā quæ tum affectibus, tum ipsorum causis sit accommoda: sicuti de spontaneis ostensum est ulceribus. Vacuabis nanq; cum qui redunt dat humore, cæterum aliquando medicamēto, quod flauā purgat bilē, sæpe eo quod nigrā: modo eo quod mistæ est facultatis: quod scilicet bilē simul & pituitā educat, ueluti in altero herpetum genere: quem à similitudine quam habet cum milio, *κυσσιγί* græce appellat. Quippe si protinus ulcus facit quemadmodū alter: sed admodum exiguas pustulas, ad speciem milij, quæ ipsæ interposito spatio in ulcus abeunt. Adeo non sine ratione quibusdam uisum est in eiusmodi uitio bilē esse aliquid pituitæ admistum. Incidunt sanē nonnumquam & citra uehemens totius corporis humorum uitium in partibus ulcera, quæ haud difficulter medicamentis, quæ repellendi digerendiq; mistas facultates habent, curantur. Ac repellunt qui dem non solum ea quæ astringunt, sed etiam quæ sine astrictione refrigerant. Digerūt uero quæ calefaciunt. Constatq; quod in generatione ulceris, exuperare debebunt quæ repellendi facultatem habent: ubi non amplius confluūt in ægotantem particulam uitiosus humor, quæ digerunt. Siquidem exiguū uitiosus humoris etiam si quis ad uiscera & magnas uenas retrudat, nullū profectō quod sensu percipiatur, malum committet. At si eius nō leuis quātitas sit, in princeps aliquid membrum aliquando procumbit: ubi scilicet prius naturæ uiribus totum corpus expurgantis non sit, uel per deiectionem, uel urinas, uel cutim quæ totū corpus includit, uacuatum. Atq; fluxæ quidem bilis uacuatio est facilis: pituitæ uero ac potissimū eius quæ crasior glutinosiorq; est, itemq; nigræ bilis, difficilior, quo magis purgantis medicamenti ope indigent. In herpete uero, quoniam tenuis humor est qui id uitium creat, abunde est etiam aliuū leuiter soluisse, uel urinas, per ea quæ id modice efficiunt, citasse. Verum quoniā de medicamento rum methodo proditum etiam aliquid in superioribus est, non pauca autē & in operibus quæ proprie his sunt dicata: satius sit sermonē nihil ultra proferre, quando satisfacere etiam ei qui attentus erit, hæc possint. neq; enim nos ea à Musis accepimus. Verū hominī qui prudens sit, & diligens, & mente exercitatus, ipsa rerum natura quid agendum sit, suggerit. Vbi uero etiam inueniēdi uiam ab alio quæ traditam cepit, huic facillimum est per eam ultra progredi. Huius rei amplum testimoniuū fuerit, quod eiusmodi uiri, artem maximis operibus illustrarunt. Qui uero parum sunt prudentes, ij nihil præterea inueniant, etiam si tota uita infinitos artis effectus cōspexerint. Plurima nāque inueniuntur hodieq; quæ apud maiores nostros non fuere inuenta, ueluti nunc à Romæ quidam excogitauit, quēadmodum acrochordonas & mymecias ore sanat. Verum de prioribus, utpo

te à cute extantibus, minus est mirum. de mymecias uero, potissimū quæ cum summa cute prorsus sunt æquales, mirum uidebatur. Veruntamen has quoq; primum labiorū applicatiōe, celsuū ad se trahebat, atq; à radice euellebat: deinde primoribus apprehensam dentibus totam simul excimebat. Sed & scalpro ad myrtacei folij speciē formatō, & ferramento eo quod *σκληρο πικραχρυσόν* Græci uocant, quispīam manibus exercitatus, facile eas excidat, cum proprijs lineamentis à circumposita cute circumscripta discernantur. Aque uero & ualente aliqua pinna circulo mymecias imposita, ipsam educimus. Debebit porro pinna fistula esse mymecias crassitudinī par, ut eā undiq; prorsus cōstringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsā, celerime ita mymeciam etiā cum ipsa radice totā educet. Constat uero & quod finis ipse pinna quæ eam circulo secabat, nō tenuis modo, sed etiā acutus & firmus esse debet. Itaq; tum galli ueteris pinna, tum uel magis aquilæ, ad hunc usum est cōmoda. Abscindere uero ab his tantū radicem uersus oportet, quatenus reliquæ partis fistula cōplecti mymeciam possit. Sanē ex ipsa statim abscissione, si modo scite fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Atq; hoc quidem ratio inuenit, nō casus. Iam quod hæc uehementer attrahentibus medicamentis sursum uelle, & putrescentibus enecabitur, ratioē ab aliqua est inuentū: ijsdem postea usus, experientia rem cōprobauit. Quædam nanq; etiam ante experientiā fiduciam de se manifeste præbent: ueluti quæ aculei ac telum quod modo infixū sit, eximūt: item quæ nulas, si quæ oculo inciderunt. Quædam ratione certe excogitātur, confirmanatur autem ipso usu. Quod autē facilius etiā per te eiusmodi uias ad curationem cōparandam copiā inuenias, nō tadebit aliquid huius generis exemplū proponere. Nominamus autē id genus in numero particularū uitium. Quoniā enim quædam deficiunt, sicut dens, uel digitus, uel è naso alā, uel auris quepiā particula, uel pudendī pellis: quædā redundant, ueluti sextus digitus, & quæ græce *εξωστωεις* dicuntur, & dentiu ij qui naturalibus adnascunt: adimere quidem quod superuacū est, sanē haud difficile est, aliud uero producere quod simile est quod desit, id in quibusdam quidem est facile, in quibusdā difficile, in alijs planē fieri nō potest. Si nanq; carnosum sit quod desit, haud magno negotio id reficias, atque eius rei in cauis ulceribus tradita methodus est. Sin os sit, ipsum quidem instaurare nō est: cæterum aliud pro eo durum efficere, id licet. Dicitū uero etiam in præcedentibus est de reficiēdis uenis: nepe quod aliquādo nouas alias sensibilibiter progenitas uidimus, aliquādo omnia tantibus non prouenerunt. At si digitus desit, uel tale quippiā, restituere id prorsus non licebit. Sanē proditū & de præputio prius est, quemadmodum id quippiā instauraret. At quæ in naso, uel aure, uel labio sunt curta, ea quidē ut refecisse non licet, ita decorē aliquē his adijcere licet, si quis diuisam utrinq; cutim mox in unū conductā queat agglu-

tinare. Alia uero ratione huic morborū generi adnumeratur atheromata, & steatomata, & melicerides, & ascarides, & ceria, & elmyntes, præterea qui in articulos & pulmōes incidūt calli, quos poros uocant, itemq; qui in renibus & uesica inueniuntur calculi. Quippe in omnibus his cōmunis est substantiæ generatio quæ ante non fuit.

18 Contra sit in alopecia, & ophialia, & pilosi, item caluitie, in quibus amissio particulæ est quæ utilis fuerat. Tanquā igitur in cæteris omnibus, in quibus gigni quippiā uolumus, id agimus, ut naturæ motus liberos minimeq; impeditos reddamus; eodem certe modo & in pilis amissis. Quippe naturæ opus est ueluti in sinuosis ulceribus generatio carnis, itidem in capite & palpebris productio pilorū. Ergo si recordaberis ea quæ in Naturalibus libris nostris de pilorū generatione didici, utiq; ex ipsis amissionis eorū causas inuenies. Siquidem ostensum in his est q; ex succis qui per cutim transpirant, quod limosum est, id pilos tum à principio gignit, tum de cætero ueluti succrescēdo auget. Hoc igitur quoties uel prorsus periit, uel redditū est uitiosum: toties pilos corrumpi est necesse. Corruptuntur namq; & stirpes ipsæ duplici de causa, aliās nutriente succo destitutæ, aliās non idoneo usæ. Ac prorsus quidem perditio eo qui pilos alat succo, caluities oritur. Eodem uitatio, tum quas *ἀλωπεκία* græce uocant, tum alopecia proueniunt. At primum quidem ex naturali eorum moderatione, etiā alienam à natura causam inuestigabis. Ab hinc curationis rationē inuenies. Quæ utiq; per indicationes omnibus iam dictis, in quibus uel aliud quoduis uitium, uel etiā ulcus ex humoris uitio incidit, cōmunes perageat. Siquidem & in habere quod influit, & absumere ac digerere quod iam ægotantē locū occupauit cōueniet. Ergo ceu in ulceribus illis purgationē nocentis succi primū adhibuisti; eodem modo in pilis ipsis ab hac primū curationē inchoabis, scilicet diligenter prius æstimās quis color cutis sit, cuius carnis corruptos pilos. Nā si is albidior q; pro naturæ habitudine, pituitos humoris purgationē exhibebis; si pallidior, eiusmodi bilis purgationē, non secus q; si nigrior conspicitur, quæ nigrā detrahant bilem offeres. Sanè ad uitiosi humoris speciē certius agnoscendam, non leue tibi adiuuentū præcedens uictus cōferet; præsertim intelligenti qui nam ciborū nigræ bilis succū colligant, qui nam pallidæ, & pituitæ. Ergo cum iam planè purū ex purgatione corpus existimas; eum qui in cute cōtinetur humorē, digerentibus medicamentis discutias; sic tamen ut in his caueas, ne adeo calida acriq; admo ueas, ut cutis exulceret. Quin etiā ea quæ ualenter sicant, cauere cōueniet, ne uidelicet cum uitiatō humore etiā utilem qui adfluit, absumas; ueluti in caluitie sit. Hæc igitur ipsæ aduertēs, admissi prius medicamentis quæ alopecia sanarent, exiguum thapsiæ. Deinde cōsiderans quotidie quæ admodū ægotantis natura ab hac esset affecta; ubi uel tumefactā plusculum, uel quodāmodo excoctam uidisti, illo quidē die medicamentū abstinui,

Galen,

A illeui autē particulā uel galli uel anseris liquato seuo, propterea quod hæc magis tenuiū sunt partū, & altius descendunt. Deinde postero die, siquidem aliquid iam dictorū remāserat, simili modo illeui. Sin nihil tale apparuerat, rursus medicamentō sum usus. Atq; ut id alte demitteretur, etiā cutim prius linteo infricui, quoad manifeste rubra fieret. Verum si à balneo uti eiusmodi medicamento uoles; idipsum ex balneo factum cernes, quod prius ex frictione habebas. Iam eos quoq; quibus periere ex cilijs pili (quos græce *κίλλες* nominant) simili bus genere medicamentis sanabis. Deliges autē materiā oculis idoneam, nec per negligentiam committes, ut medicamentū intra tunicas eorum cōfluat, itaq; sicca tutiora sunt, de quibus æque ac de cæteris in nostris De medicamentis operibus est proditum. Nunc enim (quod dixi) abunde est sola genera medicamentorū prætermittā particulari materia, transcurrere, quod minus de his idē idē dicere cogar. Ergo quæcunq; ab ipsa naturæ moderatione sunt aliena, ea tota tollere conueniet. Quæcunq; uero sub hac se tenet, ceterū quodammodo corrupta sunt, ea restituere quatenus licet, oportebit. Sanè dictum à nobis est, aliqua ambigua naturæ esse. Nec illud nō dictum: quod eorum quæ aliena sunt quædam tota substantia sunt aliena, Logica scilicet inquisitionē, nec ad curationes in quibusdam affectibus hoc fane loco perinde utili. Siquidem pterygium à sanitatis habitu alienū esse, patere cuius arbitror. Non tamē idē substantiæ ratione, quemadmodum atheroma & meliceris, est alienum. sanatio uero huius quoq; dum paruū adhuc est & molle, per ea medicamenta quæ detergēt, perficitur; cuius generis sunt quæ trachomatia uocāt. Vbi magnū durumq; euasit, chirurgiam postulat. Similiratione & aquularum (quas *ὕδαριδες* uocant) quæ magnæ sunt, chirurgi curabis. Quæ paruæ sunt, siccantibus medicamentis iuuantur. At *χελάριον* (est em̄ id quoq; ex uitijs quæ oculos infestant unū) cum toto genere alienū à natura sit, auferrī postulat. Ad eundē modum & pus ab oculis, quos *ὀφθαλμὸς* uocant. Verum id plerunq; medicamentis digeritur. Hypochyma uero iam incipiens digeritur, ubi diu cōstitit, non potest. Aetate uero nostra ocularius quidam medicus, cui Iusto nomen erat, etiā cōcusione capitis multos *ὀφθαλμὸς* sanauit. Collocauit enim eos in sella rectos, ac capita eorum utrinq; à lateribus apprehendens, mox quatiebat, adeo ut manifeste descendere pus ipsi uideremus. Mansit autem horum pus deorsum propter grauitatem substantiæ tameti hypochymatis nequaquā manentibus, nisi admodum ea quis diligenter impingi cogeret. Etenim leuius est, ac ut ita quis assimilet, nebulæ similis hypochyma quā pus: quantum horum quoq; ipsorum quædam (hypochymatum dico) serosioris humoris sunt. Hæc autem punctiōe ad præsens discutuntur. Interposito tamen haud longo spatio, ceu limus quidam deorsum fertur. At quādā pus quod in oculis est, digerere placet, colligens quæ myrrham habent, maxi-

tom. 6

q me

me utemur: quæ utiq; & *ἰατρικὴ* Græci proprie uocant: hæc certe minus, sed reliquis melius faciunt quæ *ἀσθενητικὴ* uocant. Quæ uero impense siccât, ad præsens certe ualenter uacuât: sed quod reliquum est, ita cogunt, ut ægre resolui possit, ueluti de scirrhis tumoribus prius est comprehensum. Subinde uero multum simul puris uacuabimus diuisa tunica ea quæ cornu est speciei paulo super locum quo committuntur inter se tunicæ uniuersæ. Nominant porro locum græce alij *ἱετῆρ*, alij *στέφανος*, id est coronâ. Quo fit, ut hoc quoq; uitium tribus subiiciatur uacuandi modis, & chirurgiæ quæ simul multum aut totum expellit, & per medicamenta quæ paulatim, & ei qui ad aliud ignobilior rem transfert locum, ueluti in concussione. Sunt

ARGVMENTA

Cap. I. Non satis esse in genere nosse naturâ hominis, sed uniuersiuicq; singillatim etiam teneri oportere, si fieri possit: aliter enim cõmunibus præceptis utendū esse, quâuis usu secundū locū teneat, cum particularia ut oc-
casio ex quistita & quantitas remediorū scribi nequeant.

De Mæstheo. Diuisionis ratio: quod mala diuisione multorū errorum causa sit. Quæ in singulis particularium obseruari debeant. II. De febribus ephemeris, id est diarijs et simplicissimis. Causæ, Cura, Quod diffi-
culter dignoscantur. Quæ communia febriū signa sint, quæ diarijs particularia. Quomodo ipsas inter se diarias, earūq; causas dignoscamus, licet tacentibus ægris: Et primum quomodo differant quæ sunt à tristitia, cura, ira, & uigilia: deinde quō differant quæ sunt à lassitudine, cutis densitate, quæ cõmunia sint. III. De diarijs quæ sunt ex bubonibus, seu inflammationibus glandularum. Et quæ omnibus diarijs cõmunia sint. Curatio cõmunis & singularis. febres quasdam symptomata esse partium inflammationum, de quibus postea dicturus sit. IIII. De febribus putridis quæ ex humoribus nascuntur, quarum quædam cum symptomatibus miscentur, aliæ sjs carent, de quibus iam dicetur. Quot diebus febris idea nosci queat. V. Signa febriū intermittentiū: Et primū tertianæ & quartanæ distinctione: deinde peculiaria tertianæ signa. VI. Indicia quartanæ, primū è pulsus deinde caloris modo, &c. VII. Notæ quotidianæ à calore, pulsus, &c. Qui possimū et obnoxij sint, Quomodo declinent. Vrinæ quales in omnibus intermitentibus. VIII. Indicia febriū continuarū. De longitudine earū. Comparatio ipsarū inter se, quod ad durationem & periculum. Victus generaliter in febribus quomodo instituentus. Tertianæ exquisita & nō exquisita differentia & exempla. Quartanæ quoq; & quotidianam aliam esse exquisitam, aliam non. Item in febribus cõtinuis tum alia esse consideranda, tum omnia scilicet à quibus indicationes sumuntur, tum præcipue quantitate morbi & uirium, quorū cognitio usum magis q̃ doctrina paratur: ad prædictionē sanē necessaria sunt. IX. Tertianæ ueræ cura per bilis euacuationem, balnea, & uictus rationem. X. Tertianæ nothæ curatio per uictus rationem, balnea, phlebotomiā, uomitū. XI. De cura quartanarum per uictus rationē in principio, & euacuationē post concoctū morbum. XII. Cu-

profecto (ut dixi) ex genere eorum quæ tota substantia præter naturam sint, & ascarides, & elmyntes, siue æe teretes sint, siue etiam lata. Quocirca & prorsus eas expelli è corpore cõueniet. Expelles autem si prius enecaueris. Necabis autem amaris medicamentis. Viuentes namq; obstitunt intestinis adhærētes: at mortuæ expelluntur una cum stercore. Expelluntur cum hoc etiam uiuæ, sed stupefactæ, & ut ita quis dixerit, semimortuæ factæ. At teretes quidem absynthium perimere potest. Lata uehementiora medicamenta desiderat, cuiusmodi est & filix. Pari modo quæ *ἀσκαρὶς* græce dicitur. Verum de medicamentorum copia dicere non est presentis propositi. Quare hic iam huic quoq; libro finem imponamus.

LIBRI PRIMI

ra quotidianæ. XII. De cura febriū cõtinuarū, quæ carent accidentibus: Deinde illarum quæ cum accidentibus sunt: in quibus diuisiones octo fecimus. Et primum quid agendum, si os uentriculi male affectum sit: item si alius profuerit: hic nihil opus erit euacuationē illic stomachus antea roborandus. Deinde, Si cõuulsio febrem comitetur, aut uigilia uehemēs, aut dolor cū febre sit: Aeris quoq; tepērie tanquā symptoma quoddam considerandam in euacuatione: Item regione, corporum aegri, temperamentum eiusdem, habitum corporis & ætatem, Si symptoma duo uel morbi duo contrarias indicationes exhibeant, fortiori resistendum altero interim haud neglecto. Post hæc enumerat omnes animi defectionis causas. Quomodo confestim omnias cuiuscunq; partis euacuationes animi deliquisq; currere oporteat, præcipue per extremorum deligationes, uinum, epithemata, balnea, aerem. De animi defectione ob defluxum in uentrē. Cura eorum quos animus ob multitudine in aliquam deficit: & mulierum ob uteri affectus sursum uel ad latera uergētis: Item ob stomachi imbecillitatē. Si uitioli humores in stomacho liporhythmiam pariant: & primum de mordenibus, deinde de pituitosis. Si animus deficiat ex magno frigore uel calore: inflammatione uel prauitate febris, aut ex siccitate. Ex obstructione nobilium membrorum ex ruptura uel sectione abcessus: item ob aquam hydropicorum uniuersim euacuata. Si deniq; ex animi affectu aliquo, Si ex uulnere, Si ex colico autilio, aut uirū imbecillitate animus deficiat, quomodo curetur. Item quomodo noscātur uires animalis, uitalis, & nutritiua.

XIIII. Varj dolores capitis in febribus diuersas ob causas quomodo dignoscantur & curetur. Et primum de differentijs notisq; singularum. Deinde particularim, quomodo curetur dolor capitis ob uisus corporis repletionem. Cura dolentis capitis ob imbecillitatem, reuulsione, repellentibus, postea digerentibus & euacuantibus. Ob magnam febrem, remedia instantis crisi non adhibenda. Crises diuersas pro febrium diuersitate fieri. Crises mox futuræ signa. De criticis diebus: De accidentibus crisi comitantibus. Sanguis fluor quando sperandus, & quomodo sistendus. Argumentum sequētis libri & de phlegmones uocabulo.

CL. GALENI DE ARTE CV RATIVA SEV RATIONE MEDENDI AD GLAVCONEM LIBRI DVO.

NICOLAO LEONICENO INTERPRETE.

LIBER PRIMVS.



QVOD quidem nō com-
munem tantū omnium
hominū naturam me-
dicū cognoscere oportet
dū Glaucō, sed & u-
niuscuiusq; propriā, &
dudum ab Hippocrate
recte traditū est, & nos
in ipsiſ artis operib. (ut
noſtri) circa id ſufficiē-

ter ſtudiuiſ. Non tamen propriā ſingulorum
naturā aque atq; communem poſſibile eſt ſcribere.
Verum ſcripta contrario modo ſe operib. ha-
bent, tum in plurib. alijs rebus, tum præſertim in
hiſ quæ ad præſentem pertinent intentionem. Pe-
tiſti em̃ à nobis ut tibi uniuerſalem quandam me-
dendi uiam ac rationem, quaſi per delineationem
& quoddam compēdium oſtenderemus; hæc au-
tem qualitate, & ſingulorum medicaminū quan-
titate perficiuntur, necnō & modo eorū uſus &
ex temporis ocaſione, quæ præ omnib. eſt co-
gnitiſ difficiliſſima, circa quam præcipitem exiſten-
tem, quemadmodum quodam in loco ſcribit om-
nium bonorū nobis author Hippocrates) uidet
plerūq; medicos non modo uulgares, ſed & præ-
cellentes aberrare. Quōd uero magni etiam mo-
menti ſit, ſi quantitas bona conſiectura uiriſus ac-
comodetur, idem uir pariter ſcripſit. Cum igitur
ad recte medendum plurimū conferre, & tempo-
ris ocaſio, & auxiliorum quantitas uideatur, in-
uenies autem hæc unicuiq; ægrotanti propria, ni-
hil autem proprium poſſit ſermōe explicari, hoc
pactio quod commune eſt cogimur ſcribere, quā-
uis id ſit uſu ſecundū. Nam & quōſdam aliquādo
ægrotos uiſimus, cum quib. dum ſani eſſent, nō
eram. uſerati; quo ſit ut neq; quem colorē, quam
habitudinem, aut natiūm calorem, aut quem ar-
teriarum pulſum à natura habuerint agnoſcamus;
quæ ſi ſciremus, magnitudinē morbi ſatis aliquan-
do iudicare poſſemus. nam quantum unum quod-
que à naturali ſtatu recedit, ad tantam morbus ma-
gnitudinem peruenit; quātum uero recedit, poſ-
ſibile eſt ſcire ei, qui naturalem ſtatum exquiſite
cognouerit. Cum igitur hoc in ipſiſ fuerit nobis
ignotum, ne omnino hæſitemus, ad cōmune con-
fugiſ, quem uis ad uſum ſecundum locum ob-
tineat, hic uero artifex plus aliquid quā hī qui
arte carent aſſequitur. Quōd uero hoc ipſum plus
ſit, primus omnium quos nouiſ, & hoc memo-
rauit Hippocrates. Plenius autem de hoc ſcripſe-

Galen.

runt qui Hippocrate fuere poſteriores, atq; illiſ
ſcripta accurate legerunt, ex quorum numero u-
nus fuit Mneſitheus Athenienſis, uir tum in alijs
omnib. quæ ad artem pertinent, ſufficiēter do-
ctus, tum uero qua uſa ac ratione medendi ſcien-
tiam oporteat exercere, nemini peritiſ ſecundus.
Hic igitur Mneſitheus à primis atq; ſupremis in-
cipiens generib. putauit ſecari illa oportere in
alia genera ſpeciesq; & differentias; hæc rursus in
alia diuidi, ac denuo iſta eodem modo, donec ad
talem peruenerim. ſpeciem, poſt cuius diuiſio-
nem ad unum numero & indiuiduum peruenie-
mus. mihi uero qui ad te ſcribā expedit breuiſ
meam explicare ſententiam. Nam ridiculus u-
deri poſſem, ſi tu te uelim docere, tanquam non
multo antea à Platone illa didiceris. neq; enim ut
te docerem quam uiam ac rationem in diuiſioni-
bus ſectari oporteat, hæc uolui meminſſe omnia;
ſed quoniam mihi ad ſequentia plurimū conduce-
re exiſtimaui, & cum à me exigeres edſcere cau-
ſam ob quam medicorum plurimis aberrare con-
tingit, non aliter tibi oſtendere poteram: etenim
quæ in alijs hæreſib. contingunt errata, & quæ
medici in ægrotantiū curatione delinquant, hanc
primam atq; præcipuam cauſam habent, diuiſio-
niſ ſcilicet prauitatem. Quidam enim in primis &
ſupremis generib. ſtant, ſolū quæ ab illiſ ſumun-
tur indicationib. contenti, quidam uero uſq; ad
aliquid diuidunt, non tamen uſq; ad ſinem perue-
niunt; nonnulli uero etiam uitioſi utuntur diui-
ſionib. qui uero & omnia quæ ſunt ſecūdam na-
turam & quæ præter naturam, hoc diuiſionis arti-
ficio completitur, atq; ab omnib. ſufficiētes ſu-
mit indicationes; hic ſolum, quantū humanis per-
mittitur uiriſus, medendo non errabit, illos qui-
dem quorū habet notiſſā, melius curabit, q̃ alios,
ignotos uero proxime illiſ quoad fieri poterit, ad
ſanitatē perducet. Si quis enim primū diſtinxerit
eam quæ ſecūdam ætates differentiā, deinceps
autē eam quæ ſecundū temperaturas atq; poten-
tias, cætera q; quæ in hominib. inſunt, colores di-
co, atq; calores, habitudines, pulſus, motiones, ex-
ercitia, aſſuetudines, atq; animi mores, hiſ quoq;
adiunxerit eam quæ maris eſt à ſemina differen-
tiam, & quæcunq; ad regiones, & temporū perti-
nēt ſtatus, aliasq; eius qui nobis circūſumſit aeris
cōſtitutiones recto modo diſtinxerit, hic ad pro-
priam laborantis naturā agnoſcendā proxime ac-
cedet. ſed ex hiſ nonnulla quidē in libris De pulſi-
bus, nonnulla uero in hiſ in quib. agit De tempe-

tom.

q 2 ratu-

raris sunt determinata: sicuti quæ præter naturam sunt, uniuersa quomodo inter se & speciebus & generibus differat, in libro De passionibus, est præstinum. Nunc uero de his solum ægrotis dicere proposuimus, quorum natura antequam morbum contraherent, nobis erat exquisitè perspecta. Cum quibus tamē & reliqui omnes intelligent quæ nobis crāt ignota, nihil igitur difficile ab eo quod est perfecte distinctum, id quod non tale est inuenire.

De febribus ephemeris. Cap. II

Initium igitur sumemus a febribus: quoniam tu in his præcipue curandi artificii habere cupiebas. Et primum quidem de his sermonē habeamus quæ simplicissimæ sunt, quas Hippocrates ephemeræ, id est diarias, appellat. hæc uero sunt quæ propter lassitudinem eueniunt, & ebrietates, atque iras, furores, atque mœrores atque alias animi curas uehementes: & quæ ex glandularum inflammationibus febres ortui habent, ex hoc genere sunt, præter quod si non absque ulcere fiant manifeste: tunc enim suspitionem afferunt et nullo modo mitescunt: & uigiliæ plerumque simplicem febrem induxerunt, sicuti frigus factio, & exustio quandoque. Atque hæc omnes febres soluentur facillime. Oportet siquidem eos confestim ducere ad balneas, atque ad cōsum etiam uictus rationē. Quandoquidem qui pertrixit illum sermone medicorum triduanum terminū admittunt, sepius acriores febres effecerunt, quamuis & aliter præterea delinquant, quemadmodum cernis ex eis plures in quolibet ingressu delinquentes, ueluti manufactas planè facere ægritudines. Sed cura quidem harū febrium in propriū est, sed earum cognitio maiorē exigit diligentiam, de qua nemo ante nos, quantum oportuerit, scripsit reliquit: quare minus mirandū complures tantū in medicinæ operibus aberrare, quantum etiam cognitiōe falluntur. Sæpius enim quidam ab initio casu aliquo in graues morbos incidunt, ueluti uino pleni, aut sole exusti, aut frigus facti, aut lassitudine oppressi, aut uigiliis passi, aut ira concitati, aut quauis alia causa quæ per senescere natura sit apta, correpti: deinde totū in causa antecedente consistere, neque aliam abesse affectionem arbitrati, circa uictū negligentius se habent, adeo ut seipsos lateant, in insanabiles aut ægre curationem admittentes morbos prolabi. Hæc igitur ante omnia curare oportet, (quemadmodum Hippocrates admonet) non solum futura præcognoscere, sed præterita etiam atque præsentia. Nam & quod nunc proponitur, ad eam artem attinet partem, quod pro uiribus manifeste trademus. Neque enim parua est differentia, si laueris iam ægrotitem, & securum esse iusseris, aut eum per omnem custodiam securitatemque trauxeris. Cum igitur ad ægrum accedes, primum a maximis quæ circa ipsum sunt consideratio incipienda, deinde & ab alijs, adeo ut nec minimū ali quod omittamus: nam ut magis aut minus ei quæ sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febribus tantibus signa, in pulsibus atque urinis consistunt. His uero addere oportet, & quæcumque alia

368
circa faciem Hippocrates scribit, accubitus quoque, & respirationē, item ea quæ per superiora uel inferiora excernuntur. Et si quid aliud accideret circa aliquam corporis partem aut operationem consistere uideas (qualia ille mille in multis scripsit) neque ex his ullum aliquid negligentè prætereas: hæc quidem omnibus febribus communia sunt. Itaque in his etiam simplicissimis de quibus præsens est sermo, nihil horū relinquere oportet. A postquam ex pulsibus atque urinis febri naturam perciperis, cum pulsus nullum inflammationis signū habuerit, neque omnino inequalitas in una arterie cōpulsione apparuerit: aut si hoc affuerit, omnino sit imbecille; urinae autem omnino similes his quæ secundum naturam se habent, aut non multum à naturali statu recesserint: tunc & ad omnia illa quæ ante a nobis sunt dicta, accedere oportet, & cum ueluti chorus quidā omnia concinne loquantur, tunc etiam fidere oportet. ac si libeat interrogare nunquid aliqua manifesta antecesserit causa, si quid enim huiusmodi æger fateatur, expectata prima febris solutione, statim oportet lauare, cum tunc certior tibi sit facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriarū motus in hoc in totum assimilatur huic qui in sanis deprehenditur, cum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur, neque si multum temporis inter primæ accessionis finē & secundæ principium intercedat, quemadmodum in tertianis atque quartanis. In illis enim febris remanet signum: in ephemeris autem in totū aboletur accessione cessante: plurimis uero earum & humidū quidam uapores, & quibusdam etiam sudores optimi apparent, aut omnino quidam plurimus ueluti uapor ex intimo corporis exit. Verum urinae quoque multo nunc meliores, quæ circa febris principia uidebuntur: & si capitis aut alterius partis dolor simul inuaserit, neque hic amplius persistit. Agrotantis quoque in tolerando facilitas, magnum & ipsa signū, tantumque signū quo quoddam ultra omnia alia signa febris bonitatem tibi indicabit. Et si diu lauantur, neque horror insolitus molestauerit, neque alia molestia affuerit, & si post balneū deinceps bene se habere perseueret, tunc ne uerearis cibū offerre. Vinū quoque sine formidine ad potandum exhibe, adhibito tamen, ut præsentia exigunt, modo. Nos alit, ut te non latet, eis causam quæ antecesserit solemus dicere, neque sustinemus ut de illa ægrotum interrogemus, quod maximū est argumentū, illud non errare qui talem sit a deus facultatē. Si uero remanentibus adhuc animi affectibus consideratio habeatur, tunc ex pulsibus maxime tamen da cognitio, quemadmodum in libris De pulsibus scriptum est, post hos uero & ab alijs seire querendum. Quod si illi iam quidē cessauerint, remanet autem affectio, parū quidē ex pulsibus habebis indicium earū quæ febre attulerunt passioni, sufficit autē tibi & sine pulsibus reliqua. Cōmuniter quidem omnibus urinae fuluæ, adiungitur uero his qui propter tristitiam febricitant, acritudo potius, & abundantia calor: quemadmodum & diuerso, his qui propter furorē, sed & extenuato corporis,

in his

in his quos tristitia quam in his quos cura vexauit
 conspectior existit: oculorum præterea cavititas ac
 quædam inconsueta decoloratio. Hæc quidē sunt
 & in alijs, qui quouis modo diu cogitant, com-
 munita. Maxime autē & ex oculis distinguere o-
 portet: nam ex his etiā in sanis animæ mores pos-
 sumus coniectare. At in ægrotis si quis diligenter
 inspicere queat, sunt indicia certiora, sic quidem
 eos qui propter disciplinas aut cōtemplationem
 aliquam diu cogitarunt, ab his quos tristitia corri-
 puit discernere oportet. At qui uigilarint, distin-
 guere oportet ex forma decolori. Nam in ipsis fac-
 ies sublumens, & oculorum motus indicij præ-
 bet, utx enim palpebras attollunt, inest etiā pal-
 pebris humiditas. Nam qui tristantur, aut cogita-
 tionibus detinent, his exiccat̃ur. Cavititas uero est
 cōmune accidens omnibus, moeroris, uigilijs, cogi-
 tationibus, non tamen furori: in hoc enim neq; o-
 culorū cavititas, neq; decoloratio manifesta est, &
 plus caloris, atq; celerius ex imo prorumpit, neq;
 pulsuum magnitudo destruitur, quemadmodum
 in uigilijs, tristitia, & cōgitationibus. quare hæc à
 furore apertissimè distinguunt̃: inter se uero quē-
 admodum diximus antea. Eorū autem qui ex las-
 situdine in febrem inciderunt, cutis est licciōr q̃
 in alia aliqua ephemera febre, sed hoc quidem o-
 mnibus ex lassitudine febricitantibus commune
 existit in tempore accessiōis donec in uigore cō-
 sistit: post hoc uero pluribus, modo non sint supra
 modum labore uexati, quædam humiditates, aut
 calidus uapor ex intimo corpore effertur, quibus-
 dam uero etiam postquam febris cōsistere desuit,
 siccitas perseuerat, quod maxime accidit his quos
 superfluus labor oppressit aut frigus, aut simul cū
 labore sunt à sole deusti: & quidem pulsus nō eo-
 dem in utriq; modo se habet, quia parui quidem
 his sunt, quos superfluus labor uexauit: in alijs ue-
 ro magni. Quæ uero cute condensata accidunt fe-
 bres, (condensatur autem hæc aut ex frigore, aut
 ex qualitate aliqua, quæ uim astringendi habet su-
 bito ei adueniente, uelut illi qui aqua aluminosa se
 lauerint accidit) hæc quidem ex omnibus febris so-
 læ sunt astricta passio, has uero tactu cognoscere
 licet: quemadmodum & squallidas febres, & quæ
 ex laboribus & combustionibus fiunt. Nam neq;
 harū densitas hos queat latere qui tactum habent
 exercitati, sed & caloris motus nescio quo pacto
 crescit ac insurgit, qui mitis quidē in primo tactu
 sentitur, acris autem multū si plusculum immore-
 mur. Non tamen & his urinæ sunt fuluæ, neq; cor-
 poris moles cōcidit, neq; etiam oculi caui atq; ari-
 dissimæ, quoniam etiam quibusdam humectima-
 gis atq; prominentes apparent, quàm hi qui secun-
 dum naturam se habet. Neq; sunt pulsus minores,
 cuiusmodi in moeroribus, curis, aut uigilijs, aut im-
 modicis exercitijs apparent.

De Febribus quæ fiunt ex inflammationibus glandu-
 lularum. Cap. III

Febres quæ ex inflammatione glandularū fiunt,
 pulsus habent maximos, ueloces, atq; frequētes,
 plurimusq; illis calor inest, ac postquam febris cō-

Galen.

A stiterit, statim ex profundo quædam emergit hu-
 miditas, calida quidem sed mitis, acris etenim &
 mordax huius generi febrium inter omnia alia mi-
 nimè adest, atq; ut plurimum facies rubicundā illis
 & magis tumens, urinæq; subalbida. Communis
 aut̃ omnibus huiusmodi febribus est pulsus æqua-
 litas. nam pauca admodum ex his febribus eam
 quæ in uno ictu inæqualitatem ostendit, & neq;
 ipse satis aperte ac manifeste illam præ se ferūt. Ta-
 lia quidem sunt ipsarum indicia. Curare autem o-
 portet omnes quidem balneis. At qui ex densita-
 te cutis aut glandularum inflammatione febricitat,
 si in aere balnei immorari iusserit, haudquaq; no-
 cebis, reliquos omnes q̃ citissime oportet ab aere
 semouere: si uero diutius in aqua immorari uolue-
 rint, permittere: oleo autē tepido & multo & ma-
 nibus mollibus perfricare quamplurimum, atque
 hos præferim qui ex lassitudine febricitant: scē-
 do autē loco, qui meatus habet astrictos: & tertio
 qui inflammationem glandularum patiuntur, sæ-
 pius autē istos lauare in quantum licuerit. cibum
 autem assumere qui ex labore febricitant possunt
 multoties, nō æque tamen qui ex densitate cutis
 aut glandularū inflammatione laborat, at his utriq;
 tenuis uictus est optimus. Qui uero ex lassitudi-
 nis febricitant præcipiendum est, ut cibos assumat
 concoctos faciles, ac cruditatem præcipue deuitet:
 sed & uinum potare quantum possunt conuince-
 re, sunt permittendi. Mensuræ autem ratio, quem-
 admodum in alijs omnibus ex uiribus & ætate su-
 mitur ægrotantis, necnon & ex naturali tempera-
 tura, & præterea ex consuetudine, & anni tempo-
 re, & regione, atque alijs huiusmodi. Qui uero ex
 glandularum inflammatione febricitant, arcendi
 sunt à uini potu, donec inflammationes soluantur:
 At qui cutis foramina habent astricta uel perfrige-
 ratī sunt, si nō multū hoc affecit laborē, neq; plen-
 um corpus habeat, nō sunt à uini potu prohiben-
 di. at qui pleniorē corpore sunt, uel multū perfrige-
 ratī, prohibere utile est. Qui uero ex uigilijs, aut
 aliquo animæ affectu febricitant, postq̃ balneau-
 ris, cibo humidō, ac boni succi reficere expedit: ui-
 num uero omnibus, sed præcipue his qui uigiliam
 passi sunt, intrepide offerre nisi capitis dolore pre-
 mantur, aut pulsus uenarum in temporibus sen-
 tiant. Liquet autem quod etiam in alijs eadem ca-
 ueda sunt, sed & ijs qui ira aut moerore aliquid, aut
 cogitatione febricitant, uinum est exhibendum,
 & qui furore perciti fuerūt quādo omnino ab affe-
 ctu quieuerunt: prius uero periculosum uti uino.
 tentare autem oportet & cōtrarium semper asser-
 ere ei quod molestat, lassitudinē quidem quærit: ui-
 gilijs uero somnū: iræ autē, & furori, atq; tristitiæ,
 in sermonibus, actionibus, spectaculis, narratio-
 nibus, animi iocunditatem. Sic qui cogitatione la-
 borat, omnino ratiocinationes omittat, & qui ex
 glandularū inflammatione febricitat, prius huius
 curationi intēdat, ac multo prius ulceris unde ori-
 ginem habuit. Hæc quidem febriū ephemerarū
 indicia atq; remedia sufficienter se habet: reliquæ
 uero febres nonnullæ ex inflammationibus, non-

tom. 6

q 3 nul-

nullæ ex humoribus accendunt, & quæ ex inflam-
mationibus fiunt, sunt ueluti quædam accidentia
parui phlegmone laborantiu, & morbus magna
ex parte ab instrumento pariente denominatur
phrenitis, aut peripneumonia, atq; pleuritis, aut
aliquid tale, sed de his postea dicemus.

De febribus putridis. Cap. III

At quæ ex humorum putredine febres accen-
duntur, ab hoc ipso nominantur febres, & sunt non
accidentia morborum, sed ipsi morbi: ex his uero
nonnullæ quidem sunt sine accidentibus, quæ &
mitissimæ sunt: quædam uero cum accidentibus
infestæ. Nos uero de prioribus dicamus febribus
quæ accidentibus carerent in quibus maxime si fieri
possit primo die qualis sit febris an acuta uel lon-
gi temporis est cognoscenda, & utrum ex his quæ
intermittentes dicuntur, an continua. quod si pri-
mo statim die certa cognitio haberi non potest, se-
cundo saltem febribus speciem inuenire tentandum:
quod si neq; in hoc aliquid firmum aut stabile scia-
tur, in tertio saltè aliquid, manifestius apparebit:
nam pauca omnino sunt, quæ, ut exquisitè digno-
scantur, quartum desiderant: ego uero quam bre-
uissimè potero indicia explicare tentabo, ex qui-
bus speciem febris intelliges; quamuis de istis lon-
gius ac manifestius alibi disseruimus.

Signa febrium intermittentium. Cap. IV

Quæ igitur cum rigore inuadunt, non solum ex
earum numero esse iudicabis, quæ per circuitum
infestant. Tertianæ enim atq; quartanæ in totum
cum rigore faciunt accessiones, sed tertianæ qui-
dem in primo insultu cum nimio sæpe rigore inci-
piunt. Quartanæ uero non uidimus cum uehemen-
ti rigore incipientem, sed post tempus magnitu-
do illi superuenit, præter id quod neq; statim ab initio
hæc febris solet inuadere, sed alijs quæ anteces-
serint, subsequi. Quartana itaq; eas quæ errabundæ
aut erraticæ dicuntur, insequitur: quotidiana uero
intermittens raro aduenit, quin os uentriculi pa-
tiatur: quemadmodum quartana ex male affecto
splene generat, tertiana ex iecore laborante. Quæ
quidè cum ualido rigore incipit, magis febris ter-
tiana quæ aliqua aliarum febrium fore speratur. Si uero
al, quæ postea dicuntur signa attestentur,
hanc proculdubio in prima die tertianam esse co-
gnosces. Quod si cum paruo rigore inceperit, tunc
magis alia signa attendere mente oportet, quoniam
non quotidiana intermittens tantu atq; quartana,
sed etiam hemitriteus aut aliqua alia ex continuis
esse potest: alia uero signa & ex caloris qualitate
& quantitate, & artenarum motu sumuntur, ex
ipsa etiã rigoris qui sentitur forma, & anni tempo-
re, & regione, & temporis statu, atq; ex natura &
ætate ægrotantis, & ex præcedentibus causis, &
his quæ comitantur. Nam calor quidem multus &
acris esse debet, pulsus autè magni, ac calidi uehe-
mentes, ueloces, atq; frequentes, omnis inequali-
tatis præter quæ febrilis expertes, rigor autè ueluti si
à realiqua acuta plusquã frigida cutis pugeretur,
cum hi qui quartanã aut quotidianã intermitten-
tem patiuntur, potius frigidu rigore sentiant; tem-

pus autè anni æstiuu, sicuti & locus, & præsens co-
stitutio calida; sit autè & ægrotantis natura calidior,
biliosior, & ætas iuuenilis, & exercitationes potius
quæ ociositas antecesserint, magis deusio quæ frigefac-
tio, & parcitas cibi potius quam crapula, uigilia
quoq; inuiciora atq; lassitudines, & intensæ cogi-
tationes ad eundè perducunt effectū. Quod si mul-
tos alios eodem tempore labores cõtingerit ter-
tis corripit febribus, hoc quoq; maximu præter ea
quæ nuper diximus, signu erit, quod si hæc omnia af-
fuerint indicia, aut saltè quæ maxima sunt, & longe
præcipua, & sitis quoq; uehemens adiungatur, uo-
mitusq; bilis, aut sudor, uel utraq; superuenerint,
tunc nulla dubitatio relinquif: quod si inter hæc à
febre quieuerit homo, hac inquã quæ in suo motu
est & omnibus nota, propria uero febrium inæqua-
litas in artenarum motu relinquat, tunc certissime
poteris, esse tertianam febrem enunciare, æque ac
si tertio die accessiorem fecisse uidisses.

Signa quartanæ. Cap. VI

Quartana autè (nam & huius signa tibi scribe-
re oportet) manifestissimu sui præbet indicium in
principijs accessionum, quando rigent adhuc qui
quartana laborat. Nam eorum pulsus satis tardus
ac rari. Cum autè in uigore consistit febris atq; etiã
augeat, necesse quidem est ut ueloces fiant atq; fre-
quentes. Seruat tamen & tunc propria ipsorum tar-
ditas ac raritas, si additæ uelocitatè atq; frequentia
in accessionibus ratione pendas. Et quidem si
cõparaueris quartanæ febris uigorem tertianæ ui-
gori, nõ paulo uelociore atq; frequentiores in ter-
tianiis pulsus ostendere artenarum uidebunt. Et ipsius
unitus motus inæqualitas in quartana febre eius
formã ostendit: nam quæ omnibus cõmunis esse
bribus, in uno pulsus artenarum inæqualitatem in hac
manifestissime licet deprehendere: multo enim ue-
locius principium finemq; motus inuenies quæ me-
diu. Non tamè in tertiana ita se habet: breuis ete-
nim in ipsa est uelocitatis excessus, atq; in uigore
præsertim. Veru & caliditatis indicia diutius mo-
do se habet. nam estum & deusio & quendam
uelut furor qualiter in tertianiis uidetur, in quar-
tanis haudquaquã inuenies. Hæc igitur signa ma-
xima sunt. Reliqua uero extrinsecus, nam neque
hæc sunt omittenda: sed & ægrotantis natura est
inspicienda, si in ea atra bilis abundat, & tempus
quoq; anni, si autumnus, & præsens constitutio, si
inequalis: sic uero & loci natura, & morborum per-
uagantium populariter, & si lien intumuerit, fe-
brisq; sine ordine antecesserit, & ætas senior quæ in
uigore consistentium, & si cum sudore febres desi-
nant. In his uero bilis flauæ uomitus minime est
expectandus, quemadmodum nec in quotidianis
intermittentibus: hoc enim tertianarum proprium
est signu. At cum febris cessauerit, si adhuc signu
febris remanserit, pulsusq; his qui secundum natu-
rã, rariores ac tardiores fuerint, quartana procul-
dubio erit huiusmodi febris.

Signa quotidianæ intermittens. Cap. VII

Febrem uero quotidianam intermittentem uel
ex his maxime signis agnosces; nam eius calidita-
tem

tem humidiorē cum quadam acritudine esse oportet, non cum primum manus admouetur con-
fessum occurrente, sed per moram. Nam quadam
humida caliditas cum multo uapore cōmissa exi-
re uidebitur: cum magis ignis in multo humore
suffocetur, quā ipsū possit conuincere. Sed &
his multo minores sunt pulsus pulsibus quartana-
rum, quā istarum pulsus pulsibus tertianarum.
Rursus uero tanto rariores sunt in quotidianis in-
termittentibus pulsus his qui in tertianis, quanto
illis pulsus quartanarum: at tarditas in utrisq;
eodem modo se habet. Minus uero sticculosa hæc fe-
bris est, tantumq; eam quartana excedit, quā-
tum ista tertiana. Lingua uero & totum corpus sic-
cissimum est in tertianis: at in febribus his humi-
dissimum, & uomitus pituitosus. Et quæcumq; per-
uenient excemuntur frigidiора sunt, atq; humi-
diora, & crudiora, aquosiora, & pituitosiora. Vni-
uersum corpus deniq; in hisce febribus plēnū cru-
dis humoribus inuenitur. Et quidē ætatibus, natu-
ris, regionibus, annisq; temporibus, et tēperaturis hu-
midioribus accidunt. Nam iuuenem biliosa ac sic-
ca temperatura, nūquam uidī huiuscemodī corri-
pi febre. Pueri autem & maxime paruuli, & ex his
qui iam perfectum corpus habent, pituitosus & ha-
bitus crassus, atq; ocio plurimum dediti, crapulis, e-
brietatibus, balneis assiduīs, post cibū præsertim
utenes, quotidianis facile capiuntur. Loca etiā
humidiora, atq; ex anni temporibus hybernū,
atq; ex constitutionibus humidiores hanc præci-
pue afferunt febrem. Quod si sit etiā populo cō-
municata, tunc præter ea quæ antea diximus, si-
gna, hoc quoq; non parum ad eam dignoscendā
conducit. Non tamen harum febrium declinatio-
nes, quemadmodū tertianarū & quartanarum su-
doribus terminantur. Quare neq; ad integrā quie-
tem manifeste (exceptis paucis) perueniunt. Vri-
næ uero quæ procedentibus ipsis adueniunt, toti-
us morbi tempora docent. quæ autem in princi-
pijs uidentur, febris etiā speciē indicabūt. Nam
in quotidianis uel albæ sunt & tennes, uel crassæ
& turbulente, uel rubidæ. In tertianis autem fulgæ
aut subfulvæ. In quartanis uero uariæ quidem sed
crudæ omnes. Hæc omnia febrium intermittēti-
um sunt indicia.

Indicia febrium continuarum. Cap. VIIII

Febres autem cōtinuas ex eo cognoscēs, quod
nullum eis adeest ex signis quæ intermittētib;
adesse oportere diximus. Et si citra etiā quatuor
& uiginti horas non cessauerit febris. Si uero inæ-
quale habuerint incrementū, hoc præter aliā lon-
gius etiā tempus ostendit. Et quidem si & pro-
prium febrium signum in pulsibus manifestū ha-
buerint. Si uero & inordinatio quædam uel inæ-
qualitas ipsis, uel in cōcinnitas adsit, & hoc etiā in
dicium erit simul magnitudinis ac cōtinuitatis. Si
uero in hoc statu permanentes tertio die maiore
accessionem ostenderit, aut excrementa & urinæ
omnino crudæ apparuerint, non possunt huiuscē
modi febres ad septimum diem terminari. Si ue-
ro & quarta dies tertię diei similis fuerit, & febris

A quodammodo submersa, neq; facies, aut reliquū
corpus collabitur quicquam, huiuscemodī febris
ad longius tempus extendi consuevit. Tales quidē
sunt differentię earum febrium quæ accide-
ntibus carent. Curatio autem earum deinceps scri-
betur: primum quidem intermittētium, deinde
continuarum. Ex intermittētibus uero acutissi-
ma quidem ac mitissima est tertiana. Longior au-
tem, ac quantum in ipsa est, haudquaquam peri-
culosa quartana. Quotidiana uero intermittēs lon-
ga, & non sine periculo. Quare ab initio statim ad
uniuersum ægritudinis tempus inspicientes, ra-
tionem uictus instituemus. Nam quæ uelociter
sunt, ac celeriter ad statum ueniunt, & si ualde te-
nuem uictum exhibueris, haud magnum afferes
detrimētum. Quæ uero sunt diuturniores, nisi ab
initio grandiori cibo reficias, hominem cum mor-
bo pariter perimes, aut intempestiue uictus mo-
dum commutabis: neq; enim oportet statu aduen-
tante grandiore quā prius cibum offerre, sed
contra potius tenuissimū uictum qui in toto mor-
bo exhibeatur, ad statum reseruare. Hoc igitur in
omnibus commune præceptum. Sed oportet præ-
terea quæ singulis febribus intermittētib; pro-
pria sunt considerare. Veluti cōfessum in tertianis
(neq; enim male ab his initium sumēdum) primum
distinguas, si exquisita sit febris, & (ut quispiam di-
ceret) legitima, aut nō exquisita, sed uelut nothæ
nam quæ exquisita est, non longius progreditur
quā ad septimum circuitum præter id quod etiā
C minime est periculosa: alteram uero, quæ non
est exquisita, uidī quandoq; cum in autumno incē-
pisset, in uere desinere. Deinde uero, ut par est, in
tempore adeo longo, tum quia ægrotus medicū
præceptis parere noluisset, sed in aliquo deliquisset,
tum quia ex hyeme læsus esset, lien ualde intumuit,
& præcordia flatibus sunt oppleta, & ita sub-
tumida quædam erat decoloratio in facie, ac præ-
sertim circa crura: adeo ut nobis de iuene dubita-
re contigerit, ac maioribus uti remedijs fuerit ne-
cessarium. Sic igitur nihil simile habet huiuscemodī
tertiana cū exquisita. Quare & ab initio eas di-
stingere oportet: quantum enim natura differūt,
tantū rationabile est rationem uictus permutare.
Ut igitur eas optime sciamus distinguere, quæ a-
D dolescenti acciderint, mihi sat erit scribere, quæ ue-
luti quoddam exemplū, ac monumenta tibi futu-
ra sunt earū quæ non sunt exquisitæ tertianæ. Erat
tempus anni mediū inter occasum pleiadū & an-
tecedens æquinoctium: inceperat aut febris cum
horrore adolescenti circa auroram ferē, quæ neq;
in caliditate similis tertianæ uidebat, neq; in pulsi-
bus, sed neq; uomitus bilis subscurus est, neq; sudor
sufficiens præterq; quod in die secundo tantum-
modo circa horam tertiam quidam pauci humi-
di uapores exierant, ex quibus febris quidem
transpirabat, at ita pedetentim, ut uix circa uesperam
expers febris uideretur. nam febris signū satis
manifestum in pulsibus manserat, in reliquis
uero circa uesperam satis bene se habebat, & per
totā pariter noctem. Rursus uero circa tertiam diei
auroram

auroram secunda accessio facta est, omnino præterq; in tempore similis primæ: nam nocte superueniēte paululum ante diem vapores humidī exhalauerunt, ac circa quartæ diei auroram febris cessauit, ac reliquo deinceps autumnī tempore atq; hyemis quo egrotauit, alia omnia & hora accessio nis & solutionis febris eundem modum seruauerunt. Agebat autem adolescēs circiter decimum octauum ætatis annum, albus aspectu, & pinguis, qui sapius antea in ocio degerat, & crapulis balneisq; plurimis & repletionibus usus erat: quare neq; bene cibos concoquebat, simul aut aduenit ei durities in pulsu, in prima quidem die atq; secundā mediocriter, in tertia aut & quarta atq; sequentibus usq; ad septimam, ad tantam peruenit duritiem, ut quispiam, qui soli crederet pulsui, multorum fore mensium ægritudinē iudicaret. talis aut perdurauit usq; ad uernum æquinoctium, in quo cœpit mollescere, & rursus postea quadragesimo die omnino æger à tertiana est liberatus, tendente paulatim ad mollitiem pulsus, ac minore quotidie fiēte accessione, urinisq; meliōrē habētibus subsidentiam, etenim hæ quoq; in priore tēpore erāt admodum crudæ. Talis quidem est tertiana, quæ alteri exquisitæ maxime contraria existit. Reliquas uero intermediās haud paucas numero, ex extremis, quæ determinata sunt, nō difficulter inuenies. Quæ enim in principio sermonis tertianarum febriu indicia scripsimus, si omnia affuerint, exquisitam reddunt tertianam, cuius accessionis tempus breue: quatuor aut quinque aut sex, aut longissime undecim aut duodecim horas completur: & huiuscemodi febrium urina, tertio die aut ad summum quarto coctionis signum ostendunt. hoc pacto quidem exquisitā aut non exquisitam tertianā cognosces: eadem quoq; ratione & quartanā & quotidianā intermittentem. cui enim omnia insunt indicia, quæ in quartanis febribus antea scripsimus, hæc uera atq; exquisita quartana est: cui uero minime, spuria est, & nequaquam exquisita. & quotidiana quoq; intermittens, cui omnia quæ diximus insunt, exquisita est: quæ aut eam naturam non omnino habet, nō exquisita. Igitur neq; sunt quartana & quotidiana longæ, quæ non sunt exquisitæ: at quemadmodū exquisita tertiana acuta est, sic & quotidiana & quartana diuturnæ. Hæc quidem in his quæ per circuitum quandam febricitant, oportet considerare. In alijs autē febricitantibus urinas atq; excrementa, atq; uniuersum corporis habitum inspicere oportet, calorem quoq; atq; artieriarum motum, & quæcunq; alia præter hæc Hippocrates & longus usus inspicere iubent: ueluti regiones, anni tempora, constitutiones, & ætates, corporum temperaturas, consuetudines, & causas antecedētes, & quæ simul cū morbis inuadūt, & quæ in medio tēpore apparēt. Iamq; totū cuiuspiā uideri possit admodū esse, non tamē re uera ita se habet. nam quiddā maximū etiam inter hæc omnia, breue tamē dictū nondū scriptū est. quid uero hoc est? morbi quātitas ac uirum, res quæ ad se explicandam uno indiget uer-

bo, ad usum uero permagna. neq; enim bene prænoscere possumus, nisi horū singulorū magnitudinem diligēter pensitemus. nam utrum morbus sit exitialis, an nō: & qñ magis debeat mori, aut sanitati agrotus restitui, nisi omnia quæ diximus diligētius animaduertaris, ad duō redigens capita, ad ipsius scilicet morbi magnitudinem & agroti uires, non poteris uere prænoscere. Nam si uires adeo ualidæ fuerint, ut possint morbi superare, necesse est agrotū euadere: si uero contrā, omnino morietur. Nō igitur solum inspicias qualis sit morbi species ac forma, sed et eius magnitudinē aduerte. Non paruam aut hoc exiget experientiā, tum alias ob causas, tum quia neq; scribi, neq; omnino sermone edoceri singulorū quantitas potest: & si quid in nobis est, ex nulla re adeo possumus ad exquisitam peruenire notitiā, quātum ex crebra excitatione circa quantitatis cōiecturam, hoc quidem in ipsis operibus & discere & docere possibile est. Quæcunq; uero in qualitate determinatur, hæc diligenter ac manifeste quā breuibus poterimus uerbis transigemus.

Tertiana febris curat. Cap. IX

Exquisitam ergo tertianam, ut quæ ex fluxu bile cōmota inualecat, quantum eius maxime fieri potest, refrigerare oportet ac humectare: nam contrariorum contraria remedia, quæ quidem quod superfluum est, reprimāt: quod uero deficit, suppleant. At fluxu bilis humor inter omnes qui in corpore sunt, siccissimus ac calidissimus existit: hunc igitur cū ad uentriculū repit, per uomitū educere oportet: cū uero uergit ad inferiora, per inferiorē excretionē: hoc quidē & spōte fieri solet in tertianis exquisitis. Per urinā quoq; & sudores oportet diuertere. Iuuat autē & per inferiores partes bilis expurgatio. Venter autem mollibus clysteribus exinaniendus est. Urina uero potōnisbus, in quibus apium aut anethū maduerūt, prouocāda. Et si tibi coctionis signa monstrānt, iam cum fidutiā absinthiū potes exhibere, quod alioquin summū est stomachi remediū ubi bilis infestauerit: si præsertim ex ipsius coma quantū sufficiat accipies aqua mulsā madefeceris. Balnea uero calida ex aqua potabili profunt, tū quia aliquid bilis educit, tum etiā quia sua qualitate plurimū iuuant. nam huiuscemodi balnea humectant, ac potentia refrigerant. Marinæ aut aquæ & salæ nitrosæ atq; sulphureæ plus quidē bilis educūt, sed multo minus q̃ potabiles profunt. Præstat uero neq; ipsas utiles dicere, quando quidē plus qualitate nocent, q̃ euacuationibus iuuent. Equidem noui quandam corrupto iudicio hīce balneis uti perisualum, dein de extenuato corporis habitu ad tantam uenisse perniciem, ut tabe consumptus intenteret: reliqua uero uictus ratio ad bilem etiā excernendā ipsi instituta erat. semper aut oportet contrarias qualitates illis quæ præter naturā inualuerint opponere, cū hoc multo plus iuuat, q̃ quomodo libet euacuare: sed neq; hoc ipse nouerat, neq; alio docente didicerat. Hæc igitur in balneis intentio sit, ut corpus madeat atq; humectetur, atq; idcirco neq;

nirum, neq; sal, neque sinapi inspergere oportet, quod genus mali cōplures agrotis asserre uidentur, ac plurimum olei calidi infundētes ad aquam perducere ac madefacere, & si in ea natate uoluerint, quantum id facere possunt, permittendū. At qui balneis admodū delectātur, si etiam bis in die lauari permiserit, nō aberrabit: sed illud semper habeto in memoria, ut in tēpore id faciāt. Si uero etiā cōctionis morbi signa ostendant, tunc etiā si sepius laueris, nihil deliqueris. A uino uero anteq; morbus cōcoquat, omnino abstinendū: at ubi cōcoqui cōeperit, dandum est ab initio tenue, aquosum, & paucū: ubi uero iam propē est ut morbus solutur, amplius est offerendū. Cibi autē quicunq; humectant atq; refrigerant, omnes utiles sunt exquisitis tertianis, quantitas uero in ipsis sit tanta, ut bene concoqui possint. Ex oleribus quidē attri-plex, blitū, lapathum, & malua, & lactuca, & cucurbita: ex alijs uero pitanae succus, & ex alica forbitiones, & ex piscibus saxatiles: Ex uolatilib. autē quae mollibus constant carnes, quae autē talia non sunt, eorum alae, testiculi quoq; gallorum, & suum pedes, & cerebra: paruorum uero si etiā dederis carnem flaccidam, nihil nocebis, sed & oua ad forbendum sunt offerenda, & praesertim uitelli eorum: nam hi facilius q̄ pars alba cōcoquantur. Ex fructibus autē permittendum est ut illos degustent qui nō sunt omnino difficiles cōcoctu. oportet abstinere a melle, sinapi, & salitis: atq; omibus acribus, & a uinis & satis uetustis, & quae natura sunt calida. Haec quidē sit uictus ratio in pluribus ueluti ad coniecturam exposita. Qui uero non ad modum deliciofi sunt, his talis uictus est institutus, qualem nostri me aliquando instituisse in exquisita tertiana secundū sermonem Hippocratis, ex succo pitanae usq; ad crisim. Haec quidē in exquisitoribus tertianis seruare oportet.

Tertianae nocte cura Cap. X

In his uero quae non adeo exquisitae sunt, prouidendum est pro uiribus, ne morbus augeatur, neue agrotantis uires prosterantur, quae longiori tempore debent laborare. Difficile uero est seruare utrumq;, quoniam inedia quantum profunt ad morbi cōctionem, tātum uel amplius officiūt uiribus. Cibi uero, quantum agroti robur adaugent, tantum cōctiones impediunt. Sed & id quoq; noscere opus est ad quantam magnitudinem peruenerit morbus, ac quantae sint agroti uires, ut ad ea inspicies, quae maius auxilium exposcunt, inedia quidem in ualentioribus utaris uiribus, & morbo cōctu difficili: largior autē cibo, ubi uires sunt debiliores, neq; morbus admodū cōcoctu contumax. Hec quidem & in omnibus alijs morbis considerare oportet. In tertianis uero non exquisitis, neq; statim circa initia balneare expedit, sed cum primum cōctionis signa apparuerint: neq; quotidie cibū oportet exhibere, sed alternis diebus. Quies uero & calefactio circa praecordia iuuat, & forbitiones concoctu faciles, & clysteres nō admodū molles. Quod si sanguinē mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittendum, sed ab initio statim adhi-

bita earum rerum, quas scis distinctione, tantum mittendum, quantum praesens exigit status. Sit autem totius uictus ratio non quae humectet atq; refrigeret uniuersum corpus, qualis in exquisitis exhibetur tertianis, sed & aliquē modū assumat ad calfaciendum, atq; incidendum. Plurimum igitur eos iuuat pitanae succus, pipere adiecto, uel etiā hyssopum, uel organum, uel spicam nardi, multa aqua infundens & decoquens ad bibendum propina, & quaecunq; alia quae cient urinam, preterq; illa quae supra modū calfaciunt atq; exiccāt: maxime uero post diem septimam danda est iugiter ab sinthij coma. Et quidē oxymeli potioe plurimos iuuat, & aliquid ex his quae molliter uentrem subducunt, quibus me assidue uti nouisti. Vomitus autem post cibum adeo his quibus haec febris perdurauerit utilis est, ut multos scia solis uomitibus statim fuisse curatos.

De cura quartanarum. Cap. XI

Deinceps de quartanis dicemus, quas etiam ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullum forte medicamē aut euacuationem exhibentes, nisi forte sanguis uehemēter superabundans appareat. Et si uena incisa, is qui fluit niger uideatur ac crassus (praecipue uero in his qui liene laborant huiusmodi uisitur) audacius mittendus est: quod si flauus aut tenuis apparuerit, statim suppressendus. Venam uero secare oportet, uel interio-rem, aut eam quae est in sinistro cubito media, & uictum instituire minime flatuosum, ac bonum, uentrem, quantum possibile est mollem facientes his quae usitata sunt. Quod si haec nihil proficiant, clysteribus utendum est, a principio quidem mollibus, postmodum uero acrioribus. Arcendi sunt autem a carnibus porcorum atq; ab omnib. edulij, quae tenacia sunt, & tardum habent exitū, ac quae refrigerant exiccantq; corpus. Vino uero utendum est albo ac tenui ac mediocriter calido, & uolatilib. quae boni succi sunt & non in paludibus degunt: pisces autē exhibendi cōcoctu faciles, mollibus carnibus nihil tenax habentibus praediti. Utendum est autē & salamentis, & sinapi, & certis diebus id medicamē quod dia trion pipereon uocat, uel quod diosporiticū est assumendum: & si quotidie piper tantū cum aqua biberēt, recte etiam facerent. A frictionib. autē & ambulationibus & balneis, atq; alijs uisitat nō sunt penitus prohibendi, & si omnino possent a balneis abstinere, solis contenti frictionibus, q̄ plurimum ex eo iuramen admitterent. Et si quartana febris breuis sit, haec quidē ab initio usq; ad exitū sunt peragenda. Si uero in statu morbi praecipue agrotus esse uideatur, tunc subtilioris uictus ratio est adhibenda, q̄ ante uel postea, statim uero praecipiendū est ut diū conqueat, ac uiscerib. prouidēdo perfundēdo atq; emplastrādo ijs quae mollire ac laxare possint, deinde medicamētis utendū, quae ciendi urinā uim habēt. Et si cōctionis morbi indicia apparuerint, tunc purgare oportet ijs quae humores atros exi-

naniendi uim habent, non semel tantum, sed sæpius, si fuerit necessarium. Utendum autem & uomitibus post cibum frequenter, & si nihil prohibuerit, elleborum album dare oportet, primum quidem permistum radicibus: quod si nihil fecerit, elleborum ipsum. Qui uero nequeunt euomere, hi per inferiora ualentius sunt purgandi, & his postea medicamentum cōfectum ex uiperis in potu dandum, & alia quæ ad huiusmodi febres cōmendantur, ex quibus est & illud nobis familiare præ cæteris laudatissimum, quod succum cyrenaicū recipit. Qui cumque uero ab initio aliquid ex his medicamentis exhibuerunt, aut omnino ante statum, quartanam quæ erat simplex, sæpius fecerunt duplicē, aut omnino maiorem ac difficiliorē: ex duplici aut triplicem, aut omnino ambas difficiliores maioresque reddiderunt. Noui autem medicum qui ausus est homini qui triplici quartana laborabat, medicamentum ex uiperis exhibere, quando nondum morbus in statu esset, deinde (ut par est) auctis omnibus, febris continua subsecuta hominem occidit.

Cura Quotidianæ Cap. XII

Quotidianam autem intermittentē cum uolueris curare: utere oxymelite, post primos dies, & illis quæ possunt urinā ualide ciere, & uniuersum totius uictus caput sit ad incidendū efficacius. Circa statum uero de uentriculo est habenda sollicitudo, ac de eius ore præsertim: deinceps iubendum est ut post radices & cibos assumptos euomat, his etiā quæ pituitam subducunt, utendum. Reliqua uero uictus rationem ad communes intentiones inspicere inuenies.

Cura februm continuarum primum quæ carent accidentibus: deinde cum accidentibus præsertim animæ deliquo conuulsum. Cap. XIII

Continuas autem febres, quibus quidē status morbi nō ultra septimā futurus est, & uires ualide sunt atque ætas præterea consentit, his quidem admodū exquisitis & tenuis uictus est institutus. Quibus uero uel status totius morbi ultra septimam, uel uires inualidæ, hi ab initio solidiori cibo sunt reficiendi: prope uero statum tenuiori. Cum autem iam adest status, tenuissimū uictum seruare oportet, deinde rursus assidue solidiorem, ac simile augmentum efficere huic quod ante statum fiebat de cremeto. Sanguinem uero mittere oportet & ob morbi magnitudinem, & quibus rursus multo plus quæ natura conueniat, & maior quæ pro consuetudine corporis tumor, & uenæ eminentes atque extensæ, his omnibus est auferendus, nisi uires aut ætas aut aliquid eorū quæ supra cōmemorauimus, phibuerint. Quod uero humidus uictus in febribus acutis omnibus iuuat, dudum recte dictum est. Succum igitur pituitæ his quibus non accescit exhibere oportet: & melicratum quibus non bile scit, & sorbitiones ex alica, & panem ex aqua, & quæcunque alia eandem aut similem uim habet: in his uero quæ præter modū calidæ & effuose sunt, cum primū uideris coctionis signa, tunc audacter aquā frigidā potandā exhibe, modus uero in quantitate seruet, quæadmodū tēpus anni, regio, ætas,

& natura, & cōsuetudo etiam exposcit.

De febribus cum accidentibus, Diuisio I

Talis quidē est, ut in uniuersum dicā, febrium quæ accidentibus carēt, curandarū ratio. Quæ uero cum accidentibus sunt, nō æque simpliciter exiguū rationē: sed quantū fieri potest metiendū est, quanta sit febris, quantūque ex accidentibus periculū imminet, atque ad id quod uehemētius ac difficilior est intendendū, nō posthabita omnino etiā alterius cura. Age enim si quis febricitet & nō adsit plethorica appellata affectio, uerū ex recētibus cruditatibus, sit, ac morsum sentiat afflictiūque os uetriculi, uel si etiā humorē aliquē malū euomerit, & in huius transitū nō parū fuerit offensus, adeo ut grauius se habeat atque anxie. Nūquid hīc febrem respicientes, solā multitudinē euacuare tentabimus? quod alioquin sine molestia faceremus, an prius ori uetriculi prouidebimus, deinde postquam circa hoc bene se habuerit, quam licuerit totius corporis euacuationē faciemus. Mihi quidē ita agendū uidet. Multos itaque uidi qui ita affecti erant, quosdā interisse, nōnullos ad extremū periculū fuisse perductos, cum medicis eos uacuare tētassent, antequam uentriculi corroborassent: sed neque si fuerit febris cum profluuiū uētris alia est opus euacuationē, uerum hæc sola sufficit, quamuis non sit pro multitudinis ratione: quicumque enim his plus adimere fore necessariū putantes, aut sanguinē mittere, aut uentrem mouere tentauerunt, in grauiora pericula duxerunt. Sed & si quis simul & distentione neruorū laborauerit, & sanguis egerit missione, neque huic tātum semel mittere oportet quantū exigit morbus, sed aliquid etiam accidenti est relinquendum, cuius causa sæpe sudores eueniunt, & uigiliæ molestant, & uires ægroti debilitantur: ita etiam si uehementissimæ uigiliæ aut dolor intensus ægrotū infestant, cauendæ sunt subitæ ac multæ euacuationes: ipsa præterea ambiens aeris tēperatura, loco accidentis cuiusdā habenda, quando exquisitè calida ac sicca fuerit, quæadmodum hoc anno fuit tempore intermedio inter Canis ortum & Arcturi. Atque ideo omnes quibus medici nihil omnino de temporum statu cogitantes, sanguinem abstulerunt, interierunt: si etiam ualde frigida fuerit, tunc quoque sanguinem mittere est formidandum. Neque illud ignorare oportet, non parua ex eiusmodi rebus sequi pericula. Intereū autem qui in calidis admodum constitutionibus non recte euacuatur, ex defectu animæ, quem syncope uocant, & dissolutione, in frigidis uero cum accessiones incipiunt, nimium perfrigerari nequeunt tolerare. Ob hæc igitur neque in locis supra modum calidis aut frigidis sanguinem mittere audemus, sed si regio ipsa & temporis status consentiunt, omnino abstinemus: cum uero nō consentiunt euacuamus quidem, sed multo minus quam si neutrum prohiberet. Tantique etiam accidens quoddam agrotantis ad patiendum facilitatem considerare est necessarium. multi enim neque unquam sunt euacuati, neque euacuationem ullam acruatam aut inediam longā possunt perferre, sed alij quidem ex his in

omnino modam corporis imbecillitatem facile incidunt, quidem uero os uentriculi male affectu habent, adeo ut cibos abhorreant: quod si eos cogatur assumere, aut non retinent, aut male concoquunt. In hac dignotionis parte etiam agrotantis temperaturam contemplari oportet. quicunque enim calidi & sicci natura sunt, hi omnes facile ab acruatis euacuationibus offendentur. Et consueudo quoque non parui momenti est, tum ad omnia alia, tum precipue ad euacuationis indicationem: quidam enim nunquam fuere euacuari, neque unquam euacuationem acruatam pertulerunt & multis cibis usi sunt: nonnulli contra neque multis cibis usi fuerunt, & euacuationibus sunt assueti: hos igitur intrepide euacuare oportet, quando & reliqua etiam consentiunt, ceteros uero, non aduersos, nec si omnia alia id suaserint. Eodem pariter modo & corporis habitus considerare oportet, nam qui densa & solida carne constant, his habitus haudquaquam facilis ad patiendum est: quare non oportet uereri ipsos euacuare ex toto, siquidem & alia id iubent: sed qui molles & flaccida, & propterea diffilientes habent carnem, hi mirum in modum sunt ad patiendum habiles: quare & si reliqua omnia sanguine esse minuendum persuadent, non tamen id facere audendum est, sed & alijs euacuationibus, quammodum moderate & cum formidine fieri potest, utendum est. Eodem modo & quicumque supra modum crassi sunt aut macilentissimi: nam & his uenam incidere cauendum est, aliasque euacuationes acruatas uereri oportet. His etiam & ætas annumeranda est ueluti accidens quoddam, quod prohibendi acruatam uacuationem uim habet: neque enim pueri neque seniores hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes quos diximus, ubi affectiones euacuationem hortentur, non semel, neque acruatim, sed paulatim oportet euacuare inedijs moderatis, & frictionibus, & clysteribus, mollibus, humectationibusque, & cataplasmatibus, & balneis, quorum signorum indicationes rursus ab ijs quæ antea diximus, sunt assumenda. Ita etiam si quando duo contraria accidentia consequantur, inspicere oportet utrum eorum sit fortius. Eodem modo si duo morbi eundem hominem obfederint, qui inuicem pugnantes habeant indicationes: nam & tunc quoque aduersus id quod magis urgeat instandum, neque alterum omnino negligendum. Eas uero quæ habent ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundum causam à qua singula sunt considerandum, qualia sunt defectus animi, & dissolutio. Nam consueuere medici de una re hæc duo nomina dicere. Est unum quidem res ipsa, cuius sunt plures causæ: nam animo deficiunt & in morbo cui cholera nomen est, & in profliuijs uetris, & diffcultatibus intestinorum ac leuitatibus, & muliebris fluxu, & uulnibus, & sanguine per ora uenarum, quas Græci hæmorrhoidas appellant, emanante, aut per superiora ducto, aut per nares aut alios meatus, & in enixarum purgationibus immoderatis. Nonnunquam uero & uehementis cruditas animæ defectum attrahit, & tunc præsertim cum uentrem supra modum soluerit, & qui morbus bulinus ap-

pellatur, nihil aliud est quam animæ defectus. Omnem præterea quæ ex utero prouenit, stragulationem, defectus animi antecedit, sicut ad uteri uersus superiora recursus, & ad latus inclinationes, atque inflammationes plerumque consequitur. Antecedit autem morbum attonitum & comitalem, cum malignior existit, & dissolutiones, & syncopen, & marcorē: sed & in insulstibus febrium non admodum paucarum aduenit, & tunc præsertim cum supra modum aut siccum & squalidum, aut plenum immoderate corpus extiterit. Et nonnunquam etiam simul cum febre ardente atque maligna inuasit, & quibus extremæ corporis partes in insulstibus febrium plurimum sunt perfrigeratæ, & quicumque ob inflammationis magnitudinem, uel hepatis, uel uentriculi, uel stomachi febricitant, hi etiam in principijs accessionum animi defectus adueniunt, illis præsertim quibus humores crudi & incocti redundant, aut qui aliquam precipuam partem obstructam habent. Animo etiam deficiunt quibus os uentriculi male affectum est, aut humorum uitio mordicatur, aut crassus uel lentus uel humidus uel frigidus humoribus aggrauatur. Quidam etiam in uehementibus animæ affectibus animo defecerunt, sed præcipue senes, & qui alioquin sunt imbecilles. Etenim plures eorum tristati aut lætati aut irati animo defecerunt. Sed & toridae humiditates quædam, his ita affectis, haud in tempore superuenientes animi defectum inducunt. Si cuti & qui magis robusto sunt corpore, ex immoderatis sudoribus. idem patiuntur, et si abscessus quispiam rumpatur, ei qui non admodum uiribus ualidis sit uehementer uiribus officit: ac tum precipue cum materia tota ad uentriculum, uel uentriculi os, aut thoracem defluerit. Et si quando etiam nos abscessus secantes totum emittere pus retauerimus, animi defectum subsequi est necessarium. Et si quandoque purgantes, aut clystere adhibentes, aut quomodoque euacuantes, id aliquo modo uehementius quam oporteat egerimus, neque etiam in morbo intercute tota simul superfluitas (quæ sit præter naturam) potest sine noxa euacuari, sed tunc quoque necessarium est hominem deficere animo. At uero ex uehementia dolorum ueniunt dissolutiones, cum morsus quidam ac tormina, aut uolulii, aut intestini crassioris affectus subito accidunt. Sed & nervus percussus, & musculi caput animi defectum intulerunt, & maligna in articulis ulcera omniaque gangrenosa & depallescetia, et immoderata frigiditas atque caliditas uitalisque roboris dissolutio. Hæc quidem sunt defectus animi causæ. Singule uero earum propriam curam desiderant, & de omnibus quidem non licet nunc scribere. nam quæ affectionibus assident, sine illis curari non possunt. Tantum igitur in præsentī sermone de ipsis dicemus, quantum quispiam de eis ediscens, possit ijs quæ repente ingruunt accessionibus occurrere: ueluti quod eos qui ex cholericis & uentris profliuijs & multis alijs acruatim factis euacuationibus dissoluuntur, aqua frigida spargere oportet, & nares apprehendere, & os uentriculi perfricare, ac iubere ut euomat, stomachum irritando digiti uel penne immisione: sed neque malum, manus uel pedes

des deligare: oportet autem nexus fieri plures ac fortiores circa manus, quādo per inferiores partes fiunt euacuationes: quēadmodū quādo per orā uenarum hæmorrhoidū sanguis profluit, aut uentris profluuiā adfunt, aut cum per uteros exeūt in mulieribus purgationes: nam si tunc crura fortius ligentur, sapius aliquid ad partes inferiores attrahitur: cōtrā autē fit in fluxibus sanguinis facis per nares atq; uomitibus, in quibus crura sunt uehementius deliganda; & quidē quibuscūq; in uulneribus sanguis emanat, eodē modo si ex superioribus partibus accidi, inferiores: si ex inferioribus, superiores uinculis sunt adstringēdæ: sitū quoq; aliquem sursum tendentem parti expedit inuenire, non tamen hoc multum fiat: nam si nimīū tendatur, atq; ex hoc fatigetur, nihilo minus irritatur quā si inclinaretur deorsum. In uniuersum autē aut ad communia membris partentibus in aduersum trahere oportet, aut ad ea in quibus est euacuationis origo. Atq; ideo uehementes euacuationes, quæ ex uteris fiunt, cucurbitulæ mamillis appositæ statim sedāt: quæ uero ex naribus, hepatis & splenis secundum narē patientem: quod si ex ambabus naribus subito ac multus sanguis efflueret, utriq; uisceri sunt adijcendæ. Vinum etiā aqua frigida tēperatum curat eas, quæ ex magnis sunt euacuationibus dissolutiones, & tunc præsertim quando ad uentriculum fluunt humores. Sed aduertendum est, an aliquid sit quod prohibeat huiuscemodi inhibitionē. Veluti si aliquod unū ex uisceribus inflammationem patiatur, aut caput uehementius doluerit, aut affectio aliqua quæ delirare cogat affuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna enim & quasi insanabilia ex potu uini in huiuscemodi affectibus nouimenta proueniunt. Quod si nihil prohibeat, postmodū ægrotantis naturam & consuetudinē, & ætatem, & ambiētis aeris temperaturam distinguere oportet: ad hæc enim respiciens, uel frigidū uel calidū potū exhibebis. Nam qui assueti non sunt potare frigidum, aut manifeste ex ipso offenduntur, & quicūq; natura sunt frigidiores, & qui in extrema sunt senectute, & loco natura degunt frigidiori, & tēpore hyberno, caue re frigidum oportet. At qui contrario modo se habent, hisce intrepide offerre. Sit uero uinum in fluxionibus quæ ad uentriculum fiunt, calidum et tēnue, quale Lesbium: in sanguinis autem fluxibus crassum ac nigrū & acerbū. Iphis uero locis imponere oportet, ueluti uentriculo, & utero, & stomacho, & thoraci quæ corroborādī uim habēt: capiti autem & fronti præter hæc, illa etiā quæ refrigerant. Et quibus in summis partibus, in naribus uena aliqua disrupta est, medicamen aliquod ex ijs quæ sanguinē suppressere possunt, imponendū. Balneæ uero in fluxionibus quidem ad uentrem aptissime sunt, sanguinis uero fluxum acriter irritant. Et quicūq; ob sudoris multitudinem animi defectum patiuntur, his etiā plurimū nocent. horum enim alstringere oportet, ac refrigerare, ac non laxare cutem, & uinum frigidū præcipue his exhibere, & nil omnino calidū offerre. Sed neque

etiam crura ac manus ligare oportet, neq; cogere ad uomitū, neq; ullo modo mouere: ac uetis refrigerantibus aditus præparare: aerē quoq; domus alterare frigida atq; acerba qualitate, myrtorum folijs, uitium pampinis, ac rosas pauimentū constermentes. Nihil uero horum confert, ubi ad uentrem fluxiones fiūt: nam quo magis cutem densaueris, tanto ipse magis augentur. His igitur qui ex euacuationibus dissoluuntur, ita confestim succurrendum est. Atqui ex multitudine non ita. Verum in illis artus quamplurimum fricare oportet, calfacere, atque deligare. A uino uero & cibis abstinentium, & balneis etiam, si febricitauerint. Sufficit autem si eis dederimus melicrati potum, in quo ebullierit thymus, uel origanum, uel pulgium, uel hyssopus. Conuenit quoq; oxymel. Et quæ etiam ex utero laborant, atque exoluunt, non aliter curandæ sunt, excepto oxymelite: fricare etiā atq; deligare magis pedes oportet quā manus. Et quemadmodum in multo effluxu cucurbitas mamillis imponimus, sic quibus sursum aut in latum tractus est uterus, inguinibus & coxis adhibebimus: & naribus quidem ea quæ foetidissimi odorem habent. Vteris autem odorata ea etiam quæ laxare ac calfacere possint medicamēta afferemus. Si uero os uentriculi fuerit imbecille, atq; ideo animi sequatur defectus, ea quæ roborendi uim habēt oportet emplastra adhibere, quale est quod fit ex palmulis, uino, polenta, croco, aloë, ac mastiche: madefacere autem ijs quæ constat ex absinthio, & oleo melino, et mastichino, & nardo, & cœnanthe, & uino. Et si exurunt misce re ex refrigerantibus aliquid, ueluti cucurbitæ succum, atq; lactucæ, & portulacæ, & solani, & seridis, & uræ acerbæ: hic quidem non solum refrigerat, sed etiam adstringit. Aqua etiam frigida plerūq; iuuat eos qui stomacho exurunt, si in tempore detur, alioquin plurimum obest. Atq; ijs qui uentriculi os debile habent, uinum calidum potius oportet exhibere, si nihil sit aliud quod prohibeat. Plurimum uero iuuat eos qui ita laborant etiam frictio extremorum. Quod si ex his remedijs nihil melius se habuerit, eos quidem qui stomacho exurunt, quā primum ad balneas ducere oportet: qui uero aliquid frigiditatis sentiunt, medicamen dia trion piperon nominatum, atq; ipsum piper solum, atq; absinthium bibant. Qui uero ex uitiosis humoribus os uentriculi mordicantibus dissoluunt, hos post aquæ calidæ aut hydreleī potū fac euomere: q̄ si difficulter euomat, prius concalfacere oportet, quæ os uentriculi circūstant loca & manus & pedes. Quod si neq; hoc modo possunt euomere, digitos aut pēnas demittendo irritare oportet: q̄ si neq; sic euomat, rursus his oleum calidū q̄ optimū inueniri potest exhibendū. Solet autē sapius oleum non solum ad uomitum irritare, sed etiam uentrem molliorem facere: est aut hoc non parum bonū presencium rebus: quare nisi sponte accidat arte procurandum est, præcipue uero & glandulis subditis hoc tentandum est facere. Quod si ex istis facilius fiat, etiam

absinthij comam in melicrato decoquens ad potum exhibeas, atq; deinceps uinum, deinde omnibus modis membra oportet corroborare: partim ijs quæ extrinsecus apponuntur, partim absinthij potionibus, non tamen id in principijs faciendum suadeo, sed postea quâdo circa alium partes fuerint expurgatæ. Quando uero adhuc humores in ipsis continentur, nondum adstringere, sed tantum cõcalescere (ut antea diximus) cõuenit. Vbi uero multa pituita frigida in ore uentriculi fuerit acruata, fouere quidem plurimum oleo, in quo absinthium ebullierit, postea uero etiam melicratum exhibere, uel hyssopo, aut aliquo simili in ipso macerato, similiter oxymeli, aut piper, aut dia tripereon piperone, aut dioscolitico medicamẽ. Victus uero ex nimia frigiditate ueniunt exolutiones, eodem modo curandæ sunt quod bulimi, omnimodo calefaciendo. Vinum igitur eis exhibere oportet calida temperatum, ac cibos qui calefaciendi naturam habent, fricacq; ac calefacere ad ignem simul. Quæ uero ex nimio calore accidunt, ijs quæ refrigerandi ac corroborandi uim habent, hæc uero maxime eueniunt ijs qui in ære suffocante ac balneo commorantur. Statim igitur ipsos corroborabis si aqua frigida sparseris, & flabellaueris ad uentum conuersos, & os uentriculi perficaueris atq; lancinaueris, ac postmodum uino cibosq; refeceris. At qui ob inflamationis magnitudinẽ, aut uehementis febris malignitatem animi defectu patiuntur, & in insultibus accessionum refrigerantur, his artus fricare fortiter, & calefacere, cruraq; ac manus deligare, ac uigilias cibiq; & potus omnimodam abstinentiam præcipere oportet. Optimum uero in his quid futurũ sit præcognoscere, atq; hæc ante accessionẽ facere anticipare. Eos etiam qui ex siccitate in principijs accessionũ syncopæ sunt in cursu, optimũ est præuidere: nam si duabus aut tribus horis ante accessionem exhibito cibo, manus ac pedes constringi iusseris, non interibunt. Oportet autem cibos esse concoctu faciles, & sto macho gratos. Quod si magnũ imminere periculum fueris suspicatus, uinum dare anticipabis, uinumq; præsertim in alicam elixatũ infusum: quod si aliquid panis loco alicæ exhibueris, idem ualebit. At si mediocris syncopa expectatur, uino parcendum: sufficit enim tunc mala punica, aut pyra, aut poma, uel aliquẽ alium fructum astringentem cibis admiscere; et si adhuc mediocriter tulerint accessionem, cum rursus cibũ obtuleris non erit necessarium fructibus uti, hæc quidem faciendi sunt si quid futurũ præuideris. At qui ex inopinato in periculum inciderint, his uinum calidum cum pane est exhibendũ, & parum aliquid cum eo alicæ calidæ. Nam si ijs qui ita affecti sunt amplius obtuleris, aut cibos difficiles concoctu, non modo syncopam patientur, uerum etiã strangulabuntur.

At qui animo deficiunt ex membri principalis obstructione, his oxymeli dare oportet, atq; ex hyssopo, organo, pulegio, et melle potum, cibosq; incidendi naturam habentes: nam crassi ac tenaces

magnas in talibus afferunt noxas. Sed neq; deterius fuerit artus, sicuti crura atq; manus perficrare atq; deligare: prodest etiam hæc potibus uti qui urinã ciendi uim habent, ueluti qui anethũ, & feniculiũ, & apium, & petroselinũ, & animum, & daucum, & spicam nardi recipiunt, qui ubi manifeste inuerint, iam uino utendum est albo & tenui, non admodum antiquo. Nosces uero huiuscemodi obstructions cum ex alijs inæqualitatibus pulsuum, tum ex his præcipue quæ secundũ magnitudinem & paruitatem ac uehementiã & debilitatem sũt, & ubi etiam humorũ plenitudo non adiungatur: nam istius quoq; cõmunes sunt. Fiunt uero & in huiuscemodi affectionibus, cum uehementes fuerint, pulsus intercidẽtes. Hæc quidem in libro De pulsibus a nobis latius explicant. Nunc uero transgrediamur ad eum sermonem qui superest de reliquis exolutionibus, ueluti quæ ex abscessuum disruptione aut sectione cõtingunt, aut ex superflua euacuatione in ijs qui aquam intercutem patiuntur, confestim quidem hi optimis odoribus fouendi sunt, paulopost autem sorbitionibus concoctu facilibus sunt reficiendi. Si uero ob tristitiã, aut gaudium, aut timorem, aut iram, aut terrorem exoluantur, odoribus & narium apprehensionibus sunt reuocandi, cogendiq; ad uomitũ. Eodem pariter modo, qui ex uulneribus, aut purgationibus, aut doloribus qui in articulis, neruis, & musculorum tendonibus eueniunt, exoluuntur, statim sunt ab eo affectu reuocandi, postmodum uero conueniens affectioni cura est afferenda. Animi uero de seclusus qui intestini laxioris doloribus, aut uolubilis, aut similibus uehementibus cruciatibus fiunt, ex patientium locorum concalefactionibus fricationibusq; extremorũ præcipue curantur. At quæ ex propria imbecillitate uirium quæ regunt corpus eueniunt, exolutiones, ex intemperatura uidelicet factæ partium de quibus uires proueniũt, contrarijs curare intemperaturis oportet, frigiditas quidem concalefacientes: calidas uero refrigerantes atq; in alijs eadem ratioẽ. Virtus igitur quam uitalem uocant, quam ex corde prodeuntẽ ostendimus, ex pulsum debilitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, ac nutritiua dicitur, ex sanguineis egestionibus ab initio aquosis atq; tenuibus, postmodum uero crassius ad modum facis olei. At quæ ex cerebro originem ducit, quam præcipue nonnulli animalẽ appellat, ex motu uoluntariorũ imbecillitate deprehenditur. Sed de his quidem affectionibus proprio tractatu separatim tibi scribemus: multa em̃ ab ipsis medicis sunt pretermissa.

Cura capitũ uarijs causis molestati. Cap. XIII

Quoniam uero sermonem de accideñtibus hucusq; fecimus, rursus ad primum institutum redeamus, unam in omnibus communem intentionem habentes, causas a quibus fiunt eorum singula cõsiderare, hæc siquidem tibi conuenientem curationem ostendent. Veluti si quis doleat caput, si quidem os uentriculi illi mordeatur, & fastidium sentiat, tubendum est ut euomat: nam uel bilem euomet, uel pituitã, uel utruq;. Quod si nulla insignis

appareat in uentriculo affectio, considerandum nunquid multitudo uel obstructio aut inflammatio aliquarū capitū partem adsit: inuenies uero primum quidem si interrogaueris, nunquid dolor per totum caput extendatur, aut alicui particula fortius insideat: deinde nunquid cū grauitate uel tensione uel mordicatione uel pulsū. Nā qui cum grauitate dolores sunt, multitudinem ostendunt: qui autem cum mordicatione, uel uaporis, uel humoris acritudinem: cum pulsū uero, inflammationem: at cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsū, spiritus crudi ac flatuum multitudo: si uero cum pulsū, corporis membranosi inflammatio: at si grauitas adsit, multitudo intra membranas contenta significatur. Cum igitur omnia distinxeris, causam ex qua horū singula sunt considerare oportebit, illa enim tibi modum curationis ostendet. Veluti si multitudo uaporis atq; humoris contineatur, aduertere oportet, nunquid ob magnitudinem februm humores diffusi, ac ueluti effluentes ad caput ascēderint, aut propter partem imbecillitatem, aut ob totius corporis plenitudinem. Hanc enim totius corporis euacuationibus haud difficulter curaueris: eam uero quæ ex partis imbecillitate cōtigat, partim quidem in contrariū trahendo per totum corpus, partim ipsi parti remedia adhibendo. In contrarium uero trahes clysteribus acribus, & nexibus, & frictionibus in partibus inferioribus plurimis, & si expedierit, aliquid etiam sanguinis abducendo. Partem autem sanabis eo tempore quo ad uniuersum corpus retrahis, his utens in adfectionibus quæ ad caput uim repellendi habent, ac deinde euacuabis, postremo uero corroboraſ. Repellit autem oleum, quod immaturum nominatur, aut tale aliquid simile, & quod oxyrhodini, & rosaceum uocat ipsū per seipsum, & quæcūq; ex capitibus papaueris, & teneris oliuæ germinibus, & hedere corymbis, mentaq; uiridi, & sisymbrio parant. Vtendum uero ipsis in multitudine quidē crudiore ac frigidiore, tepidis: in calidiore autē & bilioliore, frigidis. Euacuat autem atq; dissoluit oleum calidum ipsum per se ipsum, magisq; si antiquum fuerit, uel sicyonium, aut anethum in ipso ebullierit. Nam multitudo humorum, qui non admodū sunt crassi atq; tenaces, sufficienter per huiusmodi euacuatur: si etiam spondylion uel persillum intus decoxeris, aut pulegi comam, uel calamentum, uel mentę, uel sisymbrii: ita etiam id quod crassius est euacuabis. Hæc uero ipsa, uisum etiam aliquid membræ adijciunt, & quæ debilis sunt roborant. Utendum uero ipsis deinceps usq; ad integram sanitatis restitutionem. Et si opus fuerit, per nares etiam & palatum expurgabis. Sternutamenta etiā sunt excitanda. Et si ad balneas hominem induxeris siccis sintonibus caput est perficandum, salq; & nitrum & sinapi sine oleo imponendū. Hæ qui dē sunt ex particula debilitate doloris capitis medicinæ. At quando ex magnitudine februm accidit & medicamenta adhibere est necessarium, frigida qualitates ac facultates, & quæ ex hydre-

lao & oxyrhodino & papauerum capitibus constant irrigationes expediunt. In dolore autem capitis qui sanguinis fluxū, aut uomitū decretorium significat, non sunt remedia querenda: neq; enim accidens quoddam, sed bonum signum potius tale quicquam est existimadum, sicuti & multa alia quæ ante crises contingunt, quæ plurimis quidem terrorem incutunt, bonum tamen quoddā ostendunt. Optimum uero posse dignoscere, ubi corpus perturbatur a natura cum alias excretionibus præsertim uomitum, et sanguinis fluxum moliente, quorum inseparabile indicium est capitis dolor. Diximus autem plenius de hisce omnibus alibi, nunc uero quantum poterimus primum seruantes institutum, breuiter de ipsis transigemus. Considera igitur primū quidem species febrium an calidæ sint atq; urentes, nam hæc per excretiones iudicari consueuerunt: quemadmodum quæ molliores sunt ac summe quodāmodo, diu durant, & sæpius feruntur in abscessus. Secundo loco an morbus sit ad salutem declinans. Quis enim bonā crislum in morbo pernicioso expectauerit? Tertiō ad hæc totius morbi tempus considerandum: si enim principij uel augmenti fuerit signum, nondum autem status neq; concoctionis signa apparuerint in urinis, uel sputis, uel alui egestionibus, non expectandū est bonam fore crislum. Hæc sunt ex quibus sperauerit quispiam morbum per excretionem crislum habiturū. Eius uero quod iam instat, neq; iam etiam futurum est, hæc signa sunt. Difficilis quædam tolerantia omnem crislum antecedit, & si quidem in die crisis esse debet, noctū: si autem noctū, in die. Si tale aliquid uideas, considerandū est quotus sit ægritudinis dies. Quidam enim sunt qui ad crislum apti sunt, paruo etiam motu a natura accepto. Multi uero in magnis motibus nequeunt omnino magnitudinem perturbationis inspicere, nunquid sit secundum diei naturam. Nam septimus dies etiā ex paruo natura apparatu ad crislum per euacuationem mouetur. Sextus uero magno apparatu indiget, & sæpe, neq; ulla in eo sit crisis: quod si fiat, neq; sine periculo, neq; fideliter accidit. Si autē & unicuiq; dierum aliorum, quædam inest propria natura, quam ubi de diebus decretorijs agitur, diffiniuimus. Age iam sit dies pro magnitudine perturbationis. Deinde oportet considerare qualis erit crisis. De alijs igitur nihil impræsentiarum dicere oportet. At si uomitus aut sanguinis fluxus ex naribus futurus est (nam huiusmodi crisisbus unū diximus esse signum, dolorē capitis) ex his maxime distinguere oportet. Primum quidem si statim ab initio non inualit, sicut quoddam ægritudinis accidens: sed quando crisis primum agitare cœpit. Secundo loco si etiam collum aliquid compatiatur, & præcordia retracta sint, aut spiratio difficilis repente superuenerit, thorace ueluti angustiore facto. Si enim præter hæc omnia, pulsus in tumorem subito elati non reciderint in paruitatem, neq; debiles facti fuerint, statim crisis expectanda est. Si uero non modo non deciderint, sed etiam in altum at-

collantur, & uehementiam assumpserint, faciem
 ægrotantis inspicere oportet. Nā si quod in eo mē-
 brum palpitet, aut uena quæ sunt in temporibus
 pulsent, aut genæ, uel nasus, uel oculus rubidior
 factus fuerit, magis etiam crisis expectanda est. Si
 uero & inuiti lachrymati sint, aut splendores uide-
 re imaginati fuerint, ac manus naribus uelut scal-
 pularum ad mouerint, tunc non iam fluxurū, sed iam
 fluentem sanguinem inspiciēs: nam ubi semel aut
 his scalpserint, statim erumpit. Neq; uero ex his
 perterrearis, si hominem desipientem aut resiliē-
 tem inspexeris. Nam & hæc humorum repentum
 ad partes superiores indicia sunt, quæadmodum
 & spiratio difficilis, & præcordia retracta, & col-
 lum simul cum capite aggrauatū. At tibi unā cum
 his indicio etiam sit, desipientia. Et hæc quidem
 sufficere signa possunt: sed accedit quandoq; & æ-
 grotantis ætas, & natura quæ spem magis confir-
 mat, ac præterea anni tempus, & præsens constitu-
 tio. Nam si ægrotus fuerit adolescens, aut alioquin
 natura calidus, aut multo sanguine abundauerit,
 magis adhuc de hoc sperandum erit: & si etiam sæ-
 pius antea dum sanus esset aut ægrotaret, sanguis
 ex naribus fluere uisus est, hoc uel solum sufficit
 fluxus sanguinis spem asserere. Si uero & tempus
 anni æstatem uideris, uel non quidem æstatem, al-
 ioquin tamen calidam præsentē constitutionem,
 nonne ex his aliquam indicationem assumemus?
 Quod si & plures eo tempore crism ex sanguinis
 fluxu habuerint, & hoc tibi spem uehementius au-
 gebit: & si corpus plethoricum extiterit, & con-
 suleret excretionēs fuerint retentæ. Mihi quidem
 neq; omnino uidetur difficile, eum qui tot & talia
 habuerit indicia, futuri sanguinis fluxus præco-

gnoscere. At absurdum & magnæ imperitiæ est,
 non præcognoscere. Nostri uero temporis medi-
 corum indiligentia ea admiratur, quæ admiratio-
 ne digna non sunt. Nam siue ex detrahere, siue ex
 sinistra fluxurus sit sanguis, nihil difficile ex nuper
 dictis prænosceret: plures uero medicorum hoc
 non solum difficile, sed neq; omnino possibile exi-
 stimant. Et quidem hæc alias excretionēs om-
 nes prænosceret licet, si hæc duo tantum conside-
 rauerimus, et unde naturæ motus agatur, & in quā
 partem. Nam & quæ deficiunt adiuiabimus, &
 quæ immoderate feruntur coercēbimus, si ista no-
 uerimus: Veluti cōfestim sanguinis fluxus ex sple-
 ne, magnæ cucurbitæ sinistris præcordiis suppo-
 sitæ, facile retrahunt: at qui ex hepate prodeunt,
 dextris: & qui ab alijs membris, eadem ratione.
 Nam ex uno de omnibus colligere poteris in uni-
 uersum contemplando. Quare & ego in hoc lo-
 co præsentem finiam sermonem; deinceps autem
 de febribus, quæ ex inflammationibus accidunt,
 tibi transigam, deq; alijs affectionibus, quæ in sin-
 gulis partibus corporis constituuntur. Inflamma-
 tiones autem à uenteribus dicebantur, quæ sunt
 ueluti quædam effluuiescentiæ: à iunioribus au-
 tem non æque. Neque enim herpetas, neque ery-
 sipelata, neque tale aliquid quicquam inflamma-
 tionibus annumerant: sed uni tantum affectui ex
 calidis, qui sit cum tumore duro atque dolore pul-
 satili, hoc nomen accommodant. Non tamen ad
 hunc solum febres ac dolores sequi uidemus, sed
 ad omnes simpliciter calidas, ac ueluti effluue-
 scētes affectiones. De his igitur atq; alijs
 similibus morbis, sequentili-
 bro uerba faciemus.

ARGVMENTVM

Cap. 1. De inflammatione, cum eius differentijs
 causisq; & quæ proprie sit dicatur. 2. De biliosis ul-
 ceribus, scilicet herpete, erodente & miliari, erysipelate
 & carbunculo cum suis differentijs. 3. Inflammatio-
 nis uoce continentur, bubo, phyma, phygethulm, lip-
 pitud, pleuritis, angina, peripneumonia. Et quid ho-
 rum unumquodq; sit: Difficiliter agnosci internas in-
 flammationes. De inflammationum proprie dictarum
 cura agere incipit. II. Pergit agere de causis & cura
 inflammationum proprie dictarum, & primum earum
 quas fluxus aliquis generauit. De euacuatione uni-
 uersali eiusq; scopis: præcedere enim illam oportere,
 deinde adhibenda topica quæ repellant influenza, ua-
 cuent influxa. 2. Quæ foris imponenda sint inflam-
 mationibus ex fluxu aliquo ortis, primum si non admo-
 dum doleant, deinde si ualde doleant. 3. Quid facien-
 dum cum pus inflammationis ex fluxu natæ apparuerit.
 Et quomodo tractandæ & incidendæ sint tū hæc tū aliæ
 inflammationes. 4. Ratio curandi erysipelatis, tum
 simplicis, tum cum ulcere uel inflammatione mixti.
 5. Cura herpetis, erodentis primum, deinde super-
 ficiei. 6. Præcepta in omni ulcere curando, & priu-
 tim de carbunculi cura. 7. Pro locorum affectionum
 natura curatio variat secundum indicationes à loci affe-
 ctu tempore, formatione, situ. 8. et uiribus seu facul-
 tatibus partium, cui eam quoque adiungit quæ à sen-
 sus particulæ acrimonia aut hebetudine lumitur. De
 Galen.

LIBRI SECVNDI

singulis autem copiosius differit. 9. De indicatione
 præcipua ab ipso morbo, siue simplici, qualitatis tan-
 tum alteratis: siue cum materia eaq; temperata uel in-
 temperata. III. Oedema quid, eius causæ & cura.
 IIII. Adhuc de cura oedematis. V. Scirrhus quid,
 quæ sint eius causæ & curatio. Item scirrhi curati exem-
 plum. Tendinum scirrhis affectionum per pyritem uel
 molarem curatio. VI. Curatio indurati splenis. 2.
 Iecoris indurati. 3. Cura spiritus flatuosi, & status
 ubiq; præsertim in alio: & de anodynīs. VII. Ab-
 scessus quid, eorum differentia & curatio. Inflamma-
 tionis superficialis cura: item nondum suppressa. De
 scarificatione leui, profunda & mediocri. De eatapla-
 smate ex ficibus cum farina hordeacea uel pane syncos-
 misto: & quæ ei miscēda sint cum amplius discutere aut
 siccare uoluerimus. In tumore soluto difficili quid a-
 gendum, & quomodo cauendum ne reliquæ duræ
 remaneant. VIII. Suppurati tumoris, qui re-
 solui & discuti non possit, curatio. IX. De sinu
 uel ulcere sinuoso curando diffuse agit. Quæ figura ei
 curando necessaria sit: conglutinati in fundo notæ, &c.
 X. De gangranis, siue gangranosis inflammationibus,
 & earum cura. XI. De cancri generatione tum alibi,
 tum in mamillis: deq; elephantiasis. XII. De cura
 cancri. XIII. Elephantiasis curatio. XIII. Cu-
 ra strumarum, meliceridum, & hydropis. Epilogus
 ad Glauconem.

GALENI DE ARTE CVRATI

VA AD GLAYCONEM

Liber secundus.



De his autē quæ in singulis cor-
poris partibus sunt affectio-
nes, ô Glaucon, deinceps di-
cemus, ab inflammatione in-
cipientes. Etenim sapius hæc
fit, plurimasq; habet differen-
tias, ex quibus omnibus solēt
febres contingere. Commu-

nīs igitur in omnibus est immoderata caliditas, &
ueluti quædam effluuiscientia, unde & inflamma-
tionis nomē de ipsis afferre antiqui consueuerūt.
Propriam autem in singulis differentiā inuenies,
ex qua eius speciem agnosces, & conuenientem
afferis curationem. Aliter enim quī herpes,
aliter quæ erysipelata, atque aliter quæ phygethla
uocantur, ac reliquas inflammationis species cura-
bis: itaque hoc etiam in loco antecedit ea facultas
quā possumus recte cognoscere affectiones. Ti-
biq; hoc primum conabor scribere, omnes ab ini-
tio distinguens inflammationū differentias. Prima
igitur inflammationis differentia est secundū quam
hanc quidem humidā, hanc uero siccam esse con-
tingit: humidam quidem, quæ ex calida fluxione
membrū occupante cōtingit: siccam uero, quan-
do nullo humore influente calor naturalis efflu-
uit, hoc autem usq; ad aliquid quidē ueluti febris
est membrī. Cum uero iam ad immoderatā calidi-
tatem ac siccitatem peruenerit, corruptio atq; ex-
tinctio omnimoda fit. Quare neq; in plura secari
potest, quemadmodum differentia altera, secun-
dum quam quosdam influere humores particula
dicebamus. Multæ enim sunt huius species: nam
fluētē sanguine altera, flaua bile altera: ambobus-
que simul humoribus, alia tertia. Et quidē in earū
singulis uel iā putruit id quod influxit, aut in mem-
bro cōstrictū putrescit, & uel crassum est uel te-
nue, & uel bonum uel acre. Sanguine igitur bono
ac mediocrē crassitudinem obtinente ad parti-
culam aliquam acruatū fluit, atq; ob multitu-
dinem impactō, uehemens dolor arripit hominē,
nisi membrum sensum omnino hebetem habue-
rit, pulsusq; in profundo molestus accidit, tendiq;
omnino ac frangi membrū apparet, & uehemen-
tem calorem persentit, adeo ut comburi uideatur,
unde et refrigerari desiderat: talisq; rubor per sum-
ma uiget, qualis ex balneis aduenit, aut ex igne,
aut quouis alio modo calefactis. Hæc quidem affe-
ctio totius generis nomen accipit, atq; inflamma-
tio nominatur, sicut multæ aliæ species nomen ge-
neris accipiunt: fitq; assidue ex omni fere occasio-
ne. Nam & uulneribus, & conuulsionibus, & con-
tusionibus, & disrptionibus, & exercitandi labo-
ribus, & exarticulationibus atq; fracturis, & spon-
taneis ulcerib; aduenit, & præter hæc omnia, quan-
do ad immoderatā humorum repletionem uenæ
perueniunt, tunc quid superflū effundunt ad ali-

quam partem quæ eo tempore recipere apta sit.
Omnino autē, hæc reliquis omnibus est imbeci-
lior, uel rarior, aut ad attrahendū paratior, uel im-
mobiliior ex quacūq; causa fuerit ad has perducta
affectiones. Neq; em̄ de hoc dicere proposuimus.

Flaua uero bilis quando sui seruans naturā unā
cum sanguine per totum corpus deferitur, morbi
facit quī regius appellatur. Sola uero, quando se-
cernitur, & in aliquo membro consistit, herpes uo-
catur. Siquidem crassa sit secundum substantiam,
totam exulcerat cutem usq; ad carnem suppositā,
atq; hunc affectum Hippocrates nominat herpe-
tem exedentem. Si uero tenuior fuerit, id quod in
superficie est, tantum ueluti deurit, atq; hæc speci-
es generis sortitur appellationem, cum simplici-
ter & sine additione herpes uocetur. Nam ex dua-
bus alijs speciebus quæ quidem nuper dictæ sunt,
altera herpes exedens nominatur, altera uero mi-
liaris, quoniā in hoc affectu pustulæ paruæ ac mul-
tæ per summā cutem similes milijs excitantur. Fit
autē herpes huiusmodi ex bile quidē & ipse, sed
minus calida & acri quā sit prior. Quod si ex san-
guine et flaua bile calidioribus quā oporteat mi-
sta fluxio fuerit, uel ex sanguine quidem, sed ferue-
scente & tenuissimo secundum substantiam, erysi-
pelas affectio uocatur, multo inflammatione calidi-
or, magisq; colorem flauum representans. Et si te-
tigeris, facile sanguis subterfugit, rursusq; illabitur
exquisite tenuis, & aspectu rubidus. Non tamen
doler hæc ueluti inflammatio, neq; ut aliqua inflam-
mationis species pulsū aut compressionem aut
similem inuehit tentionē: sed quandoq; ualde pa-
rum infestat, ac tum præsertim, quando per solam
cutem diffusum fuerit, nihil inferiorē carnem mole-
stans, & tale sapius accidit. Atq; hoc est exquisi-
tum erysipelas. Quemadmodum quod attingit in
feriorem carnem, neq; ex uere tenui fluxione con-
sistit, neq; tantum est erysipelas: sed iam affectio
permista ex erysipelate atq; inflammatione. Exu-
perant autem in ipsa quandoq; propria erysipela-
tis accidentia, atq; hic affectus a iunioribus medi-
cis erysipelas inflammationis participans nomi-
natur: nonnunquā uero inflammationis, & tunc
ipsum nominant inflammationem erysipelatis par-
ticipantem. Quod si neutrius accidentia manife-
ste obtinuerint, sed æqualia apparuerint, tunc ery-
sipelas atq; inflammatio misceri dicuntur. Exqui-
situm igitur erysipelas cutis solius affectio est, nō
tamen ipsa inflammatio partium tantum cuti subie-
ctarum, sed harum quidē præcipue, nonnunq; ue-
ro etiam cutis: & ipsa quidem dolorem affert, ni-
hilominus q; altera, pulsus tamen ei deficit. Cum
uero sanguis influens calidus sufficienter extiterit
& crassus, quodcūq; membrorū subito occupa-
uerit, hoc cōburendo facit ulcus cum crusta: que-
quid uero circumiacet, in inflammationem leuat
effert

effluere centem uehementerq; dolorosam. Vocatur aut Carbo huiuscemodi affectio. Cū uero sanguis influens niger extiterit, crassusq; ac feculentus ac feruens, qualis quē antea diximus: simul aut & serofas humiditates nonnullas tenues admixtas habuerit, pustulas quasdā per summa cutis excitat, si miles ijs quae ex igne fiunt, quibus disrupsit crustosum sub ipsis ulcus inuenit: etiā hoc Carbo est.

Inflāmatiois quidē species tot sunt secūdū ipsam affectionis diuise naturā. Multas uero quispiā pretermittas putaret, deceptus multitudine nominū, ueluti à grecis bubones, phymata, phygethla, ophthalmias, peripneumonias, pleuritidas, & multa alia similibus appellationib; dicta; hæc em̄ omnia inflāmationes quēdā sunt in prioribus cōprehensæ speciebus. Singula uero diuersa sunt sortita nomina, quoniam qui primi ea imposuerūt, uno nomine & affectiois ipsius, & affectæ particulæ cōpositū intellēctū interpretari uoluerūt. Sunt enim bubon, phyma, et phygeton, partiū laxarū (quas adenas, id est glandulas uocant) affectiones. Bubon quidē inflāmatio. Phyma aut, quod statim auget atq; ad suppurationē festinat. Phygeton aut est, id quod erysipelas particeps inflāmationis, aut inflāmatio erysipelatis particeps nominat: Sic aut & Ophthalmia eius mēbrang, quæ corneæ inhaeret, est inflāmatio. Pleuritis aut eius quæ lateribus subiacet. Synanche aut faucis. Peripneumonia uero pulmonis: eademq; in singulis ratione. Eas igitur quæ sunt in partibus apparētibus inflāmationes, promptū est cognoscere: quæ aut in oculis, & febres afferūt omnino, nō eque discernunt. At mihi uidet mēte egere perspicaci eiusmodi agnitio, ac pretereā peritia naturę membrorū, quæ ex corporisfectione simul & exquisita scientia operationū atq; usu cōparamus. De his quidē in alijs tractatibus diximus. Nunc uero nō datur de his sermonē adiungere, quādo tibi repente peregrinādī necessitas ingruat. Quo pacto uero quispiā eas maxime curet inflāmationes, quæ in apertis partibus constant: hoc tibi primū trāligere satago, principiū suū ab ea passione, quę plurimū fit, atq; idcirco totius generis assert appellationē, in qua hoc in primis cōsiderandū existimō, qd & in alijs omnibus magnā uim habet, ut morbi causam inueniamus.

De causis inflāmationis. Cap. 11

Est igitur una quædam apparenti inflāmatio nunc causa, quæ non admodū occulta est, quæ fluxio appellatur, nisi quādoq; illis cōiungatur, quæ aliqua alia ex causa factæ uident. quādo enim nulla ex his præcedēte membrū confestim patitur inflāmationē, ea quę hanc affectionē causā generat, fluxio uocatur: ipsa uero affectio, affectio fluxionis. Oportetq; in his inflāmationibus principia curationū optima fieri: nam quæ in ipsis errata contingunt, difficulter sanabiles, aut omnino insanabiles faciunt affectiones. Sunt aut hæc duo maxima errata, si nulla de toto corpore prouidentia habeatur, & si calefiat atq; humectetur etiā membrum. Hæc uero duo medicorū pleriq; delinquant, non nulli quidē à methodicorū heresi persuasi & inflā-

mationes omnes esse affectiones astrictas existimantes, quas elaxare oporteat. Sūt uero quidam, qui seneratione atq; ulla cōsideratiōe istos sequuntur: Vnā excusationē ad male agendū habētes cū multis delinquere. Sed neque ex dogmaticis medicis quispiā, neq; ex Empiricis ita sensit, sed qd & ratio & experientia suadet, totū quidē corpus euacuare quibuscūq; id fieri debuerit euacuatiōibus cōsultū: Ipsam uero inflāmātā partē perfundere ac superlinire eis quæ id quod influit repellēdū uim habent, id uero quod in mēbro patiente cōtinetur euacuādī, uim autē ac robur adiungēdī ijs quæ iam affectæ sunt partibus. Ad quæ uero inspicientes oporteat euacuare, iam & antea diximus: sed et nunc breuiter cōmemorabimus, ut in sequētib; memoria seruata, non sit necessarium in singulis affectionibus eas quę euacuationes indicāt, audire intentiones. Aetate igitur, & tempus anni, & regionem, & præsentem constitutionē, & eius quī afficitur robur, habitumq;, et consuetudinē, atq; ipsam ægritudinis naturā diximus cōsiderandā: Ex his enim quādo euacuare uel nō euacuare oportet, & unde, & quomodo, inuenitur. Veluti in ea de qua nunc agitur affectione, ad genu fluxus deferatur, atq; hoc subito plurimum attollat, tibi uero totum corpus plenum sanguine appareat, & ualida laborātis uis, tempus autē anni sit uer, regio temperata, æger uero sit adolescens aut iuuenis, is sanguinis euacuatiōe ex superioribus partibus indiget, oportetq; incidere eius in cubito uenam, aut scilicet interiorem, aut mediā. Si uero aliqua pars superior pateretur, per inferiora sanguis est educendus. Semper enim fluxionis motū ad contrarium trahere expedit. Emplastrum autē apponendum ex semper uiuo & corticibus malorum puniceorum in uino decoctis, & rhoē, & polenta compositum: hoc enim in talibus optimum est atq; ad omnia quæ facere intendimus efficax. repellit enim id quod influit, atq; id quod continetur exiccat, & membra circumstantia corroborat: innumeraq; alia medicamina eodem modo componere licet, quorum compositionis uiam ac modum in libris De medicamentis didicisti. Vnde ego quoq; in singulis unum aliquod tibi subiiciam futurum tibi & monumentum, & eius quæ est in alijs facultatis exemplum. Siquidē igitur non admodum doleat, istis utendum est: cum magno autem dolore fluxio incidente, ne sic quidē oportet, neq; aquā calidā, neq; oleum, neq; farinæ triticeæ cataplasmata afferre: hæc enim omnia fluxionibus aduersantur, quāuis ab initio aliquid iurare uideantur. Sufficit autē in huiuscemodi affectibus uehementiā doloris mitigare cum aliquo ex his, quę ex passo, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroq; sit liquefacta componuntur. Oportet autem hæc lanis excipere sordidis, quæ plurimum cœsypī habeant, & æstate quidem frigida, hyeme aut tepida apponere. Sic etiā cataplasmata ex arnoglossō, lēte, pane, & rosaceo oleo adhibere, paululum autē supra patientes particulas apponere spongiā uino acerbo intinctā, aut aqua frigida: melius uero-

ro fuerit, si parum aliquid aceti adiungatur. Quod si hæc cura insigniter profuerit, neq; alicubi pus se ostenderit, emplastris mollibus ad fluxionem utendum. Optima uero ex ijs sunt quæ exiccandi & repellendi, qui fluit sanguinis, sine dolore uim habet: Nam ea quæ uehementer intendunt, atq; idcirco dolorem afferunt, plus doloribus obsunt, q̃ exiccando proficiunt. Tale igitur oportet esse medicamentum, quale nobis est, quod ex chalcitide constat oleo rosaceo dissolutum: si uero lanam mundam uino acerbomadefeceris, & exterius apposeris, plus iuuabis. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasma imponere oportet semel aut bis: plus uero in presentibus iuuat id quod fit ex farina hordeacea: adiungendum tamen & in his aliquid uel aceti uel uini. Et postquã secueris, & pus euacuaueris, cauendū est deinceps, ne oleum aut aquam imponas: & si quando uulnus abluere aut abstergere oporteat, melicrato uel oxycrato & uino & mulso utendum. Superponendū uero si adhuc inflāmetur, ex lente cataplasma. Si uero sine inflāmatione fuerit, aliquid ex his medicamentis, quæ emplastrica uocantur, quibus in huiusmodi sectionibus uti cōsueuimus, & præcipue eo quod ex chalcitide constat: apponendū uero super hæc extrinsecus spongiam aut lanam uino acerbomadefeceris, q̃ si acerbum nō affuerit, tanto aceto aqua temperanda, ut adhuc potari possit, atq; hac intingendum. Sunt uero & ad hoc opportuna ea uina quæ aliquid aque marinæ recipiunt, & tu quoque ubi sit opportunum, potes conficere permiscendo sal ei quod affuerit, uulneri autē nullum ex medicamentis quæ oleosa sunt apponendum, quale est Macedonicum, & quod tetrapharmacum nominatur: nam exquilit exiccare expedit. Ita quidem sanare oportet eas quæ ex fluxione sunt inflāmationes. Quæ uero alia ex causa fiunt, humectare & calefacere nihil prohibet. Et si ad suppurationem perducere uolueris, cataplasma ex farina triticea quæ in oleo atq; aqua ebullierit apponendū. Et si quādo scarificare oportuerit, neq; hoc uerendum est. Si uero eas quæ ex fluxionibus fiunt inflāmationes scarificaueris, magnum afferes malum, præsertim per initia. Nam quæcumq; ex ipsius longioris temporis existēs post totius corporis euacuationem, atq; aliam opportuna curationem quāsdā durities atq; nigrities in membris habent derelictas, his sanguinē auferre nil prohibet: neq; enim amplius hæ in numero inflāmationum habendæ sunt, sicuti neq; erysipelatum, si quid iam liuidum sit. Etenim & hoc per initia quidē infrigidandum est, tunc præsertim cum sine manifesta occasione factum fuerit: quādo uero iam illi deerit feruor, & scarificare conuenit, atq; emplastrum ex farina hordeacea calidum, & cerotum, & aliud aliquid medicamentum ex dissoluentibus apponendum: nō tamen ex uena in talibus sanguis mittendus est, sed uentrē tantummodo expurgare sufficit, dandum autē medicamentum, quod bilem flauam educat. Si uero affectio parua fuerit, neq; hoc facere est necessarium, sed sufficit clysteri acriter uti. Quæ

uero ex ulceribus fiunt erysipelata, & quæcumq; adeo manifestas causas habent: si statim uolueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si antea scarificaueris, nihil nocet. Inflāmationibus uero quæ cum erysipelate coniunctæ sunt, & erysipelatis cum inflāmatione iunctis, mihi sta quantum fieri potest curatio est adhibenda, semperq; illi quod magis superat, resistendum. Etenim quoq; quæ bubones & phymata & phygethla à Græcis dicunt, similes ijs quæ in alijs partibus similes accidunt affectiones, curationem oportet adhibere, præterq; in partibus quæ acriora medicamenta in eiusdē affectibus possunt tolerare, quemadmodum laxiores partes quas glandulas uocant. Herpetes aut quantum ad totius corporis euacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet, quantum uero ad ipsius particula patiens locum non omnino similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidē desiderant similiter alijs herpetibus & erysipelatis, nō tamē ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, etiam humectare natura apta sunt, sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiā maxime possunt exiccare. Non igitur uel lactucā uel polygonum, neq; ex stagnis lentem, aut palustrē lotum, uel anthyllion, uel psyllion, uel portulacā, uel serim, uel semperuiuum, uel tale aliquid quod refrigerare possit atq; humectare, apponendum, quæ erysipelatibus erant opportuna: neq; unq; spongiæ fidas frigida aqua persusa, neq; solano, quāuis refrigerandi atq; unā exiccandi uim habet sed mediocriter. Illi uero maiorem q̃ solano addit, expetunt siccitatē. Ipsis igitur superimponere oportet ab initio quidē ex uite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & amoglossi, post hæc uero & lens adiungenda, & aliquando mel, & polenta, & quod antea scripsimus ad inflāmationes quæ ex fluxione eueniunt, cataplasma, dempta ab eo semperuiua. Ipsa uero loca exulcerata inunge medicamentis quæ ad herpetas in libris qui Pharmaceutici dicuntur, scribuntur. Multa uero huiusmodi apud omnes inueniuntur, plurimaq; ex his ad figuram paruorum circulorum formantur, & ubi uti uolueris, ex passo liquefacere oportet: quod si passum non affuerit, tenui & albo & subaustero quale est Falernum & Malsiloticū & Sabinum & Adrianum & Arsyinum, utendum est. Cauendum tamen ne ob antiquitatem aliquam contraxerit in gustu acritudinem: & si pulsa aquosa loco horum aliquando usus fueris, nil deterius feceris. Iam uero in longum tēpus protractis ulceribus, neq; passo circuli parui sunt dissuendi, neq; pulsa adhuc aquosa sit, & uina quæ sunt sufficienter austera conueniunt præcipue uero nigra: & si ea nō affuerint, alba. Medicamina autem in hoc tempore ipsis præcipue sunt accommodata, & quod Polyidæ uocatur, & Pasionis & Musæ & Andronis & quæcumq; alia his similia sunt. Herpetas uero qui summa tātummodo exulcerant, nisi diu perdurauerint, nullo horum inungere oportet, comburunt enim fortiter, & uehementer exiccant. Verum istis sufficient

quecūq; uim glaucij habent medicamēta, dilue-
re autem maxime quidem aqua. Quod si nūl profe-
cerit, etiā acetū adiungere oportet: quod si etiā so-
lani succo intinxeris, aut arnoglōsi, plus etiā pro-
ficies. Summatim uero hęc te cognoscere opor-
tet, quod omne ulcus siue sponte, siue ex accidenti,
siue ex uulnere factū fuerit, exiccare desiderat,
medicamento (ut inquit Hippocrates) nō aspero,
hoc est non mordente, neq; uehemēter irritante,
præterq; ubi malignū & cum putrilagine fuerit: ta-
lia enim acriora expetunt medicamina, & quæ igit-
nis uires habent, quale est misy & chalcitis & arse-
nicū & calx & sandaracha: etenim nō aliter quā
ignis adurunt medicamenta huiuscemodi: sæpius
uero ubi ista cesserint, ipsum ignē adhibemus. Ea-
dem ratione & his qui carbonēs appellant, super
ipsam crustā, ubi præcipue membrū putrefit, hu-
iuscemodi medicamētorū species cōueniens est,
non tamē loca circumiacētia tangere expedit, ne
teipsum lateas ea exulcerans quæ minime expe-
dit, sed antedictis circulis paruis siue pastillis uten-
dū est, qualis est qui Andronius nominat. Si quan-
do uero rubor inualuerit et plurima inflammatio,
medicamentū passo diluendū, uel arnoglōsi suc-
co. Si uero magnus sit tumor, uino quidē acerbo
in principio, postmodum uero & aceto. Cataplas-
ma etiā ex orobi farina & oxymelīte cōfectū ap-
ponendū: atq; ante statim ab initio tantū sangui-
nis auferendū quantū sufficit, nisi aliud prohibue-
rit. Hæ quidē sunt affectionū per genera cura-
tiones, quæ per naturę instrumentorū patientium
uarietate mutant. Quatuor uero sunt ab his indi-
cationes, ab eorū tēperatura, à formatione, à situ,
atq; uirtute. A tēperatura quidē, si nonnulla qui-
dem ex ipsis natura sicciora sunt, nonnulla autem
humidiora, quædā frigidiora, quædā calidiora exi-
stunt. Et secundum cōiugationē humidiora ac ca-
lidiora, uel humidiora & frigidiora, uel sicciora &
calidiora, uel sicciora atq; frigidiora, aut ex toto
temperata, oportetq; in curationibus intentionē
haberi ad membri naturā: hęc enim quousq; infrig-
idandum aut exiccandum sit docet. Nam si car-
nosę partes inflammationē patiuntur, paulū exic-
candæ sunt: uenosæ quoq; quamuis sint carnosæ
sicciores, non tamen & ipsæ multum exiccare de-
siderant. Sed quæcūq; natura arteriosæ sunt, magis
uenosæ sunt exiccandæ, atq; his amplius ner-
uosæ, & multo magis his cartilaginossæ & ossæ.
Nam priusquam ad propriam naturam particula
redeat, nondum curationi impositum finem arbi-
trandum. Ad sicciorē uero tēperaturam redu-
cunt, quæ natura sicciora sunt, & ad frigidio-
rem, quæ frigidiora, & secundum alias qualitates
eodem modo. Ad mediocrem uero habitum refe-
runt, quæ sunt in singulis mediocria: Sic quidē par-
tium tēperaturæ affectionū uariant curationes.
At formatione hoc modo: nam quædam ex ipsis
intus habent spaciositates, quædam extrinsecus,
quædam utrinq; quædam neutra parte. Veluti ex
simplicibus arteriæ ac uenæ & nerui: quæ quidem
in artubus sunt, intus: quæ uero intra peritonæū,

A utrinq;. Nerui autē qui artubus sunt, neutra partet
qui uero intra peritonæum, ex altera parte. Viscer-
ibus autem ferē omnibus intrinsecus atq; extrin-
secus sunt magnæ laxitates: ac præterea caro ipsa
in pulmone quidem spongiosa, contra uero in re-
nibus densissima, & post hanc hepatis caro: sple-
nis uero caro quanto densior est ea, quæ in pulmo-
ne est, tanto illa quæ in hepate rarior. In omnibus
igitur his quæ neutra ex parte cauitates & recep-
tacula superflui fluxus habent, fortiter exiccare o-
portet, etiam si non fuerint natura sicciores sicuti
nerui, & præcipue illi qui sunt in artubus. Sed quæ
intus & extra aliquid inflammationis possunt rela-
xare, non multum huiuscemodi fortiter exiccan-
tibus egent, si præsertim laxam carnē habuerint,
B quemadmodum pulmo. At ex posito indicatio,
neq; ipsa negligenda est: nam per quæ euacuare
oporteat, atq; quomodo, ipsa præcipue demon-
strat. Influxuentium igitur adhuc humorum, retra-
ctio, sic enim Hippocrates nominat: eorū autem
qui iam membrum obfederunt, deriuatio medela
est. Vtrinq; autem euacuationis genus per com-
munes uenas fieri præcipit, ueluti in locis mulie-
ribus in contrarium trahes, si eas quæ in cubito
sunt, securis uenas, aut mamillis cucurbitas appo-
sueris, uel manus concalefeceris, & fricueris atq;
deligaueris. Deriuabis autē, si eas quæ in popliti-
bus aut malleolis sunt uenas diuiseris, & cucurbi-
tas coxis applicueris, & crura calefeceris, ac perfric-
ueris atq; deligaueris. Et siquidem in parte dex-
C tra locorum affectio fuerit, à dextra manu aut cru-
re detraheris sanguinem: si uero in sinistra, ab artu-
bus quæ illi ē directio sunt. Quod em̄ ab ipso Hip-
Craſi in, dicitur, hoc ipsum est, secundum rectitu-
dinem. Interiores autem uenas incidere oportet:
hæ enim uiciniores magisq; ē directio sunt patien-
tibus membris. Nam si iplene inflammationē pa-
tiente sanguinē uis euacuare, interiores in manu
sinistra uenas secato: et si hepate, eadem ratione in
dextra. Si quid uero ex superioribus inflammatio-
nem habuerit, ueluti in his affectibus quos Græci
synanchas & ophthalmias uocant, & quicūq; alij
capiti aduenerint, eas quæ extrinsecus sunt atq; ē
directio. Patientibus uero artubus à cōiunctis eua-
cuatio fienda, siue retrahere uelis, siue deriuare,
D præterq; ubi affectio sit inueterata: tūc em̄ à mem-
bro ipso patiente detrahimus. Sic igit in synanchi-
cis eas quæ sub lingua sunt uenas incidimus, quan-
do iam totū corpus uacū se nobis obtulerit, affec-
tio uero sit diuturna. Sic et hepati et spleni cucur-
bitulas applicamus: sic & aliud quodlibet patiens
membrū scarificamus, si nō amplius humores in-
fluant: (tūc enim magis irritaueris, ac malū dupli-
caueris) sed quādo iam totū corpus expurgatum
fuerit, neq; iam aliquid influat, aliquid uero quod
pridē influxerat in mēbro cōtinetur. Et quidē la-
borantibus gibbis hepatis partibus quod per uri-
nam trahere oporteat: cōcaus aut per excretionē
inferiorē, situs ipse uisceris indicat: atq; etiā quod
thoracē & pulmōnē per tusses expurgare: uētricu-
lum aut & stomachum per uomitus: intestina aut

per inferiores excretiones: quemadmodū & splenem & renes per urinas: locos autē muliebres per menstrua: cerebrū autē atq; eius membranas per palatū & gargareonē & nares & aures. Sed & q; ijs quę in superficie sunt partibus talia medicamēta apponere oporteat, qualibus eget affectio, atq; ijs quę in profundo sunt, & quas per multa interposita debent eorum uirtutes attingere, nō qualia nūc sunt, sed qualia futura sint, ex situ mēbrorū agnoscimus. Quare siue medicamentū est ex ijs quę extrinsecus apponuntur, siue ex ijs quę comeduntur aut bibunt, non præsens eius uis cōsideranda est, sed ea quę ad mēbrū affectū sit peruēntura. Hęc igitur quęcūq; in pulmonis inflātionibus extrinsecus thoraci applicant medicamenta, ualde fortiora atq; acriora natura sunt, q; si ipsa membro patienti apponent. Quod enim per multorum corporū media ipsi mēbro patienti est occurrūt, obiter debilitatur, et uiribus deficit, si ab initio fuerit imbecille. Tantū igitur aduētitiū roboris adiungere oportet, quantū in trāsitu amittitur, ut quod relinquitur, æquale remaneat ei quod tactu iuuat. Ob id igitur in thoracis inflātionibus, quę in parte summa cōsistūt, ea quę solum relaxare possunt sufficiūt. Intrinsecus autē, sicuti in membrana succingēte, acriora sūt necessaria. Et de splene etiā atq; hepate, omnibusq; uiscerib. intra peritongum ratio eadem. Sæpius enim ex medicamentis impositis ulcera cutis, quamuis durior minusq; ad patiendū habilis, quam uiscera. Et si ipsis uisceribus medicamenta applicare possemus, quibus quandoq; indigent, tanto molliora esse oporteret, quanto & ipsorum natura facilius afficitur: & qui dem omnia quę comedere uel bibere iubent medicamenta in uiscerum affectionibus, hæc multo acriora ac potētiora uiribus esse conuenit præ his quibus indigēt membra morbis affecta, exceptis illis quę & uentriculo & stomacho auxiliantur. hæc enim sola talia exhibentur, qualia ab affectionibus exiguntur: reliqua uero omnia maximam acritudinem ac uirium potētiā habent, quę præsertim uel renū, uel pulmonis gratia dantur. Considera itaq; quot numero partes pertransire oporteat id medicamen quod ad pulmonē sit peruenturū: primū quidē os, & fauces & stomachū: dein de & uentriculū ipsū, & quædā extenuioribus intestinis: deinde eas quę sunt in mesenterio uenas: deinde eas quę in cauis partibus hepatis, ex quibus ad eas quę in gibbis trāsumptum: hinc ad concauā peruēnit uenā: post quā ad cor: deinceps hoc modo ad pulmonē. Neq; negare possumus, quin in singulis partibus his, quibuscūq; admisceat humoribus, ac quandā transmutationē atq; alterationē pro natura uisceris capiat: quare quod de eius uirtute relinquitur, minus omnino est atq; imbecillius, q; ut mēbrū affectū iuuare possit. Quę igitur a situ partū indicatio sumitur, tantū curatio nē euariāt: quę uero a uirtute, quantū nunc dicturus sum. Quoniam ex partibus corporis nōnullæ ab influentibus uirtutibus gubernant: quædā uero a proprijs atq; natiuis, atq; ex his ipsis quædam sibi

duntaxat, quædā etiā alijs sōns & origo sunt quærundā uirtutū, & aliæ quidē opus habent peculiare, aliæ autē cōmune, permutare opus est curationis formā pro ratione earū quas diximus differētiarū. Nam pleraq; ex ijs remedijs quę antea memorauimus, morbum quidem finiunt, sed natiuis membrorū uirtutes offendunt, quæ quidē offensio ad totum corpus pertinet. Quod dupliciter fit, quatenus & mēbrū est alicuius uirtutis origo omnibus partibus cōmunicatæ, aut ipsius opus toti corpori utile est. Hepar enim, cor, cerebrū, & testes communiter uniuerso corpori principia sunt uirtutū: uentriculo quidē, atq; locis muliebribus proprię insunt uirtutes nulli alteri parti cōmunes. opus uero uentriculi quidē toti corpori cōfert, locorū autē nequaquā. Nocet autē sæpius affectionis curatio membri patiētis uirtuti. Quæ enim immoderate laxant, soluent robur, quare & membri uirtutē. Quæ autē supra modum refrigerant, natiuū calorem extinguunt, qui fortassis (ut nonnulli arbitrant philosophi ac medici summi) substantia uirtutem existit: & si non hoc, saltē primū & maxime necessarium ipsarū instrumentū. Iam uero & qualitates quædam extraneæ uirtutes dissoluere possunt. Nihil igitur horum in curationibus præterire oportet, ne nosmetipsos lateamus, in eum incidētes sermonē: Morbus quidē curatus est, homo autē obijt: quod a quamplurimis quotidie faciat uideamus, qui rationi experientiā sine ratione præferūt, atq; hæc esum methodicā omnia artis bona destruētem, & quæ sermones aliquos dogmaticos quidē habet, sed multis errorib. plenos, cōsecrant. In indicatione autē quę habet ex uirtute partium, quispiā etiā reposuerit & facilitatē & difficultatē ad sentiendū. Nā quæ facile sentiunt, acria medicamenta non tolerant, sicuti neq; etiam humores. Nam cum acris, humor in uentriculi ore continetur, sæpius animi defectū patiuntur. Quod si mediocris sit affectus, anxietatem & nauſeam habet, & nonnunq; humorē quo infestantur euomunt: nonnunq; uero frustra lancinantur, hocq; in illis maxime affectibus accidit, in quibus in ore uentriculi uitiatu humor imbibitur. Eodem pariter modo cum ad oculos huiusmodi defluerit humor, maximum affert dolorē, & pustulas exulceratas, quæ difficulter curā recipiunt, excitat. Sic quoq; rurſus oculi ipsi ob eam quā habet ad patiendum facilitatē, tolerare nō possunt acriū medicamentorū uicinitatē, quæadmodū neq; etiā uentriculi os: quinimo nec aliqd' extrinsecus aggrauans hæc particule tolerat, & magis uentriculo oculus, qui nonnunq; etiā ab ijs quæ inungunt grauat. At quæ difficilē sensum habent, hæc cataplasinata grauiā sustinēt, & medicamēta mordacia. Si quisigit uelit ex facilitate sentiendī indicationē illis quatuor, quas antea memorauimus, quintā annumerare, uel in ea cōprehendere quę ex uirtute sumit, nihil quantū ad recte medicandum differat. Hasigitur omnes indicationes memoria habere oportet in quacūq; particula morbo aliquo affecta: nā & ipsius temperatura, & formatio, & situs, & uirtus singulas

singulas quæ in nobis sunt operationes commu-
tant, cõmuni intẽctione seruata: hanc enim ex mor-
bo semper assumẽdam esse docuimus. Qui igitur
secundum solam & simplicem intemperiem mor-
bi sunt, per contrarias qualitates curantur. Calida
quidem intemperies per refrigeratĩa, siue primo,
siue ex accidenti refrigerent. Frigida uero, per ca-
lescentiã: sic facit per humectantiã, humida au-
tem per exiccantiã curantur. De eo uero quod pri-
mo calescit, aut ex accidenti, plenẽ (ut nosti) di-
ximus in eo tractatu quem De simpliciũ medica-
mentorũ potestate cõposuimus. Vbi id quod pri-
mo frigidum est, quandoq; ex accidenti calesce-
re ostendimus, quemadmodũ aqua frigida affu-
sionem, ubi caloris naturalis fecerit reuocationẽ;
& calidam refrigerare, cum rarefaciendo corpus
caliditatem fecerit euaporare. Quæ igitur secun-
dum solas actiuas qualitates corporis sunt altera-
tiones, ex sola quæ ex calescentibus, refrigeran-
tibus, humectantibus, atq; exiccantibus potesta-
te adhibetur, ad naturalem habitum restituntur,
neq; sensibilis egẽt euacuatione. Quæ uero ob ma-
teriæ influxũ, siquid bene temperata sit, solam
euacuationem desiderant: si uero uitiatã, euacua-
tionẽ, atq; unã per contrarias qualitates expunt
alterationẽ, euacuationẽ quidem, ueluti qui rheu-
matici dicuntur affectus. De quibus (ut nosti) u-
num a nobis uolumen est editũ, in quo & hoc sta-
tim ab initio ostensum est, quod ea quæ totũ cor-
pus alit facultate debilitata, huiusmodi sunt affe-
ctiones, cum acerrata superfluitas ad partes præ-
cipue defluat imbecilles. Si tamen per rheumati-
cam affectionem sanguis qui in huiusmodi partes
fluat, fuerit uitiosus, mista oritur affectio, quod for-
teratissime euenit. Sanguis enim sine pituita aut
flaua aut atrabile influens, tenuis semper mihi sub-
stantia apparuit. Ex alia autem quamquam causa si
pars intumeat considerandum est, an huiusmodi
affectus sit phlegmone, an scirrhus, an œdema.
Nos enim omnem calidam ac ueluti flammẽ affe-
ctionẽ nominamus phlegmonem, id est inflamm-
mationem, cuius differẽtias paulo ante diximus.
Tempus itaq; est ut de œdemate quàm breuissi-
me subiiciamus, ut memineris eorum quæ latius
de hoc nos dicere audiuisti.

De Oedemate. Cap. III

Oedema autem uocamus tumorem mollem, do-
loris expertem, quem ex pituitosa substantia aut
spiritu uaporofo fieri constat, qualis etiam in cada-
ueribus euenit. Nonnunq; etiã in pedibus & cru-
ribus eorum quos aqua intercus uexat, et in phthi-
sics, & alijs qui malo habitu (Græci cacexian uo-
cãt) laborat. Verũ tale œdema in periculosis illis
affectionibus accidens est, nulla propria præci-
puaq; curatione indigens. Sola enim frictio ex oxy-
rhodino, aut nonnunq; ex sale & oleo, uel etiã ex
sale iniecto oxyrhodino sistit ipsum, aliãq; huius-
modi multa. Cum uero propter pituitam quæ par-
ti influxit huiusmodi sit affectus, spongia in aqua
quæ parum aceti habuerit tincta, affectionẽ sedat;
quæ si non quieuerit, plus aceti miscendũ est; sit ta-

A mẽ moderata ipsius temperatura, ut possit ipsam
quispiam bibere. Quæ autẽ ex ea plus aquæ cõti-
net in principio adhibenda est, maxime in molli-
bus corporibus. Quæ uero hac fortior fuerit, in ro-
bustis & duram habentibus cutem, & qui ad pri-
mam spongiæ appositionẽ non iuantur. Oportet
autẽ spongiã omnino nouã esse, quæ si non affue-
rit, saltẽ exquisitẽ abluat ex aphronitro & nitro,
& ex ea quæ conia stactẽ, id est lixiuũ distillatũ à
Græcis nominat. Quod si ex his œdema nõ quie-
scat, aluminis parũ adijciendũ est, spongiãq; omni-
no noua applicet. Si uero in aliquo ex artubus ta-
le fuerit œdema, incipiendo ligaturam in imis par-
tibus finire oportet in altioribus, iniectiõnem &
compressiõnem & uniuersam distributionem fa-
ciendo, uelut in fractionibus.

De Curæ intentione. Cap. IIII

B Curationis enim intentio in huiusmodi affecti-
bus mista est, una quidem ut eorum substantia dis-
soluatur, alia ad congregandum & cõstringendũ.
Si igitur per ea quæ dicta sunt non sedetur, tunc a-
liquid quod fortiorum medicamentorum tempe-
raturam admistam habeat, ex dictis potestatibus
adijciendum est. Ego in diuturno œdemate prius
oleo ungens, deinde spõgiã ex lixiuio apposui,
atq; cõstringens uehementius affectũ perfectẽ cu-
ratũ uidi, non amplius uidelicet hac curandũ regu-
la habente mistã facultatũ cõtemplationẽ, sed ad
discutiendũ & incidendũ declinatẽ, id quod in om-
nibus serẽ diuturnis affectibus pbatũ haberi non
ignoramus. Postquã uero satis ad te de œdematis
scripsimus, de duris deinceps tumorib; dicẽdũ est.

De Scirrhis. Cap. V

D Exquisitus scirrhus est tumor præter naturam
sensu priuatus durusq;: non exquisitus uero non
omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino
sentit. Scirrhus igitur insensibilis curam non reci-
pit: qui uero difficulter sentit, nec incurabilis est,
nec facilem curationem admittit. Fit autem ex hu-
more lento & crasso, uix solubiler induratis par-
tibus infixio. Interdum itaq; statim à principio cõ-
gregatur paulatim & augetur: crebrius uero me-
dicorum imperitia paratur, cum uehementer ery-
sipelata & inflammationes adstringunt & infrigunt.
Si quis igitur medicamenta uehemẽter dis-
solutua induratis corporibus adhibuerit quæ ma-
nifestam faciant scirrhĩ diminutionẽ, breui tẽporẽ
sperabit perfectam curationẽ, non uere, ignorans
q; residuũ affectionis hoc curationis modo incura-
bile redditor, tenuiori enim ex eo dissoluto hu-
more residuũ exiccatum lapidis duritiẽ assequit̃.
Non igitur curandæ sunt partes induratae medica-
mento immo dice siccante, sed cũ eo quod calorẽ
habeat tepidũ, humiditatẽ uero nec multã nec om-
nino minimã. Quod enim superfluum humorẽ
habet, nihil omnino dissoluit: quod uero minimũ,
plusquam oportet exiceat. Oportet autem indura-
tum corpus à medicamento quod auxilio futu-
rum sit, simile quid pati his quæ sub sole fundun-
tur. Vocantur autẽ mollificantia huiusmodi medi-
camenta, de quibus amplius diximus in quinto li-
bro

bro tractatus qui De simplicium medicamentorum uiribus inscribitur. Exempla quoque ipsorum dicta sunt ex simplicibus omnes medullae atque adipēs. Ex medullis primas partes obtinet ceruina, deinde uitulina; ex adipibus autē adeps anseris in uolucrum genere: leonis uero in pedestrū ceteris praestat. At uero qui ex gallina sumit, anserinū, & qui ex parido leoninū sequitur, ac deinde urinum, atque taurinū. At qui de capris accipitur & crassior & sicior praedictis est, idque magis si ab hircō capiatur. At iam dictum est quod huiusmodi affectus medicamentis uehementer siccantibus non indiget. De differentia uero quae ex eorum tenuitate crassitudineque oritur, indicatiue quidem dictum est, manifeste uero nequaquam adhuc idcirco in memoriā tibi reuocanda sunt quae inuicē commentabamur, quando Ceciliū puerulū curabam, cui ex erysipelate nimis infrigidato atque astricto tumor durus in toto femore relinquebatur. Existimauimus enim medicamenta, quae ipsum curare deberēt, tenuia esse oportere, quare femur oleo perfundebam in profundum peluium posito puero, quae multum Sabini olei continebat, eo quod omnium tenuissimū ipsum esse sciebam: à balneo uero abstinēbam, nisi in longo interuallo dierum totius corporis curandi gratia. Postque uero partem fouimus, medicamenta ex praedictis medullis & adipibus confecta adhibuimus, miscendo nonnunquam bdellium Scythiū, mastichen Aegyptiā, atque Ammoniacum thymia uocatum, quod pingue & non uetustū esset; similiter & galbanum. Et postque per haec praeparatum fuerat, soluens ammoniacum pinguisimum in acerrimo aceto, circumliniui toti femuri circumcirca; deinde per aliquot dies rursus opopanacē multae pinguedinis miscui aceto acerrimo dissolutū, & hunc quoque recentē, alioquin pinguis non permaneret; quemadmodū nec bdelliū, nec ammoniacum, neque etiā galbanum: utriusque puerum alterum crus agitare, ut plus cibi ad illud ferretur. Postea ubi repulsus erat iam durus tumor, timens ne eius residuum maneret, omnia ē contrario facere aggressus sum, femur ex aliquo medicamēto eorū quae pice constant perungens. Manifeste itaque clarebat quod ex aceto linimenta egregie tumorē commuerant; laxatiua autē molliorē reddiderant, minorem autē nequaquam: uicissim tamen eis utendū adhibito conuenienti moderamine puerulum curauit. Nam si altero duntaxat medicamentorum genere quis curā attentasset, nihil ad scirrhi solutionem profecisset. In tendonibus (uoco autē sic neruos musculorum propagines) ex praedictorum medicamentorum usu manifestissima auxilia uideri licet, si quis recte utatur curatione ex pyrite lapide. Oportet autē eum, cum igne excanderit, acerrimo aceto aspergere, ac deinde super lapidē mouere partē affectā, ut à uapore sursum lato scirrhus dissoluatur. Multae enim partes iam perfectē distortae ac mutilatae, per hunc curationis modum, ex hac ipsa commotione penitus curatae sunt, ut ferē magicum opus uideretur. At oportet praeparare mollificando partem indurata[m] medica-

mentis de quibus supra diximus. Etiamnū in hac ipsa quae sit per pyritem lapidē curatione, abunde multum oleum Sabini prius perfundendum est, aut aliud quod extenuandi uim habeat. Nec minus proderit anethi comam decoquere, praesertim cum uiridis fuerit atque recens. Quod si pyritem habere non possis, molari utendum est, uocant autem sic lapidem ex quo mola paratur, & qui frumentum molit.

De Splene indurato, & hepate, & spiritibus flatuosis cura. Cap. VI

Splenem induratum non solum de foris fortibus medicamentis curare cōueniē, sed etiā per fortissimas potiones; nam eas sine molestia tolerat. Ex quo rūrū numero primas partes sibi uendicat cortices radicū capparis, & scolopēdriū, & miricā radix, atque cumitates, omnibus huiuscemodī in aceto uel oxy melite coctis. At se penumero cū tangit splenem tenens uidet, nō tamē durus, sed flatusosus potius est tumor, in quo oportet ex absinthio madafacientiē medicamen emplasticū mistas uires cōtēns superponere, quale est quod ex sulphure atque alumine cōstat. Sunt denique multa huiuscemodī in Medicamentorum tractatibus descripta, nō simpliciter autē mistorum medicamentorum uiribus attendendū est, sed & quantū miscet. Cū itaque splen flatusosus rīmore afficiat, et magis cedemat; si multū aluminis adhibueris, nihil nocebis, in duris autē tumoribus uim dissolutiua[m] superare conuenit: parū autē eius quod stringendi uim habet, admiscendū est. Cum igitur de numero simplicium & sponte nascentium medicamentorum flos salis tali sit natura praeditus, sanat splenes induratos, si extrinsecus ipsis in uelica apponatur. Scirrhum autē hepatis ab initio quidē sanauimus saepius: Vbi uero ad plures dies forte foret extensus, neque ipse potui sanare neque alium uiridē qui posset. Omnibus igitur qui ita affecti sunt ex hepate, subsequit aqua intercus: pereunt autē quam plurimi in tempore longo; quosdā uero noui etiā breui pereuntes, qui uentris profluuio laborabant. Liqueat igitur quod his sufficere angustata erant ora uasorum, per quae transmittit cibus ex finis hepatis partibus in conuexas, adeo quod si qui ex eis sanati sunt, ea quā antea diximus, in musculorum partibus scirrhi curationis ratio saluauit; neque enim perfert hoc membrum fortia medicamēta, ueluti splen. Augere autē oportet ea quae ratione inflammationis ipsi apponunt per mollificantium amissionem: erāt autē illa ex absinthij coma, & expressae myrobalani retrimēto, & utraq; nardo Indicaque ac Celtica, adhuc autē & croco, & cenanthe, & mastiche chia, & unguentis quae ex spica nardi conficiuntur, adhuc autē & mastichino & melino & cenantino. Hos igitur ammoniacū thymia ma, & bdellium & quas diximus, medullas, & adipēs misti, & quae incidere possunt factum in hepate scirrhum sanare poterunt, si etiā ratio conueniens uictus adhibeatur unā cum medicamentis quae in potu sumuntur ad aperiendum abstergendūque eum qui in uiscere continetur humorem. Sunt uero haec omnia etiā eos qui in renibus continent lapides cōtinuere apta, de quorum mate-

riamulti medici cōscripserūt. Admiscere autē oportet & ex his quæ urinam mouere possunt aliquid. Plurima uero est etiā istorū materia quæ a multis quidē scripta est, atq; a nobis cōprehēsa in eo quē De medicamentis scripsimus tractatu. Quare tunc etiā quę dicta sunt tibi sufficiant. Tempus enim est trāsgredi ad alterū tumoris genus, cui materia generationis est spiritus flatusosus. Vocat autem nō solū flatusosus, sed etiā flatus huiuscemodi spiritus crassus ac uaporosus existens, non secundum substantiā æthereus neq; tenuis. Cogita uero eius naturā ex circūstante nō aere in memoriā reuocans; qualis in Austrinis sit constitutionibus, qualisue in Aquilonaribus; ei enim qui in Australibus sit, assimulat flatusosus; alteri uero qui in Aquilonaribus, is qui in nobis secundum naturā est spiritus. Adiuuat autē ne huiuscemodi spiritus diffusetur, etiā densitas corporū; quare huiusmodi affectus curatio cōmunē habebit intentionē ad rarefaciendā ea quæ dēfata sunt corpora, atq; ad crassos spiritus extenuandos. Nam si cū subtiliori substantiā sufficienter calefeceris, id quidē quod densatū est, rarefacies; quod uero crassius est effectū, extenuabis. Patientiū autē particularū natura cōuenientē auxiliorū materiā cōindicabit, magisq; ac minus in ipsa. Nam spiritus iste crassus & uaporosus nonnunq; sub mēbranis quæ integunt ossa, cōprehendit; nonnunq; uero sub peritonæo, aliquando intra intestina uel uentricē; comprehendit uero aliquando & intra tunicas quæ musculos cōplectuntur, quæadmodū & a mēbranosis tendonibus; cōprehendit etiā ab ijs quæ ratione cognoscunt spatia in musculis atq; alijs partibus corporis, quorū locorū naturā in tractatibus De sectionibus didicisti. Itaque etiā ipse musculus inflat; atq; in uentris uel intestinorū corpore flatusosus includit spiritus. Et cū sufficienter frigidus fuerit, tunc maximum dolorē excitat. Cōmunis autē curatio omnibus (quemadmodū diximus) per subtiliorem substantiā & quando affectio dolorē habuerit adiunctum talē habentē naturā ut dolorē talē queat sedare; secundū uero patientiū partiu differentiā & materia curationis cōmutatur, & augetur, atq; obtunditur uis. Cū igitur ex tali spiritu dolor interuenit, in uentre inferiore subtile oleum cum medicamentis, quæ in ipso ebullierint, per clyster inijciens, statim dolorē sedabis. Quæ uero debet ebullire in oleo medicamentā, cum subtili substantiā calefacientia sint, cyminū, & id quod apud nos est, & magis quā ipsū id quod Aethiopicū nominatur, & apij & petrapij semē, & marathri, & sinois, anelisq; atq; lybistici, & feseleos, & dauci, & spodilij, & si cōiectura cōprehenderis frigidā esse dolentium partium affectionē, rutā & marathri & grana lauri in ipso decoques, miscebisq; asphaltum, ipsumq; oleū laurinum, & si qua alia similē naturā habent. Quod si inflammationē huiusmodi doloribus adiunctā putaueris, auferes ea quæ admodum acria sunt, & quæ uehementius calefacient. Ad ea autem quæ in hoc mediocrē naturā gerunt, quæq; uim laxandā habent, transgredieris; in oleo

itaq; ad ebulliendum pones anethū & non rutā, etiā admiscebis adipē asferinū uel gallinacē, sed hæc quidē ubi uehementiores dolores infestant. Mediocres uero etiam extrinseca cōcalefactione iuuantur, ea præcipue quæ ex milijs fit; nam eorū leuitas dolētibus sine omni molestia est. Si hæc nō affuerint, uel ex sale calefacto, uel ex limo crudo, uel quocunq; alio modo. Cucurbita etiam magna cum multa flāma absq; cutis scarificatione, sæpius statim dolorē amouit; oportet autē eam umbilicē cōprehendere. Quod si etiā cum his dolores permanserint, medicamentis ex opio uti non dubitabis, quale est Philonis Tharsensis, omnibus medicis notum, ita tamē ut scias aliquam noxam ex huiusmodi medicamentis, membrīs patientibus necessario affuturam; nihilominus ad id quod magis urget instans, etiam parua cum noxa hominē ex nimio dolore animo deficientem, liberabis; nam & sequentibus deinceps diebus, si magnā noxam membro cōtractam uideris, emendare licebit. Vocantur igitur huiusmodi medicamēta, indolentia; quoniam dolorem quidem sedant, & dolorē auferunt, non tamē affectiones penitus sanāt, sed uim sentiendi obtorpescere faciūt. Vti autem oportet Philonis medicamentum, omnibusq; ex opio cōfectis nō statim, sed post tempus compositionis annum, aut omnino semestrem. Maxime uero atq; citissime ex potu horū medicamentorū laborantes sani fiunt, ubi intestina gracilia patiuntur; sicuti ex his quæ sedē induntur, crassiorum intestinorum affectiones præsentaneum habent remedium. Non modica autē fit uirtutis distributio & ex ebibitis, cum inferiora afficiuntur; atq; ex his quæ sedē induntur, cum superiori fuerint affecta. Quæ tamen in carnosissimis partibus spiritus flatusosi aggregatio, nonnunq; omnino uacat dolore, ac longiori tempore durat, ac tum præcipue cum fuerit articulationi uicina. Hic enim sunt musculi magis neruosi ac densi, atq; in media sui parte carnosiores ac rariore. Tales uero (ut nosti) affectiones sanari medicamentis ex pice, resina terebinthina, et adipe leonino atq; taurino. Cōuenit autē ipsis & quod ex strigmetis, & calce fit, & ex fycomoro, & (ut summatim dicā) ea quæ insigniter subtili cōstat substantiā, quibus ea quæ molliēdi uim habēt admiscēt.

Sequitur de Abscessibus. Cap. VII

Enim uero de his satis dictū est, iam tempus est ut transeamus ad abscessuum tractationem; sic autem nominant eas affectiones in quibus inuicem distant, quæ prius se contingebant corpora. Spatium igitur uacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam uel humidam aut mistam ex utrisq; cōprehendat. Ad hunc uero ex inflammationibus quædam, atq; ex erysipelatosi & phlegmonosi non pauca transmutantur. Sine his uero etiā abscessuum affectio consistit ex multitudine quorundam humorum, aut spirituum uaporosorum, siue in ipsis patientibus partibus generentur, aut ex alijs confluant; ea ratione qua fiunt illa quæ decubitus uocantur. Nominant uero sic illas affectiones, cum qui prius

unum membrū infestāt humores, eo relicto ad alterum transeunt. Quocūq; uero modo fiat abscessus, id spatium quod abscedētes interiacet partes; humiditatibus quæ ipsū faciunt completur; quæ ubi aliquandiu perdurauerint, plures habent alterationes. Nā & lapidibus & arenis, & testis, & lignis, atq; carbonibus, & limo, & strigmento, et amurcæ, & multis alijs talibus similia in abscessibus corpora cōtineri inueniuntur. Qui igitur per summa sub cute cōsistunt, facile dignosci possunt, neq; est eorum sanatio difficilis: nam ex tactus proprietate facillime discernuntur. Curantur uero ex extrinsecus adhibitis medicamentis, neq; his quæ bibuntur opus habent, ueluti quæ in profundo, atq; in uisceribus præsertim fiunt. In dignotionibus igitur, cum suppurantur cedunt digitis premētib; non resistentia, quemadmodum membra inflammata: dignotionem igitur præbent manifestam. At proprietates celsionis alia est in tenibus humoribus, alia in crassis, quemadmodū & in tenacibus atq; mucosis humoribus. Sæpius uero nobis subiicit cum tentione spirituiosa pars aliqua abscedēs, quæ ubi secta fuerit, inuenitur sanguis concretus, adeo ut qui his autter huiusmodi uiderit affectionem, si solers & memor fuerit, comprehensum in huiusmodi tumoribus sanguinem ita concretum agnoscere poterit, cum in memoriam ex collatione reuocauerit tensionis ac celsionis proprietatem. At forsan præstat non proprietatem, sed quantitatem tensionis ac celsionis nominare. Curatio autē earum, quæ in superficie cutis abscedunt inflammationum sit, incipiente quidem iam abscessu, per ea quæ dolorem sedant atq; laxant; procedente uero tempore ad ea quæ concoquendā ac suppurandū uim habere proprie dicuntur transferri oportet. De his autem dictum est, sicuti de pluribus alijs, in quinto libro De medicamentorum simplicium potestate tractatus. Statim igitur aqua abundanti perfundere atq; fouere oportet, et oleo calido pariter inflammata conspergere, atq; ex farina triticea, quæ in aqua atq; oleo moderate ebullierit, cataplasma imponere: nam hoc citius ad suppurationem perducit, quàm id quod ex pane conficit. Illud enim maxime dissoluendū uim habet, ut cui adsint sales atq; fermentum, optimeq; tostum sit. Hac uero omnia defunt triticeæ farinæ. Et cū suppurari incipientem inflammationem curaturus, suppurationem prohibere posse speraueris, tunc plurimum panem ebullire permittas, oleo scilicet ac aqua subactum: sit autem aquæ ad oleum multiplex proportio. Plus autem quàm hoc suppurationē prohibet hordeacea farina simili modo preparata: quæ uero in tali curatione affunditur aqua, habeat altheæ radices in se decoctas. Si uero per summa cutis in parte inflammata tensio ualida fuerit, multis scarificationibus incidere oportet in superficie, ac postmodum ex farina hordeacea elixata ut diximus, cataplasma apponere. Tentari autē sæpius plurimas & ualde tenues in superficie scarificationes: contrariō autem his modo alias profundiores magnas, & tertias quæ mediū tenebant

in longitudine ac profunditate. Quæ igitur in superficie fiebant, debile auxilium afferrebant. Quæ uero longe erant atq; profunda, plurimū quidem sanguinis exhauriebant, adeo ut ferē animi defectum afferrent: rursus uero ipsa propriam curationem ueluti uulnera exigebāt. Quæ autem earum ambarum mediū tenebāt, semper inueniri ab inuenientibus dictis esse remotas, atq; ideo eas in usu censui præferēdas. In quibus igitur difficulter ad suppurationem peruenit, neq; facile discuti tumor potest, ibi humores esse compactos crassiores ac tenaciosiores est existimandum. In his uero affectionibus tantum cōuenit ea quæ super profundiores scarificationes curatio. Conuenit etiam id quod ex caricis consistat in aqua decoctis cataplasma. Oportet autē non ipsas assumere caricæ, sed aquam in quā ebullientes sunt liquefactæ. Expediit uero & caricæ pingues esse & dulces, ut earū humor non dissimilis mellis uideatur: & si eas assumens decoxeris usq; ad plurimum temporis, reddetur aqua mellis tenui substantia similissima. Huic igitur aquæ aliquando hordeaceam farinam iniungere oportet, aliquando panem syncymistum (sic autem nominant eum qui mediū est inter exquisitè purum & fursuraceum) uocant autē nonnulli eundem panem autopyron, quoniam in puro farinam non qualis natura est, talem ad cōficiendum panem assumūt, sed prius purgantes fursur excurrunt: contrā aut in fursuraceo prius adiungunt eam farinæ partem quæ purissima est. Panis autem qui autopyros appellatur, qualem habet ex natura farinam triticum, talem etiā seruat. Oportet autem triticum ipsum ex quo farina sumitur, esse ex his quæ generosa dicuntur: quædā enim ex ipsis multum fursuris continent, quæ ignobilis nominant; quædam uero simlaginem, quæ (ut dixi) generosa uocant. Nequaquā igitur oportet fursuraceū esse frumentum, ex quo utilem ad cataplasma farinam accipimus: sed quemadmodū dictum est multam habere simlaginem: quod si ignobilis tritici farinam assumpseris, crassiorem fursuris partem oportet excernere, atq; ita panem medium conficere. Ex hoc igitur pane partē mediā ac teneram ad cataplasma cōmicebis, quādo potestā medium inter farinam hordeaceā & triticeam uolueris facere cataplasma: nam farina triticea maxime ad suppurationem ac concoctionem ualet; hordeacea uero plurimum resoluit. Hic uero quem diximus panis mediā naturā seruat, sicuti & eius farina inter nuper dictas farinas triticeas est media. Ad hoc igitur respiciens cum decoctione caricarum misce quod tibi conuenientius uidetur, siue ex panibus siue ex farinis. Si uero tumores resoluiatur, minus tamen quam oportet, simul coquere oportet cum caricis hyssopum uel origanum. Si quando uero uehementius tumorem excicare uolueris, sales decoctioni adicias, deinde hoc modo cum ipsa subige farinam hordeaceam. Eximatur autem & hinc quicquid fursuraceū est, & postq; plurimum ebullierit, appone cataplasma. In tumoribus tamē qui difficulter resoluiuntur, uerendum est

est, ne eorū reliquiae praedurae relinquantur. Quare in singulis solutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis cuius curatio suscipitur: tumore nam ea quae cum fortiter exsiccantibus agitur, reliquias duras operatur. Hoc uero in singulis solutionibus animaduertens, si partem patientē attigeris, & quod nunc apparet, illi quod prius uidebat contuleris. Si igitur unquē tale quod piscatus fueris, decoque in aqua cucumeris agrestis radicem, aut bryoniae, aut asari, saepius quidem per se solas, nonnunquam caricas pingues adiciens, deinde aequae farinae admisce, comiscens & aliquid adipis anserini praecipue uel gallinacei: quod si hi non affuerint, suillū adiunges. Radices quoque earū quas nuper diximus herbarū, atque praeterea altheae, si post moderatam decoctionē cum pane atque adipe conterantur, huiusmodi tumores resoluunt. Fortior autem hisce omnibus est dracontij radix, & si quando ea uti uolueris, cum sit his quas nuper diximus multo subtilior atque ad resoluendum potēior, omnino ad ipse comisce. Nisi enim humectaueris atque mollieris induratos tumores, sed cum fortibus medicamentis resolueres tantū studueris, in primis quidē diebus eos insigniter decrescere facies, sed pariter id quod relinquit indurabis, hoc uero induratum difficulter resoluetur. Melius igitur nos, ut diximus, fortiter resoluentibus medicamentis comiscere mollientia, ne tumores in scirrhos (quorū curationē praecedētibz audiuisti) cōuertant uerētes.

De Tumore suppurato. Cap. VIII

Rursus igitur ad suppuratos tumores accedamus, quos ubi posse resolueres desperaueris, ex farina triticae utere cataplasmatibus, nam ad celeritatem suppurationis plurimum conferunt. Deinde de aperiens si uideris ea quae circa sectionem sunt libera inflammatione, medicamentis quae emplastrica dicuntur, utere. Sit autem eorum uis ad excidendum habilis, careant etiā morfu, ut neque astringentia medicamenta habeat admista, sed ea potius quae sine doloris sensu resoluunt, uel parū aliquid astringentis habeant. Ego uero saepius in huiusmodi, uisum sum medicamentum ex fermento & ostreis cōbustis confecto. Si uero pars aliqua sectioni circumstantis inflammata fuerit, eo quod ex chalcitide constat, oleo liquefacto, ubi uero paulatim refrigeratum fuerit, in mortarium translato & molliens manibus, atque uinum infundens, ut nosti. Ad multa uero utile est hoc medicamentum, quemadmodum in libris De compositione pharmacorū diximus. Faciemus etiam alios (si deus uoluerit) de affectionibus quae singulis partibus accidunt, ubi omnium medicamentorum, quibus uti consueui, diligenter uires explicare tentabo, atque eorū usum opportunum exponere. Sed tu iam in hisce medicamentis de quibus in hoc libro memini, accipisti à me antea & mensuras & praeparandi modū ubi uero plus opportuno cutis colliquata fuerit in suppurationibus, adeo ut panno detrīto similis efficiatur, nō facile subiectis corporibus agglutinat, ut necesse sit eo curationis modo, qui secundum latitudinem appellatur, ulcus curare.

Galen.

De Sinu. Cap. IX

Cum uero amplius agglutinandi cutem subiectis corporibz creuerit difficultas: huiusmodi affectum sinū appellant. Deinceps autem tibi in memoriam reuocabo huius quoque curationis modū quem uidisti me saepius in pluribus adhibere. Vbi talis affectio consistit, satius est fistulā directe perforatam uel exare uel ex cornu factam habere paratam: quod si haec non fuerit, unum ex his instrumentis quae pyulca, id est puris attractiua dicunt, quod foramen latissimum habeat, & eius quod à nobis compositum est ex charta combusta medicamentum, tu saepe uidisti me exiguum portionem multo oleo rosaceo permiscere, ac per id instrumentū puris attractiui in sinu iniicere, deinde linamentū uulso orificium claudere. Quaecūque uero emplastica medicamenta oleo rosaceo liquefaciētes iniicimus, hoc instrumentum non permeant. In his uero oportet uesticam suillam accipientes, fistulam directam foramen habentem apponere. Esse uero acriora medicamenta liquefacta quam illa quae emmota eo quod linamentis illinuntur, dicuntur, est necessarium, qualia sunt apud omnes usitata colore uiridi insignia. Haec enim oportet non paucō oleo rosaceo liquefacere, ut in sinū iniici possint. dissoluitur autem emmotorum uis in huiusmodi mitionibus. Igitur emplastica omnino medicamenta quale est Macherionis & Epigoni, & quod his cognominatur, ubi ad emmotoriū usum deducuntur, cerati indigent admitione: haec enim ad sinus utilia sunt. Quia enim ratione eis ceratum admiscetur, eadem etiam sunt ad sinus utilia. Miscetur autem quoniam uires mordaces habent, si per se sola liquecerēt, nō admisto ipsi cerato: sed ubi quidem oleum rosaceum plurimum fuerit, quod uero in ipso liquefcit medicamentum paucum non amplius acritudinem seruant: ubi uero sinus medicocriter carne oppletus fuerit, tunc agglutinantia medicamenta apponere oportet, ueluti si recenti & cruento uulneri medicareris. Multa uero talia sunt natura praedita, quae partim ex asphaltō constant: uocant autē huiusmodi nescio quomodo emplastra barbara. Alia uero sunt quae fulua uel fusca à colore dicuntur ex lithargyro & erugine aris decocta plurimum: sic enim argo fuluum colorem accipit. Si uero parū ebulliat, facit emplastrum quae lutea dicunt. Te uero non latet, quod omnia metallica medicamenta subtiliores partes habent, & uim excidendi maiorem ubi multū ebullierint. His uero medicamentis in praesens fuluis ubi reponuntur, quaedam extrinsecus supereminentia fusca concrescit, sub qua pars medicamenti profundior plus quam ab initio fuluior uidetur. Atque idcirco nonnulli huiusmodi emplastra uocant bicolora, quidam uero bifacia. Quanto uero subtiliora fuerint ac maiorē excidendi uim habuerint, tanto plus in sinu operabūtur: nam ad eius profundum oportet transmitti uim, si intentionē propositam assequi uelimus. Quae uero recetia & cruenta uulnera agglutinant, quanquā his minus exsiccat, labra uulnerū, si breuia extiterint, ac minime pro-

tom. 6

s funda

funda agglutinant, atq; ob hoc facile ac cito quod oportet efficiunt. Si uero in profundū uulnus pro tendatur, & futuris & fibulis solumus in unū colligere. Sinus itaq; omnes non simplices sunt diuisiones, sed frequenter in ipsis modo una pars, modo alia excoiata est, quod neq; te oportet latere. Cum igitur ad locum superiorem sinus extendit, facile per os sanies elabitur. Si uero uergit ad ima, cum intus retineatur, partem aliquam continuam erodit. In his itaq; sinibus, nisi prius ad effluxū feceris sectionem, nihil proficies, neq; cum carnem generare, neq; cum agglutinare uoueris. In alijs uero non opus est sectione, si modo conuenientē figuram in parte patiente seruaueris, ex qua figura potes aliquando sinum ad partem superiorem uergentem, facere ad inferiorem declinare: ac cōtrā, uergentē ad ima, conuertere ad superiora. Vidisti me igitur sinum in cubito existentem, cuius os erat prope cubiti flexuram figura in superiora tendente sanasse sine alia facta ex aduerso sectione: & in femore similiter figura sinus ad ima uergente, cum sinus uersus genu quidem terminaret, altius uero os media femoris regione superius, sine ulla ex aduerso diuisione: similiter uidisti factā esse curationem, subijciente me popliti cervical molle, ut inferiorem situm haberet inguen quā genu. Sufficit autem in hoc sinu & alijs isto maioribus solum melicratum immisum aptum ad conglutinandū omnes eius partes profundiores. quidam autem lixiuium iniecerunt seipsos coarguentes in his, quæ prius ad carnem sinui inducendam medicamenta immiserunt; neq; enim caro noua priori adnasci potest cū sordities circūfedit. Quomodo igitur sufficienter carne innata sinui cōglutinatiuum adhibent medicamentum, si quidem ueluti satis sordidum existentem lixiuium abstergere tentant, cum pura caro neq; acrius melicratum tolleret. In hac igitur satis est si hoc tale immittatur, quale quispiā cum uoluptate potaret, & post melicratum solitus sum deinceps anteq; medicamentum conglutinatiuum imponam, aliquando uino solo, aliquando uino mulso sinū abluere. Nam ad abstergendum atq; ad expurgandum circumstantes sanies melicratum est melius: sed ad conglutinandum uinum est melius & efficacius: sit aut inter dulce & astringens medium. Et quidem post medicamenti agglutinantis appositionem spongia noua ex uino, aut uino mulso circumijciatur quā mollissima, atq; deligatio quidem incipiat à fundo sinus, finiat autē ad os: sed nec lintheorum circumuolutiones ad fundum sinus dolo afficiant, sed constringant paulatim, atq; laxentur usq; ad os sinus, & hoc ipsum habeat laxam pharmaci impositionem, & quod circum apponitur emplastro, ita cū forficibus discisso ut ex ore sinus sanies si quæ excernantur, possint effluere, paruo aliquo alio ipsi imposto emplastro usq; ad solutionē: quā tertia die faciens, auferes hoc ipsum, quod ueluti operculum circumiacet, id quod per totū sinum circumiectum est medicamentum relinquens. Indictum autem tibi sit, nunquid pars sinus profun-

da sit bene cōglutinata, humor saniosus emanans si multus aut paucus coctus aut crudus est. Adhuc autem si neq; in ipso sinu dolor sentiatur, neq; tumor apparcat, sed totus locus depressus siccus atq; expers doloris existat. Si autē & pus bene coctum in ore uideris paucum, adhuc magis bonati bi sit spes de sinus conglutinatione: imponensq; rursus spongiā ac denuo alligans ut diximus, secunda die uel tertia solue, permutas semper quod ori sinus superstat lintheū eodem emplastro perunctum, quod totum os in circuitu comprehendet. Oportet autē non esse admodum impressum, sed ita ut omnis sanies ex sinu per ipsum possit euacuari. In prima igitur & secūda die si aliqua sanies tenuis à sinu excernitur, noli omnino de conglutinatione desperare. Sæpius enim circumiecti membro patienti medicamenti uis uehementer exprimit ex ipsa cute & carne subiecta tenuem humiditatem, quando ita affectum fuerit corpus aegroti, aut ex naturali tēperatura, aut ex malo uictu: quā humiditate expressa spatia mediocriter exsiccata conglutinantur. In tertio autem & quarto ab initio die si humor saniosus crudus ex ore se ostendit, tunc scito sinum non esse conglutinātū. Sit autem præ omnibus id quod patienti membro circumijciatur medicamentum, uehementer quidem exiccans, neq; mordens uero, neq; intendens, ueluti est nostrum quod cirrhū id est fuluum uocatur, sine cera cōfectum ex metallicis medicamentis elixatis & oleo cicino & aceto, quod uulnera cruenta cōglutināt, ac sine molestia sinus exiccat. Vidisti uero & ipso sanatas fistulas aliquando, in quibus angusto & longo existente foramine cum nondum intus callum haberent sed fordicem solum, immisi primum lixiuium, deinde tamdiu intus permanere permisi, donec speraui totam fordicem penitus excidisse: postmodū medicamentum apposui. Sic uero & eos qui sub cute sunt sola sinus, in quibus carnem generari non opus erat, quicq; ruditer à quibusdam curati erant, simul ut fuscepi hoc medicamentum conglutinaui, cum tamē prius lixiuium abluissem: quoniā qui ulcera curant, nullum ex his quæ expurgandi uim habent adhibent medicamentum. Vbi uero qui ad abcessum perueniūt, tumores tarde secti fuerint, aut ob medicamentum imperitiā, aut eorum quibus medela adhibetur timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant ut longiori tempore cutis à pure ro datur: cōtingit sæpius uniuersam cutim à pure circa abcessum aggregato sufficienter extenuari infra panni siue linthei detriti, unde & illi nomē detrita à medicis inditum puto. Est itaq; huiusmodi cutis conglutinatu contumax, præcipue si quis secundum substantiam siccum medicamentum imponat: ex his enim magis sit detrito panno similis, & sicca cutis instar pellium detritarum. Vsum est igitur mihi opportunum, si quis ad eius conglutinationem utatur medicamento, substantia quidem liquido, potentia autem siccō. Dictum est autem in libris De medicamentis, qd potentia sicca medicamenta dici solent à medicis, quæ exiccandi uim habent

habent. Optimum autē ex omnibus medicamen-
tis quæ substantiam quidem liquidam habēt, uim
autem exciccantī, est id quod à me compositū est
ex lithargyro et adipe suillo antiquo et chalcitide,
quibus additum sit oleum uetustissimū. Nam uim
eius esse efficaciorē sum expertus ad huiusmodi
affectiones, cum neq; admodum durum fuerit,
neq; exquisitē non inficiens manus, sed si tale con-
ficiatur, & uulnē cruentorū conglutinatiuum
erit, & omnia etiā ulcera ad cicatricē perducit, si
& oleo diluatur, & cum uino mediocris ætatis cō-
miscetur, deinde in circuitu eiusmodi affectioni-
bus apponatur, quas sæpius sine ulla molestia cō-
glutinauit. Cōfert autem ut diximus in detrita cu-
te non parū mel, si usq; ad emplastri cōsistentiam
elixetur. Eius uero elixationis mediocritas uix re-
cte perficitur nisi inspicatur. oportet enim ipsum
neq; adeo esse durum, ut difficulter adhareat, neq;
ita liquidum ut circūfluat. Nam quod durum est,
ad eandem peruenit cum duris emplastris absurdū
tatem: liquidum uero ueluti superiectū calido cor-
pori, undiq; circumfluit, & siccū linteam derelin-
quit, quod non modo nihil iuuat, sed etiā nonnun-
quam obest cuti, quæ debet cōglutinari. At si me-
diocriter elixetur, hoc quidem optimum est medi-
camentum in huiusmodi sinibus: sed quoniam eli-
xationis eius mediocritas non facile potest conie-
ctura attingi, rectius mihi uisum est ei myrrhā sub-
tiliter tritam aspergere, aut aloē, uel thus, aut ali-
quod ex his, uel omnia simul, tum præcipue cū lin-
teo inunctum liquidius apparet. Oportet autem
aspergere ista per cribrū quod sublime supra mel
teneatur: sufficit aut semel aut bis cribrum agitare
ut mediocriter excidat. Sæpius uero & dum elixa-
tur adiciō mellis aliquid ex ante dictis medicamē-
tis, quando præsertim sinus maior fuerit atq; pro-
fundior. Visum fuit aliquando & tenui centaureo,
quod mirū est ad huiusmodi medicamentū. Post
ipsum uero & symphytū utile est, & deinde ireos
illiricæ radix, postea farina ex orobis, neq; obscu-
rum est quod & cōtundī oporteat, & per cribrum
subtile transmitti, ac postmodum leuigari talia om-
nia. Melli autem cōmiscendum eo tēpore quan-
do debet ab igne amoueri, tantum nobis insuper
terētibus donec melli decocto optime uniantur.
Melius autem fuerit si cacabo ab igne amotō, hæc
omnia admisceantur, & deinde diligenter agite-
mus, donec mel adeo tepidum reddatur, ut corpo-
ri cui curatio adhibeatur, possit imponi.

De Gangrænâ. Cap. X

Consequens est ut deinceps dicamus de inflām-
mationibus, quæ gangrænæ factæ sunt. Nominat
autem (ut nobis) gangrænās eas, quæ ex magnitu-
dine inflāmationis fiunt mortificationes, quæ non
dum tamen integræ factæ sunt. Nam cum omnino
membrum effectum est emortuum, ut punctū uel
sectum uel adfectum nō sentiat quæ patitur, statim
recidere oportet, quæ sanam partē uicinam attingit.
Sed quod ita affectum est, denigratur. Quod
uero in medio est constitutū, ita ut tendat ad mor-
tem, Gangrænâ nominat. Curatur autē euacuati-

Galen.

tibus nobis quā possumus multū sanguinis qui
in membro patiente compingitur, cuius causa fuit
mortificationes, ob id q; arteriæ ex angustia loci
nequeunt se attollere, reliquo autē transpirationes
exhibere. Aut igitur cutem uniuersam multis se-
ctionibus profundis secare oportet unā cum sub-
iecta substantiā, aut plurimū scarificationibus pro-
fundis incidere. Sanguinem uero manare permit-
tens, imponere debes ex medicamētis aliquod ad
putrescentia utilibus, cuiusmodi sunt ex oxymeli
cū farina orobi uel lolij. Si uero talia non assint,
fabarum farinam adhibe, atq; ipsum oxymeli so-
lum: & si fortius medicamen apponere uelis, adij-
ce sal, aut ex trochiscis aliquem exquisitissime tri-
tum, qualis Andronis, & Polyidæ, & Pasionis est.
Et Musæ medicamen ad hæc aptissimū, quod in
Hæratō scriptum est. Vtari autem ex his quæ
antea diximus, animū aduertens ad corpus ægro-
ti. Nam si rusticum fuerit & durum natura, fortis-
sima medicamenta desiderat: foemineum uero &
molles carnes habēs, imbecilliora. Sic & uiri qui-
cunq; albi & molles carnes habent, & balneās a-
mant, & in ocio degunt, mollia exigunt medica-
menta. Neq; dubiū est idem in pueris faciendum
esse. Et si quādo etiam putrefactā atq; emortuam
partem absideris, ut securius agas, his utere medi-
camentis, naturam corporū simul attendens, atq;
eius insuper partis quæ male affecta est. Quædam
enim sunt, quæ citissime ad putredinem ueniunt:
& satius est ob maiorem securitatem, quando ab-
scindis aut circumcidis id quod iam putruit, eam
quæ ueluti quædam radix ipsius est, sanæ parti ad-
iunctam adurere, sicuti sæpius in pudendis facere
consequimur, nonnunq; male affectis partibus,
quæ adurunt afferentes: quandoq; uero linamen-
tum ante submittentēs. Facta uero adustione sole-
mus (ut nostri) uti succo porri, qui ubi nō adsit, his
quæ paulo ante diximus. Vbi uero tibi uidebitur
his remedijs adhibitis cessare putredē, ut cito cru-
sta excidat medicamēto quod nominatur Cepha-
licum, cum melle utere. Melius uero & ex hydre-
læo pane decocto, uel farina hordeacea, uel etiam
cum ipsa miscendo triticeam, facere pharmacū.
Id etiam medicamentū quod Tetratharmacū no-
minatur, ac præterea Macedonicum, sunt ad sup-
purationes, & ad crustas remouendas accommoda-
tissima. Similiter autē & quæcunq; uim habent ad
suppurationem perducendi. Et panis uero tritus
cum apio uel ocymo optime crustas distrumpit, &
à sanis partibus separat. Ex simplicibus autē medi-
camentis iris, uel radix panacis, uel aristolochiæ,
uel acori cum melle. In mollibus uero corporibus
sufficit orobi farina cum melle uel thus. Aufert
autem & crustas Machæronis medicamentum, &
Isis cum melle. Cum uero exciderint crustæ, hu-
iusmodi ulcera possunt quibuscunq; medicamen-
tis, quæ carnem inducant, ad sanitatem perducī.

De Cancris, & elephante. Cap. XI

Cum de his abunde dictum sit, reliquum est ut
de cancris tumoribus differamus, qui in omni-
bus quidem partibus corporis fieri cōsueverunt.

sed in mamillis præsertim mulierum, quæ à natura purgatione non habent, quæ ubi modum serua uerint, tunc mulier integra fruitur sanitate. Hi uero omnes præter naturam tumores ex atræ bilis superfluitate generantur, de qua diximus in cōmentarijs, in quibus De potentijs naturalibus egimus. Vbi ostendimus hunc humorem, dum sanguis in hepate fit, fecis uinariæ proportionē generari: expurgari autē à splene, qui ex eo naturaliter habet alimentū. Cum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucū generauerit, & ratio uictus adhibita confert, & splen satis attrahit ex eo qui generat, nulla huiusmodi superfluitas in uenis coaceruatur. At cum contraria eueniunt, tunc in uenis multiplicatur, & eas de quibus dicturi sumus, facit ægritudines. Dico autem his quæ antea exposuimus cōtraria, ut scilicet hepar ad generandum huiuscemodi superfluitatem fit aptum: sit etiā ratio uictus per tales adhibita cibos, qui crassum & sæculentum sanguinē procreare natura apti sunt: splen uero sit natura imbecillior, & quicquid de ea superfluitate generat, ad se minime trahere potens. In hoc uero corpore turbidus fit, ac crassescit is qui in uenis cōtinetur sanguis, & nonnunquam à uenis habetibus (sicut & alia omnia) uim excernendi id quod extraneum est, per hæmorrhoidas excernitur. Sepius autem & ad uarices decumbit. Et quandoq; ad cutem uniuersam expellitur, fitq; is morbus quem Elephantem nominant: nam & aliquando ad alias corporis partes, quæ ceteris sunt imbecilliores, humor iste deferret, atq; euidenter apparent quæ in illa parte sunt uenæ, nigro sanguine ac crasso plenæ: quantoq; crassior fuerit ac nigrior, tanto deterior est affectio. In mamillis autem sæpe uidimus tumorem forma ac figura cancro animalis consimilem. Nam quemadmodum in isto pedes ex utraq; parte sunt corporis, ita in hoc morbo uenæ distenduntur, ac figuram omnino similem cancro repræsentant. Hunc morbū per sui initia sæpe sanauimus. Sed ubi in molem insignem satis attollitur, nemo sine manus opere potuit curare. Itaq; in omni huius generis curatione intentio est, totum qui circumstat tumorem præter naturam qui partibus sanis adhæret abscindere, sed ob uasorum magnitudinē, cum præsertim fuerint arteriæ, profluuij sanguinis statim periculum imminet: q; si laqueis eas circumprehendas, per consensum affectiones insequuntur. Si autem & morbi radices exurere statuas, neq; huic rei maximū periculū deest, cum prope loca principalia sit aduistiō. Hunc igitur morbum (ut diximus) in principio sanauimus, & tunc præsertim cum atræ bilis humor non admodum crassus uidebatur existere. Nam hic purgantibus medicamentis ex quibus sanitas sequitur, prompte succumbit. Neq; obscurū est huiusmodi medicamenta debere esse euacuanda atræ bili accomodata. Quod tamdiu faciendum est, donec sanitas pristina subsequatur, ita ut ratio uictus optimos generans humores, interim adhibeatur. In Alexandria quidem elephantis morbo plurimi corripiuntur, propter uictus modū & re-

gionis feruorem. At in Germania & Mysia rarissimi hæc affectio uidet. Et apud Scythas lactis potatores nunquā ferē apparuit. In Alexandria uero plurimum generatur ex uictus ratione. Comedunt enim farinam elixatam & lentem, & cochleas, & multa salsamenta, & nonnulli ex ipsis carnes asinas, & alia quædam quæ crassum & atræ bilis humorem generant. Nam cum circumflans aer calidus sit, motus humorū agitur uersus cutem. Huic igitur morbo, quas antea diximus conferunt purgationes. Quod si & aras & uirtus permiserint, sanguis prius mittendus est.

De cura Cancr. Cap. XII

In cancris uero non inutile est, neq; in istis ubi nihil prohibet sanguinem mittere, deinde purgare: & si fuerint mulieres, menstrua euocare, siquidem nondum quinquagesimū annum attigerint. Patienti autem particula succus solani imponat, nam hoc medicamē ad huiusmodi utile est. Quod si nolit ægrotans medicamento adeo liquido illiniri, cum præsertim domum exit ad consueta negotia peragenda, medicamen ex pompholyge cōstitans est imponendum, quo me uidisti uti ad cancrōs etiam exulceratos: & si hoc non adit, adhibe alterum medicamentum nostrum quod ex chalcitide fit. In uictus uero ratione succus pitænae abundanter exhibendus est, & serum lactis, & ex oleribus, malua, atriplex, & bletum, & quādo tempus tulerit cucurbitis utendum, & piscibus petiolis, & auiibus omnibus, exceptis palustribus.

De elephantia. Cap. XIII

Sed his qui elephantiam patiuntur, in uiperarum esu est mirabile auxilium. Ita uero eas præparare oportet, quemadmodum uidisti Marlos, qui feris uenenatis & aspidibus nutritur. Capite quidem primū abscisso, & cauda, usq; ad digitos quotior: deinde omnibus interaneis exemptis, cute etiam ut liquere potest adempta. Aqua deinde abluatur corpus ipsarum. Sed neq; aliter cum theriacam antidotū conficere uolumus, usq; ad hoc præparamus: sed deinceps coquimus quod desideret. In theriaca quidem paululum anethi & pauci salis in aqua ponentes. In his autem qui elephantia laborant, in olla anguillarū modo præparantes, & album ius efficientes. fit autem hoc modo: Aqua abundanter in ollam funditur & paucum olei, & cum hoc porrum & anethum adijcitur. Liqueat utem q; uiperarū carnes sunt decoquenda, donec exquillite molles reddantur. Ipsum etiam medicamentum confectum ex uiperis quod theriacā appellant, optimū est ad potandum ijs qui huiusmodi morbo laborant, uel etiā si cui libuerit ad cutem oblinendam: nam cum omnia hæc facta fuerint, nonnunq; solet squama à cute decidere, aut quid simile ei, quod senium serpentis appellat. In alijs aut tumoribus præter naturā, nō putauim oportere eam que manu fit curam hoc in loco scribere, cū tu medicamenta pbatissima à nobis acceperis.

De Strumis. Cap. XIII

In strumis enim ea quæ astringere & exsiccare, & pus etiam facere possunt. In his autem quam medicantes

licerides dicuntur, ea quæ has dissoluendi vim habent, & quæ pus resoluunt medicamenta, & quæ aquam in froto & abdomine accepisti, quibus etiam in aqua intercute laborantibus utaris. In his enim duplex intentio est, scilicet ut sanetur tumor durus in uiscere, & coaceruata humiditas dissolvatur. At prius de scirrhi in uisceribus curatione dictum est. Quare curatio hydropum ad has tres reducit intentiones, ut sanemus durum tumorem qui in uiscere est, ut ea apponamus quæ humiditatem dissolunt, & medicamenta quæ urinam mo-

uent in potu demus. Hæc quidem ad te missa qui longè peregrinaturus es, medicriter se habere uisunt. Si uero (ut institui) tractationem De medicamentis secundum genera & loca patientia composuero, illum in tuo reditu habebis. Sed & aliud opus magni amicus exposculantibus exarabitur, in quo tota methodus ac ars curandi continetur. Quod si tibi peregre detineri diutius contigerit, singulos qui a nobis scribentur commentarios ad te mittere non grauiabimur.

ARGVMENTA CAPITVM

Prologus: quod iter facientibus, & ijs qui ruri aut in solitudine uersantur potissimum hæc scribat, ideoque remedia sepe quacunque parabilia duntaxat se præscribitur: interim uero etiam exquisita quædam, sed non difficilia paratu, idque à capite ad pedes. Caput 1. De causis & differentiis dolorum capitis, ex æstu, frigore, & uaporibus, præsertim à uentriculo eleuatis. 2. Ex solis æstu. 3. Ex frigore. 4. Ex uaporibus. 5. Ex uentriculi cruditate. 6. Ex uini potu. 7. Ex ictu & casu ab alto. 8. Ex contusione siue collisione. 9. Ex ebrietate ac solis æstu. 10. Ad capillorum destitutum. 11. Ad capitis furfures. 12. Ad capitis pediculos. 13. Ad achores siue manantia capitis ulcera, & fauos. 14. De alopecia & ophialia, id est areis. 15. De doloribus aurium. 16. Ad aurium nouimenta ex aqua. 17. Ad aurium inflammationes. 18. Ad igneum in auribus feruorem. 19. Ad aurium ulcera. 20. Ad grauem auditum, auriumque sonitus seu sibilos. 21. Ad grauem auditum. 22. In aure infundenda apta. 23. Ad uermes aurium. 24. De parotidibus, id est abscessibus iuxta aures. 25. Ad narium uitia, & primo ad ozænam ac polypum. 26. De polypo. 27. Ad sanguinis è na-ribus fluxum. 28. De uitio oculorum. 29. Ad diu-rnas lippitudines. 30. Ad humorum in oculis destitutum, ex Archigene. 31. Ad calidam destillationem. Linimentum pro oculis. 32. Ad oculorum dolores. 33. Emplastrum ocularium. 34. Ad uehementes oculorum dolores. 35. Ad destillationem in oculos cataplasmata. 36. Anacollemma ex limace. 37. Ad hama-las & hypophthalmata. 38. Ad oculorum molles ex ictu tumores, dictos œdemata. 39. Ad oculorum pruriginosam scabiem, pterophthalmiam, à sole & puluere orta. 40. Ad inueteratos palpebrarum affectus, præputæ callum. 41. Ad palpebras depiles. 42. Ad pilos palpebris innatos, oculum infestantes. 43. Ad leucomata, id est albugines. 44. Ad uisus obscuritatem. 45. Ad pterygion, id est unguem oculi. 46. Ad nyctip-loriam, id est nocturnam oculorum cæcitatem. 47. Ad oculorum tubercula, crithæ dicta. 48. Ad fugillata sub oculis. 49. Ad fugillata sub oculis cum œdemate, id est molli tumore. 50. Ad recentem fugillationem. 51. De uariis. 52. Ad scissas in mento ex crescentias. 54. Ad menti impetigines. 55. Ad diuturnas impetigines. 56. Ad scabras impetigines. 57. Ad genarum exanthemata siue papulas. 58. Ad dentium uitia, & primo dolorem. 59. De fomentis ad dentium dolores. 60. Ad idem apophlegmatismi. 61. Ad idem, naribus

Galen.

LIBRI DE PARATV FACILIBVS.

in sciendum. 62. Ad dentes denigratos. 63. Ad col-luendos dentes. 64. Ad colluendum gingiuas. 65. Den-tes à dolore præseruanda. 66. Ad oris grauolentiam. 67. Ad dentes mobiles. 68. Ad dentium erosionem. 69. Ad omnes tam oris quam columellæ ac faucium in-flammationes, ceterosque affectus, seu ulcera ea sint, seu crusta, seu putredo. 70. Optimum medicamentum stomacum. 71. Ad inflammationes tonsillarum ac columellæ, & oris putredines. 72. Ad oris putredines ac cruitas. 73. Ad columellæ inflammationem & rela-xationem. 74. Ad aphthas, id est oris ulcera. 75. Ad aphthas nigras & depalcantes. 76. 77. 78. 79. Ad aph-thas depalcantes, & albas, & nigras, & infantium. 80. Ad uocalis arteriæ asperitatem. 81. Ad interscissam uocem. 82. Ad rufum siccam. 83. Ad sanguinis reiectionem ex-puitionem. 84. Ad tabidos & thoracis uitia. 85. De oris uentriculi affectibus. 86. De calida uentriculi in-temperie. 87. Ad uentriculum iusto frigidiorem. 88. Ad eos quibus in uentriculo cibus accecit. 89. Ad stomachi subuersiones. 90. Ad dysentericos, & cibum uomitu resistentes. 91. Ad stomachi subuersionem, coeliacos, & dysentericos. 92. Ad sitim ex nimio ardore, cataportia. 93. Ad stomachi subuersionem & feru-dos halitus. 94. Ad stomachi perfrigerationem & singultum. 95. Ad astuantem stomachum. 96. Ad nimiam ex stomacho saluam. 97. Ad dolorem stomachi. 98. Ad uomitum bilis nigra. 99. Ad stomachi inflationem. 100. Doloris stomachi mitigatorium. 101. Ad eos qui bulimon, id est grandem famem facile incurrunt in uia. 102. Ad singultientes. 103. Ad hepatis obstructionem. 104. Passillus hepaticus. 105. Ad ictericos. 106. ad splenicos. 107. Epithema splenicum. 108. ad hydropicos. 109. ad colicos. 110. Ad refrigeratos. 111. ad inflammationes. 112. ad dysentericos. 113. ad coeliacos & dysentericos. 114. ad diuturnam dysenteriam. 115. De applicandis sedi remedijs. 116. ad sedis ex ardore dolores. 117. ad ani pruritum. 118. ad proidentem anum. 119. Potio ad renum & uesicæ affectus, inflammationis participes, & exulcerationes. 120. ad uesicæ ulcerationem & urinæ difficultatem. 121. ad renum obstructionem. 122. ad calculos. 123. ad coxendicum, pedum, & articulorum dolorem. 124. ad podagram paroxysmum. 125. ad feruidas inflammationes. 126. ad immensos ardores. 127. ad laxas inflationes. 128. ad sanguinis è naribus fluxum. 129. De fluxu sanguinis è uulnere. 130. ad cho-leram affectum. 131. De pharmacis mortiferis.

tom. 6

s 3

CL. GALENI DE REME- DIIS PARATV FACILIBVS LIBELLVS

AB HVBERTO BARLANDO PHILIATRIO LATINO SERMO.

ni traditus, & à Iunio Paulo Crasso medico Patauino, accuratissime
castigatus, & ab omni labe purgatus, addito etiam prin-
cipio, quod antea desiderabatur.

PROLOGVS.



V V M ars medica circa
nullas unq̃ urbes, neq̃
ullos opulentos homi-
nes, aut nobilitate, aut
potestate, aut magistra-
tibus insignes, ita circū-
scripta fuerit, ut non ma-
gna ipsius erga mortali-
um genus beneuolen-
tia, ad publicam omniū

utilitatem, in cōmuni spectauerit: & tamen nunc
ob negligentiam eorum qui illi operam dant, de-
ficere uideatur: æquum esse duxi, ut pro mea uiri-
li, operam meam impenderem, ut de ea quæ ad ru-
ra ipsa, ac solitudines quoq̃, fines suos proroga-
rit, etiam consultum esset, his qui iter faciunt, aut
ruri, aut in solitudine uersantur, quum in horum
corporibus & facile, & præter expectationē, mor-
bi oriantur, & uim suam exercent: nec tamen his
ita prompta remediorum copia esse putetur. Et
profecto neq̃ quocunq̃ loco medicamenta pre-
tiosa in promptu esse possunt, neq̃ præterea me-
dici præsentis sunt, qui illis uti possint: quum ta-
men eiusmodi plerūq̃ adsint calamitatū circum-
stantiæ, ut nullam dilationis tarditatem ferant, ue-
lut in angina contingit, & uenenosis medicamen-
tis, et moribus animalium uirus et aculantiū. Item
in sanguinis profluuijs, & cholericis fluxionibus,
& id genus alijs. Quare neq̃ scientificas & exqui-
sitas curandi rationes, omnibus suis præceptis ab-
solutas, hoc loco tradere proposui: Sed talem qua
possit quis etiam de plebe, periclitantibus casu a-
liquo, aut aliàs male affectis hominibus illico opẽ
ferre, si sanè in tanta rerum difficultate, paratu fa-
cilioribus remedijs utatur. Nam alioqui uelut pro-
re confessa, illud sumendum est, quod ratio mate-
riæ quæ exquisita & omnino ex arte est, atq̃ etiam
remediorum usus, qui ex artis ratione sit, eo maxi-
me tempore requiruntur, quo & medicamento-
rum & medicorum copia nobis suppetit. At ubi
occafio præceps est, nec in promptu copiosa ac lar-
ga sit remediorum uertas, eo sanè tempore sum-
mopere necessariam medicamentorū facultatem
esse arbitror, quæ sunt facilima paratu, illis qui
quacunq̃ tandem parte male afficiuntur. Præscri-
bam itaq̃ remediorū facile parabilem materiam:
quandoq̃ tamē, quamuis raro, aliquam etiam ex-
quisitorum medicamentorum mentionē faciam.
sed quæ ipsa quoq̃, eo quod multis in usu sint, fa-
cile haberi possunt. A capite uero initium faciam.

A Hoc enim uelut arx quædam totius corporis est,
uelutiq̃ habitaculum sensuum, qui in summo ho-
nore sunt, & hominibus maxime necessarij exi-
stunt. Itaq̃ remedia illi cōmoda primum propo-
nam, atq̃ ex his ea in primis quæ facile haberi pos-
sunt, & manifesta ac cognita omnibus habentur.

De causis et differentijs dolorum capitis. Cap. 1

Caput porro multis modis affici potest, ex estu,
ex frigore, ex uaporibus à uentriculo sublati, idq̃
replentibus, ex his item quæ id grauunt, & ex gra-
ueolētibus, & ex alijs multis. Quin & cutis ipsius
& capilli deturpantur, uelut in alopecia & ophiā-
si, & uarijs ulcerum differentijs. Aestus itaq̃ ac fri-
goris signa satis manifesta sunt, quum sint illæ cau-
sæ externæ, ab eo quod laceffunt & auspicantur
malum, procatartice: grecis appellata: Concomi-
tantur autem ex aestu affectos hæc, dolor cum pul-
satione, uniuersū capitis corruptio, cum ignei calo-
ris perceptione, uasorū circa caput distentio, ocul-
lorum rubor. Plerūq̃ etiam uigilia. Ex frigore ue-
ro hæc, grauitas coniuncto stupore, congelatio,
uasorū circa frontē collapsio, Et si humiditas fri-
gori copulata sit, sopor. At ex uaporibus affectos
comitatur dolor punctioris, pulsus arteriarū circa
frontē, uertigines, caligines oculorum, sonitus
aurium. atq̃ hæc pariter cōtingere solent, siue ex-
terni, siue interni uapores caput replent.

De capitis dolore ex solis aestu. Cap. 2

Capitis ex solis aestu dolori medetur fortis ex
oleo immaturo, frigido. Quod si uehementior sit
dolor, ex rosaceo & aceto. At si ad manū non fue-
rit rosaceū, oleo acerbo siue immaturo utendum.
Porro olei partibus quatuor, aceti unam cōmisce-
to, si mediocriter refrigerare cupias, alioqui plus
aceti foret adhiendum. Feruente autem aestuan-
teq̃ uehementius capite, cōmiscendum aceto suc-
cus, aut polygonij, id est, sanguinarie, aut planta-
ginis, aut portulacæ, aut lactucæ, aut uiræ acerbæ,
aut deniq̃ alius quicuis, similis cū dictis facultatis.
D At ex succis hisce, magis ne an minus tēperatura
frigidus cōueniat, satis superq̃ docebit affectus ip-
sius magnitudo siue uehementia. Cōsultus ad hæc
fuerit, decubere ægrotū in domo quapiā frigidio-
ri, si nō natura, saltē arte, utpote strata folijs & ui-
tis, & rubi, & pomi, & alijs horū similibus, quibus
fuerit pro tēpore refrigerandi facultas. Dicto por-
rò affectui per quā similes sunt, qui à quauis intem-
perie ortū habent, & non à causa externa. Verū ut
ab intēperatura, tum calidiori & sicciori, tū frigi-
diori & sicciori graues oboriuntur dolores, ita nulli

ab humidiori. Cæterum curantur ab intemperie
 orti capitis dolores modo eodem, quo à causa ob-
 orti externa, suo nimirum contrario.

De capitis dolore ex frigore. Cap. 3

Capitis ex frigore dolori medentur foci natu-
 ra calidi. qui ex mediocri habuerit ortum, satis fue-
 rit uti oleo aut anethino, aut rutaceo, calido; sin ex
 vehementiori ac grauiori, cucumeris agrestis radix
 prodest, cui modicum euphorbiæ interdū addito,
 uel oleo irino, aliò ue id genus tenuis substantiæ uti-
 tor, aliqua ijs cōmiscendo. Porrò admissibetur ho-
 rum quantitas modo maior, modo minor, pro ra-
 tione uincetis frigoris cōsiderando ac metiēdo.

Ad capitis dolorem ex uaporibus. Cap. 4

Quibus caput ex uaporibus dolet, his subducen-
 da alius est, prospiciēdūq; de modo undiq; perspi-
 cabilis, ærisq; clari ac puri, cieda sternutamenta, præ-
 sertim si febre uacent, attracto per nares trito aut
 struthio aut pipere. uacuatis em ratione hac uapo-
 rib. facile discutietur dolor. Fouēdū præter hæc oleo
 caput est, cui adiectū sit aceti nonnihil. sic em reprimet
 immodica ad caput uaporū sublatio, quodq;
 nunc cerebri uentriculis inleat, discutietur. Non
 linatur autem talis dormire, & potissimū interdū.

De dolore capitis ex uentriculi cruditate. Cap. 5

Quibus caput per cōsensum dolet, ex cibi in uē-
 triculo cruditate, aqua tepida liberalius est in po-
 tu exhibenda, dein ut uomant iubendū. Multis eo-
 rum sanè, qui stomacho laborant, cum e lecto sur-
 rexerint, caput dolere consueuit, ijs statim assum-
 pto cibo dolor leuari solet. Quod si quando præ-
 nimio capitis dolore, repente aliqui obmutescāt,
 idq; causa non satis cognita, horum caput aqua te-
 pida liberalius infusa foueri conuenit, auribusq;
 oleum infundī, & lanam inseri.

Ad capitis dolorem ex uini potu. Cap. 6

Quod uini natura calidius capitis faciat dolorē,
 oppellens ipsum facile uaporibus, interdum aut &
 succis, quod etiam citra uini potum uapores id ge-
 nus petant facile nonnumquā ipsum caput, dolorē
 inducentes, præsertim ijs, quibus caput contigit
 temperaturæ calidioris, omnibus manifestum est
 stimulo. Proinde curationis intentio in his est, uapo-
 rim uacuatio ac discussio. qui quoniam natura cali-
 di sunt, caput ipsum distendentes, egent refrigeranti-
 bus, hinc illinendum capiti rosaceū actū admodū
 frigidum. Conueniunt etiam talibus, somnus ac
 quies, & sub uesperam balneum, cibis boni succi,
 cui tamen calefaciendi natura non sit, cuius gene-
 ris sunt, pitæanæ succus, oua sorbilia nō addito ga-
 ro, panis aqua maceratus, lactuca, ut quæ refrige-
 ret, & brasiica, ut cui sit uapores desiccandi natura;
 utendum ad hæc aquæ potu. Ceterum ijs, quorum
 uenterculus hoc subuertitur, dabimus aut malum
 punicum, aut coctum seu pomum seu pirum, quæ
 coquenda sunt ratione hac. Infusa in ollā aqua fer-
 uida, suspensisq; in ipsa olla fructibus eiusmodi au-
 tumnalibus, tantisper sub hac ignē succendemus,
 donec fructus illi percoquantur, solo ab aqua illa
 feruente sublato uapore. Quinetiā uræ passæ cor-
 roboratū uentriculi habent facultatē, at palmulis

in totum abstinendū, utpote natura sua inducenti-
 bus capitis dolorem. Quod si post hæc, sic affecti
 nondum probe dormiant, in crastinū ducendi sunt
 in balneum sunt, aquaq; calida frequēter per-
 fundendi, deinde interiecto aliquātulo tempore,
 denovo lauandi, ac tandem cibandi, eodē, quo no-
 bis paulo ante dictum est, modo. Ceterum si quan-
 do post omnia hæc, relinquatur adhuc pristini nō
 nihil seu uaporis seu succi, exilioribus capitis mea-
 tibus impacti, atq; ita perduret adhuc ueteris do-
 loris uestigium, rosaceo abstinentes, fouebimus
 ipsum caput chamemelino moderate calido, dein
 de irino, quod maxime quadrat id genus affectib.
 Cæterum omnibus his uino est abstinendum.

De dolore capitis ex ictu, & casu ab alto. Cap. 7

Quandoquidē ex ictu & casu ab alto, obuēniūt
 capitis dolores, existimauim non inutile, saltē pau-
 cis, de his etiā agere. Admouendus igitur his per
 spongiā aut lanā molliorem, foci aquæ cali-
 dæ; iniungenda post hæc quies, cibi subtractio; in-
 feriores uētris uacuatio. Fugienda aut sunt, sol, bal-
 neum, uini potus, clamor, uociferatio, oēs præte-
 rea cibi acres, acidi, ac falsi. Cæterum illud cuius
 manifestum existimo, uariandas inueniendorum
 auxiliorum intentiones, pro causarum affectus in-
 ducentium uarietate ac natura.

Ad capitis dolorem ex contusione siue collisione. Cap. 8

Vt uenit non raro, ut ipsum caput contunda-
 tur, interim sine uulnere, interim cum uulnere, ita
 ut ob hoc complentur curationis intentiones:
 Porro cōtusioni propria sunt remedia Græcis *πρὸς
 πρὸς πρὸς*, Latinis uero mitigatoria dicta, cuius ge-
 neris sunt, aquæ calidæ super caput effusio, & fo-
 tus capitis hapsio lanæ ex oleo. quod si qua adsit ca-
 pitis diuisioni calamitas, ut occasione hac conglu-
 tinari prohibeatur, huic detergē prius spōgia ex ui-
 no sideritina herbam tritam illigabis. Aliud. Resi-
 nam frictā cataplasmatīs modo impositā uulneri
 alligato. Aliud. Aloen tritam ac mellis mistā im-
 ponito. Aliud. Ulmi uirentiæ folia concisa, dein
 de cōtrita, applicato: quin ulmi etiam cortex pro
 uinculo uulneri circumuolutus idem præstat.

De capitis dolore ex ebrietate ac solis aestu. Cap. 9

Quandoquidē Archigenes scripsit conferētia
 capitis dolori remedia dicta Græcis *πρὸς πρὸς*, La-
 tinis uero appensa siue amuleta, sic appellata, q;
 de collo suspēdunt, aut alicui corporis parti adal-
 ligātur, haud existimauī absurdum, aut ab hoc nō
 stro cōmentariolo alienum, adscribere paulo ante
 dictis & hæc. Capitis arcentia dolorē, tā ex ebrie-
 tate, q; solis aestu. Polygonij, id est, sanguinalis her-
 bæ duos cōnectens ramulos capiti coronæ in mo-
 dum imposito. Aliud. Polygonio laeuigato ex
 lactis crema caput sub uesperam inungito; ac su-
 perposito leporis pellē, siq; in crastinum finito;
 tum enim hanc detraheris, cōperies finitum dolo-
 rem. Aliud. Cichorij, quod Romani Intybum
 dicunt, applicato dolenti capiti. Aliud. Sertū ro-
 faceum, ex recentibus rosarum floribus confarci-
 natum inducito dolenti capiti. Aliud. Cinge ca-
 put sereto ex callitricho, quam alij adianton, alij tri-

chomanes uocant. Aliud. Scripsit Archigenes summopere conferre capitis dolori uerbenacam, quam quidam sacram herbā uocant, tam ferti modo impositā, quā ex aceto & rosaceo inunctam. Testudinis lacustris, quam Amyda quidam appellant, sanguinem instillatū capitis synicipiti.

Ad capillorum desoluium. Cap. 10

Ladanon conspersum uino odorato & acerbato contere, adfundens & oleum myrteum, ut strigmentorum cōsequantur crassitiem, capitiq; inunge. Aliud. Noces uirides, sed iam submaturescen-tes, confractę numero centū olei sextaria duo, alu- minis liquidi librę tres. conijciūt in nouum uas testaceum pręfaturatū aqua, ne combibat cōcre- ditum sibi humore, quod postea accuratissime ob- litum reponitur in domum liberi patentisq; aeris, diebus quadraginta, demū aufertur, atq; in usum conservatur sic preparatum oleum. Aliud. Ladanon, ablinthium, & iuniperi bacca cōteruntur, linteoq; illigata conijciuntur in oleum, maceran- turq; diebus quinq;, quod postea fuerit usui. Idem possunt nigre myrti, aut gallę partes duę, ex oleo: quin hoc ipsū medetur etiam capitis fursuribus.

Aliud. Ladanon detritum ex uino dulci quoad strigmentorum habeat spissitudinem infricatur.

Aliud. Anemones florem laeuigatum ex oleo, illine. Idem hoc reddit etiam capillitium nigrum.

Aliud. Verbenacam rectam, unā cum radicibus desiccata, deinde exacte admodum laeuigatam tantillo misceto oleo, quantulo opus sit, ut strig- menti consequatur crassitiem, finitoq; deinde ad- tempus simul putrefieri, demum utitor.

Ad capitis fures quā *αὐτὸν ὁ ἰατρίῳ* dicit Græci. Cap. 11

Pręficutū caput illinitur betę succo, fenogre- ci farina, et nitro, omnibus e qua portione cōtritīs.

Ad capitis pediculos. Cap. 12

Herbę pedicularis partes duę, sandarachę pars una ex aceto ac oleo capiti infricatur. Aliud. Alumine scissili ex oleo utitor.

De manantibus capitis ulceribus, quas *ἀχρόες* dicunt

Græci, & *funis*. Cap. 13

Αχρόες, id est, manantia ulcera, cutis capitis u- tium sunt, ab ipso sic dictę affectu, quod cutem te- nuissimā foraminibus perforant, ex quibus gluti- nosa effluit sanies. Huic uitio affine est, quę *κρίσις* dicunt Græci, nos fauū. in quo foramina sunt, q̃ in illis maiora, melleum continentia humorem. Est autem utriq; uitio initium ex humore super- fluo. Porro incipiūt cum pruritu, demum extube- rascent. Curatio est siquidem graue ac magnum fuerit uitium, corporis totius uacuatio, catapotijs ex scammonia, aloę, & colocynthide: hæc enim æ quali pondere contrita excipiuntur brassicę suc- co, ac conformantur in catapotia erui magnitudi- ne. Quorum maxima uice unica offerenda quan- titas, sunt catapotia decem & septem numero, cæ- terę autem uariant pro uiribus eorum, quibus su- muntur. Sin mitius ac minus fuerit uitium hoc, sa- tis fuerit topica, id est, localia tantum dicta reme- dia applicuisse, e quorum albo est cimolia ex acer- rimo aceto inducta. Aliud. Creta ex acerrimo

aceto similiter inungitur. Idem possunt sania ter- ra, & bulla dicta pompholyx. Aliud. Illinitur si- militer lithargyrus cū charta usta ex aceto. Ara- chores ac faui, quib; adiuncta est ulceratio doloro- sa, pręfouendi diebus singulis sunt aqua calida, in qua decocta sit aut myrtus, aut rubus, aut morus, aut asparagiri radix, demū inungendi. Aliud. Sals- cis folijs ex aqua, aut lente ex melle, aut decocta asparagiri radice deline caput, aut betę succo cū fe- nogreçi farina. Apposita præter hæc remedia his, sunt pini cortex cū cera, uel cadmia ex oleo aut li- thargyrus, aut cerussa. Proderit etiā abstergere in balneo cimolia ex betę succo. Ceterū illud nemi- nē latere uelim, in mollis carnis corporibus, ut inq; hierib; remedia hæc nō ex aceto, sed uino illinēda.

De Alopecia & ophiali, id est, areis. Cap. 14

Geminum accidit pilis capitis uitium, alterū de- fectu, alterum mutatione ipsorum in colore con- trarium siue diuersum: defectu, ut in caluitie: mu- tatione coloris, ut in alopecia & ophiali, id est, are- is, uitijs pilorum cum primis in decoris. Euenit au- tem pilis hoc uitij genus, eadē ferē quā stirpibus ratione, quæ corruptuntur intereuntq;, interim penuria nutrientis ipsa succi, interim immutatio- ne huius in alienū ac cōtrarium. Porro tam alope- cia q̃ ophialis ut sunt ex æquo affectus præter na- turā, ita similiter eandē habent tum ortus, tum cu- rationis rationē, ob solā tantū figurā ac formam, diuersas fortitæ appellationes: siquidē in ophiali per similes serpenti species in capite apparet, at alo- peciam ferunt dictā, quod *ἀλωπας*, id est, uulpes, uitio eo frequenter laboret, quod aliud est nihil, quā pilorū denudatio, qua locus affectus disco- lor apparet. At nos cur hoc aut illo modo appella- tum quidpiam sit, curiosius non inquirimus, pro- cōperto habentes, idq; physica siue naturali qua- dam ratiocinatione adducti, horum omnium cau- sam esse, uitiosos succos. Proinde tempus iam est, ut ad ipsorum transgrediamur curationē, quæ & ipsa uaria est, pro nimirum affectus seu uitij diuer- sitate, quam tibi cutis color mōstrabit, qui in alijs confestim albidior est, in alijs pallidior, in alijs ue- ro nigrior. Esse porro omnia hæc uitiosi succi ger- mina, neminē fugit. In quibus igitur cutis in ca- pite color apparet albidior, a corrupta pituita uitij esse indicat, quod curatur medicamentis pituitam educentibus, necnon apophlegmatismis, hoc est, medicamentis, quibus per os pituita purgatur. In quibus autem color apparet pallidior, utendum medicamentis quæ bilem pallidā uacuant, sicuti ijs quæ nigram, ubi color apparuerit nigrior. Ne- cessum enim totum prius corpus purgari, q̃ loco affecto topica, id est, localia dicta remedia appli- cendo, ne his irritato affectu, plus etiā adduatur ad membrum læsum uitiosi succi, cuius rei cum præ- purgato toto corpore nullum sit periculum, tum demum localibus remedijs utendum. Sunt porro *ἀποφλεγματικά*, id est, pituitā per os educētia me- dicamenta, pyrethron, & staphis syluestris, quorū alterū per se, aut etiā utriq; simul cū mastiche mā- ducaf, & sal glebosus cū pulegio, aut sinapi cōtri- tum

rum, ex oxymelite & diutius ore contentū ac gargarissum. Cæterum purgantium medicamentorum quodq; peculiarem sibi humorem trahit, eductū aliud quidē pituitam, aliud uero bilem, hoc flauam, illud nigrā. Sed longū nimis esset quodq; horum singulatum recēdere, nec adeo ad rem, cum alterius sit instituti. At in cōmuni quidem, alopecie & ophiali hæc ferē conueniunt. Initio catapota siue pilulæ ex aloē, quæ cōstant ex medullæ colocyntidos parti una, aloes ac scammonia parti bus duabus, succi absinthij parte una, excipiuntur autem omnia hæc succo pomorum. Quantitas horum exhibetur pro sumētis ea corporis uiribus. Deinde paucis, utpote septē forte interiectis diebus utendū hiera *ἡiera κολοκυνθιδος*, sic dicta, quod colocyntidos sit particeps. Eius hæc est compositio. Medullæ colocyntidis mollis unc. xvi. chamæpityos sexuncem, floris iunci odorati quadrantē, calicē cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ, singulorum trientem. croci exagia. vij. opopanax quadrantē. piperis longi & nigri, singulorum quadrantē. marubij, stœchadis, singulorū septuncem. gentianæ, agarici, singulorū quincuncem. sagapeni unc. i. cōtusa ac leuigata melle Attico excipe. datur ex ea nucis ponticæ magnitudo, febrientibus ex aqua, alijs ex uino mulso. Porro ratio hæc curandi non raro uel sola satis est, ubi nimirum uitia hæc sunt etiam noua, ac tantum nō recentia; inueterata enim difficilius eluuntur, egentq; remedijs loca libus. Cum igitur (ut modo dictum) fuerit iam corpus totum, quāri fieri potest, mundum, subductis superficialibus uitiosis succis purganti medicamento, tum confidenter admovebis loco affecto topica, id est, localia remedia, quæ omnia in genere calida sunt, & diaphoretica, qua facultate uitiosos succos tum uacuat, tum discutit; ē quorum albo est thapsiæ succus, cū cerato inunctus. Aliud. Euphorbium detritū, & ex oleo illitū, sulphur ignem non expertū, & nitrū Alexandrinū ex aceto infuscat. Aliud. Laurinū illitum, nasturtij semen ex oleo. Aliud. Erucæ semē tritū, pinguedineq; agnina exceptū illinitor. Aliud. Alcyonium asperum illud tostū ac leuigatū, ex aceto aut cedrino liquore inducitur. Aliud. Calami radix uista, aut cortex uisus, ex oleo cedrino, aut pice liquida illinitur. Aliud. Murium stercus contritum ex aceto inungitur. Aliud. Integras amigdalas uistas imbue aceti aceto. Aliud. Erinacei terrestris pellis una cum ipsius capite tosta, & in puluerē tusa, ex melle inungitur. Aliud. Cepam uetustā affecto loco, sed præfricato panno lineo donec rubescat, frequēter infrica. Aliud. Raphani corticē contritum ex melle illinito. Aliud. Lauiatā ferri squamam ex oleo & aceto inducito, infricās donec locus rubescat. Aliud. Ordeum tostū, & muscerda, id est, murium finum, æquali pondere ex aceto illinuntur. Cæterū cum dictorū medicamentorū sit hoc quidē uehementē, illud uero minius calidum, silentio ne utiq; prætereundū, calidiori utendū, tum in durioris carnis corporibus, tum uitijs hisce uetustioribus. sicuti cōtra minus calido, cum in re

A centibus id genus uitijs, tum etiā puerorū ac mulierum, similibusq; alijs tenerioris carnis corporibus. Esto aut cōmune præceptū hoc in omnibus eius generis remedijs. Huic adde præfricandā partem affectā panno lineo, neq; ruditer adeo, ut excorietur, neq; cōtrā leniter adeo, ut non mediocriter saltē rubescat, ante prædictorū remedium applicationē. Esto postremo affectus locus frequenter radendus, qui si quando usu ueniat ut dictorum medicaminum impositione ulceretur, illinendus aut porcino adipe, aut rosaceo

De doloribus aurium. Cap. 15

Oboriuntur aurium dolores intermā a frigore, atq; fiunt hi ferē a frigidis aut uētis, aut balneo, intermā ab aqua medicata, quæ auri incidit, intermā ab inflāmatioe, quæ cōsistit modo extrinsecus, utpote in foraminis seu meatu auditorij cute, modo per profundū inflāmato auditorio nervo, atq; ita distēde etiā particulas proximas. Est cū spiritus flarulētus auri inclusus, nō reperies egressū, huiuscemodi excitet dolorē. quin efficit non raro idē sanies auribus quauis ocalioe innata. Ceterū dolores ad frigus relatos, discutit celerrime calefaciētia. Cuius generis sunt, instillatū aurib. oleū, in quo incocta sit cepa. Aliud. Piper curiose admodum detritū ex oleo. Aliud. Nardū calidū auri insusum. Aliud. Oleū in quo decocta est ruta.

Ad aurium nouemta ex aqua. Cap. 16

Oleum calidū frequētius instillato, quod molli deinde lana exuccato, rursusq; aliud inguttatē. Aliud. Oui aquato, modo eodē quo in oculorū inflāmationibus uti ipsi cōsueuimus, preparato, aut lacte muliebri tepido utitor. Aliud. Cōfert adeptum aferinus, tum uulpinus, tum gallinaceus.

Ad aurium inflammationes. Cap. 17

Nardus cū medicamine basilico immisssa iuuat. Quod si immēsus intolerabilisq; sit dolor castorio ex lacte muliebri, aut aquato oui tepido utitor. Aliud. Parua opij portio cū sapa. Ceterū cauēdū hic ne præter rationē et temere auditorio meatui facies famus negotiū, qui suauiter tantū detergēs siccādusq; est, specillo molli lana circūuoluto. Fouēda porro auris spōgij mollis. ex aqua, in qua decocta sit althea, quā quidā a magnitudine uocant *σπογγία αλχηρ*, id est arborecentē maluā, aut furfuribus tenuioribus, macrioribusq;. Quod si flatu lentū fuerit qd in aure includit, & obstructio ueriusq; dolor hæc obsideat, aphronitro ex aceto utitor, aut succo dracōtij herbe, aut cetaurij, aut polij

Ad igneum in auribus feruorem. Cap. 18

Ardoem igneum in auditorio meatu perceptum, cui non sit adiunctus pulsatilis dolor, solet initio iuuare, acetum cum rosaceo.

Ad aurium ulcera. Cap. 19

Glaucij ex aceto cōtritū instillato. Quod si plurius ab his defluxit humiditas citra dolorem, scoriis am ferri ex aceto curiose detrita in sole immittito.

Ad grauem auditum, auriumq; sonitus seu sibilos. Cap. 20

Ad aurium sonitum repente obortum, nardinum ex aceto instillato. Aliud. Ciminum tantillo muscetor oleo, quoad mellis habeat crassitudinem

nem, ac infunditor. At si billos morbi cuiuspiam reliquias, curamus fotu auris ex absinthij decocto, cui post hæc acetum ac rosaceum inguttantur. aut raphani succus cum rosaceo, aut eleborus cum aceto. quinimo solum acetum, sed acre, instillatur tepidum, aut solum mel, aut aqua mulla, aut mistum oleo acetum, quod *ἑλεβορύ* dicunt Græci. Aliud. Porri succum cum lacte muliebri, aut rosaceo immittito. Aliud. Oleum amygdalarum amararum in cepa decoctum inguttato tepidum. Aliud. Cepam, allium, & adipem anserinum æqua portione simul terito, deinde colatum adipem infundito.

Aliud. Lentis decoctum addito melle immittito.

Aliud. Vinum dulce in quo decocta sit myrtus, in aurem mittito, uel succum ex oliuarum folijs expressum, mellis incoquito, ac postea uitior. Aliud. Idem potest ceparum succus cum melle.

Ad grauem auditum. Cap. 21

Subduc initio uentrem catapottis ex colocynthide. Vtere dein apophlegmatismo, id est, medicamentum pituitam per os educente, ex pyrethro & mastiche. Ipsi autem auri extrinsecus admoueto fomentum per calamum ex absinthij decocto, cui deinde instillato acetum albu, & aqua æquali mensura, in quibus seruata fuerit nitrū. Aliud. Vitor si militer decocto, aut foliorum aut baccarum lauri.

In aurem infundi apta. Cap. 22

Porri succum irino unguento mistum infundito. Aliud. Fel seu taurinum, seu caprinum rosaceo mistum instillato. Aliud. Corticis raphani succum ex rosaceo immittito.

Ad uermes aurium. Cap. 23

Auribus uermiosis infundito ex bubulis carnis inter assandum defluentem liquorem, aut aristolochiam tritam ut emplastrum ipsis admoueto. Idem potest immixtus ipsis succus tam nepetæ quam rubi.

De parotidibus, id est abscessibus iuxta aures. Cap. 24

Morbi cuiuspiam, ut quem sequuntur soboles, parotides, ab alijs ratione alia obortis inflammationibus differunt, proinde dissimilem etiam postulant curationem. Quæ enim à sola destillatione seu defluxu materiæ proueniunt, neque multa existente, quæ influit materia, neque uenenofo, nec toto de nique corpore plethorico, sola spongia ex posca imposita sistuntur. Contra in parotidibus, quæ morbi alterius sunt soboles, remedijs utimur quibus ad cutem attrahendi est facultas, aut etiam imposita cucurbitula. Tantum enim abest reprimamus influentem hic succum, ut contra è profundo in summam cutem euocandi sit studium nobis, nisi forte uehemens fuerit ac copiosus humoris influxus. sic enim nihil opus iuuenis naturæ conatum; quandoquidem si tum aut cucurbitulam quis admouerit, aut attractorium medicamentum, quo ex alto in cutem pertrahat materiā, grauem excitabit dolorem, qui & uires ægotantis prostermet, & somnum ac quietem turbabit. Proinde mitigatorijs est hic remedijs opus, non autem ijs, quæ humoris fluxum iuuēt etiam. Cataplasmata autem *ῥιζορριζα*, id est mitigatoria sunt: Panis oleo maceratus ac impositus. Aliud. Triticea farina ex oleo appo-

fitā. Aliud. Hordeacea farina cum axungia admota. Aliud. Hyoscyamus herba, cum butyro in modum emplastrum applicata. Quod si abscessus ad suppurationem deuenierit, aut cute discissa pus ex cernendum, deinde ulcus ipsum comuni ulcerum ratione curandum, aut tentandum possintne pus discuti discuti; idem remedijs simul attrahendi simul extenuandi facultatem habentibus, quæ his fume diebus singulis renouanda. Fovendus porro locus affectus donec sedetur dolor, quo iam mitigato, locum habebunt, quibus est discutiendi facultas, è quorum numero sunt, plantago detrita cum sale, utque emplastrum imposita, rumicis radix in uino decocta, sulphur ignem non expertum, & cymolia ex aceto: fici in muria decoctæ ac tritæ, porrum cum sale. Applicatur etiam comode sal tritum cum butyro, succidaque lana exceptum, maxime parotidum initio, multo autem magis in tenera carnis corporibus. Induratis enim parotidibus, omnique iam dolore carentibus, sterius capillum ex aceto utiliter imponitur. Carterum si quando breui tempore uolemus pus mouere, fovebimus parotidas assidue calida, et farina hordeacea oblinemus.

Ad narium uitia, et primo ad ozenam ac polypon. Cap. 25

In curandis narium uitijs & potissimum ozena ac polypo, excicandum initio roborandumque est ipsum caput, imposito emplastro *ἰνὴν ἰνὴν*, si dicto, quod salicem contineat, aut anemonite, aut barbaro, aut de limacibus, cuius hæc est cōfectio: Myrrhæ uncia, thuris tantundem. limaciæ integræ, duo ouorum aquata. Omnia hæc contusa in pila misceantur, deinde linteo excepta capiti admoueat, quod continuus fiat diebus nouē, atque tum de mum localibus hisce utendum in naribus remedijs, nepe succo nepetæ, naribus infuso, ac ipsamet nepeta siccata & trita, demum naribus per harundinem inspirata. Aliud. Ranunculi herbæ succus cum melle supine iacentis naribus inficitur, utque ipsum ægrotus attrahat precipitur. Aliud. Mali punici succum æreo uase tantisper decoquito, donec crasse scat, demum naribus infricato. Aliud. Gallas ac myrrhæ aqua portione cōterito, naribusque inspirato.

De polypon. Cap. 26

Atramēti futuri uncia quatuor. milti unc. una, redacta in puluerē, naribus per calamum inspirant. Simili modo insufflat puluis toste radice bryonie. Aliud. Atramētum futuriom & sandaracha quo pondere terunt, naribusque inspirant. Aliud. Cornu ceruinum ustum & sandarachen naribus instillato. Aliud. Plumbum torridum ex uino inungito. Aliud. Acidum mali punici succum coquito in uase æreo donec mellis habeat cōsistentiā, deinde illinito. Aliud. Auripigmentum laeuigatum stylo applicator. Aliud. Auripigmentum & calcis aqua non restinctam æqua portione, trita applicato.

Ad sanguinis è naribus fluxum. Cap. 27

Principio cōcretum in naribus sanguinem specillo, cui lana ex aqua madens addita sit absterge, de hinc lycium aqua dissolutum, penicilloque ex intorto panno lineo exceptum, naribus infere.

Aliud. Linamentum tortile igni accensum, succo

coq aut polygonij, aut porri extinctū, naribus infuso. Aliud. Acetum acerrimū coquito, in quo maceratum spongiā naribus immittito, quam ut facilius possis, cum uoles, extrahere, præstat lineo filo deligatum imponi naribus. Frontem præterea spongijs ex aqua frigida foueto, sitq̃ egrotus capite eleuato erectoq̃, iubeo. Manus et pedes uinculis constringito, necnon aures ualide obturato.

Aliud. Gypso, aut luto sigilino fronte illinito. Aliud. Cucurbitulā magnā applicato: hepaticū quidem, profuete ē dextra nare sanguinei; sinistri uero, cōsinistra; sin ex utraq̃ nare effluta, utriq̃ uisceri.

De uitij oculorum. Cap. 28

Omnia sanē corporis membra exactissimis in curando præscriptionibus egent, si reuera ad sanitatem reduci debeat. Verum oculi quo præstantiorem habent præceteris usum dignitateq̃ præcellunt, hoc debet exactius cōsiderari ab eo, quisquis inoffense curabit crebros in ipsis affectus, uarijs differentibusq̃ de causis euenientes ac augescentes. De quibus exactius uerbosiusq̃ agere, alterius est commentarij opus; præfens tamen eatenus de ijs agit, quatenus id patitur ipsius compendium. Affectus igitur oculis accidentis ortum habent, interim ab æstu & calore, interim à frigore, cum particulæ sensu quodam subitupido. His accedit, fieri modo cum inflammatione, modo sine hac. Est etiam cum ortum habent ab humorū defluxu seu destillatione, & cum sine his. Nonnunquam ad hæc cum partis affectæ grauedine & dolore, nonnunquā absq̃ his. Cæterum leues sed calidas oculorum perturbationes satis superq̃ reprimis foris oculorū ex sola posca, sicuti frigidas fomentum per spongiā ex uino albo diluto. at ualidas uehemētesq̃, ut quas magna grauisq̃ comitatur inflammatio, si quidem sanguinis in fronte uasa præ plenitudine distēta fuerint, ita ut ultro se proferat cōspiciendam sanguinis plenitudo, curat facta mox ab initio uenæ sectio, nisi quid prohibeat hæc fieri; sicuti eas quæ ab alijs causis fiunt atq̃ in fractu concitantur, uentris per medicamenta uacuationis quibus factis utendū *τοῖς ἐν γαστρὶ*, quod in oculis instillantur, sic dictis medicamentis, ut fœnograci cremore, eum in usum pulchre præparato, quod optime hac sit ratione. Principio lorū diligenter in aqua dulci fœnogracem, leuiter in eadem coquitur donec quicquid habet in se acre abiciat. Deinde alij rursum aquæ incoquitur effusa priore. Vtile etiam in usum eundem est oui cādium, ac tenue, oculis frequenter instillatum, quin etiam lac muliebre, quod necessum & boni sit succi, & ex ipsis mulieris mammis in oculum immulgeatur. Mitigandos porro sedandosq̃ oculi dolor, impositis emplastris ad inflammationes conscriptis, necnon ex oui exigui luteo, sertula campana seu meliloto, pane, & rosaceo. Quin utendū etiam collyrijs huius in usum cōscriptis præparatis, quæ longa quadam experientia longocq̃ usu omnibus ferē sunt nunc cognita, alijs alio uti consueris. Sunt autem ea ex ouo tenuissimo, leniter et indolorese abhibenda. Innatans porro oculis lip-

pitudo, detergenda est spongia ex aqua calida, uictus ratio sit tenuissima. Quod si uehemens fuerit capitis grauitas, occipito cucurbitulam adfigemus, cōcisa prius cute scalpello, exuctumq̃ ab illa sanguinem frequenter effundemus. Quod si sublati sursum uaporibus caput impleatur, ac pituita obstruat omnes ipsius meatus, sternuatorijs minoribus, apophlegmatismisq̃ utentes purgabimus ipsum caput, humorumq̃ infractum diluicemus, sternuatorijs quidē ex pipere, quod tritum naribus attrahant iubebimus, apophlegmatismis uero ex sinapi accuratissime laeuigato, additis aceto tenuis substantiæ & quantitatis mediocris, melle, & aqua, ea portio ē ut fluidiora omnia & ore facilius contineantur & gargarizentur: facta enim hunc in modum per nares [ac palatum] uacuatio ne liberaliori, infractus obstructionsq̃ omnes capitis discutientur. Porro quod non modo curandæ lipitudinis, uerumetiā cuiusuis ferē alterius agnitudinis, primus præcipuusq̃ curandi scopus consistat in exacta uictus ratione, neminem fugere existimo. Cæterum lipitudinibus æstiuis medemur aridarum rosarum decocto, quod oculorum palpebris per spongiam assidue admouetur,

Ad diuturnas lipitudines. Cap. 29

Specilli mucronem allio tantisper insertum, donec huius tingatur succo, oculis inducimus.

Aliud. Triticum ignitis ferreis laminis incoctū ex uino illinimus palpebris. Aliud. Atrameto sutorio ex melle inūguimus, et frōtē, et palpebras.

Ex Archigenis De pharmacorū compositione cōmentarijs præcepta, ad humorum in oculis defluxum. Cap. 30

Destillationi humorum in oculis, maxime ab ipso protinus exordio cōducunt tenuitas, tum cibi tum potus, aque potus, ac præ omnibus, absoluta à coitu continentia, uentris inferioris laxitas, frigida multa potatio, frontis assidua itoratio ex aqua, cui sit adiectum aceti pauillum. Quidam ex aqua id faciūt, in qua præmaceratū fuerit chalcantum. Fugiant omnes acres odores, puluerem, fumum, splendorē tam lampadis quā solis. Imponatur fronti per noctem lana, aut munda ex uino, aut sordida ex aqua frigida. Quod si destillatio ingrauescat accedatq̃ dolor, cōueniūt uenæ sectio, & omnimoda abstinentia tum cibi tum potus, nisi forte & agroti uires proferantur & protrahatur morbus. Sit uenter continue fluidus, aut medicamento ad hoc appposito, aut ualidioribus clysteribus. Post hæc iuuant uiridia uitis folia, in modum cataplasmati fronti assidue inherētia, aut folia seu myrti seu lentisci. Similiter succus tum rubi tum brassicæ. Idem præstant uitis folia cū tenui polenta uel samphyschi, uel sedii, uel portulacæ, uel cotoneorū. Cuiusq̃ enim horū tenera folia, cū uino & tenui polenta instar cataplasmati frōti utiliter applicantur. Ipsi autē oculis foris lana munda ex oui aquato, necnō coctum oui luteū cum uino & tenui polenta, ut emplastrum aut fronti, aut ipsi oculis admouetur. Iuuant præterea tum eryngij radix trita ex aqua, tum cicutæ semen, eodem applicatū modo, necnō mollis ac nuper salitus caseus,

cum apij folijs. Panis præterea ex uino aut rosaceo mirum in modum confert. In summa, quæcunque adstringendi reprimendiq; uim habent, utilia sunt initio, ut sunt cicuta, psyllium, apium, solanum, & paludibus innatantes lentes, serpyllū, sampsycon, folia uitis, coriandri, portulaca, lēs aquis innatās.

Ad calidam destillationem. Cap. 31

Brassica & polenta trita, ex aqua instar cataplasmae imponuntur. Eodem applicantur modo, contrita folia tum ocimi, tum sampsychi. Multam impetuofamq; destillationem cohibent papauerum capita, herba apollinaris, quā hyoscyamum dicunt, cum tenui polenta ex uino. Memineris tamen non nisi foto prius loco, cataplasinata applicanda. Quod si protuberent palpebræ, distendanturq; sinteū butyro madēs oculis imponitur. Porro graui difficilq; oculorū chemosi (dicta est autē chemosis rubra carnosaq; corneæ oculi pelliculæ inflammatio) medentur presentissime accuratius detrita murium carnes, cum crudo oui luteo, ad cerati consistentiam, & ex panno lineo impostitæ.

Linimentum pro oculis.

Panis purus tostus, additis acaciā & satiuę puniceæ flore (cytinion dicunt) ex aqua illinitur.

Ad oculorum dolores. Cap. 32

Rosas aut aridas aut uirides in aqua dulci præmaceratas ac leuigatas addito candidi oui luteo, emplastri modo impone, nec addere farina cōctam similiter in aqua dulci. Quod si grauior molestiorq; fuerit dolor, hyoscyami folia, aut carnem seu peponis, seu cucumeris cū ouo cōcto, aut huius luteo, & pauco uino, ut cataplasma applicato.

Emplastrum ocularium. Cap. 33

Pulchre his medefi pini cortex & polenta ex uino.

Ad uehementes oculorum dolores. Cap. 34

Coriandri succum cum lacte muliebris oculorum angulis guttatim instillato, aut platani folia trita cum tenui polenta, in modum emplastri oculis extrinsecus imposito.

Ad destillationem in oculos cataplasmata. Cap. 35

Conducit ad hanc utridis tum cupressus, tum fabina herba ex uino, & folia tum paliuri, tum portulacæ, detrita cum pinguedine anserina, & croco; necnon iris sicca ex melle, & apij folia cum polenta. Porro graui impetuosoq; defluxui cōfert uiridis pulegiæ semen, quā hoc autē magis adhuc, cera cum aceto ad malagmatis crassitiem redacta, capitisq; syncipiti admota, cui superdato lanā suauiterq; illigato; aut imposito ipsis oculis in modū emplastri rosas, melilotum, & amyllum simul cōcta, aut amyllum ex uino albo.

Anacollemata, id est agglutinatoria resfringentia fluxū. Ca. 36

Limacem cum testa tufam, toti fronti & temporibus illinito.

Ad hemalopas & hypophagmata. Cap. 37

Incipientibus oculorum sanguinolentis suffusionibus ab icū percussu uē, cōfert ab ipso confestim initio, ne inflamatio ac dolor comitentur, instillatus sanguis colubinus, præsertim alis expressus tenerioribus. confert & oui aquatum eodem modo immissum, aut lana pura exceptum, & foris

admotum. Plurimum ad idem faciunt ouiluteum assum ex uino impositum, & trita rosarum tum folia, tum flores, per se, aut cum uino, cum tenui polenta, ut emplastrum, apposita.

Ad oculorū molles ex icū tumores, dictos oedemata. Cap. 38

Plurimum ad hoc facit fomentū ex posca molli spongia frequenter adhibitum, deinde spongia noua ex eadem posca oculo imposta.

Ad oculorum psorophthalmiam, id est, pruriginosam scabiē a sole & puluere ortam. Cap. 39

Iuuat hāc aqua liberalius infusa, æstate frigida, hyeme calida, nec minus fortis spongia factus ex lentis decocto. Immittere etiā guttaim ipsis oculorū angulis succū aut rubi, aut rosarū, quēq; singulatim ex aqua, aut applicare rosas aridas tritas ex uino. Porro illinum dormituri oleo, abstinentiū his in totū ab omnibus tam acribus, quā acidis.

Ad inueteratos palpebrarum affectus, præcipue calum. Cap. 40

Cōctam amurcam, & ex oleo tritam inunge.

Ad caluas, pilisq; carentes palpebras summpere hoc conducit, faciens renasci pilos. Cap. 41

Muscarda, id est, finum murium & sterus hircinum æquali mensura torrentur, & ex melle illinuntur. Facit hoc etiam ad uirilignes.

Ad pilos palpebris innatos oculum insistentes. Cap. 42

Euulsis radicibus pilis, cimis sanguine confectato locum, & nunquam renascitur. Idem potest illitus pediculi canini sanguis. Idem præstat, euulsis prius radicibus pilis, fel aut hyænæ aut hirci, inunctum confestim a pilorum euulsione.

Ad oculorum & uulue uicinas, id est albūgines. Cap. 43

Celeriter his medetur nitrū exacte cōtritum & ex oleo inunctū. Idem præstant illitū lacertæ simum, et nycticoracis ouū, his enim tingunt oculi.

Ad uisus obscuritatem. Cap. 44

Omnem oculorum obscuritatem, incipientemq; suffusionem curat fel uulturis, cum marubij succo, & melle attico, cuius si nulla sit copia, tenero ac molli utere. esto autem tum succi marubij, tum mellis dupla ad ipsum fel portio. Idem possunt fel taurinum liquidum cum æquali pondere succi fœniculi, & duplo mellis, & fel ursinum cum aqua duplo.

Ad pterygion, id est, oculi unguem. Cap. 45

Populi nigra liquorem cum dupla mellis portione mistum illine.

Ad nyctilopas, id est nocturnam oculorum acuitatem. Cap. 46

Iecur hircinū assa, interq; assandum desluentem saniem, siue saniosum humorem collectum oculis infrica, ipsumq; iecur edendum præbe. Iuuat etiam columbæ sanguis instillatus, & fel capræ aut capræ iecur decoquens, præcipe ut habentes caput pannis circumuolutū, teneant intentos in olam oculos, suscipiantq; uaporem: uel expressum ex recenti onide succum oculis illine.

Ad oculorum tubercula, Cribe dicta. Cap. 47

Cera alba foueto, aut muscæ reliquum corpus præciso abiectoq; capite, tuberculo ipsi infricato.

Ad fugillata sub oculis. Cap. 48

Raphanus, quam radiculam dicunt, trita & imposita, iuuat confestim sub oculis fugillata. Tollat autem

autem ubi mordere inceperit. Iuuat similiter im-
positus caseus recens, Itemq; ceratum cum absin-
thij uel raphani succo impositum: egregie facit ad
recentes ac liuidas sub oculis sugillationes spon-
gia in muria tincta, & assidue admota. post hoc ue-
ro assiduus fortis ex aqua calida. Atq; hæc quidem
ad liuidas sugillationes faciunt. In quibus uero
eruentæ sunt, aut subflauæ, aut subpallidæ, muria
uitæda est. Cataplasmate uero utere faba fresa, aut
absinthio, aut hyssopo, aut origano, aut raphani
cortice, aut uua passa uinaceis exemptis, unoquo-
que per se, cum melle, aut aceto, aut aqua non co-
cta. Facit & bulbus albus cum ouo at melle. Aut
cyclaminus cum uua passa. In inueteratis autē ac
nigrefactis, sinapi cum duplo adipe ouillo. Aut
farina fabacea cum melle subacta, aut comman-
ducata, ac cum salina illita. Aut cumini linteo il-
ligatum, in feruenti aqua missum, pro fomento
adhibe. Aut farinā ordeacea cum aceto mulso co-
ctam. Aut foeniculum tritū cum cerato impone.

Ad sugillata sub oculis cum molli tumore, qui œdema
dicitur. Cap. 49

Spongiam ex aceto impone, & emplastro ute-
re ex farina hordeacea, cocta cum aceto mulso do-
nectum uo sedetur, post hæc adponito coctam len-
tem & cum melle tritam.

Ad recentem sugillationem. Cap. 50

Imponitur trita ex aqua cicuta, aut detrita uitis
alba radix ex mulso.

De uariis. Cap. 51

Nascitur in faciei cute tumor exiguus durusq; C
dictus Græcis *ovros*, Latinis uarus. Differt autē a fi-
cosis tumoribus in mento prouenientibus, nō so-
lumq; ex crasso humore consistat, uerumetiam q
participet uenit quadam sanie, ratione cuius faci-
le ulceratur non recte atq; ex arte curatus.

Ad uaros in facie. Cap. 52

Acetum accerrimum cum melle equali mensura
mixtū uariis accuratius illine, digito infricans.

Aliud. Ex amygdalis amaris aceto dissolutis
ac curiosius tritis, cōformato pastillos, atq; in um-
bra deliquat. Vbi autē usus postulat, dilutum ex
his alioq; aceto uariis inducito, & simulatq; arue-
ritnū capone abstergito. Facit hoc ad tumidos af-
fectus, faciei pruritus, & principii elephantiasis.

Ad ficosas in mento excrecentias.

Cap. 53

Salem fossilem ex aceto, aut glutinum fabrilē
cum milto, id est, rubrica illine.

Ad menti impetigines. Cap. 54

Acceptum magna copia triticum incudi impo-
ne, cui deinde applicato candentem laminam ere-
am, quicq; effluit humorem etiamnum calentem
affectui infrica.

Ad diuturnas impetigines. Cap. 55

Trita capparisi folia ex aceto accerrimo cum tan-
tundē mellis impositio. Aliud. Idem potest con-
tritus ex aceto radicis rumicis cortex. Aliud. Cha-
maleontis radicē in aceto decoctā, ac laeuigatā su-
perdato. Aliud. Detritam rumicis radicē, & hor-
deaceam farinam ex accerrimo aceto applicato.

Galen.

Ad scabras impetigines. Cap. 56

Tritis amygdalis amaris frequēter ipsas inūgito.

Ad genarum exanthemata siue papulas. Cap. 57

Ferrum candens paliuro ligno imposito, acce-
ptumq; qui ex hoc defluit humorē illinito.

Aliud. Cōtritis myrti baccas ex uino inūngito.

Ad dentium uitia, & primo dolorem. Cap. 58

Abluito dolentes dentes calido gallarū ex ace-
to decocto, aut tædæ pinguis talearum, aut alterci
tum seminis, tum corticis, aut cedreæ, id est, cedri-
ni liquoris, uel propoleos, uel solani, uel capparisi,
uel alij, uel myrtirumolurum in aceto decocto-
rum, aut calidā uini facis, aut polys corticis, aut et-
tiam ipsiusmet herbar, aut marrubij. Horū inquā
quodq; cum aceto iuuat. Idem præstant platani pi-
lulæ, & rosæ aridæ, decoctæ in uino albo, aut terti-
as usq; quo dentes frequēter colluantur. Idem ef-
ficat tum eupatorij radicē cocta in uino, tum pule-
gium, aut decoquito ceruinum cornu in oxyga-
ro, sapeq; eo os abluito, aut scillæ interiora in mi-
nutas secato particulas, additoq; acetis sextario, in
uas aliquod consicito, sinitoq; hæc in fimo asinino
defossa macerari diebus triginta, eluitoq; eo den-
tes. Eiusdem est effectus lac asininū, quod moios
dentes confirmat etiam, aut tithymalli radicem
in oxymelite ad medias usq; incoquito, aut etiam
hyoscyami, lauatoq; decocto eo dētes. Item lacte
mori cōmisso probe cum uino, deinde tepefacto
collue dentes. Aliud. Lauatū item dentes utiliter
decocto alij, seminis erucæ, & nitri.

De fomentis ad dentium dolores. Cap. 59

Extrinfecus ad dentium dolorē cōueniūt fomen-
ta ex fricto sale, uel milio in marsupium coniecto,
aut etiā ex fordidis pāniculis admodū calentibus.
At intrinfecus huiusmodi sunt fomenta utilia.
Aridi origani ramulum in feruens oleum demis-
sum, superne affecto dēti applicato, uel ricini fru-
ticis coliculū simul cū cera imposito dolenti dēti,
aut tange hunc frequenter specilli mucrone, uehe-
mentissime calente. Ceterum illius in uniuersum
meminerimus necessum, utendū fomentis id ge-
nus omnibus, tam ijs inquam quæ extrinfecus, q
quæ intrinfecus adhibētur ante cibum aut longo
post assumptum cibum tempore.

Apophlegmatismi pro dentium dolore. Cap. 60

Optimi apophlegmatismi utilissimiq; dētiū do-
loribus sunt, herba pedicularis masticata, aut sin-
gulatim, aut cū pulegio, uel quod in galla nigrū in
regrius est affecto dēte cōmordeto, linitoq; hiās
interim effluere pituitā. aut quinq; alij nucleos cū
nigre myrti pauculis folijs in aceto ad dimidias de-
coquito tede rude assiduō cōmiscens, ac eluito eo
dentes, oreq; cōritino, post hæc hiato, donec pi-
tuitæ satis profluat, demum rosaceo os abluito.

In nares injici idoneum, & dentium leuabis
dolorem. Cap. 61

Solum radicis betæ succum naribus immittito,
& dentium leuabis dolorem.

Ad dentes denigratos. Cap. 62

Prærigatum melle fissilem salem, torreto super
igne, ex farmentis uitis, teritoq; deinde adiecta

tom. 6

t

paucula

Paucula myrrha dentibus infricato.

Ad colluendos dentes Cap. 63

Vino odorato in coctā aridam iridem habente dentes colluīto.

Ad colluendum gingiuas Cap. 64

Lauato gingiuas aceto, in quo coctum sit hyoscyamum.

Dentes à dolore præseruantia Cap. 65

Lauato dētes his mētib. singulis uiuo in quo ad medias decocta sit tithymalli radix, & nunq̃ dolebunt. Subscripta dētifricia maximopere cōducūt ad dentiū à dolore præseruationē, & ad cōfirmandum tam dentes, q̃ gingiuas, cōciliandūq̃ dentium cādorem. Lanam succidam linteolo illigatam torreto, adiecta deinde tertia salis portione, terito omnia simul, & perfricato hoc puluere dentes. Idem præstat puluis usti contritiq̃ capitis leporis.

Aliud. Contritū ex melle sale, ad cerā crassitiem, linteocq̃ mūdo illigatū urito, quo deinde adicta iridos portiuncula perfricato dentes.

Ad oris grauolentiam Cap. 66

Hordeū melle & uiuo præmaceratū illigat charā, teritūq̃, quo deinde cōfricantur gingiue.

Ad motos dentes, ut cōfirmetur. Cap. 67

Teritur ex oleo atramentum sutorium, quod lana exceptum dentiū applicat radicibus: uel ulmi cortex in uiuo decoquitur, decoctūq̃ hoc ore cōtinetur, cōfirmat enim dentes.

Ad dentium erosionem Cap. 68

Folia capparis in aceto acerrimo ad dimidias coquito, ac tepido eo lauato dentes. Idem potest coctus similiter capparis cortex: hoc idē dentiū medetur dolori. Aliud expertum. Nigellam præfrictam, deinde tritā ex acerrimo aceto, dētis erosioni ut emplastrum imponito: sic enim in posterum plus non erodetur, sed perdurabit ut est erosio.

Ad omnes tam oris quam columelle, ac faucium inflammationes, caterosq̃ affectus, seu ulcera ea sunt seu crusta, seu putredo. Cap. 69

Cōmune in omnibus hisce præceptum, reprimendum repellendūq̃ mox ab initio omnem ē capite defluxionē. Cæterum ab elapso iam morbi initio, ad ipsius finē usq̃ ut dūm simul reprimētib. simul resoluētib. Reprimēdi igitur facultatem habet medicamentū ὀστρακόγῳ, sic dictū quod ex moris conficitur. Eiusdemq̃ sunt facultatis uuæ immaturæ succus, cum pauxillo melle & florum rosarum aut ipsarūmet rosarum siccarum, sicuti & pini corticis ex aqua decoctū. At ubi iam morbi principium præterierit, q̃ hæreat nunc in loco affecto, qui ē capite defluxit humor, fuerit ex parte opus, discutiendi habētibus facultatem, proinde adijciendum cuius prædictorū aphronitrum, aut ipsū nitrūm beronicarion dictū, uel incoquendum in sapa pulegium, aut satireia, aut thymus, aut nepeta. Poterit porro quiuīs copioso repente influente succo paratam habere similitūm medicamentorum copiam, seu uenator erret per agros, seu opus rusticū in agro faciat, seu etiam utator iter suū, enumeratorum medicamentorū indigus, si meminerit dictis affectib. utilem rubi

A succum, ac dictorū etiam quemuis, imō omnia ferē quibus adstringendi facultas est, oris affectibus esse accommodata: electissimū tamen ad ipsos medicamentum sit ex succo corticum nucum uiridū cocto, cum paucō melle. Utile similiter ad eosdē, decoctū coroneorū, adiecto mellis pauxillo. sed quod ex uiridibus nucibus sit medicamentū, multo est utilissimum, ad uehementes tonsillarum inflammationes, & suffocationes. Aliud. Accipe dulcis mali punici tūsi cū suo cortice expressum colatumq̃ succū, cuius sex partibus addito unam mellis, demū coquito ad mellis spissitudinē acutior. Aliud. Mufsi sextarij decoquito ad tertias, adiectis rhu coriarij unc. iij. demum reponito in usum. Aliud. Tufas gallas numero xxx. decoque in mellis sextario, quo utere.

Optimum medicamentum stomaticum. Cap. 70

Florum rosarū unc. ij. *miridāoy*, id est, fructus pini unciam unam, tere ex melle, ac utere.

Ad inflammationes tonsillarum ac columelle, & oris putredines. Cap. 71

Succi mororum, aut rubi, & rosarum aridarum, singulorum uncia una. coquūtū parū cum melle, quod his illinitur. Aliud. Cotoneorū acerborum succum cum aequali mellis portione coctū illine.

Aliud. Acerbum malum punicū cum suo cortice tūsum incoquito uiuo dulci, quo colato utitor.

Aliud. Immittito in sapa pulegiū, aut thymū, aut origanum, aut hyssopum, aut nepetam, ac simul coquito sufficienter, deinde colatum hoc teneatur in ore.

Ad oris putredines ac crustas Cap. 72

Album canis finum inungito ex melle. sit autē eius canis finum qui solis uelcitur ossibus. aut aquam rhu sutorij cum melle ad sordium crassitudinem decoctam, aut etiam uistarum hirundinum cinerem ex melle illinito.

Ad columelle inflammationem & relaxationē. Cap. 73

Palmularum ex aqua decoctū, adiecto pauxillo melle, gargarissatur, oreq̃ continetur. Ad idem faciūt decoctum rosarū, & clauicularū uitis, rubi, sentis caninæ, pomorum acerbiorū, sorborum deniq̃ immaturorū. rhoi, q̃ in cibis utimur, et rhoi coriarij, & fructus miricæ. Horum enim quodq̃ singulatim, aut cuius ex prædictis adiunctum, & ex aqua decoctum, gargarissatur, aut ex his siccatum quodpiam in puluerē conterit, ac columelle apponitur, quæ sensim ac leniter sursum ducitur. solet autem is cochleario iniectus, columellæ apponi: quinetiam cuiusuis prædictorum, tam plantarum, q̃ fructuum succus, cum pauculo melle uæ illitus iuuat. Aliud. Ad uulue inflammationes conferunt sales triti & ex melle inuncti. Aliud. Palmularum ossa ac nuces, tenere, uirides, aridæq̃ pari portione urūtū, inq̃ puluerem comminuntur. quo columella perfricatur. Aliud. Rosas siccas in tenuissimū pollinem læuigatas ex melle inducito.

Ad aphthas que oris sunt ulcera Cap. 74

Portulacam melle madentem manducato, aut foliorum oliuæ ex uiuo decoctum gargarissato.

Ad aphthas nigras & depascentes. Cap. 75

Deterfas prius, orobea farina ac gallarū ex mellis linito, aut licij decoctum gargarissato, aut fece dulcis uini ex melle perfricato, aut tamaricis fructum cum melle tritum infricato.

Ad depascentes aphthas. Cap. 76

Gallarum decoctum cum mellis æquali mensura misto seruafactūq; utitor.

Ad aphthas albas. Cap. 77

Pluma oleum in quo chalcitin præcoxis illi ne, & confestim curabuntur. aut deterfo nunc mūdatorū loco affecto, tritum tamaricis fructum ex melicrato aut uino pluma similiter inducito, & cito sanabuntur.

Ad aphthas nigras. Cap. 78

Vuā passam sine uinaceis & anisum tere, locoq; affecto ex melle infrica, aut pruni folia cōcisa, asininolacte misceto, colluitoq; ex eo os. Idem posunt marrubij succus, & lentis ac rubi cremor, nec non tritum cornu ceruinū locoq; infricatum.

Ad aphthas infantium. Cap. 79

Lentem cum pauco pane & cotoneorum succo mistā exhibe, & rosarū florē, quin ipsas etiā rosas aridas, utitor aut oris collutione ex rebus medio-criter adstringētibus. Ceterū oleū aphthi ipsis aduersissimum est, nec non omnia uehementer acuta, illud quidem q̄ humectat sordidatq; hæc uero quod sua mordicatione noceant.

Ad uocalis arterie asperitatem. Cap. 80

Dulcis radice quam glycyrrhizan dicūt, uncia tres minutim admodum contrantur, deinde addita gummi tragacanthæ uncia una, excipiantur omnia passo, conformenturq; ad fabæ magnitudinem pilulæ, ex quibus contineat unam sub lingua dormituras.

Ad intercisam uocem. Cap. 81

Ficus & eryngion affatim coque, huic decocto adde gummi pauxillum, ita ut quām mellis, crassior sit ipsorum consistentia, & sub noctem exhibeto. Aliud. Brasicæ succum cum melle decoctum lambat. Conducit hoc idem ad tussim.

Aliud. Lini semen tufum ac per cribrū excretū, uuas passas bene pingues sine uinaceis, purgatas pinacæ nucleos ac frigos, nucleos pōticas siue auellanas præpurgatas, omnia hæc in pari portioe trita excipe melle cocto, da cochlearij mensura.

Elegna tussi accommodatim.

μυρρανω, id est nucleorum pineorū unc. xij. carnis da ctylorū choenices duas, terito simul exacti us, melleq; cocto excipito.

Ad tussim siccam. Cap. 82

Iridis ex aqua decoctum, cui mellis pauxillum adiectum sit, da frequenter forbendum.

Ad sanguinis reiectionem, expuitionemūc. Cap. 83

Rosarum aridarum unc. viij. gummi tragacanthæ hexagia tria terunt, & in pastillos drach. ponere ex aqua conformantur, propinātur ex aqua.

Aliud. In cucumeris domesticī uentrem infundito aquæ sextarium, coquitoq; ad tertias, demū expressum ex his cremorē in forbitioe dato.

Aliud. Rubricæ cynopie unc. ij. terræ samtiæ

Galen.

A unc. xij. amyli uncias tres. coge sanguinalis herbæ succo, propinato trium obolorum quantitate.

Aliud. Fricti seminis lini uncia octo, gummi tragacanthæ unc. xij. prædicto modo cōmode excipiuntur. Aliud. Polygonij siue sanguinalis herbæ radices aqua incoquito ad tertias, additoq; trito pauculo gummi, offerro in sorbitionem.

Ad tabidos & thoracis uitia. Cap. 84

Ireos decoctum cum melle ad potandum dato, aut ad sorbendum hyssopi decoctū cum melle, aut coctum marrubij herbæ succū cū melle, aut eruū ruffescēs, frixum primo, deinde tritum cum uigin ti partibus mellis, da in eclegmate, aut amygdalas amaras læuigatas cum melle exhibeto. Aliud. Seminis apij unc. vi. piperis nigri unc. i. mellis lib. una. datur cochlearij mensura. Aliud. Mistū cū melle, lento q; igne decoctum butyrum offerro.

Aliud. Apij unc. i. piperis grana quinquaginta, trita, cum mellis lib. i. sensim decoquantur, propinaturq; Aliud. Scillæ crudæ expressum succum cum mellis aqua portioe, carbonibus super positum coquito, ac dato ex hoc mystri quātitatē ante cibum & post cibum. Aliud. Abrotonon, pingues passulas sine acinis, rutę germīna in aqua decoquito, percolatoq; decocto huic mel adijce rursusq; decoque, ac utere.

De oris uentriculi affectibus. Cap. 85

Inflammationes tam oris uentriculi, quām hepatis, adstringentium medicaminum indigent ad misionē. Etenim si in curandis his utatur quis uolis relaxantibus, uitæ adducet discrimen, idq; omnibus Empiricis uocatis medicis experientia edoctis & in artis exercitatione obseruatis, nō pauci eorum, quise Methodicos nominant, curandi hac ratione innumeros sustulerūt ē medio stomachicos, oborta syncopa, sicuti non paucos etiā hepatis uitio affectos, solis usi relaxantibus, quibus hepar plerisq; dissoluitur; cuiusmodi nihil eueniet si eorum, quibus est adstringendi facultas, aliquid his semper adijciatur, seu oleo affectū locū foueas seu admoto cataplasmate cures. Sūt porro ex adstringentium numero, absinthium, unguentū nardinum, aloē, cotoneorū tam decoctum quām oleum, nec minus ceratum ex aloē, mastiche, cera, & nardo, cuius fuerit hæc confectio. Accipitur ceræ uncia una. mastiches uncia quatuor, aloēs uncia duæ. & nardi quantitas conueniens. Quod si uehementē adeo fuerit uentriculi imbecillitas, ut ne alimentum quidem contineat, adijciantur his succi uuæ immaturæ uncia duæ. Porro si succi absinthij fuerit facultas, addatur & huius uncta una; aut labruscæ flos, aut succus rhois.

De calida uentriculi intemperie Cap. 86

In calida uentriculi intemperie medicamentum hoc per os commode exhibetur, quod cōstat mastiches uncis duabus, mentæ unc. i. coctis succo plantaginis. huius medicamenti faba exhibetur magnitudo ex aqua. Quod si contra uentriculus frigida afficiatur intemperie, dicto medicamini adijcito castorei unciam unam. exhibetoq; similiter. Cognoscetur autē calida uentriculi intemperies,

toni. 6

t 2

partim

partim ex bilioso uomitur, partim ex sensu mordicationis biliosae, in ore uentriculi perceptae, partim quod hoc ipsum ad motu manui calidum appareat.

Ad uentriculum isto frigidiorum. Cap. 87

Ad uentriculum refrigeratum, quicquid ob pituitae in ipso herentis crassitudinem opus habet simul calfactione, simul humorum incisione, perquam aptum est medicamen hoc quod constat corticis radicis sceniculi uncias sex. acetici libra una, mellis libra una. Decoquuntur primum radices cum aceto, ac coctae nunc exprimunt, abijciuntque, demum adfuso melle incoquuntur rursus simul ad mediocrem crassitatem. Propinquantur autem huius cochlearia tria ex aqua.

Ad eos quibus in uentriculo cibus acescit. Cap. 88

Quibus assumptus cibus in uentriculo acescit, medicamentum hoc accommodatum est, quod constat pipere uncia una. seminis anethi unc. una. cymini uncias quatuor. omnibus diligenter tritis, propinatur ex eis cochlearium ex aqua aut uino diluto, dormituro.

Ad stomachi subuersiones. Cap. 89

Ad subuersiones stomachi idoneum est hoc medicamentum, quod constat ex succi mali punici acidi, cum suis acinis expressi, partibus tribus, succi mentae parte una. decoquuntur haec in uase fictili, assidue miscendo ac agitando, cumque iam crassescunt, sublata reponuntur in usum. Datur ex medicamento hoc postulante necessitate, ante cibum omnem mystrum unum, aut etiam duo.

Ad dysentericos, et cibum uomitu reiicientes. Cap. 90

Malorum cotoneorum libram unam decoque in uini myrti sextariis tribus ad tertias usque, expresso deinde liquori adde mellis libram dimidiam. coquitoque rursus assidue miscendo, tandem reponito in usum, dat huius ante omnem cibum mystron.

Ad stomachi subuersionem, coeliacis, et dysentericos. Cap. 91

Mala cotonea quatuor numero. integra mala punica decem numero. sorba octo. in aquae sextariis tribus accurate decoquito, cumque omnia flaccescere iam coeperint, exprimito, demum abiectis crassis fructuum partibus cremorem eum iterato coque, ad tertias usque, postremo additis generosi mellis libris quatuor, rursus coquito impositum carbonibus, continuo miscendo ad conuenientem consistentiam, sicque in usum reponito, utitorque ut medicamento praecedenti.

Immodicam ex nimio ardore sitim extinguentia catapotia. Cap. 92

Seminis cucumeris domestici unciae octo. tragacanthae unciae quatuor. dissolue tragacantham recentium crudorumque ouorum aquatis, ac tritam exactius, dissolutamque adfundito caeteris, conformatoque ex omnibus mistis catapotia, quae in umbra de siccatur, teneaturque ex ipsis unum sub lingua, soluturus salua humor paulatim deglutiaturo.

Ad stomachi subuersionem, et seruidos halitus. Cap. 93

Anesi, apij, cuiusque unc. ij. cymini uncia una. propinato ex his bene laeuigatis, ieiuno quidem cochlearium ex aqua, sub somnum aut ex uino. Aliud. Bibatur tribus continuis diebus absinthij dilutum.

Ad stomachi perfrigerationem et singultum. Cap. 94

Piperis unc. iij. castorei unc. i. mediocris cochlearij quantitas ex aqua ieiuno datur. At si ex calidis succis, in ipsa uentriculi coctione corruptis singultus ortum habeat, quod ex stomachi ardore, mordicationeque cognoscas, aqua tepida hausta, iube assatim uomant, & cessabit confestim singultus. Porro si temutamentum in tempore factum, sedat singultum, sicuti etiam acetum in sorbitione acceptum.

Ad estuantem stomachum. Cap. 95

Quibus stomachus praenimio ardore feruescit, aut animi sequitur defectus, siquidem sine febre hoc usu ueniat, dato in potu frigida cyathos tres, aut quatuor, idque per temporis interualla. Quod si his malum mitescat, cibo est reficiendus aeger: sin uero perdetur, attritis coniunctisque extremis, & praebeto sorbendam assidue aquam, in qua maduerint cotonea, pirae, aut mespila, aut baccae iuniperi, aut papini uitis, uel succum mali punici, aut uuae acerbae. Vel dato, quem bibat, tritum mentae ramulum, aut labruscae florem, & finito quiescat.

Ad nimiam ex stomacho saliuam. Cap. 96

Nimia diffuentes salua manducent siccam conyzan. Porro extrinsecus imponant stomacho coctita uitis uiridia folia, aut cotonea, aut uiridis portulaca, aut etiam cucurbitae ramentum.

Ad dolorem stomachi. Cap. 97

Stomachi ex inquietudine, aut anxietate dolores sedat ac mitigat potum lac uaccinum aut alinum, cui incocti sint silices lapilli, aut rosarum decoctum, aut etiam assum ouiluteum cum polenta potum.

Ad uomitum bilis nigrae. Cap. 98

In his qui bilem atram generant, ad stomachicam inflationem, & potissimum inter manducandum impernitiliter uentriculo spongia ex aceto quacerrimo calido. Aut hederæ folia uino decocta, ut cataplasma ipsi applicantur. Porro cibus sit boni succi, cuius generis sunt, oua, alica, & iuscula, utpote auricularum, extremarum porci partium, phasianum, iuuenis perdicis, aliorumque omnium his similium.

Ad stomachi inflationem. Cap. 99

Ad inflatum distentumque stomachum inuatuat polifera seculus foris impositus, necnon potum eiusdem decoctum. Idem praestant nepetæ decoctum addito mellis momento, & piper drachma pondere.

Doloris stomachi mitigatorium. Cap. 100

Stomachi dolor sedat cuminum assum, & apij pauxillum potui ex aqua datum; item abrotoni ac thymi utriusque obolos duos potui dato.

Ad eos qui grandem famam dicunt Balauios facile incurrit in uia. Cap. 101

Balauios dicta fame incurrites, seu in itinere, seu modo alio, refocillamus, reficimusue, porrigentes olfactandum acetum, aut pulegiū, aut terram acetomadentem, aut poma aut pira, aut his similes fructus alios, quorum pro tempore fuerit facultas, aut etiam panem ex uino eos assumere cogentes.

Ad singultientes. Cap. 102

Singultientibus da rutam, cum uino in sorbitionem, aut nitrum ex melicrato, uel apium, uel castoreum

stereum, uel abrotonon, uel aristolochian, uel cyminum, uel anisum, uel calaminthen, quā nos nepetam dicimus.

Ad hepatis obstruktionem. Cap. 103

Amygdalarū amararum unc. iij. cymini, seminis apij, cuiusq; unc. i. datur cochlearium ex uino. Aliud. Baccarum iuniperi unc. iij. seminis brasiacae unc. i. seminis eruae unc. ij. excipiuntur melle cocto, daturq; cochlearium unū. Aliud. Succo cichorij cyathū cū aquā calidā cyathis duobus, & mellis cochlearijs duob. exhibeto. Aliud. Succo anethi cyathus cū tribus cyathis aquae mulsae calidae. Porro dictorum omnium quodq; seorsum, aridum rufum, aut cibo inspargit, aut coctū bibit. Aliud. Chamæpityos decoctū cum pauxillo melle bibitur. Aliud. Chamæpityos decocti unc. viij. tūsae radicis cichorij unc. iij. excipie melle cocto, datur huius auellanae magnitudo ex aqua calida.

Pastillus hepaticus, id est ad iecur inscriptus. Cap. 104

Anisi, seminis apij, ari, amygdalarū amararū premundatarū, absinthij, cuiusq; unc. una. cōformantur ex aqua in pastillos drach. unius pondere, exhibeto febrientib. ex hydromelite, non febrientibus ex uino misto. Aliud. Erigerontis eundē in usum bibitur decoctū. Aliud. Aristolochiae drach. dimidia trita offertur, febrientib. ex aqua, si cui ex uino non febrientibus. Aliud. Trifolij herbæ ad tertias decoctum dato potu.

Ad affectos morbo regio. Cap. 105

Morbo regio affectū lauato in balneo aquae potabilis, totumq; corpus oleo confricato anethino. Quod si febre uacet, in colocynthidos corio feruifacitū uinū propinato. Aliud. Lanariae tritae cochleariū ex aqua dato, aut ex mulso liberis a febre. Aliud. Cichorij cyathos tres propinato, febrientibus quidē, nullo admisto alio, non febrientibus, uero, ex mulso misto. Aliud. Ciceris dicti xpiis, id est arietini et foeniculi coctorū cremore exhibeto, febre carētibus cū uino misto. Aliud. Tenerima folia tam nasciturj, q̄ rorismarini terito, expressoq; ex his succo, utitor, ex mulso, si febre careant. Aliud. Elaterion cū lacte muliebris maceratum naribus infundito & iubeto sursum attrahi. Aliud. Cyclamini succo aqua misto, ut modo dictū, utitor. Aliud. Editur eundem in usum sentis caninae rubēs fructus. Aliud. Chelidonij herbæ succū cum uino & aqua mulla porrigito non febriticantibus. Aliud. Hyperici drach. unam propinato ex aqua mulla. Porro ieiunīs dato in cibum amygdalas amaras.

Ad lienosos. Cap. 106

Das his in potu decoctū chamædrios, uel chamæpithios, uel polij, uel rubiae; idq; aut perse, aut cū oxymelite nō febriticantib. Aliud. Candida hederæ corymbi numero tres, danf. deuoradi. & superbibendū acetū mullum. Aliud. Radicis caparis ex oxymelite decoctū febriticantib. das. Aliud. Thamaricis fructū tritū & per incerniculū excrementum duorū cochleariorū quantitate, dato ex oxymelite. Aliud. Ferrū ignitū aqua restinguito, quā da in potu cum uino, si nulla ad sit febris.

Galen.

Epithema splenicum, id est lien aptum. Cap. 107

Foenogræci unc. iij. hordeaceae farinae unc. iij. seminis nasturtij unc. iij. caricas acerrimo primum aceto maceratas cōtundito fortiter in pila; deinde adiiciens cætera, unito omnia simul. ac utitor. Aliud. Moly herbam etiamnum uirentē cum suo semine in ollā cōiuncto, in qua diligenter obturata coquito plurimū lento igni, coctāq; nūc & in pila tritā imponito lienī ante tres dies non soluturus.

Ad hydropicos, id est, aqua inter cutem affectos. Cap. 108

Foenogræci uncia una. hordeaceae farinae uncie tres, stercoris columbini uncia quatuor, fraxæ resinae, picis, cuiusq; libra una. axungia ueteris librae duae, liquato, quē liquari ex his possunt; demū addito cætera ex aceto trita, ac utitor. Aliud. Fimi caprilli sicci libras duas coctas in oxycrato, ut malagma imponito.

Ad colicos. Cap. 109

Anethum & cyminum in tribus olei uncij coquito, & simul exhibeto. Aliud. Rutam coctam similiter in dicta olei mensura, adiecto resinae terebinthinæ cochleario, præbeto.

Ad eos qui refrigerati sunt. Cap. 110

Anethino utere, cui additum sit triti castorei cochlearium.

Ad inflammationes. Cap. 111

Anethino utitor, cui admista sint casei nō saliti duo cochlearia. Aliud. Additur similiter uel pinguedo anserina, uel cerui medulla.

Ad dysentericos. Cap. 112

In dysentericorū curatiōe, illud præmeminisse fuerit perquā oportuū, uidelicet optimū dysenteriae remediū cibi esse paucitatem. Necessum ad hæc sunt ea, quæ dysentericis in cibo dantur, q̄ licet leuia, ab omni aliena grauitate, & concoctū facilia. Porro decoctum malorum puniceorum integrorum nec minus cotoneorū cōmode his tum ad sorbendū propinatur, tum per clysterem iniicitur. Aliud. Plantaginem herbā cum oryza exacte decoctam da in cibo: quin huius ipsius succū adiecta pinguedine hircina cōmode subministrabis. Aliud. Myrti baccas uino incoquito, siquidē febre careāt: sin aliter, aqua, ac immittito. Aliud. Cochleariū integrarū ustarū unc. i. cornu cerui usti unc. ij. uniatū succo plantaginis. exhibeas ex hoc fabæ magnitudine, febre carentibus cum uino, cū aqua uero febriticantibus.

Ad coliacos & dysentericos. Cap. 113

Baccarū myrti siccarū cōtusarūq; rosarū aridarum, cuiusq; unc. i. baccarū iuniperi decem numero. pīrorū aridorū tusorumq; tria & uiginti numero. ceratorum, quas dulces siliquas dicunt, contusorum uncia una. corticis pinī uncia quatuor. propinato excreti ex his puluisculi cochlearium ex uino. Porro solidius illud crassiorūq; partium pinguibus palmulis coactum uentri imponito.

Aliud. Potum leporis, tum hinnuli, tum etiam capreae coagulum ex uino, necnon immissum cum oryza cremore iuuat.

Ad diuturnam dysenteriam. Cap. 114

Chartæ usq; calcis, cuiusq; uncia una. uia im-

mature succo excipies in pastillos cōformato, pōderis diuersi, nempe modo unius, modo duarum, modo etiam trium unciarū. ut cuiq; ætati apta sit ad manum quantitas. Porro ubi usus postulat, unum ex his uino austerio dissolutum adiecto oryza cremore, per clysterem inijce. Aliud. Cocti anserini oui putamē minutissime tritum dimidia drachma quantitate ex uino propinato.

De applicandis sedi remedijs. Cap. 115

Sedi diuersa accidunt uitia, ut sunt rima, condylomata, aliaq; inflammationes. Aptæ autē his sunt tenera, mollia, omniq; uacantia mordicatione, inuncta remedia.

Ad sedis ex ardore dolores. Cap. 116

Ouiluteum ex uino albo tritum, & rosaceo cerato exceptum illine, emplastrisq; modo utere. Cōueniunt autem his *επιπλῆ*, id est, mollia, teneraq; dicta pharmaca, & *ἀδύκνη*, id est, mordicatione carentia, illita. Aliud. Recentem anseris adipem inungito, & emplastri in modum imposito. Vtile his etiam cataplasma ex pane mundo dissoluto coctoq; in aqua, & rosaceo, quod fuerit efficacius, additis ouorum luteis aliquot coctis. Aliud. Foenogracū elixum tritumq; adiecto butyro ut cataplasma applicato. Aliud. Anserinum adipē inungito. Aliud. Rosarū unc. iij. coctorum ouorū lutea duo, trita ex uino albo, rosaceoq; cerato excepta illiniuntur.

Ad ani pruritus. Cap. 117

Terram uocaram cimoliam trita cum uino, ceratoq; myrteo exceptam appone.

Ad procidentem anum. Cap. 118

Recrementi plūbi unc. i. rosarū siccarū unc. iij. accurate admodū trita, sicca inspergunt ano, eloto prius uino myrteo. Aliud. Cyclamini succū & mel æqua portione decoque in uase æreo, donec cerati habeat crassitudinem, & inunge.

Potio ad renum et uesicæ affectus inflammationis paritripes, & exulcerationes. Cap. 119

Seminis lini uncia duæ, amyli uncia una, propinato ex aqua cochlearium.

Ad uesicæ ulcerationem, & urinae difficultatem. Ca. 120

Pinei nucleī, & amygdala, singulorum numero uiginti, palmulae quindecim, tragacanthæ unc. iij. datur ex his cum aqua.

Ad renum obstructionem. Cap. 121

Apij decoctū tribue in potu. febre carētibus ex condito, febrientibus ex aqua. Aliud. Decoctū cicerū, quæ a similitudine *κεκοί*, id est, arietina appellantur, cum condito, detur in potu.

Ad calculos. Cap. 122

Lini semen exacte tritum, datur bibendū cum condito. Aliud. Seminis cucumeris domestici fixi unc. vi. seminis maluae unc. v. nucleorū pineorum frixorum uncia sex. seminis apij uncia viij. amygdalorum amarorum mundatorum uncia ix. dulci excipiuntur. cochlearij datur mēsurā ut antedictum est.

Ad coxendicum, pedum, & articularum dolorem. Cap. 123

Eiusdem inter se sunt generis omnes huiusmodi morbi, proinde eandem ferē postulant cura

tionem, differentes solum efficientibus ipsos succis, quorum hi quidem sunt calidi, illi uero frigidi. Dignoscuntur autē, q̄ calidum succum comitentur rubedo, calor; & si adiuncta fuerit inflāmatio, uehementes dolores. Contrā frigidum, tumor albus, laxus, ac mollis. Porro utriusq; curatio est, ut calido frigida, frigido uero calida, discutitiāq; applicentur. Est siquidem magna fuerit efficiētis morbum succi abundantia, hic uacuante medicamento primo est educēdus. Quod si corporis adsit plethora, principio secāda est uena; deinde repellendus cohibendusq; influxus oxycrato, aut hoc etiam frigidioribus medicamentis alijs. At omnibus de his scriptū nobis abunde est, cū alijs in lib. plurimis, tum maxime mi Glaucō duobus illis de arte curatiua ad te misis. Proinde uerbosius de his differendū nō est, hoc præsertim cōmentario. Io, qui derebus acquisitū facilibus tantūmodo instituitur nobis. Cæterū in coxendicū doloribus, reprimentibus medicaminibus nunq̄ est utendum; cum enim in alto corpore sit iuncturæ huius situs, reprimentibus medicamentis succus a circumstantibus uasis muscularisq; deferretur ad ipsam iūcturā, grauius etiā dis cruciaturus: quapropter mitigantibus tantū lenientibusq; est remedijs utendum. Neq; porro uehementer aut calidis ac frigidis medicamentis in coxendicum est dolore agendum, quod ab his irritet uerius q̄ curet humorū fluxio: admodum enim calida attrahunt magis q̄ uel discutiunt uel dissoluiunt: ē diuerso frigida congelant coarctantq; quodāmodo fluentes humores, discutitq; reddunt cōtumaces. Cæterū coxendicū dolore affectos uomitus quā alui deiectione iuuat magis, quod humorū ad inferiora defluxū retrahat. Prouocandus autē initio uomitus est, ab accepto cibo. Postea uero ad ciendū hūc, licet etiā uti bulbis uomitorijs, & raphano, id est radícula: exhibetur aut in aqua cocti bulbi, ex oxymelite: radícula uero concisa in tenues particulas, editur similiter ex oxymelite. Deinde ubi nunc a sumptis his longum satis tempus præterierit, ad uomitum ducendi sunt: quo prouocato, deinceps longo interposito tempore, lauandi sunt: deinde iterum tantisper est ipsis quiescendum, donec omnis oborta ex eo corporis turbatio cōquiesuerit; demum tenui sunt uictu reficiendi.

Ad podagra paroxysmum, id est acerbationē. Cap. 124

Brasicae folijs decoctis ac tritis addito acetice, lutea duorū ouorū crudorū, ac rosacei parum, quæ acuracius deinde mista in modū cataplasmatiss tepida imposito, frequēter renouans. Aliud.

Cataplasmati uulgaris & usitato ex caricis elixo adiecta hyofscyami folia incoquito, ac utitor

Ad seruidas inflammationes. Cap. 125

Lentem palustrem ex aceto & rosaceo imposito. Aliud. Vlmi folijs expressum succum & coctum cum cerato illine

Ad excedentes, & ueluti immensos ardores. Cap. 126

Lactuca folia exacte cū pane trita, applica, frequenter remutans. Aliud. Coriandrū uiridetum cum polenta ut emplastrum admoueto.

Ad laxas inflationes. Cap. 127

Salem ex oleo diligenter tritū succidaq; lana exceptum ut emplastrum impone.

Licet commentarij huius initio de cholera dictū sit, & mortiferis pharmacis, deq; serpentibus qui cū morfu ue uenenum relinquūt, & sanguinis etiā fluxu sit non nisi dictum nobis, non fuerit tamen à ratiōe alienum paucis adhuc de ijs agere, licet ad aliud locum hæc pertineant.

Ad sanguinis è naribus fluxum. Cap. 128

Triteam farinam porri succo maceratam tortili linamento adfrica, persfluentiq; nari inserto. Aliud. Tortile linamentum aceto quam acerrimo madens ad lucernam comburito, & mananti nari inserte. Aliud. Asinini simi (sic enim nunc reddo latine onida) etiamnum calentis succū mistum cum æquali aceti portioe, & tanta farinæ triticeæ, ut sordium habeant consistentiā, linamēto adfricato, quod affectæ nari imponito. Iurant ad hæc tam pedibus quam manibus iniecta uincula, necnō refrigerare caput. Magnas præterea cūcubitulas præcordijs adfigere, iecoris quidem, profuente dextra nare sanguine, sicuti sinistris siue lienis, affecta nare sinistra. Ceterū de sanguinis per os reiectione, dictum nobis antea est.

De fluxu sanguinis è uulnere. Cap. 129

Sanguinis è uulnere effluxum curant myrrha & thus, trita, & ex ouiaquato pro uulneris ratione impolita. Aliud. Vitæ ranæ cinerem uulnere inspargito. Superponenda porro his sponsia ex oxycrato, & frequenter siccitatis ratione mutada. Aliud. Recentem ac calidum adhuc simum asininum cataplasmatismodo superdato: quod si aridus fuerit, dissolue pauxillo aceto.

Ad choleram dictum affectum. Cap. 130

Si sine febre, aliaq; uacuatione eueniat, da buccella panis ex uino misto, daq; potu frigida, & cucurbitulas magnas medio adfige utrī, Quod si is

A qui affligitur quadrato sit habitu, in frigidū induci to lauari, in quo diutius permaneat. Porro cibus conuenit adstringentis facultatis, ut sunt ex autumnalibus fructibus poma tam cotonea q; punica.

De pharmacis mortiferis. Cap. 131

De letalibus medicamentis, neq; indistinctus hic agere tutū satis est, neq; parui laboris de omni bus singulatim. deq; sequentium ad hæc symptomatum siue accidentium curatione; ne interim referam adiunctam huic rei male faciendi occasionem, præsertim ijs, quibus male facere uolupe est. Proinde ea hic tantum tradam, quæ in communi ferè creduntur conferre ijs, quos letalia eiusmodi medicamenta deuorasse contigerit. Principio igitur iubendum, ut hi tales confestim uomant, epoto prius hydrelæo, id est, mistis aqua & oleo, & plurimo & frequenter. Deinde uarijs diuersisq; sunt cibandi ferulæ, à quibus non ita multo post rursum uomant iubeto. Sic enim aut simul reijcitur mortiferum medicamentum, aut saltem infringetur ipsius uirtus. Quod si post hæc uenterculus uideatur à uomitu ueluti aduri, hydrorhodionon, id est, aquam rosaceo oleo mistam potui offero, dehinc uomant rursus iubeto. Quod si usus postulare uidebitur, dabis theriacen ex uino, aut iuniperi baccas numero nouem, & rutæ trita uiginti folia, aut herbæ chamæpityos. A somno in totum abstineat præcipito, extremarumq; partium utilior frictione. Quod si malum uidebitur tibi altius in uentrem nunc descendisse, quod ex mordicatione irritationeq; inferioris uentris cognosces, instandū acriorib. clysteribus, cuius generis sunt C qui ex melle copiosiori & nitri spuma constant, aut alio quouis cui irritandi uentris sit facultas. At strangulationi à deuoratis fungis medetur nardus ex oximelite pota. Idem potest gallinarū domesticarum simum, ex oxymelite. Cæterum suffocatoriū ex concreto in uentriculo lacte, auxilium potum cum uino coagulum.

ARGVMENTA LIBRI DE FACILE PARABILIBUS medicinis.

Cap. 1. Ad capitis dolorē. 2. Ad idem, & hemicraniam. 3. Ad epilepticos uel à lydere percussos. Vt cōfessum excutitur. De trahētia materiā per nares. 4. De aurium uitij diuersis & primū de illis quæ in auditu riji sinibus sunt. Ad aures purulētes uel sanie manantes & grauiter dolētes. Ad tereidines. Ad dolores diuersos. Ad grauē auditū & surditatē. Ad sonitus & tinnitus. Ad ulcera & inflammationes aurium. Ad uermiculos, & ea quæ inciderunt extrahenda. Ad sordes aurium. 5. Ad nares ulceratas. Ad polypos, ozenas, interiores phlegmonas, & ulcera cum duritie. 6. Vt sanguis per nares euocetur, uel fluens erumpens uel sistatur. 7. Ad sterentes. 8. Ad puncta & notas inflatas tollendas absque cicatrice & ulcere. 9. Ad albugines, opelidas, lenticulas, album colorem & id genus alia. Vt facies albefcat, erugetur, splēdeat. 10. Ad aliores fissuras. 11. Ad oris halitum commendandum. Ad oristetros absque ulcere odores. 12. Ad albandoos. 13. Ad sanguinis ex ore profusionem. Ad ulcera gingiuarum. Ad dentes titubantes, concussos, dolentes, oidos, exesos, stupentes. Vt dentes sine ferro &

absque dolore eximantur. 13. Ad ulcera oris & putredines. 14. Ad uulua morbos. 15. Ad inflammationes consillarū & anginas. Ad abscessus in tonsillis. 16. Ad interrumpat submissamq; uocem. 17. Ad eos qui prope suffocantur. 18. Ad puerorum crustas in faucibus. 19. Ad ossa deuorata; aliaq; omnia ex gutture excutienda. 20. Ad hirudines ex gutture efficiēdas. 21. Ad distillationes. 22. Ad tusses simpliciter, & asiduas, & nocturnas. 23. Ad asthma, spiritus difficultatem, orthopnoeam. 24. Ad sanguinis ex ore profusionem. 25. Ad eos quibus ex aliqua ui in interiora sanguis erupit. 26. Ad omne sanguinis profluuium. 27. Ad sanguinis sputū & tabem uel phthisin. 28. Ad lateris phlegmonem. 29. Ad mammas pendulas & flaccidas. Vt sōgo tempore molles sint. Maiores ne fiant. 30. Ad foetidos sudores, & alarum terros odores. 31. Ad lac siccandum. 32. Ad uitio stomachi laborantes. Ad imbecilles & nauseantes. Ad morsus uentriculi sine bilis uomitu. Ad stomachi imbecillitatem. Ad stomachi præcordiorumq; uitia. 33. Ad singultū. 34. Ad choleram & uomitum. Ad uomitū comprimendū. 35. Vt

facilis sit uomitus. 36. Ad uoluitum mirū auxilium, & ad steruus uomentes. 37. Ad crebro uomentes. Ad choleram & uomitum supprimendum. 38. Ad locinorū uitia. 39. Ad arquatos tum aliā remedia, tum naribus infundenda. 40. Ad lienosos, & induratū quouelienem. 41. Ad aquam intercutem. 42. Ad tormina & uentris dolorem. 43. Ad torsiones intestinorum & uentris. 44. Quæ aho immittantur ad euacuationem. 45. Ad dyfentericos, coeliacos, & lienteriam.

46. Ad uentris profluuium. 47. Ad dolores dyfentericorum. 48. Ad colicam, diafragma, inflationem, tormina, & omnes intestinos dolores. 49. Ad intestinorum scissurā. 50. Ad ischiadem. 51. Medicamenta quæ exterius imposita alium ducunt. 52. Ad urinæ difficultatem & calculos, & urinam proritandam.

53. Ad conceptum remedia. 54. Vt mulier marem gegerit: Vt foeminam. 55. Notæ maris & foeminæ in utero. 56. Vt mas concipiat. 57. Vt foetus retineatur. 58. Vt partus acceleretur. 59. Suffitus ad ægre parientes. 60. Ad lac creandum. 61. Ad iacreficandum. 62. Si mamma duræ inflammationē fuerint.

63. Potio foetum mortuū, aut nō ritu naturali exeuntem efficiens. 64. Abortus futuri signum māmæ graciefcentes. Cataplasma abortiuum, & alia ad necandum aut efficiendum foetum. 65. Ad mulierem quæ a partu nō purgerur. 66. Ad pallorē mulieris a partu. 67. Ad uentris, mammarum, femorum, coxendicumq; scissuras. 68. Ad sudores uentris, præcordiorum, femorūq; a partu. 69. Ad inflationes in coxëdicibus. 70. Ad prominētes umbilicos. 71. Vt umbilicus a partu magnus ac elegans fiat. 72. Ad uteri strangulatus, dolores, tormina a partu & corruptiones, duritias. 73. Ad muliebrem profluuium sistendum. 74. Vt ne mulierum naturalia concubitu humefcāt. 75. Vt ne cui penis ar rigi possit. 76. ad eos qui inuoluntarie urinam reddunt. 77. ad somnum conciliandum. 78. ad eos qui coire nequeunt.

Quæ sequuntur ex ueteri translatione sunt, nec habentur in Græcis codicibus.

79. Prologus ad Claudianum Solonem. 80. De tincturis capillorum. 81. Præseruatio a canicie. 82. ad faciendum capillos albos, & flauos. 83. De casu capillorum cum aliis, tum in resumptione ab ægritudine.

84. Vt in loco cōbusto ab igne oriatur capilli. 85. Pilostrum. 86. De alopecia. 87. De furfuribus. 88. De psydractis & efflorationibus. 89. De achoribus & faviis. 90. De tremore capitis. 91. De dolore capitis. 92. ad dolorem capitis & temporum. 93. ad aures sanie manantes & dolorosas. 94. ad serofulas & parotidas, quæ sunt apostematæ secus aures. 95. De morbis oculorū, & primo de ophthalmis incipientibus. 96. ad ungulam. 97. & 98. ad hypopiam, id est, liuores sub ocululo. 98. De pterygijs. 99. De ulceribus oculorū & albuginibus. 100. ad caliginē & nebulas oculorū. 101. De hordeolo. 102. De madarosi. 103. ad supercilia pilosa. 104. Vnctio habentiū oculos glaucos. 105. ad fusosufusiles. 106. ad ægilopes. 107. ad nyctilopes. 108. ad pediculos oculorum. 109. De palsionibus narium, & primo de polypo & ozana. 110. ad foetorem narium. 111. ad ulcera narium. 112. ad extrahendum sanguinem de nariibus. 113. ad fluxum sanguinis narium. 114. De panno & lentiginibus. 115. ad faciendam faciem rubicundam. 116. ad fluxum sanguinis ab ore. 117. ad oris ulcera. 118. De albificatione dentium. 119. ad dolorē dentiū. 120. De morbis gingiuarum. 121. ad gingiuas tumidas & carnis excrescentiam. ad inflammationem gingiuarum. ad gingiuas denigratas & putidas. ad gingiuas sanguinoletas. 121. ad uulū inflammationem. 122. ad sputum sanguinis. 123. ad pleuritidem. Vnguentum ad eandem. 124. De mamillis, & primo de apostasiearum. 125. ad attrahendum lac. 126. Vt mamillæ remaneant tenæ diu. 127. ad dolorem stomachi. 128. ad debilitatē stomachi. 129. ad umbilicos procidentēs. 130. ad tortiones & dolores uentris. 131. ad colicam. 132. ad difficultatem mingendi. 133. ad sistendum exuberantiam urinationis. 134. ad renum & coxendicum dolores. 135. ad conceptionem. 136. ad difficultatem partus. 137. ad extrahendum foetum mortuū. 138. ad eas quæ post partum remanent discoloratæ. 139. ad educendum menstrua. 140. ad dolores matricis. 141. Vt mulier corrupta appareat uirgo. 142. ad uenerem incitandam. 143. ad morsum uenenosorum animalium. Inuocatio ad morsum uiperæ Suffumigia fugantia uenenosa animalia. Vt uiperæ non mordeat. Epithema in morsu uiperæ. Fomentum ad morsum uiperæ & muris aranei.

CL. GALENO ASCRIPTVS

LIBER DE MEDICINIS FACILE

PARABILIBVS AD SOLONEM MEDICORVM

principem sine principio.

Iunio Paulo Crasso Patauino interprete.

Obseruato multa nos in fine istius libri ex ueteri translatione appofuisse quæ in Græco codice non uidimus.

Ad capitis dolorem. Cap. I



LIVD remediū. Caprinū stercus ex aceto & oleo rosaceo terito, frōti illinito, & fascia deligato: id facito multo mane, ac uesperī, & ex capite laboratē sanitati restitues. Aliud. Euphorbio & atramento scriptorio unā cum ace-

to detritis frontē illine. Aliud. Pueruenerenō expertus in limine egroti sanuæ mingito, tu uero acetū in fūdito, atq; utrūq; in unū super limine cōmisceto, donec foridū acquirat crassitiē: ac eadē illa hora frōti imponito. Aliud. Si qua ex partu capitis dolore teneat, cinerē cum aceto admiscens fronti superdato. Aliud. Hedere lachryma cum aceto et rosaceo mista frontē obline. Epithema ad idē. Nasturtiū cū aceto & rosaceo misceto ad cerati crassitudinem, impositoq; ita, ut a tempore ad tempus pertineat, ilico dolorem auferes. Ad

Ad eos, qui ex altera capitis parte dolent. Cap. 2.

Acacia roseo cerato excipiens utere. Aliud. Cichorium impostum & capitis dolores, & exustiones à sole efficaciter tollit.

Ad comitiales morbum. Cap. 3.

Ictinum, hoc est miluim in olla cremato uiuentem, cineremq; propinato, & sanabis. Aliud. Eiusdem iecur exustum & tritum ex aqua potui dato. Aliud. Asini stercus frictu cochleariorum duorum pondere quotidie exhibeto, atq; ægrotus morbo liberabitur. id remediū longa experientia comprobatū est. Aliud. Urina ueris in fumo arefacta ex aceto mulso pota benefacit: esto autē urinae portio ad Aegyptiæ fabæ magnitudinem, sed optima est aprī. Aliud. Hircinum stercus ad morbū comitiale proficit, si ex eo quindecim globuli summū exhibeantur. Aliud. Agrestis malua succū ægrotus per triginta dies ieiunus bibat, & curabitur. Aliud. Mustella iecur aridū ex aqua propinato, id facies autem cum ægrotus mox est calurus. Aliud. Parum olei leporis coagulo infundito, & pilulas facito, ex quibus modo unam, modo duas præbeito. Aliud. Mustella sanguine oblinito, ac mustellam pedibus capiteq; abiectis epulandam apponito: pariter & strumis exhibitā mustella prodest. Aliud. Murem dissecans per lunæ silentium iecur ipsius extrahito, & assum ægrotō, ut comedit, exhibeto. iuuat etiam acetū mullum scyllinum, & luliani, & theriaca. Aliud odorabile ad comitiale affectum. Tithymallum cum aceto & polenta terens placentulas conficito, olfaciendasq; laboranti offerito, & non cadet. cōfert etiam odorari peucedanum & picem.

Suffimentum comitiale morbum detegens.

Lapidem gagatem suffito ipsum circumuelans, ne odor dissipet, cadetq; si reuera comitali morbo affectus est.

Potiones per quas dignoscitur, utrum comitalis morbus sanabilis sit.

Acaciæ drachmam aqua diluens propina: si uomuerit, insanabile malum est, sin autem continue nit, potio ipsi prodest.

A fidere percussorum curatio.

* Asini lotio ipsos consperge, & sanescunt.

Si comitali morbo humi prostratum confestim excitare uis.

Thymum aut pulegium conterens eius narium admooueto.

Materiam per nares detrahentia.

Anagallidis coeruleum habētis florem succum naribus instillato, subetoq; supinum ægrotum spiritum adducere. hoc enim omibus ex capite laborantibus opitulat. Aliud. Succū hederæ albæ naribus instillato. Aliud. Nigellæ expresse succū cum mullā instilla. Ad eundem modum & tride ueteri oleo admisso utitor. Aliud. Betæ radicis succum in nares infunde, & caput purgat.

De aurium uitij primūq; de illis, quæ in auditorijs sinibus sunt. Cap. 4.

Vino diluto, aut mulso aurem subluo, ac licū in oui putamine macerans infundito.

Ad inflammationes & dolores.

Alij capitula cōterens cum oleo in olla calefacito, oleūq; in aurē infundito, & dolor sedabitur.

Ad magnum dolorem.

Anserinum iecur salsum cum nardo, eliquato, & repurgans in aurem indito.

Ad aures sanie manantes.

Liquidum alumen aqua diluens in uitreū uas conde, & maceratum infunde.

Ad aures purulentes & grauiter dolentes.

Porri succo melle diluto utere. Aliud. Opium dulci uino eliquans ac tepefaciēs in aurē iniice. Aliud. Cedri lachrymā ex pauco nardo immitto. Aliud. Mel & oleum unā in uasculo prius tepefacta instillato.

Ad terebines & sanie.

Alumē fissile cum aceto & dulci uino elixum ad mellis temperaturam, infusum tam in recentibus quam antiquis uitij efficac est.

Ad sonitus aurium intra seipsas & acres dolores.

Cedri lachryma cū melle admista, & infusa prodest. Aliud. Aloe, quæ iecoraria dicit, cū mulso ad fordij crassitudinē tēperata, & infusa bene facit. Aliud. Vulpis adeps eliquata infundat. Aliud. Nardū tepefactum infundito. Aliud. Calsiā ex rosaceo iniicito. Aliud. Centipedæ domesticæ oleo rosaceo inferuefactæ opitulatur.

Ad dolores paulatim ingruentes.

Lanam succidam in aceto seruēfacias, exprimitoq; humorem in aurem, deinde foramen summū lana succida integito. Aliud. Mali punici immaturi succo cum melle utere, aut lentisci, aut herbarum muralis, aut ligustri, aut rubi, horum cuiusque succū aut seorsum, aut melli admiscens & elixans utere, pariter & plantaginis, aut lactucae, aut sanguinalis succo utendum est.

Ad dolores absq; ulcere.

Sulfur ignem non expertum per calamum naribus suffletur. Aliud. Papaueris lachryma muliebri lacte temperata instillatur.

Ad grauem auditum.

Absinthiū in aqua elixans aurē decocto eluito.

Ad sordiditatem naturalem.

Capræ nuper iugulatæ cornu caprino lotio impleto, & ad fumum per dies nouem suspendito, deinde utere.

Ad sonitus ex profundo.

Acetum, rosaceū, rutam, & cuminū cum melle macerans utitor.

Ad tinnitus sonosq; repente extortos.

Acetum acre tepefactū in aurē demitte. Aliud. Vitis albæ, mellis, ueratri albi, & rosei olei portionem in unum permiscens in aurem dato.

Ad aurem dolentem & sanie manantem.

Acetum, mel, roseum que permisce, & tepefactis utere.

Ad acerbos dolores.

Subactā oleo adipē infundito, & spōgia locum occludito. bene facit & ad neruorū morbos cum uulpino adipe atq; sullo æqua portione permista.

Ad dolores aurium ac phlegmonas.

Hastulæ regiæ radicē mundato, & in oleum uase uti-

se vitreo contentū demitto, & per cōtinuos qua
draginta dies sub Canisestu insolato deinde utitor

Ad ulceratas aures & purulentas.

Lacertas pauxillas uenatus mundo oleo eliqua
to, atq; ita in aurem demitto: & uermes, si in au-
re fuerint interficiēs.

*Ad aurium uermiculos, & ad ea, quae in aurem inci-
derunt, extrahenda.*

Cepas & hyssopum in lotio uetere conterens
instillato. Aliud. Partis interioris cucurbitu-
lae sylvaticae seminum, aluminis Aegyptij pares
portiones in cedrino oleo macerans infundito.

Ad sordes aurium educandas.

Lanā unguentaria glande madidā in aurē de-
mitte; & ipsā sordiu plenā inuenies. Aliud.
Nitrū laeuigatū in aurē cōijcito, acetūq; instillato,
super lana mollis addenda est, & per noctē relin-
quenda, sequēti uero die calida mulla aurē eluīto.

Ad aurem dolentem.

Salis flos cum rosaceo & aceto infundēdus est.

Ad saniem aurium & magnum dolorem.

Nitrum rosaceo dilutum in aurē demitte. A-
liud. Album ueratum ex uino aut aceto cū alu-
mine infundendum est. Radicis preterea calamin-
thae succus aceto maceratus instilletur.

Aliud ad diutina uitia.

Licij & mellis equas portiones cōmiscēs utere.

Ad inflammatas aures.

Capitulorum papaueris cortices contere, & ter-
tiam partē cum hordeacea farina permisce, & in
dulci diluto elixa, cataplasmaq; confice.

Ad nares ulceratas, & polypos, & ozenas. Cap. 5

* Spuma nitri attinge, & ad spiritus odorem con-
cilandum, albæ uiolæ florem nondum ex colicu-
lo elapsum lege, tereq; cum aqua, donec mellis
crassitudo fiat. Aliud. Aerugine ex melle deco-
cta locum attinge.

Ad interiores phlegmonas.

Adipe aserino cum porri solaniq; succo æquis
portionibus diluto interdii obline.

Ad narium ulcera cum duritie.

Plumbum tritum uino aqua maris non tempe-
rato macera, myrteiq; olei, quod satis est, adde ad
mellis spissitudinem. Aliud. Aeris squamma
ex melle decocta utere.

Sanguinem per nares euocantia. Cap. 6

Mentam excipiens melle, & collyrium faciens
in nares mitte.

Ad profusum sanguinem & naribus.

Rutam tritā oleo excipito, & intra nares cōij-
cito. Aliud. Gummi ac thus contrita & aceto
liquata in nares da. Aliud. Cinerula cypria cū
succo porri tēperata bene facit. Aliud. Spon-
giam usam pici admistam, & arefactam linamen-
to inspersam in nares pellito. Aliud. Acuti ium-
ci florem naribus imponito.

* *Ad sanguinis eruptiones, quae suppressi nequeunt, praesertim
cum diutius febricitantibus sanguis perfunditur.*

Pyriton imponito nonnunq; aridum, nonnunq;
collyrio oblitū, & crassitudinē cauis nasi respon-
dētē faciens ita immittito; iisdem & nares & tem-
pora & frontem illinito. Aliud. Diphryges

A ustum, & ex aceto tritum superimponere. Aliud.
Lanam oui albo madentē admoue. Aliud. La-
nam herbæ sanguinalis, aut solani succo imbutam
in nares dato. Aliud. Ruta ex aceto trita cir-
cumponenda est, & suffiēda. Utendum prae-
rea est reprimere cohibereq; sanguinis impetū u-
lentibus; ut cicutam naribus suffiito, odoremq; at-
trahito; nares etiam digitis comprimito; aures ce-
rato, aut alio quopiam diligenter occludito, quin
etiam penis extremum papyro deligato; in mulie-
ribus uero mammarum papillis similiter. Item re-
frigerare & potentibus frontem caputq; oblinito, &
conspargito. Praesentissimū remediū est capiti cu-
curbitulam affigere, uel etiam frontis uenā solue-
re. Sternutamenta quoq; plerunq; sanguinem re-
uocant, aut herbam buglosson, aut asini finum ex
aceto in nares cōijce.

Ad sterntes. Cap. 7

Anetum capiti clam subijcito; id & profluenti-
bus ex lectulo remedio est.

*Ad puncta & notas inflisas tollendas absq; di-
catrice & ulcere. Cap. 8*

Nitro locum detergēs resinam terebinthinam
superdato, & per dies quinq; dimittito, mox locū
soluens puncta scriptorio specillo perforato; dein
de thus nitrum ac mel pari modo mista, ut cerati
crassitudo sit, imponito; post solue, & ablue. A-
liud. Ex trito uerato cum pane, aut ex acido la-
cte per se cataplasma facito. Aliud. Fici trito
cortice illine. Aliud. Staphida agriam, quam
C herbā pediculariam, & pediculos necet, quidam
appellant, in cataplasmatibus modum imponito.

Ad alphas, & ephelidas, lentículas, & id genus alia. Cap. 9

Cucumeris sylvatici radicis succo trito et cribra-
to faciē deterge. Aliud. Alcyonio ex uino tri-
to faciē obline. Aliud. Vitē syluestre contu-
sam, & uino Aegyptio maceratā superdato. A-
liud. Erucæ agrestis radicē trita, & ouis felle ex-
cepta utitor, faciē prius nitro peruncta. Aliud.

Elaterium ex aceto terens, & ad mellis crassitu-
dinē redigens, ceratoq; admiscēs inunge. Aliud.

Cinabari ex melle faciē illine. Aliud. Cachrys
semine trito ipsas lentículas inunge, & arefactum
ablue. Aliud. Sylvatici cucumeris radicem, fi-
ciq; summos ramulos in aceto feruefactos tritoq;

D imponito. Aliud. Veneris umbiliciradicibus ex
melle cōtritis faciē illine. Aliud. Rubia ad ma-
culas à sole contractas & alphas benefacit, si ea tri-
ta ex oleo facies inungatur. Aliud. Zonchū a-
marum terens ex melle faciei imponito. Aliud.

Anethi semen ex uino uetere tritum & ad mel-
lis spissitudinem redactum, faciei obductor, atq;
ita per integrum noctem remaneto, sequēti mane
illud remoueto, recensq; aliud reponito; eodēq;
semine cōmanducato ephelidas & lentículas uti-
liter illinito. Aliud. Alba uiola ex aqua ad eadē
proficit. Aliud. Aphronitrum tritum cum cera
to ex tyrhenica cera confecto faciei superdato.

Ad alphas & album colorem.

Alcyonium ustum mellis que admistum illitum
prodest; eodē quoq; cum erui farina & tritici mi-
sto

fito quam maxime calido faciem detergeto. Aliud. Amara amygdala cortice spoliata aceto accipitur, & cataplasma facito. Aliud. Ocy misemen cum gallinaceo aut anserino adipe tritum benefacit. Aliud. Fœnum græcum ex aceto tritum squamulas, si illinatur detrahit.

Ad ephelidas & lentículas.

Myrrha & crocum, si aqua macerentur, illita iuuant. Aliud. Purpuras, aut uocatas cerycas hoc est buccina expiscatus, in ollulam cõijce, & in furnum allandas mitte, deinde ex melle tritis utere.

Ad faciem albam & extenta cute reddendam.

* Cucumeris syluestris radices in frusta diuide, & refrigera: deinde aqua elixatis ac tritis in cataplasma utere.

Aliud faciem splendendam reddens.

Exeruo bene olente uino macerato cataplasma facito. Aliud. Tritici, quod semidalin uocant, succū exprimēs humidiorē partē abijce, parti illi autē, quæ subsedit, oui album cõmisceto ad mellis spissitudinē, atq; hoc faciē perunctam oleo deterget: sole autē maculatam faciē frigida multa laua to; & per unum diem facies colorator redditur. * satis elixans parum aluminis iniice; deinde lixiuiū admiscens ac terens utere multo inungens oleo, sic enim facies coloris, bonūq; odorē os spirans efficitur. Cupreſti atq; dicitis tales unā feruefaciēs dococto corpus totū madefacito. Aliud. Thuris & paderotis æquas portiones misce, & ex melle tere, ita faciē inunge, atq; integrā diem sic dimitte, deinde ablue. Aliud. Lini facem mellis admiscēs sub solem iter facturus corpus inungito, eo tamen prius nitro perfricato.

Ad impediendam solis exuſſionem, & exuſſam faciem sanandam.

Bulbo cādido trito ex melle inungito: quod si facies citra phlegmonem tumefacta fuerit, nigrā terrā ex aqua cõterens superdato. Aliud. Alycyonio & nardo gallico simul tritis utere.

Ad oris uitia. Et primo, Ad labiorum rimas.

Immaturation gallam tritā accipito, & resinā tere binthinā cum hyſſopo & melle, atq; his perunge.

Ad aliores fissuras. Cap. 10

Caprinus adeps mundatus proficit. Aliud. Adeps anseris, & mel, & terebinthina æquis portionibus addito flore rosarū, hyſſopo arida, & maſtiche, fiat inunctorio.

Ad oris hilitum commendandum. Cap. 11

Vino uetere bene olente, in quo iris maduerit, os collue, alsidueq; in ore breui tempore contine. Aliud. Vino paulisper os subluē, in quo serpillum maduerit.

Ad oris tetros absq; ulcere odores.

Nonnulli meraco uino, cui myrrha admista sit, os eluunt, atq; rotundum odoratū funcū terentes, partes oris internas perfirant. perinde & marmo re uſto cum aneso utuntur: ita & hordeo cum sale * & melle: quidam & panniculum cremant, & uino iniiciunt, atque ita trito utuntur & pumice & nardo & myrrha ex melle: semidalin quidam & irin cum melle miscentes cõburunt, atq; ita utuntur: et ex ostreis purpura & buccino cum myrrha:

A cumq; cubitū eunt, aceto acerrimo colluunt. com manducant autem nonnulli domum egressi pini folia, & aqua os subluunt: quidam præterea & anesum, aut dulcem radicem, aut irin, idq; genus alia alioquo iter facturi commanducant.

Ad dealbandos dentes, aliq; eorum uitia sananda. Cap. 12

Vtuntur autem & huiusmodi quibusdam dentificijs, quæ unā & gingiuis profunt, & dentes splendidos firmioresq; reddunt: terram eretriada uocatam uſtam tritamq; adhibent. hoc ualde bene splendidos dentes reddit: farina erui lotio subacta illine. Aliud. Animalis dasypodis à pilosis pedibus uocati caput uſtum cū ſeniculo quā albiſſimo & ſepiæ tritis oſibus admiscens utere. Aliud. Cornu ceruino uſto tritoq; utitor: hoc & dentium dolores tollit, & ex roſaceo impositū capitis dolores discutit. Aliud. Pulegio & sale fricto mistis ad eadē tritis utere. Aliud. Ouillo talo uſto ad ſimilia utitor. Aliud. Hordeo toſto & sale mistis tritisq; utere.

Diachſma, id est collutio ad ulcera, & dentes titubantes infirmosq;.

Alicacabī radicē unā cum mali corio frequenter elixam colluto. Aliud. Albæ populi, aut uerbenacæ radicem accipito, aut eryngij radicem uel ipsam herbam, aut polij radicem accipito, & terens apponito.

Ad conuulſos dentes & dolentes.

Asini ungulam uſtam tritamq; aceto excipe, & orbiculos faciens repone, ad uſum aceto orbiculū unum liquato, datoq; ore continendum: illico enim dolorem ſedar tollitq;. Aliud. Nigri chamaeleonis decocto si foueas, dolorē dentiū curabis. id & mures necat. Aliud. Betæ ſucco si fiat collutio, cõfeſſum dolor finit. Aliud. Alterci radicis calidior decocti si foueas, dolor quieſcet. Aliud. Rutæ hyſſopū & myrrhā ex uino tritas ore cõtineto. Aliud. Si ex uerbasci radice aceto, poſca, aut uino elixa os colluat, bene facit. Aliud. Ex nitro cū oleo facta collutio dolorē pellit. Aliud. Cupreſi baccis ex uino & roſa elixis os foue. Quod si dentes omnes doluerint, ce dri liquore os si collues, protinus dolor ſuccurres. Dens molaris si doleat, malurā unicū habentis cauliculum radice si tangas, dolor abibit.

Dentes dolentibus herbæ muralis radicē, cum balneas ingrediuntur cõmanducandam præbeto, quam ſub molarī dente, quoad ex balnei egrediant, retineto, & dolor euaneſcet. Aliud. Pyrethri radiculā cõmanducata eodē die fugat dolo rem. Aliud. Herbæ pontitidis uocatæ radix maducata dolorē finit. Suffimentū dentes dolentibus. Alyconij ſuffitu cõtinuo dolor tollit. Aliud. Alterci ſemen ſuffitu dolori medetur.

Vt dentes bene oleant.

Cimoliā cū ſale terito, dentesq; fricato. Aliud. Dentem canis accipito, & in ignē cõijce, ſuffituq; facito: ut enim iſte crematur, ita dentes cõfirmat.

Ad exefos dentes.

Ad exefos autē dentes, atramento ſutorio trito permiſtū piper accipito, aut gallam: Aut ex mel-
Te ſiſſum

le fissum alumen in cauum dentis inferito, & dolo rem leuabis. Aliud. Limacis lapidē in frustula sesamī magnitudinē æquantia cōfringe, & in den tīs foramē immittit, ilico dolorē sedat, sed ex cera operculū facito. Aliud. Taurinū iecur lento igne frictum denti q̄q̄ impolitū simulatq̄ tetigit do lorē discutit. Aliud. Testudinis unguis in ma xillaris dentis exsili foramen cōiectus multū pro ficat. Aliud. Fel ursi impolitū ilico dolorē le uat, curat autem etiam quoquo modo illinatur.

Ad dentes motos & labantes.

Testudinis sanguis diu ore contentus dentes corroborat. Aliud. Alcyonio indico ex uino trito si os colluatur, motus sistitur.

Ad dentes ex istu concussos.

Coralium imposito, & satis diu contineto.

Ad dentium stuporem.

Aegrotus portulacam mandito, Aut oleo om phacino perungito. Aut amurcam olei in uase æ neo ad mellis temperaturā coquito: hac enim ue rusta si inungas, ualde prodest.

Ad dentes eximendos sine fermento & absq̄ dolore.

Fermentum denti circumdato, & paulisper re linquito, mox dentem lacertæ sanguine circum fundito, & excidet.

Vt sponte dens excidat.

Pyrethrum aceto mollitū saleq̄ per trigina dies maceratum denti prius mundo facto circumponi to. Aliud. Artemisiā herbā ex aceto tritam obline. Aliud. Dentem circū suffo diens uer miculis, quas campas uocant, in summis brascia rum aliarumq̄ herbarum folijs repertis illine, ab alijs dentibus cauens. Quod si inferiores dentes eximere uoles, illis uermiculis utere, quæ in infe riore parte illarum herbarū reperiuntur. Aliud. Sandaracham ex aceto tritam siccari permittit, & sicca utiliter utitor, prius sanguinem circum den tem eliciens: sic enim paulisper dimittens, digitis ipsum eximes. Aut agrestis cucurbitulæ radicem in foramen dentis cōijce. Aliud. Mœdi im maturi radicem arefactam tritam & cretam radici bus dentis circunda, & paulo post digitis apprehende, sequetur enim. Aut æthiopica olea lachry ma affectum dentem tangito. Aliud. Lacer tam agrestem arefactam, dissectam, cōtritāq̄ re pone, cum dentem circum mūdaueris imposito, & paulo post attrahito, quoniam sequetur. Aliud. Vrticæ semina cum galbano mista affecto denti circumline, & protinus excidet.

Ad eximendos sine dolore dentes.

Herbæ lappæ radix calefacta, & denti apposita facit, ut statim digitos sequatur.

Vt dentes digitis euellantur.

Syluestres cucurbitulas scinde, & aceto macera ad mellis spissitudinē, deinde ferramentū ad scal pēdos dentes in medicamentū demitte, eoq̄ den tem circū scarifica, atq̄ os paulisper clausum habe ri præcipe, deinde apprehēde digitis dentē & atrahe: absq̄ dolore euellēs. Aliud. Farinā ex la cte rithymalli adhibe, & hederacea folia superim pone, per horāq̄ dimittit; frangēs em sine dolore.

Ad ulcera oris & phlegmedines. Cap. 13.

Melanteria cōtusa prodest. Ad eadem benefa cit & oleum immaturū separatim aut cum melle propinatum. Proficat & glaucunis uocata cōtusa, eius succum ex melle & aqua paribus portio nibus ad gargarizandum exhibito.

Ad uisula morbos. Cap. 14.

Gallam tritam per se admoueto digito oleo in tincto, aut in cochleari inijciēs applica. Aliud. Spinæ Aegyptiæ semē tritū atq̄ aridum appone. Aliud. Caricas cum olea folijs esui dato. Succū cyrenaicū cum sale arefactū apponito, prius gar garizatione ex aqua calida facta. Aut fissum alu men ustum diligenter admotū iuuat. Aut stellio. * nem uiteis lignis crematum imposito, & benefa cit. Aliud. Rubi cauliculos ex melle & piceli quida maceratos circunda. Aliud. Lapidis. * gerati quasi nunq̄ senescētis florem admittū gar garizandum dato. Aut brasciæ succo admittū alu men fissum & gargarizatū mirifice prodest. Vt rium utiulæ apponendum. Myli & calcem uiuam aquis portionibus resina terebinthina excipe, & subde, retinendamq̄ permittit: intra horas tres au fert. Item proficit ad uræ affectum picis cretem * tum, quod ex Cilicia aduehitur, cochleario excep tum & subditū. Et uræ acerbæ succus ex melle, aut prædulci uino. Dicitur autē incolumem serua re columellā si quis urę acinos quotannis ieiunus deuoret, & nunquā eius partis affectu uexabitur. Iisdem præterea gargarismatis in columellæ uitijs utendum est, quæ ad tonsillas affectas describen tur: primū atq̄ inter initia iube aqua calida os fo uere, deinde frigida gargarizare, aut posca, aut ma li punici dulci succo ad mellis crassitudinem deco cto & aceto mulso eliquato: aut dracunculi succo gargarizet, & optime proficiunt.

Ad inflammationes tonsillarum & anginas. Cap. 15.

Id uero bene facit in tonsillarū tumoribus. Myr teas baccas præparantes melle, absinthio, & dra cunculo innuere consueuerunt. hoc autem medi camentum illitum, aut cum aliquo gargarizatum mirum in modum prodest. Quod si aliquæ phleg mones reliquæ super sint, tonsillæq̄ exasperatæ sint, lacte planē calido per se, aut cū supra positu rum aliquo utendū est: aut fursuribus aqua elixis, aut mulla, aut fursurū decocto, aut dulcis radicis, * aqua calida farinā subigens bis aut ter, succo ute re: aut gallinæ hœdī uel iusculo, aut hordeū corti ce liberatū unā cum passulis decoque: aut maluræ decocto per se utere, aut unā cum melle maluram elixa, aut cum lupinis & uino dulci, & uitior.

Ad tonsillarum tumores & anginas.

Dulcis radicis succum eliquans utere. Quod si crustæ factæ sint, ad has remouendas, mulla garga rizandū est, aut lentis decocto per se, aut cū hyflo po aut iride, uel etiam oliuariū fassarum aqua gar garizetur: aut croci parum & myrrhæ cum modico uini dulcis inferuescant: aut ficiis elixis hordei farinam permisce, succumq̄ exprimens percola, & succo utere: aut ficorum decocto sinapis modicum adijciens gargarizandum propina: puritatem namq̄

namq; detrahit, & phlegmonem discutit.

Ad abscessus in tonsillis.

Aliquod ex ijs, quæ supra comprehensa sunt, proficit: item aphonitro contrito locū tange, interdum autem & florem nūtri adiunge: separat enim crustas, & abscessus attenuat, si per collutionem propinet, & lixiuo percolato marrubij succo dilutus utiliter exhibetur: aut ipsum marrubium in mulsā coctū, aut rutæ decoctū cum marrubio aut per se aut in mulsā elixio subsidio est. itē & rutæ succo gargarizatus, & erui decoctum similiter prodest: aut misy cum galla immatura mistum: aut myrtū liquido alumini ac mellī paribus portionibus tritam miscens illine. hoc remedium non crustas solum abijcit, verum etiam antiadas à Græcis uocatas glandulas mūrice dissipat: aut porcelli cruore manus imbuens, ter laborantis collum attinge. Aliud. Cochleas testa nudatas in ollam insice, deinde torreas, & in cinerē redigens, puro melle ac leni excipe, atq; perunge. uis eius incredibilis est.

Ad interruptam submissamq; uocem. Cap. 16

Bulbos duos crudos ex melle efui dato: auxilia tur & fici decoctū cū thure & myrrha gargarizatum: ad idem facit & sulfur ignem non expertū in ouis deuorātū cochleariorū duorū aut trium ponere. Aliud. Accipe amygdalas amaras xx. seminis lini alsi drach. iij. tragacanthæ aqua macerata drach. ij. nucleos pini triginta: melle excipe, & utere. Aliud. Pulegij drach. iij. seminis lini, piperis, calamenti, ana drachmas duas: petroselinū drach. unam. mellis lib. unam.

Ad eos qui prope suffocantur. Cap. 17

Humanum stercus in panniculo deligatum & crematum potui dato, hoc iam suffocatis opem fert. Aliud. Et caprinum stercus cum melle & liquida pice illitum angina laborantibus summe prodest: aut rutæ succo & lacte per strigilem trāsmisso laborantis fauces collue: multū enim lachrymam detrahit, & malum leuat. Aliud. Vrīna assidue gargarizata sanitatem restituit, unā uero & succum brasiacæ gargartzare oportet.

Ad puerorum crustas in faucibus. Cap. 18

* Prius inungito, deinde uinū, in quo aristolochia decocta fuerit, gargarizetur: citissime curabitur.

Ad cissa deuorata aliq; omnia ex gutture excutienda. Cap. 19

Aquæ & olei parem modum in os fundens cōtineto, quoad rem deuorātā eiiciat. si quis comedens aliquid deuorauerit, & suffocetur, ex eadem re, quam comedebat, particulam utriq; auri super imponat ac super caput: res enim deuorata strangulansq; descendet.

Ad hirudines ex gutture eiiciendas. Cap. 20

Marina aqua gargarizetur. Aliud. Olei, aut succi cyrenasici magnitudo erui ex uino puro calidā potui detur. aut succum anagallidis, aut acetum acre cum thymo propina, postea calētī aqua gargarizetur.

Ad distillationes. Cap. 21

Caseus antiquus in cibum sumptus iuuat, ipsas

Galen,

A enim resiccat. oleo ueteri nares assidue perunge, aut sulphure & myrrha contrita cum uino & melle & oleo.

Ad tusses. Cap. 22

Fici puro uino madefacti & in cibū sumpti bene faciūt. Aliud. Resina terebinthina in melle cocta linctui detur, postea uinū meris dulce sorbendum exhibeatur. Aliud pueris magis commodum, Coagulum purū elixio melle comprehendere, & exhibere. Aliud. Canem lycurgū uocatū excoriatum epulandum appone. Aliud. Allium ex melle decoctum succurrit tussitibus, Aliud. Scyllam accipito, & eius summum excauato, in cauo conijce ouum, locūq; creta obtege, & assans edendum exhibe.

Ad tussientes assidue.

Hyssopi fasciculū in aqua ad tertias decoquēs, ieiuno per triginta dies calidam potui dato, pueris uero etiā cum caricis. Aliud. Pernam contundens & instar farinæ in locum affectum spargens, iuuat: hoc idem & sanguinis ex ore electioni succurrit egregie. Aliud. Sinapi tufum tritūq; cochlearij mensura cum uini cyathis duobus deinceps per dies tres bibendum dato.

Ad nocturnas tusses.

Mentā tritam in acetū coñice, & ad sorbendum propina. Suffitus ad tussim. Stryacis, mastiches, piperis, petroselinī, ana. drach. unam: sandaracæ drach. sex: bacā lauri unā, impone carbonib. accensis, & per calaum æger fumum excipiat.

Ad asthmaticos, id est, suffrictos. Cap. 23

Vinum, aut mulsam, ubi scylla decocta fuerit, propinato. Facit & pulmo uulpis siccatus, & tritus ex uino nigro potui datus. Aliud. Nasturtium album tufum & mellī mistum lingendū exhibeto.

Ad spiritus difficultatem.

* Ouium pilos, qui circum anum sunt, accipe, hosq; uastos ac tritos in dulci uino propinato. Aliud. Sulfur ignem non expertum ex uini cyathis quatuor potui dato.

Ad recta ceruicæ spirantes.

* Radiculam ex aqua calida propinato. Aliud. Sedū ex melle tritū linctui dato, aut bulbū, aut abrotinum, aut haliçā ex mulsā, aut hyssopū in mulsā coctum, aut herbam stœchada, aut castoreū ex dulci uino, aut scyllæ intranea ex aceto mulsā.

Ad sanguinis exore profusionem. Cap. 24

Symphiti herbæ radice, quanta potest, uescatur, eodemq; die acetū ne gustato. Aliud. Terram samiam dato, interdum cum succo herbæ sanguinalis, interdum per se. Dicebat autem Hippio centurius, ad sanguinis eruptionem magnifice proficit urticæ succus ex uini cyathis tribus epotus: iuuat præterea acetum absorptum præcipue scyllinum: item & mentæ succus & tragacanthæ sub lingua contentus.

Ad eos quibus ex aliqua ui in interiora sanguis erupit. Cap. 25

Accipe uitis cinerem aceto extinctum, plusq; acetī superfundens eliqua, & per panniculum ex-

tom. 6

u

cola

cola, id modica aqua temperatū propina cochleariorum sex mensura: hoc & locum sanguinem fundentem adstringit, & concretum sanguinem, deuoratum liquat & excernit, et cruoris profluvium compescit: est enim sanguinis in interioribus locis exitus repressum.

Ad omne sanguinis profluvium. Cap. 26

Symphyton herbam ex aceto faciei superdato, si ex naribus sanguis decurrat: si ex pectore feratur, thoraci: si ex uestica, aut utero, aut renibus, coxendicibus imposito.

Ad sanguinem sputum & tabem uel phthisim. Cap. 27

Gummi partem nigram dulci uino elixam exhibe sub lingua continendam ac deuorandam: ad sputū enim sanguinis & tussim gummi nigra pars uehementer facit.

Ad phthisim non perfectam sanandam.

Pulmo cerui calamo extractus & arefactus coctatur, ipsius cochlearia tria ex mellis cyathis tribus exhibentur: deinde paucis diebus interpositis iterum propinetur.

Ad phthisicos, & purulenta sanguinea, sputa reijcientes.

Vt amur calito caseo, cum cū pane esui dantes, ipsum ita colluētis aqua ter & quater donec aqua ipsam non reddatur: ipsam deinde charta inuoluentes cremamus, damusq; sine oleo exiguum mulsi infundentes. Herophilus autem salitum caseum solum cum pane exhibet: postea uero aquā potandam iubet: dicens cum sal in caseo aluū perturbat, uinum quidē datum soluit. utimur & scylla tosta cum salsamento in ipsa, & uehementer purgatur: item & porro cū pane: postea cum diligenter purgati esse uidebuntur, si infirmiores fuerint, ipsos carnisui & alijs id genus reficimus. Eadem ratione utimur in ijs, quæ ad purgationem attinēt, ubi abscessus eruperint. Herba quoque piscis uocata cum axungia non salita esui data sanguinem reijcientes ac tussientes mirifice adiuvat.

Ad lateris phlegmonem. Cap. 28

Radici corticem in potum exhibe, cuminum, quo in obsonijs utimur, in aquā inijce et bibendum exhibe. Aliud. Rutæ coliculus quinque contritos quotidie dato: aut herbæ stæchadis quantum tribus digitis capī potest. Item trifolij semē, aut panacis radicem, aut aiugam similiter potui dato.

Ad erigendas distendendasq; mamas pendulas ac fluctidas. Cap. 29

Terram scriptoriam capiens & cum melle elixans panniculo illitam imposito à summo mane usq; ad uesperam, deinde spongiā ex olla superaddito, quoad cataplasma abduxeris: hoc autē & arrectas & turgidas mamas facit. Crassius autem cataplasma imponas, si uis ipsum efficacius reddere, & gallæ acerbæ unciam unam admisce.

Vt mammae plures annos molles sint.

Ex cicuta carystia cataplasma facito.

Vt mammae maiores ne fiant.

Porcellum dissecans cruore mammae obline, amplius non augetur.

Ad fetidos sudores, & alarum tetros odores. Cap. 30

Alaro alas subline, à balneo & summo mane quotidie ad alumine liquido perunge quotidie,

A aut ocymi semine ex uino & melle illinito: hoc odores foedos alarum discutit: Aut puluerem tenuem admove.

Ad lac siccandum. Cap. 31

Cretarium aceto maceratū illitū & impositū lac arefacit.

Ad uitio stomachi laborantes. Cap. 32

Cedri liquoris cochlearia duo, olei immaturi cyathum in unum miscens sorbendum dato, id omnem dolorem funditus tollit. est autē Scorpionis, fidemq; hominum superat. Aliud. Anesium in panniculo succi plenum deligato, & in aqua calida conijcito, & sorbere iubeto.

Ad imbecillos & nauiscentes.

B Mentē coliculus duos aut tres mali punici dulcis succo atque aceto inferuefaciens forptui dato. Aliud. Sambuci tenera folia ex munda aqua si bibantur supra fidem proficiunt.

Ad morsus uentriculi sine bilis uomitu.

Tragoriganum in aqua pari modo macerās sorbendum exhibeto laetis faciens temperaturam.

Ad stomachi imbecillitates.

Sinapi frictū ex aqua tritū & potū bene facit.

Epithema ad stomachi precordiorumq; uitio laborantes.

Fæcem aridam cerato myrteo aut roseo accipe, & utere.

Ad singultum. Cap. 33

Cum semel singultum sensit, digitum tuum sinistræ manus, quem saluatoriū uocat, ter ore contineto: aut acetum ei sorbendum dato: aut cuminum, & alicam: aut uomat & singultus sedabitur: aut spiritum contineat: aut sternutatione utatur: aut rutam ex uino bibat: aut micā panis acetomadem bibito: aut porcelli ofuscilum manu attrito: singultus quoq; terror incussus finit.

Ad cholera & uomitum. Cap. 34

Vinum oblinū in cholera ex usu est. stomacho enim commodat, & ad uentrem bene facit.

Ad uomitum comprimendum.

Herbæ sanguinalis succo cibos inficito. Aliud. Absinthium in aqua ad tertias decoctū potui dato habitum egroti considerans: centaureum præterea, aut thymum aut nigras myrti baccas similiter exhibeto.

Vt facilis sit uomitus. Cap. 35

D Sanfuci folia esui dato. Aliud. Lixiuio percolato oras poculi oblinito.

Ad uomitum mirū auxiliū, & ad stercore uomentes. Cap. 36

Ita facito: oleum in quo anethum decoctum sit, bibito: quoad autem elixatur, egroti in calidam aquam demitte, & ab olei potu calidas mamas esui concedito. seruabitur enim etiam si iam strangulatur. hoc ego principem in nostra Asia seruauit.

Ad eos qui crebro uomunt. Cap. 37

Rhun & cuminum in unum contumens da ex acetū mulsi cyathis sex unciam in potum.

Ad cholera uexatos ualde efficax.

Menta ex uino sumpta, si febris absit, herba quinquefolia arida trita ex uini cyathis septē, aut ex aquæ calentis cyathis duobus pota statim dolorem leuat. Aliud. Cochlea cum testa contusa potui danda est.

Ad supprimendum uomitum.

Foliorum & capreolorum uitis succus cum potenta ieiuno in potu datur ex aqua cochlearij pondere. Aliud. Panacis obolum ex uino & oleo calido propinato.

Ad iocinoris uitia. Cap. 38

* Petroselinij seminis cochlearij, menta inaspera & epota proficit. Aliud. Herba fumararia uocata in succu soluta, & in passillos redacta aridaq; indolentiam præbet, ter autem ex aqua pota liberat. Aliud. Lupi secur pœnu pœdere ex uini dulcis sextario exhibitu bene facit. Aliud. Piperis albi grana noue, & myrtæ quod auellanae magnitudinæ æquat, omnia una cōtusa sereno cœlo alternis diebus exhibitu ter aut quater. Aliud. Equi secur pœnu cedrino reponito, deinde chio uino & aqua dilutum exhibeto: quibus enim secur ulceratum est, ne amplius exedatur, efficitur. Aliud. Maluæ succus ex melle potus iocinorosis medetur. Aliud. Haustule regiarum pota iocinoris dolores leuat. Aliud. Alba uiola pota confestim iocinorosos dolore liberat. Epithema iocinorosis commodum. Laferpitium contusum ueteri axungia comprehendē, & linteolo illitum superimponere. Aliud. Fico in mulla decocto & trito absinthium contusum quamplurimum admisceto, & utitor. Aliud. Brafica crudafuperdata iocinorosis celeriter opitulatur.

Ad arquatos. Cap. 39

Radices acathi, quod Romani tricardumæam uocant, uirides tres, aut aridas quatuor in aqua decoquito, donec dimidium relictu sit, & expressis radicibus aquam potui dato. Ad auriginē ualde efficax medicamentum, & longa experientia comprobatur. Raphanos uirides cum folijs contunde, & unius duorum uel succu ex uini cyatho uno exhibeto: ante balneum uero, si ieiunus fuerit, propinato, & in calidum solium descendere iubeto: uidebis enim auriginem aquæ supernatantem. quod si contumacia egreditur fuerit, succum bibere iubeto: aut anchusæ radicis arida cochlearia duo accipiens ex aqua cyathis tribus potandam dato: aut sulphuris ignem non experti cochlearia quatuor ex uino, aut herbæ Sabinae unciam ex mulso. Ego sanè & hoc utor uehementer faciente, aphronitri uncias duas in uini aminei cyathis duobus macerans, sub diuocq; noctem integram exponens do ieiuno potandū, idq; facio per tres aut quatuor continuos dies, & sanitatē restituo. Aliud. Herbam hypericon & adianton aquæ incocta potandam offeras. Aliud. Myrticam ex aceto trita potui da, arquatos curat. Regio morbo affectu in balneo abducens, & in solium descendere iubens iunci odorati uncias duas ex uini mulsi cyathis tribus potui exhibe: discutiet longam auriginē, & liberabit. Aliud. Herbarubia utere in quotidiano uictu absq; carne suis la, ipsam cōtundens & cribrans da usq; in sextum diem cochlearium unum ex uini quatuor cochlearijs: deinde semper subtrahens dato uini cochlearia nouem, deinde septem, postea quinque, deinde

Galen.

A quatuor, deinde tria: quod si tricesimo die fuerint aliqua morbi reliquia, eadem exhibeto similē ordinem seruans. Aliud. Chamamelum ex aqua potum arquatum pellit, & iocinorosis uehementer auxiliatur. Aliud. Radicula ex melle & lacte pota medetur. Aliud. Aselli, hoc est, centipedæ sub aquarijs uasis reperta trita ex mulso pota regio morbo liberat. Aliud. Serpillum aquæ incoctum & potui datū auriginē summo uet. Aliud. Sulphur ignem non expertum mensura unius cochlearij aut duorū ex uino potū arquatū curat. Aliud. Ferri rugo cito liberat. Aliud. Capræ stercus aridum tritū cribratū cochlearij mensura ex uini odorati cyathis quatuor ieiuno & loto exhibe: sebricitatibus autem ex aqua eandem portionem. Aliud. Ursini fellis quantū Græcam fabam æquat, exhibeto, deinde aqua superbibito. Aliud. Sabinae cyathus ex mulso potus hoc morbo liberat. Aliud. Thus aquæ incoctum propinato. Aliud. Terrestris lumbricum tritū potui dato. Aliud. Aristolochiæ ex aqua exhibeto. Aliud. Cichorij succi cyathos quatuor si biberit, sanabit. Aliud. In medium balnei conclauē descendere iubeto, ut sudet, & egressus sanus erit. Aliud. Stercoris canini albi cochlearij ex uini optimi cyathis tribus per dies decē propinato: hoc idem ad colicos dolores & inflationes pariter proficit. Medicamentum ad morbum regium, quod in nares fundi debet. Elaterij quantum fabæ Græcæ amplitudinem æquat, muliebris lacte liquidum in nares fundatur. Aliud. Nigella aqua incocta in nares cōiecta in balneo auriginem detrahit.

Ad lienosos. Cap. 40

Rumicis agrestis radix tundatur in pila: & trita succus exprimitur, & per tres dies singuli cyathi bibantur. Aliud. Panacis radix contusa cochlearij mensura ieiuno ex aqua calida cyathis tribus exhibeatur.

Ad lienosos cum prædoro tumore.

Capparis radicis corticis unciam accipe, acetum sextarium semis, aquæ sextarium integrum decoque ad tertias: propina a cibi perfecta concoctione cyathum unū duo uel, & hoc per interualla facito. Aliud. Hederae foliorū aceto incoctorū & contusorū succus expressus robustis purus potui datur, sed delicatioribus aqua dilutus: antequā bibant autē ipsos cōcitatius ambulare cogito. Aliud. Centaurij tenuioris, quod iam cōsensuerit, in pila cōtuli cochlearij febre carēbit. dato. Aliud. Leporinus lienis recens ita deuoratus, ut ne dentibus attingatur, lienosos magnifice iuuat: ignoret autē laborans quid deuorauerit oculis fasciæ uelatis. Idē facit & catellorū nondū usum adeptorum lienis perinde in uentriculū transmissus. Aliud. Venatorij canis catulū aridum tritū modico nardo adiecto ieiuno exhibe. Dicebat autē Marcellus id quoq; ad lienosos uehementer facere, si cardamomi cochlearij unū aut duo ex acetis scyllini cyatho uno duobus uel ieiuno dantur, idq; per tres dies cōtinuo facito. Aliud. Radices

tom. 6

u 2 hede

hederæ molles elixæ ex uino bibantur, aut crudæ cōtusæ ex uino itidæ. Aliud. Alini stercus aridū aceto dissolue, & per linteolū excolatū potui dato. Aliud. Raphani succus ex oxymelīte maceratus per tres dies accipiat singulis diebus cyathi binī lienē attenuat. Aliud. Ferri cremētī cochleariū ex posca potui dato. Aliud. Irin longam aceto incoque, & acetū propinato. Aliud. Elcorodani cor potui esuiq; exhibeto. Aliud. Muxin ex aqua elixū, si aridus sit, succū propinato, muxin uero dicitur lingua Cappadocia. Aliud. Stœchadis triti cochleariū ex uinī lētiscini cyatho bibat. Aliud. Ammoniacā guttā ex aceto tritā ieiūno exhibe cyathi mēsurā. Aliud. Muris lienē, & piperis grana septē in fico torreas, & clam epulanda exhibe. Epithema ad lienosos. Lapidē asium in uesicā bubulum consicito, & aceto acrimaefactā lienī superimponito, ipsum cōminues. Aliud. Glandem, qua unguētarij utuntur, ex aceto maceratā, & ad cerati crassitudinem redactā imponito. Aliud. Vulpis lienis super locum alligatus lienosis morbo liberat. Item hœdī lienis impositus lienē digerit. Aliud. Syluestris brasica, si ex ea cataplasma fiat, lienosis medetur. Aliud. persici arboris folia eodem modo imposita bene faciunt. Aliud. Myrica semē aceto incoctū, tritū atq; superdatū iuuat. Aliud. Ammoniacā guttam aceto maceratā linteolo illitam impone. Aliud. Crocomagma aceto maceratū & ad cerati tēperaturā redactū imponito: non amouetur, quoad ex toto sanauerit. Aliud. Capparidis radix curiose trita & linteolo illita ac loco imposita eodem die opem tulit.

Ad lienosos.

Radicis capparidis corticē in aqua libra, & acetū semilibra incoquito usq; ad tertias, & potandam præbe sesquiciunciam. Aliud. Hederacea folia aceto inferuefacta cōtunde, & humore exprime, ac robustioribus ipsum præbeto: delicatioribus aut aquā admisceto, sed prius ipse ambulato, atq; ita bibito. Aliud. Capparidis radicem tusam & aceto mulso incoctam ieiūno potandam præbeto. Aliud. Accipe cupressi baccas, & ualide conteras, & erui farinam q; tenuissimam in acetū mitte, & usq; ad emplastrī tēperaturā decoque, lieniq; per triduum impone: post tertium diem solue, & emplastrum aquæ plenū inuenies. Aliud. Ammoniacam guttam in scyllino aceto per tridū de merfā ac leuigatā panniculo illine, atq; impone, neq; amoue quoad emplastrū decedat. Aliud. Folia sycamini mori refrigerata & arefacta in umbra terito, & aridum medicamentum facito scrupulorum quatuor pondere, & cum paucis piperis & caryophyllis & ex uino mero calido, cū descendit in balneum, potui præbeto.

Potio ad aquā inter cutem, ut ea per lotiū eiciatur. Cap. 41

Aeris uisti quantū fabam Aegyptiæ æquat, simi columbini unciam, uini cyathos tres exhibe: esto aut unica potio. Aliud a nobis in multis cōprobatum. Tithymalli characiæ uocati radicē pro ægroti uiribus esui dato: statim em̄ largiter aquā ducit.

Aliud. Granū cnidiū tusum & cribratū melle cōprehende, ut sordidū crassitudo fiat, & cochleariū plenum ex uinī mulsi cyathis tribus & modico aquæ calidæ ad lactis tēperaturā, aut ex ouo forbili propinato: plurimū em̄ aquæ deijcit. Aliud. Hebuli radicū succi cyathi duo, uini tantūdem in unū misti & exhibitū liberant absq; stomachi subuersione. Aliud. Graminis decoctū potui datum urinā citat. Aliud. Solani succi cyathi quatuor, mellis cyathi sexdecim in potū sumpti bene faciunt. Aliud. Hyssopū, & hirci lotiū ex dulci potum urinā mouet, perinde & si caprini copiam habueris. Epithema ad hydropicos. Hederæ crematā diligēter in modum cataplasmatīs impone. Aliud. Raphanos aquæ incoctos, quoad tēritate flaccescant, accipe, deinde hordeacea farina adiecta misce: decoque, & cataplasma facito.

Ad tormina & uentris dolorem. Cap. 42

Aristolochiæ radicem in uino potui dato: ad tormina, singultum, capitis dolorem, & partus difficultatem bene facit. Sternutatio ad tormina & omnia interna uitia proficit. Aliud. Lychnidis herbæ radix lota, dulci uino incocta deinde percolata & pota magnifice prodest: sin minus autem, cibus tuis adijce modicum casie & olyræ non confusa.

Ad tormina intestinorum & uentris. Cap. 43

Cumini fricti & cōtriti cochleariū unū duo uel ex aquæ cyathis tribus potandum est, & aduersus inflationes acetum seruēfacito ac refrigerato: postea apij semen tusum admisceto, aciterū acetum seruēfacito, ex eoq; potionē dato. Aliud. Iriōnem herbam ex aqua tritā potandā dato. Aliud. Ex lampyro, quod satis est, tritum ex aceto ieiūno exhibe. Aliud. Laurum commanducās ieiūno succum deuorato: partem commanducatam umbilico imponito: sic tormina finiuntur.

Medicamentum ano inmittendum alui purgatorium. Cap. 44

In fel tauri lanē hapsum intingito, anoq; immittito. Aliud. Gallicum saponem lana inuolutū submittito, aut liquidum alumen potius.

Ad intestinorum tormina. Cap. 45

Lentē tenerā cōtusam cum rubi radicē elixam imponito, ac esui dato. Aliud. Flores mali puniceæ domesticæ acido lacti incoctos contere, & oleū eodem modo infunde, & edendos appone. Aliud. In milliū contusum elixū, uitulinū adipē infunde, & q; purgatissimū calidissimūq; forbendum exhibe: postea gelidissimā aquā sorbeto, & confestim erit incolumis. Aliud. Gallæ interiorē partē tritam ac leuigatā accipito, farināq; admista & oui albo pastillos effingito, atq; alios frāgito, uinoq; nō salito madafacto, & esui dato.

Medicamentum ad torminosos uentriculosos, & leuore intestinum laborantes, quod per linctum accipit.

Laserpitij ramēta melli cōmiscens linctui dato. Aliud. Oūū, mel, uinū, mali punici putamina pari portione in uinū miscēs frigito, & piperis modū cū inspergito, ac potionē dato: uehementer facit. Aliud. Oua tria accipiens in acetū consicito, ac

inaper triduum macerari finito: deinde similaginis modicum capiens cum tribus ouis subigito: mox affans, & meraco uino madafaciens exhibeto.

Potiones ad torminosos & uentriculosos & leuorem intestinorum.

Vinum adstringens, cui rus obsoniorum usq; ad tertias incoctus sit, potandum iubero, quibus uentriculus male se habet. Aliud. Vinum austerum, cui galla incocta sit, illis potui pro uiribus concedito, quorum uentriculus fluxione uexatur.

Ad uentris proflutium. Cap. 45

Callitrichi ex aqua decoctum dato. Aliud. Socbe, quia ad testacea uasa uti solent, spinis asperam in pila corundito, & aqua incoquito: & aqua in dolore uentris absq; uino propinato, cum febrim habent: cum febre uacat, uinum commisceto. Aliud. Nucum putamen, quod nucleos includit, tritum ex aqua potui dato cochleariorum trium mensura. Aliud. Cornu ceruinum mollius ustum cum galla pari portione in potum dato. Aliud. Rumicis semine contritum & potioni cibo uel inasperum optime facit. Aliud. Nucum internum illud, quod instat columelle est, et capitum papaueris quod ueluti operculum est, pari portione ex uino exhibeantur. Aliud. Quernas glandes contusas & diutius cribratas, ut polenta in uinum austerum spargito, portioneq; concedito. Aliud. Carabitisas frictas & tritas ex aqua porrigo. Aliud. Struthocameli uentriculus & aliarum auium similiter cochleariorum duum mensura ex uino potus febriliter absente, praesente uero, ex aqua. Aliud. Thuris grumus sabae magnitudinis in uini nigri cyathos uno, solani succi cyathis duobus eliquatus in potum detur. Aliud. Gummi albi cotusi unciam ex uini nigri cyathis sex bibito: ad idem animum possum facit. Aliud. Cochleam Aphricanam sumens in eam liquidam picem infunde, & calefacte carnem exime, & in animum bis aut ter immitte. Aliud. Serpentinum, hoc est, spolum, in uase aeno ex oleo frigens, quoad in carbonem uertatur, contere, & digito in oleum intincto anum perunge. Aliud. Herba sacra inferius fouetor, aquam ne attingito. Aliud. Beta ex aceto contusa, & cataplasmatismore a superioribus ad inferiora usq; imposita torminosis magnifice prodest. Aliud. Ceruorum ossa contusa uentri illinito.

Ad dolores torminosorum. Cap. 47

Malum cotoneum assum cum cerati rosei pari portione impositum illico dolorem leuat.

Ad leuiores intestini, quod colon uocant, dolores. Cap. 48

Ostreorum testae crematae & tritae potui dentur, duarum ligularum modus sit ex calentes aquae cyathis tribus. Aliud. Thymum cretense aquae usq; ad tertias incoctum ex attico melle propineatur. Aliud. Sacram radicem tenuem in aquam mitte, & ad dimidias elixa, decoctum per quinque dies potui des, & morbo liberat: hoc in multis probatum est. Aliud. Viridis menta elixa per triduum exhibeatur, & nuncq; dolebit. Aliud. Lauri summitates tenerae lignae esae per triduum liberant: collula uero, ubi meta incocta sit,

Galen,

A caue ne per triduum illud terram attingat.

Ad interseptum.

Fraxini ligni ramentorum cyathus triduum potui datus sanitatem restituit. Aliud ad multa faciens. Cucurbitulam syluestre Alexadrinam ex cautam non ferro, & expurgata in uini coi sexta riu mitte, & seruefacito, uinum postea ad temperatum calorem reuersum bibito, & deambulato: & dolore solutus erit. Detrahit multa excrementa haec potio. falem autem, ne nauseet, ore cotinet. bene facit & ad coxendicis dolores.

Medicamentum ad colici dolores subdendum.

Opium hispanum lactuca excipe, & in pessum redactum sedi immitte. Aliud. Allij nucleolum lixiuio calefactum ex inferiore parte indito, & arido stercore detracto fanaescit. Aliud. Si colici dolore tentatus dormientem canem expergescerit, & in locum, ubi canis dormiebat meierit, statim dolore leuabitur, canis morietur.

Remedium colicis & inflatis exterius imponendum.

Cerato ligustrino laferpitium comprehendere, & imponere: ego uero & modicum castorei admisceo, & efficacius redditur.

Ad tormina.

Gracum cuminum maducato ac deuorato. Aliud. Cnici cotusi & foenigraeci elixi succu potui offer. Aliud. Pectine in aqua calida madafactum & ablutum propina. Aliud. Baccarum lauri aridarum corticis cochlearia nouem in potu dato.

Ad omnes intestinos dolores.

C Ex intestinis dolenti si quis pedes lauerit, & ex aqua ea potui dederit, dolor confestim euanesceat.

Ad intestinorum scissuram. Cap. 49.

Aegyptiae spinae radicem & carnes hœdi caprae cum pilis & corio capiens terito, & similagini commistas capras uino temperans potionem facito: eadem radix & phlegmone pulmonum laborantibus in potu auxiliatur: eadem suspensa tertiana febris & quotidiana liberat, & ex oleo pota uulneribus medetur.

Ad coxendicis dolores purgatorium. Cap. 50

Tithymalli succi guttas quinque in ficum instillato, & elui dato, purgat.

Medicamenta, quae exterius imposita aluum ducunt. Cap. 51

D Granum cidiu cortice liberatum cerato comprehendere, & uentri puerorum super umbilicum imposito. Aliud. Felle tauri umbilicu perungito. Aliud. Suillus talus ustus tritusq; ex aqua potui detur. Aliud. Herba anthemin, hoc est, chamaemalum ex oleo terito & inungito, statim dolor finietur. Aliud. Reticulum, cuiusmodi uolueris, de mulieris capite detractum capiti laborantis imposito, sanitatem ei restitues: melius fuerit autem si prius calefactum reticulum imposeris. Aliud. Coriandrum ustum, oleo maceratum umbilico superimposito, & lana cotegeto.

Ad urinae difficultatem & calculos. Cap. 52.

Scorpij usti edant, illis aut qui forsitan abhorrent, cum adipe misti tostiq; clam & citra suspicionem exhibeant: mirifice profunt. Calculus aut per urinam redditus oliuae nucleos similis contritus & igne

candens, deinde si bibatur, eos qui in uesica sunt, calculos exterit. Felis iecur ustum tritūq; ita, ut bibi possit, calculosis remediū est. lāpis quoq; lapillus porui datus uesicæ calculos dissipat. Aliud. Vmbilici Veneris radix elixa & trita uncia pōdere in diē ex diluto uino bibat, ad renū calculos uehemēter pficit. Aliud. Succū urę immature, & rufæ hederæ corymborū par modus ex albo uino tēra, succo illinito micē difficultate male habitos.

Medicamen exterius calculosis imponendum.

Vrina reddita butyro ueteri remollito penē oblinito, & cubitū eunti lana apponā per triduum.

Epithema urinae prouans.

Calamintham cum aceto & pipere cerato colligito, & umbilico superdato. Aliud. In sanfuci decocto desideat. Aliud. Herbā perdicion, id est, parietariā oleo incoctam super locū uesicæ imposito, ilico urina decurret.

Ad calculos.

Montana trisago mullæ incocta potanda offeratur, hoc remedio Samius Priscus utebatur. Aliud. Albæ hederæ corymbi ex uino poti lapillos confringūt. Aliud. Salicis folia tusa ex uino austero tantisper accipiantur, dum sanitas restituatur.

Ad conceptum remedia. Cap. 53

Caricas ieiuna cū oleo folijs edito. Aliud. Rumīnantis pecudis spumā digito fumēs ex uino in potū exhibe. Aliud. Nasturtiū tritū ex aceto per quatrīduū edito, postq; corpus mundatū fuerit. Aliud. Vulpinū sterces in pello apponatur & loci muliebres sublinantur, atq; ita uenere utatur. Aliud. Artemisiā tritā apponito: in iunget autem muliebre pudendum gummi cum a purgatione menstrua tertius fuerit dies, & concipiet.

Vt mulier marem generet. Cap. 54

Alba fasciā puerili dextrū pedē ligato, & coeat.

Vt fecundam.

Nigra fasciā sinistrum pedem.

Nota maris & femine in utero. Cap. 55

Apium insciā muliere super caput imposito, quodq; primū uoce protulerit aut marē aut fēminā, illud pariet, incorruptæ ueritatis hoc signū est. Aliud. Grauidæ mulieris urinā accipiēs duas foeculas facito, in unam hordeū, in alterā triticum conijcito, deinde urina conspergito, atq; ita demū terram superijcito, si prius triticū expullulauerit, mas parietur, sin uero hordeum, fēmina.

Vt mas concipiatur. Cap. 56

Anserino adipe & resina terebinthi loci perungantur per biduum, tertio die cum uiro coniugatur, & marē concipiet. Vt mas gignatur: Vir sinistro teste ligato uenere utatur: Vt fēmina dextro.

Vt factus retineatur. Cap. 57

Lapis aetites appendatur. Foetum quoq; & lapis ille retinet, qui in pirastro adnatus inhaerescit, iste similiter pensilis gesteretur. Et malū agrestis radix, quam epiboscon nominant, appensa. Sardoniū etiā lapis retinet foetus usq; in finem: uentri autem eum deligare oportet. Est herba quoq; sideritis, cuius appensū foetus custodiuntur.

Vt partus acceleretur. Cap. 58

Bulbi amari triti ex uino dulci porui dentur; illi

copariet. Aliud. Dictamū ex uino, aut aqua propinatū idem facit. Aliud. Sussum lac ex melle bibitum. Aliud. Galbanū ex aqua tritum potumq; confestim educit foetum.

Suffitus egre parientes. Cap. 59

Atiuga super carbones posita, aut bituminis, quo fabri ferrarij utuntur, duplū carbonibus iniectum mirifice prodest. Aliud. Pulegiū falciculū in aquā calidā mittito, in eaq; mulierē desidere iubeto, ipsiq; in aurem dicito, chum, cam, min, duns. Aliud. Oleum manibus continens eius illa perfricato, atq; ita dicito: secundæ sistite corpus, ubi praeceperit uobis magna dei genitrix.

Ad lac creandum. Cap. 60

Raphanos cum tritico, uino incoctas percola, & uinū potui offeras. Aliud. Aquam cui furfures cum foeniculi radicibus incoctæ sint, propinato. Aliud. Mulsæ nigellam permistā habentis uncia bibatur. Aliud. Mulsā hederæ folia contusa habens potui detur.

Ad lac rescicandum. Cap. 61

Aqua maris foeto, & astringe siccareq; ualentia superimposito. Aliud. Muriam calidam spongijs exprimens, & thuris puluisculum inspergens, deligato, & chartas eodem modo.

Quod si mammae dure inflammataeque fuerint. Cap. 62

Lini semine aceto mulo incocto illine, aut foenogracō similiter elixo, aut sesamo nō loto refrigerato trito & melli admisto, aut ex ficis cataplasma facito. Aliud. Cuminū tritū mulo tēperatū ad cerati crassitudine linteolo illitum impone.

Potio factum mortuum, aut non ritu naturali

exeuitem eiiciens. Cap. 63

Fellis tauri quantū est amygdalum, uini ueteris diluti ligulis duabus temperatū potandū offerat: statim foetum excludit. Aliud. Oui crudum cedri lachryma illinito, calefacito, & ieiunæ forbē dum dato. Aliud. Mulsam artemisiā incoctam habentē propinato. Aliud. Lapis phoenicites uocatus illitus foetū detrahit. Item lapis demorsus à cane foetum adhuc imperfectum euocat si pragnās mulier super ipsum trāseat: nam quod in uentre est, ualde cito expellit.

Vt cognoscatur, mulier an abortum fecerit, & ad abortiendum

& foetum mortuū ac menses ducentes. Cap. 64

Mammæ gracilescentes, abortum significant.

Cataplasma ad abortum impellens.

Vitiæ mundæ cyathi duo in ollula ex aceto decoquantur, cum ad dimidiū consumptum fuerit, aloes uncia adijciat, ut malagmatis instarredatur, deinde illinito ab umbilico ad pectinē usque, & alligato.

Cataplasma, ad necandum foetum cuius noxam

ullamq; suspicionis notam.

Cupressi foliorū partē aqua elixā curiose terito ad malagmatis temperaturā, atq; umbilico & abdomini imposito, fasciāq; deligato, deinde supinā iacere iubeto, aut in sella sedere, quā in partu mulieres uti solent, & sopita sine dolore foetū emittit.

Medicamen discriminis expers, ut trimestris, aut

quadrimestris foetus eiiciatur.

Opopanax obulum accipe, & collyrium fac,

locis muliebris. submittit: tutū est, atq; in mul-
tis expertū. Aliud. Radicula tritam melle ex-
ceptam pēsis illine paruis, & eos mulieris genita-
libus impone: educit hoc secūdas & mēstrua pur-
gamenta. Aliud. Artemisiæ folia teras ex roseo,
& sordium crassitudinem faciens appone: menses
ciat. Aliud. Caricas duas & semissem, nitri obo-
lum accipe, pessum facito, & submittit. Aliud. Ar-
temisiā tritam inpone. Aliud. Rutæ agrestis se-
men immitte. Aliud. Galatites lapis suffutis non
purgatis muliebris menses ducit.

Ad mulierem, quæ a partu non purgetur. Cap. 65

Arisemen tritum ex uino albo ieiuna bibito.

Ad pallorem mulieris a partu. Cap. 66

Panacis radices contūsæ ex dulci uino a ieiuna
potē pallore discutiūt. Aliud. Flores mali punice
domesticæ odorato oleo incocti potui dentur.

Ad uentris, mammarum, femorum, coxendicūq;

scissuras. Cap. 67

Marinam cochleam oblongam cremato & cō-
terito, deinde oui albo, aut alinino lacte adiecto
illinito. Aliud. Lapidem, qui diaphanes, hoc est
perspicuus uocatur, conterē. contritūq; in ingres-
su balnei, antequā inūgatur, illinito, uicēlimo die
scissuræ euanescent.

Ad sudores utris, præcordiorū, femorūq; a partu. Ca. 68

Cimoliæ & pulueris thuris (mannam uocat)
par modus oui albo exceptus cum ligustrino cera
to illinatur.

Ad inflationes in coxendicibus. Cap. 69

Panis medullam & melanteriorā unā subigito,
& imponito: bene facit.

Ad prominentes umbilicos. Cap. 70

Gallas uistas tritasq; ex aqua superdato.

Ut umbilicus a partu magnus ac elegans fiat. Cap. 71

Operculum urcei cartaceum fumens panni-
culo inuolue, deinde thuris puluisculum oui al-
bo comprehendens illine, & in umbilicum mitte,
tenaciterq; alligato.

Ad uteri strangulatus Ca. 72

Testudinis terrestris iecur tritum in pēso natu-
ralibus imponito.

Potio ad uteri dolorem

Leporis cor aridum, & in ramenta concisum
potui datur.

Ad tormina uteri a partu corruptiones, &
strangulatus.

Leptosphaeros, id est tenues orbes accipito o-
bolisemisse, (orefinema uocant) tribus digitis,
& ex dulci bibito.

Ad uteri dolores.

Malipunicæ dulcis radicē ex uino propinato.

Ad uteri duritias.

Cuminum tritum & rutæ folia pice liquida ex-
cepta & butyro in pēso ex lana facta impone.

Potio ad mulieres ex utero laborantes.

Castoreum cum aniso propina. Aliud. Cu-
minum tritum, & nigellæ semissem ex aceto mul-
so propina.

Ad muliebri profluuium Cap. 73

Peucedani radicis & cupressi baccarum pares
portiones ex uino albo potentur. Alia Vuæ ni-

græ acinorum arida semina ex uino nigro austero
potui dentur. Aliud. Hedī coagulum acerrimo
aceto maceratum ieiuna propinato. Aliud.
Coralliū ex nigro uino dato, & confestim suppri-
metur profluuium. Aliud. Ferulæ cinerem, &
papaueris lixiuium ex aqua pauxillum exhibeto;
quod si largius effluat, spongiæ combustæ drach-
mas tres exhibeto. Aliud. Cornu ceruinū uisum
potui dato. Medicamenta naturalibus imponen-
da. Malum punicum in lana more cataplasmati
appone. Aut mali punici coria elixa in lanaq; trita
in pēso apponenda sunt. Aliud. Gallæ interio-
ra & thuris tantundem in pēso accipiens ex aqua
appone. Aliud. Pulegiū tritum lana munda com-
prehendens naturalibus impone. Opitulatur etiā
spongia seruienti aceto madida, & mediocriter ex-
pressā: femorum præterea coitio, extremorum de-
ligatio, atq; in caput decubitus.

Ut ne mulierum naturalia concubitu sua

meſcant. Cap. 74

Gallæ immaturæ grana quatuor, cirenulæ, qua
in oculorum uitis uti cōſueuerunt mystra duo te-
rito, in unum misceto, & in uitreo uase reponito,
ex hoc mystrū sumēs ueteri uino dilutū eo primis
diebus nupta naturalia sublinat, ac per totam ui-
tam locorum illorum humiditatem nō percipiet.
Aliud. Gallas per octo dies in aqua macerato, de-
inde lanā mollem sulphure suffumigatā aqua illa
madefacito, & non expressam siccificere sinito, ex
lana pessum faciens naturalibus immittito, in con-
gressu uenero uirgo putabitur, deinde lanā tolli-
to, exiccatoq; atq; iterum si lubet utitor. Aliud.
Acuti rumicis semen tritum submittendum exhi-
beto, & non differunt a uirgine. Aliud. Gallas
cōtusas in aquam demitte, ex qua subluantur mu-
lierum naturalia, angustiora em reddent. Aliud.
Panniculos tenues in aquā alumē liquatū haben-
tem demergito, & exiccato: deinde quadrati iūci,
cassæ, gallarum, singulorū parē modum ex uino
ueteri conterito, donec miellīs crassitudo fiat: in
hoc panniculos madefaciēs resiccato, utq; impo-
nant, cōcedito, atq; ita per duas horas retineāt, uel
prout requirit necessitas, & cū uenere uti uolent,
eximant. Aliud. Melle & nitro usq; ad pubem na-
turalia oblinito, atq; ita concumbito.

Ut ne cui penis arrigi possit. Cap. 75

Buccinū uisum lotio bouis castrati extinguito;
hoc in cibis, aut portionibus, utitor, qd̄ remanet in
uase reponito. Aliud. Paruulū lignū appendito,
& definit. Aliud. Acutus iuncus impositus & in
figuram cyrici redactus, illius qui cito semen ex-
cernit, sub stragulis uestibus positus impetū in ue-
nerē cohibet. Aliud. Coriandrū aut pulegiū si fre-
quenter edat, penē flaccidū reddit. Aliud. Fel tor-
pedinis si quis potui det, genitale membrū minī-
me tigebit. Aliud. Lucernæ spōte extinctæ scin-
tillam adhuc uiuam si in poculū cōieceris, & po-
tui dederis, per totā noctē penis arrigi nō poterit.

Ad eos qui inuoluntarie urinam reddunt Cap. 76

Galli guttur uisum ligulæ mensura ieiuno ex
aqua propinato. Aliud. Leucanthemi flores fe-

ptem tritos ex aqua, potui dato. Aliud. Leporis testiculum aridum minutatim concisum ex uino odorato potandum offer. Aliud. Cimices tres cōtusos ex uino austero propinato per nouem dies. Aliud. Calamintham & myrrham ex aqua ante cōenam potui dato. Aliud. Anserinas linguas per triduum, quoq; die unam, edendas apponito. Aliud. Ruta syluatica semen per triduum esui dato. Aliud. Iplius penis cimolia ex muralis herbe succo oblinatur.

Ad somnum conciliandum. Cap. 77

Lauri folia inscripta capiti clanculum subijcito, nominans concophon brachreon.

Ad eos qui coire nequeunt. Cap. 78

Scammoniam ex aqua illinito.

In antiqua translatione hæc super erant, quæ licet in Græcis codicibus non sint inuenta, ex alijs tamen Galeni libris sunt comprobata præter ea quæ asteriscum habebunt.

GALENVS CLAUDIANO SOLONI
ARCHIATRO S. 79

Quia petisti ut de facile acquisibilibus tibi scriberem Solon dilectissime, grati esse putauit, quæ mihi per experientiam cognita sunt, scribere, & tibi mittere, à capillis usque ad pedes procedens, ut homo facilius possit ipsa adipisci, incipiamus igitur primo à capillis.

De tincturis capillorum Cap. 80.

Vnctiones capillorum ut etiam cani fiant nigri. Scortiam ferri & plumbum coque in aceto usque ad tertiam partem, & illine, interim tamen ne tange capillos oleo. Aliud. Radices capparis tere, & coque in lacte asine usque ad tertiam partem, & utere. hoc serua quia prorsus nigrificat pilos capitis. Aliud. Testudinis marinæ fel dissolue cum oleo, & unge capillos. Aliud. Racemulos in nucibus pendentes in oleo coque, bitumē liquidū adde, unge.

Aliud. Plumbū cum oleo repone in uasē plumbeo, & eo unge capillos. Aliud. Melongiam terrestrem cōbure, & cum oleo leniens, unge capillos, & dimitte per totam noctem.

De præseruatione à canicie. Cap. 81

Accipe colocynthidē, & perfora eam, & munda ipsam bene ab ijs quæ sunt intus, deinde imple eā oleo laurino, & adde semen hyoscyami non contritū, dimitte una die, & unge semel in anno.

Ad faciendum capillos albos Cap. 82

Stercus hirundinis terens cum felle tauri, unge. Aliud. Verbasci albi cōbure florem, & extingue aceto, & leniens unge.

Ad faciendum capillos flauos.

Alumen coque in aqua, & cataplasma capillos duobus diebus, & post hoc laua cum aqua in qua est dissoluta fax urini cōbusta. Aliud. Cū decocto lupinorū amarorum unge capillos, uel ipsos lupinos amaros crudos terēs, et permiscēs cū aqua, unge. Aliud. Fecē uini permisce cū oleo balani, & fac sicut spissitudinem ceroti, & unge caput quando uadis dormitum. Aliud. Folia ligustri infunde in succo struthij, & utere hac infusione. Aliud. Rubiam, stœchadem citrinum, politrichum, et ab

linthium, lupinos, pone in aqua reponēs in uasē uitreo, & dimitte per nouem dies, mouēdo bis in die, in tēpore uero usus accipiendo de dicta aqua quod sufficit, infunde in ea spongiam, & dimitte ut imbibat aquam: & quando fuerint deliccati capilli, laua cum aqua calida & sapone.

De casu capillorum. Cap. 83

Ad casum capillorum ulmi radicē & foliorum m. i. macera in iij. cyathis aquæ, & unge, & post hoc unge cum oleo. Aliud. Sambucum cōbure, misce cū ceroto, & unge. Aliud. Aloem permisce cum uino nigro austero, & unge. Aliud. Myrrham & ladanū unge cum uino aut oleo myrtino. Aliud. Accipe apes multas, & cōbure, & misce cū oleo, & unge, cauendo ne ungas id quod est circa. Aliud. Nigellam accipiens combure, & leniens cū aqua unge: maxime autem hoc confert supercilijs.

De capillis qui cadunt ijs qui resumuntur ex agritudine.

Ladanū cum uino & oleo rosaceo coque, & fac spissitudinem ceroti, & unge. Aliud. Radicem mori ex cortica, & combure, & coque ut dictum est. Aliud. Polygonij semen terens, pone in lixiuio, & laua caput: deinde coque lentiscum, & collue caput.

Vi in loco combusto ab igne oriantur capilli. Cap. 84

Folia ficus terantur, & leniantur, & apponantur in loco.

Psilotrum. Cap. 85

Cerebrum uespertilionis lenias cum lacte mulieris, & unge. Aliud. Fel thynni misce cum gummi hederæ, & unge. Aliud. Accipe sanguinem recentē leporis marini, & unge. Aliud. Sanguinē cerui permisce cū aceto, & unge. Aliud. Fructū urticæ syluestris accipe, dissolue cum oleo, & frica cum ipso locum. Aliud. Vespertilioes plures uiuos pone in bitumine, & dimitte ut putrefiant, & unge quencunq; uis locum.

De alopecia. Cap. 86

Murem cōbure, & tere, & puluerem permisce cum adipe ursino, & unge, persificans locum cum cape albo. Aliud. Cantharidas cōbure, & tere, & puluerē permisce cum melle, & unge. Aliud. Cum folijs ficus frica diligēter, deinde unge cum adipe ursino. Aliud. Spumā maris cōbure, & terens permisce cum oleo, & unge. Aliud. Ranam habentē longa crura cōbure, & terens assume cū pice liquida, & unge locum præfricando ipsum.

Aliud. Equi fluuialis pellem combure, & unge locum. Aliud. Sanguine testudinis marinæ unge locum. Aliud. Accipe stercus muris, & thus, & permisce cum aceto, & fac mellis cōsistentiam, & unge præfricando locū. Aliud. Asphodelū tere, & permisce cū aceto uel uino, & præradens locum frica cum folijs ficus uel cum panno aspero, & unge. Aliud. Radicem canne combure, & permisce cum adipe uris, & unge. Aliud. Tithymallum tere, & unge locum.

De surfuribus. Cap. 87

Cimoliam infunde in aqua, & misce succum betæ, & unge: deinde laua, & accipe thus masculum & tere

& tere, & permisce cum uino & oleo & unge. Sequenti uero die herbā pedicularē cum oleo unge. Aliud. Accipe nitri, fecis uini, mirabolanorum, singulorum libram unam. herbæ pedicularis libram unam & semis. permisce cū oleo antiquo, & unge. Humidos aut furfures laua cum aqua salia, uel cum decocto lupinorū, est enim expertum.

Aliud. Laua caput cum succo bletæ cocto uel crudo permisto cum melle. Aliud. Cimoliam permisce cum percoctione scœnugræci, & unge. Aliud. Radicē cucumeris syuestris coque, & cum decoctione eius laua. Aliud. Scillam in fornace obrue, quādo fuerit mollis, exprime eam, & eius succo permisce parum olei, & unge.

De psylliæ & efflorationibus. Cap. 88

Psylla sunt parua efflorationes factæ in capite similes uescis eminētibus in superficie. Efflorationes uero sunt ulcerationes factæ in superficie subrubicundæ & asperæ. Curant aut sic. Recipe farinā fabarū, & infunde in uino: & appone sicut cerotum. Aliud. Fac cerotum ex ligustro & ceruſa, & unge. Aliud. Recipe, amyli, ceruſæ, aluminis, foliorum uiridum rutæ, singulorū drach. iij. permisce cū aceto & oleo myrtino, & unge. Aliud. Recipe lithargyri, ceruſæ, singulorum drach. xij. sulphuris uiui drach. octo, assume cum oleo myrtino & unge.

De achoribus & fauis. Cap. 89

Achor est passio ueniens in capite perforans cutem capitis subtilibus foraminibus per quæ exit humor parū per uisculosus. Fauus aut facit foramina maiora continentia humiditatē melli similem. Curantur aut sic: abrafum caput fomenta bis aut ter aut multoties cum aqua calida decoctionis myrti, aut rubi, aut lentis, aut lupinorū amarorū, aut radicis asparagi: quando aut effluent multi humores, cataplasmes caput cum folijs salicis aut lente coctis in aqua. Confert etiā inungere caput cum sulphure & parietaria & sapone ante. Aliud. Recipe lithargyri drach. xvi. foliorū rutæ drach. viij. herbæ pedicularis drach. iij. chalcātī, drach. ij. assume cum aceto & oleo myrtino.

De tremore capitis. Cap. 90

Stœchadem da bibendam cum aqua. Aliud. Artemisiæ succum parua habentis folia permisce cum oleo rosaceo, & unge neruorum deriuationes. Aliud. Spinæ albæ semen bibendum exhibe. Aliud. Castoreum dissolue in aqua, & bibendum præbe.

De dolore capitis. Cap. 91

Cornu cerui combure & tere, & permisce cum oleo rosato, & unge frontem & tempora. Aliud. Cerebrum uulturis leniens unge caput et tempora. Aliud. Psyllium suffundens permisce cum oleo rosato, & utere: hoc autem confert & ad hemigraniam. Aliud. Styracem liquidam permisce cum oleo, & unge. Aliud. Oniscos, id est asellos sub hydrijs degentes coque in oleo: & unge caput. Aliud. Flores mali punici uel ipsa baustia, coque in uino aut aqua marina usq; ad con-

sumptionem tertiæ partis, & tere, & cum ceroto permiscens unge. Aliud. Pulegio & fœniculi radice cum farina hordei unge tempora. Aliud. Mentam aut sinapim cum aceto permisce, & unge tempora bis in die.

Ad dolorem capitis & temporum. Cap. 92

Accipe opij quantitatē fabæ, & pulegij partes sex, & lentisci, & assume cū aceto & oleo rosato et unge. Aliud. Lapathium acutum & gallam tere & unge tempora & frontē. Aliud. Castoreū dissolue cū oleo rosato & aceto, unge frontem & tempora. Aliud. Iridem siccā & cardamomū minus in aceto resolue, & unge capillos sicut faciunt mulieres quando ungunt eos. Aliud. Succū peucedani cum oleo irino leniens unge. Aliud. Hirundinis sterqus prius quā uis terram attigerit simul cū luto nidi, in uasculo ligneo, aceto madefac, & illine frontem. Aliud. Gummi hederæ cum aceto & oleo rosato leniens unge tempora.

Ad aures sanie manantes & dolorosas. Cap. 93
Medullam uituli liquefaciens instilla. Aliud. Scoriā ferri leniens in aceto acerrimo instilla.

Ad scrophulas & parotidas quæ sunt apostematæ scæ aures. Cap. 94

Scrophulas cōmuni quidē curatione discutunt, ea quæ scirhos: propria uero illa, farinā lupinorū amarorū coque in oxymelite, & unge. Aliud. Stercus bouis aut capræ coque in aceto, & appone. Aliud. Calcē melli aut oleo aut adipi porci permisce & appone. Aliud. Farinā iridis & sterqus colūbi coque in uino, & appone. Aliud. Recipe axungie ueteris, seminis hyoscyami, picis, olei antiqui, stercoris citrini gallinæ, singulorum partes æquales, commisce, & appone.

De morbis oculorum & primo de ophthalmijs incipientibus. Cap. 95

Succū mentæ infunde: resoluit enim, sed melior est sanguis columbi. Aliud. Fœniculi succum exprime & utere: antiquus aut est melior, permisce aut eum aqua, & utere. Aliud. Rutā recentē exprime, & pone succum eius in pyxide aris rubei, & utere. Aliud. Cum coctanis coctis, & farina hordei, & uino albo fac cataplasma. Aliud. Folia papaueris & cortices granatorū cum pollicine hordei cataplasmes. Aliud. Rosas coctas & lenitas cataplasmes. Aliud. Decoctionē meliloti cataplasmes. Aliud. Folijs coctani tritis cataplasmes cum uino & alphisitis.

Ad ungulam. Cap. 96

Dicif ungula morbus oculi quando cornea aliquando quidem superficietenus, aliquando uero in profundo pus cōtinet, & assimilat parua ungula secundū figurā, quare morbus ille uocat ungula. Ad moderatas ergo ungulas cōfert melicratū, & succus scœnugræci, & collyrium quod quidem fit ex thure. Ad fortiores autē recipe aloes, myrrhe, croci, singulorum, part. i. uini part. iij. mellis part. vi. dissoluas crocū cum modico uino: deinde aloem & myrram: deinde infunde mel, & ueniens repone in uase uitreo, & utere bis in die: expurgat enim, incarnat, & consolidat.

Ad hypopia, id est, liuorem qui fit sub
oculo. Cap. 97

Sinapin tere, & appone cū ceroto. Aliud. Ossa
sepiæ tere subtilissimè, & permiscens cū aceto un
ge in nocte: tollit enim ea. Aliud. Radicē cucume
ris syluestris mellis commisce, & impone.

De liuoribus oculorum

Hyslopum tritum liga in panno, & infunde in
aqua calida, & tange liuores, fomentans. Aliud.
Farinam iridis cum melle admisce, & appone.
Aliud. Cyminum tritum permisce cum lacte
mulieris, & appone: & origanum appone simili
ter. Aliud. Erucæ semen terens cum felle bo
uino cataplasmes.

De pterygijs Cap. 98

Pterygium dicitur neruosa superinnata oculi
membrana eminentia incipiens ab angulis & pro
cedens usq; ad corneam: quando uero insuper au
getur, cooperit & pupillā. Magna igitur & diutur
na pterygia per chirurgiam inciduntur: recentia
uero & moderata in magnitudine iuuant æs com
bustum, uel calcanthum cum adipe porci. Aliud
bonum. Calcanthi, part. i. gummi arabici, part.
mediam, dissolue in uino, & unge. Quidam au
tem hepar capræ mellis miscens ungunt. Ali
ud. Recipe licium & ligustrum, et cum aqua fac
collyrium, & unge.

De ulceribus oculorum & albuginibus. Cap. 99

Vlcera quæ fiunt in oculis quæ quidem sunt su
perficietenus, nephelia nominant. Quæ uero pro
fundum petunt, albugines. Nephelia ergo succus
anagallidis expurgat, & succus centaureæ mino
ris cum melle. Diuturna uero subtiliat cedria & es
solum dissolutum in aqua in modum collyrii. Al
bugines autem iuuat nitrum dissolutum diligen
ter cum oleo, & unctum. Aliud. Recipe succum
draconteæ & misce cum melle crudo, & unge.
Aliud. Fel hirci conficra in oculo. Aliud. Os
sepiæ combure, & dissolue cum melle, & unge.
Aliud. Ex stercore lacertæ faciens collyriū cum
aqua unge. Aliud. Felle canis marini unge, uel
raphani succo, uel felle galli. Aliud. Recipe succū
malorum granatorū, & pone in uase terreo, & co
operi cum panno, & pone in sole quousq; habeat
mellis cōsistentiā: & ei misce mel æquale, & custo
di quia inueteratū ualet magis, & quando uidit
dormitum patiens, unge oculos. Aliud. Felleo
nis cū melle unge. Si uero puer parvus habet albu
ginem, mater infantis mandat ammoniacum, &
insufflet in oculū: similiter ungat oculū menstruo
aliciuius de cognatione sua: & similiter mater eius
incidat paruū digitum suū & cum sanguine qui
fluxerit, ungat oculum.

Ad caliginem & nebulas oculorum. Cap. 100

Vnge oculos cum succo foliorum draconteæ.
Aliud. Succum betonice cum uino permisto
calido instilla.

De hordeolo. Cap. 101

Ex aqua decoctionis hordei fomēta oculos, uel
ex cera alba: uel accipe muscas & absconde capita
earum, postea reliquo corpore frica oculum.

A

De madarosi Cap. 102

Madarosis id est glabrities & pilosis, est casus
pilorum palpebræ: curantur aut his. Recipe nude
orum palmularū cōbustum drachmas iij. spicæ
drach. ij. tere & utere. Aliud. Stibij alij, piperis,
ana drach. i. spicæ drach. tres. Aliud, faciens ad
casum pilorum superciliorum. Auellanas com
bure, & permisce cum adipe urli aut capræ, & un
ge. Aliud, quod etiam confert ad alopeciam bar
bæ. alterci drachmas duas, stercoris muris drach
mam unam. polytrichi drachmas duas, olei irini
cyathos quatuor: tere & permisce cum oleo, &
præfomentans unge. Aliud. Seneciam serpen
tis combure, & unge: facit enim nasci pilos: uel ni
gellam tere & fac similiter.

Ad supercilia pilosa. Cap. 103

Origanū cōbure, tere, & applica, prius tamen
euelle pilos. Aliud. Lacertā uiridē coque in o
leo, & postq; euulseris pilos, unge locū. Aliud.
Chamaeleontis seu laurcolæ radicē permisce cum
sanguine ranæ, & unge locum.

Vnctio habentium oculos glaucos. Cap. 104

Glauco mulierū oculos nigros reddit hyoscya
miflos cyanæus repositus in umbra: & tēpore u
sus permistus cum uino austero & inunctus.

Ad suffusiones Cap. 105

Theriaca quæ fit ex uiperis, permisce cū melle
sine fumo, & unge: cōferunt etiā caputpurgia, &
purgatio cum hiera, & fomentatio cum decocto
foeniculi, & fagapenum & elleborus albus cum
melle appositus, uel cum succo foeniculi.

Ad ægilopes. Cap. 106

Ægilops est abscissus paruus iuxta magnum
oculi angulū, qui si negligatur, scinditur utque ad
os: & dicitur ægilops anteq; scindatur. huic con
fert glaucium & crocos simul cum succo perdicij
appositum: oportet aut frequenter ea permutare.

Aliud. Conculas cum testis suis tere, & appo
ne. Aliqui uero miscent & aloem uel myrrham.

Aliud. Fel porcinum sicca, & appone. Aliud.
Perdicium cataplasmes. Aliud. Aegilopem her
bam inter frumenta nascentem cataplasmes. A
liud. Portulacam & thus masculū appone, prius
tamen ea masticabis ieiunus. Aliud. Cranium
hominis tere & appone.

Ad nyctilopas Cap. 107

Hepar hirci assa, & unge cum liquore qui de
fluit, oculum: iuuat enim duodecies inunctus.

Ad pediculos oculorum. Cap. 108

Aqua marina tepida palpebras fomenta.

De passionibus narium & primo de polyo &
ozena. Cap. 109

Vitriolū leniens cū aceto unge. Aliud. Cor
ticum granatorum drach. xvi. fellis tauri, amomi,
myrrhæ, calaminthi, prassij, añ. drach. viij. croci,
drach. ij. ellebori albi, drach. ij. utere sicco.

Ad scetorem narium. Cap. 110

Recipe amomi, myrrhæ, rosarum siccatū: aqua
liter assume cum oleo nardino, & unge: cōfert au
tem & unctio cum hedyroo magmate.

Ad ulcera narium. Cap. 111

Recipe lithargyri drach. iij. rutæ recentis, alu
minis

minis scissi añ. drach. ij. assume cum oleo myrtino A
& aceto. Aliud. Recipe cerusæ, drachmā unam.
sithargyri, drach. iij. scorix plumbi, uel plumbi cō
busti drachmas tres. omnia lauentur & assuman
tur cum oleo myrtino.

Ad extrahendum sanguinem de naribus. Cap. 112

Florem graminis appone. Aliud. Rubiam
cum oleo accipe, & unge nares.

Ad fluxum sanguinis narium. Cap. 113

Corticē oui cōbure, & accipe de eo partē unā,
& de galla partē mediā, & insuffilla. Aliud. Licium
appone. Aliud. Asini stercus comburēs insuffilla ci
nerem eius, aut exprimes insuffilla succum. Aliud.
Lapidem molarem igniens extingue in aceto, &
darecipere odorem. Aliud. Thus masculum & a
loem assume cum albo oui & fac licinium, & ap
pone, & superpone pilos leporis. Aliud. Vento
sam magnā pone in hypochōdrio secūdū rectitu
dinē naris patiētis; oportet autē & in ijs quæ stypti
cant & prohibere possunt impetū sanguinis, uti.

De panno & lentiginibus Cap. 114

Draconteæ radicē cum melle cataplasmes, uel
nigellam cum aceto uel pentadactyli fructum.

Ad faciendam faciem rubicundam. Cap. 115

Rubiam tere & permisce cum oleo, & unge.
Aliud. Bulbum amarū terens permisce cū melle,
& unge. Aliud. Recipe ciceris, rubiæ, thuris,
myrrhæ, ana. drach. ij. assume cum adipe uituli, &
oleo masticino, & unge, & post spacium absterge
cum spongia calida.

Ad fluxum sanguinis ab ore Cap. 116

Colluat os ex decoctione rosarum in oxycrato
postquam erit frigida, & transglutiat. Aliud.
Gargarizet patiens & colluat decoctione rosa
rum frigida, aut extremitatum uitis, aut foliorum
lentisci aut rubi, aut citoniorum, aut acinorum u
uæ, aut rhu. Aliud. Semen rosæ cum masticæ da
ex styptico bibēdum, uel ex uino decoctionis ru
bi aut rosarum.

Ad oris ulcera. Cap. 117

Gallam in uino coquens collue os, deinde ap
pone gallam tritam permistam cum melle aut flo
rem rosarum; collue etiam os cum decoctione fo
liorum oliuæ.

De albificatione dentium Cap. 118

Nitrum, os sepix & os dactylorū terens utere.
Aliud bonum. Coralli rubē, pumicem, ossa da
ctylorum, ossa sepix, & sal assum terens utere.

Ad dolorem dentium Cap. 119

Oleo lentisci nō antiquo colluant dentes. Ali
ud. Colluat os cum folijs rutæ coctis cū oxymeli
te, uel colluat cum aceto scillitico, uel coquatur
in aceto pyrethrum & hyssopus; oportet autē hu
miditatem & humorem euacuare.

De morbis gingiuarum Cap. 120

Ad gingiuas corrosas recipe florū rosarū drach.
viij. gallarū drach. iij. myrrhæ drach. ij. commisce,
& appone. Aliud. Lactē asine gingiuas collue.
Aliud. Foliorum oliuæ decocto os collue.
Aliud. Aceto scillitico gingiuas collue. Aliud.
Rubiginem ferri & balaustia sicca appone.

Ad gingiuas tumidas & carnis excrescentiam.

Succum portulacæ ore detine, uel aquā salitam
oliuarū colymbadum, uel oleum ex immaturis o
liuis expressum calidum uel lentiscinum uel meli
num. Sicca uero quæ profunt sunt rubigo ferri aut
æris, radix aristolochiæ, semen plantaginis, chal
canthum asitum, & balaustia.

Ad inflammationem gingiuarum.

Collue cū decocto foliorū oliuæ et appone gallā
Aliud. Coque in uino cocto folia oliuæ & gallam.

Ad gingiuas denigratas & putridas

Cōfert fricatio cum facie uini usta; abstergit em,
mundificat, & albisicat.

Ad gingiuas sanguinolentas.

Cōfert misctio sanguinis à cephalica & scalp
latio gingiuarū, confert etiā succus hyoscyami uel
eius decoctū cum sapa, si retineatur in ore. Aliud.
Extremitates lentisci & balaustia coque in posca,
& collue. Aliud. Radicem rubi coque in ui
no & os collue. uel rhu & gallam coque in uino;
& utere similiter.

Ad uulnam phlegmonem patientem. Cap. 121

Confert glycirizæ succus cum melle appositus
& terra sigillata & fructus spinæ Aegyptiacæ. Mi
tiora autē sunt hæc, gummi Arabicum, tragagan
thum, farco colla apposita.

Ad sputium sanguinis. Cap. 122

Iuuat etiam terra sigillata, & trochisci de carabe
& trochisci de corallo, & theriaca data in lecto.

Ad pleuritidem. Cap. 123

Siquidē usq; ad clauiculā peruenerit dolor, mit
tendus sanguis est. Si uero ad precordia descēdat,
corpus est purgandū, & utendū clysteribus forti
bus; si dolor fuerit moderatus, dāda est aqua mul
sa & ptisanæ cremor aut chondri. In processu uero
morbi permiscendum sorbitioni calamentum uel
marrubiū; confert etiam semen urticæ cum melle.
Ad fortiores aut dolores utendū est facculis ē mil
lio & fursure; uel fomētis ex aqua calida aut oleo
in aliqua uesica posito uel lana succida infusa oleo
& uino habente sal. Post septimum uero diem &
emplastro dicto rutaceo utemur. Multoties autē
bulbi cū axungia suffecerūt. Dandū est & electua
riū quod fit ex pineis & amygdalis amaris & semi
nelini & amylo. Vnguentū bonum. Recipe
bdellium, costum, cauliculos caulū cōbustos &
redactos in cinerem, permisce cum adipe; hoc em
medicamentum præclare discutit.

De manillis & primo de apostasi mamillarum. Ca. 124

Cimoliam, libanotidem, & oleum rosatum per
misce, & appone. Aliud. In principio infunde
spongiā in posca tepida & exprime, & appone, &
superliga. Aliud. Palmulas & micā panis tere,
permisce cū posca, & appone tepidū. Aliud. Co
riandrum & psyllium cum ceroto appone. Aliud.
Panem & herbam muralem uiridem cum ceroto
cataplasinabis per diem. Aliud. Panem cum aqua
mulsā uel melle & uino cataplasmes; si uero non
tolerāt grauedinem mamillæ, perfunde cum oleo
calido & lana succida molli, uel cū decoctione fo
nugraci uel altheæ uel seminis lini.

Ad attrahendum lac. Cap. 125

Sisamum cum uino dulci da bibere. Aliud. Anethum uel semē eius coque cum carnibus uel cum facientibus lac abundare. Aliud. Porrum coque in aqua, & da bibere eius decoctionē: uel porrum tere, & cola, & da aquam bibere. Aliud. Succum fœniculi da bibere. Aliud. Radicē fœniculi & hordeum assum coque in aqua, & permisce butyrum, & da bibere. Aliud. Decoctionem hippomarathri da bibere, da etiam comedere ipsum fœniculum. Aliud. Cardamomum cum uino da bibere. Aliud. Semen agni casti da cū uino bibere. Aliud. Succum bletæ da bibere. Oportet autem abstinere ab acutis & falsis & acidis oleribus crudis.

Vt mamille remaneant tense diu. Cap. 126

Cyminum terens cataplasma cum aqua, deinde spongiam infusam in oxycrato superappone & ligas: post tres autē dies aufer cyminum, & cataplasma mamillas cū radice lilij & melle, & dimitte tribus diebus: & hoc fac ter in mense.

Ad dolorem stomachi Cap. 127

* Castoreū da bibere cum oxycrato, & si est uentositatis causa, coque in oleo cyminū & semen dauici & petroselinum. & unge, & si est frigiditas, coque in oleo baccas lauri & rutam & nigellam & semen fœniculi. In moderatis autē doloribus fac fomentationem cum milio. Confert etiam uentosa magna in umbilico posita.

Ad debilitatem stomachi. Cap. 628

Confert oleum de succo citoniorū. Aliud. Mastichis, styracis, añ. partes ij. Ah sinthij, cœnātes, añ. partes tres: Olei malini partes iiii. Vini quod sufficit: Rosarum partes duas: hec linia assume ex purpura, aut lana, & appone stomacho.

Ad umbilicos procedentes. Cap. 129

Gallas combure uel tere, & permisce cum cortice thuris & albumine oui, & appone.

Ad tortiones & dolores uentris. Cap. 130

Da cyminū mastichare & transglutire. Aliud. Carthamum & fœnogrecum tere, & coque, & da decoctionē bibendam. Aliud. Baccas laurificas & excorticatas tere, & da bibere cochlearia nouē. Aliud. Serpyllū terens da cum uino bibere. Aliud. Decoctionē sampluci da cum uino bibere. Aliud. Eringij radicem da cum uino bibere, uel decoctionē spicæ uel castoreum.

Ad colicam Cap. 131

Spolium serpentis in uase æneo frigans cum oleo quousq; comburatur, dissolue ipsum in illo oleo, & unge ex eo cum tuo digito.

Ad difficultatem mingendi. Cap. 132

Rhum & corimbos hederæ rubæ tere cum uino albo, & unge partes quæ sunt sub umbilico patientium dysuriam.

Ad sistendum exuberantiam urinationis. Cap. 133

Accipe pelliculas quæ sunt in uentre gallinarū: & sicca in sole: & recipe ex eis drachmam unam, & thure masculo & glande sicca & balaustijs & galla, ana drach. iij. tere & da ex eis ieiuno cum melle rosato & aqua frigida.

Ad renum & coxendicium dolores. Cap. 134

Recipe farinam iridis & acetum potēs, & permisce eis resinam pini & lupinos & pyrethrum et terebinthinam & sulphur & nitrum & baccas lauri, & miscens omnia cum melle appone.

Ad conceptionem. Cap. 135

Matricē leporis licca & tere, & da bibere quando fuerit à menstruis purgata.

Ad difficultatem partus. Cap. 136

Chamæpyteos & asphaltum pone super carbones, & suffumiga uel appone.

Ad extrahendum fetum mortuum Cap. 137

Fellis tauri quantitatē amygdalæ dissoluens in uino lymphato da cochlearia n. bibere, & emittet confestim. Aliud. Lyciū crudū trito caule iunge cum cedria, & calefacias, & da bibere ieiuno. Aliud. Artemisiā coque in melicrato & da bibere. Aliud. Super lapidē quem mordet canis quando proijcitur in eum, positum in solo trāseat mulier quæ patitur difficultatem partus.

Ad eas quæ post partum remanent discoloratæ. Cap. 138

Pumicem terens in uino dulci da ieiunē bibere. Aliud. Accipe facem uini antiqui & radicē lilij & alia, & lenias, & unge faciē uespere, & mane lauā, & hoc fac quousq; facies rubescat.

Ad educendum menstrua. Cap. 139

Prassium, nepitā, rutā, corticē celli, ana, drach. iij. coque in uino aut aqua, & da bibere. Aliud. De aqua qua dissoluitur fermentum uetus quando fit panis, da bibere.

Ad dolores matricis. Cap. 140

Pæoniæ radicem da bibere, uel radicē iridis uel seminis pæoniæ granula. xv. uel pulicariæ aut urticae succū appone, uel folia mellis cocta in uino. Aliud. R. rutam uiridem, & tere, & cum butyro & adipe porci fac unguentum.

Vt mulier corrupta appareat uirgo. Cap. 141

Recipe gallarum immaturarū, ligustri, xylocassia, rosarum siccarum, piperis albi, grani gnidij, ana hexagium unum, tere, & prælauata matricē apponat ista: cōfert autem & semen lapathij acuti tritum appositum.

Ad erectionem pudendi. Cap. 142

Pudendū intendunt & mouent ad coitum ista, nucum pinearum, piperis, petroselinij, scobis pudendi ceruini aridi, terebinthinæ, singulorum partes æquales, excipe melle, & ex uino bibēdas præbe. Aliud. Cicerum crudorum, nucum pinearū, singulorum partes duas, seminum erucæ, piperis albi, singulorum partem unam, mellis quod sufficit, da cum uino. Aliud. Vnge pudendum cum melle antequam coas. Aliud. Semen erucæ bibendum exhibe cū melle. Aliud. Succum erucæ cyathos ij. cum pipere albo quod sufficit, da tribus diebus de tertio in tertium: uel succi erucæ & piperis albi da cochlear unum ieiuno. Cōfert etiam testa marini erinacei bibita, & lac bouinū bibitū. Aliud. Polygonij semen & carnem piscium fluui alium siccam terens bibendam præbe, tensionem enim facit: similiter semen portulacæ coctū cum lacte bouino mire prodest: item oua perdicis si comedantur. Aliud. Semen porri cum uino non lymphato

lymphato bibendum exhibe. Aliud. Succus polygonij bibitus facit promptiores ad coctum. Aliud. Aquā in qua extinguit ferrū bibe cū uino. Aliud. Testiculi uulpis sicci bibe cochlear unū. Aliud. Expressione radicis asphodeli da bibendā. Aliud. Quando taurus postq̃ coīuerit minxerit, terram cōmisce, & luto, quod sit ex urina, unge pudendum. Aliud. Stercoris bouis recentū unge pudendum. Aliud. Coccon gnidium, hoc est oleastellum tere, & permisce cū oleo rosato, & unge. Aliud. Succo uerbenacæ unge pudendum.

Ad morsum uenenosorum animalium. Cap. 143

Ad morsum uenenosorum animalium fraxini folia tere & ex succo da cochlearia tria nō febricitantibus cū tribus cyathis uini. Aliud. Corticū arboris glandis, uel erucā quæ in oleribus nascitur, uel chamæpythin, uel polycariā, uel alliū, unū ex his teres da cum uino nō lymphato ieiunio bibendū. Aliud. Sanguis anatis aduersatur omnibus uenenosis et mortiferis: hoc idem etiam faciunt carnes gallinæ nouiter occisæ si moribus imponant: obstant enim omnibus uenenosis, & curāt, præter apidis morsum. Aliud. Rutam da cum uino bi-

ARGVMENTA

Cap. i Degurgulationis uitis curandis. Ad penden-
tem columellam. 2. Vt sine siti diu quis conseruetur.
3. Ad grauem auditū & surditatē. 4. Ad coeliacos.
5. ad uentris tormina. 6. ad supprimendū alui pro-
fluuium. 7. ad eminentia intus forisq̃, scissuras, si-
cosq̃ in sedē. 8. aridum ad exelas gingiuas dentesq̃ la-
bantes. 9. ad dentium dolorem. 10. ad dentes ob-
scūm decedentes. 11. ad corrolas gingiuas. 12. ad
oculorum uaria uitia. 13. ad albugines oculorum, &
carices ueteres, & uisum mirifice acuendum. 14. ad
agilopes, id est fistulas oculorum. 15. ad albugines
probatum. 16. ad suffusiones mirabile. 17. ad uere-
res suffusiones, heberem uisum, & ad omnia quæ oculis
tenebras offundunt. 18. ad oculorum dolores & uigi-
lias. 19. ad carbunculos oculorum totiusq̃ corporis.
20. ad acuendum uisum. 21. De ordeolis in palpe-
bris enatis. 22. ad fluxiones oculorum. 23. ad capi-
tis uitia diuerfa. 24. apophlegmatismus. 25. ad ca-
pitis dolorem. 26. ad hemicraniam. 27. ad clauos,
enam si in capite sint. 28. ad hemicraniam. 29. ad
capitis dolorem & hemicraniam, omniaq̃ ex fluxione
uitia. 30. ad clauos & myrmecias. 31. ad hemicra-
niam. 32. ad ictus uenenosorum ferarum. 33. ad do-
lorem capitis ex uini potu. 34. ad hemicraniam. 35.
ad fluxuium capillorum & barbæ. 36. ad capillos de-
fluentes. 37. ad tulsim. 38. ad tulsim reiectionemq̃
sanguinis. 39. aliud ad tabefcentes. 40. ad tulsim/
arteriam asperam, uocem amissam, & sanguinis spu-
um. 41. aliud ad tulsiculam & ulceratam arteriam.
42. aliud ad tulsiculas, fremitus, & sanguinis screa-
tum. 43. ad tulsim diurnam. 44. ad tulsim, co-
lumellæ, & constillarum phlegmonem. 45. ad tulsim,
& uitia radicis ueræ, & distillationem. 46. ad distilla-
tionem & tulsim probatum. 47. ad arteriam ex de-
fluente pituita laborantem & tulsim. 48. ad fluxio-
nem capitis. 49. apophlegmatismus pituitæ hyme,
50. ad destillationem. 51. ad humores in pectore
contentos. 52. ad tulsim, spiritus difficultatem à sto-
macho, & sanguinea sputa. 53. ad anginam. 54. ad
tulsim aridam. 55. ad tulsim, fluxionemq̃ pectoris.
56. ad constillarū uitia. 57. ad anginam. 58. ad
destillationem. 59. ad uocis claritatem. 60. ad

Galen.

bere. Aliud. Cerebrum gallinæ bibitum iuuat.
Inunctio ad morsum uiperæ.

Galbanum cum cyprino unge. Aliud. Serpyll-
um cum aceto similiter inunge.

Suffumigia fugantia uenenosa animalia.

Pyrethrū & sulphur incēde, & fugient. Aliud.
Cornu cerui & eius pinguedo idem facit: pellis et-
iam & pedes dextri si infingantur portæ, prohibēt
ingressum cuiuslibet uenenosi. Aliud. Pulmo
asini si fumigetur, omne uenenosum fugat.

Vt uipera non mordcat.

Draconteam tere, & unge manum, & nō mor-
deberis. Fructus uero ipsius herbæ tritus cū aqua
& positus in equis peregrinantium fugat eas. A-
liud. Ex succo solatri unge manus.

Epithema in morbis à uiperæ.

Viperæ caput abscondens applica partem san-
guinolentam loco demorso, liga, & dimitte sic.

Fomentum ad morsum uiperæ & muris aranei.

Trifolium bituminosum coque, & decocto ca-
lido locū demorsum foue. Nullus autē fomēto illo
utatur qui non patitur: trāsit enim affectus in eum
ut putet se à uiperæ uel araneo mure cōmorsum.

LIBRI TERTII

amissam uocem. 61. Ad phlegmonem aut erysipelas.
62. Ad lumbricos alium occupantes. 63. Ad lum-
bricos latos & rotundos. 64. Ad citandū sudorem,
finiendamq̃ febrim. 65. Ad hemicraniam. 66. Ad
canis morsum. 67. Ad timentes canum impetum.
68. Ad morsum canis rabiosi. 69. Ad anginam col-
liq̃ dolores. 70. Ad narium foedum odorem.
71. Ad prorumpentē à naribus sanguinem. 72.
Ad lateris phlegmonem correptos. 73. Ad acutam fe-
brim. 74. Prælagium in febricitantibus. 75. Ad
glutinanda uulnera. 76. Curatio ad dolorem auris.
77. Ad scabiem pruriturūq̃. 78. Ad stomachi ui-
tia. 79. Ad cruditatem inflationesq̃ uentriculi reme-
dium: quo usus statim esuriet. 80. Ad uentriculum
qui æstuat & cibum non retinet. 81. Ad dolorem
uentriculi. 82. Ad acorem in uentriculo. 83. Ad
inflammationem uentriculi. 84. Ad oculos fluxio-
ne laborantes. 85. Ad caliginem oculorum. 86.
Ad albuginem oculorum. 87. Ad oculorum uer-
tiginem. 88. Ad oculorum fluxionem. 89. Ad
dentium dolorem. 90. ad dentium uulnus. 91. ar-
dum, quod os humidum cruentumq̃ deterget, gingi-
uarum carnem infatur, dentes dealbat. 92. ad late-
ris dolorem. 93. ad internos ani tumores. 94. ad
lienem cataplasmata. 95. ad tertianā. 96. ad quar-
tanā. 97. ad sanguinis fluxum & naribus. 98. ad
uolentas sanguinis eruptiones. 99. ad tormina & in-
flationes. 100. Vt ne boues ægrotent. 101. Vt ne por-
ci ægrotent. 102. ad carnem glutinandam. 103. Pla-
gatum curatio. 104. ad equorum scabiem. 105. ad
somnia conciliandū. 106. Ne quis noctu somniet.
107. ad pectus. 108. ad corrosos dentes. 109. ad
renum uitia. 110. ad coxendicis dolorem. 111. Vt
dentes putridi nigriq̃ splendidi reddantur. 112. Ca-
taplasma capiti fluxione tentato. 113. Passillus dese-
minibus ad tulsientes. 114. ad iecoris uitia. 115. a-
liud, iecori & uentriculo cōmodum. Rursus alia duo.
116. ad linguam fluxione laborantem. 117. ad oris
ariditatem. 118. ad labia scissa. 119. ad spanopogo-
nas, & eos quibus menti pili decidunt. 120. Vomito-
rium. 121. Reprimentia uomitum. 122. ad sangui-
nem uomentes. 123. ad citandum uomitum pituitæ.

tom. 6

x

124

124. Pilulæ purgantes pituitam. 125. Ad uitium aut dolorem oris stomachi, uel cordis. 126. Suffitus aut anhelosos & diu tussientes. 127. Ad difficultatem spiritus, & sanguineum sputum. 128. Ad cruentum sputum. 129. Ad febriem ardentem. 130. Ad confirmationem genitalium & renum, & ueteres affectus. 131. Ad discutendas genium fluxiones. 132. Cataplasma ad pedum dolorem ex offensione, aut casu, aut alia uolentia. 133. Ad scabros ungues & paronychiam, diuinum. 134. Ad ambustia. 135. Ad sanguinis undecunq; eruptionem. 136. Ad impetigines. 137. Ad dealbandam faciem. 138. Ad dolorem uteri. 139. Paxamadam purgatio. 140. Ad necandos culices. 141. Ad abigendos serpentes. 142. Ad fugandos pulices. 143. Ad difficultatem urinæ lumen torum. 144. Ad ictum calami. 145. Ad comitalem. 146. Ad appetentiam cibi excitandam. 147. Ad hirudines deuoratas. 148. Ad apum ictus. 149. Ad serpentum morsus. 150. Ad inflammationes ut uenæ incisione factas, & duritias humerorum, & deustiones, & sanguinis concretiones. 151. Ad hydropicos. 152. Vinum ut odio sit, & quomo cauenda ebrietas. 153. Quis ex uno uini scypho inebrietur. 154. Ad lenticulas in facie. 155. Ad infantium procidentem sedem. 156. Ad gingiuas pueri & dentes orientes. 157. Ad lac multum creandum. 158. Ad exsuffiones per hyemem. 159. Ad aquosum ramicem. 160. Ad uulnus incurabile in quauis corporis parte. 161. Ad uomitum. 162. Ad aphthas. 163. Ad tælapas, capitis tumores. 164. De uiribus rutæ, rhamni, & mentæ. 165. Ad supprimendum sanguinem. 166. Præfagium de ægotante. 167. Ad impediendâ Venærem. 168. Ad dolorem oculorum. 169. Ad capitis dolorem. 170. De morbis pectoris. 171. De morbis uentris. 172. Ad grauem auditum & aurium sonum. 173. Ad custodiendam uitam. 174. Ad stertiles. 175. Ad lumbricos mirabile. 176. Vt digno scas mas ne an foemina sterilis sit. 177. Ad rigorem. 178. Garum Ioachi. 179. De capitis dolore. 180. Ad rigorem. 181. Ad sanguinis enaribus profluuium. 182. Ad uteros. 183. Ne arbor fructum amittat. 184. Ad uulnus. 185. Ad stomachum. 186. Ad impetigines. 187. Ad dolorem dentium. 188. Ad lumbricos uentris. 189. Ad urinæ difficultatem. 190. Ad uulnus dulce. 191. Ad dolorem lateris. 192. Ad iecur & stomachum. 193. Ad conciliandum somnum. 194. Ad tussim. 195. Ad cordis dolorem. 196. Ad lumbricos alui. 197. Ad hæmorrhoides. 198. Ad exustionem. 199. Ad pruritum. 200. Ad morbum regium. 201. Ad uermes. 202. Ad tussim. 203. Ad comam. 204. Ad aurium dolores. 205. Ad regium morbum. 206. Ad iocinosos, lienosos, & à stomacho laborantes. 207. Ad renum uitia. 208. Basilus lictus de ratione uictus. 209. Idem ad stomachum pituitosum & dolorem capiti inferentem. 210. Ratio uictus in cibis & ieiunio, & secundum menses diæta, quod ad uomitum, balnea, &c. 211. Ad capitis dolorem. 212. Aduersus uini no-

xam. 213. Inunctio ad artuum dolorem, manuum pedumq; intertrimenta, corruptelas, adustiones hymis, & uenti manus pedesq; lidentis. 214. Ad agiolas. 215. Ad uulnura incurabilia. 216. Ad pulmonum inflammationes. 217. Ad talpas, sic dictos tumores. 218. Ad dolorem uentris & stomachi. 219. Ad stomachi uitia. 220. Ad debilitatem genium. 221. Ad dolorem lateris. 222. Ad lienosos. 223. Ad profuuium sanguinis muliebre. 224. Ad stomachi compressionem. 225. Ad coliacos. 226. Ad urinæ difficultatem. 227. Ad exterius prominentes ani tumores. 228. Ad artuum dolores. 229. Ad dolorem genium. 230. Ad ossa fracta. 231. Ad quartanam. 232. Ad morsum scorpis. 233. Ad ueneficia & præstigia. 234. Vt mulier concipiat. 235. Ad foetum in utero mortuum. 236. Vt lac abundet. 237. ad ueros. 238. De inuoluntario mictu in fratribus. 239. Ad roborandum penem. 240. Ad scabiem unguium. 241. Ad intertrigines. 242. Ad podagram. 243. Ad roborandum stomachum. 244. Ad sputum. 245. Ad uomitum biliosum. 246. De singultu. 247. Ad pedum intertrimenta, scissuras & permiones. 248. Ad podagram. 249. aceti scillini confectio ex Galeno. 250. Vini scillini compositio ex Galeno. 251. Medicamentum quod manducatum stomachi pituitam detrahit, gargarizatum caput purgat. 252. ad urinam quæ ægre aut omnino non redditur. 253. ad calculosos, & urinam prouocandam. 254. ad sanguinis mictum. 255. ad urinæ stillicidium. 256. ad dolorem uiz urinariæ, & difficultatem mictus atque anhelitus, & ad sanguineum lotium & calculum. 257. ad inuoluntarium urinæ exitum in fratribus. 258. ad inuoluntarium mictum. 259. ad difficultatem urinæ & calculum. 260. ad exterendos calculos. 261. ad supprimendam aluum. 262. ad citandum sudorem, & finiendam febrem. 263. ad canis morsum. 264. ad morsus canis rabiosi. 265. ad anginam & colli dolorem. 266. ad internas aniprominentias. 267. ad lienem cataplasma. 268. ad nigros dentes. 269. ad lumbricos alui. 270. ad interiores exterioresq; ani prominentias. 271. ad dolorem dentium. 272. ad hirudines. 273. ad calculosos. aliud calculos frangens: rursus alia. 274. ad stillicidium. 275. ad urinæ difficultatem & stillicidium. 276. ad mingentes in stragulis. 277. ad stillicidium. 278. ad impetigines, & alias, & feras. 279. ad penis dolorem & inflammationem. 280. ad impetigines. 281. ad uulnura recentia à gladio aut ligno illata. 282. ad perniciosam medicamentam. 283. ad fluxionem gutturis. 284. ad mammarum tumores. 285. ad dolorem capitis lupinum. 286. ad tussim & hæticam febriem. 287. ad tussis. 288. ad humores pectore contentos. 289. ad tussis. 290. Vt uox canora reddatur. 291. ad uocem amissam. 292. Vt capilli & barba crescant, si decidunt. 293. ad renes dolentes.

LIBER TERTIVS DE MEDI

CAMENTIS QUAE AD MANVM SVNT,

Galeno ascriptus.

De gurgilionis, quæ ex uua dicitur, uitijs
curandis. Cap. 1



VRGVLIONEM male habi-
tum ita sanè curare poteris.
initio phlegmões uictus mo-
dicus & boni succi esto, sorbi-
tiones & gargarizationes ex
mulso fiat, aut mulsa, aut sapa-
tepidā, aut ex aceto mulso, qd
gargarizetur solum & effun-

datur, & ne deuoretur: manducetur autem pyre-
thrum, aut piper, aut uua taminia, quam & staphi-
da agrian uocant: hæc trita cum nitro, & sale pala-
to columellæq; affricta, phlegmonem dissipat, ex-
terius autem hæc eadem imposita: & alia similiter
calefacientia & phlegmonem mitigantia, & do-
lorem leuantia, episthemata uero & cataplasmata
idonea sunt.

Ad pendentem columellam.

Hyssopiradicem & caricarum succum una mi-
sceto, & gargarizato: perinde & ad tonsillas ac
columellam unā seruēfaciens palmulas & lentem
gargarizato.

Vt sine siti diu quis conseruetur. Cap. 2

Dulcis radice succus potui detur, aut portulacæ
cyathū deuorato. Aliud. Aneforū pondo uncia,
dulcis radice succi pōdo uncie duę, tragacanthæ
madefactæ pondo tantundē, cōfictio pastillis, &
in umbra siccato, ex his unū sub lingua cōtineto,
& succum descendere permittito, & non sities.

Ad grauem auditum & surditatem. Cap. 3

Caprinum fel recens cum pari portione mellis
ad carbonēs decocti mistum tepidum in aurem in-
stillato. Aliud. Leporis fel recens cum pari mel-
lis portione mistum & in capæ corio tepefactum
in aurem mitte: hoc enim remedium ei, qui uel ni-
hil audiat, auditum restituit. Aliud. Suis mansue-
tis fel pari mellis ad carbonēs decocti portioni admi-
stum tepidum infunde, aut scillæ succum & rosa-
ceum miscens utere. Aliud. Erui succū instillato,
& stupam rosaceo imbutam superimponito.

Ad coliacos, hoc est, uentriculorū
fos. Cap. 4

Myrteas baccas uirides, rosas aridas, malico-
nia, flores mali punice syluestris, gallas quinq; mul-
to uino subigens in uentriculum mitte: aut fabæ
cortices uino inferuefactas per clysterium inijce:
aut lentis decoctæ, aut oryza non purgata, aut si-
deritidis herbæ succum tepidum perinde per cly-
sterium immitte: item & acaciæ succum per infe-
riores partes in uentrem da, aut cerusam & argen-
ti spumam ex melle & uino tritam.

Ad uentris tormina. Cap. 5

Cuminum ex melle elui dato, & profectum mi-
raberis: aut calami radicem ex uino calicis unius
mensura propinato.

Galen.

A Ad supprimendum alui profluuium. Cap. 6

Aquam origanum incoctum habentem propi-
nato. Aliud. Sepiæ testam & capillamenta cre-
mata ex uino ueteri potui offerro, aut rubi fructus
cum solijs ad tertias decoctam propinato. Aliud.
Cuminum Græcum & gallam non tritam crema-
to, & ex uino ueteri potui dato cum ad tertias re-
ductum fuerit: id facito per triduum.

Ad eminentias internas scissuras, ficosq;
in sede. Cap. 7

B Auripigmenti fisci pondo uncias tres, quernæ
cariei pondo uncias quatuor, ex omnibus in unū
tritū aridum medicamentum componito: ita ue-
ro utitor, locum prius urina pueri uenerem non
expertū subluio, deinde inspergito.

Ad eminentias, quæ intus forisq; in ano sunt.

Lasertij radicem tusam tritamq; superdato.

Aridum medicamentum ad exesas gingiuas, dentesq;
laborantes. Cap. 8

C Mastiches pondo unciam, thuris pondo unci-
as duas, myrrhæ, rosarum aridarum utriusq; pon-
do uncias tres, sarcocollæ, gallarum utriusq; pon-
do uncias quatuor, omnia in unū contere, & gin-
giuas consperge, quas prius sedi, aut myrti, aut
lentisci, aut uitiis, aut oleæ foliorum decocto te-
pido collueris.

Ad dentium dolorem. Cap. 9

Aceto, cui hyssopum aut origanū incocta sint,
foueto: aut pyrethrum, piper & zemma, & masti-
chen paribus portionibus commanducanda exhi-
beto. Aliud. Vuæ taminæ acinos quatuor, ma-
stiches micæ uel grana octo manducari iubeto.

Ad dentes ob istum decedentes. Cap. 10

Oleo uuulas passas incoctas habente locum fo-
ue, deinde aceto, dolore uidelicet exacerbato: tri-
duo interposito iterum repete, atque ita dentes
renascuntur.

Ad corrosas gingiuas. Cap. 11

D Aristolochia ex melle contrita gingiuas con-
spersgito: aut ceruinum cornu exustum, donec al-
bescat, & cerusam, & argenti spumam, & nardum,
& pumicem cerato comprehende, & illine: aut
testudinis crematam testam ex oleo tritam in gin-
giuam instillato. Aliud. Eruæ semen cum suc-
co, & capræ fel cum melle, aut nigellam itidem
cum melle illinito.

Ad oculorum uaria uitia. Cap. 12

Caprina medulla oblinito, & sanabis: aut capri-
nam, ouillam ūe adipem calida aqua madentem
imponito: aut lini seminis succo, aut muliebri la-
ctē madefacito.

Ad albugines oculorum, Græci leucomata uocant, & cicatrices
ueteres paucissimis diebus curandas remedium, quod
etiā uisum mirifice exacuit. Cap. 13

Aeruginis rasæ uncias quatuor accipe, ammo-
niacæ gutta tantundem, cerusæ uncias duas, gum-

mi unciam unam. Liquidum autem medicamentum, cucumeris agrestis radicis succus. Aliud. Lauri baccharum mundatarum & tritarum, gummi quantum satis sit, permisce & fiant collyria, quando uti uoles terito, & ex pueri uenerem non experti urina illinito: probatum est.

Ad Aegilopas, hoc est fistulas oculorum. Cap. 14

Fimi columbinariidi drach. quatuor accipe, & cum masculo thure tritas inspergito: expertum est.

Ad albugines comprobatum, multos enim iuuat. Cap. 15

Perdicis masculi felle ex melle illinito. Aliud. Ladani uncias duas terito, ex uino optimo, & oleo, quantum satis erit, illinito.

Ad suffusionem admirabile, quod ilico uisum restituit. Cap. 16

Muris sanguinem, & galli fel, & muliebre lac æquis ponderibus misce, & bene subactis utere: probatum est enim, & magnifice profuit.

Aliud ad inueterascentes suffusiones, hebetem uisum, & ad omnia, quæ oculis tenebris offundunt. Cap. 17

Baccas lauri cortice liberatas numero decem, gummi drachmas duas, ex aqua pluuiatili collyria facito, & illine: suffusos quidem ex urina pueri uenerem non experti, cæcutientes autem ex aqua pluuiatili.

Ad oculorum dolores, & uigilias. Cap. 18

Mullam insillato, & ouum præmaceratum, ac putamine mundatum in duas portiones secato, & super oculum deligato, & somno occupabitur.

Ad carbunculos oculorum totiusq; corporis. Cap. 19

Herbam muralem cum panis micis posca prius madefactis tritam adhibeto.

Ad acuemum uisum. Cap. 20

Fœniculi succo trito ex melle multo recenti, & super carbones sine fumo cocto illinito.

De ordeolis in palpebris enatis. Cap. 21

Acacia ex uino utere.

Ad fluctiones oculorum. Cap. 22

Oculis fluctione laborantibus initio quidem cibis modicus conuenit, aquæ potus, a uenere abstinentia, & aluus ducatur, primumq; multa frigida modico aceti permisto alsidue faciem lauer, & in lectulo olfaciat: puluerem, fumum, luccernæ solisq; splendorem deuitet: deinde rosas uirides uel aridas dulci uino madefactas contere, ouiç; uitello admistas superdato, aut ex hordei farina dulci uino incocta cataplasma facito: quod si dolor uehementissime cruciet, altercum quoque admisceto.

Ad capitis uitia diuersa. Cap. 23

Cataplasma ad caput fluctione uexatum. Hæc compositio caput fluctione tentari non finit, neque oculum male haberi: accipe cimoliæ, nitri, albæ uitis radicis aridæ, cucumeris sylvatici radicis, fabaceæ farinæ, singulorum pondo uncias duas, pariter tritis & in unum redactis ad sordium crassitudinem utere in balneo: longe ualentissimum remedium est.

Vi manducatu pituita ex capite detrahatur. Cap. 24

Vuam raminiam & mastichem manducato, aut mastichem & zingiber. si mastiche dura sit, parç ceræ admisceto.

Ad capitis dolorem. Cap. 25

Rutam diligenter contere, & ex aceto atque rosaceo frontem illine.

Ad capitis ab altera tantum parte dolorem quem hemispaniam Græci uocant. Cap. 26

Porri caput comamq; oleo incoquito, ex eo caput perfundito, statimq; dolor tollitur. Aliud. Hederæ extrema oleo incoquito, & ex eo caput perfundito effectum miraberis. Aliud. Amaræ amygdalis tritis frontem oblinito.

Ad clauos probatissimum, etiam si in capite sint. Cap. 27

Accipe sandarachæ, aluminis scissi, atramenti futorii, myrsos, uiuæ calcis, saponis, singulorum parem modum, sed calcis tatum duplum, tritis ex primo saponis iure utitor: admirabile est.

Ad dolorem capitis hemispaniam uocatum. Cap. 28

Accipe erucæ seminis uncias tres, rutæ uiridis uncias septem, piperis grana unum & triginta, ouorum trium alborem, aceti quod satis est, omnibus permistis illinito frontem.

Pastillus celebris Socratis ad capitis dolorem & hemispaniam, omniq; ex fluxione uitia mirificus. Cap. 29

Accipe euphorbiæ drachmas quatuor, thapsiæ succi drach. sex, zingiberis drachmam unam, opij drachmas tres, opopanax drachmas duas, omnia in unum ex aceto liquato, pastillosq; conficito, cum uti uoles, aceto dilue, & fronti illine: suffiritiam potest, & ad membrum aliquod fluctione male habitum magnifice proficit.

Ad clauos & uerrucas appellatas formicas. Cap. 30

Clauos enumera, & totidem formicas accipe, & in panniculo lineo raro deligato & cum his etiam cochleam, deinde cremato, tritasq; ex aceto oblinito: aut sinum bubulum aceto maceratum per triduum imponito, omnesq; claui decident: palmularum ossæam partem ultimæ tritam cū sale & gutta ammoniaci in sole subigito, imponito & curabis.

Ad dolorem capitis hemispaniam dictum. Cap. 31

Lumbricos terrestres quindecim accipito, piperis grana quindecim, aceti quod satis sit, omnia simul conterito, & illinito.

Ad ictus uenenosarum ferarum. Cap. 32

A bestiis uenenatis, rabiosisq; cane demorsos faciat cancri interiorum cinis ex aqua semel ac bis potus, quantum manu capere potes.

Ad dolorem capitis ex uini potu. Cap. 33

Herbæ sanguinalis coliculos duos connecte, & sertum capiti circumdato.

Ad hemispaniam dolorem. Cap. 34

Nasturtij semen tustum cum oui albò permisce, fronti impone, & stupam superda: aut aquilæ capitis os simile simili appende, perinde & uulturis. Aliud. Lapilli in capite labracis, id est lupi piscis reperti dolorem capitis leuant, & ad hemispaniam faciunt appensi dexter dextræ parti, sinister sinistræ.

Ad defluuium capillorum & barbæ. Cap. 35

Betam ex myrteo, & polytrichi capillamenta illinito: aut adiantum ladaunq; paribus portionibus trita ex immaturo oleo, aut myrteo, aut lentis-

fano imponito. Aliud. Ladanum uino amineo, & oleo myrteo maceratum utroq; ad mellis spissi-
tudinē, caput in balneo perungito: melius est au-
tem, quod aliqui polytrichon uocant, si portio se-
pima ladano adijciatur, atq; ita illinatur.

Ad capillos defluentes, ut plures inflauerentur. Cap. 36

Murini stercoris drachmas tres accipito, cala-
morum, quos conatelos uocant, drach. quatuor,
mygdala amara numero lxxij. succi balsami, la-
dani utriusq; drach. quatuor, polytrichi drach. se-
ptem, nardi gallici drachmam unam, in pice liqui-
da madefaciens ladanum uino oleoq; macerato,
arida uero in puluerem redigens cum liquidis per
melle & utere, quotidie perungens: mihi uidetur
& caluis posse capillos reddere.

Ad tuſſim diuerſa remedia. Cap. 37

Iuniperi fructus eſu potuq; ſumptus. Aut bdel-
lium epotum. Aut daucus Creticus ex uino po-
tus. Aut dracunculi radix pariter elixa & ex mel-
le trita. Authelenij: Aut perdicidis herbæ ſuc-
cus tepidus ante cibum ex aqua potus. Aut ſan-
guinariæ ſuccus eodem modo ſumptus. Aut per-
ſonataradix. Aut pineus nucleus ex aqua potui
datus. Aut propolis ſuffita. Aut reſina epota, &
terebinthina ſuffita. Aut arſenicum ſciſſile cum
galbano ſuffitum, & fumus deuoratus. Præterea
bituminis, thuris, ſtyracis, cuminiq; ſuffimentum.
Aut cinnamomum ex melle tepido potum. Aut
cupreſſi bacca contuſa ex uino cum myrrha iei-
uno exhibita. Aut ſoeniculi radix ſemenq; uino in-
cocta, & propinata. Aut uinum cui uiridis ſeru-
la incocta ſit. Aut origanum mellis incoctum & bi-
bitum. Aut myricæ ſlos, ſemen, ac folia uino eli-
xa, & potui data. Aut piceæ cortex ex aqua potus.
Aut albe populi folia & ramuli ex aqua, aut uino
potui oblata. Aut uerbſci radix ex uino in bal-
neo pota. Aut allium crudum elixum eſe uiſi da-
tum. Aut lanariæ herbæ radix ex melle ſumpta
peſſime affectos liberauit. Leporinū ſtercus con-
tritum ex uino calido ſumptum arteriæ & colu-
mellæ uitij, & ſpiritus diſſicultati ſummo opere o-
pitulatur. Ad eadem facit & lingua aquilæ collo
ſuſpeſa. Aut nucleus pineus integer uſtus tritusq;
cum modico piperis melle exceptus laborantiq;
exhibitus cochlearij meſura. Ad ueterem tuſ-
ſim autem leuandam, ſulphur ignem non exper-
tum uino inſijcto, & in balneo ſorbeto. Aut ſina-
pim terēs miſcensq; mellis dacos tres exhibeto.
Aut naſturtij ſemen tritum ex aqua potum cubi-
tum eunti. Aut thus cum melle tritum linctui da-
tum ſummo mane aut cubitum eunti. Aut rapha-
ni ſuccus ex melle ſorptus diluculo. Aliud. Iuni-
peri bacca quinque, aut ſeptem ex melle potæ. A-
liud. Accipiantur piperis drach. iij. nucum drach.
ij. nucleorum pineorū, hyſſopi utriusq; drachma
una, pulegij, iſridis, urtiſe ſeminis, ſingulorū drac.
quatuor, mellis quantū ſatis ſit, detur ligulæ me-
ſura. Aliud. Sinapi, cuminum, nigella, naſtur-
tium, paribus portionibus unā conterantur, uino
excipito & propinato. Aliud. Pulegium aſſidue
manducetur, tritumq;, & uino maceratum bibe-

Galen.

tur. Aliud. Cumini friſti, nigellæ friſtæ utriusq;
drachma una, piperis grana quadraginta, unā tri-
ta, & melle fermentata ieiuno dato & cubitum e-
unti. Suffumigatio. Accipe auripigmentum ſciſ-
ſile, piper, marrubium, hordei farinam, triſaginis,
& uitis radicis corticē, chamæleucen, maſtichen,
crocum, coſtum, omnia in unum miſce, & colly-
ria conſice, & ieiunum ſuffumigato cubitumq; e-
untem. Aliud. Piper, nuces, auripigmentum
ſciſſile, ſimul terito, miſcetoq; cum melle, & pro-
pinato. Aliud. Butyrum, anſerinum adipem, &
reſinam unā cum melle contundito: & ieiuno cu-
bitumq; eunti exhibeto. Aliud. Virgulum ſoeni-
culi, ſemen piperis unā terito, & melle fermenta-
ta concedito. Aliud. Veſicarium ſolanum cum
B radicibus elixum potui dato.

Ad tuſſim reſiſtionemq; ſanguinis. Cap. 38

Accipe coſti, cinnamomi, rhei barbari ſingulo-
rum drach. unam, ſimul & trita, & in unū corpus
redacta ex uino tepido propinato.

Aliud ad tabeſcentes faciens. Cap. 39

Accipe thuris, piperis, auripigmenti ſciſſilis, ca-
riophylli, ſingulorum parem modum, omnia con-
terito ex melle, et fermentata concedito diluculo,
& cubitum eunti. Aut auripigmentū ſciſſile pro-
ſale in ouum ſorbile mittito, & ſorbeto ieiunus.
Aut arſenicū tritum ex uino tepido in balneo pro-
pinato. Aut arſenicum ſiſſile & utellū oui miſce-
to & bombici illinito, & per inſtrumentum, quod
ſiphonem Græci uocant, ſuffumigato. Cum uero
laborans ſuffumigio triſtabitur, ipſi butyrum ad
auellanae nucis magnitudinē deuorandum exhi-
beto: iterumq; ſuffumigato, id aut ſepties repetes.
Aliud. Styracem bonū & braſſicæ ſuccū unā teri-
to, & fermentata ieiuno, aut cubitū eunti exhibe-
to. Aut laurei olei & uini boni accipe ſingulorum
drach. tres, miſce, & tepidū in balneo propina, &
œnelæo, id eſt uino oleoq; miſto in olla caleſcæto
ſtomachum foue. Oenelæum phthiſico potui ne
dato: ſed œnelæum curioſe paratum caleſcæto &
ſpongia ſtomachum foueto. Aliud. Lupinorum
decocto calido myrrham ſtaſten uocatam mæde-
facito, & pedes tuſſientis foueto, & ſpongia deter-
gens inungito butyro, deinde iterum foueto. hoc
ter facito curabitur. Aliud. Hederae granis, aut li-
D gnis, aut ſoliſ tuſſientem ſuffumigato. Aut reſi-
nam ex uino ueteri tritam ieiuno propinato: aut
agreſtis canabis ſemen tritum ex aqua, aut cedri li-
quorem ieiuno potui dato: aut hyſſopum & pule-
gium in poſca incoctū. Aut beronicæ melle ſub-
actam edendam offeras. Et raphani aſſi mane ac
ueſperi ſe dantur, benefaciūt, & chamæleuce ſuffi-
ta. Aliud. Baccas laureas cum piper, & nucleos
pineos ex melle dato mane & cubitum eunti.

Ad tuſſientes, arteriam aſperam, uocem amiſſam, & ſanguis-
nem ſputum. Cap. 40

Accipe tragacanthæ, gummi, utriusq; drach-
mam unam, myrrhæ bonæ tantundem, dulcis ra-
dicis ſucci, ac uini dulcis quantum ſatis eſt. omnia
contuſa in unum redige: cum trita fuerint, arida
cum reliquis miſce.

tom. 6

x 3

Aliud

Aliud ad tussiculam & ulceratam arteriam. Cap. 41

Accipe terebinthinæ, gummi, mellis boni, singulorū unciam: & terebinthinæ prius elixæ gummi adijce, & exhibe oleæ magnitudinem ore continendam. Aliud. Gummi, licij, utriusq; uncias quatuor in aquâ mitte, macerariq; finito, deinde heminā Cretici dulcis infunde, & seruefacito usq; ad fordium spissitudinē, & delingendū præbeto.

Aliud, ad tussiculas, fremitus, & sanguinis scretum. Cap. 42

Accipe tragacanthæ drachmas duas, lini seminis fricti drachmas quatuor, amygdala delibrata decem, nucleum pineum adipi incoctum: tragacantham aqua calente madefacito, & reliqua admisceto, dulceq; uinum infundens conterito. Ad uocem autem amissam, & sanguineum sputum, pro dulci uino melle utitor. Aliud. Raphanum in taleas rotundas concidito, & super prunas assato, ex melleq; ieiunus edito.

Ad tussim diuturnam. Cap. 43

Accipe piperis drachmam, lupinorum farinæ ℥℥. tres, & mellis ligulam sorbendū dato. Aliud. Auriculæ porcine os perforatum collo alligatum à tussi futura custodit.

Ad tussim, columellæ uitæ, & tonsillarum phlegmonem. Cap. 44

Lapilli in nidis pullorum hirundinum reperti, appensiq; à tussi tutum reddunt.

Ad tussim & uitæ radicis uis, & distillatio nem. Cap. 45

Accipe zingiberis drach. unam, galbani, opij, styracis, singulorum tantundem, dulci uino excipe, & globulos erui magnitudinis conficito, & loco pilulæ duos cubitum eunti cōcedito, & dulce dilutum postea sorbeto. Aliud. Zingiberis, styracis singulorum drachmas quatuor, dulci excipito, & instar erui conficito, & cubitum eunti pro pilulis tria dato, dulceq; dilutum postea sorbeto.

Ad distillationem & tussim probatam. Cap. 46

Accipe papaueris lachrymæ drach. duas, castorei drach. unam, confice pastillos erui magnitudinis, & eunti cubitū pro eius uiribus dato. Aliud. Quo utebatur sapientissimus Alexander. Accipe pyrethri drachmas duas, costi drachmam unam, tunde & cribra: in utendo autē iube nares tangere, statimq; constringe.

Ad arteriam ex diffillante pituita laborantem, & tussim. Cap. 47

Accipe styracis drach. octo, castorei drach. quatuor, zingiberis, galbani, utriusq; tantundem, in unū misceto, pastillosq; magnitudinē erui æquantes efficito, & de nocte duos, tres uel exhibeto, posteaq; bibat, sed non ilico, & iuuabitur.

Medicamentum capiti inspergendum eius fluxionem finiens. Cap. 48

Accipe hyperici, iunci odorati, iridis, ligni balsami, singulorū unciam unam, contusa cretaq; caluarie inspergito. Aliud. Caluarie inspergendum exiccatoriu. Accipe costi, fœniculi foliorū, gallarum, spicæ nardi, iridis, nardi gallici, rosarum aridarum, singulorum unciam unam, tusa cribrataq; inspergito. Aliud. Ericæ seminis, gallarum, iun-

ci odorati, sanfuci, costi, iridis, ligni balsami, singulorum uncia unā, tulsis, cretisq; caput cōspergito.

Medicamentum, quo hyeme per manducationem ex capite pituita detrahatur. Cap. 49

Accipe hyssopi, origani, utriusq; drach. iiii. pulegij drach. ij. calaminthæ drachmam unam, pyrethri, drach. ij. uuæ taminie, marrubij, sinapis, singulorum drach. unam, sapæ acetī, utriusque sextarium unum, omnia in unum misceto, & usque ad tertias decoquito, & gargarizato. Aliud eiusdem facultatis, quo uerno tempore utendum est. Accipe hyssopi uncias quatuor, origani unc. tres, pulegij uncias duas, calaminthæ unciam unam, sapæ sextarium unum, acetī sextarios tres. Aliud, quo æstate & autumnno utendum. Accipe hyssopi unc. iiii, origani unc. iij. pulegij unc. duas, calaminthæ, spicæ nardi, caryophyllorum, singulorum unciam unam, cinnami unc. tres, marrubij unc. quatuor, iridis unc. tres, cyperi unc. duas, pyrethri unc. unam, sapæ acetī, utriusq; sextarium unum, decoque usque ad tertias, & utere.

Ad distillationem. Cap. 50

Accipe origani fasciculos duos, pulegij fasciculum unum, cum aceto in mundam ollam demittito, item caricas sex, uuæ passæ acinos duodecim, omniaq; decoquito usq; ad tertias, mox percolato, & in poculum conijcito, ac gargarizato.

Ad humores in pectore contentos. Cap. 51

Vrticæ folia cum hordei cremore decocto exhibeto, hoc inflationes digerit, & materiam ex pectore euocat.

Ad tussim spiritus difficultatem à stomacho, & sanguinea sputa. Cap. 52

Novam spongiam & candidam accipito, huius ustræ tritæq; cinerem cum melle & pipere, quantum satis est, cōmisceto, in eamq; formam redigito, ut delingi possit, uesperiq; à cœna, quantum tribus digitis capere potes, accipito.

Ad anginam. Cap. 53

Bouis masculi felie collum obliuio.

Ad tussim aridam. Cap. 54

Fœnumgræcum usq; ad tertiam partem elixato, iusculumq; summo mane ex melle propinato.

Pastillus ad tussim fluxionemq; pectoris. Cap. 55

Accipe pulegij, hyssopi, piperis, nasturtij, singulorum unc. unā, melle cōprehende, et pastillos effice, singulos uncia pondus æquantes. his utitor.

Ad tonsillarum uitæ. Cap. 56

Salicis folia & semen in aqua diutius seruefacito, gargarizandaq; exhibeto: hoc pinguem pituitam maxime detrahit, & ad anginam benefacit. Aliud. Ex myrti lenticulæq; decocto gargarizari præcipito.

Ad anginam. Cap. 57

Caprinum stercus ex melle gargarizato, aut rutæ succo ore adaperto fauces sublinito.

Ad distillationem. Cap. 58

Hyssopum, ficos, mel, ac rutam aquæ incoquito, eamq; gargarizato.

Ad uocis claritatem. Cap. 59

Tragacantha uino madefacta & epota uocem claram præstat.

Ad anissam uocem. Cap. 60

Syracem aqua maceratum in globulos ciceris magnitudinis redigito, tres exhibeto; statim uoce recuperata loquetur.

Ad phlegmonem, aut erysipelas. Cap. 61

Sedi folia cum polenta in cataplasmatibus modum imposita. Aut porrulae folia cum polenta. Aut brasicae, aut calami folia uirentia conterito, & superimponito, Aut rubi. Aut rhamni & rosarum folia superdato.

Ad lumbricos alium occupantes. Cap. 62

Polypodij radicem cum sapa mistam edito. Aut raphani semen ex aqua potato. Aut allium corroditum. Aut ulmi radicem ex mulsâ aqua bibito. Aut sycamini radicis cortex aquae incoctus potui detur. Aut nigella potui detur, & in cataplasmatibus modum imponatur. Aut ex aqua brasicae semen habente potio fiat. Aut ex mentae succo. Aut ex nasturtio atq; menta. Proprium experimentum. Canabis semen aridum tustum cretumq; misceto cum aqua, ut succi temperatura fiat, mox lintheo mudo percolatum in potum offer. Aut bubulum finum aridum combustum in puluerem redigito, ex eo potui drachmam unam ex uino dato.

Ad lumbricos latos & rotundos. Cap. 63

Accipe niri, nasturtij, piperis, singulorum unciam, fac puluisculū, & ex uino ligulâ propinato.

Ad citandum sudorem, finiendamq; febrem. Cap. 64

Cantharos semen ex oleo illitum prodest. Aut pyrethrum ex oleo calefactum, & per horam ante inuasionem illitum bene facit. Aliud ad febrem expertum. Oleum comune, aut chamaemalinum, acetum, nitrum cum laureis folijs, omnia bene elixentur, & ex eo laborans perungatur, & undiq; coniectus statim sudabit. Illitio ad febricitantes. Butyri partes duas, mellis partem unam misce, & calefactis utere. Aliud. Lactuca foliorum succi partem unam, olei uulgaris partes duas, misce, & curiose agitas totum corpus inungito: experientia probatū est. Aliud. Artemisiae succi partem unā, rosacei olei partes duas misce, & utere.

Ad dolorem hemicranian uocatum. Cap. 65

Solani succus ex oleo illitus uehementer proficit. Aliud. Sinapis semen ex melle imposito. Aliud. Rutam domesticam aceto & rosaceo incoctam illinito.

Ad canis morsum. Cap. 66

Vrticæ semen impositum: Aut nigri marrubij folia: Aut apistram ex uino potum, & morsibus illitum. Allium quoq; illitū prodest, & tostum in cibum potumq; assumptum.

Ad timentes canum impetum. Cap. 67

Nerij radicem collo circumdato, & liberabitur: q̄ si experiri uolueris, cum canis in furore uersus sit, illi circumponito, statimq; furorem deponet.

Ad morsus canis rabiosi. Cap. 68

Vulneribus rabiosi canis morsu factis brasicæ folia cum lassere trita ex aceto imponantur, per se enim brasicæ aduersus rabiosi canis morsus proficit, & ipsius decoctum potui datum. Elixæ uero brasicæ ante alios cibos sumpta phthisicos sanat, utiq; arteriæ subuenit, contusa autem & cata-

A plasmatis modo lieni imposita, illum extenuat.

Ad anginam collig; dolorem. Cap. 69

Alba populus arida contrita, & collo illita: aut nasturtij semen: & finus columbinus ex melle imposita bene faciunt. Aut mel tepidum gargarizatum. Aut canino stercore candido trito ex aceto collum oblinito.

Ad narium secundum odorem. Cap. 70

Hederæ foliorū succus tepidus naribus instillatus: aut calaminthæ succus æque tepidus infusus: aut myrrha ex muliebri lacte trita infusaq; naribus, narium halitum commendat.

Ad prurientem e naribus sanguinem. Cap. 71

Acaciam ex aceto tritam naribus infundito. Aliud. Acerum cum sale fumens in ollam aut mortarium mittito, lanamq; accipiens in ipsis ma defacito, hæcq; quantum laborans ferre poterit, calefacta, eius capiti imposito: silicoq; uelamentis quamplurimis contegi præcipito. Purgatorium narium. Thymum & origanum melle exceptum in pastillos redigē, cōmanducandosq; exhibe.

Ad lateris phlegmonem correptos. Cap. 72

Hæc omnia benefaciunt, bdellium ex uino pariter & ex aqua potum: Aut balsami semen ex aqua potum, aut ex melle delinctum. Aut aristolochiæ radix ex aqua potui data, aut ruta ex mulsâ itidem pota.

Ad acutam febrem. Cap. 73

Peponis domestici succus, aut cucurbitæ ramentorum succus illitus benefacit: aut rosæ ex oleo: aut plantago in cataplasmatibus modum imposita iuuant.

Præsagium in febricitantibus. Cap. 74

Rosaceo prius inunge, & apij semen tritum superda, deinde stupam rotundam instar rotæ cordi superimponito, luteumq; oui infundito, & reticulis cōtegito, tum si fiat oui dispersio, mortē adesse scito, hoc enim ipsa anima facere dicitur.

Ad glutinanda uulnera. Cap. 75

Radix graminis cōtusa, ut aridum medicamentum imponatur.

Curatio ad dolorem auris. Cap. 76

Amygdalinum oleum in aures instilletur: aut ex nucibus oleum: aut laureum: aut balsaminum: aut dracunculi herbæ seminis succus ex oleo infusus. Aut herbæ urceolaris succus ex oleo rosaceo tepidus instilletur. Aut ruta uirens oleo incocta & tepida in aurem mittatur: aut myrrha ex melle tepida. Aut ruta ex mulieris, quæ marem peperit, lacte, tepefiat, & instillet. Aut ex allio expressum succum in aurem mittito: aut porri succum tepidum: aut saponi tepesactā: aut porri succum mellis admistum. Aut oleum oro continens in aurem inspuo. Aut cucurbitæ succū ex rosaceo instillato.

Ad scabiem priuatumq;. Cap. 77

Vlmi folia arida trita in balneo inspergito, aut sulphure ignem non experto & syluestri uia, & arsenico, & sandaracha ex oleo & aceto in balneo oblinito. Aliud. Myrrha ex muliebri lacte curē oblinito, aut dulcis radicis succum ex dulci uino potui offerro. Aut oua gallinæ integrā in acetum acerrimū demitte per diem noctemq;: quæ si trita

fuerint, iplis cum putaminibus in eodē aceto contritis adijce sulphuris ignem non experti, arsenici scissilis, uulæ taminia, cerusæ, spumæ argenti, nerij succi, singulorum unciam unam, olei ueteris quantum satis est: omnibus contritis obline in balneo.

Remedia ad stomachi uitia. Cap. 78

Ex folijs calaminthæ uiuentibus & hordeacea farina cataplasma conficito.

Ad cruditatem, inflationesq; uentriculi, quisquis hoc usus fuerit, statim esurit. Cap. 79

Accipe aneforum drachi. duodecim, piperis albi, libystici, amij, petroselini, fœniculi, singulorum drach. sex: hæc tusa & creta melle cocto comprehendere, exhibe drachmam unam.

Ad esuantem uentriculum nec cibi tenacem. Cap. 80

Laetuca succum ex dulci uino potui dato, nec uomet amplius.

Ad dolorem uentriculi. Cap. 81

Lac, in quo carbones quemi extincti sunt, laboranti propinato.

Ad acorem in uentriculo. Cap. 82

Trisago ex uino pota acore liberat.

Ad inflationem uentriculi. Cap. 83

Piperis, baccarū lauri, cumini, aneli, pares portiones confusas & cribratas ex temperato uino ie iuno dabis ligulæ unius mensura per triduum, aut anesum ieiunus manducato.

Ad oculos fluctione laborantes. Cap. 84

Fœniculi succus per triduum illitus, aut thus ex melle & lacte, aut cætarij succus ex melle, aut folia herbæ quinq; folij ex melle imposita benefaciūt.

Ad caliginem oculorum. Cap. 85

Cucurbitæ ramentorū succus superdatus proficit.

Ad albuginem oculorum. Cap. 86

Alterci folia cum polenta superdato. Lignum balsami quoq; ex muliebris lacte illinito. Aut tutā uiridem imponito. Herba præterea pulicaris ex muliebris lacte, aut calami uiuentium foliorum succus illitu prodest.

Ad oculorum uertiginem remouendam. Cap. 87

* Oleæ folia contunde & succum expressum illine, atq; miraberis.

Ad oculorum fluctionem cataplasma. Cap. 88

Portulacam cum croco & adipe suillo contere, aut apij folia cum polenta: in magnis autem fluctionibus rosas fertulamq; cum amylo coctas oculis imponito.

Ad dentium dolorem. Cap. 89

Aceto nigellam habēte os collue, aut oleo gallas incoctas habente, aut aceto, in quo platani globuli incocti sint, aut quinq; folij radix. Item peucedani radix trita & combusta illinatur. Aut malicorij rosarumq; decoctio os collue.

Ad dentium uulnus. Cap. 90

Accipe nitri, sepiæ testæ, myrrhæ, singulorum unciam unam, tritis utere.

Aridum medicamen, quod humidum os eruentumq; deterget, gingiuarum carnem instaurat, dentesq; dealbat. Cap. 91

Accipe nitri combusti, myrrhæ troglodytidis, sepiarū testæ, singulorū unciam unam, rosarū aridarum unc. quatuor, tritis & cretis utere, addito etiam iridis uncia unam: huius effectū miraberis.

Ad lateris dolorem. Cap. 92

Virentis brassicæ caules cum radicibus combustos adipe suilla cōprehende, & utere: ualentissimum remediū est. Aut apij semen decoctū, donec tertia pars relicta sit, potui da: uehementer iuuat.

Ad internos aut tumores. Cap. 93

Amaranthum aqua maceratum mane uesperiq; propina.

Ad lienem cataplasma ualde bonum. Cap. 94

Accipe apij, sinapi, baccas lauri bene cōtritas & cortice liberatas, nuces uirides parū contunde, deinde omnia in pilam cōiecta uehementius contundito, mox extracta accerrimo aceto per triduum macerato, & omnia in unū cōfusa tyberiadis succo incoquito, donec cataplasma fiat, deinde leni superimponito ā matutina usq; ad octauā horam, aluo tamen prius subducta: medicamenti effectū miraberis. Aliud. Ad lienem experientia comprobatum. Ficus nouellæ arboris cortice uiridem detrahit, & cum cinere permisceto & calefacito.

Ad tertianam febrem. Cap. 95

Mel cum scammonia semel potum curat.

Ad quartanam. Cap. 96

Accipe piper contritū, laureas baccas, cumini mastichen, myrrham, thus mundum, singula separatim trita in unum cōmisce, & mellis boni quod satis sit, adijce, & per quatrimum imponito.

Ad sanguinis ex naribus profusionem. Cap. 97

Oui putamē integrum cōburito, & liquore ex eo extractū cum fisisili arsenico permisceto, in naresq; patientis immittito: si arsenicū presto nō fuerit, solus oui liquor suffecerit. Aliud. Capræ fœminæ fetas uitas & tritas & myrrhā similiter tritā cū fetisq; caprinis mistā in nares sufflato, si uiri fuerint, cum charta, si fœminæ, cum alio quopiā: qua parte autem sanguis erumpit, archissime deligato.

Ad uolentias sanguinis eruptiones. Cap. 98

Gallas mola tritas, & malicorium, & punicæ mali grana confusa & mista cū oleo scissili & melle ac bene subacta mane uesperiq; propinato, ut mel gallarum.

Ad uentris tormina & inflationes. Cap. 99

Accipe piperis, rutæ, zingiberis, pares portiones, & tritas ex aqua calida propinato, aut artemisiam tusam, cretamq; dato: aut nitrumustum tritumq; ex humore aliquo exhibeto.

Vt ne boues egrotent. Cap. 100

Cerui cornu super Panis dei facillum ponito, candelamq; desuper accendito, & ne interdiu accensam obliuione demittito, & in tempore sanctum Demusarim inuocato, ac tollito: armēta tua & uitam custodient.

Vt ne porci egrotent. Cap. 101

Rhamni radicem tritam in aquam, ubi sese proluunt sues, projicito.

Ad carnem glutinandam. Cap. 102

Terræ lumbricos frictos tritosq; inspergito.

Plagaram curatio. Cap. 103

Myrrham & aloem tritam inspergito: Aut resinam piceam, uel & mastichen & hederæ lachrymā, ex his factum emplastrum imponito: Aut hircina xungia plagam obline, & capræ nigræ cornu insperge

perge. Aliud. Aut costum, spicam, cinnamum, zingiber, cuminum, singulorum parem modum terito, cū pice subigito & imponito: Aut panis crustam aridam tusam, & uino oleoq; subactā superdato quotidie per uices mutans.

Adequorum scabiem. Cap. 104

Anguem discindito, eiusq; adipem capiens ligno equi ungularum oras inungito.

Ad somnum conciliandum. Cap. 105

In lauri folijs hæc elementa inscribito, faciensq; stragulis cervicali eo nesciente subijcito. f. s. x. s. q. d.

Vt ne homo noctu somniet. Cap. 106

Rutæ semē in cervicali ipsius nescientis suspendito, nullasq; in somnis imagines uidebit.

Ad peccus. Cap. 107

Cum ovo arsenicum fisisse misceto, & piper, & hordei farinam, & lauri baccas, pineosq; nucleos, & exhibeto. Aliud. Allij accipe spicas septem, arsenici fisisis, piperis, utriusq; grana tredecim, bambacem, pini nucleum, ceræ modicum miscēs cum oui utello accipe frequenter.

Ad corrosos dentes. Cap. 108

Arsenicum, piper, caseum, calcem uiuam aceto macera, & appone.

Auxilium ad renum uitia. Cap. 109

* Accipe pulegium, origanum, sampsūcum, ferpyllum, chamæmalum, absinthium, centaurium, lauri folia, cucumerem syluaticum, peponem: una omnia prius cōtusa aquæ incoquito, deinde cum melle oleo & sale decocti, quātū satis est, accipito.

Remedium ad coxendicis dolorem. Cap. 110

Accipe cucumeris syluestris radices, lauri folia, rutæ folia, absinthium, plantaginem, trifaginē, marrubium, calamintham, pulegium, origanum, thymum, lactucam, euphorbium, anethum, pyrethrum, uiuam taminiam: hæc omnia in aqua incoquito, deinde melle oleo & sale adiecto, per instrumentum admoueto.

Vt dentes putridi nigriq; albi reddantur. Cap. 111

Accipe salis contriti, ropi, sepiarum testæ pares portiones: omnibus in unum tritis dentes fricato, quos prius aceto puro collueris.

Cataplasma ad caput fluctione tentatum. Cap. 112

Hoc remedium præstat caput à fluctione tutū, neq; oculum unquā iniuria affici sinīt. accipe mastiches, myrrhæ, sarcocollæ, thuris, ladanī, nitri, ce russæ, terræ cimoliam, styracis, rosarum aridarum, singulorum unciam, saponis fanci libram, mellis tantundem, lupinorum amarorum decoctū quod satis est: omnia in unum misceto, & pro saponem in balneo utitor.

Pastillus de seminibus ad tussientes. Cap. 113

Accipe anesorum amarorum unciam, foeniculi seminis, alterci seminis, amij, singulorū drachmam, apij seminis drach. tres, opij drachmam: singula beneterito, & aquam paulatim tepidam infundito, donec sordium balnei spissitudo fiat: pastillos fabæ magnitudinis conficito, unumq; exhibeto, tussientibus nanq; prodest.

Ad iccoris uitia remedia experientia confirmata. Cap. 114

Gallarum cum papaueris capitulo coctarū ius

A in balneo potato, coniectus & in latus affectū faciens: aut hedere radicis decoctum cum uino propinato. Aliud. Baccas lauri septem, grana piperis septem trita ex uino in potum dato. Aliud. Aloes drac. iij. afari, costi, eupatorij, hedyfari, ferulæ campanæ, mastiches, croci, ocyini seminis, singulorum drach. duas. conterito, cribrato, & ex aqua temperata exhibeto.

Aliud iccori & uentriculo commodum. Cap. 115

Accipe lauri baccarum, cinnami boni, caryophyllorum, aloes, hedyfari, costi, singulorum drachmam, contrita & melle excepta ex uino uetere potui dato. Aliud. Accipe acori, seminis lini, zingiberis, rutæ foliorum molliū singulorū drachmam, aneforum drach. iij. ex mulla dato. Aliud. B Mel cū pane mistū calidū emplastri modo imponito: aut absinthij ligulam unā ex temperato melle potui offer, & super secur agrotus decumbat.

Ad linguam fluctione laborantem. Cap. 116

Cynaræ folijs contulis ex melle linguam perungito: aut uenam partis, unde fluuit materia, incidito, & bene faciet.

Ad oris ariditatem. Cap. 117

Palmularum ficorumq; decocto per pennam illinito & contineto.

Ad labia scissa. Cap. 118

Lini semen ex melle contritum imponito.

Ad eos, quibus menti pili decidunt, quos Greci appellant spanoa pogonas, hoc est, raribarbos. Cap. 119

C Accipe piperis, euphorbij, pyrethri, singulorū unciam, calami foliorum molliorum succū, muriani stercoris, olei per combustionem expressi: trita omnia affricato, & assidue radito.

Vomitiorum medicamentum, quod mystri mensura exhibetur. Cap. 120

Aphronitrum album in aquam tepidam conijce, quoad dissolutum sit, & modicum olei adijce, potandumq; exhibe.

Reprimentia uomitionum. Cap. 121

Menta tusa creta, & rosaceo admista nares percutisq; illinito. Aliud. Palmulas thebaicas, & mentæ ramulos aquæ duorum scyphorum mensura incoquito, quoad sordium balnei temperatura fiat, mediam partem propinato. Aliud. Palmæ glandium contusarum, quod sufficit, accipe, uini myrtini modicum instillato, deinde exceptas ex mulso, aut aquæ hemina exhibeto.

Ad languinem uomientes. Cap. 122

Iunci odorati ex aqua decoctum propinato.

Ad citandum uomitum pituitæ. Cap. 123

D Viridem mentam, aut siccam ex aqua temperata bibito: Vt facile autē uomat, sampsuci folia potui, raphani uero semē elui dato: pituitam multam uomitur ei jciat.

Compositio pilularum purgantium pituitam. Cap. 124

Accipe aloes unc. sex, mastiches, absinthij succi, utriusq; unc. duas, cucurbitulæ syluaticæ, unc. quatuor: dentur pilulæ nouem & uiginti.

Ad oris stomachi uel cordis uitio uexatos. Cap. 125

Lentem cum spanthæo, palmulis, & uino Mendisio elixam potui offerito:

Ad dolorem oris stomachi, uel cordis.

Herbam sanguinariam curioſe tritā, aut mala, aut cotonea elixa contritaꝝ roſaceo cerato comprehendē in modum cataplaſmatis imponito: aut portulacam roſeo cērato, aut myrteo exceptā ſuperdato. Aliud admirabile experientia comprobatum. Accipe feminis lini heminas quatuor, & quæ heminas ſeptem: elixato, & utitor: hoc medicamentum ſanitatē creat: neq; enim ægrotus in peius ruet, ſed in melius proficiet.

Paſtillus ad ſpiritus difficultate laborantes & diu tuſſientes ſuſſitu proficiens. Cap. 126

Accipe naſturtij, ſinapis, abrotoni, rutæ ſyluati cæ, ſandarachæ, ſingulorum unciam, terito, & ex aqua factis paſtillis accurate utitor.

Ad difficultatem ſpiritus & ſanguineum ſputum. Cap. 127

Thymum cum pipere tuſum, & melle exceptū deſinctui dato, ſtudioſeq; utitor: ualde enim efficax eſt. Aliud. Porrorum capita melli incocta ieiunus edito. Aut rutæ aridæ, mentæ utriuſq; unc. quatuor, cum melle terito, et ceratia duo cubitum eunt ex aqua temperata propinato: luuant autē ægre ſpirantes & piſtacia eſui data.

Ad cruentum ſputum. Cap. 128

Accipe ſymphytij, maſtiche ruſſæ, utriuſq; drach. quatuor, lemnij ſigilli, balauſtiorū, utriuſq; drach. duas, terito & cribrato, & ex aceto mulſo ligulam potiui dato. Aliud expertum. Lemnij ſigilli unciam, terræ, quæ aſtrum dicitur, unc. ij. coralliꝝ tantundem. dato ex aceto mulſo puro heminā unam. mane & ueſperi hoc utere. Aliud. Acaciæ ruſſæ, amyli medicinalis pares portiones terito, & ex aqua temperata potiui dato ligulas quinq;.

Ad febrem ardentem. Cap. 129

Semperuiui & aneli folia quinq; aut ſeptē accipito, & oleo roſaceo incoquito, & ex eo à capite uſq; ad pedis ueſtigium perungito, & demiraberis: aut oleo, in quo pīethri radix macerata fuerit, inungito: hoc enim ſudores mouet, & diurnos rigores diſcutit, & corporis partes refrigeratas aut reſolutas curat. Aliud. Lauri baccas & thymum ex uino terito & illinito, ueſtibꝯq; contegito: ſudabit enim.

Ad ium genitalium & ueteres affeſus. Cap. 130

Calaminthā tuſam cribratamq; in pilam conijce, & melle exceptā decoque uſq; ad cataplaſmatis ſpiſſitudinem, & tenui linteolo illinito imponito, & ſcācia deligato: à multis probatum eſt. Aliud ad genitalium confirmationē & renū, ſed quempiam ne curato anteq; mercedē acceperis. à multis enim expertū eſt. accipe zingiberis drach. quatuor, herbe ſabinæ, pipēris albi utriuſq; drach. mam ex mulſa exhibeto. Aliud. Picis aridæ, telephij, colophoniæ, maſtiche, nītri albi pares portiones conterito, & aridum medicamentum facito: & locum prius lotum & adhuc calentem liquida pice oblinito, & aridum medicamen inſpergito, ſuperq; imponito, & bene deligato.

Ad diſcutiendos genuum fluxiones. Cap. 131

Capriſci contritæ ſucco perſtricato, aut radicis ſuccum in balneo affricato. Aut ſalem columbi-

numq; ſinum terens ex oleo inungito.

Cataplaſma ad pedum dolorem ex offenſione, aut caſu aut alio quo alio uiolento. Cap. 132

Accipe ſalis uſti, origani, cineris ſarmentorum uitium pares portiones, uitellos ouorū duos; aut tres cum uino miſta ſuperimponito.

Ad ſcabros ungues & paronychia diuini auxilium. Cap. 133

Vnguibus ex caſu reuulſis, & uitio, quod paronychia grace dicitur, affectis ſachar tritum & in puluiſculum redactum, ac inſperſum ſuccurrit ſcabros autem ungues mundabis, ſi ſulphur ignem non expertum & oui luteum æqua portione miſcebis, atq; ex aceto impoſueris.

Ad ambuſta. Cap. 134

Accipe argenti ſumæ, croci utriuſq; unc. duas, ouorum aſſatorū uitellos ponderis unc. quatuor, roſacei, quod ſufficit. Aliud. Linteoli uſti cinerē cū roſaceo miſce, & cera anchuſæ adiecta utere.

Ad ſanguinis ex quauis ſcæ eruptionem. Cap. 135

Accipe ſoreos, atramenti ſutorij, aluminis, chalcitidis, myſios, gypſi, gummi, ſingulorū drachmas octo, tritis utitor: ualde bonum eſt, & experientie teſtimonium comprobatum. Aliud. Chalcitidis drach. vi. reſinæ frictæ drach. iij. pulueris thuris drach. duas. arido medicamine utitor.

Ad impetigines expertum. Cap. 136

Ex his conſtat: thuris maſculi, zingiberis, aloes, ſulphuris ignem non experti, ſingulorum drach. binas: aceto accepta & prius trita pāniculo laneo illinito. Aliud. Ammoniæ guttæ, alcyoniꝝ, ſulphuris ignem non experti pares portiones contere, & utere.

Ad dealbandam faciem. Cap. 137

Accipe alcyonium combuſtum, & tritum cum melle & farina miſce, & deterge. Aliud. Lyſimum udon terens ex aceto in ſole illinito. Aut olarum florem terito ex aceto, deinde locum panis perſtrictum, quoad rubefcat, in ſole inungito. Ut facies munda fiat, butyro cum ſapone mulſo faciem illine.

Ad dolorem uteri remediū ſanctorum argentum non poſſidentium. Cap. 138

Aſarum cum pulegio potiui offerito.

Paxamadam uocaturum purgatoria. Cap. 139

Accipe ſcammoniæ drach. ij. aut iij. maſtiche drach. iij. apij ſeminis drach. duas, polypodij drach. iij. cinamomi drach. unam, ſermēti mundi libram unam. arida permiſce, & ſubige diligenter.

Ad necandos culices. Cap. 140

Ex nigella & ſutorio atramēto ſuffimentū facito,

Ad abigendos ſerpentes. Cap. 141

Galbanum, cerui cornu, caprinæ ungulas, & liſij radicem ſuffito. Ad morſum uero ſerpentis ſalporumq; imponitur utiliter.

Ad fugandos pulices. Cap. 142

Sylueſtris cucumeris foliorū decocto domum conſpergito.

Ad difficultatem urine iumentorum. Cap. 143

Salsarum oliuarum quod intus ligneū eſt, conterito, & contegens per dies quinq; ſuffumigato.

Ad iſtum calami. Cap. 144

Radiciſ calami combuſtæ cinerē ſuperimponito.

Ad morbum comitalem ualde efficax. Cap. 145

Coturnicum cerebrum ex unguento myrteo tritum stanneo uase reponito, & cum quempiam morbo comitali prolapsum uideris, eo faciem illinito. admiraberis enim huiusce naturalis auxilij efficaciam: nam statim ægrotus confurget.

Ad appetentiam cibi excitandam. Cap. 146

Accipe myrrham, thus, ammoniacum, multichen, & ex oui albo tritis pectus uisceraq; oblinito, & stupam superdato.

Ad hirudines deuoratas. Cap. 147

Eos, qui hirudines deuorauerunt, aduersus solem constituito: & locum, ubi inhæreant, animaduertito, & garum ipsis infillato. statim enim locū relinquunt, & expuntur. aut acetum cum butyro multum, in quo ferrum candens extinctum sit, potui dato: hirudines enim eijciet. aut eum, qui hirudinem deuorauit, in calidam aquam mento tenus demittito: phialam uero frigidæ plenam ori eius admoüeto, sed potui ne dato: statim hirudo exibit. Aliud. Hirudines deuoratas calidum acetū absorptū excutit, aut succus syriacus epotus, aut suffusio cimices.

Ad apum ictus. Cap. 148

Succus maluæ ab apibus ictos indolentes reddit.

Ad serpentium morsus. Cap. 149

Cornu ceruinum ustum & ex aceto tritum illinito: aut furni fuliginem: aut calami radices, & cicercæ, & baccas cupressi, & cornu cerui combusta omnia tritaq; in unum misceto, & ex aceto ac porro propinato.

Ad inflammationes à uena incisione factas, & duritias humerorum, & deuotiones, & sanguinis concreciones.

Caput 150

Fermento triticeo, cum axungia subacto summo studio utere: probatum enim est.

Ad hydropicos. Cap. 151

Stercus bubulum accipito, si mas ægrotet, maris, si femina, sceminae, in ollam nouam conijce, contege, operculum luto, ne diffusetur, obline: ollam deinde super cinerem uiuæ calcis per dies septem statue: octauo die detecta olla sterces exime: & aridum medicamentum uitreo uase reponet: cum uiti uoles, tres ligulas ex uino per septem dies exhibeto, sed in uino rutæ feruefacias: hæc potio bene facit, etiam si tumores adsint, & oedemata, rescicat, euacuatq; per lotiū: ægrotus autem non potest per totum diem, nisi iter: expertum nanq; est.

Ut uinum odii sit, & quomodo cauenda ebrietas. Cap. 152

Vinum, in quo anguilla suffocata sit, potui exhibiti, uini odii parit: idem præstat & uua inferue facta. si ritus ab ebrietate & morbo custodiri uelis, folia rutæ edito: finit eadem capitis dolorem ex uino: idem & acorus facit in cibum sumpta, & thebaica puluis ebrietate nō tentatur, qui prius aut septem, aut nouem, aut undecim amara amygdala ederit. ita est qui pulmonem oris elixum seu-nus ederit, quātūmuis bibat, ebrietatē nō sentiet.

Ut quis ex uino tantum uini scypho ebrius fiat. Cap. 153

Sarmentorum uiridis aut aridæ uitis modicum comburens, in phiala, ubi uinum est, extinguito: statim ebrietate corripietur.

Ad lentulas in facie. Cap. 154

Baccarum lauri interiora ex melle trita illinito: aut nucleū pineū mellis incoctū oculis imposito.

Ad infantium procidentem sedem. Cap. 155

Fabrorum aqua, in qua candens ferrum extinguit, calefacta subluo, deinde cochleam combustam & in puluisculum redactam inspergito.

Ad gingiuas pueri, & dentes orientes. Cap. 156

Rosarū floribus tritis ex melle illinito, aut ouis cerebro ex melle, aut butyro ex melle.

Ad lac multum creandum. Cap. 157

Sesamifemen tritum ex dulci uino potum, aut titane elixa cum sceniculo absorpta, aut nasturtiū cum brassica potum.

Ad exustiones per hyemem. Cap. 158

Muria foueto: ex elixa lente & micis panis cum rosaceo tritis cataplasma facito.

Ad aquosum ramicem. Cap. 159

Plumbaginē cum sulphure, & aceto pauco, & oleo decoque, & illine locū. Aliud. Veteres nuges putridas contritas in mortario accipe, & in unge. Aliud. Acetū potui dato, & cerui cornu ustū ad cataplasmatas modū imposito. Aut ex argenti spuma cū aceto & oleo mista ad solem perungito.

Ad uulnus incurabile in quavis corporis parte. Cap. 160

Buglosson herbam euellito, & succis radices curiose lotas in pila conterito, suillam axungiam adijcito, ac bene emolliens uulnere imposito.

Ad uomitum. Cap. 161

Accipe apij radices quinq; sceniculi radices teneras quatuor, anelli drachmam, acetum, mel, & crocum merum, omnia sine croco decoquantur & post cocturam crocum inijciatur, deturq; phialæ dimidium.

Ad aphthas, hoc est, oris ulcera. Cap. 162

Oliuæ siccae manducantur, aut staphides agrestes a ceto incoquantur, & ex eo os colluatur.

Ad talpas. Cap. 163

Locum prius mulso eluito, deinde bubulum fel inijcito, & leporis stercus, aut quod ex sapone confectum est: aut rutæ succum in foramina infillato, aut aristolochiā tritam in ipsa foramina cum aceto infundito.

De uiribus rutæ, rhamni, & mentæ. Cap. 164

Ruta in primis esui potuiq; data usum acuit, tēneris appetentiam extinguit, capitis dolorem leuat, si quis teneris eius folijs capitis ossa contegat: succus præterea rutæ cum sceniculi succo & melle commistus atq; illitus hebetem uisum acutiorem reddit. Idem præstat & seminis rhamni succus ex mulso illitus. Menta quoq; cum polenta in cataplasmatas modum imposita abscessus sanat.

Ad supprimendum sanguinem. Cap. 165

Beronicem mellis super prunas cocti plenam edendam apponito: & brassicæ ocymiq; seminis utriusq; grana sex trita potui dato ex uino mulseri à multi sanguinis profluuiō male habitæ.

Presagium de egrotante. Cap. 166

Salicis tenera folia cōtusa illinito, si roseus fiet, euadet: si uiridis, morietur.

Ad impediendam uenere. Cap. 167

Erucam sacerdotes edunt & rutam & uiticem:

erucæ

eruca igitur semen ex melle, aut cum fœnogræco ieiuno illitum arrigi non finit.

Ad dolorem oculorum. Cap. 168

Crocum tritum & cum liquore, qui à rosa stillauit, fermentatum illinito.

Ad capitis dolorem. Cap. 169

Si hæc adfint signa, oculorum tenebræ, capitis ipsius dolor, auris sonus, nasi obstructio, summo mane oculorum lachrymæ, nonnullis & oculi caligant, quibus hæc adfunt, caput hunc in modum purgato, origano hyssopo et sale nares perficatio: neq; in posterum caput dolebit: qsi neglexeris, morbi huiusmodi sequentur: obtusus uisus, aurium sonus, capillorum casus, & dentium dolor.

De pectoris morbis. Cap. 170

Cum pectus aliquod uitium passurum est, in primis humiditate in ipso sentire uidetur: sin coctæ, crudis abundat humoribus, æstuationem sitimq; habet, ipsius lingua aspera est & spumans, & singulis horis saliuæ decurrit. conuenit autem ipsum a coena uomere; aut summo mane stomachum purgare præsumptis raphani radiculis, aut sinapi uirenti, aut eruca, aut nasturtio ex aqua tepida, et ita tim uomens sanabitur. si negligenter se gesserit, in spiritus difficultatem, & lateris dolores, & febres acutas incidet, atq; penitus somno carebit.

De uentris morbis. Cap. 171

Quando in uentre uitium aliquod suborturum est, primum tormina doloresq; in uentre sentiuntur: & alui suppressio, & excretio, & in ipso cibi potusq; perturbantur, & amari uidentur, & grauitas in genubus, & circa lumbos renesq; dolores sunt, & omnino febricitabit. his ita se habentibus simplicibus medicinis purgare oportet: enicū igitur contusum, & aqua dissolutum potui dato: aut brasica, aut betæ succum melle cōditum adiecto modico salis propinat, & miraberis: si res neglecta fuerit, difficultas intestinorum, desidendi immoderata cupiditas, & dorsi dolores impendent.

Ad grauem auditum, & aurium sonum. Cap. 172

Nitri spumam in acetum conijce, oleumq; roseum & uinum infunde, & capitis posteriora inunge. Aliud. Nigri ueratri radicem in aure conijce, & sanabitur: expertum enim est.

Ad custodiendam uitam. Cap. 173

Centaurij decocto palmites uitis conspergito, hoc canes, uulpes, & coeli uolatilia propulsat.

Ad steriles. Cap. 174

Os cordis cerui accipe, tere, & potui da mulieri: & uidebis gloriam dei.

Ad lumbricos mirabile remedium. Cap. 175

Nigellam tritam ex grano potui dato.

Ad dignoscendum nas ne an fœmina sterilis sit. Cap. 176

Lentem in utriusq; urinam separatim conijce: & utrius lens germinabit, ille est filium creans, cuius uero lens non germinat, ille sterilis est.

Ad rigorem. Cap. 177

Scribe in tribus malis aut pluribus, aut ita dicto, fauus, drausus, danonus, danubius, & eiusi dato.

Confectio garitoachi martyropolis. Cap. 178

Accipe frustulorum panis non fermentati, non conditi, puti efacti libram nigellæ tzaricam, semi

A contusam mentam, calaminthā bunisam, aridam, utraq; semi libram pondere, rutæ, syluestris thymbræ, fœniculi, singulorum tramia quadraginta, anesi tramia triginta, nanachuam tramia quadraginta, uuarum passerum pinguium maturarum semilibram, palmularum mundarum tzaricam, mellis ueri hilari melissi semilibram, sacchari cantij tzaricam, rosarum aridarum, aut humoris ab ipsis per ignem extracti tramia centū. hæc in dolio cum aqua conijcienda sunt, soliq; per quadraginta dies exponenda, ipsis uero adijcere oportet in puro lineteolo deligata ligni aloes tramia quinq; spicæ tramia septē, caryophyllorum tramia duo, croci tramia tria, mastiches, thuris, utriusq; tramia decem, struthij corticis tramia quindecim, musci tramiū ampar tramia duo. omnia lineteolo inclusa in dolio medium succum demittito: & per quadraginta dies quotidie terito, & exprimito suspendens uidelicet in dolio in medio succo: & post quadraginta dies aquam succo superfluitantē colligito, & in altero uase reponito, & in succū alterā aquā inijcito, & utraq; insolato: sed postq; totū ius coactum fuerit in altero uase, tunc in nitido cacabo, aut in olla usq; ad tertias decoquito, & cotoneis maturis impleto: lineteolum autem nunquam de medio garo eximito: & optimum garum, omnibusq; hominibus utile conficies.

De capitis dolore Barnabe monachi. Cap. 179

Accipe farinā sabaceam, quantum manu capere potes, & mastiches, cuminiq; parum, in unum miscere oportet cū succo malorum cotoneorum, emplastrum facito, & membrana illitū fronti imponito.

Ad urine difficultatem. Cap. 180

Vnguentum optimum in urinarium iter infundito, statim urinam reddet: aut mel, & syluestrem canabim in unum misce, & perinae impone: aut muscum in urinarium meatum immitte.

Ad sanguinis e naribus profluuium. Cap. 181

Canabina folia trita & arida in narem sufflato: aut pannum lineum combustum ex acri aceto in nares immittito.

Ad uteros. Cap. 182

Obsonium e iusculo, & amanetarium uerum, & cardid usta ex uino ueteri potui dato.

Ne arbor fructum amittat. Cap. 183

Lilij radicem arbori suspēdito: ibiq; fructus habebit, & non cadet.

Ad uulnus. Cap. 184

Cor cum pelle & cornu cerui combure, & ex oleo inunge.

Ad stomachum. Cap. 185

Rutam & thymbram cum ouo, & cuminum, & mentæ radices potui dato.

Ad impetigines. Cap. 186

Pipere trito ex muliebri lacte inijgit, & sanabit.

Ad dolorem dentium. Cap. 187

Ouorum putamina, sepiam, & oleum misceto, & coquito, donec tertia pars relinquatur, & tepidum ore contineo.

Ad lumbricos uentris. Cap. 188

Cornu cerui ramenta ex uino ueteri potui dato à balneo.

Ad irina difficultatem. Cap. 189

Coriandrū, mentā, & aquam cum melle decoquito, quoad tertia pars superfit, et in potū offertur.

Ad uulnus dulce. Cap. 190

Suillū finum cum oleo & acri aceto misceto, & locum prius setaceo panno excoriatum inungito.

Ad dolorem lateris. Cap. 191

Paliuri radicē uino incoquito, donec tertia pars remaneat, & à balneo potui exhibeto.

Ad iecur & stomachum. Cap. 192

Accipe aloes & spicā utriusq; miliarisū, & ex uino à balneo propinato.

Ad conciliandum somnum. Cap. 193

Caprinum finum cum trifagine ad luti spissitudinem misceto, & faciem oblinito.

Ad tussim. Cap. 194

Raphani semen & foeniculi ex melle potui dato.

Ad cordis dolorem. Cap. 195

Rutam, & lini foeniculicq; semen cordi imposito.

Ad lumbricos alium occupantes. Cap. 196

Lupinos, lauri baccas, taurinum fel misceto, & umbilico superdato.

Ad hemorrhoidas. Cap. 197

Telutudinis testa suffita bene facit.

Ad exustionem. Cap. 198

Ouorum afforum uitellos in fartagine combure, & in modum emplastri impone.

Ad priuritum. Cap. 199

Garum, sulfur ignem non expertum, & oleum misce, & inunge: effectum miraberis.

Ad morbum regium. Cap. 200

Chrysolachani semen, mel, & crocum confundito, & in lectulo cubantem illinito: bene facit.

Ad uermes. Cap. 201

Chamaeleonis radicē contunde, & urticae summitates contritas iniice.

Ad tussim. Cap. 202

Foeniculi radices contritas ieiuno potui dato: admirabile remedium est.

Ad comam. Cap. 203

Maluam, & saluā radicē conterito diligenter, & in uas cum generoso uino conijcito, à balneoq; comam illinito.

Ad aurium dolores. Cap. 204

Rubi succus expressus, tepefactus, & in aurem infusus dolorem finit.

Ad regium morbum. Cap. 205

Chrysolachani contusi, mellis, utriusq; ligulam unam, ex uino calido ieiuno exhibe. Aliud ualde bonum. In dextram aurem facienti tenuem uenam cedito, & sanguine effluente utilitatem miraberis: si lienis uero doleat, idem facito in sinistram latus facienti.

Ad iocinosos, lienosos, & à stomacho laborantes praesentissimum remedium. Cap. 206

Vitici grana eius potuiq; ex uino mane uespereq; exhibeto. Aliud. Apij, & petroselinī macedonici semen, & cicer, & uiticis semen, omnia cōterito, & ex uino calido potui dato.

Remedia ad renum uitia. Cap. 207

Erucae, nasturtij, raphani semina conterito, & melle attico comprehendito, & ex uino uetere drachmam potui concedito.

Galen.

A Basilij icti melitinoi de ratione uictus ad regium notarium grammaticum. Confectio uini perspicui & cocconi. Cap. 208

Dolium uino impleto, quantum fuerint mensuræ uiginti, & ex ipso mēsuras duas accipe, & in lapideam ollam conijce, & adde feminis foeniculi, lini, anesi, singulorum miliaria centū, cum his bene feruefacere oportet, et ex sacculo percolare, et sextarium in dolū mittere: deinde accipe triplicidij miliaria centum. caryophyllorū miliaria quinq;. croci miliarium. cyperi, ligni aloes utriusq; miliaria quinq;. omnia in unū trita & cribrata linteolo inuoluito, & in medio dolio statuito, atq; utitor.

Eiusdem roboratio stomachi pituitæ plenum & dolorem capiti inferentem. Cap. 209

Te oportet singulis diebus rosei mellis miliaria uiginti accipere. apij seminis miliarū unum. anesi miliarū semis. & ieiunare usq; ad meridiē, & tunc gustare. nā propterea ita te facere statuius, quoniam rosa stomachum confirmat, mastiche calefacit, foeniculū & apium, si in iecinore ac liene multitudinem atrorū succorū offenderint, detrahunt, & per lotium eijciunt absq; molestia: anesum uero, eo quod flatus à uentre disijcit, stomachūq; corroborat. iccirco te usq; ad meridiem cibo abstinere precepimus, ut ne alter morbus appareret, utq; uis herbarū diutius in uentriculo moraretur. cum uero decem dies praterierint, eundem ordinem adhibe obseruato, cum roseo sacharo, ut stomacho robur addatur, uisusq; indolenter. Fecimus autem & de alimento sermonem hunc in modum.

Ratio uictus in cibis & ieiunio, & secundum menses dieta.

Caput 210

Primo die amygdala amara decem cum pane & uino, quantum satis sit, te edere cōuenit. Secūdo die mel cum pane & uino, quod sufficiat, edito: Tercio die agni anniculi carne uescaris, eius scapulam elixā igne torreto, cū pane biscocto & uino, quod satis, edito: Quarto die oryzam solam aquæ incoctam addito melle cum pane & uino, quantum sufficit, edito: Quinto die grana punici mali, amygdala, allū cum dauco, ficis aridis, & uuis pasis decoque, & uescere cum pane & uino, quod sufficiat: Sexto die similit carnē anniculā in fartagine cum dauco decoquito, & uescere, panis & uini, quod satis est, addito, ut uis punici mali obtundatur. frigida enim est, atq; ideo malū punicū adiectū fuit, ut quæ antea per quinq; dies assumpta fuerant, refrigerarentur. erant enim reuera calida: Septimo die carnē minutim cōcisam cū cicere & cōdimētis decoque, & uescere, quantum satis est: Octauo die carnē cum aceto, caricis, amygdalis, nucibus syriacis, croco, dauco, pasis uuis, cū alijs canibus cōcisīs, cum melle, q̄ satis sit, decoque, & uescere, cum uino, quantum sufficiat: Decimo autem die ciborum ieiunijq; ratio ita se habet, mali punici granum, quemadmodū & predicta, decoque, & cum uino, quod sufficiat, ede. Hæc est summi cibi ratio: semper tempore cœnæ menta ex melle utitor, ut cibi digerantur, & ne pituita uentriculus abūdet. quo autē bona ualitudine fruaris, uenam sine noxia causā ne secato. Quod si morbus caput tenta-

uerit, uenam caluariz secato, & extrahe sanguinis A
miliaria decem; hoc autē bis feceris & aprili men-
se, & septembri, per triduum ante & post abstinen-
tiam imperans. auxilium quoq; bis prædictis men-
sibus deuorato, & capitulis papaueris ut dormias
utere, caueasq; a coitu: quod si uelis, semel in septi-
mana post noctē mediam id facito. At iulio men-
se & augusto te per biduum uomere oportet: u-
erump, quoniam per diem unicū stomachus pur-
gari non potest. quando autem uomis, caueto, ne
aquā prius, aut postea biberis: dumq; uomis, o-
culos uelato, & deligato, stansq; uomito loco edito,
aut super fluuium, uomitū si sitias, tolera sitim, et
sobrius esto. Te uti lauauone oportet mense aprī-
li usq; in totum nouembrem: cæteris mensibus ab-
stineto. q; si lauari uolueris, semel tantum in septi-
mana lauato: idq; semper ieiunus: si sitias, tempe-
ratā aquā bibito, & balneū egressus oleo, & mulie-
ris lacte, quæ foeminā peperit, caput irrigato: per
noctē aut pedes calētī aqua cū furfuribus foueto.

Ad capitis dolorem. Cap. 211

Accipe amygdalorum lib. iij. seminū cucurbi-
tæ librā unam. oleo ab utriq; expressio capitis uer-
ticem, nares, pedes ac manus inungito.

Aduersus uini noxam. Cap. 212

Cotonea mala matura dulcia accipito, & mun-
dato, deinde succum exprime, & in uinū infunde.
Unctio experta ad artuum dolorem, manuum pedumq; intertrime-
ta, corruptelas, adustiones hyemis, & uenti manus pedesq;
ledentis, qui Sarracenia lingua tlen dicitur, com-
positio ita se habet. Cap. 213

* Accipe axungię anserinæ partes duas, & me-
dullam ceruorum iuuenum, & martasancem rap-
param, & mel super carbones decoctum & perco-
latū, pone in lapideū leberē, & seruefacito, quoad
prædicta pinguis tabescant, quibus adhuc calidis
martasancē iniicito, & cum prorsum refrixerint,
mel addito, & bene instar malagmatis subigito, &
ad ignē aut in furno inungito, & bene perficito:
tantisper autem inunge, donec dolor abscesserit.

Ad agiopsid, id est fistulas angulorum oculi. Cap. 214

Taurinū fel, & liquidam picem, & acetū in unū
miscens emplastrū conficito, & imponito, aut ru-
tæ folia cum chorygio in foramina immittito.

Ad uulnera incurabilia. Cap. 215

Ariore panij radicem in uinum dulce demitti-
to, & agro tanti potui dato.

Ad pulmonum inflammationes. Cap. 216

* Piperis grana quindecim, salis micas totidem
territo, & teaphen, illorum addito. in unumq; cogi-
to, & cum fimo gallinæ rufæ, atq; oleo inungito:
aut dauci semen, & nigellam, & porrum conterere,
& potui exhibe.

Ad talpas. Cap. 217

Accipe trifaginē & hordeaceam farinā cum
melle fermentato, & inungito & in modum cata-
plasmatis imponito.

Ad dolorem uentris & stomachi. Cap. 218

Thus cum uino antiquo in cacabum conficito,
et donec tertia pars superfit, decoquito, atq; in bal-
neo propinato: aut oleum & uinum perinde co-
quito, & tepidum in balneo potui dato.

Ad stomachi uita. Cap. 219

Cuminum & cinnamomū coterito, & myrrhā,
mastichem, & bliscum modicū adjicito, deinde
cocta & mista potui offerro: aut mentæ ramulos
tres, & grana punici mali, & palmulas propinato.

Ad debilitatem genium. Cap. 220

Lini semen & mel in aqua feruefacito, & cordi
in modum cataplasmatis mponito.

Ad dolorem lateris. Cap. 221

Ex cumino triticea farina & uino ueteri cata-
plasma facito, & cordi superdato.

Ad lienos. Cap. 222

Brafsicæ folia, ammoniacum, acre acetum, om-
nia misceto, conterito, & locum per triduum obli-
nito: aut platani folia aquæ incoquito, quoad ter-
tia pars superfit, & potui dato: aut brafsicæ folia
B igne torreto, & trita ex igne propinato.

Ad profluuium sanguinis muliebris. Cap. 223

Taurini cornu ramenta ex aqua pota sanguinis
profluuium sistunt: aut ulacem, & brafsicæ semi-
na, & scammoniam in unum misceto, & potanda
exhibeto.

Ad stomachi compressionem. Cap. 224

Accipe gallas tritas, & rhoi flores, aut mali co-
ria, & usq; ad tertiam partē decocta: aut scenigra-
ci melli incocti ius potui dato.

Ad coeliacos, hoc est uentriculosos. Cap. 225

Nasturtij semē in nouam ollam confice, & de-
coque, deinde ouum separatim elixa, & eius pu-
tamen detrahito, & ipsum diligenter conterito, &
nasturtij semini elixo adjicito, & unā feruefacito,
atq; si uelit ægrotans, edito, sin id non possit, a-
quam potato: aut taurinos renes frictos potui da-
to: aut ueterem caseum acri aceto incoctum iei-
uno esui dato.

Ad urine difficultatem. Cap. 226

Pagurum fluuiatilem conterito, & panniculo
expressum potui exhibeto: aut sceniculi radices
ad tertiam partem decoctas laboranti propinato.

Ad exterius prominentes aut tumores. Cap. 227

Viuiam calcem & recens arsenicum in unum
mista imponito.

Ad artuum dolores. Cap. 228

Quinqueneruium & scorpidium & acetum mo-
dicum misceto, & locum oblinito: aut sinapi & ca-
ricas in unum conterito, & in balneo superdato.

Ad dolorem genium. Cap. 229

Maluam, hordei farinam, lini semen unā conte-
re, & in sarragine cum oleo fricta loco impone.

Ad ossa fracta. Cap. 230

Accipe picē, thuris puluerem, palmulas, malue
florē, oui album: omnia mista imponito, et stupā
superaddita, calamis ac fasciā deligato, sanabitur.

Ad quartanam. Cap. 231

Vinū uetus trifaginē incoctā habēs ter potui dato

Ad morsum scorpij. Cap. 232

Testam igne candentem impone: aut alam ex
melle potui dato: aut humum respiciens, quem la-
pidem præmebas, eum imponito.

Ad ueneficia & pestifigia. Cap. 233

Caridion & latum cuminum & zochij radicem
ad tertiam partem decoque, & ex uino uetere po-
tui

ui da: getet & glaneum ossa. hec enim suffita da-
monas abigunt.

Vt mulier concipiat. Cap. 234

Leporis uterum frige, tritumq; assidue propi-
na, habeat autem & leporis sanguinem: aut uulpis
stercus cum seuo bubulo misce, & mulieris uirg-
genitalia inunge.

Ad foetum in utero mortuum. Cap. 235

Muliebri lac cum melle & radicibus amarant-
potui dato, & exibat.

Vt lac abundet. Cap. 236

Foeniculū & anethū cū melle & uino decoque,
& quotidie mammas obline: lacte mulier affluet.

Ad uteros. Cap. 237

Auem iugulato, & festucam lineo panniculo
intolutam intra auem condito, atq; ita elixato, &
ius potui dato: fuito uero auris oculos, & maneta-
rem uerum, & caridion ure, & propina.

De inuolutario mixtu in fratrīs. Cap. 238

Gallinæ gulam gutturi annexam conterito, &
urito, ac iterum diligenter terito, & ex uino uete-
re potui dato.

Ad roborandum penem. Cap. 239

Rapissimum tritum mellis admisceto, & panni-
culo attrito illitum peni circumdato.

Ad scabiem unguium. Cap. 240

Sinapi mentamq; ex aceto coctam imponito.

Ad intertrigines. Cap. 241

Muscum marinum aquæ marinæ incoquito, &
expresso humore imponito.

Ad podagram. Cap. 242

Accipe myrrham mur uocatam, herbamq; pu-
licarem, aut pyzercatum mystri mensura ex ace-
to, pedes illinito.

Ad roborandum stomachum. Cap. 243

* Accipe lignū aloes, acorū, cyperū, mastichem,
thus, nigellam, fœniculum, & spantos, ualde cōte-
rito, & in unū corpus redigito, & ex succo punici
mali & melle super carbones cocto potui offeras.

Ad stupum. Cap. 244

Rosaceum zupha, aut hyssopū, quod ad tussim
facit, & angustiam & dolorem pectoris, compo-
* tio hæc est. accipe manusiacorum drach. duas. una

* pia, uel zinzipha numero uiginti. zepistania, uel
myxia totidem, ficos aspr. dulces numero quin-
de

* cim. aut dulcē radicem semitritam mensura drach-
mæ. chachalis cōtusi, uel papaueris capitulorum

* drach. v. parefauia, uel polytrichi drach. ij. anafuen
uel dulcis anethi drach. duas. tolme caraus, uel apij

* seminis drach. duas. uuas passas, grana bona loga-
rices. s. zupha uel hyssopi drach. ij. rhazani, uel se-

* minis fœniculi drac. duas. uuas passas, granaq; mi-
sta lauato, & emoschafum ex aqua refrigera per

* diē unū & summo mane; ut elixatū cum prædicto
uidelicet logaricion unc. iij. & tātisper decoqua-

* tur, donec aquæ remaneat logarica una & semis,
& tunc percoletur, ut certe sciatur in ipsa nullam

remanere materiā, deinde sacchari logarici unam
addito, ut zupapion fiat: & quotidie unum potato

per dies octo, & oleum amygdalinum instillato.

Ad uomitum biliosum. Cap. 245

Bilem uomentibus huiusmodi cataplasma ad-

Galeni.

A hibendum est, quod ex his constat: palmulis, ficis,
gallis in uino aut posca incoctis & pane exceptis;
acacia præterea, hypocistis, & balaustis, & rhus ca-
taplasmati adijciant: itē cucurbitula magna cum
multa flamma stomacho si affigatur bene facit. ci-
bus paucus & crebro exhibendus est: uerum ad
atram bilem uomentes & stomachū inflatū spon-
gias aceto acerrimo calido imbutas adhibeto, aut
ex edera folijs uino incoctis cataplasma facito.

De singultu. Cap. 246

Singultus aut ex repletionē, aut ex inanitate,
aut ob acres humores stomachū mordentes exci-
tatur, quibus uomitu reiectis desinit. pleriq; autē,
si cōpositione ex tribus piperibus deuorata, mox
uinum biberint, singultire solent. cibo præterea in
mordacem qualitatem corrupto quidam singul-
tiant: uomitum sanē ob plenitudinē, aut morsum
singultientibus remedio esse inuenimus. calidi-
tatem ijs, qui ex refrigeratione: si uero ex humo-
rum copia singultus fiat, euacuare uehementius o-
portet, id sternutatio præstabit: sed ab euacuati-
one singultus sternutatio non curat. singultientibus
autē ruta ex uino danda est, aut nitru ex mulla, aut
seseli, aut daucū, aut cuminū, aut zingiber, aut ca-
lamintha, aut nardū gallicū: hæc singultibus ex ci-
bi corruptela, aut ex frigore, aut ex multitudine ci-
borum auxilia sunt. ad eos uero, qui ob frigiditū,
aut crassiorū succorū multitudinē singultiant ca-
storū ex posca potui datū bene facit: cuti quoq;
ex oleo uetere cucumerino illitū prodest: scillinū
C quoq; aut muscum acetum potum iuuat: itē spi-
ritus retentio magnifice singultum discutit.

Ad pedum intertrimenta, fissuras, & perionies. Cap. 247.

Rubrica uel sinopidis, & cymolia paribus por-
tionibus ex caprifici succo illinito. Aliud. Ede-
ram, calamintham & salem in aqua simul incoqui
to diligenter, ac pedes semel atq; iterum lauato, &
sanitatem recuperant. Aliud. Muriam crassam
calidæ aquæ admisceto, ex ea pedes ac perionies
foueto. Tertium, sal, cuminum, oleumq; miscean-
tur, & prius inunctos pedes illinito curiose: nam
per occultos sensibus meatus materia elabitur.

Ad podagram. Cap. 248

Semper uiui succo diligenter cocto utere. Aliud. *
Asinini stercoris succum asinino lacti, ac dulci ui-
no admisce, & illine. Aliud. Phocæ, leonis, lupi
aut uulpis corum si quis elaboret, & calceos ge-
stet, pedes non dolebit. Aliud. Vespertilionis
tres aquæ pluuiatili incoquito: deinde hæc aquæ
adijcito: lini seminis triti unc. iij. oua cruda tria, o-
lei cyathum unum. bubuli stercoris, ceræ utriusq;
unc. iij. omnia in unum corpus redacta subigito,
& cubitum eunti semel atq; iterum applicato.

Aceti scillini confectio ex Galeno. Cap. 249

Salubre optimum acetum scillinū a Pythagora
scribitur, quo omnes imperatores usi sunt: ab ipsi-
us auctore fertur, quicunq; hoc utantur, longe uitæ
fore, & eius extrema integra usq; ad finē perman-
sura: & ipse quidem Samius senex huiusmodi exti-
tit. quantū enim temporis uixerit, haud ignoras.
de ipso enim in libro traditum est, quod cum suis

tom. 6 y 2 consan-

cōsanguineis hanc facultatē cōmunicauit. cumq; hoc medicamento uti incēpit, quinquagesimum annum natus erat, & usq; ad centesimū septimū uitā produxit integer, & nulla unquam aduersa ualetudine tentatus. hęc sanē medicamentū autor differuit, qui fortasse uir philosophus erat mentiri nescius; nos autem uiri huius fidei periculum fecimus, ac firmam cōstantemq; huiusce medicamēti facultatem esse testamur. oportet igitur scillam montanam libræ unius ponderis capientem dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in uitreum uas mittere, atq; obturare, ac per triginta dies in Caniculā caloris, ut maceretur permittē, deinde scillam extractā exprimere; id genus aceti parum mane sorbeto. tibi enim hæc euenient, ut ne faucium orisq; partes unquā remollescant, os uentriculi bene ualebit, facile spīritum duces, uox recte habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusq; flatuosus uapor in uentre unquam excitabitur, nullū uiscus suspensum erit; bene spirans, bene coloratus deges, ad ciuilia negotia recte affectus, non acidū, non falsum ructabis, si aliquid aceti huius assumpseris; et ieiunus ut assumes præcipio, septemq; postea stadios deambules, ita enim dissoluetur. hoc aceto qui utitur in uictu quamuis licentiosus esto. omnia enim cibaria cōficiet, & a nullo unquam offensam patietur, neq; ualde implebitur, sed in melius proficere uidebitur, nihil superuacui in corpore residēbit, nō flatūs, non bilis, non stercus, non urina, sed omnino facile excernit atq; educit, aluus lubrica omnino est, totiusq; corporis purgatoriū est medicamentum, etiā si in ossibus sordes inhæreant: itē phthisicos ab omnibus deploratos hoc medicamento sanitati restitutos nouimus, morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis interualla non redierit, incipientem uero ac nouum perfecte discutit, neq; reuerti amplius hunc affectum permittit; ad podagræ præterea, & articularū morbos, iecoris, lienisq; duritias uehementer facit; & particulares quidem aceti scillini affectus hi sunt: cōmunes autē quamplurimi, quibus nos cōmoti salutare hoc medicamentum sanitatis integritatisq; causa tibi tradidimus. Deficit.

Vini scillini compositio ex Galeno. Cap. 250

Vinum hoc potui datum omnem sanitatem affert. humores enim attenuat, sed maxime pituitā, neq; ipsam in stomacho, aut uentre aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus consistere permittit, neq; alium id genus tenacem humorem obstructions facientē, sed omnia dissoluit, & uentrem lenit, atq; ita subducit, & urinam mouet, & per ipsam causas attenuat excernitq; adeo uero caput purgat, ut nares humiditate uacent. cōmodum est podagræ, articulari, & comitiali morbo; deniq; omnis sanitatis autor est. ex his cōstat. scillam albam montanā circiter canis exortum accipito librę pondere, per dies decem in umbra refrigerata; deinde scillæ folia refrigerata in uitreū uas mitte, & uini albi ueteris sextarios duodecim su-

perfunde, & suspensum uas per quadraginta dies habeto, postea scillam exime, & abijce, & uino ad antedicta uitia utere, & eius uim percipies, subinde ante cibum uini duas uncias exhibe. sin a cibo, unciam mediam. quodd si ipsum potui cōmodum efficere uelis, ut magis delectet, mellis sextarios duos, aut tres admisceto.

Medicamentum, quod manducatum stomachi pituitam detrahīt, gargarizatum caput purgat. Cap. 251

Origanum, gummi, hyssopum, sampsucū, pulgum, thymū uini uncis tribus incoquito, donec una remaneat, & gargarizandum dato; excutiet enim etiā pulmonis materias, si edatur: id autem quotidie facito; probatum est enim.

Ad urinam reddentes ægre, aut nequaquam. Cap. 252

Lecluli cimices terito, & urinarium foramen filino. statim urina decurret. id etiā ad pueros minere nequeuntē bene facit.

Ad calculosos, & urinam prouocandam expertum. Cap. 253

Baccarum lauri, & piperis æquas portiones terito & cribrato, & ex mulsā mensura una exhibeto; mulsā uero calida esto. Aliud lapides atterens, & mulieribus uirisq; urinam prouocans. lauri corticē aquæ incoque & permisce, sorbendumq; propinato; uehementer facit.

Ad sanguinis mictum. Cap. 254

Accipe zingiberis drac. ij. brasiæ seminis dra. iij. papaueris drachmā; succo excipe, & globulos facito, laborantiq; exhibeto.

Ad uinæ stillicidium. Cap. 255

Thymi & sceniculi æquas portiones conterito, & ex aqua temperata calida potui dato.

Ad dolorem uicæ urinarie, & difficultatem mictus, atq; amblium, & ad sanguinem lotium, & calculum. Cap. 256

Asari, myseos, nardi gallici, æquas portiones accipito, melle attico, cuius spuma abiecta sit, excipito, & dato nucis ponticæ magnitudinem; facit enim etiā fenes cōualefcere, quibus effluxus siccior est, eumq; promptiorem reddunt.

Ad inuoluntarium urinæ exitum in stratis. Cap. 257

Liliū radicem elixam potui dato. Alterci quoq; succū aut semē in asinino lacte maceratū corio cerui includito, & dextro femori appendito, miraberis. Aliud. Apri ungulas uistas ex uino potui dato; aut galli testem usum edendum apponito.

Ad inuoluntarium mictum. Cap. 258

Cochleam cum testa uistam tritamq; ex uino cubitum eunti potui offereto.

Ad difficultatem urinae & calculum. Cap. 259

Lini semen, piper, petroselinum tula & creta ex condito accipe cochlearium unum.

Ad exterendos calculos expertum. Cap. 260

Scorpios marinos exiguos tres integros cōbitrito, & cinerem ex condito propinato.

Ad supprimendam aluum. Cap. 261

Rhum atq; oryzam uino incoque, donec tertia pars remaneat, & per inferiores partes immitte; aut uinum austerum, in quo hirci iecur incoctum sit, potui dato; aut gallas uistas bene terito, & suillā adipem misceto, frictasq; ex aceto eiusi dato laboranti * piperis drachmam. farinæ lupinorum drachmas tres, mellis ligulam.

Ad curandum sudorem, & finiendam febrem. Cap. 262
Cachryos semen ex oleo illitum, aut pyrethrum ex oleo calefactum & illitum hora una intervallo post accelsionem.

Ad canis morsum. Cap. 263

Vrtica semen emplastrum modo impositum, aut nigri marrubij folia similiter, aut apiastrum ex uino potum, uel morfibus impositum; aut allium illitum, aut assum potui eiusq; datum.

Ad morsus cani rabiosi. Cap. 264

Rabiosi canis morfibus, brassicae folia cum lasere ex aceto trita imponito. per se enim brassica rabiosi canis morfibus aduerlat; & ipsius decoctum potui exhibitur. elixa autē brassica ante alios cibos assumpta phthysicos sanat. & arteriae uitia emendat: cōtrita uero et leni superdata ipsū cōsumit.

Ad anginam & colli dolorem. Cap. 265

Alba populus arida, trita, & ex melle illita collo, aut nasturtij semen, & columbinum simum ex melle instar cataplasmatismatis imponito.

Ad internas ani prominentias. Cap. 266

Amarantum aqua maceratum mane uesperiq; potui dato.

Ad lienem cataplasma ualde efficax. Cap. 267

Inulam, sinapi, baccas lauri secundum proportionem accipe & tere, deinde nucis nouae corticē parum contundito, mox in pilam coniectum ualēditiu terito, & eximens aceto acri macerato per triduum, & omnia in unum redigens cum succo tibetici ad usq; ad cataplasmatismatis temperaturam decoquito; & leni summo mane per octo dies imponito: euacuato prius uentre, atq; miraberis. Aliud ad cōminuendum lienem, Capparis radicē unc. iij. calcis uiuae unc. iij. cōtursas cribratas acetoq; cōmissas imponito non diutius horae spatio totus lien absbitur. Aliud. Brassicae decoctū solum ex aceto mulso ieiuno potui dato: aut rubi radicē usq; ad tertiam partem decoque, & decoctum per triduum dato. Aliud. Corticē nucis ex aceto ac mellis incoctū ieiuno propinato; aut ferrū candens in mulso extinguito, & potui dato: admirabile est.

Ad nigros dentes. Cap. 268

Palmularum ossibus mastiche & melle dentes per septem dies perfricato: & albi redduntur.

Ad lumbricos alui. Cap. 269

Lupinos, lauri folia, ac fel bubulum misce, umbilico impone: id bene facit.

Ad interiores exterioresq; ani prominentias. Cap. 270

Amylum picem aquam una feruefacito, donec tertia pars remaneat, ac per septē dies potui dato.

Ad dolorem dentium. Cap. 271

Vitis racemum capiēis in fartagine frigito cum oleo, auricq; instillato, & conualecet.

Ad hirudines. Cap. 272

Aristolochiam terito, & sale conspergito.

Ad calculos. Cap. 273

Lauri baccas piperq; misce to equali, & ex mulsa mystrum unum dato. Aliud calculos frangēs.

Lauri corticē aquae incoquito, quoad tertia pars superfit, & forbendum exhibeto. Aliud calculos frangens. Turturis stercus ustum ex mulsa praebeto. lapides enim per urinam exturbat. Aliud ex-

Galen.

A pertum ad calculos. Struthij, rhu pontici, capparis, singulorum drachmam accipito: dato quotidie ex uino albo drachmam, & per mictum subfidentiam calculosam eijciet. Aliud. Origanum in aqua usq; ad tertiam decoquito, & decocti cyathum unum potui dato.

Ad stillicidium. Cap. 274

Foeniculi seminis, palmularum thebaicarū partes portiones cōterito, ex aqua temperata calidas propinato.

Ad urinae difficultatem & stillicidium. Cap. 275

Costi, mellis, aquae cyathos nouē accipe, des potui craterē mercede prius petita. Aliud. Cyperi Asiatici triti cochlearium unum, ex uino meraco, aut ex melle exhibeto. periculū de ipso factū est.

Ad urinae difficultatem.

Petroselinum Macedonicum terito, & ligulam unam exhibeto.

Ad stillicidium.

Cucurbitam aridam conterito, ut farinae instar sit, cuius exiguum cochleariū ex aqua potu dato.

Ad mingentes in stragulis. Cap. 276

Leporis cerebrum ex uino propinato. Aliud. Vesicam allam esui dato per triduum aut cyperū tritum * potui dato: aut leporis testiculū ex uino odorato tepido propinato.

Ad stillicidium. Cap. 277

Thus accipe, & in uino diutius feruefacito, propinatoq; per triduum * accipiens raphida marinum pisciculum comburito, & potui cinerem offerito.

Ad impetigines. Cap. 278

Cornu ceruini ramenta acerrimo aceto incoquito, usq; dum tertia pars remaneat, ex eo illinito.

Ad feras impetigines.

Hordei farinam aceto acri permistam imponito: aut hastulae regiae radice ex aceto trita illinito frequenter: aut lineum panniculum super candenti ferro comburito & illinito, aut nucis uirentia folia cataplasmatismatis modo imponito: hoc & ad scabiē facit.

Ad penis dolorem, & inflammationem. Cap. 279

Cuminum & ouorum putamina bene decoquito, & foueto: effectum miraberis.

Ad impetigines. Cap. 280

Allium & teaphion aquam & oleum omnia misce to & illinito.

Cataplasma ad uulnera recentia a gladio, aut ligno illata. Cap. 281

Salicis folia trita imponito, & sanguinem profluentem supprimes, & uulnera glutinabis atq; sanabis: aut ouillum simum ex oleo tritum instar cataplasmatismatis imponito.

Ad perniciosam medicamentam. Cap. 282

Rutam, ficum, & nucem terito, ac ex uino positionem dato: aut fulicae sanguis liquidus ex oleo potus seruat: a potu uenenoſi medicamenti & a ui perae morſu liberat.

Ad fluxionem gutturis. Cap. 283

Nido hirundinis trito ex aceto illinito.

Ad mammarum mulierum tumores. Cap. 284

Caprinum stercus aridum ex uino meraco im-

ponito: inflammationem enim digerit.

Ad dolorem capitis lupinum. Cap. 285

Suillum finitū comburito, & cinerem mellis admisceto, caputq; rasum inungito: ac super brasiacæ folia dato.

Ad tussim, & heticam febrem. Cap. 286

Stryracem & brasiacæ succū simul terito, & fermentatos ieiuno, & cubitum eunti exhibeto: aut laurei olei, & uini generosi utriusq; drach. tres misce & calefacias * in balneo interius: & uinum oleumq; calidum temperato, & stomachū foueto.

Aliud. Lixiuuium percolatū calefacito, & tussientis pedes foueto, & spongia deterfos illine & foue: id uero tussibus medetur.

Ad tussis. Cap. 287

Refinam ex uino uetere tritam ieiuno potui dato, & pulegium in posca decoctum, & beronicem cum melle fermentatam esui dato: aut raphanum tostum mane ac uespere edendū apponito: aut butyrum insulsum, quanta est nucis auellanae magnitudo, deuorato.

Ad humores pectore contentos. Cap. 288

Vrticæ folia cū prifana decocta potui dato, bene facit ad inflationes, & materiā ex pectore euocat.

ARGVMENTA CAPITVM CONSILII

Caput I. Præfatio ad Cæcilianum, quod non accurate positis auxiliis præscribere eum puerum non uiderit: In gratiam tamen eius scripturum se consilium, quo tamen recte utrumq; in methodi medicinalis peritum esse oporteat. Et q; in Therapeutica methodo hæc omnia secundum artem & uniuersaliter scripserit: hunc uero libellum & similes idiotis magis quam medicis scribi.

2. De ratione uictus. Quod uitanda sint causæ externæ, quibus morbus hic commouetur, ut sunt, frigus, ardor, uenti ualidi, &c. Et si quando propter eas paroxysmus fuerit obortus, æger ab omni motu domi quiescat, donec recreetur, & uictu tenui utatur. 3. Veris initio purgatio totius corporis perito medico committenda. Victus ratio post purgationē, nempe: deambulatio matutina, studium literarū, altera deambulatio: exercitatio apud pædottribam mediocris. De pædottriba eligendo, & exercitij modo, ne nimis uehementis sit: aut saltem nō subito sed paulatim ad uehementiam intendatur: & capite erectio inferiora magis, crura præcipue, moueant. 4. Frictio prima sicca cum sindone fiat, ad ruborem usq; paulatim ad capite descendendo, caput postremum fricetur. In altera uero frictione quæ cum oleo fit, uniuersum corpus simul fricetur, ita ut unus caput, alij duo circa thoracem sunt, alij duo crura fricent. Sic etiam ab exercitio omnia simul membra fricentur, & caput maxime sindone aut etiam pectine, ubi iam ab exercitio respirauerit. Balneo raro utatur. 5. De prandio & cœna. De holeribus & fructibus, quibus & quantum uti liceat, quod ad cōmune huic & alijs plerisq; morbis uictus

A

Ad tussis. Cap. 289

Fœnumgræcum, quoad tertia pars supersit, decoque, & iusculū summo mane ex melle exhibe.

Vt uox canora reddatur. Cap. 290

Tragacantha uino madefacta & in potū assumpta uocem splendidam reddit.

Ad uocem amissam. Cap. 291

Styracem terito, & ex aqua globulos amplitudinem cicerum æquantes conficito, & terito cum dederis, statim loquetur.

Vt capilli & barba crescant si decidunt. Cap. 292

Betā, & myrtēū oleum, & polytrichū misceto, capillosq; oblinito: aut adiantū & ladanū æquis portionibus terito ex immaturo oleo, aut myrteo aut lentiscino, & illinito. Aliud. Ladanū in uinum aminæū myrteumq; oleum mittito, & terens utrumq; ad mellis spissitudinem redige: caputq; in balneo perunge: melius est & illud adiantū, quod nonnulli polytrichon uocant, si septima pars ladanū addatur, & illinatur.

Ad renes dolentes. Cap. 293

Cum pulegio farinæ furfures decoquantur, & ius percoleur, spongiæq; eo imbuta fomentum fiat.

PRO PVERO EPILEPTICO.

rationem. 6. Quinam cibi peculiariter huic morbo conueniant, aut minus, inter olera & radices præcipue. Radices edules omnes prohibet, præter raphanos interdum. De oxymelitis usui, simplicis & scillitici, uel cum cappari & pisciculis falsiti, uel per se in potu.

C

7. Prandium sit cum oxymelite & aliquo olere, uel olis uis, uel nucibus, uel ficibus, uel caricis. Pueris concedenda quadam potu ipsorum desiderio quibus palam

& tempestiue fruuntur, ne clam copiosius silem se insurgunt.

8. Paulo post prandium obambulet æger, deinde studij literarum uacet, iterum obambulet, coner. De cibis cœnæ conuenientibus. Tenaç aut crassum succum gignentibus, instantibus, excrementiis & difficilibus concoctū abstinendum, & particularis eorū enumeratio.

9. De usu electuarij scilla per 40. dies post purgationē tenuernam. De oxymelitis apparatus. Fortiora aut imbecilliora exhibenda remedia pro re nata, & semper pro circumstantijs uariari aliquid oportere: quod nisi in methodo therapeutica exercitatus præstare nullus potest: neq; enim satis accurate hæc scribi possunt. Proinde idiotæ non simpliciter ex his proficiunt, sed artifices qui curæ præstiti, opus est.

D

10. Apparatus medicamentis scilla: quæ uel soli in uase operculato & membrana inuoluto: exponitur in canicularibus, & melli deinde miscetur: uel ab initio statim contrita, quod minus efficax est, uel in aqua cocta trita, quod minime efficax: uel cum aceto, quod uehemens quidem sit, sed neruis noxiū.

CL. GALENI DOCV. MENTVM DE PVERO

EPILEPTICO.

Nicolao Leonico Thomao Patauino interprete.



Ego te Cæciliane existi-
mabā ad ægritudinem
filij tui nostris admoni-
tionibus haudquaquā
indigere. nam qui prius
ipsum uidit, & tecum
Athenas iterum nauig-
aturus est Dionysius,
idoneus est & præsens
facere ea quæ opus erūt

& rursus discedens ad habitudinē ægritudinis
concedentia documenta relinquere. ego autē qui
nunquam puerum hunc uidī, forsan multum deci-
pi possem: cū neq; à principio qualis fuerit ipsius
natura, neq; nunc qualis ob ægritudinē sit, cogno-
uerim: sed à uobis hoc tantū audierim, epilepsie
accessionibus puerū infestari. Verum, ne forsitan
me suspiceris negligentē magis quā ueridicum
scriptionem hanc subterfugere: quod nunquā an-
tea feci laborē hunc libens subibō, ut tibi rem gra-
tam faciā, scribendo quādā medicinalia præcepta
pueri epileptici, in quibus necesse est medicinæ ar-
tis imperitū decipi & aberrare, circa mensurā uel
tempus utendi. Demonstratū enim à nobis est in
alijs libris quòd non contingit quēpiā recte me-
deri ne minimis quidē ægritudinibus, nedū adeo
magnis ut est epilepsia, nisi methodū aliquā cura-
tiuam nouerit. Atqui Dionysius mihi iam cōmu-
nicauit, & mecum prius considerauit de tota pue-
ri curatione, quā tu mihi imposueris, ut hæc do-
cumenta conscriberē. Dionysioq; meam tum ipse
sententiam facilius manifestauit, cum intelligeret
omnia quæ ego dicerē, nihilq; ille obaudiret, ceu
methodi curatiuæ ualde peritus. Tecū uero neq;
quomodo sermonē instituā noui. hā accurata tra-
ctatio distinctionibus multis indiget, et obscurior
est q; imperito hominī cōueniat: breuis autē & ma-
nifesta haudquaq; accurata esse potest. Quapro-
pter subuehere tibi documēta cōscribere: quāuis
rem tibi gratam facere percuperē: existimās mihi
simile quippiam euenturū quale Phidias utiq; ac-
cidisset, si postquam Palladis simulachrū absoluit,
quispiā illū coegisset separatim, digitum, manū,
pedem, nasum, aures, singulasq; corporis partes
effingere. Ego enim methodū curatiuā tanquam
quoddam simulachrū in pluribus cōmentarijs à
nobis scriptā fuisse arbitror, quæ non modo impe-
ritos homines, sed ne medicos quidem quoscūq;
finuare non potest. Quoniam autē cogis me de par-
te una artis tractare sermonē facere seorsum absq;
aliarū coniunctione: tuæ cædo uolūtati & pareo:
atq; in tuam gratiā documenta scribo: quæ tibi in
hoc sufficient. satis enim est medicæ artis inexper-
to nō magnū aliquid & irremediabile, in medico-

Arum præceptis cōmittere, præcipue cum didicerit
legitime uersari in his cōmentarijs. Eruditus igitur
illis curatiuæ methodi negociū scriptū est: tibi au-
tem et alijs qui nonnullarū rationalium artium sci-
entes estis, medicinæ autē inexperti (arbitror) for-
tasse nonnihil utilitatis & ex his cōmentarijs, pro-
ueniet. Conabor autem quantum fieri poterit ma-
nifestissime enarrare quanam utens puer dicta nō
parū iuuetur: & ab accidentibus quotidie ipsum
inopināte inuadentibus minime lædatur.

2 Conuenit igitur in primis quantū fieri po-
test hæc obseruare. Namq; puerum necesse est in-
terdū occurrere magnis frigoribus, immensis ca-
loribus, uētis ualidis, balneis malis, cibarijs caput
tentantibus, rotarū obuolutionibus, corruscationi-
bus præterea, & tonitruis, & uigilijs, & cruditati-
bus, tristitijsq; etiā, & iracundijs, & lassitudine non
nunquā cōmoueri: atq; alijs huiusmodi rebus à
quibus (ut summam dicam) corpus uehemēter
moueri & perturbari solet: atq; in reminiscētiā
quandam morbi referri, & ad generationem paro-
xyismi deduci. Hæc igitur conuenit, multo ante ca-
ueri. & si quādoq; his præcedentibus paroxysmus
succedet, tunc ab omni penitus motu oportet illū
remouere, & domi cōtinere, & uictu ualde tenui
illū nutrire, donec à paroxysmi incōmodo libere-
tur. quis autē sit tenuis uictus, quamuis arbitrer te
cognoscere, tamen si ea quæ sequuntur perlegeris,
aliquid etiā de ipso percipies. tempus itaq; est ut
huiusce rei documenta tradere aggrediar.

3 Accedente uere (nam ægritudines quæ re-
uerti solent quodāmodo tunc moueri contingit,) puerum
purgandum assero mediocri purgatio-
ne. huic autē purgationi Dionysius præsens mode-
rabitur, & quæ opus erunt imperabit, accurate cō-
gnosces quonam modo ad purgationem corpus
preparare oporteat, & quo uti debeat pharmaco,
quā ue quantitate, & in quo tempore, nam de his
inter nos sepe consultū est. Quare Athenis præsen-
tem habes Dionysium, sed nihilominus cum ipso
mentem simul & consiliū habes meum. Post pur-
gationem autem quando recesserit Dionysius, &
puer Athenis remanserit: hanc oportet ipsum ui-
ctus rationem obseruare. Cum à cubili mane sur-
rexerit, antequam ad præceptorē accedat, medio-
cri deambulatione utatur, gressu non admodum
concitato. post hac autē usq; ad palestræ tempus,
disciplinis uacet quibus assueuit. quā primū au-
tem ab illis discefferit, ubi mediocriter rursus de-
ambulauerit, ad pædotribam accedat. hūic autem
pædotribam si quēpiam alium ex ijs qui puero
præsunt, multum oportet esse prudentem. sed ta-
lem inuenire difficile est: præsertim cum electio
fieri debeat ex hominib; ineruditiss & asininis, nō

minus animam quam corpus hebetem & crassam habentibus. non igitur tanquam paruorum hoc te fugiat: neque cuius est populo pueri curam tradas, probe cognoscens quod summa curationis in hisce duobus versatur, in usu uidelicet a te tibi dati pharmaci, & in exercitij modo. alia namque omnia horum sunt preparamenta quaedam. paedotribam igitur hunc tecum simul Dionysius eligit. Sit autem ipsius scopus & norma in exercendo quoad quantitatem quidem, ut puerum antequam defatigetur cessare faciat, necnon ut uniuersum corpus calefaciat, et mediocriter euacuet: ambo autem in eodem tempore contingent. quando enim quod superfluit sufficienter euacuatur, & quantum satis est corpus incalescit, tunc si quispiam ab exercitio cessauerit, quiescet antequam in defatigationem incurrat. exercitium uero ab hoc tempore ultra, in solida iam agit membra, & corporis habitus colliquat. aggregat autem omne id quod colliquat in iuncturis maxime & musculis: ad hocque sequitur uirtutis languor, postea uulceris sensus, quando aliquid corporis partem mouere tentauerint, & hoc est ipsa lassitudo. non solum igitur paedotribam prudenter esse oportet, sed etiam mediocris exercitij expertus, ne citius quam par est puerum ab exercitio cessare faciat, securum timens lassitudinem. ne uero satagens calefacere, & complete quod superflui est euacuare, in lassitudinem puerum ducat. Mediocrium igitur exercitiorum in quantitate huiusmodi sunt animaduersiones. In qualitate uero corroborare oportet omnes corporis particulas, maxime caput & uentriculum, & huius precipue quod ori circumstat. ut autem quispiam istud assequi possit, nunc dicam. Primo quoniam exercitia uehementia caput replent, ab his abstinere precipio. secundum si quando his uti necesse fuerit, capite erecto quae infra sunt moueantur, et ex his maxime crura. tertio a paruus & tardis motionibus incipiat paedotriba, & sic ad uehementes & celerissimos motus deueniat. nam subito ab intensis exercitijs incipere non solum imbecillibus, sed etiam robustis summe perniciosum est.

4 Existimare autem oportet, quod fricationes exercitij loco habeantur, maxime in corporibus imbecillibus: imò saepe numero solae, modo recte fiant, aliarum motionum uicem supplēt. opus est autem primum manibus molliter cum sindone a supernis partibus ad inferna delatis, corpus ad rubedinem deducere initio a brachijs & manibus factum, atque ita ad pectus & uentrem deuenire, subinde etiam crura multum fricare conuenit: ut ex supernis partibus aliquid huc defluat: postremo ad caput deueniendum est. nam statim a principio ad ipsum accedere periculofum. corpore enim ad huc pleno existente, ad id quod primo calescit, facile superfluitates attrahuntur. ultimo igitur loco, post alias corporis partes, caput confricari oportet, ut nunc dicimus, absque oleo. quando autem & oleum applicare libuerit nihil prohibet capitis fricationem simul cum alijs fieri membris. ut unus caput fricat, duo alij pectus & uentrem: & totidem

alij crura. sic autem & post exercitia: imò uero magis tunc, omnia simul confricentur membra: ita enim celerius ad quietem corpus deducetur, & minus refrigeratur. oportet autem si de quapiam alia re, de hac ipsa magnam curam habere. Non lauare autem, ut plurimum conuenit: neque statim post exercitium palaestram exire, sed postquam plane quies uerit spiritus, & ab exercitijs commotio prorsus cessauerit, atque tunc etiam si indone caput multum fricare conuenit, & saepe numero pectine uti.

5 Post haec autem ad prandium eat, & prius quippiam ex ijs quae uentrem molliunt assumat, uel olus, uel salsamentum, uel psisanam, uel oliuas cum tertia parte panis. reliquas uero duas in coena tempus seponat cum ualentioribus obsonijs. quae autem huiusmodi existunt paulo post dicetur, si prius enarrauerim omnia quae absque nocimento aliquo fumi possunt. Ex oleribus igitur minime illis prohiberi iubeo, a lactucis, a malua, ab atriplice, a blito, non tamen idem semper capiat uolo, uerum alias aliud, moderate. ex eodem etiam est genere beta, & brassica. oportet enim etiam ex ijs quippiam moderate gustare. porrum quinetiam interdum, & apium, & smyrnium degustare conferet: & de autumnalibus fructibus quicumque non sunt penitus crudi, aut suapte natura difficulter concoquuntur: etiam namque & suas ipsorum superfluitates, & aliorum etiam esculentorum retinere consueuerunt. ergo & mora, & quae praecocia nominantur, & ficus, & si qui sunt eiusmodi notae, sine molestia descendunt. cucurbita quae dicitur, nihil ab oleribus uentrem molliētibus differre uidetur: item pepones cucumerini (nam qui tales non sunt, pessimi sunt) maturae etiam uuae aliquantulum quandoque puero concedi potest: mala uero & pirararum & in parua quantitate degustet: & hac ipsa non solum ut in arbore sua sint bene coacta, sed etiam domi seruata ad maturationem recte peruenerint. Scire autem oportet eadem poma quae recentia matre sunt decerpta, & quae domi deposita referuantur, per multum inter se differre, nullamque inter se similitudinem habere. possunt autem conseruari poma pirararum: nec non plurimi etiam alij fructus, & pruna quae uocantur Damascena, ficus quinetiam quas Caricas uocant, ex huiusmodi sunt genere, & ex arbore palma, dactyli, quorum comestione penitus illi non interdicto, sed oportune & moderate illis uti permitto: assidue autem & multum illis uti minime uelim. Atque ut semel concludam, quicumque mali succi sunt cibi, uel alui astringunt, uel inflant, uel difficulter concoquantur, si assidue uel plusquam conuenient assumantur, non solum huic morbo, sed omnibus etiam alijs nocere solent.

6 Atque huc usque sermo de dietae modo protritus alijs etiam quamplurimis aegritudinibus conueniens erit. Huiusce autem morbi peculiaris & proprius est, ut caueamus ab ijs precipue esculentis quae pituitam generant. unde etiam alijs cibis qui innoxij sunt, uiscosos tamen, aut frigidos, aut crassos humores generant, haudquaquam esse immorandum censeo. huiusmodi autem sunt atriplex

plex: & blitum, & malua. quorum sanè moderatum usum non prohibeo, alsiduū autem uehementer damno. ex hoc sunt genere & cucurbitar: multo que magis cucumeres, & poma, & pira: & item quæcūq; humore pituitosum gignunt, aut viscosum, aut crassum, sunt in genere pessimo prout esculentorum, quales sunt qui uulgo appellantur fungi: ab ijs enim omnino abstinere confuso, quemadmodum & à rapis, & à quibuscūq; radicibus quæ mandī solent. crassos enim habent succos & agrè concoquuntur: exceptis quibusdā quæ acrimoniam quandam & caliditatem in se habent. quemadmodum sunt dauci & raphani: sed ex raphanis haudquaquam illum degustare prohibeo, uerum quodam intercedente ipatio: à dauco autem abstinere condiscat magis quàm etiam à rapis. in esculentorum autem usu abundet illa quæ acria sunt, & uirtutē incisiuam habent: dummodo insigniter non sint mali succi, odoremq; habeant qui caput tentat. quorum ex genere sunt etiam quæcūq; per caliditatem replent caput. quemadmodum uinum, & sinapi, & petroselinum, & daucus, & capæ, & smyrnium. hæc enim ultra modum æstium inducunt, et malos humores generant. sinapi uero licet conueniat ad humores crassos incidendos, tamē ab eo abstinendum est, quoniam caput tentat. in oxymelitis autem usu secure condiscat, etiamsi quotidie sumere uelit. potest autem caparē ex illo comesse: paruoscq; pisces salitos oleo modico superinfuso, ut concinnetur obsoniū: quod profecto huiuscemodī ægritudinis, ueluti medicamentum quoddam reputari potest: precipue si sit acetum scilla conditum: hoc omnes uulgo iam scilliticum uocant. quod ego si quippiam aliud in hoc casu sanè laudo. horum uero alterutrum singulis diebus assumere contenderim, dico autem uel capares uel pisces salitos oxymelite conditos. si uero puer oxymeli bibere uelit, id sit in promptu & ante præparatum, & non ex tempore ex utriusq; crudis confectum. quo autem modo ipsum præparare oportet paulo post recensebimus. ceterum plurima aqua commisceatur. nam quod sic factum est, suauius redditur. ac hyeme quidem calidum accipiatur. æstate uero non erit malum etiam si plerūq; frigidum sumatur, si & uehementes fuerint calores, & ipse siti sit aridus, potuiq; frigidum assueuerit antea. nam inter alia sitim egregie sedat oxymeli non ualde dulce, præsertim si aquæ frigida misceatur. mihiq; non parum sæpe contigit puerum à comitali morbo penitus liberasse, non immutata uictus ratione, præterquam quod post primam purgationem oxymeli sumere, eoq; uti pharmino iussissem. Verum quoniam neque sitim uel naturam noui, nescioq; quantum uirium is sibi adiciuerit morbus, & ipse assistere nequeo, diuinare haudquaquam possum, quàm paucissimis indigeat remedijs. melius itaq; mihi uidetur de omnibus sermonem facere.

7 Igitur post exercitium in prandio oxymelite (ut dictum est) utatur & quibusdam oleribus, & oliuis, & nucibus, & ficibus, cum siccis, tum re-

centibus: uerum non simul quotidie omnibus. uinum enim sit & simplex quod assumat: sed ut uictus ratio uariari possit, de omnibus uerba feci. eodem etiam tempore (ut dictum est) si desiderauerit puer, alij etiam fructus cōcedi illi possunt. cum alioqui ab ipsis melius sit abstinere, non solū morbi illius deuitandī causa, sed ad integram etiam totius ualitudinis incolumitatem: quemadmodum uides nos ferme ab omnibus æstiuis ac fugacibus fructibus abstinere. uerum quoniam non philosophis in præsentia salubris uictus præcepta conscribimus, mihi sanè per quàm optandum erit si non solum ad pueri curam hæc documenta, sed ad uniuersam illius uitam facere poterunt. Est igitur illi concedendum ut palām & tempestiue eos comedat fructus, quicūq; magni uel fuerint uel nocumēti, ne clam & intempestiue illos comedens, in maius incurrat malum. qui enim palām ab aliqua re quam ualde appetunt, prohibentur, hi cum data est facultas, plus nimio ingurgitare se consueuerunt. quamobrem pueris ego plura esculenta concedere soleo ex ijs quæ non ualde nocent, ut tempestiue & palām illis moderate utantur potius q̃, ut diximus, propter uehementis desiderium furtim ex his & uoraciter assumere festinet. Atq; hæc de cibiratione sufficienter sint dicta.

8 Post cibum autem ubi paululum temporis intermiserit, priusquā ad studia disciplinarum accedat leuiter deambulet censeo, & rursum ut id ipsum à studijs rediēs ante cenam faciat sanè consulo, quo tempore duas reliquas panis portiones quas reseruauerat assumat, item aliorum unumquodq; sic ut dictum est: carnes quidem ex omni fere auium genere, præter palustres. ab omnium aut quadrupedum usu præcipue abstineat. Quod si quando illis uti necessitas fuerit, domestici quidem suis extremitatibus & uentriculo uescatur, syluestris uero carnis uniuersis bene uti potest. hoedorum quinetiam carnes degustet, & nonnunquam leporum etiam. carnes autē omnes sint uel simpliciter conditæ uel sine nidore assæ: simpliciter condiantur si aqua incoquant & anetho, porro, sale, & oleo concinnentur: quoniam autem modo sine nidore recte assetur caro, clibanus quem apud me uidisti, exemplo tibi esse potest. ex marino autem genere crusta intacta, quidē omnia nocua, & incommoda: ex piscibus uero optimi sunt iij qui in saxosis degunt locis. sumere etiam poterit ex ijs qui in alto degunt, quos pelagicos uocant. ex cartilagineo autem genere torpedo fere sola conueniens est & commoda. Ceterum de leguminibus ptisana quidem præcipua est. hanc sequitur lens, alica, & pisum: alia autem fere omnia mala. & ut uniuersaliter dicatur, quæcūq; viscosum, & crassum generant succū, flatuosaq; sunt, & multarum superfluitatum, necnon difficilis cōcoctionis, sicut ante dicebamus, maxime sunt cauenda. Et ostrea quidem omnia, & cartilaginea ea quæ *σλάχια* uocantur, & squammis carent: præterea bulbi, & cochleæ, & caseus, & fungi bubulæq; carnes; & oia in aqua durata, cum difficilis sunt cōco-

tionis, tum crassos generant succos. alica uero & carnes fuisse bonum generat sanguinem, sed uiscosum. palustria autem omnia superfluitates generant plurimas. legumina uero omnia flatuosa sunt, & præcipue faba, & cicer: pitanaq; non diligenter cocta flatuosa est. quomobrem bene coquere illam oportet, uel ea non uti. lens quoque bene decocta omnem ponit flatuositatem. uerum illa non asis due crebrius uti oportet, quoniam humores generat crassos.

9 Cæterum ad uictus quotidiani rationem hæc abunde sufficere possunt. Medicamento autem ex scilla, quod tibi tradidimus purgatione præmissa, quodq; primo uere fieri iussimus, singulis diebus secure filius tuus utatur, priusquam ad palæstram accedat. nam nisi ualde magna fuerit agritudo, & occalluerit, sperandum sanè est in quadraginta dierum spatio hoc medicamento illam perfecte cessaturam. quoniam iam innumeros pueros nulla ellebori opera sic curauimus. uerum post purgationem prius quam hoc utatur pharmaco, semel aut bis absinthium fumerè oportet: De oxymelite autem ut dicamus, id certe acidissimum esse censetur, quod ad mellis proportionem quartam aceti habet partem; dulcissimum uero quod octauam: alia autem intermedia mensura quanto ad extremorum alterutrum appropinquant, tanto aciditatis aut dulcedinis participare uidentur. oportet autè ipsam penitus decoquere. ita enim quæ miscentur, accurate in unum ambo deueniunt: & aciditatis uehementia quæ in aceto est, retunditur: & quod in melle inflatum est castigatur: spumam etiam illius, qui recte decoquit, auferre debet, nec me præterealater in Græcia, & in plerisque locis insularum oxymeli etiam ex fauis confici solere, quo etià tibi secure utilicet, puero præsertim æstiuo tempore Athenis degente. minime autem ad me in præsentia pertinet de declarare, quando dulcius id, aut acidius, uel dilutius, aut mercialius exhibere oportet: neq; in alijs particularibus immorari meum est, sed illius qui & præsens fuerit, & curandum corpus quotidie inspexerit, & de humorum habitu recte coniectari poterit. in crassis enim & uiscosis humoribus acidiori & mercialiori oxymelite utendum est. in his autem qui humifmodi non fuerint, dulciori & diluto magis. eodem etiam modo reliqua quæ dicta sunt omnia, pro quotidianis corporum constitutionibus commutare & uariare conuenit, quemadmodum et in omnibus alijs agritudinibus facere cõtingit. quapropter si quis methodi curatiuæ ignaro & inex-

A perito innumera etià præscripserit documēta, haudquaquam illum sufficienter efficiet medicum non modo non magnarum agritudinum, sed ne minimarum quidem: istud enim sæpenumero palam ostendi cum inueterata ulcera malasq; oculorum affectiones ad sanitatem redegissem isdem sanè medicamentis, quibus pleriq; ante me uisi nihil profecerant. & profecto temporis opportunitas in usu uniuscuiusq; ut Hippocrati placuit, post quantitatem ad uires diligenter accommodatam, reliquum utilitatis apportat. nam pharmaca potius sunt auxiliorum materia quam auxilia, quemadmodum etiam ab excellentibus assueuerunt medicis. Et meus quidè unde exordium sumpsit finem accipiat sermo, haudquaquam fieri posse ut minimum quippià quod ad artem pertinet pertractare recte ualeatis qui artis penitus sit ignarus & expers, sed illi semper assistentis periti opus esse.

10 Verum quoniam plerique scillæ succum non recte faciunt, quando id tibi etiam cognoscere cordi est, huic ego sermoni adiungam quoniam modo illum conficere sim solitus. Vas quodpiam accipio à quo extractum fuerit melle: meliterium id Græci uocant: in quod scillam cõficio manibus prius illam in exiguas discerpēs particulas. postea bene apto operculo illud obturans, extrinsecusq; pelle circumdans, & diligenter colligans, in loco quopiam meridiem spectate colloco, qui à borealibus omnino non perflectur uentis. id autem facere soleo ea omni parte in qua caniculam exoriri omnes assueuerant Græci: quadraginta autem huiuscemodi sunt dies: uiginti quidem ante totidemq; post exortum. paulatimq; in ijs diebus uas illud ad solem conuertere soleo, ut ex omnibus similiter partibus incalasciat. transacto post me dum præstituto temporis spatio, uas illud aperies, in illo reperire soleo scillæ partes elixis similes, succumq; ex illis in uasis fundo quandam defluxisse, quem colligens, quam optimo melle concinno. Huius singulis diebus cui dare uolueris cochlearis pleni mensuram præbeo, pueris quidem minoris, adultis uero maioris. quin etià scillæ ipsius carnes accurate cõtundens, illasq; cum melle dissoluens, & conterens, ex illis cochleare unum, ut dictum est, præbere consueui: quod sanè quoad uires & efficaciam secundum à prædicto locum obtinet. Cæterum quicunq; scillam elixantes, illam postea conterunt, illius proculdubio uires resolunt. quemadmodum qui istud ipsum ex aceto faciunt, pharmacū quidem ualidum admodum cõficiunt, uerum neruis non innoxium.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI DE INCANTATIONE ET amuletis, quem inter Constantini Africani opera legimus.

Cap. I. Quantum ualeat amor, animi persuasio, bonas spes, & reliqui animorum affectus: sine quibus res naturales aliquid efficere non possunt. Galenus citatur.

II. Enumeratio particularium quorundam ex tota

substantia agentium. III. Epilogus, Simpliciter credendum esse uiribus rerum naturalium, quibus agunt ex tota substantia, etsi causæ lætæ cum alia multa sint, quæ nisi uidissemus, nunquam crederemus.

CL. GALENO ASCRI.

PTVS LIBER DE INCANTATIO

NE, ADIVRATIONE, ET VSPENSIONE.

Est autem inter Constantini Africani opera excusis.

Quantum ualeat amor, animi persuasio, bona spes, et reliqui animorum affectus sine quibus res naturales aliquando nihil efficiunt. Cap. 1



V AESI T I fili charissime De incantatione, adiuuratione, & suspensione, si qua possunt prodesse, & si inuenierim in libris Græcorum hoc, qualiter in libris Indorū est inuenire, cui quæstioni cōpendiose in hac epistola conor respondere. O

mines inquam antiqui in hoc uidentur esse cōcordati, corporis complexionem animæ sequi uirtutem: quæ uirtus si sit æqualiter temperata, actio quoq; corporis erit perfecta, unde quia uirtutes animæ, in pueris, senibus, & mulieribus imperfecte plurimum esse uidentur: complexio quoq; corporis eorum imperfecta esse probatur. & hæc imperfectio similiter contingit habitatoribus intemperatæ regionis, utpote caliditatis Aethiopiæ & frigiditatis Scythiæ. Inde Plato inquit: Quando mēs humana rem amat aliquam, licet naturaliter non adiuuatiua, sibi eam prodesse certificat: ex sola autem mentis intentione, corpus res illa iuuat, uerbū gratia si quis incantationē sibi prodesse confidat, quæ sit eumq; sit, eum tamen iuuat. Si enim, ut diximus, complexio corporis uirtutem sequitur animæ, necesse est rem taliter se habere, ut certificatur: quia ex timore, tristitia, latitia, stupore, non solum corpus in colore mutatur, sed etiam in multis alijs rebus, ut uētris solutione, uel nimia defectione. ego autē uidi ista, sanitatis diuturnarū passionum fuisse causas, maxime illarū quæ corruptiones sunt mentium. In sanis autē fuisse infirmitatis causæ hæc eadem: unde Socrates, incantationes, inquit, uerba sunt decipientia rationales animas secundum spei inceptionem, aut secundum timoris incisionē. Indit autē medici tantum confidunt incantationē siue adiuurationem iuuare: Græci uero antiqui medici intendūt his in animam erroneam perfectionem suam reuocare, qua reuocata necesse est ut corpus reuocetur ab ipsa, cum complexionē corporis uirtutem animæ constet sequi. Vnde Gal. super libro Hippo. De humoribus, Si quis, inquit, dixerit humores corporis mutatos immutare actionem animæ, ut animæ actio mutata mutat eosdē, non mentitur: quod certificatur, quia quando complexio cholericā dominatur, sit inde iracundus: & e contra in sape irascētibz cholera rubea augmentatur, necesse est enim complexionem animæ corporis complexionem imitari, & corporis animæ. Iterum inquit Gal. intellectus & scientia in anima ex complexionē augmentatur cholericā: cōtinentia & studiositas, ex melancholica: deambulatio uero

A & delectatio, ex cōplexione sanguinea: phlegma nihil adiuuat uirtutē animæ nisi in prima gustatorum mutatione. Cōstat ergo, qd si medicus animæ complexionē quoquo modo adiuuerit, incantatio ne, siue suspensione, corporis cōplexionem ad uitam perducit. Si autē his conueniēs adiungitur medicina, corpus incantatione animæ adiuuatur, quibus coniunctis necesse est sanitatē utriusq; citius consequi. Item inquit Gal. sunt homines lati naturaliter & delitiosi, qui quando infirmantur, sanos eos subito futuros cōfirmet medicus, & eorū dīctam cū exercitijs reuocet: quorū spes, sanitatis est causa. Sunt & alij ecōtrario natura tristes, & unde tristētur & angustientur, eorū animis semper cogitantes: quorū cogitationes oportet fallere medicū, & lætificādo intentione mutare animas eorū: sed neq; excedere debet lætificādi modum, ne promissionū magnitudine negligat se medicādus. meminim enim quendā nostræ terræ nobilissimū murmurasse se esse ligatū ne cū mulieribus coiret, quē adiuui falsificādo intentionē suā, & hoc magnis ingenijs: sed tamē nunq; reuocare potui, propter qd certificare & cōfirmare incepti quod ipse prius intendebat, deinde adducēs sibi librum Cleopatrar, quæ fecerat de scēminarū formāda speciositate, le gensq; locū, ubi dixit taliter: Ligatus fuit coruinū accipiat mistū cum sesami oleo, quo unguēs totū corpus, adiuuabitur: iste autē audiens, cōfusus est libris uerbis, sic fecit, citoq; cōualuit, & augmentata est cōcupiscentia coeūdī. Ego quoq; in antiquorum lib. multis legi suspensā collo suffragari cum proprietate, nō ex natura sui, quod nō nego posse fieri propter confortationē mentis, ut dixi: de quibus cum sint multa, pauca tibi tangere disposui.

Enumeratio particularū quorundā ex tota substantia agentū. Ca. 2

Arist. in libro De lapidibus ait, suspendens siue ragdū collo, aut portās ipsum in digito, defendit a casu Epilepsiæ suspensio: unde semper mādāmus nobilibus, ut ē collo filiorū suorū suspendatur, ne in hanc infirmitatē incidant. Itē quodlibet genus hyacinthorū suspendens in collo, siue habēs in digito, si intret in regionē pestiferam, nō læditur, sed potius in mentibus hominū honoratur, & a maioribus petitiones eius cōplentur. Item sardā uiginti granorū hordei pondus portans ē collo, seu in digito, nō uidebit terribilia in somno. Itē corneolam ē collo portans, siue in digito, mitigat iram in cōtentione: cuius autē color est sicut lotura carnis, sanguinis fluxū cuiuslibet membri stringit, maxime in foeminis. Onyx suspendens uel digito portatus augmētāt in somno terribilia, & tristitia, & inter homines cōtentiosa, in pueris autē suspensus saluam oris auget. Gal. stercora luporū ossa comedentiū si in uentribz illa dolentiū, uel ē collo pa-

cientium

tientium suspensa fuerint, statim dolorē mitigā, alquando & in coxis suspenduntur, & cum fune laneo ligātur, illius scilicet ouis quæ a lupis comesta est, sicq; melius iurabūtur & fortius. quod si filum non inueniatur, cum corrigia ceruina ligantē. Idē Gal. in uas argenteū posuit, cuius quātitas fabæ fuit, & in coxis suspendit, multum profuit: hoc autē dixit in libro De simplici medicina. in libro autē eodē ait: Si uiperæ suffocata collum cum filo lineo suffocandi ē collo suspenderis, absoluitur à suffocatione sua, & multū ualet apostematibus faucium. Dioscorides ait, dentes canini canis rabiosi quādo hominē momorderit, in frusto corij ligati, & armo suspensi, defendunt à moribus canis rabiosi. Idem, pullis hirundineis paruis in augmento lunę acceptis, & primogenitis, si fuerint in uentre scissi, duos lapides inuenies, unum unius coloris, & alterum diuersi & oppositi, quos si ligaueris in corio uituli anteq; terrā tetigerint, & ē collo siue armo suspenderis, epilepticis ualet, & aliquando perasant. Quidam medicī suspēdunt ē collo radices herbæ acetosæ propter scrofulas, & ualent; alij suspēdunt radices arnoglossæ propter eadē, & dissoluunt. Auricularis digitus abortiuus si ē mulieris collo suspēdatur, non cōcipit dum collo habebit. Hyoscyamus cum lacte caballino temperatus & corio ceruino impositus & suspēsus ē collo mulieris, concipere nō permittit, dum in collo erit. Quidam dicūt mulierē ranam accipientem & os eius aperientē terq; ibi inspuentē, non concipere illo anno. alij oculū hirci radice ligant sampsur chin in horto, & frīgant cum urina rursi tauri uespere; mane autē extracta radix ligatur cum eodē oculo in armo, libidine augmentat. Galenus inquit, lapis coralli multū ualet ad passionē stomachi, si suspēsus fuerit super stomachū uel ē collo patientis. Dioscorides, semen croci hortensis ad scorpionis morsum ualet in manu tentū uel ē collo suspēsum; simile facit radix lauri; idem etiā iris agit. Alij

Argumenta capitulum libri de oculis, cuius partes sunt 6. & sua cuiusq; capita.

Partis prima.

Cap. I. Oculos, eorumq; partes & actiones cognosci debere à medico rectē ipsos curaturo, & q; crystallinus est pars principalis oculi, cui ceteræ subseruiunt.

II. De tribus oculi humoribus, & tribus post uitreū humorē tunicis, et tribus ante albuginē, & tela aranea.

III. Quod crystallinus a uitreo nutritur. Quod nerui optici soli cōcaui & de cerebro ueniūt recti dura & pia matre: Et de tribus post uitreum tunicis. IIII. De tribus tunicis ante crystallinū iunctis eis quæ sunt post ipsum: deq; usu earum & albuginei humoris. De coniunctiua, & musculis mouentibus oculos & palpebram, & sustentantibus nervos opticos.

Partis secunda.

Cap. I. Quod omnes sensus à cerebro procedunt: & q; ab ipso prodeant septem neruorū paria, ceteri uero nerui à spinali medulla. II. De triplici actione uirtutis regitiuæ, & de animali spiritui & natura cerebri.

III. De neruis opticis, & quid à ceteris differant.

IIII. De coniunctione neruorum opticatorum, & cur non unicus exiuerit crassus à medio primi uentriculi cerebri. V. De animato spiritu & uisibili: & q; uisibilis spiritus substantialiter ad oculos peruenit, & ad aliorū sensuum organa solum perueniunt eorum spiritus irradiatiue. VI. Quo modo fiat uisio,

A dicunt radices asparagi siccae super dentes ligatae, trahūt sine dolore. Item pedes leporis & renes dextro armo ligati, canes latrare nō permittūt: similiter secur facit canis, nisi coloris eius generis fuerit cuius secur fuit. Indi dicūt stercois elephātinū cum melle mistū, & in uulua mulieris impositū, nunq; permittit cōcipere: testat hoc quia arbori suspensum nō permittit fructificāre. Aaron dixit stercois elephātis cum lacte caballino mistū et corio cerui nō ligatū & umbilico mulieris suspensum, nō permittit concipere. Quidā medicī dicunt pedē testudinis dextrū pedi podagrici dextro suspensum iurare, sinistro sinistro, idem & in manibus. Itē radix pæoniz ē collo suspēsa pueris ualet epilepticis: similiter pyrethrū: idē facit pilus ex toto nigri canis.

B Epilogus. Simpliciter credendum esse uiribus rerum naturalium, quibus agunt ex tota substantia, & si causæ lateat, cū alia multa sint, quæ nisi uisidissimus, nunq; crederemus.

Nos autem hæc ex libris Antiquorum excerptimus, ut mens tua in incantatione, adiuuatione, & suspensione non refragetur amplius. Sed omnia si ex libris Antiquorum philosophorū extrahamus, librum protendemus. Atqui uoluntatē nostram hæc tenus exhibuimus. Hæc autē ego non tentauī, sed nec etiā neganda sunt mihi, quia si non uiderimus magnetē sibi ferrū trahentē, nō certificamur, nec crederemus: similiter quod plumbum rumpit adamantem, quod ferrum nō facit: & lapis, qui uocatur nitrum, foco incenditur: piscis autē quidam marinus se capientis sensum auertit: quæ omnia si à nobis non uideantur, nō creduntur, sed tentata certificant. Et forsitan itidem se habet dicta ab antiquis. Quorum enim actio ex proprietate est, rationibus uideat se cōprehendi non potest: rationibus autē tantum comprehenduntur quæ sensibus subministrantur. Aliquando ergo quædā substantiæ habent proprietatem ratione incōprehensibilem propter sui subtilitatem, sensibus non subministratam propter magnam sui altitudinem.

Partis tertia.

Cap. I. De prima medicinæ intēctione, & de necessarijs ad eā. II. De rebus naturalib; nō naturalib; & cōtra naturā. III. De generibus & speciebus morborum.

IIII. De causis morborū. V. De accidetib; morborū.

Partis quartæ, de morbis oculorum, & neruorum, & musculorum in eis, & palpebrarum.

Cap. I. De accidetibus & morbis oculorū in genere. II. De diuisione accidentiū oculi, & declaratione morborū diuidentiū. III. De accidetib; pupillæ. IIII. De accidetibus albuginei humoris. V. De accidetibus uisibilis spiritus. VI. De accidetib; cornæ. VII. De accidetibus motus uolūtarij oculorū. VIII. De diuisione morborum oculorū in apparentes & occultos: & primo de apparentibus. IX. De passionib; palpebrarū, & angularū eius. X. De passionib; cornæ. XI. De egressionē uiz: & passionib; eius. XII. De suffusione seu cataclata. XIII. De passionibus oculi natis intus & occultis. XIIII. De musculis mouentibus oculos & palpebras, & de uisjs per quas fiunt humores ad oculos.

Partis quintæ, de facultatibus remediiorum ocularium.

Cap. I. Distinctio remediiorū ocularium secundum sapores. II. De speciebus saporum, & impressionibus quas in lingua faciunt. III. De facultatibus remediiorum primis, secundis, & tertijs, & earum effectibus.

III. Diuisio remediorum quæ sumuntur uel à planis, uel metallis, uel animalibus & exempla eorum.
V. De uiribus remediorum ocularium particulatim.
VI. De nouem qualitatibus secundis remediorum ocularium, earumq; effectibus.

Partis Sextæ.

Cap. I. De apostematibus & causis ipsorum in genere.
II. De curis apostematum. III. De causis & cura doloris in genere. II III. De causis & cura doloris

A oculorum. V. De ophthalmia & eius cura. VI. petia, tumoris, & pruritus oculorum. VII. De carne addita in oculis, & carbone, & cura. VIII. De casu pilorum, eiusq; remedio. IX. De curis uulnere & fissuræ in genere. X. De uulnere oculorum, pustulis in cornea, panno, ungula, nyctalope, scabie. XI. De infusione, egressu oculorum, & petia. XII. De collyrijs multis ad oculorum ægritudines.

CL. GALENI DE OCVLIS

A DEMETRIO TRANSLATVS, NVPER

AVTEM A VARIIS MENDIS EXPURGATVS.

Quod oculorum, & partium eorum, & operationum notitia est necessaria uolenti curare oculos: & quod crystallinus est pars principis oculi cui ceteræ subserviunt. Caput I



PORTET medicum oculorum curam habere uolentem, prius eorum naturam optime cognoscere: unum quodque enim membrum infirmum ideo curatur, ut ad naturam suam propriam sanitatem conuertatur. Sed

scientia naturæ membri, & uniuscuiusq; compositionis non potest comprehendere nisi partes totius noscantur. Qui igitur oculorum naturam scire desiderat: primo omnes partes quibus constructi sunt intelligat, noscatq; operationem cuiusq; partis, & quæ fuerit illius necessitas, & quomodo quæcunq; pars illa componatur. unde de difficilioribus dicamus. Sciamus itaq; quod omne membrum compositum habet propriam actionem propter quam factum fuit, quam actionem cum una suarum partium operatur, ceteræ uero illi operanti ministrant. Sic & de oculis est, qui cum multis partibus diuersis compositi sunt: uisus tamē proprie ab una suarum partium, id est humore qui dicitur crystallinus. ceteri uero humores, atq; panniculi sunt propter iuuamentum ipsius, quod expla-

De colore, figura, & situ humoris crystallini, uitrei & albuginei. Et de tribus tunicis quæ sunt post uitreum. Et de tribus quæ sunt ante albuginem. Et de tela aranea. Cap. II

Crystallinus est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, qui locatus est in medio oculorum. Albus est & splendidus, ut cito uarios colores recipiat, quia albus & splendidus corpus cito & uelociter coloribus opponit, sicut in claro uitro fieri patet. Rotundus, ne cito patiarur, quia omnis forma rotunda non cito patitur, quia angulus caret. Parū latus, ut lumē sumere possit. Si enim rotundus esset exquisitè, lumē non cito sumere posset, quia in loco uno stabilis non esset. In medio locatus, ut ceteræ partes sibi ministrarent: quædā, quibus defenditur: quædā, quibus adiuvatur; unde necessarium in medio sibi ministratū

Galen.

B fuit. Quod autem in eo sit uisus, testatur id quod uideamus in cataractis. Aqua enim cum inter crystallinum & corneam steterit, ut non possit species præ aqua ad crystallinum transire, lumen amputat uisuale, sed aqua ablata, lumen reparatur. Crystallinus autem in medio duorum locatur humorum, quorum unus retro est, qui dicitur hyelinos, id est uitreus quasi ut utrumque lucidus. Alter uero est, qui est quasi albumen oui, & dicitur albugineus. Post uitreum sunt tres panniculi, quorum primus uitreus circumdat, quasi rete, inde & retina dicitur. Post hunc est alius, similis secundina, & dicitur secundina. Iuxta quæ est tertius qui ossa contangit, durus & solidus: unde & scleros uocatur. Ante albugineum sunt tres panniculi, quorum unus albugineo coniungitur, eumq; circumdat, qui est quasi uvea, eiusq; color nigredini pertinet, unde uocant eum rhagoida, id est uveam. Ante hunc est alter cornu similis unde ceratoidis, id est cornea dicitur. Iuxta hunc est alius, qui penitus non circumdat sicut alij, sed eos intra se iungit, unde coniunctiua dicitur: quia si cornea ab ea operiretur, spiritus eam perforare non posset. Inter crystallinum & albugineum est tela aranea. Sed nunc uideamus exa-

men uniuscuiusq; ipsorum. Et primo de uitreo tribusq; panniculis post eum existentibus.

Quod crystallinus uitreo nutritur. Et quod nervi optici soli cœli & de cerebro ueniunt tecti dura & pia matre ad loca oculorum. Et de tribus tunicis quæ sunt post uitreum. Cap. III

D Dicamus igitur ita, Omne membrum necessarium est ut habeat cibum, quo restauretur id quod calore naturali et accidentali intus et extra dissoluitur. Cibis uero membro conueniens est, quæ sibi membrum bene assimilat. Crystallino ergo cibis est sic necessarius, ut ipse sit albilissimus, & clarissimus, & ob hoc cum sanguine in sui naturam sumere non possit, necessarium uitreum habuit mediantem, qui medius est inter naturam sanguinis & crystallini. Albius enim sanguine est, & minus albus quā crystallinus: hic autem uitreus humor est de sanguine in uenis subtilibus & arterijs digesto, unde mutatus est à suo colore in speciem uitri. Ipse enim uenę & arteriæ sunt de retina, quæ procedit à subtilibus cerebri panniculis, neruum per quem spiritus ducitur circumdantibus, qui neruus concavus est: quod planius dicemus ut pateat. Natura enim à cerebro sensum & uoluntarium motum omnibus tribuens mem-

tom 6

z

bris

bris per nervos mediātes, duos nervos à cerebro prodeūtes, ad oculos mittit, quorum unus durus est, unde fit motus, alter mollis & concavus: neq; præter ipsum in toto corpore concavus alius est: quod ideo fuit, ut animatus spiritus visum faciēs, per eum duceretur. Cerebrū uero duobus panniculis est operitū, uno subtili & molli, altero duro & crasso: subtilis autē secundāz asimilat, quia uenas & arterias habet, qui cerebro prodest, quia nutrit & defendit eū cū suis arterijs & uenis: crassus uero defendit solūmodo ab ossibus capitis appropinquantib; ei. Omnes autē nervi à cerebro procedentes, istis panniculis sunt operiti, donec à capitis ossibus egrediant; similiter nervi ad oculos uenientes, his duobus panniculis circundantur, unde molli panniculo concavus nervus circumtegitur, et extenditur in modū telæ cum suis uenis. Est autē rete uitreum humorē cooperiens: uitreus autē humor medium crystallinū cōprehendit; retina uenis & arterijs ad uitreum portat cibum, & cū suis nervis sensum & spiritum visibilē ad crystallinū ducit. Subtilis autē pāniculus qui secūdinā dicit, quo nervus circumtegitur, cum alio qui retina dicit coniunctus est illi: secundo loco crystallino iunctus est, cui secundina præstat auxilium, quia suis uenis & arterijs nutrimentū portat ad retinā, et defendit eam ne rumpat. Durus autē panniculus subtili cōiungitur, eumq; circumdat, qui ad hoc ualet oculis, q̄ eos ab osse defendit in quo locati sunt, ne eis sua duritie noceat, & est quasi ligamentum oculorū. Sufficiat hæc de tribus humoribus, & tribus panniculis post crystallinum existentibus.

De tribus tunicis ante crystallinum iunctis eis que sunt post ipsum. Deq; inuementis earum & albuginei humoris: Et de coniunctiua, & musculus qui mouent oculos & palpebram, & sustinent nervos opticos. Cap. IIII

Panniculi uero tres ante crystallinum existentes taliter sunt: diximus enim panniculos cooperire cerebrū, nervosq; ad oculos ueniētes circumdare: sed tamen in oculis existētes diuiduntur, & faciunt duos, uterq; tamen ad medium crystallini iungitur in loco qui dicitur iris. Super pupilla est panniculus cornea qui à duro panno cerebrū cooperiente procedit, & panniculus qui uuea dicit, & ab illo quem secundinam dicunt procedit, qui, ut diximus, iungitur duro qui cooperit, ut dictum est, secundinā. Panniculus uero exterior, id est cōiunctiua, super corneam procedit. Cornea uero ad hæc necessaria est ut crystallinum defendat, ne ab exterioribus, quia durus panniculus est, patiat; tur. Hæc autem subtilissima, alba & dura est: subtilis & alba, ut cito spiritus eam penetrare possit; dura, ne propter subtilitatem cito rumpereetur. Uuea tribus de causis necessaria est: una ut corneam nutriat quæ uenas unde nutriatur habere nequit: alia uero, ut media sit inter corneam & crystallinum, ne cornea duritie sua noceat crystallino: tertia, ut coadunet lumen suo colore nigredini pertinente. Omne enim lucidum, lumē dispergit, nigrū uero coadunat. Uuea ergo multitudinem uenarum habuit & arteriarū, ut corneam nutriat. Mol-

lis fuit, ne crystallino inferret nocumentum. Proprios habet uillos in quibus aqua coadunatur in cataracta: lenis autem exterius est, ne cornea sibi noceat. Color eius est sicut color est cœli, ut lumē sicut diximus coadunet: in medio eius forām est, per quod lumen ingreditur, & intrinsecus plena est humore: qui dicit albugineus; ut faciat crystallinum à cornea distare. Albugineus alterius inuaminis est, quia crystallinū defendit, ne ab exteriori aere desiccetur: & humectat uueam, ne noceat crystallino. Sed inter crystallinum & albugineum quidam est panniculus tenuissimus, sicut cortex tenuissimus cepæ, uel araneæ tela, qui medium operit crystallinū, ut eum ab uuea defendat. Ideoq; quidam medici dixerunt oculorum panniculos septem esse, dixerunt alij sex, alij quinq;, quidam quatuor, quidam tres, nōnulli duos, quorū discordia non erat in re. Dicentes enim septem, computabant retinam, secundinam, scliron, araneam, uueam, corneam, coniunctiuam. Qui enim sex, retinam non esse panniculum dicebant, asserentes defensorium panniculum quoddam esse, retinam potius nutrire, quàm custodire. Sed qui quinq; autumabant, araneam non panniculum sed crystallini partem esse dicebant, neq; coniunctiuam. Dicentes autem quatuor, contendebant coniunctiuam non esse panniculum sed ligamentum oculorum, neq; retinam nec araneam retinam. Tres esse dicentes, uueam & secundinam unum esse dicebant panniculum, quia uuea à secundina procedit: retinam quoq; & araneam unum panniculum; item scliron & corneam unum panniculum. Qui duos dixerunt, scliron & corneam unum intendebant: & secundinam & corneam unum; retinam uero & araneam & coniunctiuam non esse panniculos. Intentio ergo antiquorum erat una. Nunc de cōiunctiua dicamus de qua hucusq; tacuimus. Sciendum ergo lacertos oculis esse necessarios, quibus possent moueri, & uisibilibus rebus opponi. Ideoq; septem habent lacertos, quorum unus mouet oculos erga nares, alter uersus tempora, tertius sursum, quartus deorsum, quintus firmat & corroborat neruum unde uisus procedit: duo alij alligant coniunctiuā ne usq; ad corneā tendat, & operiunt lacertos ibi existentes in angulis oculorum. Tres iterum superiores palpebras mouēt, unus superius & duo inferius: inferiores uero palpebræ nullum habent motum.

Particula secunda est de ortu neruorum sensus à cerebro. Et triplici specie regitiua uirtutis. Et de neruis opticiis & ipsorum coniunctiue, & spiritibus uisus. Et de modo quo fit uisus. Cuius sex sunt capita. Quod oēs sensus à cerebro procedit & ab ipso procedit septē paria neruorū, ceteri uero nervi à spinali medulla. Cap. I

Necesse est qui naturā oculorū uult scire, prius cerebri naturam optime cognoscat. Visus enim ab eo procedit & superior eius actio ad eum conuertitur. Cerebrum autem frigidius & humidius cæteris membris est, quod postea explanabimus. Initium enim est sensus & uoluntarij motus ac regitiuæ uirtutis. Nullum enim aliud membrū hac actione fungitur, sed cerebrum; his enim modis operatur

operat, uel per se, uel per uia adiutuatis, instrumen-
to adiuuante sensum agit & motu uoluntariu. In-
strumenta sunt nerui, qui duobus sunt modis, qui
dam a cerebro, quida a spinali medulla procedunt
medulla spinalis tamen de cerebro est, unde cere-
brum fundamentu neruoru est omnium. Sed dur-
is neruis uoluntarius motus efficitur, dum nerui cu
lacentis coponuntur. Lacerti enim de neruis sunt
& carne & ligamento compositi, & ligamenta ab
osisbus procedunt. Molles nerui quinque sensus fa-
ciunt, quibus omnibus subtilior & acutior est ui-
sus, qui sensus igneus est, & igneam habet naturam,
id est splendorem & ruborem: lumen igneum est na-
tura, quia cum coadunatur intus, ignis ex eo suc-
cenditur. Post uisum est auditus, post quem olfa-
ctus, post olfactum, gustus: qui quidem quia sentit
quod est aquosum, a quoque pertinet. Sapor enim qui
sentitur nihil aliud est quam aqua alicuius corpo-
ris siccitati admista calore operante: proinde an-
tiqui saporem uocant chymum, id est liquorem.
Ceteri sensibus tactus calidior est, qui quidem sen-
tit quod terreum est, & terrae pertinet, id est durum,
molle, calidum, frigidum, & siccum, & quae ex his
procedunt. Omnes autem nerui sensum habent tactus,
sed non uoluntarium motu, ut diximus, quia duri
nerui tantum uoluntario motu funguntur, sed mol-
les duris sunt sensibiliores, procedunt uero duri
plus a spinali medulla. A cerebro autem procedunt se-
ptem parsu neruorum, quorum primum & secun-
dum par ad oculos ueniunt, unum est concuum
per quem sensus uisus fit, id est per quem anima-
tus spiritus uisum dans ad oculos tendit. Secundum
par, oculi lacertos, & palpebras mouet. Tertium,
ad linguam tendit dans ei sensum saporum. Quar-
tum ad palatum deuenit ubi gustus sensum facit.
Quintum ad aures accedit sensum auditus faciens.
Sextum ad uiscera descendit, & per ea diuiditur
dans eis tactum. Septimum mouet lacertos linguarum.
Ceteri quibus mouentur manus, pedes, pedes,
dorsum, & caput de spinali medulla procedunt. Sic
cerebrum cum instrumento, id est neruis, motum
agit & sensum.

De trina actione uirtutis regitiuae, & de animalis spiritu, &
natura cerebri. Cap. II

Regitiua uero actio per se solum tribus modis
est, phantasia in fronte, ratio in medio, memoria in
puppi. Cerebrum autem habet quatuor concauitates
quae dicuntur uentriculi, duae sunt in prora, tertia
in puppi, quarta inter proram & puppim, in qui-
bus semper est animatus spiritus, quo actus, ut di-
ximus, fit. Spiritus autem animatus, de uitali fit, uita-
lis in corde generatur & nascitur. A corde enim
duae uenae ad cerebrum ascendant, quae subter ce-
rebrum uenientes, multis diuiduntur modis, & pro-
telatae faciunt quasi rete, per quas spiritus uitalis
de corde ad cerebrum ductus, in illo reti moratur, quo-
usque mundificetur, & subtilietur, purificatus dein-
de ad medium uentriculu cerebri tendit, ibique ali-
quantulum permanens subtilifatur, postea ad pup-
pis uadiu uentriculum: sed uia quae est a medio ad
puppim non est aperta: habet enim portam in qua

Galen.

A quoddam obstaculum est, cuius forma est sicut pi-
nea, quam anatomici uermem uocant, sed ferme sem-
per clauditur. unde cum spiritus qui est in puppi,
fuerit motus, fit memoria: cum is qui est in medio, fit
intellectus, & ratio: cum ille qui est in prioribus,
fit sensus communis & phantasia. haec est dispositio
cerebri, suarum actionum. Cerebri autem natura frigi-
da est & humida. Frigida duabus de causis. Vna
propter multitudinem sui motus quo fiunt memo-
ria, intellectus, & imaginatio. Secunda propter mo-
tionem quae ab eo dirigitur, unde fiunt sensus &
uoluntarius motus, ne causa suae motionis calidif-
simum factum, incedere tur, & incensum consumere-
tur amplius. Si cerebrum calidum esset, memo-
ria instabilis esset: caput enim calidum, mobile est
B naturaliter, frigidum contra. Memoria uero requi-
es & stabilitas est necessaria, quod sic attestantur,
quia calidum cerebrum habentes, instabiles & mo-
biles sunt. Humiditas autem cerebri duabus de cau-
sis est necessaria. Vna, ne ex motu nimio desicca-
retur: motus enim calor facit, calor uero desiccatur
humiditatem. Alia, ut in eo uelociter imaginatio
formaretur, & cito sensum qui eam dirigit suscipere
posset, & uelociter ad audita discernendum mo-
ueretur, rursus uero nerui ab eo procedentes molles
essent. Impossibile est enim a duro, molle, uel a mol-
li, durum generari, proinde prora mollior est puppi,
quia de prora molles, de puppi, duri nerui proce-
dunt, quibus motus uoluntarius fit.

De neruis opticiis & coris differentijs a ceteris neruis. Cap. III

C Qui instrumentu uisus optime scire desiderat
primum naturam utriusque nerui uisibilis inuestiget,
ut bene cognoscat, quibus cum ceteris neruis co-
municet, & quibus discrepet. Deinde de uisibili
spiritu perquirat, quatenus sciat cum quibus spiri-
tibus conueniat, & in quo discrepet: postremo de
ipso uisu quod sit, quod in hoc capite plane descri-
bam. Primum itaque neruoru par, quod supra dixi-
mus cum utroque cerebri panniculo descendere, &
secum uisibilem spiritum ducere, cum ceteris ner-
uis sensum faciunt. duobus modis conuenit. Vno,
quia utalij, a cerebri prora descendit. Alio, quia &
ipse nobilis est, discrepat tamen ab eis, sex modis.
Primo quia maior ceteris est a cerebro & a spinali
medulla procedentibus. Magnus uero quia con-
cauus est: si enim esset paruus, necessario subtilis
esset, unde cito frangibilis, cuius concauitas neces-
sario fuit larga: ut nullam pateretur obstructionem,
& ideo magnus fuit. Secundo, quia solus sic con-
cauus est, ut eius concauitas sensui ostendat, quae
concauitas protenditur usque ad locum in quo pan-
niculus oculorum qui rete dicitur, se procreare in-
cipit: quod facile sensui patet, si anatomia cernat.
Inchoat quoque ipsa concauitas ab utroque cerebri
uentriculo, qui est in cerebri prora, in quo tamen
loco concauitas uideri non potest, quia subtilis-
sima & angustissima est: hoc foramen qui uult aspi-
cere, quærat in cerebro magnorum animalium in
hora, qua occiduntur. Caueat tamen ne in asta-
te, calidoue tempore fiat, & utrosque cerebri pannicu-
los tangat caute, ne frangantur, & in fine illorum

tom. 6

z 2

parum

panniculorum inuenier illud neruorum par ab utroq; uentriculo procedens, poteritq; uidere qualiter ipsa concauitas ab ipsis uentriculis inchoet. Tertio quia uterq; uisibilis neruus, intrinsecus est mollissimus, ut facile sentire possis, extra aliquantulum durus, ut à passione sit illatus. Quarto quia per hoc par neruorū multo maior spiritus quantitas, q̃ per oēs neruos sensum & motum uoluntariū facientes ducitur. in illis tamen nō substantialiter, sed sola uirtus eius per eos uehitur. per illud aut̃ par, multa spiritus essentia quantitas defertur. Oculi enim cū sint nobilissimæ actionis, tradit ad eos multum de subtiliā spiritus, usq; ad panniculum qui dicitur uuea; hoc enim fuit necessariū ad adiuuandū uisum. Quinto quia cæteri nerui quantū sunt à cerebro remotiores, tanto sunt duriores, & à propria natura mutati, iste intrinsecus mollissimus est, extrinsecus uero solidior, ut mollities interior exteriori duritie tueat, ne quādo desicet: cuius mollitiē & si aliquantulū inuenies indurari, tamen ad oculos ueniens, in naturā quam in cerebro existens habuerat, conuertitur. in panniculo enim qui rete dicitur mollis efficitur, ita ut in naturā cerebri procedat, sitq; quasi rete. Sexto quæ & laudabilior eius pprietas est: quia hoc par neruorum cum è prora utriusq; uentriculi separatur egrediatur, non recto itinere sicut exierat, uadit sed per interiora capitis torquet, & ad olfactarium ueniens commiscetur: sic ut ipsorum utraq; foramina fiant unum ibidem. Iterum hi nerui separantur, et recto itinere, ut egressi fuerant, uadunt, unusq; à dextro uentriculo exiens, ad dextrū oculum tendit: alter de sinistro prodiens ad sinistrum peruenit, de quorū coniunctione & separatione plures antiquorum diuerse senserunt.

De opinionibus circa causam coniunctionis neruorū opticorum, & de causa ob quam non unicus exitus crassus à medio primi uentriculi cerebri. Cap. IIII

Quidam hæc ideo fieri dicebāt, ut si unus læderetur, alius subueniret: alij eos ideo esse coniunctos, quia omnis sensus ab uno fundamento procedit, quorū sententiā prorsus uana est. Natura enim tam optime, tam fortiter, mēbra cōpleuit, ut nullam timeant passionis occasionē, nec solum nerui uisum ferentes ab uno loco exeunt, sed omnes ab eodē loco egrediunt, neq; tamen postea cōiunguntur. Nonnulli ob hoc eos dicunt coniungi: ut unus ab alio confortetur: si enim separati essent, propter itineris longitudinē rumperebantur, quod quidem non impossibile est, sed tamen nō est uia tam longa, ut in ea rumpi debeat. Alij sic aiunt, quorū intentio uera est: spiritui uisibili ueniēte ad oculos, necesse est, ut uno oculo clauso totus spiritus ad alium ueniat. quod fieri non posset, nisi nerui prius separati coniungerent, & iterum separarentur: quod huiusmodi experimentū testatur. Si aliquid corpus super nasum ponatur, utroq; oculo ad uidendum directo, sit uisus debiliior & obscurior: sed uno clauso, sit uisus in altero fortior, quam in utroq; fuerat, & quod utriq; cernere nequieuerant, unus solus clarissime aspicit. hoc ideo, quia

A Spiritus qui in utroq; fuerat, ad unum cōuertitur: altero enim clauso, alterius pupilla clarior efficit. Alij alio modo sentiunt, quorum sententia est necessaria, nisi nerui ad oculos directi primū cōiungantur, & postea separarentur, necessario res uana, dupla uisui appareret. cum enim res uisibilis uideri nō possit, nisi uisui oculorum pupillas exeuntes: ipse aut̃ uisus per lineas rectas egrediat, & recto tramite ante se percipiat, sicut uidemus radios solis per angustam cauitatem domum ingredi, & lineæ ipsæ angustæ sunt in exordio sui: deinde uero paulatim dilatantur, fiatq; in utroq; oculo quedam pinæ forma necesse est, ut uterq; uisus linea directus, & in loco ubi est res uidenda cōiunctus, eam æqualiter percutiat, deinde quousq; ad pupilam æqualiter egrediatur: ut per unam superficiē ambo ambulent. Duorū exordia sunt in loco, ubi utriq; nerui cōiungunt, ibi unus idemq; factus, & sic ex utraq; pupilla à suo loco egressus, uidendam rem uidet, eamq; sicut est, cōprehendit: quoniam si una pupilla à suo loco inferius uel superius mutaret, res superiori pupilla uisa, superius uideretur, sicq; dupla appareret, ppter qd̃ oculis tria fuerunt necessaria, scilicet pupilla funditiua uisus, locus ubi uterq; cōiungit neruus, & recta lineæ, ut uisus recte per eas traseat: hæc est causa quare nerui ad oculos ueniētes prius cōiungunt. Sed tamē quidam sic obijciunt. Cū illos duos neruos necessarium sit coniungi: quare non statim unus facti sunt, sed duo. Quibus est respondendū, unus ideo neruus non fuit, quia à cerebri medio exire nō potuit, maxime quia magnus est uterq; item magna quedā concauitas illic est, ubi palati foramina cerebro coniungunt, per quam cerebrum suum superfluat: expellit. uia etiam quæ ad nares ducit, ibi constat: illa aut̃ concauitas, & hæc uia, ibi esse non posset, si neruus unus ibi locaret. Nares enim sunt in mediā facie, unde nisi earum foramina cerebro opposita essent, olfactus non esset. quia ergo cerebri loca rebus hisce cōprehensa sunt, necesse fuit, ut nerui uisum ferentes nō ab uno loco egredirentur, quos natura in uno loco cōiunxit, ut idem foramen eos habere faceret: deinde, ut separatim ad utrumq; oculum irent, seiunxit.

De animato spiritu & uisibili, & quod uisibilis spiritus substantialiter ad oculos peruenit, & ad aliorum sensuum organa solum peruenit eorum spiritus irradiatiue. Cap. V

Visibilis, ut diximus, spiritus de spiritu nascitur animato à uentriculis prore cerebri procedēs: ibiq; mundificat ut diximus, cum de cerebri natura disputauimus: qui spiritus, spiritualiter est sensibilis, quia uisus unus ē sensibus, cæteris dignior & nobilior, porro ipse habet proprietatē quam nullus aliorū sensuum habet. Animalis siquidem spiritus in cerebri uentriculis existens sensum & uoluntariū mādāt motum: uirtus enim ipsius per neruos penetrat ad cætera mēbra: elsetia uero in proprio permanet loco: sicut sol totum aerē illuminat, ipse tamen in uno loco stat: sed ad oculos non solum uirtus uisibilis spiritus, sed ipse spiritus essentialiter dirigitur, & tanta eius quantitas, quanta est necessaria

cellaria, illuc adducitur, quod utriusque nervi concavitas attestat. id etiam hoc testatur, quia uno oculo clauso, ad pupillam alterius tota virtus conver-
 titur causa nervorum coniunctorum: inde foramen
 panniculi qui dicitur uvea, præ multitudinem spiri-
 tus necessario dilatatur, aperto vero oculo cum spi-
 ritus ad eum revertatur, foramē uveæ ad propriam
 redigitur mensuram. Hoc signo etiam, si observa-
 ri possit, cognoscitur, si uno oculo aqua clauso pupil-
 la alterius dilate: spiritus enim visibilis in eo esse
 demonstratur, unde aqua quæ transitum eius ob-
 struit, ablata, visus redditur. Si vero non dilatetur,
 hoc ideo est quia nervus per quem spiritus ducitur,
 obstructus est; unde etiam cum cæteri nervi nullā
 habeant concavitatē, quia virtus animalis spiritus
 non ipse et essentialiter per eos ducitur, oculorum
 nervi necessario concavi fuerunt, ut spiritus sub-
 stantialiter per ipsos transire possit. Cæteri autē nō
 sunt concavi, ne per corpus divisi, & à suo funda-
 mento remoti, leuiter perirent: uel quia tanta spi-
 ritus quantitas sensui motui voluntario nō est ne-
 cessaria quanta visui. Nullus enim sensus, præter
 visum, sentit sentiendā rem, nisi ei coniungatur: vi-
 sus autē pupillam egrediens longe remota sentit:
 unde multa spiritus quantitas necessaria est, & ideo
 nervi necessario concavi facti sunt.

De modo quo fit visio. Cap. VI

Videndum est etiam quomodo fiat visus. Dixi-
 mus ergo cum aliqua res videtur necessario, uel ali-
 quid ex ea dirigitur visui, per quod quid ipsa sit,
 cognoscitur: uel visus visus etiam ad ea manda-
 tur, uel aliquid medium est inter visum & rem vi-
 sam, per quod ipsa cognoscitur. Sic potest ergo in-
 vestigari quod horum certum sit. Omnes philoso-
 phi concordati sunt, quod res non possit uideri nisi
 per foramen pupillæ. Si ergo ad visum à re vidē-
 da aliquid dirigitur, siue sit virtus, siue sit forma, si-
 ue qualitas siue quantitas mensurata, quomodo
 illud angustum foramen intrare poterit? quæ eti-
 am virtus esse potest quæ ad oculos diuersorum in
 momento re videndā deducat: quod quia impos-
 sibile est, spernatur. Quod autē visibilis spiritus pu-
 pillam exiens solus ad rem videndā uadat, eiusque
 quantitas magnitudinē cōprehendat, falsum est.
 Ipse enim spiritus non tantæ est quantitatis, ut adeo
 dilatari possit, ut tot & tantas rerum ambiat quan-
 titates, cum in uno momento multa & diuersa &
 maxima indiuidua comprehendimus. Ad tertium
 ergo membrum convertamur, quippe aer corpo-
 ra circundans, si clarus & lucidus fuerit, supplemē-
 tum visui facit quod nervi cerebri, quia sicut splē-
 dor solis, sic spiritus recipit uirtutem, sicut enim so-
 lis splendor superiorem aeris extremitatem per-
 currens, totum aerem penetrat, eumque clarificat:
 sic & visibilis spiritus pupillam egressus, mox to-
 tum aerem penetrat, et extensus per loca remotio-
 ra, mutat ea in suam naturam, quod fit cum aer in
 toto iunctus est, quod in sole palam fieri uidetur.
 Si enim aliquod corpus in aere ponatur, cum so-
 lis splendor illud nequeat penetrare, forma illius
 corporis post se obscura apparet. causa, quia non

Caten.

A suscipit aer lumen nisi sit cōtinuus, nec solis splen-
 dor, separatum à se aerem mutat: quoniam si actio
 splendoris fortiter in aere operata fuisset, posset
 in eadem actione permanere, splendore solis ab-
 sente. Sed utrique hac caret proprietate, quod neque
 sol, neque splendor suam actionem aeri, ipso absen-
 te, potest dimittere: recte ergo causa dans lumen
 ablata, ipso momento, lumen ab aere aufertur. Eo-
 dem modo de nervis intelligitur: quia si nervus fue-
 rit incisus & à cerebro diuisus, ilico membrum cui sen-
 sum dabat, fit insensibile. Propterea hæc duo sic
 debent esse coniuncta, id est aer & spiritus, sicut
 nervi & cerebrum: & quamvis aer in altera mute-
 tur actione, sicut cum calefit uel infrigidatur, & in
 qualitate rei calefacientis uel infrigidantis perma-
 net, lumen tamen nō idem in aere operatur: ipso
 enim absente & lux ab aere amputatur. Deinde
 necesse est semper, ut aer continuatim illumineat.
 hoc enim nisi fuerit, nullo modo lucidus fieret, sic
 & nervi cerebro faciunt supplemētum, quia licet
 de substantia sint cerebri, duriores tamē sunt, quod
 lucidioribus passibus ionibus subiaceant, unde aliquā
 tulum à natura cerebri sunt mutati. Sed nervi duo
 bus modis sunt, quidam enim motum faciunt, qui
 dā sensum: & facientes sensum, molles sunt: ope-
 rantes motum, sunt duri. Et quamvis nervi duri
 sensum habeant tangendi, molles tamen nervi
 non inveniuntur illam cum duris nervis habere
 societatem. sed ipsi duri hoc faciunt, quia tactus
 ceteris sensibus est crassior. Sensus autem visibilis
 quia ceteris sensibus est acutior & subtilior, ideo
 nervus spiritum visibilem seruans, ceteris sensibi-
 libus nervis cerebro est propinquior. Quia igitur
 oculi in aere agunt, sicut cerebrum in nervis, ideo
 multam quantitatem spiritus habuerunt, ut in aere
 rem suam faciant, sicut in nervis proprias res cere-
 brum. Visus autem primo colores sentit quod ei
 proprium est, deinde corpus in quo fundati sunt:
 sicut gustus prius sentit sapores, postea fundamē-
 ta eorum. Gustus tamen & cæteri sensus rem senti-
 endam ad se venturam expectant: visus uero ab
 oculis elongatur, & per aerem extenditur quo-
 usque ad corpus perveniat coloratum. hac de causa
 solus visus sentit formam corporis, ac quantitatem,
 & cum eius colore motum rationabiliter, non ta-
 men essentialiter, sentit: quod nullus habet cæte-
 rorum nisi tactus accidentaliter. uerbi gratia. Si
 quis per tenebras ambulans fustem in manu duxe-
 rit, eo amplius non potente penetrare, cognoscit
 quod motum per corpus solidum fieri, impossibi-
 le est. Visus autem habet alteram proprietatem,
 quia incedens supra corpus leve, solidum, & luci-
 dum, rectus ad pupillam convertitur, unde exie-
 rat. unde in speculo uel in alijs splendidis corpori-
 bus prope nos stantibus, uidemus formam no-
 strā: & si quis studiosè in oculum alterius spectet,
 uidet in eo suam faciem: causa, quia visus ad pupil-
 lam convertitur, propter luciditatem panniculi
 qui araneæ tela dicitur. est enim supra crysalli-
 num, sicut ad eptis superne coagulatus: & quasi ru-
 tilans, clara est. Veruntamen quamvis præ cæteris

tom 6 z 3 solus

solus per aerem motum rei sentiendæ sentiat, non tamē arbitrat, sicut cæcus se cōfufe sentiret: quia aer, mox ut rem sentit, eam uisui ministrat: quæ proprietas soli inest uisui, aerē uidelicet in sui mutare naturā. Alterius etiā dignioris est proprietatis, quōd non solum recte, sed ex transuerso cōspicitur necessario, cum multus spiritus a cerebro ad oculos dirigitur, rursus spiritus pupillam exiens, & aerem percutiēs, mutat eum in suam naturam. Recte ergo uisus igneus dicitur, auditus aereus, gustus aquosus, tactus terreus, olfactus fumosus. quatuor enim elementa sensus quatuor constituunt, ut unusquisque eorum unum ex his cōprehendat, & ea cum in natura sua sunt, uel in aliud mutantur, uel aliqua accidentia patiuntur, discernat: præter hos quatuor sensus, fuit alius qui fumosa comprehendere. fumus enim in sua natura medio cris est, cum elementa nō nisi quatuor sine. Sed uisus qui ad hoc est, ut colores cōprehendat, necessario luminosus fuit. solum enim quod lucidū est, conuertitur in colores. Testatur hoc aer, qui cum clarus et lucidus sit, facile in colores mutatur. nam palam est, quia si quis candidis indutus iaceat sub arbore, color uestimentorum in frondium colorē mutatur: unde patet aerem in illum colorē fuisse mutatum. Videmus etiā sæpe aerem in colorem lucidi parietis mutari, illumque colorem per aerem ad illud corpus mutari, maxime si paries uiridis uel rubeus fuerit uel citrini coloris: & sicut solis splendor eum ad suam mutat naturam, sic & colores in feras eum qualitates conuertunt. Similiter & lumen uisibilis spiritus mox ut aerem percutit, ipsum immutat. Hæc tria sunt quæ aerem sine ullo temporis spacio immutāt, lumen solis, fulgidus color, & lumē uisibilis spiritus. Palam ergo, uisum nō fieri nisi aeris mediocritate, quod sensus attestatur. Antiqui etiā cōcordant dicentes aerem esse uisui ueluti ramus, & conueniens est instrumentum cum fuerit lucidus, uel aliorum corporum lucidorum lumine illuminatus: & sic seruire aerem uisui, sicut cerebro nerui. Sicut enim cerebrum non sentit quod oculi comprehendunt, nisi neruis mediantibus: sic & oculi nihil sentiunt, nisi lucido aere mediante.

Particula tertia est de prima uniuersali medicinæ intentione, & de rebus naturalibus, non naturalibus, & præter naturam, & de generibus & speciebus, & causis & accidentibus morborum. Cuius sunt quinque capitula. De prima medicinæ intentione, & de necessarijs ad eam. Cap. I

Oportet medicum præ omnibus primam & uniuersalem medicinæ intentionem præuidere, & eam particulariter diuidendo ad indiuiduum ducere. Prima autem medicinæ intentio est, quæ bifariam diuiditur: aut enim in sanis, cum similibus sanitas custoditur: aut in ægris per contrariū sanitas redditur. Quorum prima necessaria est rerum naturalium scientia. naturalibus enim agnitis, præstiterit ea quæ sunt similia sanitati: & sic etiā cognoscunt quæ sunt contraria. similibus ergo seruatis, contrarijs prohibitis, sanitas custoditur. Secundæ autem intentioni duo sunt necessaria: non natura

lium scilicet & contra naturā rerū scientia. Sanitas enim infirmo cum quadam mutatiōe restituitur: quam mutationē qui facere uult, necesse est sciat ad quid mutare decet. Nisi enim sciat de quo, et ad quid mutandū decet mutare, non securus est quin unde conuenit non immutari, mutet. & nisi nouerit ad quid decet mutare, ad id quod non oportet, conuertere poterit. Sanitas infirmo reddidit cōmutatione rerum contra naturam ad naturalia. unde & ista sciri debent ad quæ illa transmutant, & illa etiā quæ ad illa conuertantur.

De rebus naturalibus, non naturalibus, & contra naturam. Cap. II

Res autem naturalis duobus est modis, generalis & specialis. Generalis dicitur esse humani corporis complexio, & uniuscuiusque corporis cōpositio. Complexio quidē multipliciter est: tum ætas, & consuetudo. Naturalis complexio est secundū differentiam sexus, ut in mare & foemina: uel secundum euentum, ut est complexio spermatum, uel spirituum de quibus sit. Consuetudo sex modis est. Primo ex aere & eius mutatione, quæ mutatio localis est, uel temporalis, cum aliquid in tempore contingit. Secundo ex motu uel quiete. Tercio ex repletionem uel inanitionem. Quarto ex somno uel uigilia. Quinto ex cibo & potu. Sexto ex animæ accidentibus. Specialis est, ut uirtus, quæ triplex est, naturalis, uitalis, animalis. Superius animalem tetigimus, cum de cerebro disputauimus. Vitalis est quæ cor & arterias facit pulsare. Naturalis triplex est, generatiua, nutritiua, & augmentatiua. Nutritiua quadruplex, attractiua, retentiua, digestiua, et expulsiua. Res autē extranaturam duplex est, aut est nocumentum actionis, aut quod ex eo generatur. Nocumentum actionis, aut quod ex eo generat, duplex est, aut est sine mediatore, & morbus dicitur: aut cum mediatore, & causa uocatur. Quod autē actionis nocumento generatur, accidēs nominatur: quod iterum duplex est, scilicet aut ex diuersis corporis qualitatibus, aut a qualitatibus diuersis a corpore egredientibus. Corporis qualitates diuersitas quinque modis est. Sunt enim qualitates quæ sentiuntur. Qui ergo ægro sanitatem uult restituere, decenter debet inuestigare septem res naturales, quæ sunt, elementa, complexiones, humores, membra, uirtutes, spiritus, & operationes, & quæ sequuntur eas, ut ætates, colores, figuras, distantia inter masculum & foeminā. Et res nō naturales quæ sunt sex. Aer, cibus & potus, inanitiō & repletio, motus & quies, somnus & uigilia, & accidentia animæ. Et res extra naturam quæ tres sunt. Morbus, causa morbi, & accidentia morbum concomitantia.

De generibus & speciebus morborum. Cap. III

Morbus generaliter triplex est, quia corporis cōstitutio tria est. Prima corporis cōstitutio est in membris simplicibus, ex elementis compositis, in quibus quædam morbi species generantur, quæ duobus modis sunt, uel simplices, uel compositæ. Simples quidem sunt calida, humida, frigida & sicca. Compositæ uero sunt, calida & sicca, calide & hu-

& humidæ, frigidæ & humidæ, frigidæ & sicca. Secunda corporis constitutio est in membris quæ composita uocantur, ex simplicibus compositis, in qua sunt morbi quatuor modis: aut secundum formam membrorum, aut secundum compositionem, aut secundum magnitudinem, aut secundum numerum. Secundum formam quinque modis, in figura, foramine, concauitate, lenitate, aut asperitate. Secundum compositionem dicitur cum a loco mutantur uel in loco malo ponuntur. Secundum magnitudinem bifariam, uel ultra modum, uel infra. Secundum numerum similiter, uel ultra modum, uel infra. ultra modum naturaliter, uel extra naturam. Tertia corporis constitutio est corporis totius ex unitate simplicium & compositorum membrorum facta, in qua morbus generatur qui separatio iuncturæ uocatur. Hæc sunt genera morborum & species.

De causis morborum. Cap. IIII

Causa autem morbi est generaliter sicut genus, sed specialiter est triplex. Causa enim morbi simplicis, aut calidum facit morbum, & est septupla id est nimius motus animæ, corporis passio, calor exterior, angustia pororum, putredo, rerum acutarum acceptio, cibi paruitas. Aut frigidum facit morbum, & est octo modis, tactus rerum frigidarum, acceptio earum, multitudo cibi & paruitas, obstructio pororum & largitas, nimius motus & quies. Aut facit morbum siccum, & est quadruplex, sicca rei obuiatio, cibi siccus, cibi paruitas, nimius motus. Aut facit morbum humidum, & est contraria proxima dicta. Sed simplicibus morbis quos diximus cum materia existentibus, commiscetur causæ intraneæ, quæ sunt, uirtus mæbris impellentis, debilitas recipientis, materie multitudo, pororum largitas, defectio nutritiue uirtutis. Causa morbi compositi uel est secundum figuram, uel foramen, uel concauitatem, uel asperitatem, uel leuitatem. Secundum figuram aut propter quantitatem spermatis, uel qualitatem, uel propter aliquod accedens quod infans patitur quando nascitur, uel cum lac fugit, uel propter alia. Secundum foramen, uel propter obstructionem, uel propter coniunctionem. Obstructio fit a fortitudine retentiuæ, uel defectione expulsiuæ, uel propter frigiditatem & siccitatem, uel ligaturæ strictionem. Secundum concauitatem, aliquid innascens uel in membro incidens, ut est chymus, lapis, uerruca. Largitas foraminis coniunctioni contraria est. Asperitas de genere separationis est iuncturæ, cum non est a caliditate. quod post planius dicemus. Lenitas est asperitati contraria. Corruptio loci fit cum mæbra a naturalibus suis locis mutantur, uel separatione, uel mollitie concatenationis mæbrorum. Magnitudinis causa est multitudo materie, uel fortitudo nature. Paruitas membrorum cum contrario est: aut propter incisionem. Magnitudo in numero, aut naturalis est, ex spermatis abundantia, aut accidentalis, ut lapis in uescica. Paucitas autem est e contrario. Separationis iuncturæ triplex causa est, incisione exteriori facta, ut igne uel ense, uel interiori, ut ex acutis chymis, aut ex-

tensione, uel exteriori ut cum fune, uel interiori, ut ex crassa uetustitate; aut de fractura, uel exteriori, ut a lapide, uel interiori, ut ex crassibus chymis.

De accidentibus morborum. Cap. V

Accidentia sunt tria, scilicet nocumentum actionis, diuersitas egredientium a corpore, diuersitas qualitas corporis sensibilium, quorum duorum causa est nocumentum actionis. Actiones tres sunt, animalis, naturalis, uitalis. Nocumentum actionis triplex est. Nam omnis actio tria patitur, uel enim ex toto aufertur, uel minuitur, uel mutatur: uerbi gratia, tactus aut amputatur, & dicitur stupidus, aut minuitur, & titillatio uocatur, aut a sua natura mutatur, & tunc corrupta uocatur. Causa horum duorum est frigiditas tertii gradus, & iuncturæ separatio. Palam ergo est quod causa nocumentum actionis morbus sit. Morbus tantum nocet actioni sine mediatore: ideo nocumentum actionis est significatio morbi, nec est differentia inter accedens & significationem, nisi in nostra intentione, quia nostra intentio est in nocumento actionis, & id ad quod sequitur nocumentum, morbum uocamus, & illum insequenda accidentia dicimus. Morbum autem dicimus causam accidentium, unde morbo cognito cum accidentia scire uolumus, dicimus accidentia significationes.

Particula quarta de accidentibus, & morbis oculorum, & neruorum suorum, & musculorum, & palpebrarum. Cuius sunt xiiij. capita.

De accidentibus morborum oculorum in generali. Cap. I

Sed quia intentio huius libri est patefacere significationes morborum oculorum, prius oportet scire eorum accidentia, ut uia qua ad morbum notitiam ueniamus, sit nota. Accidentia ergo oculorum sunt triplicia, nocumenta actionis, & quæ ex illis sequuntur: diuersitas in oculis, scilicet sensibilis qualitas, & diuersitas ab eis exeuntium. Nocumentum autem actionis oculorum, est secundum quantitatem actionis, id est eorum quæ sunt actionis, uel animalis, uel naturalis. Nocumentum naturalium actionum, est quod accedit quatuor uirtutibus naturalibus: animalium uero actionum quod sensui & uoluntario motui accedit. Actiones animales tantum duas species sensus habent. Nocumentum naturalis actionis in hoc loco non oportet notari, quoniam in hoc non differunt oculi a corpore toto: sequitur enim nocumenta tactus, ut sunt molities, titillatio, & dolor: ita oculis ut toti corpori accedit. Accidentia uero uisus & uoluntarij motus quæ oculi patiuntur hic oportet dici.

De diuisione accidentium oculi, & declaratione membrorum diuidentium. Cap. II

Sciendum itaque quod accidentia quæ oculis contingunt, aut in eius instrumento sunt, aut in sua uirtute, aut in ministris. Instrumentum uisus est humor crystallinus qui patitur, uel unum ex octo similibus morbis, uel ex compositis morbis, cum a suo loco mouetur, uel iuncturæ separationem. Si mutatur a loco sursum uel deorsum in utroque oculo, uident rem duplam: si mutatur dextrorsum uel sinistrorsum, non apparet res dupla. Virtus uisus a cerebro

per concauū neruum descendit: unde eius passio uel de nerui, uel de cerebri, fit infirmitate. Quorū infirmitas triplex: simplex que est una de octo: uel officialis, ut apostema, & obstructio, uel iuncturæ separatio. Ministri uisus sunt humores, & spiritus, & pāniculi, qui oculis septem habentur: quorum illi qui sunt ante crystallinū, sunt foramen uuee, id est pupilla, albugo ouī, spiritus qui est in pupilla, & quantitas pupillæ, quæ corona dicitur.

De accidentibus pupillæ. Cap. III

Coræ id est pupillæ contingunt quatuor, largitas, angustia, mutatio de loco, & tortuositas. Largitas uel naturalis est, uel accidentalis. Accidentalis est, uel de extensione panniculi quo tegitur, cuius extensio de passione est uuee: uel de multitudine humoris albuginei. Passio uueæ aut simplex est, ut siccitas; aut cōposita, ut apostema. Angustia pupillæ, uel naturalis est, uel accidentalis: de mollitie, quæ mollities de nimia fit humiditate dominante, & lubrici faciente, aut de albuginei paruitate. Largitas pupillæ siue naturalis, siue accidentalis, semper est mala, quia spiritū spargit: Sed angustia, si propter rem de qua facta est stricta, naturalis est, bona est, quia spiritum coadunat: accidentalis tamen molesta est, nō ideo, quia angusta, sed propter causam de qua facta est stricta: maxime si fuerit propter albuginei paruitatē. Duplex enim malum est. Vnum, quia crystallinus est discooperus ad lumen; aliud, quia ex paruitate albuginei deficcatur. mutatio pupillæ de loco, uel naturalis est, uel accidentalis. Accidentalis cōsideretur. Panniculi qui sunt iuxta pupillam cōtumescent, uulnerantur, & consolidantur. Hæc tamen mutatio non multum est mala. Separatio iuncturæ si sit in uuea, & non sit perforata, nō multum nocet uisui: quod si perforetur, currit humor albugineus, & uueam tunicam coniungit araneæ. Vnde quinq; accidentia generat. Vnum, quod uuea crystallino propinquatur, nec habet unde cooperiatur: atq; spiritus uisibilis de cerebro procedens nō coadunatur in pupilla, sed egreditur ab ea, & dispergitur.

De accidentibus albuginei humoris. Cap. IIII

Albugineus humor in quātitate & qualitate patitur: in quantitate, si augmentatur, unde uisus obscuratur, uel minuitur: unde nequit crystallinū cooperire, in qualitate, liquore & colore: liquore si parum crassus fuerit, longinqua uidere nō sinit, & propinqua bene discernit. Si sit crassissimus omnino, uisum occupat, & amputat, & cataracta dicitur: quæ uel in parte una, uel in multis locis dispersita est, in uuea, uel in pupillæ medio, uel circa eam. Si sit in medio, omnia perforata uidentur infirmo. Partem enim quam uidere nequit, putat concauam esse. Si circa pupillam, multa in una hora uuea non permittit uidere, propter paruitatem pineæ uisus. Si crassitudo dispersita sit, & particulariter sit diuisa, quæ uidet putat esse quasi stricta, unde patiens cernit quasi muscas & similia, quod pueri & febricitantes plurimum patiuntur. Color si mutetur, omnia coloris istius esse putantur, utpote si fuerit plumbeus, omnia fumosa appare-

A hunt & tenebrosa, sic & si fuerit alterius coloris idem ipse color in uisus omnibus apparebit. eistamen ad cataraclam præparati sunt oculi, de quorum stomacho fumus ad caput ascendit, & patientibus fluit de naribus reuma.

De accidentibus uisibilis spiritus. Cap. V

Spiritus uisibilis in qualitate & quantitate patitur. In qualitate, utpote si fuerit subtilis, unde bene discernit, ac res optime comprehendit: uel crassus unde ad remota loca penetrat, et longinqua uidet: uel paucus ad remota se elongare nō ualens, sed solum propinqua cernens.

De accidentibus corneæ. Cap. VI

Pannus corneæ, quod pupilla tegitur, si quomodo patiatur, uisui nocet, cuius nocumentum propter se, uel propter aliud fit. Propter se, tria morborum genera patitur, uidelicet simplicem, compositionem, & separationē iuncturæ. Simplex, ut humiditas, & siccitas. humiditas uisui nocet propter quantitatem, ut si fuerit multa, omnia sicut fumus & nebula apparebūt: uel propter qualitatem, utpote si rubea fuerit, omnia uideri rubea facit, ueluti qui patiuntur sebel contingit. Si aut citrina fuerit, citrina apparebunt omnia, sicut ietheris fit. Siccitas spasmū generat, unde uisui nocet, si multum: uisus ergo quandoq; ex toto amputatur. Separatio iuncturæ, si fuerit perforata cornea, duobus modis uisui nocet. Vno modo propter putredinē in illo uulnere cōgregatā. Secūdo, quia crystallinus secūdo lumini fit uicinus. Passio corneæ, quæ propter aliud fit, uel propter cōiunctiuā, uel propter palpebram est. Propter cōiunctiuam, si ungula nascatur in ea, uel fiat apostema corneæ operiens: sed passio corneæ & cōiunctiuæ & aliarū partium oculorum non nocet uisui, nisi accidentaliter.

De accidentibus motus uoluntarij oculorum. Cap. VII

Passio uero motus uoluntarij oculorū est triplex. Vel enim amputat, & mollities uocatur: uel minuitur, & tremor et titillatio dicitur: uel propter la certos, cum nō ut oportet, mouentur, & spasmus nuncupatur: quorū trium unumquodq; sit, aut propter cerebrum, aut propter neruos, aut propter la certos: sed diuersitas mollitiei ac spasmī lacertorū oculos mouentiū est secundum diuersitatem motionis eorum. Quod quomodo uideat, uel unde procedat, in fine sexti capitis planius dicitur.

De diuisione morborum oculorum in apparentes & occultos. Et primo de apparentibus. Cap. VIII

Morbi oculorum uel sensui apparent, & facillime cognoscuntur, uel latēt, & eorum notitia est obscura, quorum significationes intellectuāli investigatione comprehenduntur. Incipendum igitur a morbis sensui apparentibus, & ostendendum in quo loco oculorū appareant, & nascātur. Morbi ergo qui sensui apparent, uel sunt in cōiunctiuā, uel palpebra, uel in angulo oculorū, uel in cornea, uel in uuea, uel inter uueam & crystallinum. In cōiunctiuā septem sunt, uidelicet petia, ungula, ophthalmia, tumor, duritia, & similia. Petia est sanguis fluens de aliqua arteria, uel uena incisa, quam patitur exictu. Ungula est superfluitas neruosa

uola aut carnosā; extēdens se ab angulo ad pupillam, & prohibens uisum. Ophthalmia triplex est, quæ uisum turbat. Cuius causa uel exterior est, sicut fumus, sol, puluis, & similia; uel interior, sicut humores ad cōiunctiuā fluentes. Sed prima ophthalmia mala nō est. Causa enim quāprimum ablata, morbus amputatur. Secūda uero, postquam causa amputatur, habet & signa quæ habent cætera membra cum patiuntur apostema, quæ sunt, tumor, inflammatio, durities, lachrymæ, rubor, plentudo uenarū oculi. Tertia cæteris est fortior, quia & alias habet significationes. Acumen enim palpebræ inuerfatur extrinsecus, eiusq; motio uix fit, & albugineus ascendit super nigredinem. Tumor est quadruplex. Vnus fit ex crassa uentositate. Secundus ex phlegmatico humore non crasso. Tertius ex phlegmate crasso. Quartus ex melancholia, qui dicitur scleros, qui omnes sic adinuicem discernuntur. Primus euenit subito, sicut uidemus seniores in æstate pati propter muscarū morsus. Secundus & tertius paulatim fiunt, sine magno dolore & mollitie, minore in secūdo quā in tertio, quorū color est sicut color totius corporis. Quartus uel plurimū fit in angulis oculorū, & aliquādo dilatatur & ascendit ad supericiā durus, multum habens dolorem. Eius color plumbeus est, qui multoties sequitur uarias & diutinas ophthalmias, & maxime quæ mulieribus contingunt. Duritia nascitur in oculo toto, nascitur & in palpebris, quæ motū grauem facit cum dolore & rubore, nec patiens ualet oculos aperire cū à somno surrexerit, attamen sunt lachrymæ falsæ & nitrosæ, dolor & rubor in toto corpore palpebris fiunt ex humiditatib. falsis aut acutis, si cōiunctiuā est plena crassi sanguinis, quæ cum inflatur, rubet fit coloris. Est & proflua, quæ pudorem & timorem facit.

De passionibus palpebrarum & angulorū suorum. Cap. IX

Passiones palpebræ quædam sunt communes morbis totius corporis, sicut uerrucæ, scrophulæ, & similia. Nascunturq; uel extrinsecus uel intrinsecus. Extrinsecus, sicut est crassities, quæ est quasi pinguedo uiscosa relata neruis & pāniculis. Nasciturq; in palpebra superiori, intrinsecus scabies, quando, petrositas, & uiscositas. Scabies quatuor modis est, una dicitur psorophthalmia, alia choma, tertia scycosis, quarta telosis. Prima secunda leuior est, quæ magis aspera dolorem & grauitatē facit. Vtræq; tamen in oculis humiditatem generat. Tertia dura est & asperior, quia palpebræ interioris quasi scissura est. Quarta cæteris deterior est & durior ad sanandum. Grando est tumor crassus in interioribus coagulatus, ut quasi grandio uideatur. Inuiscatio est quædam uiscositas palpebram cum pupilla iungens siue in eius albedine, siue in eius nigredine, uel utrasque palpebras simul iungens, qualis fit propter uulnera in oculis. Item no cumentum palpebræ triplex est. Vnum, erectio palpebræ superioris, ne oculi albedo possit cooperiri, quod aut est naturaliter, aut cum palpebræ tortura mala fit. Aliud est palpebræ breuitas. Tertium est palpebræ inuersio ad partem inferiorem,

A quando nascitur aut propter aliquod uulnus, uel propter carnem superflua in carnibus natam. Rasa & uulnus nascuntur in eis sicut & in corpore toto in extremitate palpebræ. Pili superflui ad interiora cōuersi nocent, & pili aliquando à palpebris cadunt. Nascuntur ibi pediculi & ordeoli. Pili superflui in interioribus palpebræ nascuntur, qui pungunt & ad oculos humorem adducunt; pili cadunt aut propter humorem ad eos fluentem, aut propter alopeciā, & aliquando cum duritia, grossitie palpebræ, & rubore. Hordeolus est apostema nascens in extremitate palpebræ. Aeglops est ulcus inter oculos & nares, quod si fuerit neglectū, fiet ex eo fistula putrefaciens os, & quandoq; putredo fluit per foramen ad nares, aliquādo ad palpebram eiusq; cartilaginem putrefacit, & si palpebra digito tacta fuerit, putredo ab ea effluit, quando & lachrymæ noxiæ sunt oculis. Lachrymæ fiunt uel apostemate in foramine inter oculos & nares existente, qui hoc habent semper lachrymas patiuntur, nec fiunt lachrymæ ex conamine medicorum acutas medicinas in scabie ponentium.

De passionibus corneæ. Cap. X

Passio in cornea nascens, uel propter oculos, uel propter totum corpus causatur, in qua tamen infirmus magnum dolorem sentit in neruo, & patitur extensionem in panniculis oculorū, qui panniculi ruborem & extensionem sentiunt ascendere, & maxime, si ambulat, aut mouetur, capitis dolorem patitur, & ab oculis subtilis & acuti humores fluunt, neq; potest acuta colliria sustinere, neque ualēt oculis imposita. Passio corneæ propria est uulnus, macula, obscuritas, sanies, & talia multa, septem nominibus dicta, quarum quatuor intrinsecus, tres uero sunt superficiei tenus. Intrinsecus hæc sunt. Prima est uulnus, cuius color est quæ si fumus, quandam partem nigredinis operiens. Secunda uulnus, plus primo concauū, sed tamen albidius. Tertia uulnus partem albedinis & nigredinis operiens. Pars tamen qua tegitur albedo, rubei coloris est, quæ uero super nigredinem stat, alba est. Quarta est uulnus quoddam in modum faculæ putrefactum. Passiones uero exteriores hæc sunt. Prima est quoddam uulnus concauum & angustum. Secunda est uulnus concauum, sed largius. Tertia uulnus plus cæteris putrefactum: hoc obliuioni traditō, oculorum pāniculī putrescent. Quare autem omnes corneæ passiones aliquando curabiles, aliquando incurabiles sint, causa duplex est, aut propter diuersitatem uulnerum, aut propter diuersitatem materierum in uulnere existentium, & cornea de multis corticibus composita est, uno super alium locato. Aliquando uulnus in primo, aliquando in secundo, nōnunquam in tertio cortice nascitur, propter materiam quæ in quantitate multa est, aut pauca, aliquādo alba, aliquādo nigra, modo subtilis, modo crassa, calida sola, uel acuta, uel nitrosa, uel dulcis. Quod post tertium corticem est, molestius est quā quod post secundum, & post secundum quā post primum, salubrius quod fit in superficie, deterius quod est post

post omnes cortices. Materia si fuerit multa calida, patiens magnum in oculo sentit dolorē: multitudo enim materiei facit extensionem & calidum dolorem. Item salubrius est quod non est in loco pupillæ, deterius quod in loco pupillæ: quia si scindatur uulnus, non sumus securi, quin per uream pupilla egrediatur, & fluat humiditas oculorum, quod si uulnus super pupillam sit, uulnere sanato uisus offenditur.

De egressione uue, & passionibus eius. Cap. XI

Egressio uue quatuor modis fit. Aliquando enim egreditur parum, ut uidentes pustulam esse putent. Sed si discrete inspicitur uuea sani oculi, & uuea infirmi oculi, & si earum colores sint dissimiles scias pupillam egredi. Si uero similes, apostema ibi ortum esse: aliquando plus exit, & tunc satis apparet eam esse egressam. Tertius modus est, cum tantū egreditur ut palpebræ minus praeualeant, & pilī palpebram pungentes iungēdo dolorem inferant, & hunc modum melon dicunt. Quartus modus *νῦψος* Græcè, Latine dicitur clauus: quia egrediens pelliculas uuee superficiē tenens operit, unde eius forma fit quasi clauus. Passiones uuee sunt, dilatatio, aut contractio. Dilatatio autem fit quatuor modis, aut ex nulla causa patenti, uel propter percussione, uel propter apostema, uel propter aliam passionem.

De suffusione, seu cataracta. Cap. XII

Inter uueam & crystallinum humorem aqua nascitur coagulata, prohibens spiritum uisibilem à pupilla exire, quæ passio si est incipiens, obscura est, perfecta uero facillime cognoscitur. Sed qui ad hanc uenturi sunt passionem, eis ante oculos cimices uolant, quibusdam autem quasi flammæ apparent, incidentibus autē uisus amputatur, & color pupillæ amputatur: huius aquæ color est diuersus, quædam enim aeri, quædam uitro assimilatur, alia est quasi album habēs colorem, alia quasi cæli colorem, alia quasi uiridē, alia quasi uenetum. unde antiqui cataractas, ueneticos oculos appellauerūt, sed differētia est, quia ueneticī oculi duobus modis fiunt, uel propter aquam si nimīū fuerit coagulata, uel propter siccitatē quam patitur crystallinus. Species aquæ, quæ aeri assimilatur, facile potest curari, licet eius accidentia sint quæ supra diximus. Secunda uero species quandoque curabilis est, quandoque non, quod sic dignoscitur: Si uno oculo clauso pupilla alterius dilatatur, possibile est sanari, sin autē, minime. causa, quia neruus cōcauus quo uisibilis spiritus ad pupillā ducitur, oppilatus est. Hæc cataracta ex passiōe stomachi procedit, uel cerebri, sed sic discernitur. Si appariit in uno oculo fuerit, uel in utroque, sed diuersæ, cataracta ex cerebro esse intelligit: si in utroque æqualiter, stomachi esse cognoscitur. Item si modo plus, modo minus apparuerint, ita qd stomacho minus digerētē maior fit. Item si patiens, de stomachi arsurā, uel ardore murmurauerit. Itē si ex picra exhibita, ista imaginatio decreuit, cum eū nō fuerit huius mali cataracta, picra uidet nihil esse proficua. Si fuerit propter cerebrū, plurima ex phre-

netica nascitur passione, quia phrenesis est apostema calidum nascens in cerebri prora: sitq; quasi fuligo, calorem secundum humorem de quo nascitur, desiccante, & per uenas circa cerebrū & oculos ad oculorum substantiam penetrante: talia enim apparere facit. Sufficit de passionibus oculorum uisui apparētibus. Oportet de his dicere quæ difficile intelliguntur, quia intrinsecus nascuntur.

De passionibus oculi natis intus, & oculis. Cap. XIII

Passiones intrinsecus nascentes sunt mollities quæ dicitur paralytis, & desiccatio, quæ spasmus uocatur. Paralytis autem triplex est, uel enim motum amputat, uel uisum, uel utrumque. Sed uisum amputato absque causa manifesta, uel etiam minorato notabiliter, propter nerui concaui passionem, uel propter uisibilis spiritus paruitatem fit. Neruus patitur contractionem, uel iuncturæ separationem, & tunc necessario usus corrumpitur. nec enim manifestatur, nisi rationabili inuestigatione comprehendatur: uerbi gratia si uisus absque manifesta causa, uel minuitur, uel auferitur, interrogetur patiens an grauitatem sentiat in prora capitis, aut circa frontem. quo id patiente, scias humores humidissimos ad concauum neruum fluxisse, eumque obstruxisse, uel apostema ibi generasse. Potest etiam aliter inuestigari, si uno oculo clauso pupilla alterius non dilatatur, neruum obstructum esse non dubitatur. Item patiens interrogetur si in capite fuerit percussus, uel propter casum aliquem uulneratus, quod si fuerit, nec pupilla exierit post, nec magis subito uisus conuersa fuerit, scias neruum esse contractum. Si autem propinqua uideat, & non longinqua, & non parua, scias spiritum uisibilem esse defectum. Quod si longinqua & minime propinqua uiderit, & si meridie, uespere uero non, sicut accidit senibus, scias causam esse crassitiem spiritus, uel suam commistionem cum turbidis humoribus. Hæc sunt accidentia in substantia oculorum latentia. Sed passionēs oculorum in mobilibus locis nascentes, aut sunt propter cerebrum, aut propter neruos, aut propter lacertos. Si propter cerebrum, necessario in utroque oculo corrumpitur motus: si propter neruum, illa pars oculorum offenditur, quæ ab illo neruo regitur. quod si neruus non in toto patitur, sed in parte, motus lacerti qui neruo illi pertinet corrumpitur, nonnunquam passio non in neruo, sed in essentia lacerti nascitur.

De musculis qui mouent oculos & palpebras, & de uis per quas fluunt humores ad oculos. Cap. XIII

Lacerti autem oculorum sunt, ut diximus, duodecim, quorum quinque oculi ipsi mouentur, tribus utriusque nerui fundamentum corroboratur, & per eos oculi seorsum mouentur. Reliqui quatuor palpebras mouent. Passio uero lacertorum est duplex, mollities & spasmus. Quod si lacerti motus oculorum, molles fiant, oculi suæ grauitatis causa descendunt inferius, & cum palpebris se infingunt. Si autem spasmauerint, uersos oculos torquet, & sic neruis spasmantibus in eadem parte qua ipsi patiuntur, oculi torquentur. Tres uero lacerti utriusque

nerui fundamentum corroborantes, oculos A
superius eleuant, si spasmantur, oculi nō patiuntur, imō inde confortantur; si autem mollificantur, oculis nocent, quia extra egrediuntur. Oculis ergo absque ulla percussione existentibus, uisusque permanente, scias nervos esse mollificatos: quod si fuerit ex percussione nervuorum, fracturam esse cognoscas. si nervus qui palpebras sursum mouet, mollificetur, palpebra deorsum cadet, si spasmatur, nō ualet oculus claudere: lacertis quibus interioris mouent palpebrae mollificatis, oculi non clauduntur, si spasmantur, palpebrae superius non eleuantur. Quod si lacerti in parte patiente non patiuntur, nec palpebrae in loco eius atinente patiuntur. Humores autem ad oculos fluunt, uel per uenas supra cranium existentes, uel per eas sub craneo existentes. Si per uenam supra cranium manauerint, frōtis & temporum uenae crassae sunt & extensae, unde ualet si inciduntur, uel defecatiua emplastra uel cataplasmata apponantur. Si autem haec nō apparuerint, scias humores per uenas quae sub craneo sunt, manare.

Particula quinta est de uirtutibus medicinarum sanantium morbos oculorum.

Cuius sunt capita sex.

De distinctione medicinarum oculorum per se sapores. Cap. I

Qui oculorum passione uolunt curare, eorum medicinas, & uirtutes earum oportet cognoscere, quae maxime saporibus ostenduntur. Sapor enim uirtutes innuit. Vnde sciendum quod quae ad linguam ueniunt, & nihil in eam faciunt, insipida uocantur. Insipida autem uel sunt simplicia, sicut aqua, uel cōposita, nulla tamē qualitate praualente. Quod si aliqua praualuerit, erit aliquantum frigiditati attinens, sicut medicina quae dicitur obstruens, quae duobus modis est, aut terrestris & sicca, sicut haematites, & tutia, & cadmia, & his similia: uel uiscosa, ut oui albugo, oleum omphacium. Quibus aer dominatur, linguam pati faciunt, uel cum delectatione, uel cum nocumento. Quae delectationē inferunt, necessario patet quod quibus ea faciunt, eis similia sunt. Linguam ergo delectantia humane cōplexioni sunt similia. Humana autem cōplexio, temperate calida est & humida. Hinc ergo & omnia linguā delectantia, & humana corpora, sicut aqua tepida, delectant. Delectationē ergo faciētib. si aqua domineat, dulcia sunt, si aer, unctuosae erūt. Ideoque omne nutrimentū uel dulce, uel unctuosum, uel compositū ex utroque. Quibus uero praeter istos sapor alius dominatur, nō nutrit, sed sunt propter medicinā. Quae uero nocent, faciunt linguā punctionē, quae punctio species est separationis iuncturae. Separatio enim iuncturae aut nimia cōstrictione fit, aut incisione. Quae incisionem faciunt, calida sunt, quae nimiam cōstrictionē, frigida sunt. Item linguā separantia, aut multū, aut parū separant. Multum separantia, crassa sunt, terrestria, dura, & amara. Quae nō multum separant, falsa uocantur, Quae uero subtilia & ignea, dicuntur acuta. Quae autē cōstringunt, uel sunt crassa, terrestria, uel subtiliatiua, & aquosa.

Terrestria, & crassa, multum cōstrictiua & pontica sunt. Quae uero minus cōstrictiua sunt, & styptica, subtilia dicuntur acetosa.

De speciebus saporum, & impressionibus quas in lingua faciunt. Cap. II

Sapores autem sunt isti, dulcis, unctuosus, amarus, salus, acutus, pōticus, stypticus, acetosus. Ponticus coadunat linguā & premit, nō solum superficie tenus: uerū etiam intrinsecus, unde obstruit & asperat: Stypticus similiter: Sed salus lauat & mundificat. Amarus magis falso mundificat, exasperat, & excoriat. Acutus uero mordet, pūgit, & calefacit: Acetosus uero sine calefactione. Dulcis humectat & lenit asperitatem linguā, & delectationem tribuit. Vnctuosus similiter, sed debilius. Sapidus de genere dulcedinis aquositate non habet sibi dominantē, etiā in sapido dulcedo tantilla sentitur: Vnde fructus à terra sublimes sunt dulces, & propinqui sapido: quia humiditas eorū uicina est humiditati sapidi. Ponticus ergo terrestris est & frigidus: acetosus, aquosus: amarus, terrestris calidus & igneus: dulcis, calidus & terrestris: unctuosus, aereus. Ponticum quoque pororum scimus coadunatum, cōstrictiuium, incrassatiuium, refrigeratiuium, & desiccatiuium. Acetosus incidit, subtiliat, aperit, mundificat, attrahit, dissoluit, incidit. Amarus mundificat, lauat, attenuat, & calefacit. Salus coadunat, obstruit, desiccatur, nō multum calefacit. Dulcis mollificat, maturat, & moderate calefacit. Vnctuosus humectat, & mollit sine manifeste delectatione. Et sciendū quod ponticus & acetosus sunt in frigidatiōe aequales, sed ponticus, terrestris, acetosus, aquosus est: quod & sensui patet & intellectui. Videmus enim in initio fructus ponticos esse suae arbori similes, sicut oliuā, uīuā, coctana, granata, & similia, quorū quidem quanto sunt plurius temporis, humesciunt, & cum sua humiditate & ponticitate acetositate recipiunt, deinde sapor paulatim mutatur, quousque dulcis fiat. Sed nonnulli ad dulcedinem ueniunt, nulla mediante acetositate. Sed maturatio fructuū fit calore, quae duobus est modis. Vna naturaliter fit in fructuum essentia ex proprio ipsorum calore, alia ex calore solis. Item sensui patet, quod uidemus ponticum linguam cōstringere & desiccare, quod est eminentis frigiditatis actio. Palam igitur ponticum fragile est, etiam penetrabile, eius causa est calor in eo ebulliens. Vnde patet ponticum crassum esse & terrestre: acetosum uero, subtile aquosum, quod sic ceterificatur. Inuenimus fructus in initio ponticos esse & frigidos, quorū pōticitatis minoratio, aut est propter solis calorem, aut propter humiditatem, aut propter utrumque. Si propter solis calorem, maturati dulcorantur, sicut castaneae. Si autem propter humiditatem crassam, fiunt fructus pōtici: Si autem propter humiditatem aquosam & quasi aerea mutantur, fiunt acetosi. Si causa caloris & aquosae humiditatis mutantur, dulces fiunt. Si uero humiditas aerea fuerit, fiunt unctuosi. Item dulcia & amara sunt calida, sed dulcia sunt in caliditate & humi

ditate

dirate tēperata, sic unctuoſa, unde utraq; naturæ humanæ cōueniunt, quæ in humiditate & calore temperata ſunt. Amara uero ſunt calidiora dulcibus, & ſicciora, quod arbitratione probaſ. Omnis liquor ſi naturali uel extraneo calore coquatur, in primis dulcoratur, ſed augmentato colore fit amari ſaporis, ſicut mel cum inueteratur, & etiam ſuper prunas excoquitur. Idcirco dulcia cum modera mine & delectatiōe: amara uero, nō moderate, quia & iuncturam ſeparant. A cūta, & ſalfa, calida & ſicca ſunt, acuta tamen calidiora & ſicciora quali ignea, unde incidunt & elidunt: ideoq; exterius poſita mundificant, & ſuperfluum carnem in uulneribus natam corrodunt. Salfa uero potui data craſſos humores de pectore & capite educūt, epilepſiæ repugnāt; neq; enim uelociter ut acuta penetrant, neq; in eis eſt tanta craſſitudo, ut diu morerentur ingredi, ſicut pontica. Salfa uero terreſtria & calida ſunt, ſed minus quā amara. Et hac ratione ſapores inueſtigantur.

*De uirtutibus medicinarum primis, ſecundis & tertijs,
& ſuis effectibus. Cap. III*

Virtus autem medicinæ diuerſa intelligitur. Eſt enim prima, ſecunda, tertia. Prima quidem quadruplex eſt, calida, frigida, humida & ſicca: quarum unaquaq; quatuor gradus habet, & unicuiq; graduum eſt initium, medium atq; finis. Quæ igitur primo gradu eſt, corpus immutat à ſuo temperamento, ſed hæc mutatio ſenſu nō apparet. Quæ autem in ſecundo, corpus à temperamēto mutat, ſed non multū apparet. In tertio gradu conſiſtens, manifeſte mutat, ſed non corruptit. Quæ uero in quarto gradu eſt, mutat & corrumpit, ſed calida cum intentione deſtruit, frigida cum dormitatione. Quæ uero in quarto gradu ſicca ſunt, neceſſario ſeparant iuncturas. Hæc primam habent uirtutem. Secundam uirtutem habentia uocantur, maturatiua, mollitiua, obſtruētia, aperitiua, mūdificatiua, in craſſatiua, inciliua, incēliua, putrefactiua, carnis depaſcitiua, carnis generatiua, ſolidatiua, doloris mitigatiua. Maturatiua et mollitiua calida ſunt. Maturatiua etiam neceſſe eſt ut tantum habeant calorem, quantū membro curando neceſſarium ſit, ne minuat uel augmentent ſuam naturalem humiditatē. Mollitiua calidiora & humidiora eſſe oportet: quia membra mollitiuſi egētia ritiem habent, cuius cauſa eſt humor craſſus frigidus & uiſcoſus, unde calida neceſſaria ſunt quæ craſſitatem & coagulationem illius chymi diſſoluāt. Oportet ergo ne ille calor ſit nimius, ne illius chymi ſubtilitate reſoluta quod craſſum eſt, indureſcat, atq; putreſcat. Item neceſſe eſt ut calor eius ſit in fine primi gradus, ſicut bdellium, ſigia, galbanum, ammoniacū, tum cum medulla uitulina, caprina, bouina, & ſimilia. Maturatiua ſi ſint calida & humida, obſtructionem tamen quandam oportet habere qua pori claudantur: quia illis obſeratis calor interius adunatur & corroborat, unde & digeſtiua & cæteræ actiones naturales uigent, ſicut facit oleum cum aqua calida, farina frumenti

cum aqua, mica panis, ſeuum porcinū, uel camelinum, pix, reſina, gummi cypreſi, cera cum oleo, thus & ſimilia. Hæc ergo obſtructionem faciunt, ſed non tantam ut diſſolutioni repugnet. Si igitur mollitiua huiusmodi eſſe oportet, induratiua neceſſario erūt frigida, ſicut portulaca, phyllū, lens, aqua, ſolanum, & ſimilia. Obſtrentia adeo poroſ obliuant, ut ſaſe aperiri nō poſſint, unde neceſſe eſt eaſe terreſtria, uiſcoſa, nullā punctionē facientia, quæ ſi pungunt, mēbra ferre non poſſunt, & attenuāt, poriq; aperiunt, & ſic oportet ea eſſe abſq; calore nimio & frigore. Aperitiua dicuntur eſſe contraria, ut craſſam materiem attenuēt, quæ uirtus in amaris & nitroſis inueniē, ſicut ſunt iris, amygdala amara, nitrum, orobum, lupinus, dictamnus. Sed aperitiua quæ ſtypticitatem & ponticitatem habent, extra poſita non aperiunt, ſed pota ta uicerum aperiunt obſtructionē. Mūdificatiua ſunt neceſſario quali aperitiua, tamen debilio-ra, ut lauent & mūdificent, ut uiolæ, fabæ, dulces amygdalæ, & ſimilia. Medicina corpus mūdificans temperate calefacit, nec deſiccāt, nec craſſitē habet, ſicut chamaeleum, malua, ſambuceleon, radix elenij, & ſimilia. In craſſatiua eſt quali obſtruens, cōſtrictiua oris uenarum craſſa eſt & frigida, ſtyptica, omni carens reſolutione. In cenſiua multum calida eſt, ſicut allium, cæpa, ſel tauri, & ſimilia. Putrefactiua ſubtiliſſima eſt, ualens primo ſuperficiem. Carnis minutitiua eſt, quali putrefactiua, debilior tamen. Cicatrizatiua eſt ſicca & ſtyptica, ſed inciliua, aliquando carnē generat, ſi modice uulneribus apponitur. Attraſtiua dicitur naturaliter & accidentaliter: naturaliter cuius attraſtiua eſt cum calore & ſubtilitate, ſicut ſagapenum: accidentaliter cui propter putredinem uirtus innaiſcit, ſicut fermento. Doloris mitigatiua conuenit habere calorem ſimilem calori corporis. Huiusmodi ſecundam habent uirtutem. Tertiam habent uirtutē, quæ lapidem frangūt, pectus & pulmonem ad ſcreandum iuuant, lac & ſperma generant, urinā & menſtrua prouocant. Medicina attenuans & incidens nimietate caloris lapidē frangit, utradix capparis, radix calamitū, uerq; elleborus, acetum ſcilliticū. Si enim multum habent calorem, lapidem frangere uidentur, ſi nimium calorem non habuerint, & cum aliquo humido accipiuntur, ad ſcreandum utiliſſima ſunt: ſed ſi aliquantulum ſint calidiora, & tamen in ſtatu temperamenti permaneant, ſiccitatēq; non habeant, lac & ſperma generant: ſi autem multo plus calidiora ſiant, ſed non ſicciora in ultimitate, menſtrua prouocant, ut acorus, petroſelinum, ſeſelis, & ſimilia, quæ ſunt calida, nec minus ſicca.

*De diuiſione medicinarum ſumptarum à plantis, & metallis,
& animalibus, exemplisq; earum. Cap. IIII*

Medicinam oculorum ſcire uolentem, uirtutes medicinarum ſuarum oportet prius cognoscere. Sciendum itaq; quod oculorum medicatiua quedam de naſcentibus terræ, quedam de metallis, quedam de animalibus ſunt. De naſcentibus eſt, ut gummi, aſſa, ſagapenum, euphorbiū, myrrha, opium

opium, thus, tragacanthum, galbanum, sarcocolla, oculi liciorum, ammoniacum, aut hypocythis, acacia, marathrum, fenugraecum, rosa, glaucium, aloes, amygdala, uel sicut galla, ut flos rosae & frondes, aut folium, aut lignum, ut casia, & cinnamomum, uel ut cortex thuris, uel mandragora, uel spice nardi. De metallis sicut haematites, sal ammoniacum, flos aeris, arugo, arsenicum, cadmia, nitrum, calcanthum, plumbum, antimonium, ferrum, ferrugo. De animalibus aliquando sunt humores, sicut fel, lac, albumen oui, & urina, aliquando membra eorum, ut cornua, castoreum, quarum omnium uirtutes singulariter ostendam.

De predictis medicinis & earum effectibus. Cap. V.

Asa ceteris gummis calidior est, incendit & dissoluit. Sagapenu calidum est & subtile, mundificat & attenuat maculas oculorum, ualet quoque suffusio ni & obscuritati quae fit ex turbiditate. Euphorbium subtile incensium est. Myrrha calida & sicca, pustulas oculorum absque dolore mundificat. Thus calidum in secundo gradu, siccum in primo. Gummi arabicum frigidum est & siccum, obstruit: Tragacanthum similiter. Sarcocolla desiccatur & consolidatur sine nocumeto oculi. Licium temperatum est in calore, unde mundificat & attenuat crassitudinem super pupillam nascentem. Ammoniacum apostemata oculorum mundificat & dissoluit. Rosa refrigerat. Glaucium similiter. Succus hypocythidis confortat & refrigerat. Acacia similiter. Mandragora refrigerat, dolorem placat, quia dormitionem prouocat. Marathrum ualet cataractae, maculas mundificat. Malum coctum oppilat & refrigerat. Gallae repugnat humoribus ad oculos fluentibus, & membra confortat. Crocus maturat. Balauistia refrigerat, repugnat, desiccatur, & confortat. Spica dissoluit & attenuat. Cinnamomum calefacit, maturat, atque desiccatur, & confortat. Haematites desiccatur, & ualet asperitati palpebrarum, carnem superfluum manducat. Sal mundificat, & desiccatur: Similiter sal ammoniacum. Arsenicum rodit & incendit, carnem dissoluit & minuit. Cadmia desiccatur atque constringit & mundificatur: quae incensa & lota, superiora agit sine punctione, adiuvat etiam oculorum uulnera, maxime si humida, quia desiccatur ea. Plumbum desiccatur. Antimonium desiccatur, & constringit, & calefacit. Aesustum uulnera consolidat. Cerusa desiccatur & infrigidatur. Flos aeris desiccatur, constringit, & calefacit. Tutia desiccatur et infrigidatur sine dolore, maxime si lota est: ualet etiam uulneribus, pustulis, & lachrymis oculorum. Ferrugo desiccatur & constringit: quae uero contra pustulas spinosas. Arugo carnem minuit & attenuat. Sciedium est, quod omne fel est siccum & attenuatum, quod mistum oculi medicinis uisum acuit. Albumen oui confortat & oppilat. Lac lauat & mundificat. Castoreum scindit atque maturat.

De nouem potentijs medicinarum oculorum, & suis effectibus. Cap. VI

Haec est diuersitas specierum medicinae oculis pertinentium. Oppilatiua. Colatiua. Mundificatiua. Aperitiua. Putrefactiua. Constrictiua. Con-

tractiua. Maturatiua. Dormitiua. Oppilatiua duobus modis est, terrestris & sicca, uel humida & uiscosa. Terrestris desiccatur humores calidos & subtilis ad oculos fluentes, maxime si ibi sint uulnera, quibus oportet adhiberi mundato capite, prout necesse est, & toto corpore fluxuque humorum cessante. haec enim medicina leuiter & subtiliter medicriter desiccatur humores qui in oculorum uenis latitant, & ad oculorum panniculos prohibet penetrare; transactoque humorum cursu, causaque fluxionis eorum praeterita, haec medicina non amplius debet dari, quam ne dolor oculorum augmentetur, quia panniculi oculorum nimia humorum multitudine extenduntur, unde et quandoque finduntur. huius tamen medicinae posteritas non in pauco declaratur tempore, quoniam aliquando operatur, & si ratio non expostulat, scilicet uulneribus in oculis apparentibus, uel corrosione in cornea existente: uel uinea egrediente: acutis tamen humoribus ad eos fluentibus, non audemus desiccatiua ponere. Stypticus enim illic positus humores fluere prohibetur, unde dolor augmentatur. quod si medicina apponatur, materiae ad oculos fluentis acumen augmentatur. Mollitiua uero seu dissolutiua seu maturatiua, si dentur, humores quidem maturantur: sed tamen in uulneribus caro non generatur, neque uulnus sanatur. A cetosis frigidis applicatis, punctura, & morsura, & tumor in oculis generantur. Nulla igitur medicina conuenit huic passioni, nisi quae inter calidum & frigidum temperata est, uel temperamento uicina, quod facit tutia lota, cadmia uista & lota, similiter cerusa lota. Alia autem medicina oppilatiua, scilicet humida, uiscosa, quam diximus, ualet in hoc loco modis duobus: uno, quia non pungit, fed dolorem mitigat alio, quia laedit asperitatem ex humorum fluxu factam: uulnera enim lauat unde dolor mitigatur, quia crassi humores acuti mundificantur. Sed oculorum medicina sapientissime metallina est: quia uero oculi sensum habent a cuti, cum metallina, uiscosa & humida miscantur, ne asperitatem faciant, sicut albumen oui, fenugraecum, lac, gummi Arabicum, tragacanthum, & similia. Medicina aperitiua dissolutiua, necesse est ut sit acuta, quam non expedit ponere in pustulis corneae, nisi res maturatiua propter suam duritiem non ualeat. Similiter cum apostema tunnicarum panniculorum & pellicularum, maturatiuis non curatur, acuta imponatur: quibus tamen maturatiua miscantur, sicut asa, sagapenum, euphorbium, cinamomum, amomum, acorus, asarum, casia, folium, spica. Mundificatiuarum & colatiuarum quaedam mundificant, & colant modicum & ualent contra paruas pustulas & uulnera: sicut cadmia, thus, cornu ceruinum, & caprinum, & ut dicit Gal. antimonium. Quaedam uero nimium mundificant, quae ualent ad ungulas, scabies palpebrarum, pruritus, & crassas pustulas: ut arugo, tragacanthum, sal ammoniacum: quae omnia pun-
gunt: sed cum lauantur, eorum punctio minoratur. Putrefactiua ualent uetustae scabiei & asperitati: ungulam uetustam purgant: & pruriginem.

si longi temporis est, curant: ut arsenicū, flos aris, & similia. Constrictiua medicina etiam temperatæ actionis est, & optime prohibet humore fluente, pustulas & uulnera, ut rosa, folium, crocus, glaucium. thus fortiter stringit & fluxum humorum amputat. Contractiua magnum generat dolorem, quæ etiam ualet commissa cum medicina uisum aeuente, quia oculos coadunat. Et est optima contra asperitatem palpebrarum, sicut est balustia, cortex thuris, ferrugo, flos aris, succus hypocythidis, succus uiræ agrestis, acacia, glauciū. Hæc enim lauant & leniunt asperitatem. Maturatiua conuenit apostematibus oculorum & doloribus propter humores clausos in interioribus corneæ: sicut myrrha, crocus, castorium, foenugracū, licium, farco colla, melicratum, & similia. Soporifera dolorem magnum patientibus ualent: tunc scilicet cum doloris magnitudine perire uidentur. Caute tamen adhibeantur, quia uisum minuūt & nonnunquam amputant. Idcirco non sæpe apponantur uel appositis calefactiua misceantur. Talia sunt opium, mandragora, & similia.

Pars sexta de apostematib. & dolorib. & ipsorum curis in generali. postea de ipsis ut insit oculis, petia, pruritu, carbone: & pilis, uulneribus, fissuris, pustulis corneæ, pāno, scabie, nyctalope, suffusionibus, oculorum exitu, & collyrijs multis contra morbos oculi. Cuius sunt capita duodecim.

De apostematibus & causis ipsorum in generali. Cap. I

Maximo studio curationes passionū quas sexata particula scripsimus necesse est ostendere. Ac primo de ophthalmia, quoniam quod proposuimus tractabimus: sed quia ophthalmia de genere est apostematum magnorum quæ faciunt dolorem, decet nos de apostematibus generaliter tractare, deinde ad ea quæ in oculis fiunt peruenire. Diximus secundo quod causa omnium apostematum sunt humores ad membra fluentes, cuius causa uel interior est uel exterior: Interior, ut superabundantia materiæ: Exterior, ut percussio, casus, fractura, uulnus & similia. Præterea membri præparatio ad recipiendā superflua quatuor modis est, aut propter membri defectionem, aut raritatem, uiræ largitatem ad membra tendentem, aut propter suæ uirtutis attractionem, fortitudinē, uel sui locationem naturalem. Defectio membri aut naturalis est, aut accidentalis: naturalis ut cutis quam constituit natura defectiuam, ut superflua ab interioribus ad exteriora, à nobilibus ad ignobilia expulsa, facilius suscipere possit: accidentalis ut ex infirmitate præterita. Raritas membri, ut teneritas maxillarum & inguinum. Attractiua membri fortitudo sit in membris fortibus propter nimium calorem, qui calor aut naturalis est, aut accidentalis. Propter situlem positionem, sicut si inferius locatum fuerit, humores enim ad corporis inferiora maxime descendunt. Sed materia quæ defluit, aut est humor, aut est uentositas: si humor, aut sanguineus, aut aquosus, aut phlegmaticus, aut melancholicus. Ventositas autē, cum nō sit subtilis, non generat tumorem. Sanguis autem si temperati co-

loris est, phlegmonem generat: si calidior & subtilior, erysipelas generat: sed calidissimus sacrum ignē facit, & uariolas. Aquosus tumor, est qui hydropisis dicitur phlegmaticus: si fuerit subtilis, tumorem: si crassus, apostema generat, quod interiorius est quasi pingue seuum. Melancholicus autem cancer generat: uentositas autem, si fuerit, tumet. Hæc est diuersitas apostematum quæ diuersa exigunt medicamina.

De curis apostematum. Cap. II

Apostemata ergo quæ fiunt ex sanguine calidissimo, si eorum causa extrinseca fuerit, nec corporis extiterit plenitudo, medicamine dissolutiua & repereussio curen: ex cællatio quoque uel incisio adhibebitur opportune. Quod si causa sit intrinseca, ab initio non dentur mollitiua uel dissolutiua, cum plus quæ necesse est dissolutiua à locis remotis ad apostema attrahant. Sed neque repugnantia autem adhibeantur, ne materia ad membra principalia conuertatur. In initio ergo curationis phlebotomia corpus purge: deinde apponant repugnantia & desiccatiua, temperiem facientia, ut sua licetate resiliat humoribus, ne ad tumoris perueniant locum, & temperiem complexionis conseruet, & locum, ut superfluum materiam deuincant. Scien dum quoque omnia apostemata quatuor tempora habere: Initium, augmentū, statum, & declinationem. In initio ergo conuenit repugnantia opponi calori. Repugnantia, tenui materia dissoluta in parte, & crassa remanente, mollitiua & dissolutiua ponuntur: nonnunquam in augmento, magno dolore existente, stypticam medicinā & refrigeratiuā ponimus: nimio dolore coacti soporiferam adhibemus. Medicina sanguinolenti apostematis, id est erysipelatis, quæ cum nimio est dolore & calore, si causa eius fuerit extrinseca ab initio mollitiua & dissolutiua sit. Si autē intrinseca fuerit, primo detur cholera rubeam pharmacum purgans, deinde si opportunum est, phlebotomemus, postea medicina infrigidans & humectans apponatur, calore fracto dissolutiua aptetur. Apostema cuius materia fuerit sanguis crassus, si cum uulnere, putredine, & putredine sit, in initio phlebotomia subuenias: deinde uulnera medicina corrosiua & mūdicatiua curantur: sed tamen considera apostematis magnitudinem ex calore: quia si magnum fuerit, repugnantia pones: si calidissimum, sortem caue medicinam. Aquosum apostema uel solutio, uel incisione curetur. Prima autē species phlegmatis quæ est, ut mel, curatur constrictiuis uel confortatiuis & solidatiuis, sicut est unū mistum cum licio & nitro. oportet autē à leuioribus incipi, & sic ad fortiora procedere. Quod si fuerit in ueteratis apostema, cum incisiua & dissolutiua: & superius ligentur fortiter & inferius leuiter. Secundum genus phlegmatis taliter curatur, dissolutiuis, putrefactiuis & incisuiis. Tertium uero, putrefactiuis & incidentibus, dissolutiua uero non ualent. Quartum genus stylo incensiuo curatur. Melancholicū apostema, id est cancer difficile curatur, non incidatur, cuius incisio multis inconueniens est mo-

est modis. Primo quia syncopin generat, si locus multas uenas habuerit. Secundo quia membra principalia non patiuntur membruligari neque sanguinem costringi nisi cum cauterio: & in loco aliquando nascitur in quo non auidemus cauterium apponere. in huius tamen initio corpus ad temperamentum oportet reuocari, & ad bonum quod phlebomatia & pharmacia & diæta & similibus immutari. Apostema de uentositate factum dissolutio curatur.

De causis & cura doloris in generali. Cap. III

Dolor duobus est modis, subita qualitatis immutatio, & iunctura separatione. Mutatio uel est de frigore uel de calore, unde causam eius non oportet inuestigare. Separatio iuncturae tribus modis fit, incisione, fractura, crepatura. Incisio uel extrinseca est cum gladio, uel intrinseca, ut cum acuta humorum qualitate. Fractura autem fit de exterioribus, sicut solidis & crassius corporibus ponderantibus: aut de interioribus, ut de apostematibus de exterioribus si sit lapis locum in quo scindit conculcat propter utramque loci extremitatem, qui depressus necessario extenditur. Iunctura quae separatur de interioribus taliter fit, augmentata materia coacuitas replet membrorum, doloreque generat. Materia uero humorum est, uel uentositas uel acuta qualitas. Ideoque sex sunt causae doloris, chymus nimius, uentositas non habens exitum, magnum apostema uel durum, humorum acuitas, uel uulnere siccitas, uel caliditas, uel frigiditas. Si dolor propter nimium chymum fuerit, ipso purgato cessabit. Si propter crassam uentositatem, cibo subtili & potu calidiusq; fomētis & cataplasmatibus curatur. Si ex apostematibus, ipsorum curatio est dolorum amputatio. Si ab humorum qualitate processerit incensura, necesse est chymum purgari, siue in bonum mutari cum medicina doloris mitigatiua. quod si non sufficiat, soporifera imponamus, ut dolor mitigetur. Quod si de frigidis crassius uiscosis humoribus processit, sopori feram caueamus, quia non est tantus dolor qui de his nascitur. Si crassa uentositas exitum non habens causa fuit doloris, res attenuatiua & dissolutiua adhibenda erit, ut uentositas dissoluatur & humores deficiant. Sic etiam de ceteris contraria contrariis oppone.

De causis & cura dolorum oculorum. Cap. IIII

Oculi uero patiuntur ex apostemate uel propter acutos humores ad ipsos fluētes, uel propter pellicularum suarum extensionē ab humorum plenitudine, aut inclusione crassorum humorum & uiscoforum, uel crassae uentositatis in loco illo. Si sit propter acutos humores pharmacia def, materia deorsum ducatur, & oculi cum albumine oui lauentur. Purgato corpore & apostemate maturari incipiente, balneum diligenter apretur. Quod si dolor fuerit propter humores interius clausos, totum corpus maxime purgetur, deinde calefacientibus utatur, & oculi cum decoctione scenugraeci lauentur: & ante purgationem totius corporis dissolutiua & calefactiua caueantur, quia ad apostema plus attrahunt quod dissolunt. Sciendum quod humores ad

Galen.

oculos ueniunt, uel de omnibus partibus, uel de solo capite: si de solo capite, solum caput expedit purgari, postea confortari, & ad temperiem duci, ne ultra malos humores generet, plurimumque digerat humores. decet etiam confortare cor & corroborare & temperare, quando arteriae in causa sunt quare humores ad ipsos defluunt: quae si supra cranium fuerint desiccati uel cataplasma & emplastrum apponatur: his non proficientibus incendantur. Nonnunquam dolor fit ex oculis propter sanguinis coagulationem in uenis oculorum clausis, unde plenae uidentur, & oculorum essentia sanguinolenta: quae passio curatur uini potatione, tamen balneo praecedente.

De ophthalmia & eius cura. Cap. V

Diximus quod ophthalmia est apostema calidum nascens in coniunctiua, & ostendimus curam apostematū solis oculis pertinentium. Vnde quia oculi sensum habent acutissimum, & dolore ferre nequeunt: non temere curentur fortiter medicamine, sed cum rebus dolores mitigantibus temperentur: & fiat quod apponendum est humidum, & uiscosum in loco in quo coegruit immiscetur, et palpebra suauiter eleuata medicina guttatim iniiciatur: & ab initio non nimio existente dolore medicina aliquid stypticitatis habet, sicut collyrium in quo est acacia, ponatur: etiam dissolutum & maturatum medicamen sicut crocus & liciū, similiter & styptica ut myrrha & cassorius, tunc masculinum. Collyrium quoque si multum stypticum fuerit, humefiat cum albumine ouilacte & decoctione scenugraeci. Haec si fecerimus, in uno die dolor remittetur, & passio declinabit: quae declinata balneum succedat, deinde collyrium priore fortius imponatur super nechiū, ut costringat & confortet oculos, tamen parum acuti collyrii cum eo misceatur, & parum a medio ad multum ascendat. Quod si ophthalmia cum nimio dolore fuerit, ponatur ab initio collyrium, quod dicitur diarhodon asperon. Apostemate uero de crescente diarhodon erimoni imponatur, & calefiat sepius, si nimio pungetur dolore: & si dolor non sit multus, sufficit semel aut bis: & haec calefactio fiat de meliloto, scenugreco, & similibus. Cataplasmen quoque croco, meliloto, coriandro, oui uittello, pane luto in uno. Sed si dolor nimius fuerit, misceatur illi cataplasmati decoctio papaueris: unguentum factum de croco, glaucio, licio, gummi, & aloe, ponatur supra frontē. Si calidus non fuerit multum, puluis molendini, myrrha, thus, albumen oui. Humoribus uero frigidis existētibz, sulfur, pix liquida, colophonia, & similia apponantur.

De curis petiae tumoris & pruritus oculorum. Cap. VI

Ad petiam sanguis columbae, pauonis, & omnia talia proficiunt, si cum thure modico misceantur, & calefactio decoctionis hordei & hyssopi prodest. Oculorum tumores habentibus fiat cataplasma ex uuis pallsis sine acinis ex melicrato uel aceto. Si tamen apostema non dissoluatur, radix trita admisceatur: tumore nondum dissoluto, succus columbae apponatur. Pruritus sicut apostema curetur purgatione corporis et dissolutioe materie intus clausae & collyriis & cataplasmatibus & fomentationibus.

tom. 6

A 2 ne

ne aquæ calidæ in nocte oculis apposita, quæ mixta cum oleo rosato, aut in ovo anatis pruritus amputat, & oleum rosatum temperate calidum. Sæpe tamen oculis cholicam imponimus medicinam, ut lachrymas in eis prouocet, quibus lauentur, & mollificetur. Pruritus cum nimio fluxu humorum, medicina Erasistrati curatur.

De carne addita in oculis, & carbone. Cap. VII

Si carnes addita propter vulnera fuerint, non curant nisi chirurgia. Excrescentia superflua carnis acuta medicina curetur, sicut æruginæ aris, sulphure, & similibus. Si autem caro oculorum excrescerit superflua, non curabitur nisi chirurgia. Quod si locus ille tumidus fuerit, ualet allium, gummi cum glucio & uino. Nascitur etiam quoddam in oculis quod dicitur carbo: & sicut apostema curatur: cumque sanum habuerit, sicut uulnus curatur sanæ habens. Quidam medici ponunt in hac passione glauciū, tragacanthum, rutam, succum malignanati, lanam ustam, uel myrrham & aloem. Huic passioni ualent ammoniacum cum aceto: & aliquando admiscemus cum eis de hordeo & zedoario, & capita muscarum è cera cataplasmata.

De pilorum ablatione & remedio contra casum pilorum. Cap. VIII

Pilis ablati lauentur loca ipsorum aquis salis, & aluminosis, & ungantur loca pilorum palpebrarum albumine oui, & alumine, staphisagria, & farina, id est stercore colubino. Collyriū Sabor. ualet ad pilos cadentes palpebris. R. ossium dactylorum drach. iij. cadmiæ drach. ij. Aliud Sabor.

R. antimoni, calcanthi, tragacanthi pondus æquale: quæ omnia cum melle temperata terantur, deinde collyriū fiat. Si autem pilis cadentibus palpebræ appareant crassæ, stercore muris cum melle temperatum ualet. Superflui pilis de palpebris sunt amputandi. Quidam dicunt pilos non ultra nasci, si radicibus pilorum extractis sanguine testudinis uel dentibus caninis locus ungatur.

De curis uulnorum & fissurarum in generali. Cap. IX

Oportet primo uniuersaliter dicere de uulneribus, postea uero de ijs quæ propria sunt oculis. Omne uulnus uel concavum est tantum, uel fissum. Si multum fuerit fissum, trina intentione curatur. Iugamus utranque partem, & suamus studiose, & curemus ne incidat pulsus, uel pilus. Quod si magnum uulnus fuerit, nec pars parti possit coniungi, nec sanies permaneat in concavitate: necesse est uti desiccatio medicamine, ut finita sanie uulnus impleatur carne. Cuius compositio est cum causa uel morbo uel accidenti. Si cuius causa sunt humores ad illud fluentes, corpus purgetur pharmacia, & phlebotomia: diata quoque temperetur: deinde desiccationis sicceatur. Quod si fuerit cum morbo, uel est simplex uel compositus. Si morbus simplex est, ad temperiem membrorum reducatur. Quod si compositus, uel ut naturam suam membrum egrediatur, uel uulnus multum concavum sit: duplex medicina necessaria est: Una quam membrum ad temperamentum redeat: Altera qua concavitas carne repleatur. Impleatur ergo medicamine desiccatio mundificatio, quod hu-

mores coadunatos destruat, uulnusque a putredine mundificet. Sed ut per poros possint egredi superflua: unum subtile & continuū quod latet sensum: aliud crassum, quod ut lutum in corpore coadunatur: & hæc duo superflua plus in uulneribus quam alibi sunt propter loci defectionem atque dolorem: necessaria est desiccatio & mundificatio medicina qua mundificetur & desiccetur superfluitatis fordities. Omne etiam uel concavum est, uel fissum. Et si fuerit cum accidente sicut cum dolore, mitigatio conueniunt. Fissura si parua sit, non est necessaria nisi coniunctio partium. & parum medico eger, nisi locus uulneris partem amiserit, quæ pars uel caro est, uel cutis, uel utrumque. Si sit cutis apponatur styptica, uel desiccatio, ut locus induratus cuti assimuletur, nonnunquam acuta medicina facit hoc accidentaliter. calida medicina paulatim apposita facit hoc accidentaliter, & locum fusa siccitate indurat. Multa uero quantitas ex ea, loco apposita resoluit causam, & minuit fissuram. Quod si caro à uulnere sit amota, in initio carnis generatio expeditur: deinde locus mundetur, & cuti assimuletur, sed omnem medicinam quæ uulneribus pertinet, necesse est siccam esse, quæ tamen propter causam quandoque caueda est. Parum sicca erit ne multum siccans carnem prohibeat generationem. Mundificatio uero quæ siccam esse oportet: ut putredinem mundet uulnera consolidans. Desiccatio esse debet ea, quæ generat carnem, quæ nec mordicatio sit, nec abrodens, sed styptica ut caro induretur, cutique assimuletur. Hæc est disputatio uniuersalis uulnorum, & medicina.

De uulneribus oculorum, pustulis in cornea, pannu, in gula, nyctalope, scabie. Cap. X

Sed uulneribus oculorum, si sint simplicia, mundans & colans congruit medicina, quia humores cito undique fluunt ad oculos propter acumen sensus eorum. Quod si uulnus cum tumore sit, uel nimio dolore: apponuntur collyria quæ thus & metalla usta intrant, & cataplasmata: nec pigritia cataplasmentur. Aliquando tamen si putredo uulneri insit, colatiua tunc apponatur. sed intueri oportet an uulnus carnem rodatur, inuestigandum quoque unde humores ad oculos fluxerint, quo perfectio caput & corpus expedit purgari. deinde apponere collyria desiccatio, nullamque facientia punctio: sicut ea quæ respiciunt casum, cum dantur cum lacte uel cum decoctione scœnugraci. Si dolor est nimius, aliquando soporifera medicamina apponuntur: fluxus humorum cessante eis styptica apponuntur. præuidendum tamen ne unde egredia-
tur, cui egredienti stypticum conuenit adiutorium. Collectio & pustula in cornea nascentes curantur cum medicina maturatio, mediocriter colatio, sicut collyrio recipiente crocum, thus, myrrham, castorium, decoctione scœnugraci. Quod si non inuenerint & tumor non dissoluatur: calidum & aperitiuum appone, sicut sagapenum, euphorbium, & similia. Pannus in oculorum albedine natus colatiuo & mundificatio curetur. Quod si fuerit subtilis, sufficit succus rubei papaueris uel deco-

decoctum minoris centaureæ cum melle: si grossus, fortiora dari necesse est: sicut picæ liquidam, æ uisum, nitrum, stercus muris, myrrham, sal ammoniacum, & similia. Si aliquid ex eo remanserit, gallam, acaciām & calcanthum appone. Vngula & scabies, si duræ sint etiam & ueteres, incidere eas uel excoriare optimum est: isti autem subtileres, appone æs uisum, florem æris, fel porcinū, sal ammoniacum. His nondum proficientibus appone medicinam putrefacientem atq; rodentem. Scabies non stypticis est curanda, quæ si sit cum uulnere magnop; pruritu conuertatur palpebra & cum hoc excoriatur. Est quædam palsio oculorum quam qui habuerint uespere nō uident, quos phlebotomari conuenit de cephalica brachij, & utatur pharmacā, & clysteribus, & caput purgantibus, & gargarismate, & sternutatione mundificentur: uena auris incidatur. Oculis mel cum alumine, & sale ammoniaco apponatur, & cum hepate caprino fumigetur. hæc omnia profunt.

De suffusione, egressu oculorum, & petia. Cap. XI
Suffusio, id est uisus defectio sic curatur. Caput, & totū purgetur, ut diximus: diæta sit tenuis, deinde utatur collyrijs, scenumigræcum, mel, sapa penum, alarum, thus recipientibus, & opobalsamum, & ammoniacum. Valet quoq; si uena hepatica incidatur, & sanguisugæ tēporibus apponantur. Oculis extra exeuntibus, uentosa in collo apponatur, oculi ligentur & aqua falsa suffumigentur. Petia curatur sanguine oculis instillato. deinde cum albumine oui oleoq; rosarū ligentur.

De collyrijs multis ad oculorum ægritudines Cap. XII
Collyrium quod dicitur diarthodon in modum piperis ualens in augmento doloris ophthalmiæ. Recipe cadmiæ cerussæ ana drach. xiiij. rosarum drach. duodecim: gummi, amyli ana drach. i. tragacanthi drach. iij. & s. aloes drach. vi. tempera cum aqua pluuiali, & informa. Aliud in initio ophthalmiæ, quod etiam uetustæ ualeat. R. acaciæ drach. liij. gummi. 3. xliij. cadmiæ drach. xxxvi. tēpera cum uino pontico & croco ana drach. xij. tempera cum aqua pluuiali. hæc omnia à Paulo sunt ordinata. Ista uero Galenus dicit. Collyrium ualens ad dissoluendū apostema die uno & ad ophthalmiam. R. antimonij, acaciæ ana 3. lxx. cadmiæ drach. ix. æris usti loti. 3. xxi. cerussæ drach. xij. s. myrrhæ. 3. vi. sulphuris drach. vi. castorei, opij, calcanthi usti drach. vi. gummi drach. ix. tempera cum albumine oui, in uno die est ualidissimū. Aliud Pauli. R. cadmiæ, croci, gummi ana 3. iij. æris usti drach. xxiij. cerussæ, rosarum ana drach. xxij. polij, croci, calcanthi, opij ana. drach. vi. aloes, spicæ, castorij ana drach. i. & s. tempera cum aqua: curat uero ophthalmiam & humores uel propter dolorē, uel uetus uulnus fluentes. Aliud. Recipe cadmiæ, acaciæ, gummi ana drach. ix. antimonij triti drach. xx. castorij, opij, ana drach. vi. licij drach. iij. & s. myrrhæ drach. xij. spicæ, aloes ana. drach. iij. gummi, tragacanthi, calcanthi, ana drach. i. & s. tēpera cū uino & aqua myrrina. Aliud ad superiora. R. acaciæ, gummi ana 3. lx. plumbilo

Galen,

ti. 3. xxx. spicæ, casia ana 3. viij. rosarum, cadmiæ ana 3. xxx. cerussæ, aloes, opij, croci ana drach. ix. castorij, licij ana drach. iij. & s. tempera cum albumine oui: ualet uulneribus & omnibus passionibus oculorum uetustis & putrefactis. Aliud in statu conueniens cum albumine oui, in declinatione cum aqua. R. cadmiæ uetustæ & lotæ, cerussæ ana drach. vi. amyli, tragacanthi. ana drach. iij. hyosciami drach. i. & s. croci. drach. vi. glaucij, sarcocollæ ana drach. vi. opij, drach. iij. tragacanthi drach. vi. croci drach. iij. gummi, opij drach. i. & s. tempera cum aqua. Aliud ualens in augmento ophthalmiæ. R. cadmiæ, cerussæ ana drach. xxij. rosarum. xij. gummi, amyli, ana drach. quatuor. tragacanthi, drach. iij. & s. aloes. drach. iij. tempera cum aqua. ualet in uulneribus & humoribus uulnerosis & lachrymis ex oculis fluentibus. Aliud ualens ad utilitatem ophthalmiæ & uulnera & adustiones & ad mundificationem uulneris putredinem. R. antimonij usti, cadmiæ, rosarū añ. drach. xxiij. cerussæ tritæ. xxij. opij, drach. vi. tēpera cum aqua. Aliud nimio dolori conueniens & liquidissimos humores ad oculos fluentes reprimens.

Recipe rosarum, drach. vi. & s. opij, spicæ ana drach. i. Aliud. Rosarum, 3. xxi. croci. vi. æris usti & loti, drach. i. & s. tempera cum aqua pluuiali. Aliud. R. rosarum, drach. xviij. cineris locorum ubi æs funditur, drach. vi. croci, opij, gummi, ana drach. vij. tempera cum aqua pluuiali. Aliud. Recipe gummi drach. iij. tragacanthi, drach. i. & s. tempera cum aqua pluuiali. Aliud. Recipe myrrhæ drach. lxxv. rosarum xl. croci vi. & s. tempera cū uino. Aliud ualet nimio dolori, pustulis, concauis putridis uulneribus corneæ, oculosq; excecatis comprimit, omnemq; oculorū passionem ad sanandum difficillimam curat. R. rosarum drachmas centum octo, gummi xxxvi. cadmiæ ustæ & lotæ drach. xxi. croci undecim: opij, antimonij, drach. ij. & s. iarii spicæ drachmas tres: myrrhæ iij. tempera cum aqua pluuiali. Collyrium Pauli. Recipe æris usti, tragacanthi usti, ana drach. viij. croci ij. nitrī drach. i. coquantur ad mellis spissitudinem. Aliud eiusdem, ualet scabiei palpebrarum ueteriq; ophthalmiæ, saniem & uulnera aurium & os rodentia sanat. Recipe æris usti drach. quatuor, myrrhæ, drach. i. & s. piperis, croci, uini ana drach. ix. Collyriū Pauli. Recipe cadmiæ auri & argenti drach. iij. tempera cum aqua pluuiali. Collyrium Oribasii ualens in initio ophthalmiæ & uulneribus. R. cadmiæ, cerussæ, tragacanthi ana drach. uiginti quatuor, antimonij, gummi usti ana drach. xxi. plumbi incensī, tutiæ, ana drach. uiginti quatuor. Aliud. Amyli. xvi. gummi ix. æris usti, tragacanthi ana 3. vi. myrrhæ, opij, ana 3. v. Aliud ualens uisioni, uueam egredi prohibens, subueniens uulneribus. Recipe antimonij usti, cerussæ ana drach. uiginti quatuor, myrrhæ drach. iij. amyli xix. tragacanthi xij. gummi. vi. tēpera cum aqua pluuiali. Aliud ualens pustulis, uulneribus saniosis & nimio dolori duræq; ophthalmiæ. R. cadmiæ ustæ &

tom, 6

A 3 lotæ

lotæ drach. uigintiquatuor. antimoniꝝ loti & usti. xviij. amyli iij. plumbi incēsi & loti. xij. tutiæ, myrrhæ ana 3. xij. tempera cum aqua. Aliud. Recipe tutiæ drachmas duodecim, cadmiæ lotæ, cerussæ ana drachmas cxxiiij. antimoniꝝ incēsi & loti. xviij. myrrhæ, opij, ana drachmas quinquaginta, & 5. tragacanthi drachmas duodecim. tempera cum aqua. Aliud utillissimū asperitati palpebrarum & scabiei. Recipe calcanthi drachmas duas, cadmiæ drachmam unam. ad solē cum uino sufficiēter agita. Aliud. Recipe cadmiæ drachmas vi. calcanthi grana triginta. pipēris grana xxxviij. spicæ drachmam unam. & 5. al. drachmas tres & 5. cadmiæ & calcanthi triturata sufficienter & agita, deinde cum pipere spicam commisce & tempera. Aliud ualens scabiei & humoribus ad oculos fluentibus uetericis passioni & pustulis. Recipe cadmiæ, gallæ, rosarum, gummi, croci, ana drachmas tres. opij, drachmā unam. omnia puluerizata cum uino ad solem sufficienter agita. Ad oculos caliginosos & sanguinolentos, aloes tritum cum albumine oui misce prodest: si aloem non habueris, canabis trita idem facit. Ad oculos dolentes, & lachrymas stringendas, & pruritum tollendum. collige mel de spuma tum, & ex eo unge folia hederæ, & superasperge puluerem facis uini, & oculis superpone per no-

ctem. expertū est. Item chelidonia cocta in aqua si ex eo oculi fomententur, dolentibus prodest. Item coriandrum uiride tritum admisso lacte mulieris oculis superpone, dolorem & tumorem tollit. Idem facit radix cucurbitæ agreſtis trita & imposita. Fel capriuum cum melle antiquo mistum & inunctum oculorum caliginem destruit. Ad pannum de oculis abstergendum. Facem uini, album oui, rasuram ofsis sepiæ facto puluere mitte donec corrodatur. Vitellum oui tritum succo apij mistum & inunctum sanguinem spargit. Absinthium uiride cum albumine oui tritum, & nocte suppositum, sanat. Ad tumorem calidum & sanguinem oculorum, anagallis cum albumine oui trita & imposita prodest. Ad tumoris calidi dolorem. Herbam uiolarium cum oleo rosarum tere, & superimponere: mire iuuat. Valet etiam mali granati succus. in uase aneo uel stanno ipsum coque & cola, & cum opus fuerit utere. Item. Recipe plantaginis, centaureæ, ungulæ caballinæ, pulegij, betonicæ, chamædrys, apij, fœniculi radicum: partes equales, pone in olla noua, & intra sparge fœnugracum. Item licium in rodoscomate guttatim impositum ualet. Item auripigmentum, pannum subtile laneum, & finum hominis combure in olla bene argillata.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI DE RENVM AFFECTVVM DIGNOTIONE & medicatione, authoris Christiani ut apparet circa finem capituli uigesimalitertij. Docet autem calculi curam in genere primum: deinde peculiariter accommodat se puero ad quem scribit capite uigesimo tertio, uel potius uigesimo quarto, & deinceps.

Cap. 1. De substantia renum. 2. De figura renum. 3. Cur dexter laeuo sublimior. 4. De situ renum. 5. Cur duo facti sint renes. De usu & functione ipsorum, & uasis eos ingredientibus. 6. Iterū de functione ipsorum: & nephritidis uocabulo. 7. De quatuor causis calculi: efficiēte, calore & frigore: materiali, crasso & uisoso humore: instrumentali, rene aut uelica. Finalis nulla est præter ipsum calculū. 8. Iterum de causis & modo generationis calculi. De loco ipsorum in renibus. De arenosa hypostasi urinæ, & incremento calculi. Urina sanguinea quomodo fiat: & de colore calculi. 9. Cur puerilis ætas frequentius uelicæ, proreſcit autem renū calculo laborat. Cur crassa sit puerorum urina. Quod qui caſeo & alijs crassis uelci solēt, etiam adulescentes, renum uelicæq; calculis infestentur. Cur pueri magis quàm puellæ calculo uelicæ afficiantur. 10. De signis renum affectorum, cōmuniū primum, ut urina sanguinea eiusq; differentijs. Remedia refrigerantia quæ sanguinem renibus influentem sistunt, quomodo sint causæ calculi. 11. Quomodo discernatur uter renū affectus sit. 12. Cur nephritici uomant, Prurigo quædam sentitur in locis affectis, pudentur intenditur. 13. Vnde dolor sentiatur in renibus. Calculi renum quales, & calculosorum urinæ. De doloribus nephriticorum. De lapide peni imposito. 14. De his qui sine dolore arenulas excernunt, cum calculi eis intus non concreſcant. Colores diuersi lapidis & arenularum. Differunt calculi, situ, magnitudine, figura, colore. De colicæ & nephritidis differentia, phar-

15. De curatione & mitigatione calculi, per uomitum, clysterem. De phlebotomia & eius modo. Cur ante purgationem incidenda uena sit non contra. Inclasa uena non statim purgandum, sed prius roborandum est corpus. 16. Ex quibus uenis detrahendus sit sanguis: deorum nempe quoniam crassa materia reuelli sursum non potest: & quod in uirtute debili, sanguis nō sit deorum trahendus in hoc affectu. Sursum etiam trahere ab initio & præcautionis gratia possumus. De uomitu, clystere, & iterum de phlebotomia. 17. De clysteribus, tum euacuantibus, tum lenientibus & laxantibus, quibus non nimium utendum est, ne uires dissoluantur. 18. De fomentis, cucurbitulis, infusionibus, cataplasmatibus. 19. De balneis postremo adhibendis, nisi magnitudo doloris urgeat mox ab initio ea usurpari: & quod non diu immorandum sit eis, ne uires exoluantur. De usu narcoticorum. 20. Quid agendum si crassus spiritus unā cum calculis fuerit. Viſus ratio tenuior & molliens alium. 21. Vſus remediorum calculos fragentium, quæ tepida potius esse debent, quàm ualde calida, ne materia exerceatur induretur que. Diuretica & calida medicamenta non lapidibus conueniunt, sed arenulis & crassis uiscosisq; humoribus. 22. Ratio uictus præseruatiua per cibum & potum, exercitia, unguenta, factoria, thermas, phlebotomiam, purgationes, uomitum. De purgantibus renes & cardui radice. 23. Hactenus de generali curatione: Quod particularis secundum multas & uarias indicationes atq; circumstantias colligatur. Considerandas esse peculiarias homi-

hominum naturas. Si non proficiant pharmaca, quorum ratio nobis constat (his enim omnino prius & confidentius utendum est) confugiemus ad illa quæ sine ratione experientia solum commendat, & ex tota substantia agere dicuntur (ut passer troglodytes, pellis leporis, & sanguis hircinus) parce tamen utemur illis. Christianorum refugium ad mysteria sua. 24. De particulari cura illius ad quæ scribit, qui, calidus, humidus, puer, imbecillis, gracilis, meatibus apertis, & facile sentiens erat: Et primum de ratione uictus in genere (non solum ad nephritin) secundum differentias temporum anni, hyemis, ueris, æstatis. 25. De ratione uictus secundum ætates, in pueritia primum, deinde in senectute. 26. Differentiæ panis quatuor in materia (aliæ enim ex fermentatione & coctione sunt,) & quando quibus

utendum: tum quæ carnes, & alij cibi qui conueniant, ut pisces, fructus. 27. De potu: & primum de uinis, quorum differentiæ sunt quinque, a colore, sapore, consistencia, odore & facultate. postea de aqua, & quæ sit optima: de frigida potu. 28. De exercitijs, eorum utilitate, modo, & tempore. 29. De balneorum usu. 30. De particulari cura & remedijs pueri nephritici ad quem scribit. Triplex differentia frangentium lapides secundum intentionem. Quæ crassam urinam ducant, quæ frequenter, quæ stimulent excretoriam uiam. De usu diureticorum. 31. Epilogus in quo etiam longas quasdam quaestiones proponit, quarum solutionem in alio libro fore pollicetur.

CL. GALENO ASCRIP- PTVS LIBER DE RENVM AFFE- CTVVM DIGNOTIONE ET MEDICATIONE.

Christophoro Heyl Vuisbadensi interprete.

CAPVT PRIMVM



RENIBVS peculiare quoddam corpus est ex fibris & carne constitutum, quod cum alia parte nulla commune habent: & caro hæc densa est, ne sanguis qui ad ipsos deferretur, facili momento diffusetur, effundatur, & abeat cum urina. Carne hæc substantia non paucas habet inuolutiones, in quibus quoniam singulatim per substantiam lapides plerumque generantur, fiunt in renibus grauissimi dolores. Ac de substantia quidem hæc tenetur.

2 Figuram autem renes habent Græcè literæ sigma (Σ) & in medio cavitatem quandam, quæ ex uenis & arterijs serosum excrementum excipiunt: nam ad eos non maiores solum uenæ, quarum alia in cavitatem hanc inferuntur, alia in membranam quæ renes circumtegit: sed uasa etiam capillis modo exilia deferuntur.

3 Dexter autem sinistro sublimior est: ne inter operandum, alter trahatur, alter retrahatur. 4 Iacent ad spinam renes, paulo altius quam ilia: & ex se urinarios meatus duos emittunt, quibus ad uesicam urina deducitur. Sed habent isti quoque meatus propriam corporis substantiam, quam in alia particula nusquam reperias.

5 Duos autem natura renes produxit, non

unum: quoniam alias excrementorum species serosa hæc superfluitas non parum superat, quam attrahere, renum officium est: ignorare enim non debemus alteram causæ uenæ partem ad corporis nostri inferiores partes deferri: quæ bisariam diuisa est, altera parte sursum, altera deorsum porrigitur. Pars quæ descendit, rursus tripliciter finditur, & pars una ad crura porrigitur, altera ad testiculos, & tertia ad renes. Procedunt uero & de corde arteriæ, quæ serosum excrementum & unâ caliditatem immittant: ut ab eis renes caleant. Sunt enim renes ita ex seroso isto excremento, ut ex atræ bilis succo lien: Quamobrem à dictis iam arterijs color renibus suppeditatur, quod natiuam suam frigiditatem possint euincere. Postquam uero serosum id excrementum renes attraxerunt, utilem qui in eo est sanguinem ipsi retinent, & ex eo nutriuntur: excrementum uero ipsum serosum à facultate segregatrice ceu inutile expellitur. Sed quandiu in uenis & arterijs hoc cum sanguine currit, excrementum serosum cum segregatum est, lotium nominatur. Proinde quod in sanguine utile est, id sibi renes in nutrimentum seruant: quod autem inutile, id abigunt. Atque uis uesicæ, bile delectatur: & lien, atræ bilis succo: ita renes seroso isto excremento gaudent.

6 Renum autem operatio est, secernere & percolare serosum excrementum à sanguine. Atque hic renum usus est. Non solum autem renum, sed & singularum partium operatio medico est

inuestiganda quod ex operatione labefactata cognoscatur quæ particula morbo sit affecta: & ex modo urinæ operationis, quantum sit quæq; affecta. Omnis affectus quo ren laborat, quamquam *vespius* dicitur, siue is similis sit, siue instrumentalis, siue communis; proprie tamē *uulsiatis*, id est calculi morbus, *vespius* appellatur.

7 Sunt autem lapidis huius quatuor causæ. Efficiens, materialis, instrumentalis, et finalis. nec opus fuit dicere à rebus externis, lapidis concretionem, aut à frigore, aut à calore fieri uelut in cuniculis & canalibus, cum caliditas, materia non expirante & uentilata exoritur: uerbi gratia cum aqua in aliquo canali substat, calor quidā præter naturā accendit, quo dispergite id quod in aqua sic cœnosa partium erat tenuiū, quod crassius est partiū in terram durefcit: manensq; eo in loco substantia lapideæ ex qua factus canalis est, adhærescit: & in lapidē sic colligitur. Subnectam aliud de eadē re notū exemplum. In lebetē generari lapides sæpe cōpertum est aquæ parte quæ tenuis fuerat dissoluta, manente alia quæ crassa et terrena est: ea enim lebetis uel alius æris corpori affigitur, & lapidescit. Verum in nobis lapidem frigus nō parit: neq; enim fieri potest, ut uiuo corpori tantum frigus accidat, quo concrefcere ualeat in homine lapis, quæadmodum fieri in externis uidemus: quo fit, ut à calore lapis in homine generetur, eoq; uel uehemēti, uel tepido. nam si crassa materia est, sufficere potest tepida & moderata caliditas, & quæ naturalis est, ad firmandā & indurandā terræ modo crassam hanc materiā: est enim crassities ad generandum lapidem singulariter accōmodata. In tenuior est, uehementiori tum planē indigebit caliditate, siue naturali siue præter naturā, qua durefcit in terram: siquidem calor tenues materiæ partes euaporare facit, atq; ita, ubi ualuerit, lapidē cōformat. Ideoq; simpliciter à calore fit in nobis calculus. Materialis causa est crassus aut glutinosus succus, uel utroq; modo uitiatus. Instrumentalis causa est ren, aut uesica, uel pars alia quæ generando lapidē sit opportuna. Finalem causam haud aliam dicas quā lapidem ipsum.

8 Sanguis qui in renes deriuat, aut crassior seipso est, aut pituitosior, aut magis ad bilem atrā, aut rusam demutatus: ferturq; ad eos, per uenas & arterias, uel in cavitatē, uel substantiā: eō delatus si quantitate uel qualitate, uel cōsistentiā excedat, alstringit, detentusq; cōcipit caliditatē præter naturam: hæc caliditas præter naturā amplius eum densat, agglutinat, & assat, assatumq; ipsum in terram & lapidē cōmutat. Qui itaq; arbitrantur in renum cōcavitatē lapides cōsistere solum, cum per urinæ meatus transeunt, discruciani laborantes dicunt: qui uero in ipso renū corpore gigni lapides arbitrant, quo modo & in arthriticis nodi gignantur: non solum cū pertranseunt, sed & qñ generantur, & qñ renū cōcavitatē subeunt, dolorē excitari existimant. Sed fieri utroq; modo lapides posse nobis satis persuasum est, cū succus tenax & crassus tēpore aliquo assatur in ijs atq; exiccatur. De-

A monstratum est enim in cōmentarijs De facultatibus renem trahere ad se quicquid in uenis sero- si uel tenuis cum sanguine permixtum reperitur. Sunt igitur meatus qui in renis uentriculum illud transmittunt: qui si quando latius distendant, crassius unā aliquid colatur: quo calefacto et exiccato in renis cavitatē, lapidosam consistentiam assequitur. Quamobrem si uirius segregatrix ipsius renis id omne in urinis expulerit, arenosum in ipsis sedimentum proveniet. Si infarctum id & solutū difficile sit quod renis cavitatē susceperit, ad eum aliud adhuc nō ab simile ex causa uena immixtum deinceps colligitur, & augescit (circumlinctor enim semper quod affluit ei quod iam adest) itaq; lapis non adeo contemnendæ magnitudinis exurgit.

B Quod certe ut facilius fiat, renū tēperatura iuuare potest haud mediocriter, si calore naturali hæce uersuens & acris fuerit. Atqui si foramē & meatus qui ex uena caua in renē peruenit, fuerit rarefactus, & sanguis humens, neq; crassius neq; glutinosius: tum urina fiet cruenta.

9 Cum itaq; ex sola pituita tenaci & crassa, lapidosorum corporum que in renibus coguntur, substantia coiuerit: color inesse solet, quæ cineritium nominamus, nō ab similem lapidi quem fieri in aquis natura calidis uidemus. Hæc namq; si tepidiores sint quā pro tēperatōne, tofos uidentur producere, neque aliq; causæ acceptum feremus, quod pueris in uesica lapides generentur, ætate uero florentibus in renibus. Quippe cum actiones naturales in pueris sint omnes fortes, fusa est in eis & dissoluta succorum crassities. Contrario modo se habent coll' ætate processerunt: nam actionibus in hisce debilioribus coacta est crassities succorum. Apparet uero in externis id quoq; cum uide licet quæ crassam naturam habent, per tenuia foramina trajicere institutū sit. quæ namq; fusa calore sunt & colliquata, trāsire ocys uidemus: quæ uero liquata non sunt, traiectioni resistere. harum materierū exempla nobis sunt, pix, resina, adeps, cera, & mel. Cum itaque in pueris calidum innatum abundet, & fortes sint actiōes: crassitudo materiæ diluta in renes delabitur, indeq; facilius in uesicam transit, non parum etiā adiuuante ad tran- sitionis celeritatem ipso actionum robore. in uesica autem existente frigida (membranosa est enim pauciq; sanguinis, & ampla intus capacitate) rursus consistit, densaturq; ad eam crassitudinē quam paulo ante mōstrauimus: cōsistentiæq; principii sumit, si diutius in uesica cōmoretur. Ipsa siquidē glutinosa credibilis est ab innato puerorum calore facilius subigi, atq; ideo magis uniri, consistere, & condenfari. Adjiciamus si libet, puerilium urinarum crassitudinis causam: quæ certe alia non est, quā puerorum uoracitas, & mouendi excessus mox ab alimento assumpto, dum scilicet pueri ferocunt & ludunt. In lactentibus autem ipsa etiam materia plurimum facit: in adultis enim qui caseo & similibus rerum esu delectabantur, lapides in uesica & renibus fieri cognouimus. Id circo *uulsiatis* uesicæ, puerorum est morbus. Haud enim potest

potest uesicæ collū tam angustū in maioribus corporibus esse, ut humorē crassum remoretur. At tamē ne putemus solum hoc sufficiens esse ad lapidis generationē, nisi calida intemperies eodem accedat: quæ calorem ignitum habeat, non temperatum aut modicum. In foemellis ceruix uesicæ dehiscent in membrū genitale, & breuissimū est & lata ut nullo labore crassa per eam ipsæ mesant quæ in urina feruntur: quæ dum masculi retinent, quod sæpe fit, & propter longitudinem & angustia ceruicis uesicæ, materiā uesicæ aestuanti præbent ad calculi generationem.

10 Signorum alia sunt, ut ita dicam, scientialia, alia artificialia, alia propria. Proprium signum est, quod certe, nulloq; mediō morbum ostendit. In renibus nēpe lapidem: ut cum arenæ in matula subsidet, tunc planē ostendat lapidem in renibus esse: signumq; hoc constans est & propriū. Quoniam uero affectus quidam complicantur, dicemus quoq; de signis communibus. Cum lotium quod excernitur sanguinolentum est, signum id esse commune poterit, uel quod uasorum apertio sit, uel ruptio, uel erosio, uel imbecillitas, uel dilatio, uel aliud quicq; eiusmodi. quoniam ruptionē exquisiti & confertim egesti sanguinis uacuatio sequitur. In apertione paulatim fertur, & sanguis tenuissimus emanans cruentā urinam efficit. Si quoque tempore & momento sanguis egeritur, imbecillitas uasorum est: Si unā cum sanguine aliæ quoq; crassitudines excernuntur, dilatio. Nam sanguine aquoso, manifestum est certumq; lapidem consistere. Quod si sanguis qui excernitur sit crassus, manifestum est, ipsius crassitudinem uiolenta coactione in lapidem esse abituram: si (ut fit) in ea sanguis uacuatio frigida exhibeamus, ut uena coarctetur & cōiueat, atq; arteria: nec amplius sanguinem ullum in renes ingerat, qui cogi illic possit. fit enim proculdubio in hisce lanandis error: nam uenam coarctant frigida, ut alium sanguinem inferre non sinat: uerum ea ratione fit, ut sanguis qui in renibus commoratur, causa sit. Proinde si frigida exhibeas, uenam cōprimes quidem, ne sanguis deferatur: sed qui renibus illatus iam est, mox indurabis.

11 Ex stupore cruris quod à rene secundū lumbum porrigitur, cognoscere poteris quis ren laboret. nam si dextrum crus stupor occupabit, dexter ren aegrotat: sin lumbum, sinister. Est uero stupor, sentiendi & mouendi in particula aliqua difficultas, qui sit in crure: quia uena quæ ad inferiorem densa est, triplici ramo diuiditur, quorum unus cū arterijs ad testiculos uadit, & uasa seminalia: alius renes ingreditur: tertius ad crura porrigitur. Cum igitur in renibus lapis generatur, unā tum afficitur uenā quæ ad crura descendit: sunt enim ambæ ab una sobole cāua uenæ, quam inferius partibus natura distribuit. igitur uena quæ ad crura porrigitur, repletur: qua turgente, stringuntur neruus aut musculus. cum stringitur neruus, animalem spiritū ad crura non transmittit, unde sensus crus priuatur & prouenit stupor. Porro ex

testiculo quoq; secundum lumbos retracto, scire possumus renem esse affectum. Si namq; dexter testiculus retrahatur, dextrum pati renem arguetur: est: si sinister, sinisterum. nam à iecore & corde uena & arteria ad renes procedit, quæ in eorū cavitatem inseritur. uasa autem seminalia ad testiculos feruntur. Quando igitur lapis in renibus generatur, uena illa & arteria distenduntur, & seminalia uasa quæ ad testes pertingunt, atq; ita per cōpactionem testes retrahuntur.

12 Tradunt aliqui, uehementis doloris ratio ne uigilias uomitum excitare. debebant itaque podagrici, lippientes, & qui uehementi dolore, & uigilijs exercentur uomere. Sed ea de causa hi non uomunt, immo propter posituram renium: in nanque positi sunt secundum spinam post intestina & uentriculum: quapropter facta in renibus uiolenta quadam distentione, per copulas affectio ad intestina & uentriculum digreditur, indeq; affectione ascendente, sequitur iubersio. Quoniam uero cum lapis subest, quædam uelut titillatio oritur, naturaq; ad eius quod molestat expulsionem stimulat, ideo spiritus occurrunt: quibus irrumpentibus in fistulosam pudendorū partem, ipsam immaniter tentigine afficiunt. nam in omni motione naturali sanguis & spiritus concurrunt, qui sunt naturæ uehicula.

13 Cum uero demonstratum sit cor, iecur, & renes in concauitate non sentire, in superficie autem sentire (quoniam in superficie nerui sentientes feruntur, in concauitate uero nulli sunt) quomodo hæc dolorem perferunt. An quia grauius cauitas, ideo dolor exurgit: extenditur namque membrana quæ foris est undiq; quod cauitas interna sit repleta, et sic extensa membrana dolorem facit. In renum itaque substantia dolor itidem generatur, quando concauitas ex lapide grauata est, & circumtenditur, profertq; consensione dolorem in superficiem: quippe quæ neruos sentientes habeat & membranam. In meatibus autem urinae, & qui neruosi sunt & sensibiles, dolor fit æuissimus. Dolor præterea uehementissimus fit in renibus, propterea quod eorum cauernulae non sunt latae, sed angustæ, & renes ob firmitatem substantiæ non diducantur ut uesica. Currunt lapides magna ex parte minores sunt æquales, & molliores: nempe quia diuturni non sunt. Qui calculo laborant, his primò urinae sunt aquosæ: cum enim sit obstructio, ceu per cribrum effluunt, post arenosæ, demum calculi excernuntur, cum dolor cessauerit. Sicut in mulieribus partibus ad foetus egressum partes dilatantur: ita hic uiolentia, renum substantia fathicit, & egreditur lapis. cum ad renem cavitatem subit, in membrana quæ istic substat, quoniam facili sensu est, dolorem mouet uehementē. & multo magis cū meatus urinae ingredit, ppter angustia & sensum eorū. quantisper enim in renū corpore sistitur, non multum sollicitat, quoniam, ut diximus, eorum substantia sensibilis non est. Sæpe namq; præ magnitudine in collo uesicæ detenti lapides in extremum periculum

lum doloris acumine patientes agunt, nec urinas sinunt excerni. Vidi ego quendam, cui per alias vias eas elapsus, in uiriliū extremitate lapis hæserat, minimumq; abfuit quin urinae difficultate, & dolore acutissimo homo interiret, nisi angusto tandē forcipe eximere potuissemus, sectionē per longum superne moliti. nam urinae meatū, nisi urgeat magna necessitas, incidere nō oportet, ne fiat fistulosa pars ea & urina profluat.

14 Inuenias tamen qui dolorē non habēt, nec sanguinem mingunt, quibus calculi in renibus cōgesti non sunt. At tenues arenulae haud magno negotio quidē excernunt; quod quī faciūt, nec egrotare se putant, quando dolorem nullum sentiānt. Verū nihil est hac in re cōtēnendum, cum tēpore omnia grauiora reddant. Lapides & arenulae colore differunt, tum ob caliditatē, tum ob materiā: nam ut quidq; illorū longiori tempore retinetur, ita rufum, flauum, rubeum, aut nigrum efficitur. Haud aliter & à succis fiunt lapides & arenae, colore uel sandarachē simili, uel nigro, uel pallido, uel alio aliquo colore pro succorū uarietate. Fiūt aut lapides in cōcauitate renum, in eorum substantia, & ubicunq; fieri commode possunt, aut parui aut maiusculi, interdum pauciores, interdum plures. Differuntq; magnitudine, figura, colore, asperitate, & multitudine. Nigros siquidem inuenias, & subalbos, & pallidos. Ac rotundi, lenes, & parui, facile excernuntur: maiores, uel aliter figurati, & maxime oblongi & asperi, difficulter. Arenulae uero prodeunt & egeruntur dum fiunt lapides: cum facti sunt, haud fieri potest ut efferantur, quia in lapidem sunt coacti, nisi natura ipsa ultro conterat & excernat, uel ars per medicamentum tritorium naturā auxiliata, conterat & euacuet ipsas. Nemo uero ignorabit colicū & renū affectū unā plerunq; incidere. Deprehenduntur tamen proprijs signis: nam aluus exonerata colicis medetur: nephriticos quoq; à principio mitigat. Et iam aliqui dederunt medicamentum quo aluus subducta, & dolor cessauit primo, secundo, & tertio die, quarto prodijt lapis. Cum autem simul in ciderint renū & colī affectiones mutuo particulā communicāt intensiōe & remissiōe: tenduntur enim ob cōtinuitatem partes haud aliter quā funiculus: & neque superne ructus ullus, neq; infra flatus quispīam exit.

15 Si renū affectus subito inuadat, & qui laborat cibo nuper refectus sit, cibiq; adhuc sint incocti sicut egrotus eos ingessit, aut semicocti, uel succorū multitudine corpus grauātū habeat: oportet ante alīa curationē, uel potius mitigationem, nisi quicq; impedimēto est, uomitū prouocare. Mox si in intestinis excrementorum superfluitates fuerint, per idoneos clysteres extrahere, modo nihil obftet. Postea si totum corpus plenum fuerit, considerare quīsnam humor sit, qui ipsum repleuerit. Atq; si sanguis is est euacuationem instituire oportet, cum nihil impedit; minorem tamen multo quā plenitudo desiderabat. Quid ita? quoniam lapidem non planē statim eximere possū-

mus, potissimum cum magnus est: ideoq; oportet pleniorē sanguinis euacuationem cauere, propter consumptionem, quē tempore adhuc aliquo in corpore futura est. sin quatuor humores abundauerint, potius uenā incidenda est ante purgationem, q̄ purgandū ante uenā sectionē. Quoniam si per sanguinis missionem corpus prius uacuatum fuerit, purgās medicamentū exhibitu uenas & arterias, & inanes corporis regiones inuenit non oppletas: quo fit, ut absq; ullo impedimento in totum corpus dimanet ad attrahēdum succos facillimeq; fiat eorū euacuatio per uasorum spatia & fusionem tenuitatemq; succorum. Nam si uasa sanguine repleta sint, & purgatiū dederis: non poterit propter plenitudinē in corpus differri: unde fit, ut subter, & nihil efficiat: aut si quicq; facit, male faciat. Ex medico quidem purgans medicamentum: ex natura uero totum negotiū pendet: hæc enim à purgante medicamento excitata, faciliatē segregatricē aduocat, quā segreget inutilia ab utilibus. ac utilia quidem retentrix facultas detinet: inutilia uero expultrix facultas expellit. non oportet aut simul uenam secare & purgare: uerum prius sanguinem detrudere, deinde uirtutem pulchre rescillare. quoniam ipsa nos gubernat, & medicamentis auxiliatur. medicamēta em̄ per seipsa nihil efficiunt, ideoq; corroboranda uirtus est, ut possit natura ut purgatiū exhibitis ceu instrumentis, atq; quod decens est, perficere. Huc præterea accedit q̄ unā cum sanguine multū ē uitali spiritu excernitur: quo excreto refrigerat totum corpus, & opera naturalia deterius obeunt. Ea propter uirtutem prius rescillare oportet, deinde medicamentum purgans exhibere.

16 Sed quia affectus renalis est, & materia ex qua lapis generat crassa, materiaq; crassam sursum reuellere prōptum non est, magis uero ad ipsius lationē spectantibus deorsum uacuare expeditum: ob id si ualida sit uirtus, uenam quā in poplite est aperiemus, uel quā ad malleolos: sin imbecillis, uenam quā est in cubito. nā si uirtute debili infra euacuabimus, retentrix facultas, quæ est imbecillis, non retinebit: sed uniuersa in præcep rapietur, & partē assiduo defluxu impetret, succis uidelicet in locū imbecillē perpetuō procubentibus: Quapropter cum firma uirtus est, conuenit ex uena quæ in poplite est, sanguinē mittere: cum debilis ea est, reuellere ad superiora. Quam uero ob rem, si quæris: ne materiæ plus in renes deriuetur. Hinc est q̄ cum cibaria, pituitam, & succū uomitu euacuauimus, tranquillitas quædam fiat & leuatio. Eijciunt namq; cibūs & pinguia quæ uentri culum grauent: à uētriculo autem renes stringuntur & urinae meatus. quo fit ut grauior sit oblatio. Sunt itaque primum ista diluenda, quæ stomachus excipiens ceu debilis distendebatur & premebatur: quibus euacuatis leuatio sequitur, & nō dum tamen perfectaliberatio. Vacuum etiam per clysterem excrementa: ne colo & reliquis intestinis constrictis atque grauatis, unā quoque ren laborans stringatur prematurque, atque sic amplius

amplius doleat. Quod manifestum est, quia ster-
coris obstructione renes plerūq; exasperari com-
pertum sit, enematis iniectione renalem dolorem
esse mitigatum: uel quod ab ea uacuatione ren-
aliquis non sit amplius cōpressus: uel quod ex ster-
core nulli postea flatus prodierint: qui in renes im-
pingentes, ipsos ut imbecilles compriment & ex-
cendunt. Sed neque sanguinem, neque alium suc-
cum plus equo relinqui in corpore par est, ne mul-
ta hinc renis uasa distenta plus doloris concitent.
Quaecunque enim uel dolent, uel calent, uel ex-
tenduntur, per uehementes & acutos dolores, ad
sematerias accerfunt.

17 Proinde doloribus siue repente siue pe-
detentim in renem incurfantibus ex commemora-
tis iam causis, illico, nisi quid prohibeat, aluum de-
coctio alioquo eluemus, caricarum, foenograci, ari-
stolochiae, & similium. ac, si uacuatum satis est, be-
ne uertit: sin minus, bis, ter, aut amplius uacuand-
um enemate est, sed ex eorum decocto quae con-
ducibilia sunt, & familiaria naturae aegrotantis, ne
angantur grauenturq; renes & uiae urinales. Po-
steaquam autem aluus satis excreuit, inijcienda
sunt quae urinae uias dilatare, renes laxare, calculi
deprimere, & morsus mitigare queant. utilis
ad haec materia est oleum anethinum, in quo eli-
quatus sit gallinaceus adeps quamrecēs: maximo
pere uero phasiani adeps, uel butyrum recens,
aut similia aliquid. Quae si in promptu non sint,
foenograci, & altheae uel radicem uel semen, aut
similia aliquid decoquentes oleo inijciemus.
Nam haec omnia uias dilatant, & lapides deprimunt,
necon doloris uehementiam mitigant.
Sed horum usum frequentius assequitur is qui ex-
ploratum habet naturalium facultatum uigorem;
immoderata nanque emollitio & laxatio uirium,
robur exoluit: quod solatur & perfecte curat u-
niuersum dolorem.

18 Post uomitum autem & enemata conferet
locum qui affectus est fomētis humectantibus &
relaxantibus delinire, quantisper lapis in rene ha-
ret: ut interim tamē curemus, ne ut dictum iam est
is abutatur. huc faciunt etiam cucurbitulae, quae
saepe lapidem celeriter adeo transferunt, ut subita
eius malī leuationem possint comparare, lapi-
de nimirum in locum ampliorem translato. qua-
propter supra a renibus initium faciendum est, pro-
cedendumq; ad inguina per obliquum illum posi-
tionem, quo loco frequenter dolores incedunt;
quod cum institueris, nihil est utilius q̄ partes eas
in laborantibus prius calfacere, postea cucurbitula
las admoouere: alioqui lapis sicubi maior fuerit in-
uētur, arctius figitur: cumq; uiolētius urgeat, nō-
nunquam periculum haud mediocre doloribus
accedit. quare fomentare iam nominatis iniectioni-
bus proderit, si mali communicatio ad puden-
da usq; processit, atq; id cum foenogracio, althea,
semine lini, anetho, gummi, & similibus aqua dili-
genter incoctis & dulci oleo infusus. Conducet et-
iam emplastrum ex triticea farina, aut hordeacea
cum lini semine, & foenogracio, & melle, & oleo

anethino, & gleucino: quae cum decoctione pra-
dicta elixabimus, inspergentes in ipsa cataplasma-
tis ebullitione, radicē altheae pulcherrime tursam,
& cribro discretā, terebinthināq; resinā cū desinit
feruere decoctū, aliquib. adiectis seminibus quae
flatus discutiunt, si quam subesse inflationē intel-
leximus, ut sunt anethi et apij semina, sceniculum,
ligustici, & alia id genus, pro laborantis tempera-
mento. Fiet aut cataplasma optimum ex lupini fa-
rina decocta cum musto, si a decoctione peuce-
dani radicem minutissime leuigatam admiscea-
mus & chamamelum. Bonum etiam fuerit pan-
em musto incoquere, & cataplasma inde lum-
bis imponere et ilibus. Nec minus proderit uesica
& partē sub umbilico cataplasmate cōfirmare, ita
ut crebra permutatioe alia atq; alia subinde admo-
ueamus, priusq; refrigeratū sit primū quodq;. Sin
illud non liceat, tepetactorio possumus alio, ne
refrigescat quod impositum est, fouere: quod fiet
si pro fomento cataplasmati aquam calidam in ua-
se testaceo uel aeneo imponamus.

19 Post alui uero & supra & infra sicut dixi-
mus euacuationem, phlebotomiam, purgationes,
fomenta, iniectiones, si dolores adhuc perseuerēt,
uti lotionibus cōuenit dulcium aquarum: Aliqui
enim uel ante uenae sectionē & reliquam curatio-
nem, balnea admiserunt, propter doloris immani-
tatem: Aliqui, si nihil esset quod urgeret, post san-
guinis missionem & curationē reliquiam. Balnea
sanē humectant & calefaciunt euestigio: calida si-
quidem aqua lenitionē affert cum calefactione:
In quam tamen qui frequentius se demittit, in esca-
tus lenimento doloris, quod lotio praestat, corpo-
ris uires exoluit, quarum est, quicquid corpus in-
festat, propulsa. Eam ob rem cum cessauerit do-
lor, auferenda balnea sunt, & fomēta adhibenda;
sed ex medicamentis quae patientis naturae sint ac-
commodatissima. Ceterum si excessu doloris ho-
mo periclitetur, commodius erit stupefacientib.
succurrere: nam aliter ea nunquam usurpes, quip-
pe cum dolorem non sedent, sed sua temperatura
sensum auferant, ipsumq; fallāt: quae dispositio po-
stea multam curam requirit.

20 Quod si spiritus aliquis crassius qui una est
calculo morbum exasperet, suspectus nobis fue-
rit: praedictis fomentis & cataplasmatibus admisce-
bimus quae digerēda inflationis naturam habent,
sicut rutā, anethū, nigellam, & hoc genus alia, dili-
genter attrita, post perfectā ebullitionē. Sed ea-
dē ad fomēta & enemata aquae incoquimus absq;
contusione. Verū si omnibus his peractis adhuc
lapides fixi permaneant, a multis cibis atq; potio-
nibus laborantem abstinēbimus, & ips quae ipsius
naturae sunt minus conuenientia, ne uenter reple-
tus, grauatus, inflatusq; ciborum succorumue aut
flatuum copia, repletioe hac renes premat & uiolē-
tia prosequatur. Sint uero quibus utitur om-
nia modica, & laborantis naturae tum qualitate tum
quantitate accommodata. Veruntamen si laboran-
tis natura calidior esset, & sitis uehementior, uacua-
to prius toto corpore & ab excrementis repurga-
to, si

to, si qui frigidam bibere essent consueti, & phlegmone nullum uiscus laboraret, nec esset imbecille, frigida sæpe copiose exhibuimus. renibus ita corroboratis, euestigio lapidē impactum expulerunt. In corporibus autem plethoricis, id est quæ succorum quatuor multitudine æqualiter redundant, & exremētosis, & in quibus uiscus aliquod debilitare affectum est, & ea sorte alijs, frigide potio cauere conuenit.

21. Cæterū si & post hæc omnia quæ diximus lapis adhuc firmiter resistat, utendum est medicamentis quibus conteratur, quæ tepidam facultatem habeant. Nam calida urinā prouocantia inducant lapidē. Quæ uero tepidā uirtutē habent, paulatim cōminuunt lapidē, nec eum duriores reddunt: eiusmodi sunt damafonium, petroselinum, polytrichon, & his similia. Sed forsā dubitare aliquis, quomodo lapidem possint cōminuere quæ tepidam facultatem habēt. cui nos respondemus. Lapis ille cum ab intemperie & ualido calore sit factus, ob id merito exhibemus quæ uirtutem tepidam obtinent, ut quæ cōtraria ipsi sunt, à quibus lapis est effectus. Sic enim multo tempore attenuamus, conterimus, & superamus ipsum. Quippe tepida ceu minus calida sunt ualde calidis contraria. Diureticis ergo & ualde calidis uti non poteris, ne crassam materiam eo pacto indures, & in lapidem celerrime commutes. Cū uero lapis nondū constitit, neq; magnus est, sed tantum obstructio sit ab arenis, uel crassis & tenacibus succis: tunc calida secure porrigas, & quæ obstructiones aperiant, haud ueritus ut lapideat materia. Cū namq; arenæ sint quæ obstruunt, si porrigas quæ aperiant, & calida, qualia sunt medicamentum ex aniso, & pipere, apium, phu, & similitum aliquid: eua cuabis & dissolues eas.

22. Ad prædicta uero breuiter delibandum est quomodo quis se à lapide præseruet, ne qui iam curati sunt, eos noua lapidis generatio rursus perturbet. Quoniam autē eorum qui calculo infestantur, sanabiles sunt alijs, alijs minime. In præseruando maximi sunt momenti ciborum moderatio, & bene coctiones. Satietares enim & cruditates hunc morbum non exacerbant modo, sed etiā pariunt, ubi nullus erat. Quapropter nihil est seruens ingerendum, quod renes possit & uesciam calfacere. Nec minus cauendum à cibis est, qui duram substantiam habent, & qui ægre diuiduntur: quicq; substantiam habent pleniorē, & qui multum nutriunt, tum qui celeriter in corpus distribuuntur ante perfectam concoctionē, item qui innarant, difficulterq; descendunt & insistant, ac uias oblimant, aut aliter corporibus adhærescunt pertinacius. Nā uentriculus talibus alimentis grauatus, cruda hæc ad iecur & renes detrudit: incoctum autem alimentum à uentriculo confertim illuc expulsum planè concreuit, atq; cum tumultu semel atq; iterum in renes delatū in lapides mutatur ob renis alicuius diuturnam concretationem. Sed ad uictus rationem transeamus. Vinum ita sittenue admodum & album, non ualde uetus: dulcia uero & nigra

uina calculosis sunt inepta. Aqua uero in uniuersa uictus ratione sit purissima & purgata: nam fluuiales, palustres, & omnes aquæ stagnantes, quæq; segniter fluunt, & non commouentur, omnes generare lapidem possunt: atque ut paucis de omni uictus ratione præcipiam, in frigidis & carnosis, diæta sit planè extenuans: in calidis & gracilibus media sit inter extenuantia & crassafaciencia. Ab aliorum omnium saturitate cauere conuenit, & præcipue dulcium, & caseaceorum nutrimentorum, & crassorum, & tenacium, & pinguium. Cruditatemq; ideo aduersissimam esse putandum est, in quam si calculosorum aliquis incidat, somno diutius aut quieti prorsus indulgeat. Præcordiaq; proprijs manibus calefaciat, donec concoctæ rite omnia sint, & infra subsistant. Locis temperatis & in aere puro fiant exercitia, ab his quibus liberum tempus est. Irascantur interdum. Deambulationes & exercitia laborantis nature conueniant: est enim desidia in primis noxia. Sit alius soluta assidue, modo ne instet aliud quippiam: cum nanque hæc probe exercit, urinæ profluent libere. Vnctionibus si oportet uti, quando oportet uti, sint quæ contra locorum iniuriā que ante corpus communire: ut sunt rubrificationes, dropaces, & quæ ex sinapi fiunt. Aquarum etiam quæ natura calidæ sunt, usus prodest, cū nihil prohibet. Considerare etiam accurate debes de sanguine mittendo cum tempus adest, si corpus sanguine plenum uideatur. Exundans enim nisi euacues, confluet in partem imbecilliorē. Sed purgatione uti præstiterit in his qui malis succis sunt repleti. nam eos qui inordinate degūt, & succum crudum in superiori uentriculo multum colligūt, à cœna frequenter uomere facito, nisi sit quomobrem prætermittant. Post prouidentiam quæ toti corpori adhibetur, offerre conuenit medicamenta quæ renes purgent: sicut quæ obstructiones aperiant, quæ urinas crassissimas, uiscosas, fetidas, multas à uenis, renibus, urinæ meatibus, atq; uescica educunt: quo numero sunt cardui decoctum, & alia prædicta. Sæpe magno usui sunt quæ urinam mouent.

23. Hæc ut omnes homines cōmuniter moneamus, non ut exquisitam disciplinā traderemus, sunt à nobis expolita. Quamobrem tibi gratia est habenda, quoniam per te sunt omnia tradita. Porro constat ab unicæ qualitatē indicatione, parari perfectam & exquisitam curationem non posse: sed indigere nos alijs adhuc, quæ ab eo genere nō sint aliena: hinc est quòd cōmonefacere de illis etiam aliquid operæpretium putemus. Variatur enim medicatio pro diuersis causis, ætatibus, locis, anni temporibus, habitibusq; & dispositionibus, moribus & consuetudinibus, temperamentis, sensus facilitate & difficultate, partium differentijs, positionibus, alijsq; id genus compluribus. quam obrem opus est optimum medicum diligenter id nosse, quod secundum naturam est. Qui namq; id quod secundum naturam est, exquisitè perspexit: celerius cognoscet id quod est præter naturam.

Nec enim prædictæ causæ solummodo medicationem variant, sed proprii quoque naturarum modi, propter quos medicamenta, uel plurimum probata sæpe nihil cōducunt atque fallunt: quapropter obseruare cōuenit. Et nisi curationi obtemperet, uel ob naturæ proprietatē, uel affectus apparatū, uel aliud quippiā; his relictis ad alia quæ utilia placent, transire necessarium est. Id quod faciendū non tantum in medicamentis est, sed & alijs omnibus tum auxilijs, tum uiuendi institutis. Verum memoratas hic proprietates, aliāque complura quæ dicta non sunt, non omnes qui ad medicinæ sacra accesserunt (licet sint alioqui argutissimi) sed quisemper agris assistent, & explorabunt naturæ motus, assequuntur. Proinde si ob latentem aliquam & propriam causam, artificiali cuiusquam iudicio, medicamenta non respondeant, oportet propter urgentem uehementiæ necessitatem, ad ea quæ ueteres obseruatione tradiderunt, & quæ a tota substantia operantur, descendere. Ea dico quæ experimento, & exercitatione haud rationali sunt reperta: quod genus sunt passer troglodytes, leporella pellis combusta; sanguis hircinus, & alia infinita tam simplicia, quam composita medicamenta. Quorum multa abominanda sunt, quæ exercitatio non rationalis inuenit: uel natura, uel fortuna quadam, uel obiter non data opera, uel imitatione, uel in somnio, uel oraculis, uel traditione, uel alijs quibusdam, ex quibus empirice constat. Quæ omnia cum ratione indiscussa nostro tempore sint, non ponemus magnam in eis fiduciam, quia modum utilitatis illorum ignoramus. Quod si aliquando cogente aliqua necessitate adhibeamus, non debemus his abuti, ne quemadmodum absque comperta & manifesta causa iurauerunt, ita uicissim offendant. Qui namque uolet esse præclarus medicus, & ratione quæque, non temere agere: circa qualitates & effectrices, & operationes debet uersari, & in eis fiduciam ponere: quippe qui sic methodo compertum habeat calidi & frigidi, humidi & siccī effectus, item acerborum, austerorum, acidorum, dulcium, salforum, amarorum, acrimum, & omni qualitate carentium, nec ignoret, quem effectum præstent, quæ crassum sunt partium, quæ tenuium, quæ obstructions aperiant, quæ attrahant, quæ emplastica sunt, & alia quæque singulatim. Enimvero ut plurimum ratio constat, lapides conterente materia uti magis decens est, quam quorum ratio cognita non est, ueluti damasonio, petroselino, polytricho, & similibus his uirtute, quæ probatoria etiam eo sunt, quod tepida facultate consent. Verum si tandem calibus ita deploratis, & hæc frustra admoueris, non absurdum erit nos ceu Christianos (sic deo rem committas) ad maxima nostra & uere arcana confugere, quibus & credo & confiteor, non corporis solum affectus, & a quibus omnes medici desperant per sanari, sed omnes etiam animi passionēs funditus extirpari.

24 Reliquum sermonem ad te peculiariter, tanquam hypothesim cōuertam. Cum multa sint

A quæ restaurare sanitatem possunt mihi ab alimentis necessario incipiendum uidetur: nam alijs auxilijs non semper uiturum, sed alimento carere nullū animal planē potest, siue ualeat, siue ægrotet. Quoniam uero tutior est & cōpendiosissima uia ad affectus leuationem unica uictus ratio: quandoquidem aliorum medicamentorum abusus & permutatio, sic ut comperi, multis sæpe non leues morbos pepererunt: tu animæ meæ sol, qui calidus es & humidus temperamentum fortitus, & ætatem puerilem, uiresque non ita robustas, habitū gracilem & rarum, & facilem insuper ad percipiendam incommoda sensationem: ob temperatam, ætatem, habitum, & raritatem assumes horum qualitatis similia in nutrimentis ciborum & potum, & quæ ualeas conquire. Ob debilitatē autem uirtutis pauca, & eo sæpius. Pauca quidem debilitatis uirium gratia. nam onus ferenti conueniat oportet: sæpius uero quia necessitas urget. Athletæ enim, uiaiores, milites, & omnes qui ualida exercitia obeunt, modo ualeant inculpare, abstinere a nullis debent, uel cibis, uel potibus quæ ad manū sunt, uel quæ occasio præstitit, quia uti ijs oportet quæ est necessitas elargita. Quibus non solum uiuere ita licet, sed & his qui negotijs urbanis plurimum distrahuntur, & patroni aut uindictæ propugnandis clientibus negociosis degunt. Tu uero qui nūc tui iuris es, hyeme comesdes plurima, plurima dico nō ad tuas uires sed aliorū anni temporis respectu. Quemadmodū & Hippocrates artis nostre princeps inquit. Aestate & autumno cibos difficillime ferunt: hyeme facillime, uel secundo loco est. Idem rursus alibi ait: Ventres hyeme & uere calidiores sunt natura, & somni longissimi. In his itaque temporibus alimenta plura tribuenda sunt: siquidem calor innatus multus est, ideo pleniori alimento indigent. Indicio sunt ætates & athleteæ. Bibes autem aliorum anni temporum comparatione minimi. Debetque potus esse album & tenue uinum, quod admodum uetus non sit. Sed & obsonia hoc tempore assa debent esse ut plurimum. Utendumque oleribus & leguminibus parcaissime est. Et hæc omnia magna ex parte calida & sicca nō propter temperiem ætatemque tuam assumes: sed propter intemperie quæ ex anni tempore frigida et humida est. Post ubi uer aduenerit, potus uberior, dilutiorque parum condecet, & esculentam molliora paucioraque. Quin & obsonia ex assis ad elixa cōmutabis, oleraque nonnunquam assumas. Verum ad hæc ab illis non subito, sed paulatim tibi transeundum est, ne uersa illa & subita mutatio comparet offensam: sicut traditū ab Hippocrate est. Plurimum atque repente euacuare, uel replere, uel calefacere, uel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum: quoniam omne nimium est naturæ inimicum: quod uero paulatim fit, tutum est, cum aliās, tum uero cū ab alio ad aliud transitur. uberiorem uero & aquosior rem potum præcipio: non plurimum, neque aquosissimum. Plurimum enim & aquosissimum æstate bibitur, quod tempus hyemi planē con-

trarium est. Ver autem sicut medio loco est inter hæc duo extrema, ita mediā quoq; rationem uiuendi requirit. Hæc autem uiuendi ratio tibi conducit nō ob anni tempus solum, sed ob tuam etiā temperaturam atq; ætatem. Et hunc in modum, uerno tempore te geres. Alijs autem anni temporibus paulo diuersius, non propter ætatem tuam & temperaturam solum, sed & anni temporum intemperiem.

25 Sicut uero anni temporum differentie non eandem uictus rationem demonstrant, ita & corporis habitus. Carnosos liquidē & molles, frigidosq; & humidos, ut plurimum scitius alimentum confirmat. Qui contrariō modo se habent, contrarium. Tibi itaq; quia mediō es & temperato habitu, maiori tempore uictus ratio temperata cōueniet. Quæ nanq; secundum naturam sunt, ut plurimum similibus indigent; quæ præter naturam contrarijs. Puerorum temperamentum calidum est & humidū, cum non possit auctio & conformatio in alia temperatura fieri, quā puerili. Ob hoc igitur similia te oportet & multa nutrimentum uti, ut multa & uaria concoquere assuescas. Quippe hac ratione natura uentrem & iecur ampla & capacia formauit, et alias unā omnes partes. Quod si quando tibi plus humiditatis quā pro sanitate conueniat aderit, siccari tamen nō ut alij debes; propterea quod auctio nihil æque ad uerferet ac siccitas. Hac de causa uitanda tibi sunt quæcunq; exiccant, calefaciunt, & extenuāt. Atq; hic modus est quo uitam instituas, ut tua natura ualeat inculpatis. Senes autem propter membrorum quidem duritiem frigidi sunt & siccī; propter excrementa uero frigidi & humidī. Senes itaq; partium quidem solidarum frigiditate, contrariorum contraria postulant (nempe frigiditatis calefactionem) in cibarijs poculentis & reliqua uiuendiratione: euacuationem uero earundem inter se mutuo propter excrementa. In his paucum nutrimentum desideratur, ob uirtutis imbecillitatem, id quod est ab Hippocrate traditū. Quæ crescunt, plurimum habent innati calidi, plurimū igitur egent alimēto, alioqui corpus absumitur. Senibus uero parum innati caloris inest, paucis propterea fomentis indigent. Et rursus: Senes facillime ieiunium ferunt.

26 Panes differunt materia, fermentatione, & ratione coquēdi. Materiæ differentie sunt quatuor. siligineus, *σιλιγίνης* Græce nominatur. *σμηλαλίτης* Latine similagineus dicitur. *αὐτόνυχος*, quem *συγκομισον* quoq; Græci nominauerunt, quod ex farina uniuersa comportata, non discussis fursuribus constet. *πιτυρίας* ac si fursuraceum diceret Latine. Horum nos incōmoda atq; affectus edocebimus. Plurimū est alimentū siligineus, qui & diutissimū in corpore moratur, & efficacissimū est secundum locum obtinet similagineus. inferior his est syncomistos, ita ut haberi mediū possit. omnibus infirmior est fursuraceus. Tibi uero, cum uales, cōmodissimū siligineus est: cum renū morbus infestat, quod nolū, dum laboras

A ab hoc abstinere, et si temō ueat edendi desiderium, fursuraceis uti medijsq; tuto poteris. Nam condu cibilius tibi esse genus hoc potest, nisi prohibeat aliquid, quia pauci nutrimentū est, & in uentre colligit excrementa, quibus ad excretionem descendit expeditius: astringitq; nonnihil ex fursuris natura, quam obrem ocyus deijcitur, in intestinis ad expulsionem irritatis. Quando in hoc affectu nihil perinde conducit, atq; uentrem semper lenem & solubilem habere: cum enim probe is subducitur, urinae possunt puriores proferri. Panes reliqui, maximeq; siligineus & similagineus, cōtrario modo alium retinent, quia difficulter secerantur. Et hinc est quod iecoris & renū obstructions pariunt: tamen si alibiliores sint & uegete plenius. B Euolucris laudantur, quæ mediā quandam materiam præstant extenuantiū & crassificantiū: sunt perdicæ, attagines, galli, gallinæ, columbæ, phasiani, passeret, & ante alias quæ turritæ nominantur. hæc nanq; habent naturalem efficiaciam. E terrestribus optimi succi est caro suilla, & hominibus maximopere familiaris, maximeq; tum nutritibilis, tum corroborans: sed glutinosum quiddam habet & crassum: ob id qui diutius ea uicunt, iecoris & renū obstructione corripuntur: eoq; longiori ab ea intervallo abstinendum. Paruorum autem porcellorū carnis si parum, & assidue utaris, nihil offendit. Ceruinam carnem uitabis, quippe quæ dura sit, concoctū difficilis, & melancholica. Ouilla carne utilius est ex C interuallis uti, quod excrementosa sit & mali succi. Agnorum uero hoedorūq; carnis quoties libitum fuerit uteris. Ex aquatilibus animalibus, pisces qui saxatiles nominantur, non erunt tibi commesti inutiles: quales sunt gobi, muli, charitilagineorū genus. alijq; qui generare bonum succum possunt. Ad hæc marinorū alij, & qui mollem testam habent. Astaci, paguri, cancri, carabi & carabides, & quibus dura testa est. De fructibus autem quid dicam: nec enim nobis ceu alimentum idonei sunt pleriq; ipsorum: sed ceu medicamenta quæ stomachum & uentriculum corroborent, assumentur. De cibarijs hæc tenus.

27 De potu autem dicendum nunc est, et uino potissimū: nam alij liquores uel ad nutritionē D nihil conferunt, uel aduersantur etiā nutritioni plerūq;. Vinum uero solum nutrit, quoniam plus habet ad nostra corpora familiaritatis, quā alij humores omnes. nam oleum & mel habent quiddam & ipsa aliquid conuenientia nobiscum, sed non tantum quantū uinum. Sunt tamen uini differentie quibus discernatur: inter quas prima est quam color exhibet. Secundam præbet degustata qualitas. Tertia consistentie debetur. Quarta in odore est. Quintam uiribus metimur. De quibus omnibus singulatim disserere superuacuum erat: dicendumq; est, quodnam tibi uinum peculiariter conducat. Aliud etenim alij uinū confert, idemq; rursus alij minus. Tibi uero conducit tenue & album uinum, quodq; parum aquæ sustineat. Nam eiusmodi uinū facile descendit, & succos qui sunt in

in nobis attenuat, & excernit per urinas, uirtutēq; corroborat. Alia uina tibi non conferunt, sicut in alijs utilia sunt. Non uidetur ab re, de aqua paucis hic sermonem facere. aqua tam sanis quam agrotantibus cōmune solatium est, & maximopere necessaria, quod mundanorum & singularium elementorum hoc unum sit, ex quibus uniuersis tota nostri corporis constitutio est conflata. Quamobrem de ea fuero haud ociose dicturus. Aqua purissima tribus sensibus iudicatur, gustu, uisu, olfactu. Gustu si nullam planē qualitatem præ se ferat, sed uideatur ab omni qualitate immunis. Visu si pura, sincera, & exquisita clara. Olfactu, si eorum nihil inest, quæ in aquis uitiosis esse olfactus testantur sunt aciditas, putredo, acumen, falsedo, ali-quod uel aliud uitium quod nomine careat. Quatuor autē commode quouis & tempore & modo uti possis aqua, sit purissima defæcata, leuis, & fontana, cuius natura est frigida. quod si etiā cito à præcordijs descendit, potiorē non desiderabis. Haud uero sicut uino, cibis, exercitijs, uigilijs & somno, secundum ætatem & temperaturam diuersitatem alijs atq; alijs uti cōmodum est: sic etiā aqua non eadem semper uti est ex usu: Imò quā utilem esse modo diximus, ea uti audacter poteris, & puer, & adolescens, & senex, quacūq; naturæ differentia præditus. Quoniam uero aqua una plus alia frigidareperitur, hac de causa non omnibus prodest aqua frigida potu indifferenter uti, uerum si pra modum calidis pinguius & carnosus, siue naturalis habitu siue acquisito, & his qui se uehementer exercent quiq; consueuerunt frigidam potare, innocua est si frigidam bibant. Quod si aliter aliqui se habeant, minus bibant ex ea. qui uero iuueniles sunt ætate, & in rebus civilibus uersantur negotiosius, q̃ ut exerceri ordinate & uiscitare queant, fontana sumat, relicta naturalis aqua. Hæc namq; tametsi iuuenilia corpora more offendere non uidetur, noxa uidelicet quæ paulatim incrementum non perceptat: tempore tamen procedenti cum ætas declinat, difficulter sanabiles aut incurabiles planē morbos inducere nata est, in neruis, articulis, & uisceribus. Quam offensiuem pars aliqua corporis percipit, quæcūq; debilissima est natura. Quam ob rem uti debes fontana, & ea defæcata, de qua plus assumas quàm de uino. Ac de aqua quidē breuissimum habemus.

27 Tempus nunc est, ut de exercitationibus uerba faciam. In quibus corpus contentiosius mouendum non est, donec uidelicet uires succumbant. nec imperfecte exercitandum, ut membra perspiratione non satis distrahantur: sed ut uiribus cuiusq; proportionē respōdeat. Quippe uehementia relatione ad aliquid est: quo sit, ut dimotio eadē alij sit exercitatio, alij minime. Vtile est igitur quæq; id exercitationis genus eligere, cui est potissimum assuefactus. nec pugilum, cursorum, & luctatorum exercitationem subire, ab exercitatio-ne uero tria imprimis cōmoda proueniunt: nam instrumentorum duritiam dum inuicem conflantur, & innati caloris incrementum concitatio

Galen.

remq; spiritus motum efficit: quibus uniuersæ cōmoditates aliæ sigillatim sequuntur. Instrumentorum namq; duritiam sequitur firmitas, atq; immunitas ab iniurijs, quæ undecūq; in corpore expectantur. Augmentū caloris sequitur fortis alimentum distribuendi attractio, & promptior alteratio, et commodior nutritio, & excrementorum offusio, per quam dura quidē membra molliuntur, humentia uero extenuantur & diffluunt, meatusq; totius corporis dilatantur & patescunt. Ex ualido autem spiritus motu eosdem meatus purgari necesse est, & euacuari superflua excrementa. cum uero nobis ab exercitatione cōmoditates tantæ accedant, cōmodum earum utendarum tempus inuenire difficile non est. Nam cum alimentorum distributionem adiuent, nullam oportet multitudinem crudorum, neq; ciborum, neq; humorū, uel circa uentrē, uel melsaricas, uel iecur, uel reliqua uasa contineri, quia periculum esset ne diffunderentur ad omnes corporis partes, priusquam concocta fierent nutritioni utilia. Et quia meatus expurgant, euacuantq; superfluitates, melius est ante cibum eas insituere. Corpora enim non pura (inquit Hippocrates) quanto magis nutries, tanto magis lædes. Quare ex prædictis clarū est, hoc tempus exercitationibus admodum conuenire. illud præcipue curandum in quocūq; exercitationis genere, ut fiat in loco salubri & aere puro. Sed hæc de exercitationibus dicta sufficiant.

29 Crebris autem lotionibus utere, temperatis & breuibus, non propter ægritudinem, sed quod ad auctiōem tuam, nutritionem, cōformationēq; faciant. Cui rei optimū erit tempus cum nutrimentum hesternum perfectē concoctum est & subsedit, aliq; iam nutrimentū necessitas impendet: item cum & in iecore, & uenis celebrata concoctio fuerit. Id quod sciet medicus qui tibi assidet, & tui perpetuo curam gerit. Nempē uentris exquisitam cōcoctionem ex deiectionibus: lecoris & uenosi generis ex naturalibus urinis. Vnde constat tibi à cibo lauandū non esse, ne obstructio circa iecur & renes eueniat. Cauebis etiā uini assumptionem protinus à balneis, nam uino caput tentatur: ut conducibilis sit primo temperatam aquam assumere. Igitur non frigida aqua, non uini, non zithi, uel licera potus mox cum laueris, damno carebit: quippe quæ & ipsa uentriculum, iecur, & neruos offendant: si non temperie, contentu saltem. Profuerit insuper tibi non statim ubi à somno surrexeris lauare, sed aliqua dimotione interposita: nōnunquam etiam mediocri exercitio. Nam exercitia moderata atq; idonea, tuæ naturæ sunt utilia, quod concoctionē, sanguificationem, & nutritionem meliorem operentur: & ob id nōn uulgariter adiuuent bonum habitum, uires impleant, tertiamq; concoctionem perficiant. Sed de his hæc quoq; sufficiant.

30 Proinde si te calculorum passio repente inuasit: si cibum nuper assumpseris, & in corpore fluctuationem præsentifcas: totum te uomito, siue id naturaliter facias, siue arte adiutus, utroq;que

modo uisum tuo medico fuerit: postea somno te committes. Cumq; alia qua in alio indurata extrema hære suspicatur fueris, clystere hæc nisi quid prohibeat uacuentur. Quod si dolor intolerabiliter affligit, in aquam calidam te dimitte. Verumtamen ne ipsa sicut paulo ante ostendimus, ab utare: nam calida persusio dolorem mitigat quidem, sed uires etiam resoluit, quæ morbi causam & quicquid in corpore inutile est discutit. Post uomitus & enemata, fomentis & emplastris laborantem particulam delinias: atq; id ex medicamentis quæ naturæ egrotantis conueniant. At si lapis defixus in rene subsisteret, acetum saccharum, acetum scilliticum, & quæ lapidem simpliciter conterunt, assumere oportet, sicut est decoctum radicis graminis, damasonij, adianti, polytrichi, & similia. Quæ si inefficaces uideantur, ijs quæ lapidē frangunt uti poteris, quales sunt regalium asparagorum radices, bdellium ex Arabia aduectum, semen altheæ, milium solis, betonica, saxifragia, pullegium, capparisi Aegyptiæ radix, cucumerum satiuorum semina, & quæ istorum uiribus sunt propinquæ. Quod si aliquo pacto ne hæc quidem proficiant, utendum putarim medicamentis quæ lapidem potenter frangendi uirtutem habeant. Potenter uero diuidit lapidem, lapis iudaicus (& si calculum in renibus fixum est masculo: sin in uesica hæreat, & ob magnitudinem excerni haud possit, foemineo lapide utaris. Nam masculus, lapidem qui in renibus est frangit; foemineus, qui in uesica) utrum combustum, lapis Cappadox, & pascui semen. Hæc sunt quæ calculum uiolenter frangunt. Si uero crassus succus in corpore subest, & urinarum crassarum euacuatione sit opus: crassam urinam agunt cardui radix, rubia & similia. Quod si frequentes urinas ducere opus fuerit, frequentes urinas ducent acorus, pastinaca, asarum, ammi, et similia. Quod si natura in deponenda urina pigra fuerit, ipsam excitabunt scordium, chamædaphne, bryoniæ cauliculi, & quæ uiribus sunt ad hanc rem paribus. Quæ uero mouendæ urinæ naturam habent, ea periculosius lapidem pellunt: temperatiora namq; sunt acri, & ob id calida & sicca, insuperq; naturæ colligentis & segregantis collectam serositatem. Sed quæ ignitas constitutiones in se non habent, rumpendo lapidi sunt magis idoneæ, quia incidunt opportune, & minimam caliditatem obtinent. Caliditas autem excadō porum colligit, non incidit. Quapropter quæ minus calida cum hoc quod incidendi facultatem habent, sunt meliora. Quæ uero urinam mouent, calida sunt & sicca, atq; acria, quamobrem secernunt quidem serosum sanguinem: sed quicquid in se crassius ille habet, id cogunt & compingunt. Propterea ijs qui calculorū morbo sunt affecti, apponi non debent: Hæc tamen si ueluti ductoribus & uectoribus ad

locum affectum, uel quandoq; fuerimus, produrunt. Caterum post lapidis excretionem medicamentis utendum est opportunis ad reficiendum & colligendum, quæ morfu, asperitate & seruore descendens calculus exulcerauit. præsertim, si magnus atque angulosus is fuit. Postea ubi corpus ex colligentium medicamentorum beneficio, sanis collectum agnoueris, tum & foris & intus præseruatia admovebis. Sed ne in hoc rei summam esse putemus. Imò quantisper ad prouidentiam hanc opera datur, tantisper conferentibus tam cibis quam potibus, & quæ concoquere ualeas utaris. Ex nutrimentis enim & potibus quæ naturæ conueniunt, balneisq;, & exercitijs atque similibus, uirtutes singulariter corroborantur: sicut inuicem ex illorum contrarijs debilitantur & deiciuntur. Hinc est quod propter uirium erectionem & uigorem, usus similia maxime desideretur. Viribus enim roboratis & confirmatis, tantum momentum ad morbi generationem habere nihil potest, quin ab ijs ilico profigetur. Quod adeo uerum est, ut nihil subesse in uniuerso corpore inutile eadem patiantur.

31 Hæc sunt pauca quæ non equidem in istam hac de re institutionem, sed breuem submōtionem sedulo tuus minister tibi offero. Quod ad perfectam de his omnibus traditionē attinet, id nobis uetustissimi sapientie professores diligenter prosecuti exhibuerunt. Quod restat, medicus qui tibi à latere est, & curam tui perpetuo gerit, meus conseruus & hæc & ueterum scripta & tuæ naturæ conuenientia me magis & alijs omnibus, quantum homini permissum est, prospexit ex ijs quæ edoctus iam est, & ex naturæ tux exprompta cognitione perspiciet. Ei te ergo solum committas, nam ita te ille (quod dijs testibus affirmare ausim) sedulo curat, ut quisquam alius curare omnino possit. Quandoquidem is cui natura hominis alicuius perspecta sic est, ut quid secundum naturam in ea sit exploratum habeat: expeditius alijs omnibus cognoscat, quid præter naturam eidem acciderit. At quamquam animus erat disceptationem de paucis quibuscumque in medium afferre, id tamen reseruandum in aliud tempus uideatur, nam in præsentia locum habere non possunt. Cuiusmodi est, quinam hoc affectu liberari possint, qui liberari non possint: & an lapis hic causa sit, an morbus, an morbi symptoma. Et, si est causa, præincipiens ne sit, an antecedens, an coniuncta: Idq; similiarum, an instrumentorum, an utrorumq;. Iam si morbus est, an similis sit, an instrumentalis, an communis. Si symptoma actione sit læsa, an excernatur quod retinendum erat, uel retineatur quod excernendum. An affectus sit quidam, an utrumque illi acciderit, ut & causa sit, & morbus, & symptoma.

CL. GALENI IN LIBRUM HIPPOCRATIS DE VITAE

CTVS RATIONE IN MORBIS ACUTIS,
Commentarius primus.

Ioanne Vasseo Meldenſi interprete.



Ignidias appellatas sententias cōscripserūt, hi sanē quæ ægri in morbis singulis patiuntur, & quonam modo non nulla his eueniāt, recte scripserunt: atq;

ea quoq; quæ medicinæ imperitus quispiā scribere potuisset, si ab ægro unoquoque qualia patitur probè intellexisset. Verum quæ medicum non referente ægro ipso perdiscere oportet, multa ex his sunt prætermissa, alia in alijs.

Non solū nihil eorū quæ ægri patiūtur prætermiserunt qui gnidias scripserūt sententias; verū & quæ ultra id quod iussū est, de quibusdā mentionem fecerunt, ut paulo post ostendā. Neq; id artis opus est, si nihil prætermiserint eorū quæ à plebe ipsa cognosci possunt. Non etenim isti artificii est scopus, sed quæ ad curationē idonea sunt omnia scribere. Quapropter sæpius nonnulla adijcere quæ vulgus nō nouit, erit opus; et multa quæ huic nota sunt auferre, si nihil ad finem artis conferre uideantur.

2 Et quædam ad coniecturalem cognitionem (τεκμαρσιον dicunt) peropportuna.

Τεκμαρσιον est quæ per τεκμήριον fit cognitio. τεκμήριον autē appellant ueteres syllogisticum signū, non autem simpliciter signum omne, ut in opere De coniectura & signo est demonstratum. Quæ igitur medicis ad huiusmodi cognitionē tum necessaria tum utilia existunt, non omnia autē gnidijs insententijs scripta esse, sed prætermissa pleraq;

3 Cum autem ad coniecturalem cognitionem dicatur quonā modo curare singula oporteat, in his multa aliter q̃ illi enarrauerunt, sentio.

Ex quo multa quæ ad coniecturalem cognitionē expedita & idonea existunt, à gnidijs medicis prætermissa esse dixit, quam nam dicat coniecturalem cognitionē, ipse consequenter docuit. Quonam modo curare singula oporteat inquis. Nempe quod ad horū inuentionē utile fuerit, id ex arte est. Sed forsan quis opinabitur prætermissas esse quæ tum ad dignotionē, tum ad prænotionē conferūt coniecturas. Verū res non ita habet, cū de necessitate in his quæ ad curationē idonea sunt, hæ contineantur. Si enim ad optimā curationis inuentionem nihil cōferrent morborū dignotio & futuro-

rum prænotio, prorsus hæ superuacaret. Nunc autē quod conferant, ob id cōmoda existunt. Ergo q̃ affectuū dignotio ad curationē ualde necessaria sit, recensere nō est opus. Nam in primis quis nam sit morbus dignoscere oportet, deinde curationē ipsius ita aggredi. Quod uero prænotio ad curationē quoq; cōmoda sit, demonstrauit in præfatione prognostici Hippocrates. Qui ergo omnia quæ ad medicinā spectant, cōmoda ea uel ad dignotio-

nem uel curationē uel prænotionē esse dixerit, uirtute idem dicit. Curatio siquidem per se à medicis exercetur. Prænotio autē & dignotio propter curationē. Quo fit ut nemo finem artis dignotionē uel prænotionem sicuti curationem asseuerauerit. Intellige autē in præsentiarū curationē, sublationem morbi, non eam quidē quæ adhuc fit, sed quæ iam facta sit. Sed de omnibus abunde est scriptū in eo libro qui De fine medicinæ agit. Nec expedit, ut in præsentiarum quippiam præposere & præter institutū faciamus, utpote qui iam ueteris mētem uel sine exquisito finis examine cognouerimus. Verum cum & modo alio dictio præsens pleriq; in exemplaribus, fide etiā dignis scripta sit, de ea mentionē facere non inuestigari fuit. Differt autem ab ante scripta dictione syllaba una uidelicet uel, ut ad hunc modum sit. Cum autem ad con-

iecturalem cognitionē dicatur, uel quonam modo curare singula oporteat. Qui ita scribunt, per τεκμαρσιον dignotionem & prænotionē intelligūt. & per uerba hæc, quonam modo curare singula oporteat, curationē, nolentes eam in τεκμαρσιον nomine cōtineri. Quod si ita habet, in ante scripta dictione qua dicitur, Multa prætermissa sunt, alia in alijs, & nonnulla ad coniecturalem cognitionem peropportuna, non recte sanatoriā artis partē prætermisisse uidetur Hippocrates. Sed quod hi respondeant ob id resumptam scriptamq; quæ sequitur dictionem, ut quod sanatorium est adijceret, nemo est qui ignoret. Verum quonā de re ad curationem congrua disceptatio non sit, ob eas res sermonē protrahere est superfluum. Pergamus igit ad ea quibus quæ ad sanationē utilia sunt, doce-

4. Atq; nō ob id solū nō laudo: uerum q̃ & paucis numero sint usi medicamentis. Nēpe maximus medicamentorū quibus in morbis non acutis usi reperiuntur, est tempestiue exhibitorū tum elaterij, tum feri, tum laetis. quæ si bona essent, morbisq; quib. dari censerent, cōgruerent, multo sanē digniora laude erant, q̃ paucissima satis facerent. Sed res impræsentiarum non ita habet.

Paucis quoque numero auxilijs usos eos ait, nisi in acutis morbis. quasi in his multa dixerint. quod sanefecerunt. Quæ uero longis in morbis dixerint, hæc uere sunt. Nam & per tempestiuam elaterij, feri & lactis potionem perficiuntur.

5 Qui uero secundum adornauerunt liberum, hi medice magis quæ singulis exhibenda sunt, percurrerunt.

Liber secundus à primo scriptus adornatus digestusque dicitur, cum institutum habens idem, plurimas dictionum easdem, nonnulla quidem eorum que in priore erant, abstracta habet, alia aut adiecta, & alia permutata. Exemplum rei huius si perspicuitatem desideras, secundum Eupolidis Autolyeum ex priore adornatum digestumque habes. Sic & gnidas sententias à primis secundas Gnidi ediderunt medicis. quæ nonnulla quidem habenter eadem omnia, alia uero adiecta, & alia sublata, ueluti & alia permutata. Secundum igitur hunc librum, Hippocrates priore medicinalem magis esse asserit.

6 Sed de diæta, id est uictus ratione, nihil quod effatu dignum sit conscripserunt ueteres, quanquam id magnum esset.

Is curationis ductus cõtextusque qui per consuetam materiam efficitur, diæta, id est uictus ratio nuncupatur: ut qui per consuetas tum sectiones tum adustiones & quæcumque alia manu fiunt, chirurgia. Tertiam ab his medicinæ partem Pharmaceuticam dicunt, quæ scilicet per medicamenta ab soluitur perficiturque. Accusat autem priscos Hippocrates quod de uictus ratione nihil effatu dignum conscripserint: idque dixit, non quod nullum quod ad uictus rationem spectaret theorema conscripserint, sed quod non effatu dignum. Quale nam aut sit effatu dignum, docebit in sequentibus.

7 Fuerunt uero qui uarios morborum singulorum modos, diuersasque horum sectiones diuisionesque non ignorauerint.

Non solum uarios morborum modos non ignorauerunt, uerum quoque & ultra quam decet de his scripserunt, ut ostendam in sequentibus.

8 Verum morborum singulorum numeros clare pronunciare uolentes non recte scripserunt, quippe cum non facile numerari queant, si quis languentium morbos alterum ab altero quadatenus differre, nullumque morbum eundem uideri, quin idem quoque nomen habeat, coniectauerit: Mihi uero placet omni in arte animum tum conuertere tum adpellere. Nam quæ probe uel recte procedunt officia, probe & recte singula peragere oportet. Quæ item celeritatem desiderant, celeriter adimplere: & quæ synceritatem, syncere: & quæ sine dolore administrari postulant, citra dolorem omnem administrare. Cætera quoque huiusmodi omnia secus quam alij ad me

liorem formam nos redigere conuenit. Maxime autem medicum laudauero qui in morbis acutis, ui quorum plurimi hominum necantur, secus quam cæteri in melius procedat. Sunt hi igitur acuti morbi quos prisci nominatim perstrinxerunt, pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, caufus, & quicumque alij hos consequuntur morbi, quorum febres prorsus continuæ interficiunt.

Dixi paulo ante Gnidos medicos cõfessum ab initio de morbis plures oportet scripsisse. Scripserunt siquidem bilis morbos septem. Pari modo & paulo infra uesicæ duodecim: Renum quoque quatuor: Stranguriæ quatuor: Deinde tetanos tres: Morbi præterea regij genera quatuor: Atque tandem phthises tres. Nempe ad corporum uarietates, quæ multas ob causas permutabatur, respexerunt, morborum identitatem haudquaquam contemplantur. quomodo est cõtemplatus Hippocrates ad horum inuentione methodo usus, qua duntaxat morborum numerum inuenire conceditur. Methodum autem eam in Methodi medendi principio demonstrauimus, diximusque aliquid in lib. De elementis secundum Hippocratis mentem. Habes quoque & à nobis cõpendio quodam scriptum unum De morborum differentijs cõmentarium: sed hoc in loco dictiones prosequi est opus. Nempe is expositionis scopus existit. Nam si quis inter exponendum demonstrationes scripserit, sermonem protrahet, & præcipuam quæ sanationis morborum causa existit, dimittit. partem inquam quæ ad maxime letalium morborum curationem excellit præstatque. Summa quidem presentis dictionis hæc est, particularia uero dictionis deinceps explicabo.

9 Cum enim nullus cõmunis pestiferi morbi modus passim grassatus fuerit, sed morbi & *σποάδες*, id est sparsim priuatimqueprehendentes, & similes fuerint: ab his plures quam ab alijs omnibus intereunt.

Ostendit hac oratione Hippocrates morbos multos uno fieri tempore, quos si perniciosi fuerint, pestem appellant. Si uero mitiores, altera quadam indicant appellatione, epidemos uel epidemios nominantes, ut epidemus morbus sit qui tempore anni aliquo in regione aliqua abunde insolecat. Pestis uero, epidemia perniciofa. Est autem & aliud morbi genus commune multis, quod in regione superuenit acceditque, endemumque uel endemium appellatur, quasi patrium dixeris aut uernaculum. His autem omnibus aduersant *σποάδες*, id est qui sparsim priuatimqueprehendunt, agros discrepante fatigantes, neque secundum cõmunem modum constantes. Sed quidnam est quod ab Hippocrate dicitur: Sed morbi, & *σποάδες*, & similes fuerint. Nempe contrarium dicendum fuit. Et non similes eos inter se esse: si utique aliquid morborum similitudine & endemium & epidemum, & pestiferum iudicari debuit. Duorum igitur alte

sum, uel meliorem hanc scriptiōem existimare oportet. Sed morbi & *αρωγὰς*, & non similes fuerint: uel similes eos dicere oportuit non inter se, sed morbis ante dictis, id est consuetis: quoniam rarius quidem tum epidemij, tum pestiferi fiunt: uocati uero sporadici frequēter. De quibus et hoc in loco agitur, ueluti de epidemijs in libro Epidemiorum morborum, & de endemijs in libro De aquis, aere, & locis. Nullum autem peculiarem de peste confecit librum, quoniam ex epidemijs unum esse illam per libros Epidemiorum demonstrauit.

10 Idiotæ uero non admodum cognoscūt eos qui in huiusmodi prae alijs praestant.

Idiotas aut non omnino cognoscere medicos eos qui, prae alijs praestant. Quod autem acutos dicat palam est de quibus ante sermonem fecit.

11 Aliāq; auxilia magis laudāt, uituperātq; Neq; conuenientes, neq; laudabiles curationes dignoscere ait idiotas, sed alias magis. Quo fit ut eas neq; recte laudent, neq; uituperent. Deinceps tanquam eorum quae dixit demonstrationē adiiciens haec scribit.

12 Magnum autem rei argumentū quod uulgus morbos huiusmodi sanationēq; utpote rude planē ignoret, uelut quos studio consequi oportet, est hoc. nempe qui medicici non sunt, medici esse ob huiuscemodi morbos uidentur. facile siquidē nomina disciuntur quae apud aegros usui esse existimata sunt. Si enim quispiam ptisanā cremorē, uinūq; hoc uel illud, & melicratū nomina uerit, referre omnia eadē medici tū boni tū mali plebejs huiusmodi uidentur. Sed res ipsa secus habet. Nempe hi quantū ad hanc attinet supra modum inter se differunt.

Quod materijs huiusmodi eorū quae ad uictus rationē spectant, medici utantur tū boni tū mali, ob id quis nam melior sit, dignoscere nequeunt idiotae: utpote qui discernere non possint quinam tēpestiue & debito modo praesidiōrū materias aegris administrent. & quinā citra hęc Hippocrates ait ubi impresentiarū secundū praesiniuit procedit, a cōsequētibus in oratione praesenti exordit.

13 Digna autē scribi mihi maxime uidentur, quae quantūq; medicis utilia existant: tamen ignorantur. quae inquam insignes profectus & insignes offensas adferunt. Quae autem ignorantur, haec sunt. Cur in acutis morbis medici quidam ptisanas nō colatas perpetuo exhibeant, & recte curare sese existiment. alij omnino contendant, hordeum ut nullum aeger uoret, subsecuturam inde quae insignis sit offensam ueriti: sed cremorem linteo colatū porrigant. Alij uero neq; crassam ptisanam, neq; cremorem exhibe-

ant, atq; ex his quidam quoad aeger ad septimam usq; peruenierit diem, alij perpetuo donec morbus iudicatus fuerit.

Logicam magis speculationem sapere uidetur, quod ab Hippocrate in quaestione disceptationemq; ponitur: cum & sine huiusmodi speculationibus recte sanare queamus. Nempe morbos recte sanare inest medicis ex faciendorum cognitio ne, & non ex causae inuestigatione, ob quam sunt controuersi qui uarias in huiusmodi morbis scripserunt curationes. Est uero secundum ueritatem id non cōmodissimum modo, uerum quoq; & omnium primum, atq; questu necessarium, ut procedente exponam sermone. quod enim quaestione dignū sit, quod proponit, & quo soluat modo ante percurrere est melius. Quod igitur quaestione dignum sit, hinc discas. Nam de philosophorū cōtrouersia nullam habemus quae euident sit coniecturam. Neq; enim si genitus mundus sit, neq; si interitus conscius, neq; si extra ipsum inane non sit, neq; si infinitus, neq; si is solus unus sit, neq; si plures, neq; quot numero si plures, neq; horū multitudo incomprehensibilis sit, aut infinita, manifeste coniectari potest. Ad hunc sanē modum & de alijs multis quae in philosophia quaeruntur, nonnulla quidē iudicare prorsus nequiuimus, alia uero non sine magna contemplatione. Verum de ipsis quae aegros iuuant, non similiter est. Nempe et si ad ipsa inuenienda longo opus sit tempore, utiq; a multis discrepante, quae tamē sese reperisse quidam iactant, ea facilem habere iudicationē uidebuntur. Nempe si aegris quidem adhibita praesidium attulerint, laudare oportet atq; agnoscere: si uero detrimēto fuerint, uitare atq; repellere. Quae uero nihil auxilij uel offensae effatu dignum praestiterint, in neutrius horum ratione censere cōuenit. Sed sanē medicos ab euidenter offendentibus abhorre oportet. Si ergo parum exuperantibus insistant qui quouis modo ab initio sunt opinati, nihil mirum uideri debet. In his uero quae admodum recesserunt, atq; usq; adeo ut à quibusdā laudentur, ab alijs culpentur, admirari quispiam eos poterit, qui ualde offendentia extollunt, uel eos qui uere iuuantia uituperāt. Id sanē est quod Hippocrates particulari uno exemplo proponit. Discit autem & id nec secus ipsius solutio ab Erasistrato in primo libro De febribus, paucisq; & euidenter, utpote qui Hippocratem planē est secutus. Percurrens etenim in libro praefato medicos tum eos qui aduersissimum febrientibus uitū praescribunt, tum eos qui longis inedijs aegros ipsos conficiunt, atq; Petronā ipsum qui tum carnes tum uinū exhibebat: In textura sermonis hoc insert pactor: In multis igitur ualde magnis plagis incidebant: si autem febrientes omnes ex tali curationis modo male liberabantur, qui ita curabāt, à curatione desistebant. Sed ut uidetur non febribus omnibus opē fert idē sanationis modus. Laudandi igitur cū Erasistratus, tum alij qui quaestionem hanc proposuerunt, et solutionē eius scripserunt

rūt: laudandus quoq; & qui præ cæteris eam proposuit. Sciueris præterea & eam nō magis de acutis morbis q̄ de alijs omnibus proponi soluiq̄. Nē per responsio de omnibus cōmunis est. Non enim in acutorū modo, uerū quoq; & morborum aliorū curatione cōtrouerſi fuerunt medici, atq; ob id longo tempore sua in cibi exhibendi regula permanent, q̄ nonnullos ab ea euidenter iuari uidēt. In cæteris autē qui nihil indē auxilij recipiunt, forsatis quidem & ægros occulte aliquid deliquisse suspicantur, quanq̄ id nō sit, sed quod reſulit Hippocrates in libro De fracturis: ubi agēs de his qui fracturas cum uulneribus perperam ligāt, atq; ob id lādunt, ait: Non enim deligationē causam esse existimant, sed aliud quoddam infortunū. Hoc & eos in uictus ratione opinari uerisimile est. Quod autē præſenti in oratione recensuit Hippocrates, id palam est, ubi quis eam fecit cogitans bis & ter legerit. Nempe ex particulari exēplo cōmunem doceri sermonē comperiet, quem & uniuersalem uocare consueuerunt, non Philosophi modo, uerum quoq; & propē omnes Logica artis non imperiti. Erasistratus ergo aduersissimari meminit uictus rationum. Hippocrates uero relictis monstrosiſ alienisq; ad moderatiores se contulit. Monstrosæ etenim alienæq; uere sunt, tum quæ per inediā fiunt summam, tum quæ per repletionē immoderatam, quæ utebatur Petronas. Moderate uero quarū meminit Hippocrates in acutis morbis, ab insignibus exhibentur medicis. Quidam enim hordeacea pīſanā in his administrant, alij cremorem duntaxat, alij ne hunc quidem in acutis morbis ante iudicationē, sed tempore interiacente solos exhibent potus, aq̄ melicratumq; & si opus sit oxymeli. Controuerſie igitur causa est quā Hippocrates ipse in ſequentibus exequetur, & quam ab Erasistrato in primo De febribus bene enuntiaſi afferebat. Est autē ea q̄ aliqui ſolo pīſanæ cremore indigent, alij hordeacea pīſana, & alij horū neutro, sed potibus ſolis ad iudicationem uſq; feliciter ſeruantur. Demonſtrabit autem in ſequentibus quinam hordeacea indigent pīſana, & qui pīſanæ cremore, & qui neutro horum.

14. Sanē quæſtiones huiusmodi proponere medici non consueuerunt: neq; forſan ſi proponantur, ſoluuntur.

Quod primus Hippocrates quæſtionem hanc propoſuerit, ſolueritq; ex hac notū euadit dictione. Neq; enim, inquit, tales quæſtiones proponi a medicis consueuerunt. Quod ſi & eas quis forſiſ propoſuerit, ſolutio non reperietur.

15. Calumniam uero uſq; adeo grauē patitur apud uulgum ars tota, ut nullo pacto medicina eſſe uideatur.

Hac quoq; in oratione ex particulari exēplo rem quandam uniuersalem docet. Nempe in primis quod qualemuncq; tractantium exercitationem cōtrouerſia, iuſtam ignorantiaſ ſuſpicionem offendit. Secundo quod concordia ipſa, merito

magnam cognitionis ſpem demonſtrat, quod nimirum mathematicis diſciplinis ualde conſulit. Neq; enim diſcipulos ſolum allicium, credulosq; reddunt, uerum quoq; & apud idiotas ſeſe uerisimas exiſtimandas præſtant. Mathematicis igitur demonſtrationibus uſos ait, qui euidenter quippiam & citra quamuiſ ambiguitatem demonſtrauerunt. Sed controuerſiaſ rationem diligenter in ſequenti oratione proſequitur.

16. Quapropter acutiſſimis in morbis uſque adeo diſſentiunt inter ſe artiſices, ut quæ alter porrigit optima eſſe exiſtimans, ea alter mala eſſe putet: atq; ſere ob id uaticinationi (quam græce *μαντική* uocant) ars ipſa ſimilis eſſe uideatur. augures ſiquidem alitem eandem ſi ad ſiniſtrā uolauerit, bonā fauſtamq; eſſe putant; ſi ad dextrā, malā infauſtamq;. Talia quoq; in aruſpicina (quā *ἱεροσκοπία* dicūt) uidentur, alia in alijs: ſed uaticinantium nonnulli contraria ſentiunt. Dico autem ſpeculationem hanc eſſe & pulcherrimam & cognatam plurimis & cōmodiſſimis quæ in arte comperiuntur.

Vaticinationem appellauit Hippocrates augurium: & aruſpicinam, uictimariā a pleriq; appellatā, quam uere antiqui alij *ἱεροσκοπία* uocat, quod *ἱεῖα*, id eſt hoſtias inſpicientes qui in ea ſcientia graues & præſtantes ſunt, ex ipſis uentura prænunciant. *ἱεῖα* autem ſciūſ appellari omnia quæ dijs ad honorem exhibemus, quales ſunt que ſitantur uictimæ, quarum exta inſpicientes *ἱεροσκοποι*, id eſt aruſpices prædicunt. Eos uero qui ex auium uolatu augurantur, quos *διωνιδῆς* & *διωνοσκόπους*, id eſt auſpices appellāt, nūc *μάντις*, id eſt augures appellauit Hippocrates, quanq̄ *μάντις* nomen & *μαντικῆς* de omnibus quæ ita prædicūt artibus proferatur. Nempe *μάντις* uocantur, & *ἱεροσκοποι*, & *διωνιδῆς* & qui appellātur *γνηθιακοί*, & qui per notas & qui ex uictimis futura prædicunt. Præterea & *χρησμολόγοι*, id eſt fatidici, & *διομάντις*, id eſt diuini uates. Sunt qui et *νευροπόλοι*, id eſt ſomniorum interpretes a poeta appellatos inter *μάντις*, id eſt uaticinantes collocant. Sed cōſtat Hippocratem ſolos *διωνιδῆς* appellare *μάντις* ſui poeta appellauit. Nam in ſiſ pleriq; ſui operis poetici partibus *διωνικὴν* artem uenturorum prænotionem eſſe demonſtrat. Quomodo & in primo Iliados circa initia ait, *ἀλλ' ἄγε δὴ πᾶσα μάντις ἐρέομεν ἢ ἱεῖα, ἢ καὶ νευροπόλους, καὶ γὰρ τ' ὄναρ ἐκ δίος δῖν*. id eſt, Conſulamus itaq; augurem quempiam, aut aruſpicem, aut ſomniorum interpretē. Nempe & ab Ioue oſtenduntur inſomnia. *ἱεῖα* quidem dicens, *ἱεροσκοποι*, *νευροπόλοι* uero qui circa ſomnia uerſatur. *μάντις* autem *διωνιδῆς*, id eſt augurē auſpicēq;. Sapius etenim in ſuo opere poetico huius meminit in maximis rebus, diuinandi etiam arte per alites uſus. Sed forſan hæc & q̄ decet plura de huius nominis *μάντις* appellatione di-

etia nobis sunt, atq; ob id ad quod dicitur transi-
re iam est tempestiuum. Quod enim ait Hippocra-
tes, tale est: Qui diuinatorias artes profectantur
in particularibus multis nihil minus q̃ medici di-
scordant. Vidi equidem aliquando augures in vo-
latis ipsis quos dextros & sinistros memorauit
Hippocrates, discordantes. Alter Arabs erat, alter
Græcus, atq; ex Asia nostra. Arabs dicebat dextrā
alite, laborantes mulieres seruare; sinistram uiros.
Qui uero ex Asia nostra erat, dextrā alite in uiro-
rum morbis apparentem, interrogantibus ipsis si
seruaretur, affructe interrogationē recensebat, si-
nistram uero denegare. Interrogabā præterea eos
an quomodocunq; uolantē uel dextrā uel sinistram
alitem pollere eadem significandi facultate dice-
rent, nihilq; differre putarent, si aut celsissima aut
terre propinquissima, aut media uolaret. Et si me-
dia, an si propius uel celsissimam, uel infimam, uel
adhuc inter has mediam. Pari modo. & si auis uel
propinqua uel longinqua uolaret, an ne in his nul-
la foret distinctio. Arabs eas nihil ea quæ uel in al-
titudinem uel longitudinē uel latitudinē esset di-
stantia discrepare respondebat. Græcus uero de
symmetrio distinguebat, dextro & sinistro, asse-
rebatq; ab auguribus hæc scripta esse, atq; immoder-
atas distātiā moderatis cōtrarias esse, testesq; in
eam rem libros Appolletis, Athenæi, Chæremo-
nis, Artemidori Phocæ, atq; aliorū multorū qui in
augurandi arte clari essent, proferebat. Deprehen-
dit atq; procubdubio Arabem & confusum & di-
stinguendi arte alienum: Græcū uero distincte lo-
qui, & artificē esse. Nempe artis quæ suorū theore-
matum iudicium per experimēta habet, dissiden-
tia ex distincta & indistincta rerum explicatione
oritur. Quod ab Hippocrate edoctus græcum au-
gurem in auis uolatu artificiosum magis iudica-
ui: quippe qui & ex abundantia q̃ celebratissimos
augurum testes exhiberet, fide dignus magis erat.
Cum uero Arabs plurimos ægotantium quibus
uera prædixerat, testes citaret, succedentis ut plu-
rimū euenti subsecuti causam pronunciaui. Nemp-
pe si auis dextra moderate distans uiros seruat, im-
moderate uero distans fœminas: sint autem plures
quæ immoderate distent, una uero duntaxat quæ
moderate, iure quidem multis succedet ex animi
sententia, paucis uero non succedet. Græcus autē
alias adijciebat distinctiones, quibus etsi dextra
auis immoderate distaret, interdum tamen seruauit
uirum laborantem declararet. Nempe cinæ-
dura, & qui molle et muliebre studiū exerceret,
ueluti & sacrificulū mulieris schemate seruari di-
cebat, rursumq; id ab optimis scriptum esse au-
guribus demonstrabat. Adde quod & alias quas-
dam adijciebat distinctiones, in quibus Arabs ni-
hil intelligere uidebatur. Retuli hæc propter se-
quentem dictionem quam nemo conuenienter
exposuit, sicuti neq; eam quæ antefcripta est, ubi
ait: Quæstiones sanē huiusmodi proponere non
consequeruntur medici, neq; forsā si proponantur.
solui reperiuntur. Nam cum clare inquit græce
vnde, latine huiusmodi, id est quæ ita dissident,

A quidam de prisana sola perperam intellexerunt:
alii autem paulo his melius de uictu acutorum,
alii de omni simpliciter uictu, alii uero de curatio-
ne uniuersa prioribus quidē melius, sed neq; ad-
huc absolute. Causam enim totius dissidij quæsi-
uit Hippocrates in omni arte quæ experimentis
iudicari possit. Quod autem id ita habeat, manife-
ste persequentem condiscas orationem.

17 Nempe & agris omnibus ad sanitatē
magnum quippiam potest, sanisq; ad secu-
ritatem, seseq; exercitantibus ad bonum ha-
bitum, atq; ad quod quilibet uoluerit.

Sermo præsens eos arguit qui Hippocratē exi-
stimant præscripā dictionē de prisana sola propo-
uisse: eosq; qui de uictus ratione siue acutorum
morbōrū, siue simpliciter uniuersa factum id pu-
tant. Pari modo & eos qui de curatione uniuersa
problema esse existimauerunt. Nempe prior ora-
tio quæ ita habet: Nempe & agris omnibus ad san-
itatē magnū quippiam potest, eos arguit qui de
prisana, atq; alios qui de sola uel acutorū uel mor-
bōrū aliorū uictus ratione antecedentē orationē
esse opinātur. Neq; enim agrī omnes à sola uictus
ratione curantur: cum multi sint, qui manuū ope-
ra & medicamentorū administratione indigent.
Adhuc uero magis neq; à prisana sola. Neq; igitur
de diætā sola acutorum, neq; de diætā simpliciter
quæ est in omnibus morbis &c. sermo Hippocra-
ti existit, neq; de sola ea quæ ex his oritur contro-
uersia: sed de omni simpliciter arte quæ experimē-
tis tum discerni, tum iudicari nata sit. Qui etenim
cōmunē uniuersalemq; iudicandī notā reperit, ex
ea quæ particularia sunt iudicat. Particulare autē
unum est & quod de prisana medicis in cōtrouer-
siā uenit: sicuti & quod de uictus ratione non acu-
torum modo, uerū quoq; & morborū aliorū: atq;
etiam quod generalius est de curatione uniuersa:
& qd adhuc hoc generalius uniuersaliusq; est de
omni corporis prouidentia, & si sanorū ea fuerit.
Nempe & hi ea indigent arte, non quæ ad conse-
quendam sanitatē præcepta tradat, sed ad præsen-
tem conservandam. Quod non prætermisit Hip-
pocrates cum inquit: Sanisq; ad securitatē. Nemp-
pe ut talis seruetur, securitate est opus. Vtile quo-
que ait esse speculationem & his qui exercitantur
ad habitum bonum. ut enim ægorum curatio ea
quæ nunc ab Hippocrate proposita est speculatione
indiget: sic & sanorum securitas, ut præsens sa-
nitas conseruetur. Sic & sese exercitantium prou-
identia ut bonū habitū cōsequantur. Hæc igitur om-
nia artis quæ circa corpus uersatur sunt. Sed qd
serie continuata dicitur, ad omnem extenditur ar-
tem. Quid nā etenim est quod ait: Et ad quod qui-
libet uoluerit: Nēpe augur, aruspex, musicus, rhe-
tor, & artifex omnis simpliciter causam eius quæ
in sua arte reperitur, cōtrouerfiā nā esse sciet: cū
scilicet unusquisq; particulare ad uniuersale trans-
fert. Ita sanē & in auguribus factā cōtrouerfiā de-
prehendit, eūq; qui ueriora loqueret iudicauit, atq;
ob id augurum memini Arabis & Græci. Nempe
artis

artis omnis constitutio ex propriorum à cōmuni-
bus distinctione oritur. Qui enim hac distingue-
re potest, is optimus censetur artifex. Vt autē con-
stitutio, sic & iudicatio in distinctione substantiam
habet. Nempe falluntur qui artes cōstituunt, cum
quod cuiuspiam contigit, id uel in omnes uel in plu-
res quā oportet extendunt. Quod siquidē nulli
priorum contigit, nemo id in tali arte persuadebit
sibi uerum esse. Nam in hoc uere oritur controuer-
sia, cum unusquisq; rem sibi persuadet, non circa
illud quod assumitur confingiturq; cōtentiose li-
tigans: quomodo nonnulli de quibusdam secus
quā sentiebant, fecerunt. quomodo & qui pro-
ponunt ambiguum esse utrum uigilamus dormi-
musq; aut sapimus insanimusq;. Quod si manife-
stum esse id indulgeatur, utri sanē magis uera lo-
quuntur, anceps iniquum esse, an qui uigilant his
qui dormiunt, uel quā infantes qui non insa-
niūt. Nullus siquidem qui sibi rem persuaserit, aut
qui secum opinatus fuerit, ita sermones facit: sed
qui contentiose litigat, secusq; quā sentiat facit.
Quidam autem in arte medicinali res nouas qui-
dem sunt aggressi, & cum rebus prioribus melius
quippiam inuenire nequiverūt, ex uulgi affectio-
ne quam Hippocrates recensuit, agrotarūt. Nem-
pe quod externū inusitatumq; est, & nondum an
utile est intellectum, laudant magis quam affuetū
quod utile esse est cognitum. Sunt qui ob uictus
suauissimi promissionem persuadentes aegros al-
liciunt, dolī uasriciāq; non ignari: sed id propter
lucri gloriāq; cupiditatem, aggrediuntur. Excepta
ergo ea quę uerbis sit controuersia, quam etiā
uirī huiusmodi inter se habent, quę secundum rei
ueritatem est controuersia oritur, quod enuncia-
tio non distinguatur, sed de pluribus quā opor-
tet, uel omnibus tanq; similiter habentibus effera-
tur. Atq; ob id iuste laudādus uenit Hippocrates,
qui de sola secundum rei ueritatem meminit con-
trouersia: quam qui artē constitutere aliquam uol-
unt patiuntur, cum secū suāq; in anima differēter
opinant, & nō uerbis subdole simulatis id agunt
ob gloriā uel lucri cupiditatem. Nullus enim qui
animi consilia uere per experimenta iudicat, Pe-
trona uictus rationē recipiēter, carnes alias admini-
strans uinumq; nigrum in his qui acuta laborant
febre, neq; in tanta siti ita temperans ut cotulā a-
quā uigilamam porrigat partem. Talia siquidem
diatēmata absurda sunt: duorumq; alterū existit.
Nempe aut quod externa inusitataq; sunt, uasris
ab hominibus exercitantur paranturq; aut sum-
mam propter temeritatē id agunt, si planē soli ue-
ritatē reperisse existimauerint. Quę uero ab Hip-
pocrate scripta sunt, ea in prudētibus uirīs qui ue-
re artē constitutere student reperiri possunt: cum
non maxima sit læsio, quando quibus non opor-
tet offeruntur. Talia igitur distinctu difficilem ha-
bent eam quę experimentis conficitur iudicatio-
nem: quę autem ualde differunt, facilem. Contro-
uersiam igitur in his quę parū inter se exuperant,
iudicare & quibus nam pīfana sola exhibenda in
acutis morbis sit, & quibus hordeacea, & quibus

A nullo pacto id faciendum sit, sed potius solus ad iu-
dicationē usq; porrigendus sit, demonstrare Hip-
pocratis diligentia est dignum.

18 Pīfana igitur frumentaceis gustamētis
recte præferri mihi uidetur in acutis mor-
bis, eosq; qui eam prætulerūt, laudo. Nem-
pe uiscositas eius leuis, continua, iucunda,
lubrica, & mediocriter humens, sitim mini-
me infert: et si quid ablui eget, probe abluit.
Nō adstringit, nō male turbat, neq; in uena-
tre tumescit. Nempe inter coquendū quo-
ad maxime potuit intumuit.

B Orationem hanc tantummodo legisse mihi ui-
detur qui librū hunc De pīfana inscripserunt: ue-
luti proēmij partē primā qui aduersus Gnidias
sententias titulum fecerunt. Nam Hippocrates in
secunda proēmij parte nō amplius Gnidios me-
dicos contra agere: sed sese ad curationis acutorū
morborum exercitationem conuertere uidetur
Tertia autē proēmij pars quā hucusq; percurrit,
ad eam quę uictū morbis acutis præscribit, artem
spectat. Neq; tamē ad eam solā est accōmoda, ue-
rum quoq; & alteri qui uniuersalior sit, subiecta
est sermō. Demonstrauimus autē in his quos in-
scripta De fracturis articulisq; parauimus cōmen-
tarijs, Hippocrate subiectos specialesq; sermones
pro alijs quibusdam uniuersalioribus obsignare
consequisse, doctrinamq; uniuersaliū ex ipsis quę
tanq; exempla cōstitui efficiere. Neq; enim ita
instituto recedit, neq; sæpius præcipit quod mul-
torum cōmune existit. Quo autē modo in pīfana
sermonem fecit, causam eius quę de ipsa est con-
tentionis tum uestigians tum decernens, sic & de
omni acutorum morborum uictū rectam tulit sen-
tentiam. Quinetiam & de uenæ sectione & purga-
tione, & tum glandis tū clysteris usu: de cataplas-
matis itē, fotibus, uino, aqua multa, oxymelite &
balneo, nōn parua inter medicos exorta est cōtro-
uersia. Quę omnia librō in hoc percurrit Hippocra-
tes methodo una quā nuper dixi, uim cuius neq;
ignorasse uisi sunt, qui se Empiricos nominaue-
runt, diorsimis, id est distinctionibus propria à cō-
munibus separantes. Consequenter autem dia-
D las magis quā diorsimos appellare sermones
eos, qui quod propriū est, à cōmuni separant di-
stinguuntq;. Iam ergo quę ab Hippocrate de pī-
fana dicuntur, uideamus. Videntur ergo mihi (in-
quit) priores medicis frumētaceis gustamētis præ-
tulisse in acutis morbis pīfanā. Frumentacea gu-
stamenta intelligit quę ex frumento fiunt: frumē-
tum autē græce *σῖτος* homines appellant, maxime
quidem triticum, sed iam etiā ordeum ac zeam
illis attribunt. Appellationem uero ad plura ex-
tendentes, cerealīa quoq; appellata semina cōnū-
merant, lentem uidelicet, fabam, lupinum, cicer-
culam, panicum, milium, pisum, scænum græcum,
auenam, tīpham, cicera, & quęcūq; id genus a-
lia. Horū igitur omnium frumentaceorum gusta-
mentorū, cetera quidem etiā uulgo damnantur,
quod

quod protinus magnum inferant detrimentū. Pa-
 nis autem solus & chondrus in acutis administran-
 tur morbis, & ad hæc sola, pitfana cōparari potest.
 Lens siquidem, & milium, & fœnum græcū tanq̃
 medicamenta ob quosdam ventris morbos exhi-
 bentur, & non tanq̃ nutritura cibaria. Pitfana igitur
 recte prælatā esse ait frumentaceis edulijs, pa-
 ni scilicet, chondro, & zea, ex qua fit tragus appel-
 latus. Nam eorū qui chondrum temporibus Hip-
 pocratis nondū fuisse existimant, ignorantiam ar-
 gues tum ex quibusdā antiquis comicis qui chon-
 dri meminere, tum etiā ex Hippocrate ipso qui
 in libro De victu salubri de chondro ipso mentio-
 nem fecit. Nam etsi liber ille Hippocratis non sit,
 sed uel Euriphontis, uel Phaontis, uel Philistionis,
 uel Aristonis, uel alterius cuiuspiam ex antiquis
 (nempe ad multos librū hunc referunt) sanē om-
 nes huiusmodi uiri sunt, atq̃ ex eis quidam & Hip-
 pocrate antiquiores existunt, alijs uero tempore ip-
 sius uiuerunt. Loquor autē de Hippocrate Hera-
 clidæ filio, qui librum hunc confecit. Nam auus ip-
 sius Gnosidici filius Hippocrates, quorundam iur-
 dicio nihil omnino scripsit, aliorum uero sententiā
 duos scripsit. De mēbris fractis & articulis. Quare
 autē pitfana frumentaceis edulijs non perperam
 anteposita sit, ostenditur per ea quę ipse inferi in-
 quiens: Quęcūq̃ etenim ad acutorū morborum
 sanationē insunt bona, nulli alteri inesse cōperies.
 Recte autem iudicabis, si & acutorū morborū na-
 turam & pitfanæ uires cognoueris. Natura igitur
 acutorū morborum est, uti ipse paulo ante dixit,
 ut horum febres omnino sint continuę. febris ue-
 ro ortus caloris natiui ad igneum est conuersio, ut
 alibi demōstrauit, & nunc manifestabit inquiens.
 Ex thorace siquidem incipit, atq̃ ad caput flam-
 mam mittit. Præterea in libris Vulgarium morbo-
 rū, febrē magnā ignē uocare consueuit: quasi non
 aliam habeat naturam præter quā ignis substan-
 tiam. Si igitur contraria contrarijs remedia exis-
 tant, sanē febris peculiare remedium ut uirtute
 tum refrigerante tum humectante sit, oportet. Id
 namq̃ febris naturæ quæ & calida & sicca est, con-
 trarium erit. Talis siquidem naturæ est ignis. Præ-
 terea cum febres & ex humorum putredine orian-
 tur, non paruam diligentiam adhibere oportet ut
 quicquid ex ipsis concoqui possit, concoquatur:
 & quod iam exustum sit, neq̃ amplius concoqui
 possit, euacuetur. Quod si febrientibus ipsis cibi
 usus sit, qui hæc efficere queat, si etiam facile tum
 coquitur, tum distribuitur, iam omnia hæc quibus
 est opus habuerit. Quænam igitur sit pitfanæ uir-
 tus, ex Hippocrate audiamus: Viscositas, inquit,
 læuis est. Læue, exasperanti opponitur. Exasperat
 autem acria, acida, & astringentia: Acria sanē om-
 nia calfaciunt, ut eruum, fœnum græcum. Acido-
 rum cætera quidem dimittantur: de oxymelte ue-
 ro est duntaxat cogitandum. Dimittantur pari mo-
 do ex astringentibus pira agrestia, & mespila, &
 quæcūq̃ huiusmodi, atq̃ ex frumentaceis lens &
 similia. Exasperantium igitur malitiam pitfana ef-
 fugit, utpote quæ læuorem non tactu solum uerū

quoq̃ & facultate habeat. Est item & uiscositas e-
 ius cōtinua. Est siquidem in omni parte sibi ipsi si-
 milis propter exactam coniunctionem. quod zēg
 nullo inest pacto. Laudatur præterea non parum
 quod in pitfana iucundū & mite existit, quod im-
 miti iniucundūq̃ opponitur, id est quod dum su-
 mitur, insuauitā quandam facit. Sicut deniq̃ &
 panis insuauis est, dum sumitur, nisi abūdē ipsum
 maceraueris madefecerisq̃. Imō & ita superatur
 ab ea quæ in pitfana est iucunditate, quæ mandī
 non indiget, sed potuū instar sorberi possit. Neq̃
 parua est prærogatiua pitfanæ lubricitatis, præser-
 tim cremoris. Pertransit enim thoracem in nulla
 ipsius parte quippiam dum transit, relinquens, ue-
 luti faciunt quæ in meatibus infarcta adeo obstru-
 ant, ut uix absolui possint. Quod accidit uiscosis
 omnibus excepta pitfana. Hinc sanē quæ ex chon-
 dro fit sorbitio, quod quidem uiscosum sit, habet:
 sed lubrico est destituta. Pitfanæ autem inest & lu-
 bricum & detergens: quapropter medici ad deter-
 gendum eum qui in uentre infarctus est, humorē,
 uomitibus exhibitō pitfanæ cremore ueluti & a-
 qua mulla, utuntur. Crudam quoq̃ conterunt pit-
 fanam puerorum mangones, faciesq̃ ut uisiosos
 cutis exterant colores, illinunt. Quod autem in ea
 deterforium existit, id & ad deiectionem est ido-
 neum, distributionemq̃, præsertim ubi ex sima he-
 patis ad gibbam transmeare debeat quæ distribui
 tur alimonia. Hic etenim infarciuntur quæ crassi
 succi sunt, & quæ tenaciter glutinis modo adhae-
 rent. Atq̃ ob id chondrus non in affectis iocinore
 solum maxime nocet: uerū quoq̃ & in his qui uis-
 cosus hoc nullo quidē pacto læsum, sed cum mea-
 rum angustia naturaliter afformatū habent. Qui
 igitur ita natura affecti sunt, ipsis tum uiscosa tum
 crassi succi omnia infarciuntur, atq̃ opplent, atq̃
 ob id grauitatem in eo uiscere sentiunt, cum hæc
 distribuantur. Præterea pitfanę uiscositas humens
 est: sed non uehementer, ut aqua & melicratū, sor-
 bitio itē ex chondro, & ea quæ sorbent oia. Nem-
 pe ea omnia stomachū languentibus ipsis ita ma-
 nifeste supinant, ut subuersum ipsum esse existi-
 mēt. Verū Pitfana humectare quidē ualet: sed sto-
 machū subuere nō potest. Stomachū autē hoc
 in loco intelligere oportet ut huiusce tēporis ho-
 mines dicere consueuerunt, non mearum uentri-
 culi tantummodo, uerū quoq̃ & os ipsius. Quod
 si imbecillū fuerit, atq̃ exolutū, manet diutius in
 eo quod indigestum est supernatans. Sed contra-
 rium usu euenire natū est, ubi à cibo aliquo boni
 succi reductū, quod cōtineat expellit. Nempe hu-
 mor protinus cum ipso recedit, & coquitur, atq̃
 quod ita expulsum est deicitur. Nec secus q̃ cru-
 dum manet, tardeq̃ cedit quod in ore uentris su-
 pernatat. Nepe partis huius munus est appetere,
 non concoquere. Quæ igitur astringunt edulia, ut
 uentriculi os roborant, sic & plus iusto exiccant.
 Pari modo & quæ ex chōdro parat sorbitio, ut hu-
 mectat, ita & supinare nata est. Pitfana igitur hu-
 ctantiū uim assecuta, malitiā effugit. Deinceps pit-
 fanā sitim minime inferre ait Hippocrates, maxi-
 mum

mum quippiam & hoc esse in his qui corpus tum
 exurūt tum siccant morbis testatus. Hac sanē oc-
 casione ptisana quā aqua mulla lōge melior exi-
 stit, quanq̃ abluendi bonitatem quam deinceps
 huic inesse ait, similiter aquae mullae naeta fuerit,
 imō si ptisanam aquae mullae comparaueris, ptisa-
 nam ipsam in acutis morbis & superiorem & me-
 lioris conditionis esse reperies, quod procedente
 ostendam sermone. Nam de ptisana sermonē ab-
 soluere est tempestiuum. Probe siquidem abluere
 dixit cū adiectione: Si quid abluī egeat, quasi non
 in omnibus acutis morbis probe abluētē utamur
 edulio. Nempe cetera omnia quae de ptisana di-
 cuntur bona morbis omnino profunt acutis: sed
 abluendi bonitas quibus uentrem subducī uolu-
 mus, ubi cibus in uia morā, est idonea. Probe igitur
 abluere febrili affectioni neq̃ tanq̃ contrariū,
 neq̃ tanq̃ familiare auxilium unum utile existit:
 sed bene tanq̃ symptomatis alicuius emendato-
 rium correctoriūq̃. Deinceps inquit: Neq̃ astrin-
 git, neq̃ male turbat, uiscositas scilicet ptisanae: sic
 enim sermonem de ea inchoauit. Non astringere
 autem quibusdam maxime bonum existit. Nemo
 siquidem astringentibus utitur cibis, nisi uel propter
 symptoma, quod animi deliquiū inducat, uel
 propter immoderatū uentris profluium. Cogūt
 siquidem constringuntq̃ corpora, uiasq̃ tum di-
 stributionis, tum alimoniae, tum eius quae foras sit
 perspirationis conuēire faciunt, quas reclusas a-
 pertasq̃ esse conducit. Quod autem non turbet,
 id est, nullam dum cōcoquitur faciat perturbatio-
 nem, in laude & ipsum praestat ptisana. Perturba-
 tio autem huiusmodi ex multis paritur edulij: his
 quidem uentrem mordentibus, alijs uero inflanti-
 bus, alijs item quae pugnātibus facultate partibus
 cōstant: quod tum in lenticula tum in brasiāsa re-
 peritur. Nempe solidum ipsarū corpus uentrē co-
 hībet, ius autem ipsum proritat, subducitq̃. Sic &
 qui cerebrum cum oleo & garo condiunt totum
 ex ipsis tum dissimulare, tum libij ipsi pugnās effi-
 ciunt: cerebrum quidē stabili & tarde meante, mistis
 uero ipsi ad deiectionē excitare idoneis. Pari mo-
 do & de ouo dicendum, siue cum melle siue cum
 sale, siue cum garo adsumatur. Nempe quod ex ip-
 sis constat, differentes habet facultates. Iura item
 ferē omnia. Quapropter & circa sermonis initia
 uiscositatem ptisanae laudans inquit, continua, q̃
 sanē citra totius in partibus omnibus similitudinē
 non fit. Verū impraesentia huic uerbo turbat, ad-
 iecit hoc aduerbium male (sic Graece *κακῶς*)
 ptisanam non turbare haudquaq̃ simpliciter
 asserens, sed male adiiciens. Nihil enim ciborū
 concoctioni quā hoc ipsum aduersatur magis.
 Quo fit ut qui De concoctione scripserunt, cibo-
 rum uarietatem praesertimq̃ ubi uarijs consistit fa-
 cultatibus nocētissimam dixerint, utpote quae in-
 gesta ipsa probe concoqui prohiberet. Obseruant
 id maxime tum exercitiorum magistri, gymnastae
 appellati, tum qui legitime athleticam exercent.
 Prandio siquidem panem duntaxat edunt, in coe-
 na uero carnē. Plura de his enuntiarem nisi scirem

A te inuenire ipsa posse, qui ex his quae de cōcoctio-
 ne in cōmentarijs De facultatibus naturalibus di-
 cuntur sis instructus. Cōmentarios autem huius-
 modi si neglexeris, frustra in his uersaris. Quapro-
 pter de perturbatione huiusmodi super sedens, ad
 omnium ultimum me transferam, quod ab Hip-
 pocrate de ptisana adhuc loquente dicitur. Neq̃
 in uentre tumescit. Nempe multos ptisanā quod
 flatuosa esset damnantes haudquaq̃ ignorans nō
 abs re adiecit. Nam inter coquendum quoad ma-
 xime potuit, intumuit. Quae sanē adiectione cri-
 men, controuersiamq̃, simul & purgationem sig-
 nificauit, concoctionēq̃ edocuit. Scribit quendam
 & nihilominus de coctione insequentibus, sed in
 praesentia tantillum hoc sermoni de ptisana adij-
 ciam. Ptisanam si ualde coxeris, cibū haudquaq̃
 flatuosum efficies. Pulmentum autem ex faba fre-
 sa, neq̃ si tribus coxeris diebus flatu uiduum orba-
 tumq̃ reddideris. Nempe ex propria substantia
 quod flatuosum est habet, non autem ob dimi-
 nutam cocturam ueluti ptisana. Sunt qui ab ipsis co-
 ctione ocyus recedere consueuerunt, potissimūq̃
 diuinitum coqui. Terūt siquidem crudam eam, atq̃
 deinde parum calfaciunt. Non enim coctam do-
 minis offerūt. Sed de coctione ptisanae ut dixi rur-
 sum diceretur. Nunc autē posteaq̃ uires ipsius de-
 monstrauit, deinceps usus distinctiones docuit,
 ad quem & ego me conferam, ubi me in sequenti-
 bus absoluturum sermonem de ptisana ad aquam
 mullam & alia, comparatione praeuenero.

C 19 Qui igitur in huiusmodi morbis ptisa-
 na utetur, ne uno quidem die uasa ut ita di-
 cā inaniri permittat, sed ab usu eius nequa-
 quam desistat, nisi uel propter medicamen-
 tum uel clysterem, eum desistere opus sit.

Soluere incipit quod quaeritur. Sed quoniam di-
 ctionem ipsam non exacte interpretatus sit, ob id
 obscurum ambiguumq̃ reddidit sermonē. Qua-
 propter quoniam maxime expositus modo nihil
 obscuritatis habeat, referre conabor, sermonemq̃
 ab initio hoc repetam pacto. Quenam esse causa di-
 scordiae cur in acutis morbis alij quidem ptisana
 hordeacea utantur, alij solo ptisanae cremore, alij
 ne hoc quidem ad morbi usq̃ iudicationem: hoc
 sanē est problema. Sed solutionem deinceps audi.
 Qui acutis laborant morbis, alij quidem à cremore
 solo, alij à ptisana ipsa, alij ab horū neutro iuuantur.
 Sed sanē immodestius de omnibus morbo a-
 cuto laborantibus tulit medicorū unusquisq̃ sen-
 tentiam, non considerata ea quae in omnibus esse
 debuit experientia. Sed distinguam ego, demon-
 straboq̃ quinam à ptisana iuuantur, quinam à cre-
 more solo, & quinam neutro indigeant. Tota igitur
 ptisana uti debēt ex acuto morbo laborantes,
 qui neq̃ alio quopiam ante indigent remedio, quae
 le uel per se factam uenam, uel uentris subductionē
 uel quippiam simile fieri solet, neq̃ etiam eis inest
 quod periculum minetur symptoma. Cremore au-
 tem, qui aliquid tum fallacius, tum periculi magis
 particeps habent. Quos uero uel sanguinis mis-
 sione

sione, uel purgatione uacuare expedit, uel etiā do-
lores sedare; his non ante uel ptisanam uel cremo-
rem dabis quā uis quippiam eorum quae dixi fece-
ris. Sanē hęc Hippocratis pręscripsisse oportuit;
& ab unoquoq; singularium rursus incepisse; atq;
hoc pacto futurum sermonē obscuritate omni ui-
dum priuatumq; fecisse. Verū quoniam id non fe-
cit, non absq; causa obscurum abiecto conuenien-
te ordine est effectus. Nos autē dictiones ipsius se-
cuti, reducamus unamquāq; ad ea quę ante di-
cta sunt capita, atq; in primis diligentia adhibita
pręsentem exponamus dictionē. Quare me latius
explicentem Hippocratis dictionē, simulq; & uer-
ba aliqua gratia perspicuitatis adijcientē audito.
Qui igitur ægotantes ptisana in his morbis utun-
tur (dicam autem paulo post quānam ea uti debe-
ant) hi quidem nulla die uasa inaniri (ut ita dicā)
permittāt, nisi desistere debeāt uel propter medi-
camentū uel propter clysterē. His ergo si bis dede-
ris, cum opus habuerint, bene facies, atq; tanta co-
pia, quantā corporis tolerat uirtus. Explicabo autē
tibi scopos quibus attentus uel per uentrē, uel per
uenas ipsos euacuabis, aut foribus cataplasmatīs
ue uteris. Hęc si prędixisset, deinde singula seria-
tim resumens cōuenienti exposuisset ordinem: non
obscurus fuisset sermo ipsius. Nunc autē quod in-
temperit, interlabiturq; semper, ad finē usq; perfe-
qui cupiens, ubi sermonē non parum suspensum
esse uoluit, iure obscurum fecit. Vera autē me lo-
qui deprehendes, si dictiones singulas omnes cla-
ras manifestasq; inuenieris: orationem uero totam
incompositam & ob id obscuram.

20 Proinde qui bis die cibare cōsueuerūt,
bis ptisanam dare oportet, qui semel, semel
quidē primo die detur, dein *ἐν προαγωγῇ*
id est, sensim paulatimq; si fieri potest, bis
quoq; detur si opus habere uisum fuerit.

Bis cibandos ipsos inquit qui bis cibari consue-
uerunt, atq; si adiuvandi necessitas fuerit, etiā si
semel tantum cibari consueuerunt, ptisanam bis
dabis, ab ipso quidē semel incipiens, sed paulatim
ad bis ipsum procedens, nempe *ἐν προαγωγῇ*, id
est sensim, id declarat. Fitq; res hoc pacto. Semel
quidem dabis, quod satis sit: sed minimū sit quod
secundo exhibeas. Deinde paulatim augebis, idq;
efficies donec ambas æquari alimonias cōtingat.
Sed nondū sermonis huius fides huic patet qui li-
brum hunc Hippocratis legit, quod neq; ab ipso
est præmonstratum quānam sint qui cōmode pti-
sana utantur. Verum ubi mediocriter ægotantes
ab ipso ita cibari prędixero, paulo post & Hippo-
cratē ipsum uelle id demonstrabo. Atq; hęc tibi sit
præsentis huius dictionis expositio. Sunt autē ple-
riq; qui dictionem hoc scribant pacto: Qui semel
cibari cōsueuerūt, semel quidē prima die dandum
sensim paulatimq; qd si fieri potest, bis quoq; de-
tur si opus habere uisum fuerit. Sed mēte caret di-
ctio hęc. Nā, q prima de die sensim paulatimq;
fieri non potest, cum sensim ipsum pluribus inge-
stioib; fieri natū sit: nō semel neq; statim in prima.

Galen.

21 Verum inter initia neq; multam, neq;
crassam admodum dare oportet: sed quan-
tum & ob consuetudinem, & ne multa ua-
forum inanitio fiat, ingerere conuenit.

Qui Hippocratem replere ægotantes asserūt
quod his qui citra periculum agunt, bis quotidie
ptisanam dare iubeat, si quod in dictione retulit,
consideraret, seipsos condemnarent. Tantum si-
quidem sorbitionis dari pręcipit, quantum alimo-
nię corpori & ob consuetudinem & ut non mul-
ta fiat uacuatio, administrari conuenit. Si igitur
ptisanę oxybaphum, id est cotulę quartam par-
tem quę quotidie ad septimam usq; uel nonam
diem exhibetur, minoris esse facultatis quā id
quo alunt nutrimentum faterentur, mea sententia
a nugis sese cohibuissent. Sed paulo post id decla-
rabo, atq; in præsentia uerbum hoc inter initia,
quod Gręci dicunt *κατ' ἀρχῆς*, exponam. Neq; e-
nim morbi principium id significat. Sed ex eo ge-
neralius audi significarum. Nempe cum ægotans
primū ptisana egere uidebitur, tūc protinus neq;
multam, neq; admodum crassam dato. A multa si-
quidem & subita tum repletionem tum uacuationem
abstinuit Hippocrates.

22 Verum dandę sorbitionis quantitas
hoc obseruabitur pacto. Nempe si morbus
siccior q; ut quispiam existimet fuerit, non
multū dare oportet: sed ante sorbitionē, uel
mulsam uel uinum utrum magis auxiliatu-
rum putaueris, propinare conuenit, quod
autē modis singulis iuuare possit, dicitur.

Morbus siccior uariis dignoscitur modis, quan-
quam uniuersalem cōmunemq; rationem habeat
eandem. Peripneumonia quidem & pleuritis atq;
omnino qui tum pulmonem, tum asperam arteri-
am infestant morbi, cum nihil ab affectis expuitur
partibus: iocinoris uero morbi, uel mēsarai, uel
uentris, uel ieiuni, uel intestinorum, uel lienis, ubi
alius prorsus cohibita sit, aut pro necessitate ex-
cernat tum dura tum aridiora, & in sese cōuoluta
caprarumq; stercorea referentia excrementa. Mor-
bi tum arteriarum tum uenarum dignoscuntur lin-
guę siccitate, & ea quę totum corpus occupat ari-
ditate. Phlegmonę pari modo fiunt durę in his
quę tum foris tum conspiciue apparent ulceribus,
ubi scilicet nulla ex ipsis sanies effluit. Sapius &
in oculis phlegmonę etiam durę oriuntur nihil
excernentes. Cerebri pręterea ægritudines, quę
neq; per nares neq; per palatum expurgātur, iure
optimo sicca dicuntur. Et sanē superfluitatū nihil
excernere, siccōrū omnium morborū notam esse
non ignoras. Non immerito igitur Hippocrates
humectantium aliquid ante ptisanam adsumi iu-
bet, ut uel aquam mulsam uel uinum, tanquā hęc
quā aqua magis humectent. Sed quoniam uires
ipsum sese enarraturum pollicetur, ob id & nos
eorū quę ad aquam est comparationē, in eam dis-
feremus libri partem, quę horum uires edocet.

23 At si os madescat, & quæ à pulmone expuuntur, talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem, ut dicam summam, augere conuenit. Nepe quæ citius magisq; madescent, iudicationis denunciant celeritatem. Quæ uero tardius minusq; tardiorum significant iudicationem.

A morborum siccorum genere ad eos qui contrario pugnanti modo conuersus, deinde memoria citra omnium adiectionem uno, narrationem suam cōmune omnium eiusdem generis exemplū ratus, merito obscuritatem fecit. Nempe os madesce, & talia à pulmone expui qualia oportet, morbi non simpliciter sunt humidū notā, quæ omnino in omni sit corporis parte; sed cum cuiuspiam eorum quæ respirationi subseruiunt, instrumento rum affectione. Ob eam rem, ut dixi, dictio Hippocratis obscurior est reddita. Sed quod ab eo enunciatur uerū omnino est; scilicet quæ per spūta ueluti oportet excreta expurgātur, celeriter iudicantur. Contraria uero duorum alterum subeunt. Nempe aut in perniciem, aut in longum finiuntur tempus. Ergo qui probe expurgantur, his ptisana dare oportet, uirum corroborandū gratia, quo expuitionibus humorum ex pulmone per tussim sientibus sufficiant. Nam qualia esse oportet, sunt ea quæ coctionis notas habent, de quibus absolute diximus tum in his quos De crisiibus, tum in illis quos De tēporibus morborū fecimus cōmentarijs; præterea & in expositione aphorismi illius ubi Hippocrates quonam oportet modo ex apparentibus prænotiones facere ostendens, sermonis exemplum pleuritidem scripsit hoc pacto. Veluti in pleuriticis si spūtu inter initia, ptinus appareat, morbū breuiat; si uero postea appareat, producit.

24 Et hæc quidem per se talia parte plurima existūt. Sed multa quoq; alia per oppor tuna quæ coniectanda sunt, prætermittuntur, quæ postea dicuntur.

Dixi & ego sermoni huic deesse nō pauca quæ ad distincte definitæq; loquendū cōmoda existūt, de quibus & ipse agere pollicetur. Sed in præsentia de his solum uult intelligere quæ dicta sunt. Ea siquidem per se talia sunt qualia ipse percurrit.

25 Et quāto maior fuerit expurgatio, tantō magis ad iudicationem usq; dare oportet; sed maxime duos ab iudicatione dies, quibus utiq; uel quinto, uel septimo, uel nono fieri debeat morbi iudicatio. Nā & diuturnum tum paritas tum imparitas perpendenda sunt. Post hoc autem mane sorbitionem dabis, sero autem ad cibaria tete conferes.

Κρίσις, id est iudicationē, nunc dixit uel perfectā morbi solutionem, uel permutationem eam quæ usque adeo insignis sit, ut æger periculū omne euaferit. Duos autē ab iudicatione iubet adnotari dies, ut & eos qui diebus tum paribus tum imparibus

fiant accessionum circuitus obseruemus. Contingit siquidem interdum ut tanquam soluto exacte morbo ægri confidant, cibentur deinde negligentius, & eius quæ per circuitum repetat accessiones occasionem præbeant. Tutum igitur est etiam si morbus iudicatus fuerit, ad duos usq; dies diligentem uictus rationem quæ æger usus fuit, seruare. Præteritis autem ab iudicatione diebus duobus, iam securum est plenius cibare, sic ut neq; mutationē eam quæ uniuerſim subitoq; fit, efficiamus, sed mane quidem sorbitionem demus, postea uero progrediente die iam & frumentacea exhibeamus alimenta. Cōstat igitur Hippocrati languentibus ipsis neq; aliud quippiā ante præfinitū tempus nuper dictū dare, neq; panem, sed ptisana omnino contentū esse. Quod ægrum satiantis replentisq; non est, sed potius, si quis uitio uertere uoluerit, tenuius quā oportet cibantis. Verū ita cibare neq; tenuius iusto est, neq; plenius quā oportet; sed exuperantiā exacte est medium, & maxime laudabile. Quod autē ita cibare sit medium, argumento est eorum qui contraria uitio uertunt, contentio. Quo ē numero Theſſalus eiusq; sequaces, tanq; ægros replentem accusant Hippocrate, Erasistratus uero tanq; fame necantem. Nam quæ ab Erasistrato in primo de febris. aduersus Apollonium Dexippumq; Hippocratis discipulos dicuntur, calumniam habent eius quiper famem sit cruciatus, qui ad Hippocratem magistrum refertur. Sed sanē Erasistrato ignoscendum magis, utpote qui uerisimilia dicat: ceteros uero qui Hippocratem ægros replere aiunt, uiros Theſſalo dignos esse existimandū; qui neq; aliud quippiam scriptorum Hippocratis, neq; quæ de uictus ratione proferuntur, nouerunt.

26 Talia autem parte plurima profunt ijs qui protinus tota utuntur ptisana.

Siue totam, siue hordeaceam, siue ptisanā simpliciter dixerit: unum & idem ex tribus his significatur uocabulis, ptisanā unoquoq; non colatā significante. Nempe si à decoctione quis ipsam colauerit, deinde cremorem separauerit, dederitq; is neq; tota, neq; hordeacea, neq; simpliciter dicta uti ptisana dicitur, sed solo ptisanæ cremore. Rursus autē in præsentia memorabo quinam sint, qui ptisana tota ab initio uti debeāt, breuiusq; erit memoratio, nisi segniter desidioſeq; quæ predicta sūt audiueris. Si ergo quæ expuuntur utilia fuerint, ægerq; neq; medicamēto neq; clysteri egere uideatur, ptisana hunc cibare iubet. Sed & consilij rationem ipse adiecit, inquit.

27 Dolores siquidem pleuriticorū confirmati sponte desinunt ubi aliquid effatu dignum tum expui, tum expurgari cœperit. & purgationes longe perfectiores existūt, minusq; purulenti ita fiunt quā si quis aliter cibaret. Præterea iudicationes simplices facilioresq; & minus reuersoriæ.

Probe autem hæc omnia à ptisana fiunt, tum q

humectet, mediocriterq; incidat quę expui debēt A
humida, tum demum quod uirtute roboret. Con-
currentibus siquidem utriusq; ocus expurgantur,
qui respirationis instrumenta infestant humores,
quos quidem & humectare & secare potest ptisa-
næ modo aqua mulsæ: sed uirtuti robur non addit:
contraria autē pollent facultate & panis & chon-
drus. Nempe uirtutem quidem roborat: sed neq;
humectant, neq; secant. Quod neq; alteri cuiuspiam
inest eorum quæ medici languentibus dare con-
sueverunt, uerbi gratia, ouis, gallorum testiculis,
alis, piscibus, iuuenibus columbis, & quæcumq; id
genus sunt. Quare qui lenticulam ex aceto conse-
ctam pleuritico in ea morbi declinatione quæ ni-
hil aliud quam coctorum expuitionē desideraret,
exhibuit, is nō immerito languenti ipsi qui sequen-
ti nocte suffocatus est, mortis occasionem dedisse B
est uisus: imō lenticulam nemo qui mentis copos
fuerit, dederit. Quod si æger aquam mulsam ptisa-
namq; fastidierit, pisces facitiles sunt maxime ido-
nei, ex aqua scilicet & porro & anetho & sale ac
moderato oleo parati: atq; ex nō saxatilibus asel-
li. Sed antea oxymeli propinare oportet: neq; em
id stomacho aduersatur, nisi affectus in languente
neruis, & in muliere, utero. Quod si oxymelitis lo-
co medicamentum aliud dare uoueris, dabis eam
quæ ex marrubio & iride fit, confectionem. Nem-
pe hæc si per se cum mulsâ bibatur, maturat probe
quæ tum in thorace, tum in pulmone sunt super-
flua, atq; ad expuitiones præparat.

28 Ptisanā autē ex optimo confectionem esse
hordeo oportet, atq; q̄ probissimè coctā,
& maxime si non solo uti debeas cremore.

Probatissimū hordeum prius quam experiaris,
ex eo solo quod & plenum sit, & nihil rugosum in
se habeat, iudicabitur. Sed experientia iudicatum
per decoctionem deprehenditur, ubi scilicet plu-
rimum intumuerit, & succum fecerit plurimum,
quod stabile ratūq; facultatis ipsius est argumen-
tum. Nempe quod ab alendi bonitate sumitur, id
scientificum non est, neq; perpetuo uerū, quan-
tū plurimū insigne egregiūq;. Ptisanam autē per-
petuo optimā esse iubet: sed maxime si non solo
uti cremore uelimus, uerū & ipsa tota. Quare autē
id præcipiat, manifeste declarauit cum inquit,

29 Nā præter reliquas ptisanæ facultates
lubricitas eius ne hordeū cū deuoratur no-
xā inferat, efficit: neq; em adhæret, neq; in
recto thoracis manet tramite, & ip̄ eū uocat.

Hippocrate & ip̄ ut plurimū quidem *διθωέλαια*,
id est rectum tramite. Interdum autem & *φοσάριον*, id
est delationē dicere non ignoramus. Quod autē
ptisanę haustū per thoracē tum rectū iter, tum de-
lationē ad uentrē usq; per stomachū fiat, liquidū con-
stat omnibus: uultq; Hippocrates in ea re nihil ip̄-
si adhærere. Nempe cum multa in thoracis pulmo-
nisq; affectionibus existit caliditas, quod adhæret
arefcitq; atq; adeo pertinaciter obstruit, ut uix ab-
solui possit, id anxietatem quandam & sitim facit.

Galen.

30 Lubricissima autem est, sitim maxime
arceat, facillime cōcoquitur, & infirmissima
existit si optime cocta fuerit, quibus omni-
bus est opus.

Ptisanā probe coctā non lubricissimam modo,
maximeq; ab inferenda siti alienā, & facilis domi-
ture esse astruxit, sed tandem infirmissimā esse ad-
iecit. Quod maxime lubrica sit, si probe cocta fue-
rit, iam antea est enunciātū. Sed q̄ ab inferēda siti
maxime aliena sit, hic propter hordei naturā con-
tinuo adiicitur. Est autē hordeum temperamento
frigidū. Verū quonā pacto substantiā ipsam tum
frigidam, tum calidam iudicare oporteat, inter an-
mantia quidem in libris De temperamentis dixi-
mus: inter ea uero quæ anima carent, in his quos
De simplicium medicamentorū uiribus fecimus
cōmentarijs. Imō & facillimā ait esse cōcoctionis
ptisanam huiusmodi, ut pote quę dissoluta sit, neq;
quippiam habeat quod & durum sit, & difficul-
ter perfici possit, atq; haudquaq; flatuosam iam pro-
pter longā cocturā effectā esse. Quantum uero
spectat ad id quod in digestionis fine dixit ptisanam
huiusmodi infirmissimam asserens: si nihil de pro-
bissimā ipsius cōcoctione antea egisset, promptū
esset sermonē Hippocratis ad eam quæ in uentre
fit domituram referendum affirmare: quasi infir-
missimā dixisset quæ in uentre & facile uincatur,
& perficiatur, & permutetur. Sed quoniam id prædi-
xit, infirmitatē illā intelligere oportet: q̄ uel pau-
cā prestat corpori alimoniam, uel nullā habeat qua-
litate quæ usque adeo uehemens sit, ut uel nervos
uel mentem feriat, quomodo acetum uinumq;.

31 Nisi igitur quis quantum deest contu-
lerit ut ptisanæ sorbitio sufficere paretur,
crebrius sanē detrimentum afferet.

Docere incipit quæ paulo ante se dictū pro-
misit cum dixit, multa quoq; alia per opportuna
quæ coniectanda sunt prætermittuntur, quæ pos-
tea dicentur. Quod autem uerbum *πιμυρσαι*, id
est conferre tum apud antiquos, tum apud
Hippocratem ipsum sepius pro *βορυσσαι*, id est au-
xilium dictum sit, demonstratū est & in alijs libris
per eas quas in ipsos confecimus enarrationes.

32 Quibus enim cibus statim inclusus, si
quis non uacuato eo sorbitionē dederit, do-
lorē si adest adaugebit: si nō adest, protinus
inducet, frequentiorq; reddetur spiritus,
quod malum est. Nempe pulmōē exiccat,
fatigatq; tum hypochondrium, tum uentrē
imū, tum septum transversum.

Cibū dixit quod ab edulij in intestinis ipsis cō-
tinetur excrementū, quod Græci & *σύνβαλον* &
κόπρον appellat. Si igitur incluso eo, id est ex mul-
to tempore haudquaquam electo, ptisanam quis
propinauerit, lateri offensam fieri est necesse pro-
pter intestinorum opilationem, quam ex collecto
in ipsis stercore, flatuq; propter oblatā ptisanam
haudquaq; pertransiente, & demum ob prauam

tom. 6

C 2

quæ

quæ ad affectam partem sit distributionem nata sunt. Quo fit ut exhausta pitana, necessario dolorem si adsit, adaugeat: & si conqueuerit, reducat. Nempe vapores, flatuosiq; spiritus, et scybalorum exhalationes cum ad latus perueniunt, dolorem ipsi pariunt, adaugentq; ob eas causas & frequentior fiet respiratio. Vocauit autem totam respirationem spiritum & in Prognostico, & in libris Populariter uagantium morborum. Densata autem frequensq; reddita respiratio, respiratorijs in organis assiduam ob motum caliditate efficit maiorem, quæ siccantur tum pulmo, tum septum transuersum: siccanturq; una & calsiunt eæ quæ tum in hypochondrio, tum in peritoneo existunt, animalis partes. Omnes siquidem in respirationibus unâ cum thorace mouentur. Quod autem principio dictionis dicitur. Quibus enim cibus statim inclusus est, Vocem hanc, statim, ordine habet cõmutato, quæ si suam peculiaremq; acceperit concinnitatẽ cõpositionemq; dictio ita habebit. Nisi præfatio pitana cæa sorbitionis modo suppetias tulerimus, frequentius oriatur læsio. statim siquidẽ quibus cibus inclusus est, nisi quis prius uacuato eo sorbitionem ita dederit, maximam afferet offensam.

33 Præterea si lateris dolor assiduus est, calidisq; fomentis non remittitur, sputumq; nõ procedit, sed *καταλιχραίνοντο* *ασπείως*, id est summe citra coctibilitatem glutinosum sit, nisi quis dolorem uel alui subductione, uel secta uena pro utriusuis exigentia soluerit, pitanam autem ita affectis dederit, præcipitem aget in mortem.

Quod de pleuritide tanq; exemplo agat Hippocrates, memoria non excidat fieri autẽ pleuritidem ipsam propter inflammationẽ eius quæ costas succingit membranæ ostendimus. Si igitur cū in uigore fuerit inflammatio pitanam quis dederit, ægrum grauitè offendet. Vigentis autem inflammationis notæ sunt, dolor assiduus, & quod nullo pacto à calidis fomētis remittatur. Cõtinuo autẽ & alia adiicitur pleuritidis non magnæ modo uerũ & morosæ nota. q. scilicet sputum abunde glutinosum ab euacuatione arceatur, infarctumq; affectis partibus sit & detentũ. Nempe hoc uerbum *καταλιχραίνονται* plus aliquid indicat, dictione maximã significantẽ glutinositatẽ, facta præpositionis huius *κατα* adiectione. Satis igitur fuerit ex ipsius additamento quod ita glutinosum sit ab eo quod concoquitur distinctisse. Nempe quod concoquitur, mediocriter glutinosum existit, non tamen *καταλιχραίνονται*, id est neq; extreme neq; summe id habet. Et ne quis in ea re falleretur, continuo Hippocrates uerbo huic *καταλιχραίνονται* aduerbiũ hoc *ασπείως* adscripsit, qd idẽ cū *απείως* id est incoctibiliter significat. Neq; *καταλιχραίνονται* *απείως*, id est citra coctibilitatẽ glutinosum malũ est. Aegro autẽ ita affecto si quis pitana dederit, prius quam dolorẽ uel secta uena uel uentris euacuatione soluerit, hominẽ perimet. Nempe in

presenti & tali pleuritide, postea quàm à calidis fomentis nõ remissum esse dolorẽ dixit, statim duo alia habet aduersus dolorem remedia, sanguinis missionẽ scilicet & purgationẽ. Nam eorum quæ ex opio, hyoscyamo, & mandragora conficiuntur medicamentorum usus, pleuritidis dolorem non sanat, sed sensum tollit enecatq;. Nunc ergo sectionis uenæ meminit simpliciter usq; purgationis. Sed deinceps super utriusq; usui distinguetur.

34 Ob has igitur *προφάσις*, id est causas, atq; ob alias similes adhuc magis, qui tota utitur pitana, septimo die uel celerius moriuntur: alij quidem deliri, alij uero ob difficultatem spirandi stertoremq; præfocati.

Quod sæpius appellet causas *προφάσις*, demonstratum quidem in his quas in alios libros parauimus enarrationibus. Sed quas nam alias præter dictas unâ celeriores inferre mortem dicat, adijcere sermoni oportet. Nunc siquidem sumptionem pitanae prius q; soluatur dolor recensuit. Sputumq; ob frequentem respirationem glutinositate, ob quam & suffocatur. Sed lædi quoq; afferit, si prius ut supponitur, quàm uacuati sint, uinum sumpserint, aquam item mulsam & oxymeli. Nempe de alijs omnibus neq; idiotis ipsis non constat. Non abs re igitur ait alios mente læsos mori. Id enim contingere natum est si uinum uinosaq; intempèstie sumpserint.

35 Non perperam autem hos antiqui sideratos esse existimauerunt, tum maxime ob id, tum non minime quod mortuis latus liuidum plagæ simile uideretur.

Veteres talisprehendit opinio tum propter necis celeritatem, tum quod nonnullorum latus affectum fluore uideretur, ubi scilicet inflammationis erat radix. Sanguine etenim in latus ob dolorem perueniente, quantum ipsius ad cutem distributũ est, id in morte perfrigeratum nigrorem cõtraxit: similiter illis qui ita ex plaga affecti sunt.

36 Rei huius causa est, quoniam prius q; dolor soluatur, pereunt. Cito siquidem fiunt anhelosi.

Quod autem hoc respirent pacto, deinceps ipse ostendit iniquens,

37 A multo autem frequentius spiritu ut iam dictũ est, summe tum uiscosum, tum incoctum effectũ sputũ fieri egressum prohibet.

Quod prius *απείως* dixit, nunc *απείως*, id est incoctum dicit. si demq; facit quod et probe tunc uocis transpositionem fecimus.

38 Imò stertorẽ inducit, in bronchijs pulsmonis retentũ. Et ubi ad hoc deuenit, letale iam plerumq; existit. Nã & sputum quod intus retinetur, prohibet aeris ad interna delationem, cogitq; ipsum celeriter egredi.

Non omnis aer in huiusmodi affectionibus ad interna ferri prohibetur, Nempe si id fieret, hominem

minē protinus mori effet necesse, non secus quam his accidit qui strangulantur. Verū quod uisui respirationis cōferat, intro ferri prohibetur. quapropter ad dies aliquot sufficiunt, sed tractu temporis aucta indigentia moriuntur.

39 Et ita ad malum sibi inuicem opitulatur. Nempe retentū sputū, frequentem spiritum reddit, qui frequens effectus sputum adoluitur, atq; expui prohibet.

Quod uerbo hoc *συμωρῶν* pro opitulari tum antiqui alij, tum Hippocrates usi sint, sæpius ante dictum est, & nunc sanē *συμωρῶν ἑκάλλησιν ἀς τὸ κε* dixit pro *συμπῶν ἑκάλλησιν*, id est opitulari & prodesse. atq; quoniam modo sibi inuicem opitulentur prosintq; perspicue quidē ipse ostendit, sed & a nobis dicitur. Sputū in bronchijs pulmonis tenaciter adherens, pulmonis canali angustia parit, atq; ob eam angustiam cinus ægri inspirant. Quo autē minus inspirant, eo magis infatigabilem reddunt respirationis necessitatem. atq; ob id citius à priore inspiratione ad secundam properant, quod densum frequentemq; spiritū uocant.

40 Prehendunt autem hæc non solum si pitiana intestitue utantur, uerū & multo magis si quippiā aliud quod pitiana detertius sit, uel ederint uel biberint.

Iam rei huius paulo ante meminist cū dixit, Ob has igitur causas, atq; ob alias similes magis. Imò eo in loco de uino, aqua mulsā, & oxymelite mentionem fecimus. Hic autem & alia intelligere est opus, quæ ita affectis non aliter pleriq; medici exhibent quæ etiam quàm aqua mulsā, uinum & oxymeli nocent magis.

41 Bene igitur ut plurimū similia sunt auxilia tum ijs qui tota utuntur pitiana, tū ijs qui cremore ipsius: uerum qui neutro horum, sed potione sola utuntur, his interdū non uno est auxiliarium modo.

Auxilia inquit similia sunt & ijs qui pitiana, & ijs qui cremore ipsius utunt. Sed qui potione dumtaxat utuntur, his interdum differenter opitulari oportet. Sed. qualis nam sit huiusmodi differētia, in sequentibus perdocet.

42 Verum omnia hæc ad hunc modum facere oportet. Si nuper pasto cuipiam, & alui oneribus haudquaquā purgato febris uel cum dolore uel sine dolore inceperit, à sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum ad infernam intestini partē descendisse coniectum fuerit.

Sermonem lacerum frustatimq; sectum, neq; continenter & conuenienti digestū ordine fecisse sese deprehendit Hippocrates. quapropter refutans ipsum, ad accommodum perducit principiū. hoc autem ideo ipsi accidit, q̃ quæstionem super medicorum cōtrouersia soluere conatus, in ea solutione de rationibus curatorijs mentionē fecit,

Galen.

A qui sanē re intellecta atq; his quidem permutatis, sermonē ab initio aliter percurrere debuit. Nempe & ita mihi aliquando felicius contingere est uisum, utpote qui ijs quæ ante scripta fuerant, permutatis, alio de ipsis scripserim modo. Sed quonā pacto & quæstionem ab ipso propositam soluere, & sermoni ordinē dare debuit, his exponam ego qui talia interpretari exponiq; desiderant, uiamq; dilucidabo: iam ergo animum conuertere, sermonē ab initio auditurus. Quare cōtingit ut interdū præstantes medici de curatione dissideant: q̃ scilicet in nonnullis expertum conuenire omnibus putauerunt. Sic sanē & in uictus ratione in morbis acutis fuerunt controuersialij quidē ægros ad iudicationē usq; pitianæ cremore seruantes: alij pitianam ipsam exhibentes: alij autem neutrum horum administrantes, ex parte autem uerum quidē dixerunt omnes: sed ex parte falsi circūuentiq; sunt. Nempe quidā ex acutis morbis pitiana indigent, alij cremore, alij horum neutro ad iudicationem usq;. Verum lucis gratia de acuto morbo uno tantum exemplo sermonē faciam. Et demum pleuritidis super curatione agere proponatur. Si languenti non multo ante tempore cibato, neq; uentris oneribus expurgato febris inceperit, sorbitio nem huic non dabis donec quæ administrata est alimonia, penetratis plurimis intestinis, ad ultimū usq; peruenisse uidebitur. Principium huiusmodi ubi quippiam sermoni fecerit, atq; deinceps omnia proprio dotauerit ordine, doctrinam in his haudquaquam obscuram pariet.

43 Vbi autem dolor aliquis uexauerit, oxymeli bibendum dabis: hyeme calidum, æstate frigidum. quod si multa sitis fuerit, melicrato utendum & aqua.

Siticulofo existente ægro, ab oxymelite admodum multo maxime temperandum præcipit, quapropter continuata serie tum melicratū, tum aquæ mentionem fecit. Nempe quantum ad morbum spectat, oxymelite magis est utendum, uerum si æger accepto multo oxymelite adhuc situerit, melicratum insuper dare oportet. Quod si & ab ea restituerit, aquam offerendam putato. Nempe aqua per se pota culpa non caret. Causas uero ob quas aqua pota culpetur, in sequentibus atq; in ea libri parte, quæ de uirtutib. ipsius agit, perdisces. Nunc autem quod præsentī adposuit orationi recensēbimus, quæ scilicet præcepit oxymelite utendum, hyeme quidē calido, æstate uero frigido. Nēpe id ad eam quæ in acutis morbis magno est adiumento nos hortatur gelidæ aquæ potionem, quam omnino prætermisisse uidetur Hippocrates: atq; ob eam rem à quibuscūq; est culpatus. Res etenim doceri non negligenter incuriosēq; narrari debuit. Quam ergo sententiam de frigidæ aquæ potu habuerit, præsentī ex sermone dignoscī ualeat. Nempe si Hippocrates sitientibus oxymeli frigidum a iquando exhibeat: quod & aquam daturus sit, est manifestum. Quamuis enim non prorsus de frigidæ potione id præceperit, ueruntamen

præceptionem sequitur ipsius: utpote qui febrem ex nativo calore exardescente suscitari existimet, atq; contraria contrariorum esse remedia. Cum autem ignis tum calidus, tum siccus sit, atq; ob id etiam febris, sanè aqua febris naturæ aduersissima est, corpus tum refrigerans, tum humectans. Et sanè ab ea si tempestiue detur, febres protinus extingui uidentur. Dictū sanè abunde in libris Methodi medendi: sed & nunc rei summa dicitur. Cum ergo febris fuerit, constante uirtute, tunc non solum non offendes, uerum & iuuabis abunde. Potio autem frigida huiusmodi, tanta sit quantū frigida aqua æger citra respirationem haurire possit. Oxymelitis uero exiguum datur, neq; singulis oblationibus plus dimidio, in hoc ergo exhibitio nis scopus est dissimilis. Nepe ad febris extinctionem frigida affatim atq; ad laborantis usq; satietatem bibitur. Quæ enim ita bibitur aqua sanationis gratia bibitur. Oxymeli uero æstate datur frigidū, ne laborantis adaugeat sitim, imò ut aduersus etiā contrarium conferre possit. Ob eas etiam causas frigidum oxymeli ante morbi coctionem dari iubet, quasi frigidam aquam ad satietatem usq; in eiusmodi affectione dare æstate haudquaquā debeamus. Denfat siquidem inflammationem si ex ea febrierint, crudosq; perfrigeratione reddit humores, ubi ex ipsis morbum contraxerint, sed ab oxymelice secutur, quod secandi uim habet. Nempe quod fecat penetratq; id spissanti cogētiq; corpora est contrarium.

44 Postea si dolor quispiam uel periculū comparuerit, sorbitionē dare oportet neq; multam, neq; crassam: sed post septimā uel nonam si ualidus sit.

Qui Hippocratem agros *ἐν πρῶτῳ*, id est reple re dixerunt, (ita enim uerbo sunt usi) dictionem hanc prætermittere mihi uidetur: ut qui fame necare ipsum dicunt, solam hanc legisse apparent. Quod si utriq; animaduertissent, eorumq; quæ ab ipso bene enarrata sunt meminissent, quoniam scilicet pacto naturæ inter se ualde differant, forsane eos contraria Hippocrati imponere puidisset, & potissimum si reliqua animo uoluerant quæ ipse demonstrauit, regiones inter se differre ostēdens; anni tempora, ætates, consuetudines, & proprios peculiaresq; languenti unicuiq; ante morbum uictus. Si ergo in omnibus quæ dicta sunt, contrario habentes modo inter se comparaueris, maximas in uictus ratione comperies differētias. Quas ubi è regione inter se ordinaueris, iam & hoc pacto multas consistere in medio exacte uidebis. Sed de huiusmodi differentijs dictum quidem absolute in libris methodi medendi, dicitur quoq; & nunc rei summa. Statue igitur quempia natura siccum quidem corporis habitu, sed superficie densum spissumq; latius uenis, uirtute uitali ualida, cibisq; non multis assuetum ægrotare hyemem non admodum frigida, in regione etiam eiusmodi, atq; prius quam ægrotaret ocio deditum, insatiabiliterq; cibis multi nutrimenti abusus. Præterea & os uen-

tris ualidum sit, quod & stomachum quidam appellant. Sit autem & alter contrario adfectus modo, humidus quidē & mollis, & uirtute uitali imbecilla, & qui plures cibos ingerere cōsueuit. Agrotetq; ætatis tempore æstiuo, & regione eiusmodi, statuamusq; hominem antequam ægrotaret, tum curis, tum assiduis actionibus fatigatum, pauca præter consuetudinem edisse, & oleracea, & quæ haudquaquā nutriunt. Ventris item os non ualidum, sed natura imbecillum habere, atq; his ita habentibus, uterq; eodē si uolueris morbo infestetur, ea scilicet quam Hippocrates ueluti exemplum hoc in loco constituit, pleuritide. Anne una tibi uictus ratio in utroq; definienda uideatur? An posterior à prima die alendus: prior uero potu solo ad septimam usq; gubernandus, ubi morbum non longius protrahaturum sese speraueris? Ego sanè qui longa experientia utrumq; probauerim, optimam ita fore uictus formam alfero. Nam si uice uersa feceris, priorē scilicet à principio nutrire aggressus, posteriore uero ad septimum usq; sine cibo seruare uolueris, trucidabis sanè ante quartum diem utrumq;. Nempe alterum citissime praefocabis, alterius uero uires prostermes. Ceterum adijce si uelis ætatem utriq; contrariam: priorem quadragenarium constituens, posteriore puerum. Nam hoc pacto citius adhuc ad mortem uterq; properabit. Sed sanè omnia hæc quæ nunc dicta sunt, ad unum reducuntur scopū, qui uno uerbo ab Hippocrate est declaratus. Quid enim ait, Sorbitionem dare oportet post septimā si ualidus fuerit? Verbum siquidē unum est: sed ex omnibus quæ nuper dicta sunt inuenitur. Si enim usq; ad septimū sufficere poterit, ex oxymelitis, & melicrati, & aquæ usu, per ea quæ dixi omnia liberabitur ac sanabitur. Nam si quædam affuerint, quædam defuerint, præsentium uires, ad absentium uires cōferens, quot diebus sufficere ex tali uictus specie ager possit, deprehendes. Verum hæc nos in tractationibus demonstrata sunt, quas si legisti, memoriæ mandes oportet: si non legisti, in eas te prius transfer, si sententiæ Hippocratis ueritatem cognoscere uolueris. Omnia siquidem in operibus omnibus dicta sunt à nobis qui uerissima Hippocratis dogmata sequimur. Sed cum fieri non possit, ut homo unus convenientem methodum & singularia quæ in ea sunt omnia doceat, neque ideo ab Hippocrate singularia omnia audiri te existimaueris. At potius culpa eo qui cum ea quæ ab Hippocrate bene præcepta sunt, elaborare & conficere deberent, laudis appetenti ducti sectam aliam constituunt. Verum nos qui ueritatem honoramus, laudamus Hippocratem cum in cæteris omnibus, tūq; in unoquoq; opere proprium scopū ita docuerit, ut huic arte tus omnino quispiam definitam certamq; inuentionis auxilio rū habeat uia. Sic sanè & cibandi scopū unū commune prorsus, tum sanis, tum languentibus esse demonstrauimus. Is autē facultatis uitalis custodia est, quam nūc manifeste explicuit cū dixit: Si ualidus fuerit. Ob eandem sanè facultatē sani edimus,

& bibimus, aliq̃ omnia uitæ munia exequimur. Propter hanc eandē & ægri ad cibos potusq̃ procedimus. Nempe morbus suæ affectionis indicat auxilia, phlebotomiā uidelicet, clysmā, cataplasma, purgationē, oxymeli, aquā mulsam, atq̃ aliorum unumquodq̃. Virtutis uero custodia solā indicat alimoniam. Si igitur morbosam affectionem nullo pacto ostenderet alimonia, nos uirtuti solī attendentes ægros ut sanos aleremus. Sed quoniam sapius noxā uti ostendimus affert, ob id morbi affectionem, non tanquā cibi indicatricem, sed tanq̃ prohibetricem contemplamur. Vbi ergo nō prohibuerit, facultasq̃ preceperit, tunc nutrimus. Neq̃ enim cibus morbi affectionem sua ratione iuuabit. Id sanē dixi, quoniam sapius materia una uim tum cibi tum medicamenti obtinet, ut ptisanā. Nempe q̃ uirtutem roborat, id ea efficere tantumquam alimentū nata est: sed quoniam & siccit & humectat quæ expulsi oportet, ideo medicamenti obtinet rationē. Chondrus ergo pleuritico cibus tantum existit, oxymeli uero medicamentum. Sed utranq̃ facultatē ptisana obtinet, usumq̃ languentibus ipsis exhibet, sed ingeritur uirtutem quidē cōseruandarum gratia tanquam alimentum, ut uero soluiatur morbus tanquam medicamentum. Cum igitur uirtus ad morbi usq̃ iudicationem sine ptisanæ sorbitione suffecerit, oxymeli & aqua mulsā satis sunt: oxymeli quidem uim medicamenti solā habens: aqua mulsā uero cibi pauci & imbecilli. Artū iudicationē septima die citius futuram speraueris, ut uerbi gratia uel quarta uel quinta, ægros sanē multos sufficere citra ptisanæ sorbitionē posse comperies. Quod si ad septimam usq̃ protrahatur, paucos omnino: suntq̃ hi qui & uirtutem habēt ualentem, corporisq̃ habitum tum durum, tum ægre transpirabilē, succosq̃ uel crassos uel uiscosos, atque si ambiens aer calidus non fuerit. Nempe si nihil ē nostro efflueret corpore, alimento opus nō esset: sed quoniā qd defluit, huius proportionē effluit, etiam cibi quantitatem definiemus. Quibus igitur per cuticulares meatus parum exhalat, fieri potest ut uis summam consulamus inediā, & magis ubi uirtutem ab initio ualidam habuerint. Nam uelociter laborat quæ imbecilla ueluti senum fuerit, & si corpus parum exhalauerit. Quapropter & pauloante quadragenarij minimus, & non septuagenarij.

45 At si nuper cibato cibus prior nō descenderit, uirtusq̃ ualida fuerit, & floruerit ætas, subluere oportet. Si uero uirtus imbecilla fuerit, glande est utendum, nisi alius sua sponte probe deiecerit.

Rursus et hoc in loco remediorū indicationem ab affectu corporis accepit, simulq̃ uirtutem cōsiderauit, non tanquam remediorum usum aliquando indicantem, sed tanq̃ cōtrario indicantem modo, interdum autem & prohibentem. Nō enim q̃ æger ualida sit uirtute, ob id clysmate est opus, sed clysmatis indicatio ex uentris desumitur affectu. Si uero uirtus ualida fuerit, uacuationi non recla-

mat: quæ si imbecilla est, uacuationem ipsam inhi- bet. Sed rursus ad Hippocratis consuetudinē conuertere animū, qui in talibus aliquando de sola agit uirtute, sicut in ante dicta uidere est dictiōe, sed interdum adijcit ætatem. Præcipuus siquidē est uirtutis scopus, sed ad notitiam eius confert etiā ætatis cognitio, cito quidem in pueris laborante propter copiam effluuij uirtute, in ætate uero florentibus abunde sufficiente. Ceterū quomodo in pueris corporis substantia tum mollis tum humida præcipua exolutionis uirtutis causa efficitur: sic & in regionibus & anni temporibus res habet. Nēpe horum caliditas uelociter cōfestimq̃ uirtutē uacuationis quātitate soluit: iure igitur Hippocrates ex uirtute interdum sola distinctionem huiusmodi doctrinam efficit, interdum & quippiā ex alijs adijcit, unā cum ipsis & cætera commemorans.

46 Tempus autē dandæ sorbitionis tum per initia, tum per omnē morbi decursum hoc maxime seruare oportet. Nam si pedes frigidi fuerint, non à sorbitione modo, uerum quoq̃ & maxime à potu temperandū. At cum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit. Sanē tempus ualere admodū putandū cum in morbis omnibus, tum præcipue in acutis, & potissimū quibus febris uehementior suberit, periculoseq̃ summum.

Quomodo dixi unum quidē esse alimoniam scopum custodiā uirtutis, necessariō autē simul morbi affectionem contemplandā esse, ita cibi offerendū tempus ex morbo nō prohibente inueniē. Quantum siquidem ex primo uirtutis scopo est, interdū & per accessum initia alimoniam existit necessitas, sicuti & in sanis ubi primū in naturalibus euacuationibus quis propē eo deuenit ut ægroret, refectione ipsi opus est. Sed quoniā in accessum tum principijs, tum incrementis ingesta alimonia lædere admodū nata sit, ob id differimus ipsius exhibitionem, quanq̃ corpus ipsum iam iam indigere uideatur. Quod nā igitur optimū languentibus ipsis dandæ alimoniam tempus? Sanē cum modera- tissime habuerint, tum thorax, tum uenter: deterrimum uero cū ea deterrime habuerint. Deterrime autē habēt in accessum principijs: moderatissime uero in declinationibus. Constat igitur optimum cibi ministrandi tempus in ægrorum declinationibus esse. Accessionis autē principij fit calore omni toto ex corpore ad cor thoracemq̃ concurrente. Incrementū cum paulatim ad extremas corporis partes se expandit. Status cū ex æquo corpus totum occupat. Verum declinatio contrariū principio modū habet, perspirante scilicet caliditate atq̃ mediū corporis relincente, quod uno ostendit uerbo inquis: Cū ad pedes calor descenderit. Neq̃ enim id est calidos ex frigidis fieri pedes, et caliditatē in eos transire. Nā descendere transitionem caliditatis ex alia parte in aliā manifestat. Fieri autē potest ut pedes calfiant, manente in corporis medio caliditate, quod in uigore ipso cōtingit.

47 In primis autem & maxime cremore, deinde pituita uteris, præscriptis coniecturis diligenter attentus.

Postea quàm Hippocrates prædixit quādo potu solo regere ægrotantes oporteat, & quādo pituita: nunc quando cremore solo, & quando pituita ipsa utendum sit, distinguit, breui quidē & conspicua distinctione. Nempe ad coniecturas quas recensuit, animum cōuertens, quis nā ex languentibus pituita uti possit, comperies: sic tamen ut à

A cremore ipso exorsus ad ipsam sensum paulatimque trāsfiras. Dico autem sensum paulatimque, ut primum quidem solo utaris cremore, deinde cremoris quidem plus exhibeas, pituita autē exiguum; deinceps æqualiter utrumque, mox pituita plus, atque tandem eam solam: sciens pituitam ipsam ad corporis nutrimentum uirtutisque robur exuberare, cremore autem ad concoctionem confectio nemque facilem esse. Cum igitur morbi conditionem uirtutisque robur uergere ad melius uideris, auge & tu pituita oblationem.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS

TIS DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS

Commentarius secundus.



ATERIS dolorem siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere, non abs re existit.

Quod à me sepius est enūciatum, ad memoriam & nūc

id reuocare est melius. Nempe quòd exponuntur explananturque quæ obscuritatem habent dictiones: neque tamen expositores id tantummodo in commentariis faciunt, uerum quoque & ea quæ dicuntur in libris in quos commentaria parant, astruunt & demonstrant. Ob eum igitur morem cogor ego & his consentire quos non probò, atque ut plurimum ad ea quæ explicatiōe egent, sententiā meam prodere, & efferre. Neque tamen eorum quæ in huiusmodi commentariis uera mihi apparent demonstrationes scribo, utpote qui de his singulis peculiariter scripserim: sed solas earum quæ ceteris in tractationibus demonstratæ sunt rerum summas ad memoriam reuoco, quod & hoc loco in mentione doloris sum facturus. Ergo quòd dolor in sensu libus fiat corporibus, cum ea ipsa in id quod præter naturam est, subito simulque transmutantur, diximus & in libro De elementis secundum Hippocratis mentem, & in eo quem De symptomatum causis fecimus. Præterea & quonā pacto transmutatio ea bifariam fiat, corporibus huiusmodi aliàs tum subito simulque, tum uolenter secundum qualitatem alterascētibz, aliàs unitatis dissolutione. Alterantur autem subito simulque ab efficientibus qualitatis, cum & calfiunt, & perfrigerantur, & siccantur, & humectantur. Verum unitas dissoluitur corrumpiturque, ubi corpora illa uel uehementer distenduntur, uel comprimuntur. Ad hunc igitur modum dolor lateris in pleuritis affecibus, de quibus agit Hippocrates, ortū habet. Nā phlegmone illis in locis præ caloris qui præter naturam est copia, partes eas quæ phlegmone obsidentur, per distemperantiam contristat, & repletionē distendit. Primo autem auxilio si dolor is uel sanari uel mitigari fomentis calidis possit, tentandū precipit Hippocrates. Nempe fomenta calida cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficere, phleg-

B monesque sanguinē tum tenuare, tum per halitum digerere conueuerunt. Quæ si facta fuerint, non solum sanguinis aliquid euacuabitur, uerum quoque et affecta quæ minus distenduntur partes, mitius exinde & mansuetius dolebunt. At cum sanguis in phlegmone non diminuitur, uel etiam spiritus uaporosus ex calore generatur, tunc dolorē augeri contingit. Sanguis autem non deminuitur propter eam quæ in toto corpore est, humorum redundantiā. Nam pars quæ calore afficitur, plus trahit quàm euaporet. Nempe quæ calfaciunt, sua pte natura ut hoc habent, ut quod in his quas contingunt, continetur partibus digerant, sic & quod redundat ex propinquis trahunt. Cum igitur fomenta calida dolorē non soluerint, corpus totum insigni aliqua euacuatione præuacuabis. Vacuatio autem insignis in morbis acutis, aut per uentrem, aut per uenę sectionem fit. Quarum alteram adsumi præcipit Hippocrates, scoposque eius quæ præsidio magis esse possit edocet. Summa ergo præsentis narrationis hæc est. Verum quæ particulatim ab eo dicuntur, & quæ multis tum obscura, tum ambigua existunt, in sequentibus explanabo. Multis dixi, quoniam his qui sese in dictionibus antiquis intelligendis exercuerunt, pauca omnino obscura sunt. At in hisce commentariis intentionem non eò tantum dirigitus.

2 Fomentorum calidorum probatissimū est aqua calida, uel in utre, uel in uessica, uel in uasculo, aut aëneo, aut testaceo admota.

D Fomenta calida proculdubio uocat, quæ corpus quouis modo calfaciūt. Quorum alia prorsus humida, alia sicca, & alia ex utrisque mista. Mordentia præterea alia, & alia mordendi facultate carentia, & ex his cōmista tertia. Primum igitur horum genus, cuius in dictione meministi, morsu caret, atque humidum existit. Secundū ex utrisque sicco & humido, mordenti & morsu priuato cōmisti est. Tertium autē siccum quidem, sed uel mordēs uel morsu carens. Quòd si & affectiones quæ unoquoque dictionum generum egent recensuisset, orationem profecto suam tanto perfectiorem melioremque, quanto & legentibus ipsis utiliorem fecisset. Sed quia non recensuit, propterea neque id recensere necessarium

necessarium erit nobis qui doctrinam alterius explanamus, non nostrā persequimur. At uero quoniam partes meae sunt contra quae expositores ceteri agere, (Nempe illi suis in enarrationibus sophisticas quae dicentes ipsos ad finē artis nullo pacto iuuare possint, supereminant quæstiones; ego autem semper quæ cōmodissima sunt prosequi molior) ob id & nunc doctrinā Hippocratis prætermissem quidem ab eo, sed quæ toti sententiæ dogmata atque uniuersalibus præceptis quodam accedunt consequo, adijcere nō cunctabor. Quanam igitur ratione fatus omnis doloribus sapiuscule adiumento sit, prius dictum est. Dictum quoque & de his est doloribus qui a fove nullo pacto, nisi prius uacuato uniuerso corpore, iuuantur. Verū cum hæc fovebus omnibus cōmunia sint, humidī quidem phlegmonis his quæ a biliosis succo factæ sunt, opitulantur. Sicci uero ijs quæ a tenui aquosque sanguine exortæ sunt. Perpetuo siquidem cōtraria contrariorum esse remedia meminisse oportet. hoc igitur scopo foras morsu carentes aduersus mordētes succos profiunt. Mordentes uero quæ tenuent, cōtra crassos uiscososque ualent humores. Eam ob rem quisnam in ea quæ phlegmone obfidebatur parte euincat humor obseruabis, ab ijs quæ retuli aspicatur: ætate scilicet laborantis, naturalis temperatura, anni temporibus, locis, & uita antecedente; & si phlegmone uideatur, ex ijs quæ ipsitum in colore, tum in magnitudine, tum in durtie, tum in mollitie, contigerunt. Et si pleuritidem uel peripneumoniam curaueris, ex ijs quæ spūendo excernunt. Verū cum præfata omnis dignotio coniecturalis sit & nō scientifica, non certa cōperatque, præsertim ubi in corporis imo sita sit, quæ dolore afficitur particula, ab his inchoare te oportet, quæ quæ cetera magis auxilio esse tibi uidebuntur. Quod si nihil præsidij tuleris, ad alia etiam te transferre conueniet. Dolore autem non sedato, ad alia totius corporis accede euacuationē. Vide ergo Hippocrates ab eo incepisse fove, qui periculo omni uacat. Is autem est qui minime mordet, humidusque existit. Nempe tamen si nihil aduersus malū fecerit, non tamen magnum, & insigne adferet de trimentum. Ceterum fatus qui ex aceto, uel eruo, uel sale sunt, nisi propitiā conuenientemque consequantur affectionem, non solum non salutare erunt, uerū quoque & malum augebūt, utpote qui fortem efficacemque habeant facultatem.

3 Verū prius molle quippiā lateri ut et mitior et iucundior fatus fiat, supponere oportet

Postea quæ in utre, uel uesica, uel uasculo aut æneo aut testaceo posita aquam lateri exhiberi præcepit, hac in dictione prius molle aliquid supponi ijs quæ lateri tum quadrare, tum coherere debeant, ut nullo pacto angat, prorsusque iucunda sit eorum quæ exhibitur applicatio præcipit Hippocrates. Cuiusmodi fuerit lana mollis, uel linteum multiplex, uel quippiā eorum quæ tū tenera tum mollia existūt. Sed paulo post de eo qui per spongiā sit fove agens, nihil supponi iubet.

4 Vtilis autē & spongiæ mollis magnæque atque ex aqua calida expressæ applicatio. Sed fomentū linteum uestiendum, ut uis eius plusculo sufficiat tēpore permaneatque; atque simul ne halitus ad laborantis spiritum feratur, nisi forsan & id prodesse aliquando uideatur: nempe interdum prodest.

Cætera quidem quæ in dictione cōtinentur, liquida manifesta que existunt: sed de halitu est discutiedū, qui & lædit & contristat, non spirandi difficultatem caloris incremento solum proritans: sed pulmonis angustia, qua ob replentem qui humidus est halitus afficitur. Solis igitur laterum doloribus, tum siccis, tum quibus nihil expuitur, idonea est halitus inspiratio, plus auxilij quæ noxæ adferens: hoc igitur in loco scriptum est primum fove genus. Mox ad secundum sese conferens inquit:

5 Præterea & hordeum & eruū in aceto ita diluto ut paulo acidius sit, quæ ut quis bibere possit madefacta dissolutaque & feruefacta atque in saculos cōiecta lateri apponuntur, atque ad hunc modum fursur.

Hordeū eruūque non semina quæ integra sint, ex aceto & aqua excoquere præcipit, sed prius contrita cōminutaque, cōstatque Hippocrate uelle id ex uerbo hoc *διγυσα*. (Siquis siquid madefacio & dissoluo significat) atque aliter ex actione ipsa certior fies. Nempe hoc pacto tum blandior, tum efficacior erit fove: fursur denique & hoc pacto parare præcipit. fove autē huiusmodi priore efficacior uirtute aceti redditur. Quod si & ex eruo pararetur, conferret sanè & is non parum. Nempe eruum crassos humores tum secare, tum conficere, tum euaporare potest, atque ob id fovebus huiusmodi utemur ubi crassos uiscososque humores in ea quæ phlegmone obfidebatur parte collectos suspicabimur. Tū autē sanè id constabit ex antecedente uictu si humores huiusmodi produxerit anni temporibus, & locis, & ætate. Præterea & si beneuoli huiusmodi quos prius memorauimus, fove nihil præsidij attulerint. Nam ubi de corporis totius repletionē distinxeris, cum uidelicet neque huius notæ apparuerint, neque beneuoli mitesque huiusmodi quæ ipsam iuuerint, succorū existimabis crassitatem, quæ in halitū soluitur, flatuosumque spiritū, qui ob denegatum exitū contristat grauatur. Flatum ergo hūc parientesque ipsum humores, præfati discutunt fove, & potissimum qui ex eruo parantur. Præterea & sermonem percurrens Hippocrates, manifeste simul & optime metricā aceti ad aquam temperatam memorauit. Nempe acetum ita dilutum esse oportere inquit, ut paulo acidius sit, quæ ut quis bibere, ut scilicet & acrius ob mordēdū facultatē, & aquosius, ppter operatiōis ignauitatem uitemus. In incidendis igitur atque per halitū digerēdis tū crassioribus tum uiscosioribus succis, aquoso oxycrato cōgruentius fuerit quod acrius est. Sed quoniam medicamēta huiusmodi nō tolerāt quæ phlegmo

ne obsidentur partes, ob id mediā utriusq; exuperantē temperiē fecit. Hoc tibi sit secundū fotuum quos ab initio trifariam separauimus genus.

6 Siccis ex fomentis maxime conueniunt quæ ex sale milioq; frictis torrefactisq; atq; in sacculis conclusis parantur. Leue siquidē quippiam & beneuolum iucundumq; est milium.

Cum de sale & milio agit Hippocrates, ad tertium fotuum quos ab initio distinximus, genus se transfert: Est autem communis utrique siccitas: sali uero peculiariter inest mordacitas. Milium autem morfu caret.

7 Fomentū huiusmodi, et dolores ad clauiculam humerumq; pertinentes soluit.

Ex adiectione huius coniunctionis, & ostendit & dolores alios soluere, utpote eos qui ad hypochondria pertinent.

8 Sectio autem non similiter tollit dolorem, nisi is ad clauiculam pertingat.

Sectio, inquit, uenæ scilicet, quam non similiter soluere inquit, auxiliari & ipsam non negauit. Sed de huiusmodi auxilio, in sequentibus fusi us latiusq; scribit.

9 Verum si fomētis dolor non placetur, nō diutius calefacito: siccatur enim id pulmones, atq; ad suppurationem excitat.

Fomenta uaria, alia quidem humida, alia sicca, & alia mordentia, aliaq; mordacitate carentia ubi percurreris, si ab horum experientia dolor non leuetur, totū corpus uacuabis à fomentis desistens, cum pulmonem exiccent, & suppurationem excitent. Fit autem suppuratio huiuscemodi, lateris inflammatione non exhalante, sed in pus transeunte, mox pure ipso in mediā thoracis pulmonisq; regionem confluente.

10 At siquidem dolor ad clauiculam pertinet, aut molesta sit uel brachio, uel mamæ, uel partibus septo transuerso superiori bus grauitas, internam cubiti uenam secare expedit: neq; ut copiose sanguis detrahatur, est cunctandum, sed eoulsq; auferendus donec rubidior multo, uel propuro rubidoq; liuidus fluxerit. Nā utrunq; cōtingit.

Pro eorum qui inflammationē pariunt humorum uergentia inclinationeq; uacuationes facit Hippocrates. Nempe quod dicitur, Quò natura uergit, per loca conferentia eò ducere, Id uerissimum exiit. Cōtingit autem interdum id ob differentiam partium eius quæ costas succingit membranæ. Nempe superiores ipsius partes cū inflammantur, ad clauiculā brachiumq; & māmam condolentiam extendunt. Inferiores uero ad septum transuersum & hypochondrium. Cum igitur superiorum condolentia signum fecerit, uenam in cubito secare eam oportet quæ sanguinem ab affecta parte & magis & uelocius tum reuellere tum

uacuare possit: uerum si partibus infernis affectus consenserit, purgatione uacuare expedit. Recte autem grauitatem circa brachium esse & non dolorem dixit. Nempe quòd hoc in loco sanguis magis acruetur, repatq; signum est grauitas quæ ex multitudine fit. Tensiones autē & in sola affectus participatione fieri consueuerunt, cum uidelicet partes ips quæ inflammantur attigæ citra sanguinis redundantiam tenduntur. Ob id igitur sanguinem redundantem secta interna uena uacuandum præcipit. Sunt autē in interno cubiti articulo plures quas secare consueuimus uenæ, de quibus ab uide quidem in Anatomicarū tractationum tertio, atq; in alio libro qui seorsum De uenarum arteriarumq; sectione scriptus est, diximus: sed impræsentiarum de ipsis summam agemus, ab initio ducentes orationem. Vena caua ex gibba hepatis sursum ad dextrā cordis aurem sanguinem deferens, partibus quidem interiacentibus exiguum ipsius distribuit, sed cordi ipsi plurimum elargitur. Deinde ab eo tanquā ab initio progressa ad collum recto festinat tramite, atque in duas rectas scinditur in thoracis parte uenas, easq; insignes quas iugulares uocant. propagatū autem ab ipsa prius quā ad cor ipsum pertingat, insignes quidem uenæ ad septum transuersum: paræ autem ad inferiorem thoracis partem quæ octo costis constat, contententes. Pars autem hæc ab una quæ coniugio caret nutritur uena, quæ in quibusdam animantibus supra cor enascitur: in cæteris uero ut etiam in hominibus ex ea emergit parte, qua iam cordis aurem uena caua tangit hinc liquidem emergens, humilior depressiusq; per cor defertur atq; in spinā contorquetur. Vena igitur hæc ad inferiorem thoracis partem defertur, & utrinq; costis octo ad septum usq; transuersum distribuitur. Ceteræ autem sublimiores thoracis costæ quatuor ab alio uenarum nutriuntur coniugio, quod à uena caua propagatur prius quā ea in iugulares scindat. Ab his igitur duabus uenis deinceps sunt quæ ad manus per axillas pertingūt. Verum quæ humerariæ appellatū, ab ipsa caua postea q; in iugularis fissæ est, utrinq; una iam thoracem extra prōgignūt, habentq; radices ips quæ in superficie extant iugularijs communes. A iugularijs siquidem quæ in superficie extant, ut partes ferè omnes tum colli tum capitis in superficie constitutæ nutriunt: sic & à iugularijs altius profundiusq; latetibus partes omnes altius profundiusq; latentibus ali contingit. Verum quæ circa scapulas atque in collo dorsali existunt loca, uenas habet quæ ex inferioribus præfate radices communis partibus ad ipsas ascendunt. Cōmunem dico radicē quam proxime dixi et ips quæ in superficie constitutæ sunt iugularijs & humerarijs cōmunem esse. Non immerito igitur humeraria superiores clauicularum partes, easq; quæ & in collo & capite existūt: tum magis, tum uelocius euacuat. Axiliaria uero thoracis partes & magis eas quæ in sublimi sitæ sunt, præsertimq; in hominibus ipsis. Nempe infernas demissasq; omnes uena una altera nutrit quæ sub corde

corde à uena cava procedit. Ex sinistra autem par
te uenę illius que infernas thoracis partes alit, atq;
ad costarū radices prona fertur, ad usq; septū trā-
uersum singulis intercostalibus spatijs tū sinistris
tum dextris rami distribuuntur. Verum quod reli-
quum ex ea est, septum transuersum penetrat, pri-
misq; ab eo corporibus dispensatur. Ceterum que
per axillas ad manus feruntur uenę, proximas ijs
que sublimes thoracis alunt partes, radices habēt,
suntq; q̄ quę per humerū ad manus contendunt,
longe maiores, ascendūt aut ad internam brachij
uiscusq; regionē; atq; cum per ipsam prone ferun-
tur, musculis ipsis qui inibi situm habent, notabi-
les dispensant ramos. Verum cum ad cubiti articu-
lum propē uenerint, uenas brachij internas ad ip-
sius cubiti osis nodum qui hic positū habet, pro-
ducunt; quicquid uero reliquū est, bifariā scissum
diuisumq; per cubiti flexū defertur, parte ea quę
in superficie cōstituitur, uenā eam que in eo cubi-
ti flexu secatur efficit; penitiorē uero eam que
cū arteria diuiditur. Secatur quoq; & uena alia in
cubito obliqua, ueluti & hęc quę in utraq; manu
una est humerarię non exigua portio. Nempe &
hec per brachium subter cutem conspicue percur-
rens, in ipso cubiti articulo qua fluminiore extat
partes, figurata scilicet ut Hippocrates in lib. De
membris fractis docuit, manu, diuiditur. Quę igitur
sublimior uenę ipsius à fissura portio per exter-
na cubiti loca defertur, ea post fissuram ipsam seca-
tur, qua primę uenę radici ē directo maxime re-
spondet. Eam ob causam & sublimiora clauicula-
rum loca citissime euacuat. Portio autē que in cubi-
ti flexum obliq; fertur, minus quidē ea, sed ceteris
magis eas euacuat partes. Pars uero quę ab inter-
na notabili uena obliq; etiam fertur, minime qui-
dem prefatas uacuat partes; uerum maxime thora-
cis superiora, q; radices tum eius quę per axillā ad
manū fertur, tum eius que superiores thoracis alit
partes uicinę admodū existant. Secare igitur hęc
iubet Hippocrates prius q̄ uenę quę ex humera-
rię fissura provenit, pręsens sit, inferaturq;. Quę si
aliquādo non cōparuerit, uicē huius secamus ali-
quā ex internis quas recta in os cubiti fidere mer-
git; didicimus. Quod si & ea non comparuerit,
accedimus ad eam quę ex pręfatarū duarum ue-
narum obliq; in sitione progignitur. Verum
& cum ea interdum nō apparere possit, humera-
rię apparente, seca humerariam, qui scilicet uacua-
tiones ab uniuerso animalium corpore fieri noue-
ris, quanq; neq; celeriter, neq; similiter ex uena o-
mni fiant. Nos uero partem eam quę phlegmone
obsidetur, tum celeriter, tum q̄ ceteras partes ma-
gis in acutis pręsertim morbis uacuare contendimus.
Quod sanē in interna cubiti uena facit, multoq;
magis ubi sanguinis redundātia ad superiora uer-
gere uideatur, aut superiores thoracis partes affe-
ctę sint. Nempe in eo malo tū brachiū tum mam-
ma grauari solent. Verum quę partes thoracis in-
feriores prope septum transuersum infestant phle-
gmone, non abs re dolorem ad hypochondrium
transmittunt. Quo fit ut dolores huiusmodi non

A admodum iuuēt quę in cubito sit uacuatio, corde
scilicet mediū occupante. Nempe uenā quę in-
feriores thoracis alit partes sub corde emergere
audiuisti. Dicta quidem mihi hęc sunt super eo
quod ab Hippocrate bene scriptum est, de secan-
da scilicet interna cubiti uena. Sed q̄ uacuandi san-
guinis terminū coloris mutationem posuerit, de-
inceps est differendū. Quicquid ergo sanguinis in
phlegmone continetur, id calorīs abundantia co-
lore permutatur; reliquum aut in partibus omni-
bus simile manet. Eam ob causam sanguine qui in
totum spargitur corpus pituitosiorē existente, ru-
bicundior sanē erit qui in eo quod phlegmone ob-
sidentur latere continetur. Quod si sanguis in cor-
pus toto tum diffusus, rubidus fuerit, is proculdubio
qui ad phlegmonē est adustus assatusq;, in nigrū
permutabitur. Liuidus aut in ea quę fit à rubido
ad nigrum transmutatione mediū obtinet. Colo-
ris igitur mutatio sanguinis ex particula inflāma-
ta translationem sufficienter commoustrat. Vacu-
ationis igitur modum mensuramq; quę affe-
ctui peculiaris sit, diximus. Sed cum interdum uir-
tus tantum uacuare prohibeat, parti ipsi quę phle-
gmone obfessa est, minus quidem futurū auxiliū
scire oportet. Quo fit ut non uirtutē exoluere me-
lius sit, quam sanguinem uacuare redundantem.

11 Si uero eas quę sub septo trāuerso sunt
partes dolor infestat, nullumq; ad clauicu-
lam signum fecerit: uentrem uel nigrō uerā
tro, uel peplio mollire oportet. Sed ueratrō
nigrō uel daucum, uel seseli, uel cyminum,
uel anisum, uel aliud quippiā boni odoris
miscbis. Peplio uero silphij succū, quanq;
& hęc inter semista non dissimiliter agant.
Cæterum ueratrū nigrum tum melius tum
ad iudicationem iuuantius q̄ peplium uen-
trem soluit: sed peplium flatum magis excu-
tit. Dolore præterea ambo hęc sedant. Se-
dant quoq; & alia quę expurgant medicā-
menta. Verum omniū quę nouerim uide-
rimq;, hęc potissima existūt. Nēpe & quę
in forbitionibus dantur purgantia medica-
menta auxiliātur, quęcunq; scilicet nō ual-
de insuauiā existūt, uel propter amaritudi-
nē, uel aliā quampiā iniucūditatē, uel quan-
tatem, uel colorē, uel suspicionem aliquā.

Quod medicāmēta purgantia per experientia
inueniuntur, & quos nam expurgent humores, &
an omnino purgent, in libris De simplicium medi-
camentorum uiribus didicisti. Quod uero purga-
tionis necessitas sit, si redundantes humores deor-
sum repant, est quoq; ratione scitum animadu-
ersumq;: sed id testimonium ratamq; fidem ab expe-
rimentis habet. Edocuit autē Hippocrates facili-
tatem medicamentorū quę in huiusmodi affecti-
bus propinat: ueratrū quidem nigrum *καταρρεα*,
ρεα, id est ad iudicationem iuuantius uacuare, pe-
plium

plium uero flatus magis excutere affirmans. Quæ aut ab Hippocrate *κρυσμώτερα*, id est ad crisum iuuantiora dicuntur, ea morbi iudicium faciunt magis, quod facultate uerbo huic *ὀφελιμώτερα*, id est iuuantiora idem existit. At cum purgantia omnia medicamēta uentrem, præsertimq; os ipsius quod maxime, tum neruofum, tum sensile existat, affligant lædantq; ob id eorum quæ boni sunt odoris mistio excogitata est, ne sola ynteraq; purgantium medicamentorum uirtus os uentris tangat. Permissa quoque inter se tum peplium tum elleborum *δμοιοτροπα*, id est modi similis esse ait, quod est facultatibus conuenire, & in nullo cōtrouersa esse. Nam & in purgantium medicamentorum permissione controuersa est, non quādo aliud quidem bilis aliud uero pituitæ excretorium fuerit, (Nam eodē tempore uacuari tum bilis tum pituita possunt) sed quando aliud quidem protinus, aliud uero longo à propinatione tempore purgationem mouere natū sit. Nempe hoc pacto inæqualis eorum quæ simul ingesta sunt fit uacuatio. inæqualem dico cum iam altera quidem desinere, altera uero incipere uideatur. Nempe quod citius purgare consueuit medicamentum, id & ex alio quippiam simul uacuat. Quo fit ut quod exigui ipsius relinquitur, imbecillius reddatur, et longe tardius suam inchoet purgationem. Præfinito igitur uacuationis tempore simile est elleboro peplium, potestq; elleboro similiter nigrum subducere humorem. Cetera uero tum dictionis huius tum sequentium patent. Cōsiderare igitur hæc atq; in memoria tenere nos oportet, sed non perpetuō in pleuriticis uti debemus, ad memoriam reuocantes Aphorismum illum ubi dicitur, In acutis morbis raro & in principijs, purgantibus medicamentis est utendum. Vbi igitur (inquit) non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, uerum & cum febre uehementissima, multo magis uitanda est purgantis medicamēti administratio, atq; per sectionem uenæ uacuandum magis, etiam si ad hypochondrium dolor finiatur. Nempe & si minus quidem auxilium q̃ per purgationem sequatur, securus tamen multo existit. Imō nullum ex eo quod per uenæ sectionem fit, periculum impendet, eo discrimen maximū subeunte quod per purgationem tentatur: & potissimū si laborantis naturam expertus quis non fuerit. Nempe alij difficulter natura purgantur: alij modico adsumpto medicamento purgantur copiose. Quibus igitur dare quadrabit, his medicamenti tantum propina quantum in plurimis mediocriter uacuare tum nouisti tum sis expertus. Si enim hominis naturā nō noueris, metus est ne plus iusto uacues, uel nullo pacto uacuationem moueas: aut si moueris, nō tamen sufficienter uacues. Quæ omnia magnas in morbis acutis parium offensas, quod non facile ut in ijs qui non febriunt emendatur. Cum igitur febris non uehementis fuerit, naturamq; laborantis expertus fueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes, ijs quæ ab Hippocrate dicta sunt uel etiam alijs similis naturæ usus. Quo è numero est

quod ex colocynthide paratur medicamentum, quod iam ex ulu hieram uocant. Id sane uarijs paratur modis: sed quod elleborum accipit scammoniamq; nō habet, id ijs qui medicamen subducentium omnino adsumere possunt, optimum est.

12 Vbi autem quis medicamentum exhibet, pristinam protinus sorbendam dato, neq; insigniter minore quam consuetum est quantitate.

Et alias quidem uentris ori quod & stomachum uocant, ut in ipsis purgantium medicamentorum potibus, illæsum maneat, consulere oportet, præsertimq; ubi febricitans tale quippiam propinatur. Verum præcipua ne offendatur, cautio est, medicamentum quod propinatur, purum non sit, sed cum alijs quæ malitiam ipsius hebetare nata sunt, temperatum mistumq;. Nempe purgantium omnium medicamentorum natura, corporū quæ expurgantur naturis contraria est, atq; ut quispam dixerit, letalis, & deleteria, id est uenenosa. ut autē succi papaueris, mandragoræq;, & hyoscyami, atque aliorum huiusmodi multorum quæ nobis & substantia & uiribus aduersa corpus perimere nata sunt, portionem exiguam adsumētes, magnam percipimus cōmoditatem: sic & purgantium medicamentorū quorum natura corporibus nostris aduersa est, exiguam aliquam partem præcedentes ad suppetias ferēdas utimur. Quo item modo in horum medicamentorū potu seminum aliqua quæ boni sint odoris miscemus, quæ & malitiam obtrudere nata sint, & operationem ipsorum nō prohibeant, tenuentq; ita incendantq; ut & crallos incendant humores, & uias quibus uacuatio fiat, aperiant patefaciantq;: sic & à sumpto medicamento pristinam sorbere confert. Nempe purgans medicamentum ipsum tanquam exiguum ad uentris quidem fundum peruenit: uerum dum trāsit, stomachus & quæcunq; uentris sublimior pars non qualitātē medicamenti purgantis modo: uerum & substantiæ quæ in transitu hæret aliquid adsumēs, uehementē læditur. Ptifanæ igitur cremor superingestus cōmoditatem affert. Nempe & detergere, & deorsum trahere qd uix adheret, & qualitatem medicamenti quod his adheret partibus, tum temperare, tum permutare potest. Ob eas igitur causas à purgantis medicamenti potu, ptisanā superforberi præcipit. sed ubi purgatio cepit, ab ea uult abstinendum, purgantis medicamēti operationem exolui ueritus. atq; ob eam rem ait:

13 Et quoniam ab re non est, purgatione in media sorbitionem dare non conducit. At ubi purgatio desierit, tunc sorbitio detur, sed cōsuetā minor: deinde liberalius perpetuo exhibeatur, si & dolor cessauerit, & nihil aliud obiecit fecerit.

Contra quā pleriq; huius temporis medici rem hanc docuit Hippocrates. Nempe hi ubi uacuauerunt, copiose nutriunt. Hippocrates uero à purgatione ptisanā minus ministrari iubet. Nam

corporū quæ expurgata sunt, natura expurgatione agitata labefacta; tolerare alimoniam non potest: neque probe eam conficere nisi omnino pauca fuerit. Purgatis igitur tantum cremoris prima die exhibendum quantum domare possint. Deinde paulatim sensimque adaugere oportet, si et dolor, ut inquit, cessauerit, et nihil aliud prohibuerit. Quod de dolore ait, est manifestum: sed, nihil aliud prohibere, ad præfatas referre oportet si intelligere uolueris, distinctiones, in quibus demonstrauit quoniam pacto morbis acutis laborantes absque sorbitionibus regere oporteat. Summa uero hominum est, cum uel morbum ante iudicationem nulla sorbitione indigere sperabimus, uel in quibus summa est quæ phlegmonem facit cruditas.

14 Sermo autem mihi idem est, si & pituita nam cremore utendum sit.

Tempus exhibendorum tum pituitæ tum cremoris ipsius & antea simile esse demonstrauit, re una dumtaxat differentiâ horum definiens. Nempe de cremore principium exhibitionis facit.

15 Melius siquidē esse dico ut protinus à morbi initio sorbere incipias quæ inanitis uacuatissimæ uenis uel die tertio, uel quarto, uel quinto, uel sexto, uel septimo, si ante hoc tempus morbus haudquaquam iudicatus fuerit, sorbitionem inchoare.

Quod in Aphorismis scripsit Hippocrates, id & in præsentiarum persequitur, in morbi omnis uigore tenuissimum utendum uictu præcipiens. Si igitur quinta die morbi uigor futurus sit, & æger solo uisus potu sufficere non possit, melius esse ait si protinus ab initio pituitam dederis, & neque tertio die neque quarto sorbitionem inchoaueris. Sic facit & eos qui uel quinto uel sexto uel septimo sorbitionem inchoant falli circumueniri, si ante hoc tempus morbus non fuerit iudicatus. Per iudicationem intelligo ut dixi non perfectam morbi mutationem solum; uerum quoque & effectum dignam transmutationem.

16 Præparationes autem & his tales fiât, quales dictæ sunt. De sorbitionis igitur exhibitione, ita sentio.

Et quibus ab initio sorbitionē daturus sis, præparationē similiter fieri præcipit. Id est, siue sectionis uenæ, siue clysmatis, siue balani necessitas fuerit, illud ante faciendum iubet.

17 De potu quoque qualemcumque ex declarandis potaturus quispiam sit, eadē omnino mihi est ratio.

Si laborantē potu solo citra pituitæ sorbitionē reueris, præfatas quoque præparationes te facere iubet. Aut uenam secare, aut clysmate uel balano uti.

18 Verum & medicos contra omnino quæ oportet agere scio. Nempe omnes, languentes ipsos per initia morborum duos uel tres uel etiā plures dies inedia siccare, atque ita tum

A sorbitiones tum potus exhibere uolunt, idque forsitan quæ magnæ corporis mutationi magnam quampiam obijcere mutationē ipsis decēs esse uideatur. Verū mutatio ipsa bene quidē habet non modica: sed recte transferenda uenit. Iam autē & ciborum exhibitio mutationis rationem maxime subit.

Medicos culpat Hippocrates qui languentes ipsos in absoluta ciborum abstinentia seruantes inde eos protinus alij quidem in sorbitionem, alij ad potum ingestionem deducunt. Non ita tamen mentionē eorum fecit qui cibos ualidiōres ante morbi concoctionem ministrant. Consueuit siquidem ut ante dixi, interdum prætermisissis quæ maxima sunt erratis culpare minora, & eam quæ ex illis oritur demonstrare offensam. Qui autem ita transmutant, forsitan (inquit) rationabiliter transmutare arbitrantur, in magna corporis transmutatione effectum dignam uictus permutationem facientes. Quod sanè bene eos existimasse ait, non tamen de transmutatione omni, sed bene aliqua est putandum. De qua partim prædixit, & partim qui piam esse diciturus, sermone adstruens declinandas esse repentinas mutationes.

19 Maxime ergo lædētur qui tota utētur pituita, nisi recte transferātur. Lædētur quoque & qui solo utētur cremore, lædētur præterea & qui solo utentur potu, sed hi minime.

Dictam paulo ante subitam uictus mutationem, qua primis diebus in absoluta ciborum abstinentia seruatos languentes circa diem quartum nutrire incipiunt, maxime quidem nocere ait, si in pituitam totam transferantur, minus uero si in cremorem, sed minus, id est laxius, quod minimum indicat, offendi eos qui ad solos procedunt potus. Nempe ex magnitudine uirtutis eorum quæ offeruntur, magnitudo oritur offensæ.

20 Oportet autem & ex sanorum hominum uictu disciplinam quæ conferat, facere. Nam si sanis quibusdam tales uel tales cibi multum differre uideantur, cum in alijs quibusdam tum in mutationibus, quomodo & in morbis quibusdam & maxime in acutis non ualde differant.

Incipit Hippocrates præfatam ab ipso de uictu sententiam demonstrare, arguens unā & eos qui contrariō uictum instituunt modo: sed ut dilucidus cōspiciatur reddatur sermo, summam ipsius omnē præfari melius esse mihi uidetur. Est autem earum quæ in eam rem adsumuntur sumptionum dignitas altera uniuersalis hæc. Si bene ualentibus læsionem adferant repentinæ uictus ad contrariā mutationes, multo magis egrotantibus ipsis. Quod uarijs etiam modis possumus interpretari, aliud in aliam transmutantes dictionem, ut hoc pacto. In repentinis uictus mutationibus qui sani sunt, ægris minus læduntur, uel sic, Aegri sanis magis læduntur.

tur: uel ad hunc modum. Detrimēta sanos minus quam agros afficiunt. Generalior hæc interpretatio. Validiores minus afficiunt, imbecilliores magis detrimenta. Licet & aliter uim sermonis interpretari, aut ex eo quod per se & primum uile sit ad quod demonstratur: aut ex aliqua continentium ipsum uel dignitatum uel sumptionum. Talis quidem tibi sit per se credibilis sumptionū altera: lemmata Græci dicunt. Lēmata uero id est sumptiones uocare consuevit Aristoteles dignitates, uel prologia, uel postulata. Sed alteram cui fides per experientiam lucem accessit, deinceps audi: Sane etiā repentina uictus mutatio offendit. Ex utraque hac sumptione cōcludit languētes à repētina uictus mutatione lēdi magis: sed multo magis qui acutis infestant morbis. Hęc est uis sermōis. Verū Hippocrates alteram ex sumptionibus per se tum priorem tum credibiliorē, protinus citra fructuram ac cōfirmationem accipit. Altera uero ijs que singulatim per experientiam noscuntur, cōfirmatur. Quod & sequens declarat oratio.

21. Atqui quod simplex tum cibus tū potus semper sibi similis ad sanitatē tutior sit, quā si quis subito ad alterum uel meliorem se transferat, facile discitur, intelligiturque.

Alteram sumptionum earum quæ ad presentis sermonis demonstrationem præstant, nunc ex multis particularibus exemplis astruere incipit, fidem ipsius in unam colligens summam, quæ talis est. Magnæ & repentinæ præter consuetudinem mutationes non paruum sanis afferunt læsionem. Quamquam sermo hic conspicuus sit, tamen si quippiam quod explanatione indigere intercedere uidebitur, ijs qui exercitati non sunt, in sequenti serie explanare non cunctabor: Nempe hic commentarios proposito non horum modo qui in sermonibus sunt exercitati, uerum quoque & eorum qui exercitati non sunt, tum liberalis, tum benignitatis plenus existit. Quod si quis præfatas disciplinas neque didicerit, neque expertus fuerit, aliud quippiam agat.

22. Nempe tum ijs qui bis die comedunt, tum ijs qui semel, noxam imbecillitatēque pariunt repentinæ mutationes: quicquid prandre non consueuerunt, & prandent, statim ægre habent. toto corpore graues redduntur, & parum ualentes, & desides. Quod si supercœnauerint, acidum ructant. alios uero alui leuitas exercet. Nempe uenterculus præter consuetudinem grauatur, superfices celsere consuetus non bis tumescere, neque bis cibos coquere.

Non solum quod in repentina consuetudinis mutatione ualde lædantur, uerum quoque & quænam læsiones fiant, & quonam modo singulas emendare oporteat scribēs Hippocrates, ob id sermonem prolixum facit. Nam si duntaxat quod in

A repentina consuetudinis mutatione lædantur ostenderet, ob id sermo illi totus breuis foret. Prima igitur consuetudinis mutatio quæ nunc exprompsit, est de ijs qui prandere non assueti prandit aliquando sunt. Aut enim tales & ægre habere, & toto corpore graues fieri, parū item ualere & desides reddi. Contingunt autem hæc ipsis grauata ab alimento ueluti à pondere facultate. Neque enim ægre ea habet propria ratione, ueluti in cibi penuria fieri consueuit. Ob eam igitur causam hoc in loco sermoni adiecit totum corpus grauari ijs qui bis cibati sunt, eosque fieri desidiosiores. Verū in assuetis prandre & non præsens imbecillitatē quidem uirtutis scripsit, sed grauitatē non adscripsit. Nempe & in talibus mutationibus imbecillitas sua ratione uirtus.

B Præterea cum desides fieri in presenti uictus mutatione asserat, in contraria timidus esse dixit, quæ si opus omne perosos & ueluti opus aggredi uertis diceret. Nempe res ita habet. Nam qui ita affecti sunt, uirtutis imbecillitatem uere sentiunt, atque ob id eas quas ante promptius obibant, obire non audent actiones. Quinetiam & ijs qui diminute cibantur, uiscera opinione pendere ait, eosque tum calidum, tum *χλωρόν*, id est uiride meire. Calidum inquit, id est solito calidius, *χλωρόν* uero, id est uiride iuxta morem quandam Asiaticorum Græcorum, qui & nunc obseruatur. *ὠχρόν* siquidem, id est pallidos quosdam uidentes, causam cur ita *χλωροί*, id est uirides facti sunt interrogant: *χλωρόν* & *ὠχρόν*, id est uiride & pallidum nihil differre existimantes. Visumque quandam *χλωρότερον*, id est uiridiorem dicunt. *ὠχρότερον*, id est pallidorem ita significantes. Est autem *ὠχρόν* *χλωρόν*, id est color pallidus ueluti ignis, & color *ὠχρός* uocatæ, cuius prima syllaba acuitur coloris cuiusdam significatione. Fitque talis color permixta aquoso excremento pallida & amara & flaua appellata bile. Nempe flauus color quantum à rubro in albiorem secedit, tantum à flauo pallidus. Scripsit & alia quædam symptomata quæ ita affectis fiunt. De quibus cum ad eam quæ de ipsis est mentionem peruenerimus, agemus. Præsentem autem dictionem discutiamus. Quæ in non assuetis prandre contingere ait, his adhuc & hoc adiecit. Si autem supercœnauerint, acidum ructant. Quod autem ructus acidus fiant & propter uentriculi frigiditatem, & propter pituitam sepius in eo acervatam, & propter ciborum multitudinem, aut si pauci quidem sint potestate tamen frigidorum, didicimus. Omnium autem præfatorum commune est calorem uentris ingenitum uinci à cibis, non eos uincere, neque his præstare, neque probe ipsos consistere posse: ut si modicæ flammæ lignorum multitudinem superaceruaueris, uel & citra multitudinem tum uiridia tum humida superposueris. Ceteris ita cibatis *ωπαίλην*, id est alui leuitatem siue humidam defectionem fieri ait. Verum in exemplaribus non paucis non *ωπαίλην* scriptum inuenies, sed *ἑσσην*: ut eo uocabulo *ἐπιπασμὸν*, id est proiectum intelligamus corporis hominis huius quæ ita cibatus est, corporis inquam ob cibi multitudi-

ritudinem *ἀσθενείας*, id est grauius molestē habentis atq; implacidi inquietiq; dū in lecto iacet, & se se permittantis. Ceterū quod circa dictionis finem cibi confectionem cōctioni similem esse oporteat, manifeste ostendit, tanquam a calore fiat non sicco squalentiq; cuiusmodi est febrilis, sed ab humido uaporosoq; cuiusmodi est qui in animalibus secundum naturam existit.

23 Conuenit aut his permutationē æqua uirtute cōpensare. Dormire siquidē eos oportet, tanquā noctem a cœna hyeme quidē circa frigus, æstate uero citra calorē, agāt. Quod si dormire non queant, plures lente ambulando absoluant circuitus, neq; stent, neq; cœnent, aut pauca & innocua. Minus præterea bibant: sed meracius et nō dilutū. Magis præterea & is afficietur, qui ter die replebitur, ac etiā multo magis qui crebris us, quanq̃ sint nonnulli qui ter die satiati facile ferant, utpote qui ita sunt consueti.

Hoc in loco referre hæc nō erat necesse. Nempe docere proposuerat quoniam pacto repentina consuetudinū mutationes nos lædant, non autem quo tales lēssiones modo curare oporteat. Verum quoniam Hippocrati hoc tētare est uisum, propterea quæ scripsit prosequemur. Maxime quidē is dormire ipse plurimum iubet: & si dormire ne queant, plures lenta ambulatione absoluant circuitus, idq; ut quamplurimi expositorum aiunt, post cœnam: sed ut eorum quæ dicuntur sensus præcipit, post prandium. Nam oratio hæc, tanq̃ noctem agant, de somno meridiano nō de nocturno dici exposulat. Præterea quod continuata est scriptū serie, ubi inquit: Si uero dormire non queant, plures lente ambulando absoluant circuitus, neq; stent, nihil præterea cœnet uel pauca & innocua, testatur Hippocrate uelle eos a prandio dormire, non a cœna. Duorū igitur alterū. Nam aut emendanda tanq̃ errati cōficia scriptio, atque ita scribendum, Dormire siquidem eos oportet post prandium tanq̃ noctem agant: hyeme quidē citra frigus, æstate uero citra calorem. uel si seruare uolumus orationē hanc a cœna, intelligenda est hoc pacto dictio: dormire siquidem eos oportet ut a cœna ante dormiebant, sic & nunc post prandii tanquam noctem agant. Quod autem uelit Hippocrates eos uel nihil omnino uel parce & leuiter cœnare, sensus est manifestus. Ventrem siquidem uult requiescere, laboremq; quo grauatius afficiatur refoveri, quod præter consuetudinē prandii homo fuerat. Hinc sequens est & minus bibere, sed non a quosum, nō dilutum. Nempe fluctuationem humiditatemq; & refrigerationem uitare oportet ubi a ciborum multitudine uenter grauatus fuerit. Potum aut qui exhibetur, nō aquosum esse conuenit, sed uetris tum calfactoriam tum roboratoriam obtinere facultatem. Cetera quæ continuantur, liquida sunt & manifesta.

Galen.

24 Præterea qui bis die cibū sumere consueuerūt, ij nisi præsi fuerint, ægre habent, parū ualent, timidiq; ad quoduis opus fiūt, & cardialgici. Nēpe his uiscera pendere uidentur, calidum mingūt & uiride, id est palidum, stercusq; exurit: Sunt quibus os amarefcit, oculi cauantur, et tempora saliuūt, partesq; frigescent extremæ.

Cetera quidem huius dictionis in eorum comparatione quæ præter consuetudinē prandii contingere diximus, sunt explanata: sed de reliquis nunc dicam. *ἀποδύς*, id est *ἀποπύημα*, id est stercus ipsorum siue alui purgationē incendi exurit inquit, a calore scilicet afflāt. Nēpe corpus magis tum siccescit tum ignescit, ijs qui consuetū relinquūt prandium. Alijs os amarefcere ait, utpote ijs qui biliosiores habent naturam: hisq; caui sunt oculi ab eadem qua excrementum adurit causa siccescentes. Quod autem in amaræ bilis naturis uerna culis calor in id quod igneum est digrediat, propterea & tempora saliuūt, id est temporum arteriæ euidenter pulsant. Partes præterea corporis extremæ frigidiore sunt, quod uenter biliosis repleatur humoribus, quorum morsu atque contritione affectus, uirtutem dissoluit, corporisq; extrema perfrigerat.

25 Plurimi quoq; horum qui prandii non sunt, cœnare nequeunt. qui si cœnauerint, uentris grauitate afficiuntur: ac difficilius cubant multo q̃ si prandii fuissent.

Picrocholi natura præter consuetudinē imprandii permanentes, cibos auersantur fastidiūq; uenter scilicet, male tum tractato tum afflicto. Verum qui coacti cibum sumperint, grauantur: atq; ob id *ἀναυηστῶν*, ut ipse inquit, id est male habentes in lecto permanentes & traducunt.

26 Cum igitur talia ob dimidiatæ diei uictus a consuetudine digressionem sanis cōtingant, neq; adijci quicquam neq; subtrahi commode uidetur.

Rursus inter exponendum quæ contingunt ualentibus ijs qui subito cōsuetudinē permutauerunt, sermonis summam obiter atq; ueluti appendicem adiecit, cuius gratia omnia hæc exponit quæ sanis contingunt. Nempe ut constet, si bene ualētibus uictus dimidiatæ diei permutatio adeo molesta sit, quomodo non admodum languentibus ipsis molesta erit. Deinde rursus ad explanationem eorum quæ sanis cōtingunt reuertitur in sequenti dictione quæ ita habet.

27 Qui igitur præter cōsuetudinē semel pastus toto die exinanitis uasis quantū consueuit, cœnauit, si tunc imprandii laborauerit, parumq; ualuerit, atq; adsumpta cœna tunc grauatus fuerit, multo magis eū grauari par est: quod si adhuc plufculus horis uene-

tom 6

D 2

exinanit

exinanitæ fuerint, atq; repente cœnauerit, magis adhuc grauabitur.

Quod ait huiusmodi est. Si qui præter cōsuetudinē impransus permanens minus cōsuetō cœnauerit, nocte grauetur: multo magis grauabit qui solito plura est cœnatus. Qui autē pluscūlo tēpore exinanitis uasis repente cœnauerit, magis adhuc grauabit. Nempe qui impransus præter cōsuetudinem permanent, horum aliq; ad minus temporis in ediam protendunt, aliq; ad longius interuallū, hos igitur grauari adhuc magis ait.

28 Quibus igitur præter cōsuetudinē uenæ sunt inanitæ, ij eodē die ueniūt reficienti. Vident in primis frigus, calorē et laborē. Nempe hæc omnia moleste feruntur: dein de cœnam solito minorē faciant, eamq; nō siccam sed humentiorē: deinceps bibant, neq; dilutum, neq; minus q̄ ingestorum ratio postulat. Postero autē die pauca prandant: ut accessione sensim crescente, ad cōsuetudinem redeant.

Vt eorū qui præter cōsuetudinē pranderunt detrimēta emēdauit, sic & eos qui q̄ semel duntaxat die præter cōsuetudinē ederunt afflicti sunt, uult in primis uitare tū calorem tum frigus, tum labores: hæc nempe omnia moleste ferri ait. Adde q; & minus solito cœnare ipsos iubet: quanq; pleriq; maxime contrā agant. Nam prandere ob negociū aliquod prohibitos uolūt in cœna, et eam quē in prandio omīssa est adsumere alimoniam, haud scientes q; eget quidem uere alimonia omīssa corpus, sed ipsam cōficere non possit uentriculus ob longiorē abstinentiā læsus afflictusq;. Quinetiam Hippocrates ut alimoniam minus uult exhiberi, ita & eam humidiorē. Nepe huiusmodi alimonia exsiccatis tum uētri tum corpori uniuerso peculiare auxilium præstat. Roborat præterea & uentrem ipsorū iubet uini potu, neq; dilutū, neq; minus q̄ cibi proportio exigit potandum præcipiens. Dilutum enim, uentris robur exoluit. Minus uero q̄ cibi proportio expostulat, uentri exarefacto inhabili existit. Postero quoq; die ita affectos uictū prospectare iubet: qui cōsuetorū ciborū minus ingestum, atq; ita læsi sunt, ut sensim paulatimq; in pristinam redeant cōsuetudinem.

29 Talia uero molestius ferunt, qui parte superiore picrocholi existunt.

Iam & ego paulo ante dixi picrocholos. i. amarabilis homines subitariam eam quæ a uictu ad abstinentiā fit digressionē pituitosis difficilīus molestius ē ferre. Bilescit siquidē ocyus his totus tum corporis tū uētris habitus. Sed quare non simpliciter dixit picrocholi: ad parte superiore? Nepe cū flaua bilis quam & pallidā & amarā nominant, superiori supernatat uentri, iure optimo tales parte superiore picrocholos dicimus. Cum uero per sedem demittitur, parte inferiore picrocholos asserimus. Paulo siquidem rhetori qui toto corpo-

ris habitu pituitosus erat, diebus singulis supernatā flaua bilis, primamq; ipsam uomēbat a lauacro non paucum. Eudemo autem philosopho qui temperamentum biliosus erat, per sedem demittēbatur: raroq; is quamquam aliquando pallidam uomēbat bilem. Vt autem Pauli excrementa bilis exiguum habebant, ita Eudemi multum. Qui igitur præter cōsuetudinem non prandent, si & toto corpore habitu, & superiore uentre picrocholi fuerint, his necessario contingunt quæ paulo ante dixit omnia. At qui uentre duntaxat superiore picrocholi existunt, his tolerantiā difficultas similiter contingit: sed ex reliquis symptomatis alia quidem nullo pacto erunt, alia erunt quidem fedius moderatiora. Prædixit quoque & eos qui præter cōsuetudinē non prandent, timidos ad quamuis operationem esse, stomachi erosionibus affici, pensilia uideri ipsi uiscera, calidum & uiride meiere, exurīq; excrementa. Alijs os amarefcere, oculos cauari, tempora palpitare, extrema perfringere. Sed horum alia toto habitu picrocholis contingunt magis, alia autem superiore duntaxat uentre talibus. Atque ob id ad quamuis operationē timiditas, extremorum perfrictio, mictus calidus uiridisq;, deiectionū adustio, cautatio oculorum, & temporum saltus toto habitu picrocholis usu eueniunt. Vtriusq; autem pensilium uiscerum opinio, & oris amaritudo. Nam ob insuetam abstinentiam, tum suspensa tum pendula percipiunt uiscera. Verum ob bilis exuperantiam picrocholis toto corpore os amarefcit: non quod affectio in ore magis fiat, sed quod sentiendi partem eam natura generis humorum discretioriam fecit. Venter autem magis quidem his exurit, quibus ex hepate in uentrem bilis effusa supernatat, minus autem quibus deorsum mittitur. Nam his quidem intestinum proritat ad excretionem, illis uero stomachum mordet. Ob eam rem Eudemus diebus singulis, bis & interdū ter deijciebat. Paulus autem interdum nullo pacto exercebat. Nisi etenim intestina a mordente aliquo irritentur, uel copioso excremento grauentur, excretionis propitius non accipiunt. Neutrū horū impransus contingit: neq; enim mordentur intestina bile in os ascendente, atq; illa non mordente cōtristantēq;. Neq; grauitas his fit, qui omnino non comederunt.

30 Non assuetam autē cibi abstinentiam facilius omnino ferunt qui parte superiore pituitosi sunt. quo fit ut si semel die cibo utantur, facilius etiam ferant.

Prius quidem parte superiore picrocholos uictū cibi qui semel die sit, difficilīus tolerare dixit. Nunc autem ad pituitosos se transferrens, pro cibi usu qui semel die sit, inedia meminit: ex habente manifestius detrimentum, ad minus noxiū translationem ex proportionē facit. Nam si magis quidem lædi eos qui sine cibo totum præter cōsuetum permanferunt diem equum sit, minus autem qui non prandent, & pituitosi picrocholis cibi usum qui semel die sit facilius ferant, quod

quod sanè & inedia facilius ferant, palam est omnibus. Causa autem cur pituitosi facilius cibi usum qui semel die sit, ferant, ex ijs quæ antea de biliosis dicta sunt euadit conspicua. Nam bilis humor in ipsis inedijs amarior redditur. Pituita uero temporis processu coquitur, sanguisque efficitur, neutra bile in sanguinis substantiam redire ualente, cum ex sanguine quidem plus calefacto flaua bilis generetur, ex eodem uero assato adustoque atque etiam ex crasso atra. Pituitæ autem generatio in pituitosis edulsijs sanguinem perpetuo antecedit: atque generatione ipsius mediæ cibi in sanguinem transeunt. Neque hoc deterioribus tantum cibis contingit, uerum & quibusdam eorum qui salubres admodum esse uidentur, ut panis chondro, semidali. Ego sanè eam quæ mihi optima esse uidetur narrari conscriptionem. Nempe quod in ea docetur, per se uerum est: atque continuatam cum ijs quæ ante dicta sunt habet seriem: qui optima explanationis sunt scopi. Non tamen in exemplaribus omnibus consimilem inuenies descriptionem, sed in alijs & alijs pugnantem. Cæterum aliter in libris ferè omnibus reperitur dictio hæc falso sermone, & nullam quæ antedictis continetur seriem seruante.

31 Potissimum sanè & hoc argumentum quod maxime mutationes eorum quæ circa naturam nostram habitumque cōtingūt, maxime morbos committunt.

multa quidem apud Hippocratem φύσις, id est naturæ nomen indicat, sed hoc in loco temperaturam significari quispiam existimauerit, ueluti & partium ipsarum structuram compositionemque. *ἔξω*, id est habitum appellari, quo in structuræ genere continetur & bilis ad partes superiores fluctuatio & ad inferna deiectio, & uiscerum suspensio, tum constantia stabilitasque. Nempe cum uenter magnus existit, uiscera confirmat & stabilis, tamen si cibus uacuus destitutusque fuerit. Verum cum paruus est, cibis quidem refertus confirmat: uacuarius uero subsidetia relinquit. Hinc fit ut suspensa sentiant uiscera. Quibus autem bilis flaua rursus natat fluctuatque, ante est dictum, meatu bilem ipsam ex hepate ad id intestinum quod Græci *ἔκφυσις* uocant, quasi e uentre enatum dixeris, deferente, neque structuram habente eandem. Nam interdum quibusdam portio aliqua ab ipso ad uentrem procedit. his quidem supernatat biliosum excrementum: cæteris uero deorsum omnino uoluitur.

32 Non igitur intempestiue neque fortes uasorum inanitiones moliri, neque cum morbi uigent, feruoremque habent, cibum dare, neque repente huc uel illuc in toto negotio quicquam mutare licet.

Dictio hæc præter ordinem scripta est, copula siquidem debuit cum ea quæ scripta est ante: ut tota oratio talis foret: Talia uero molestius ferunt qui parte superiore picrocholi existunt. At non

assuetam cibi abstinentiam facilius omnino ferunt, qui parte superiore sunt pituitosi, quo fit ut cibi usum qui semel die sit facilius etiam ferant. Non igitur intempestiue, neque fortes uasorum inanitiones moliri, neque cum morbi uigent, feruoremque habet, cibum dare licet. Nam postea quam sermonem quo magnas uictus mutationes ostendit sanos ipsos, ne dum languentes lacerare, compleuit absoluitque: iure intulit cuius gratia mentio nem de his omnibus fecit iniquiens: non igitur intempestiue neque fortes uasorum inanitiones moliri licet. Quanquam autem & institutum etiam per relata sufficienter demonstrauerit, uidetur tamen & ad alterum transire sermonem qui hæc committit, liberaliter testimonio usus. Principium igitur sequentis sermonis iure censetur dictio hæc. potissimum sanè & hoc argumentum quod maxime mutationes eorum quæ circa naturam nostram habitumque cōtingunt, maxime morbos committunt. Cui quidem dictioni cōtinua fuerit quæ ita sequitur. Multa autem his germana eorum quæ uentri contingunt, atque alia quæ dixerit. Dictionem sanè hanc sum explanaturus, sed nunc ad præsentem reuertar quæ hanc habet mentem. Non intempestiue neque uehementer fame necare, neque in morborum consistentijs uictum ex inedia ad cibi oblationem permutare licet, sicuti neque subito ad contrarium. Ex quibus sequitur talem instituendam uictus rationem qualem is præcepit. Summa autem horum est, declinandas esse subitas repentinasque ad contraria permutationes.

33 Multa autem his germana eorum quæ uentri contingunt, atque alia quispiam dixerit, ut exempli gratia. Cibos quibus uti consueuerunt, facile ferunt, tamen si natura haud quaquam boni fuerint, similiter & potus. Cibos uero quibus uti non consueuerunt etiam si mali non fuerint, moleste ferunt. Consimili modo & potus.

Quæ similia congruentiaque existit, atque ut quispiam dixerit, genere iuncta cognataque, consueuit uocare Hippocrates *ἁδελφικὴ*, id est germana, quod eorum qui genere iunguntur & familiarissimi & genere omnium iunctissimi sunt *ἁδελφοί*, id est germani. Nam propinquitates cæteræ his posteriores sunt, ut patrum matrumque fratres sororesque, & fratrum sororumque filij filiaque, & quæcumque id genus sunt. Cætera dictionis clara sunt. Nā demōstrat Hippocrates sermonem eundem quem ab initio demonstrauit, cuius summa est. Consuetudo maxime potest, repentinaque ab ea digressio corpora non parum offendit.

34 Si ergo multa præter solitum carnis deuoratio, uel alia, uel silphion, uel ipsius fucus, uel caulis, uel alia consimilia, quæ seorsum insignibus sunt prædita uiribus, uetriculis quibusdam magis quam alia labores infert, minus quis admirabitur. Ad iure admi

raberis si didiceris quantam maza turbatio nem, tumorem, flatum, torminaq; mazam deuorare non assuetopariat, si præter consuetudinem ingesta fuerit, uel qualem panis ipse calidus deuoratus sitim inferat, & repentinam plenitudinem, quod tum exicet, tum tarde descendat, & quam uaria inter se pariant purissimi confusaneiq; panes si præter consuetudinem deuorentur, & maza similiter uel arida, uel humida, uel tenax: qualiter item & polentæ afficiant, recentes quidem eos qui recentibus uti non consueuerunt, et aliæ eos qui recentibus ex consuetootuntur. Ad hæc quid faciant uini, & aque potationes præter consuetudinem in aliud subito translata, quid dilutum uinum, meracumq; repente pota. Dilutum enim cum infirmitate humetem reddit uentrem superiorem, flatuosumq; inferiorem. Meracum uero uenarum pulsationem efficit, capitisq; grauitatem, & sitim infert. Præterea quid uinū album nigrūq; præter solitum mutata, quæ etiam si ambo uinosa fuerint, ualde alterant corpus. Quare dulce uinosumq; minus quis dixerit minus esse non idem posse ubi repentina fuerit mutatio.

Sermonis totius sensum intelligentiaq; ubi prius dixerimus, ad particulares quæ in eo sunt dictiones perueniemus. Orationis igitur totius sensus talis est. Victus mutatione in eos qui insigni præditi sunt uirtute, tum cibos, tum potus nemo qui ædentes corpora uiderit, admirabitur: uerū etiam quæ sit neq; sine læsione in cibos potusq; non insigni præditos uirtute, iure quis admirabitur. Talis quidem est sensus totius intelligentia: Sed ut particulatim dicā, orationis totius principium mentionē eorū facit ciborū qui fortem uehementēq; habent facultatem, ut carniū deuorationis, aliorū, silphij, succi eiusdē & caulis. Nepe silphium totum forte habet facultatē, sigillatimq; succus ipsius & caulis. Verum hæc quidē simpliciter dixit, sed cū carniū deuorationis meminit, adiecit hic uerbum multa. Nempe multa carniū deuoratio magnā habebit facultatē, mediocris uero non magnā. Quæ huic succedit dictio ad eos accedit cibos qui non magna cōstat uirtute, mazam uidelicet et panē uel calidū, uel frigidū, uel purū, uel syncomiston, id est confusaneū. Quod panē nō purum syncomiston appellet, cōstat & ex ea quæ ad purum est oppositione. Panem hūc homines huius tēporis autopyron appellant, nō discreto scilicet infuraceo, sed unā cū sincera puraq; farina macerato conpersoq;. Post hæc de polētis mētionē fecit, recentesq; uocauit *νοταίως* Ionum uoce usus & antiquorū.

Memorauit postea & uini & aque potationes præter solitū mutatas. Meraciore itē & diluiores potum. Quibus adiecit dilutū uinum in uentre superiore *πλάθῃ*, id est humiditate infirmitatēq; facere, flatūq; in inferiore. Meracū uero palpitationē temporū capitis grauitatem & sitim, idq; caliditate, dilutū autē contraria tum humiditate, tum frigore. Mentionē quoq; & de uinorū ipsorū differentia fecit, ex his omnibus colligens quod in uniuersum ab initio ipsi propositū institutumq;, omnem scilicet cōsuetudinis subitam permutationē non paruum corpori adferre detrimentum.

35 Cæterum partem hinc aliquā sermoni contrario *τιμωρησιον*, id est iuuare oportet. Nempe his uictus mutatio facta est, corpora neq; ad robur ut cibos adijcere, neq; ad infirmitatē ut cibos diminuire oporteret haudquaquam permutato.

Verbum hoc *τιμωρησιον* opitulandum siue iuuandum indicat. Neq; aut opitulatio alia sermoni huic fuerit præter patrociniū q; uera loquitur. Nempe cum ex duobus sermonibus unus ipsi placuerit, alter uero aduersetur, & ei quidem qui placuit hucusq; est patrociniatus, nunc ad alterius patrociniū descendit, cuius sententia quis cōuenire dixerit ut languentes ab insigni uictus mutatione iuuentur, qñ & corporis affectio in contrariū his quidem qui antea sani uiuebant, nunc uero agrotant, permutata sit. Sanē & in huius sermonis gratiam uniuersaliter antea est locutus his uerbis. Transmutatio autē bene habet non modica, sed *ὀρθῶς*, id est recte transferēda uenit. Deinde quid aduerbium hoc *ὀρθῶς* indicet, nō paucis ostendit, sed ad summam subducens colligēsque dixit: Non igitur intempestiue neq; fortes ualorum inanitiones moliri, neq; cum morbi uigent feruoremq; habent cibum dare, neq; repente huc uel illuc in totū negotio quicquam mutare licet. Quare & ambiguitatē soluere iam anticipat, quā nuper enunciāuit sermoni consentiens. Adijciēq; impræsentiarum aliquid cum inquit: Cōiungere aut oportet & robur, & morbi cuiusq; speciē, & cætera quæ his succedūt, quæ in sequenti dictione explanabo.

36 Cōiungere aut oportet & robur, & morbi cuiusq;, speciē hominis itē naturam, atq; agrotantis in uictu cōsuetudinē, non in diuisis solum, uerū quoq; & in potionibus.

Conuenienti in acutis morbis uictus institutiōni quam docuit, & roboris considerationem, & morbi speciē, præterea & hominis naturam, cōsuetudinēq; ipsius adijcere iubet Hippocrates. Nempe summa quam astruit est, Non permutandam esse uictus speciē priusquam signa cōditionis manifesta sint. Id autem fit, si quot diebus ad uigorem morbus uenturus sit præcognoueris. Verum cum uictus, quē manifestabo, pro maioris minorisue ratione permutari possit, quod laborantes inter se differant uirtutis tum robore, tum infirmitate, naturali item tēperamento & morbi speciē,

atq; antecedente cōfuetudine, si ad ea respexeris, poteris artificiose tū magis, tū minus animaduertere, an uidelicet uel oxyemelite uel melicrato ægrum regere debeas, aut solam aquam bibendam adulescē cōctionis notas dare, aut pīsanā aut pīsanā solū cremorē, deinde an bis aut semel die. In uisū igitur tum magis, tum minus per ea quæ dixit cōficere oportet. Nam si ægrum pīsanā cremore indigere cōperias, iam tibi nō etiā constat quantum de eo sis propinaturus. Consimili modo de oxyemelite, melicrato, & aqua. Verū quomodo ad generis uictus inuentionē operapretū est ut cognoscas an robusta uel infirma sit laborantis facultas, quot itē diebus morbi cōctio futura sit: sic & considerandū quantū uel robusta, uel infirma fuerit. Nempe in uirtutis tum robore, tum infirmitate magis & minus ualde discrepāt. Sic morbi quoq; discrimina differentiasq; conijcere oportet. Neq; em̄ satis est cognoscere q̄ pleuritis uel peripneumonia sit, sed & qualis nam sit cognoscere oportet in dolore, febre, & spūitu. Nempe pleuritidū quæ cum dolore sunt, aliæ quidē magis, aliæ uero minus tales existunt, febremq; uehementē habēt tum magis, tū minus particulares pleuritides. Cæterum non parua est in ijs quæ expuunt differentia, ut in Prognostico est dictum. Cum igitur partīcularim in dictis differentijs uariēt ægri, fieri nequit ut in Empiricorū appellatis syndromis reperiantur disciplina. Neq; enim eorū qui in uirtute cōperiuntur excessū differentie scribi possunt, neq; febris uehemētia, neq; sputorū quantitas, neq; in particularib. coloribus, dissimilibusq; educationibus magis minusq;. Verū cuiusq; rei uirtute intellecta, omes inter se cōparare, summāq; omnem ex ijs colligere oportet. Qua quidem in re tum meliores, tum deteriores reperiunt medici, quanquā eadē didicerint. Nempe qui perspicaci magis pollebent sensu, ijs qui hebetiores habent, euadunt probatores: laboris item amatores, legnioribus, exercitatoresq; minus, exercitatis: atq; qui memoriam tenaciore habent ijs qui minus ea ualent. Ex particulariū igitur omniū uirtute colligere in sum inam omnem formā totam singulorūq; ciborum quantitatem cōmodius est. Nam imbecillitas sapius quidē, sed paulatim cibandū indicat. Fidēq; rei huius facit q̄ æger his cibari suetus sit. Facultas autē robur cōtrariū indicat. Nam si in homine semel cibari sueto uideatur, semel ipsum cibare oportet, qd̄ indicant ambe cōiecturæ. Sic & corpus bene dissilabile ad cōbationē stimulat. Quod ægre dissilatur, ad contraria agit. Quod itē tenues habet succos, id cibādum indicat. Quod his non cōstat, cōtrarium cōmonstrat. Atq; unumquodq; ex his quæ dicta sunt, magis minusq; proportionaliter si bi & auxiliōriū usum tum auget, tum remittit. Sed de huiusmodi, omnia in Methodo medendi deinceps & ordine ita exarata sunt, ut tū citissimè condiscere, tū facillimè ad memoriā reuocare possis. fieri siquidē nequit ut libro uno præsentī bene omnia scribat Hippocrates, atq; ordine doceat, utpote qui primus horū inuentionē sit molitus. Qui

tamen hæc ab Hippocrate tum transuersum, tum inordinate scripta didicerit, totamq; suam uicā in eam quæ ex operibus doctē meditationē exercitationemq; deuouerit, is & lucē & ordinē doctrinæ adijcere poterit. Quod si & pluribus libris fecerit, quanta futura sit claritas eorū quæ docentur exuperantia, liquidū patet. Nemo ergo animum despondeat, si hinc confundatur scoporum multitudinē affatim circumseptus. Nam si quod particulatim horū unūquodq; a nobis in Methodo mendendi demonstratum sit intellexerit, atq; ad illam translationē laboriose singula didicerit, ea sanē quæ nunc in compositis inordinateq; dicuntur liquido cognoscet, speculationēq; in ipsis artibus operibus exercens ueritatem ipsius laudabit.

37 Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus, subtrahere uero omnino sapenúmero expedit, cum æger sufficere possit donec morbus maturescat.

Quoniam uictus cuiusq; species ex ijs quæ antea dixit inuenitur, atq; inde quæ in ante scripta dictione referuntur, conijcere operapretum sit, ut in singulis uictus formis quantitas reperitur, præsentī dictione. Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus, prorsus uero subtrahere se penumero expedit, cognoscēs prædictorū singulorū quantitatem artificiosa egere cōiectura. Artificiose autē cōijcere uiri esse, qui uires omniū quæ in arte sunt didicerit, memoriā mādauerit, atq; diligentia omni adhibita sese in operibus artis exercuerit, pauciq; tales existit, iure optimo quæ præsentī in quā dictione referuntur ascripsit, in quantitate ipsa ad id quod minus sit procedendum esse magis q; ad id quod exuperat ubi quis a iusto modo abscedit, admonēs. Nempe quod plus est, exuperatq; noxas interdū inemendabiles facit. Verū quod minus est, facile emēdatur. Nempe si uirtus labare uideat, cibi exigui in super ministrare possumus. Verum si in uentre absorptus fuerit cibus, quod redundat superfluitq; sialias, multo magis in acutis morbis tollere est difficile. Nempe prorsus subtrahere sapenúmero expedit, cū æger sufficere possit, donec morbi uigor ad maturitatem perducatur. Rursus præfata dictionis partē hanc assumpsit nos familiaris huius scopi admonēs qui tum hic, tum in aphorismis habetur. Nempe si æger ad morbi usq; uigorē sine cibo sufficere possit uideatur, in omni ciborū abstinentia eum & potu solo moderaberis, cum tibi uidebitur necessitas.

38 Quibus autē id faciendum sit, scribetur.

Quod prædixerit Hippocrates cōmonstrata uersali uictus ratione in hoc libro se trāsiturum ad ceteras omnes acutas ægritudines, liquido constat. Veruntamen opus huiusmodi non reperitur: Nempe quæ in hoc libro à balneorum consideratione extant, si quis ueluti in typo ab Hippocrate ad futurā memoriā scripta, in domo reperies post uiri mortē deprompsit: forsā ratione quidē hoc fecit, ueruntamē ut liber digna Hippocratis men-

te non sunt, sicuti neque ea quæ de morbis & affectibus inscripta sunt, quanquam multa in his bene scripta sint. Sed super ea re in ijs quæ in ea scripta sunt expositione discipulimus.

39 Multa autem & alia ijs quæ dicta sunt, germana quis scribere potest.

Rursus ad eum reuertitur sermonem quem multis certum ratumque fecit exemplis, mutationem consuetudinis languentibus noxam asserere demonstrans, sed quoniam a sanis in eos transiit, ob id quæ similia sunt & congruentia bene *ἡδελωσιμῶν*, id est germana dixit: Quod autem postea dicturus est, sermone huius testimonium existit, quantum non simile, non congruens, nec germanum, ut ipse appellauit, sed id quod peruestigatur. Patebit autem tibi mens Hippocratis in sequentis dictionis expositione.

40 Hoc autem uerius efficaciusque testimonium. Neque enim rei de qua plurimum factus est sermo germanum existit, sed res ipsa commo- dissimum est documentum. Nempe quidam per morbi acuti exordia eodem quo laborare coeperunt die comederunt, alij postero die, alij quiduis, alij cyceonem sorpserunt. Sanè hæc omnia deterius quidam habent quam si modo alio cibaretur quis, sed quæ hoc tempore peccata fiunt, ea minus multo lædunt, quam si prius quidam diebus, uel duobus, uel tribus uasa quis integre exinaniuerit, mox quarto uel quinto talia ministrauerit. Sed sanè deterius aget qui omnibus his diebus uasa ante exinaniuerit, & sequentibus quibusdam diebus ita pauerit prius quam morbus maturus reddatur. Nempe hoc pacto mortem plurimis liquido affert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ uero in principio committuntur delicta, ea non similiter his domantibus res nituntur, sed facilius domari possunt.

Ante ab ijs quæ bene ualentibus ex consuetudinis mutatione contingunt, ad languentes ipsos per similitudinem transiit, transiuntur autem & nunc, atque ipsum quod nunc instituitur ferè ita habere est demonstraturus. Sed quid nam id fuit? sanè quod neque a principio neque primis diebus fame cruciatos ægros cum prope uigorem iam peruenierint, replere oportet. Tota autem dictione uult ostendere grauiorem contingere ægris offensam cum prope uigorem erratum sit, quam si in morborum principijs quippiam delinquatur. Inquit enim: Quæ hoc tempore peccata fiunt, ea minus lædunt, quam si primis diebus, duobus uel tribus uasa quis integre exinaniuerit, mox quarto uel quinto talia ministrauerit, atque etiã ante quam morbus, ut Græco uerbo inquit, *ῥηπιδος* reddat. Quod *ῥηπιδος*, appellet *ῥηπιμῶν*, id est quod ad maturitatem est perductum, palam est omnibus. Morbos præterea *ῥηπιδος*, id est beneficos dixit, non quidam ma-

lefcicos morososque, quos Græci *κακοῦς* uocant, sed *ῥηπιδος*, id est qui facile ad bonum uergunt. Scimus etenim ueterum multos ita uti dictione, ita quoque & Hippocratem, ut alibi est dictum.

41 Hoc sanè maximum reor esse argumentum quod primis diebus quauis sorbitione ne nequaquam eos priuemus, quibus futurum est ut paulopost sorbitionibus quibusuis uti debeant.

Sermonem hoc in loco eum dixit quem sapius antea demonstrauit, nutrire scilicet sorbitionibus, ab initio præcipiens eos qui ad uigorem usque sufficere citra pitisanæ ingestionem non possunt. Nam eos prope uigorem nutrire compellemur, cum ad tenuiorem uictus formam, etiam si antea plenius cibati fuerint, transeundum sit.

42 Funditus ergo qui hordeacea utuntur pitisana male passuros ægros ignorat, si duobus uel tribus diebus antea exinaniatis uasis sorbere incipiat: neque etiã qui solo utuntur cremore quod sorbentes læduntur, intelligunt, cum sorbitionem non recte inchoabunt. Sed tunc cauèt magnamque intelligunt læsionem, si æger ante maturationem morbi pitisanam hordeaceam sorbeat cremore uti suetus. Quæ omnia efficaciter demonstrant medicos non recte ægrotantes ad cibos inducere, quippe qui uasa exinaniat in his morbis, in quibus sorbitionem exhibere oportet. Et contra in quibus ex uasorum inanitione ad sorbitiones transeundum non sit, in illis transeant.

Aduerbium hoc *παρρησιας*, id est funditus uel *παρρησιας*, id est omnino, uel *ἄρρητος*, id est ab initio Hippocrati indicat. Nam medicos ignorare ait quando primum uel pitisanam, uel cremorem ægrotis dare oporteat, bene tamē scire si ante morbi cōtentionem pitisanam hordeacea dederint, se ægrum læsuros. Sequētem autem dictionis huius seriem quæ eadem ex eisdem sapius dictis ostēdit de industria ob claritatem transgrediar.

43 Et ut plurimum *ἀσπείρι*, id est exquisitè. Interdum autem hoc tempore, interdum & alio ex uasorum inanitione ad sorbitiones transeunt, ubi sapius a sorbitionibus ad uasorum inanitionem transire expedit, si ita ex morbi exacerbatione contigerit.

Hoc aduerbiū *ἀσπείρι* & apud autores atticos, & apud Hippocratem pro *ἀσπρῶσιμῶν* uel *ἀσπρῶν*, id est exquisitè & absolute. In quo significat & nunc est usus Hippocrates, demonstrare uolens medicos in illo maxime tempore permutare uictus rationē ex abstinentia cibi ad sorbitiones, quo ad abstinentiam accedere oportet. Atque hinc manifestissime offendens cum morbi uigor adesse, tunc tenuissimo de necessitate uictus esse tuendum.

44 Interdum autē & cruda tum à capite, A
tum à thorace attrahūtur biliofa, uigiliae
his accedūt, ob quas nō coquitur morbus,
tristesq; & amari hi fiunt, desipiunt, incerti
& discurrentes lucis splendores oculis obij
ciuntur, aures implentur sono, frigēt extre
ma, urinae crudescūt, sputa tenuia fiunt, sal
sa, colore syncero & exigua, sudores circa
collū, anxietates inquietationesq;, & spiri
tus offendens in ea quae sursum fit aeris lo
tione frequens uel magnus, supercilia quae
dantenus amplificātur, deliquia animi fiūt,
uestiū à pectore reiectiones, manū tremor, B
atq; interdum labij inferioris concussio.

Vniuersa haec contingere his ait qui perperam
cibati sunt à medicis, qui primis diebus ueloxes
egros die tertio uel quarto, uel quinto, ex thorace
pente ad edulia nō peracto morbi uigore permu
tauerūt. Quasi peractio morbi uigore, conuenien
ter eos uictum permuasse dicat. Quod autē dice
bat: Permutare quidem oportet sanorum uictum
in morbis, neq; tamen temere id agēdum, iam pa
tere ex praedictis arbitror. Nempe cū una quidem
corporis cōditio sana sit, altera quae à morbi initio
ad istum usq; extendit, mox & tertia quae ad per
fectam usq; morbi solutionem sese prorogat, dein
de & quarta quae totius conualescentiae tēpus ad
usq; sanitatis habitū occupat, in nulla harum qua
tuor cōditionum permutationes uictus insignes
facere oportet, nisi prius in alterā conditionis spe
ciem peruentum sit. Qui igitur aegrotos morbo
rum exordijs in omni ciborum abstinentia seruāt,
si ad uigorem usque talem uictus speciem seruare
possint, nemo eos culpauerit. Quod si facere non
possunt ob interlabentes aegrorū uires, quod per
peram inedia utantur *περὶ ἐξήντητες*, id est ex
siccantes aegros palam est omnibus. Hoc autē uer
bo abstinentia importunitatem plus iusto corpus
exsiccantē euidenter demonstrat: ubi etenim quo
tempore prope uigorem tenuius cibandum fuit,
in eo cibū dare coacti sunt, quod aegros abstinen
tia immoderate exsiccauerint est manifestū, quod
uocatur *περὶ ἐξήντης*. Ob id igitur modo cibandi
huic succedere ait symptomata multa, & praua:
quae omnia continuata recenset serie à biliosis cru
dis exoritur. Nepe biliofa cruda ita appellat quo
niam & excrementorū coctionē appellat, quan
quam mutata corpus nutrire non possunt, ut bilis
utraq; & serosi humores qui graece *ἰχθῆρες* dicun
tur. Veruntamen quoniam & talia euincit natu
ra, cocta quidem uocare consueuit Hippocrates
excrementa huiusmodi, quae à natura ipsa euicta
sunt, cruda uero quae non sunt euicta. Ob id & pus
in phlegmone quae concoquantur fieri ait, quan
quam pars nulla ex pure alimoniam excipiat, ue
luti accipit ex crudis appellatis humoribus & pi
tuita, quae reliquum perfectionis assecuta & pror
sus cocta, corpus nutrire possunt. Sic igitur & bi

liosorū humorum concoctio existit, ut sanguinis
qui in phlegmone est in pus migrantis: intelligen
tibus nobis coctionis nomen in suo uniuersaliore
significato. Est autē uniuersalius, cum natura cau
sis fortior fuerit, permutaueritq; eas suo robore.
Quae igitur ueluti in anima carēte corpore putre
scunt, nihil ad permutationem conferente innato
calore à coctionis ratione degenerāt: hoc sanē
contingit etiā aquosis his humiditatibus quae per
urinas excernuntur: atq; ob id crudas urinas con
coqui dicimus, quanquā corpus ex coctis urinis
ali non possit. Generali praeterea hoc concoctio
nis significato utimur, cum uel catarrhū, uel cōry
zam, uel fluētes ex ulceribus humiditates, uel eas
quae ex oculis manāt, aut crudas aut coctas esse di
cimus. Ad hunc modum & bilem uel crudam, ac
incoctā, uel coctā esse pronunciamus. Cruda qui
dem flaua admodū est & acris & male olens. Co
cta autē & pallidior & minimū male olens. Bilem
igitur crudam incoctamq; ait ad uentrē de neces
sitate cōfluere, quae ob prauā uictus rationē tum
ex capite tum ex thorace trahitur, idq; cum fame
aegros necant, nullō utili solatium uentri praestan
tes, atq; cum ex inedia ad ualidos cibos prope ui
gorem intempestiue transeūt. Recenset deinceps
& symptomata alia, quae prauam ob uictus ratio
nem oriuntur. In primis quidem uigilias, quae lon
gam inedia, cibosq; intempestiue exhibitos cō
sequūtur, quae utraq; medicorum culpant uictus
rationem. Quod autē uigilias morbi cruditas con
sequatur, manifestum sanē existit si somnos cō
coctio sequi debeat. Ceterum pertristes inquit fiunt;
tūm ob longam inedia, tum ob ualidum repen
tinum alimentū quo grauatur uenter, grauatusq;
tristes reddi & moestos. Adde quod et amarus fie
ri ait, quiddam manifeste praefato consimile astru
ens: ut etiam sunt qui ex melancholia moesti fiunt,
sic alij quidem saepius acriter excandescunt, tan
quā collecta aceruaq; in stomacho bile. Vel fan
tali cum amarus fieri ait, eam quae in ipsorū ore ex
tali bile fit amaritudinem indicat. Desipientia &
acres excandescencias & bilem amarā uel in sto
macho, uel in cerebro collectā, cōsequi nate sunt;
Incerti & discurrētes lucis splendores qui *μαγνῶ
ντες* Graece dicuntur; oculis fiunt propter eam
quae à uentre est exhalationem euaporationemq;
& propter sanguinis qui ad caput fertur, abundan
tiam. Atq; ex his prius quidem ex importuna in
terdum fit ciborum oblatione, alterum autē pro
pter eam quae commodo futura sit sanguinis eru
ptionem, uel delirium imminens. Consimiliter &
aures sonis implentur, tum propter eos qui à uen
trē sursum feruntur uapores, tum propter flatu
sum spiritū qui in capite ipso oritur. Corporis ex
tremā quae sunt pedes & manus prompte perfrige
re, male habēte uentris ore haudquaquam nos
praeterit, utpote cum uel propter longā inedia
uehementē à mordētibus mordetur humoribus,
uel ob importunā cibi multitudinem grauatur.
Paenit autem utrunq; ex ea quae antedicta est ui
ctus ratione, qua medici aegros primis diebus ubi
fame

fame exsicauerint, tūc cū tenuiter cibandū sit, ad frumētacea repente trāseunt edulia. Ob eandem rationem neq̃ eorum qui ita cibantur, urinā concoquuntur. Nam in ea quæ citra uel cremoris pitisanæ, uel melicrati, uel oxymelitis oblationem sit exiccatione, sanguis propterea quod non purgetur bile scit, propterq̃ subitā ad esculentā permutatiōē uenter cōpatiente ipsi facultate uitali grauatur. Quo fit ut stomachicę appellatę syncope manifestō nobis indicent facultatis uitalis ad os uentris condolentiā. Hoc siquidē tum magis, tum primum ex importunis, tum inedijs tum cibis affligitur. Ob id igitur sputa, & tenuia, & salia, & parua, & syncris coloribus fieri ait, & sudorē circa collū duntaxat, & anxietatē inquietatiōēq̃, & spirādi difficultatē. Crudus siquidē manet morbus propter excessum utrunq̃, longā scilicet inediā, & intempestiuā cibi oblationē. Cruditatem autē ipsam consequuntur sputa cōmemorata, ueluti & circa collum sudores, uirtute & ob famis anginā lāguēscēte, & ob cibū intempestiuū grauata. Cōsimili modo & anxietas inquietatiōq̃ quā grece ἀσπῆν dixit, cōmune est utriusq̃ symptoma, & ob lōgam inediā quæ uentrē humoribus replet, & propter cibū intempestiuū grauantē. Verū spirādi difficultas qua spiritus offendit, ob cibū intempestiuū magis q̃ ob indigentia oritur. Nam spiritū inter inspirandū & offendere & quasi sisti, tū angustia, tum cōuulsioni est nota. Latio etenim quæ sursum fit, expirationē facit. Tali autē spiritui cōtrarium tum in secūdo tum in sexto De morbis populariter uagantibus libro percurrit inquirēs: Duplex intro reuocatio ueluti insuper inspirantibus. Quod autē ob cibū intempestiuū & nō propter penuriā talis fiat spirandi difficultas, patet ex sermōe Hippocratis spiritū frequentē uel magnū ualde perperā cibatis fieri asserētis. sit siquidē frequens magnusq̃, aēto in angustia septo trāuerso ab ea quæ in uētre continet alimonia, cum uidelicet neq̃ uicta, neq̃ probe a uentre cōfecta inflationem parit. Nempe tunc ob septi trāuersi angustia de necessitate minus aeris inspirat, quanquā thorax se ea qua prius dilatabat, dilatatiōē dilatet. Ergo quod nūc aeris deest priori qui inspirabat, id deficientē diminutumq̃ respirationis usum facit, atq̃ ob eam rem animal maiorem respirationē facere cogit, uel frequentiorē, uel utrāq̃. Dicitū autē abūde de spirandi difficultatibus omnibus, in libris De spirādi difficultate, ubi tum harū, tum aliarum difficultatum spirandi causas unā cum proprijs demonstrationibus scripsimus: uerum quantum ad præsens attinet, hæc sufficiūt. Ait præterea & ex præpostero cibatu supercilia quadantenus amplificare. Verū id bi fariā scriptū inuenitur. Nempe in quibusdā exemplaribus singulari numero ad hunc modū: Supercilium quadantenus amplificatur. In cæteris uero pluraliter, Supercilia quadantenus amplificātur. Significatur autē ex ea dictiōne supercilia ipsa quodammodo distrahi uel retrahi. Fitq̃ illud interdū quidem ambobus cōuulsione intentis, aut altero solo: interdum autē & altero resolutō. Deinceps

ait deliquia animi fieri, sermonē ad symptomata referens, per quæ & uestium reiectiones fiunt ardentibus ægris. Interdū autem & manus tota tremula fiunt, plus aucto malo. Concusio autem labri inferioris, morsum in ore uentris uehemētē significat. Quo fit ut tale symptoma, uomitus acrium humorum etiam signum sit.

45 Hæc si ab initio apparuerint, delirium graue uehementēq̃ indicant, atq̃ ut plurimum ægri moriuntur.

Dicta, inquit, symptomata si circa morborū initia fiant, deliriū uehementē denūciāt. Morbi initium nunc intelligere oportet totū illud tēpus in quo nondū existit cōcoctiōnis nota. Nempe & in libris De iudicatiōibus dictū est nomen principij & plura significare, & significatum quod nunc dictum est, secundū eam esse diuisionē qua morborum tēpora diuidentes morbos ipsos consistere ex principio, augmētō, uigore, & declinatione asserimus. Ergo cum nuper dicta symptomata ubi prope morbi uigore apparent, indicationē futuram constantibus in morbis significēt, sanē si in principio fiant, iudicationē quidem nō denūciant (nihil em̄ in principio iudicari potest) sed deliriū notā existunt. Scriptū autē & de his abunde in libris De iudicatiōibus, ex quibus totū qui de his sermonē perdisces, cum illic plenior sit q̃ ut nunc omnino percurrere oporteat. Sed sanē ut in cæteris, ita in his summatim perstringere satis erit. Ergo quoties natura ad excretionē properat, effatū digna in corpore sit perturbatio, ob quā symptomata huiusmodi cum manifestissimis cōctionis signis apparēt. Verū cum perturbatio efficitur similis, nullo à natura ad instantiū excretionē facto apparatu, tunc periculossimū est signum. Dicitū iam & cæteris in cōmentarijs De ueriosis, id est iudicatorijs symptomatis qualia sint, & quantā ipsorum natura, et quonam pacto ab his differant quæ ὑπερφανέμενα, id est superapparentia uocant, quo in genere erūt, & ipsa cōctionis signa. Nempe & Prognosticū, & librum De humoribus, & Aphorismos iam ante hunc librum exposuimus. Sanē semper de his eadē dicere ad eum spectat qui prolixioribus uti consueuit sermonibus.

46 Qui autē euadunt, hi uel cum abscessu uel sanguinis è naribus fluxione, uel puris crassi expuitione euadunt, neq̃ aliter.

Cum mori ipsos dixit, nō simpliciter dixit, sed ut plurimū ascripsit: quapropter quonam pacto quidā ex ipsis seruentur dicere sequens erat: quos nunc percurrit, atq̃ quosdam ex ipsis seruati, aut per sanguinis eruptionem, aut per abscessum, aut puris abunde cocti expuitionem, simul ex his quæ retulit egros in huiusmodi symptomata incurere propter multitudinem, significans.

47 Neque sanē horum ita peritos uideo medicos, qui ut oportet dignoscāt eas quæ in morbis contingunt uirium infirmitates,

& quæ ob uasorū inanitionē, quam *κενωσις* *γίνεσθαι* dicūt, & quæ ob aliam quampiā irrationē, & quæ ob *πόνον*, id est dolorem, & quæ ob morbi acumen fiant. Quas itē natura nostra habitusq; singulis affectuum species, omnigenas fabrefaciat, quāuis cognita salutem, & mortem ignoratæ ferant.

Quoniam de ægri robore imbecillitatē sermonem fecit, qui uictus scopi sunt non cōtemnendū, ob id nūc sermonem de imbecillitate repetit, quibus hæc fiat modis medicos cognoscere debere asserens. Nemp̄ quod quādam fiat ob uasorum inanitionem, hoc enim uocabulum *κενωσις*, id proprie & primū significat, atq; ob id *ἀντία*, id est ciborū abstinentia *κενωσις*, id est uasorū inanitione dicitur, tanq; nomine generis etiā in specie homines omēs uti cōsueuerint. Alia aut̄ ob *πόνον* id est, laborē, seu propriē dicitū ut dolori idem sit, seu ut quispiā dixerit, malā affectionē, qua in acutis morbis male ægri afficiuntur. Alia præterea uirum imbecillitatē ob aliā quādam fieri ait irrationem. Nam si morbum dixit ut uentris, uel inteſtinorū, symptoma hoc sub dolorū nomine intellectū est uisus. Verū si uel uigilias uel oris uentris affectionē dixit, nō proprie interpretari uisus est. Cæterum uirtus exolui uidetur, & ob euacuationem quæ fit uel sanguinis eruptione, uel uomitu, uel deiectionibus, uel sudoribus, & ob longiorē quā par sit inediā, & propter tum dolorem aliquem, tum uigilias, tum assiduas purgādi uentris suscitaciones, atq; etiam cum os uentris ita affligitur, ut syncope insultet, idq; uel propter grauātis alimonie multitudinē, uel contristatē quādam ipsius qualitatē. Nemp̄ hæc uirtutē celerrimē tū fatigant tum dissoluit. Omnes igitur hæc uirtutis offensa ex manifestis quidē sunt causis, sed aliæ ex nō manifestis, ut quādo absq; manifesta uacuatione, uel uigilijs, uel inediā, uel oris uentris sensu ægri ad tale subtrahunt corporis affectionē, qualē in Prognostico scripsit Hippocrates inueniens: Natis acuta, oculi cōcaui, collapsa tēpora, & quæ deinceps sunt. Nam hæc corporis cōditio fit quidē & ob uigilias, & ob excretionē quādam quæ multat sit, & ob inediā: fit quoq; & absq; his, cum scilicet corporis humores tēnues fuerint, & febris caloracris. Nam euaporantur qui ita extenuantur per insensibilem euacuationē. Cæteris autē & ob intemperatū principis unius partis affectū imbecilla redditur facultas. Primū siquidem affecta prima laborat, deinde affectuū participatiōe & reliquæ duæ. Didicisti em̄ unā esse in neruis facultatem quæ principium habet cerebrum, alterā in arterijs cuius principiu est cor: tertiā uero in uenis quæ ex hepate oritur. Ergo partis unius queuis illa fuerit, intemperatura propriā interdum facultatē uiolauit, cui affectus participatione consenserunt reliquæ duæ facultates. Velocissimā igitur sunt, corde patiente, mortes. Deinde, affecto cerebro. Tardissimā ab hepate prodeūt. Ut em̄ partes hæc

A intemperie affectæ maximā facultatis unaquæq; suæ offensam incurrunt, sic partes aliæ principio unicuiq; proprius appositæ si forte intemperatū affligantur, uirtutum principia ad sympathiam agunt. Sunt etiā aliæ quæ quāuis propius appositæ nō sint, ob generalem tamen cōmunitatem uel quādam affectiōis proprietatem partes uirtutū principia cōtinentes lædūt. Os igitur uentris cum uitalem facultatē ad sympathiā agit, syncopas interfert; cū uero propriē animalē appellatā, desipientias uel conuulsiones. Vterus interdū & apnceas, quas non spirationes propē dixeris: interdum & neruorū contensionēs. Verū singula hæc cōpleta simpliciter cognoscuntur: cum uero fiunt & sensim increscunt, medicos plerosq; latent. Quæ sanē non quando ob magnitudinē auxilio iam carent, tunc cognoscere oportet, quod uulgo contingit, sed & cum incipiūt, & fiunt, hoc siquidē optimū est. Quod si fieri nō potest, saltē omnino cum increscunt, dignoscere est necesse. Sanē hæc omnia Hippocrates significasse mihi uidet cum inquit. Quas itē natura nostra habitusq; singulis affectiōnum species omnigenas fabrefaciat: ubi naturam temperatū dixit, & habitū struem corporis cōpositionēq;. Nam quārā ex natura habet texturem, tum euaporant, tum syncopā facile incurrūt. Qui uero densiore constant textura, hi in morbis cunctantur, diutiusq; trahunt. Sic autem & partes nōnulli habent, alias quidē frigidiores, alias calidiores, alias sicciores, & alias humidiores: sed omnibus peculiaris temperamento morbus.

48 Ingens siquidem malum est si ob dolorem morbiq; acumē imbecillitatē porrexit, quis potū uel sorbitionem copiosiore, uel esculentū, imbecillitatem eam ex uasorū inanitione contigisse arbitratus. Neq; sanē calumniam effugere potest, qui ægre ualentem ex uasorum inanitione nō cognoscit, torquetq; uictus genere. Periculum siquidem adfert erratū hoc: sed longe minus q̄ alterum, atq; risu dignū magis. Nam si medicus alius uel plebeius ægrū interuiserit, cognoueritq; ea quæ contigerūt, dederitq; tum edendū tum bibendum quod alter uertuerit, is præsidium attulisse existimabitur. Talia autē maxime ab his uituperantur hominibus, qui res ad nigrū uertūt. Nēpe qui ægrum interuisit uel medicus uel plebeius, hunc a mortuis suscitasse ipsis uidetur.

Ob dolores sepius ægri sine pulsu reddunt, animiq; deliqua incurrūt, & nullo pacto queūt mori, similiter & ob morbi acumen. Sunt autē quibus nō ob hæc uirtus offendit, sed ob uasorū quomodolibet factā euacuationē. Siue igit̄ ob euacuationē sensui manifesta, siue ob eā quæ per halitū fit discussione, siue ob inediā uirtus labefacta fuerit: qui ita affecti sunt, cibari q; celerrime exposu-

lant. Contrā autē qui ob dolorē uel morbi acumen parū ualentē habēt facultatē, uacuationē interdum magis q̄ repletionē indigēt. Imō qui cibū his exhibet, maximū adfert detrimentū. Verum qui ex uā forum inanitionē parum ualent, hos si quis diēta tenui prefferit, lædet; quanq̄ non æque euidenter uel celeriter. Ignorare autem si æger parum ualeat ob uacuationē, magis q̄ ob dolorem, probro uertitur. Cætera dictionis manifesta sunt.

49 Scribemus autem & horū notas, quibus singula dignosci possint.

Rursum & hic pollicetur Hippocrates, sicuti paulo ante, se librum alium quendam De morbis acutis scripturum.

50 Similia porro ijs quæ uentriculo contingunt, hæc existūt. Nam si corpus totum præter consuetudinem, ualde quieuerit, nō confestim robustum magis euadit: quod si diutius ociatum ad labores sese repente uertit, uile profecto quippiā euidenter operabitur. Ita de cæteris corporis partibus est existimandum. Nempe & pes, & cæteræ quæ articulis præditæ sunt partes laborare non consuētæ, tale quippiam patiuntur si post longum tempus ad laborem subito se uertant. Hæc tolerabunt oculi & dentes, & quicquid homini est: præterea & cubile præter consuetudinem & molle & durum, laborem facit. Quod item sub diuo est, præter solitum corpus indurat.

Rursus ad institutum redijt Hippocrates absoluto De uirtutis imbecillitate sermone, quem per digressionem à pristino mutauerat instituto: atq̄ quæ nunc dicuntur similia quodammodo esse ijs quæ uentri contingere antea dicta sunt. Nempe scopum dirigit ad summam eam in qua mutationes subitas magnam languentibus adferre læsionem astruit. Quod autem hoc in loco scribit, huiusmodi est. Vt uenter diutius omnino ociatus functionem perficere probe non potest nisi prius sen sit rursum assuescat, & suas exerceat operationes; sic corpus uniuersum singulæq̄ alie partes. Dein de & partes aliquas serie continuata nominatim commemorat, atq̄ tandem in fine sermonis, eius quæ in cubili sit mutationis mentionem fecit, astringens sanē & nunc quod ab initio de consuetudinis mutatione est ab eo propositum.

51 Sed horum omnium exempla quædam perstringere satis fuerit. Nam si quis ulcus neq̄ admodum insigne, neq̄ ualde uile in tibia acceperit, fueritq̄ homo cui neq̄ admodum difficulter neq̄ ualde prop̄te ulcera sanētur, & prima protinus die ita iacens curetur, ut nequaquam crus tollat: hoc sanē pacto sine inflammatione manebit, citiusq̄

sanitati restituetur q̄ si obambulans curetur. Quod si uel quinto uel sexto uel superiore adhuc die surrexerit, atque ambulare uoluerit, magis dolebit q̄ si statim ab initio obambulans curatus fuisset. Porro si & multū & repente se fatigauerit, multo magis dolebit, q̄ si illo modo curatus in diebus huiusmodi sese lassum et defatigatum reddiderit.

De repentina adhuc mutatione ut antea in exemplis alijs, ita & nunc in ulcere sermonem facit Hippocrates. Nam si quispiam, inquit, ulcus in tibia habēs, qui & quiescere et iacere indiget, quie te ambulet (hoc enim significat *πνευμὸν* & *ἰσχυρὸν*, id est obambulans curetur) lædetur quidem profus: sed minus quam qui primis diebus quieuerit, deinde subito circa quintū uel sextum diem etiam *ἀνωτέρω*, id est superiore, tertium uel delictum uel quartum ambulare cœperit. Sunt qui uocabulum hoc *ἀνωτέρω* de sequentibus dici debus existimant, septimo scilicet, octauo & nono: quod si ipsis placebat, eos principij dictionis per *ἔξω* & *ἰσχυρὸν* & non *ἀνωτέρω* per *α* & *ἰ*. Quid igitur dicent? Num & tale fieri aliquādo poterit ulcus, ut etiam si quis septima, aut octaua obambulare incipiat, ubi antea quieuit, non parum, sed etiam multum lædatur? Ita sanē sentio, si ulcus magnum fuerit, ut laboras fuerit unus ex his quibus ulcus difficulter curatur, & magis si ambo concurrerint. Quod si neq̄ ulcus magnum fuerit, neq̄ laborans fuerit qui difficulter ulcera curentur, curetur autē conueniēter (nam & hoc subaudire in sermone oportet) iam circa septimam aut octauā bene habebit, & ambulare citra læsionem poterit. Quam ob causam sermoni adiecit, Vlcus neq̄ admodum *ἐπίμαχρον*, id est notabile insigne, neq̄ ualde *ὀψιθόν*, id est uile: simplex scilicet *ὀψιθόν* uocans. Fueritq̄ itē homo cui non admodū difficulter ulcera sanentur. Is siquidem si nihil aliud circa curationem erratū sit, solum quia mediocriter ambulet, quum decubere deberet, lædetur quidem: sed non ita grauiter ut si primis diebus quieuerit, mox tertia uel quarta uel quinta uel sexta obambulare cœperit. Qui uero magnū ulcus habuerit, & is sit cui difficulter ulcera sanentur, non mediocriter, sed grauiter lædetur ab initio obambulans: ueluti & qui paruum ulcus habuerit, atq̄ is sit cui facilliter admodum ulcera sanentur, si primis diebus quieuerit, & quinta uel sexta ambulare cœperit, non grauiter, sed mediocriter offendetur. Ob eam igitur causam Hippocrates de eo qui in utraq̄ oppositione medium obtinet, sermonē fecit. Oppositionē autem dico, tum eam quæ in magno & paruo ulcere comperitur, tum eam qua homo dicitur *δυσχελὴς* & *ὀυλκὴς*, id est cui tum difficile, tum facile ulcera sanantur. Quod nihil referat dicere insigne ulcus, uel magnū palam est. Nempe *ἐπίμαχρον*, id est insigne, aut propter loci naturam tale sit, magnum ex potentia fiens etiam si diuisione corporis paruum sit, aut ipsa diuisionis magnitudi-

tudine insignis fieri poterit. *ἄλλω* uero, id est uile quod simplex est & paruū uel propter loci naturam quæ uilis & abiecta est, uel propter diuisionē ipsam paruam factam, dicitur.

52 Omnia igitur hæc inter se subitam omnem supra modum huc & illuc mutationē nocumentum inferre perpetuo testantur.

In exēplis singulis præsentis sermonis mentionem facit Hippocrates, quapropter & nunc in exemplo quod de ulcere facit, idem est executus. Nempe *ὅτι πλεον*, id est perpetuo idem significat quod *ὅτι παντός & ἅς*, id est ubiq; & semper.

53 Multiplex itaq; in uentre est læsio. Nā si ex multa uasorū inanitione repente quid plus iusto ingeratur: similiter si reliquū corpus diutius ociatum subito ad laborem uehementem sese uerterit, multo magis lædetur quā si ex multo cibo ad uasorum inanitionem transferatur. Corpus reuera his cessare oportet, etsi ex multa fatigatiōe subito ad ocium ignauiamq; descuerit. Oportet autem & illis uentrem à ciborum cessare multitudine, alioqui læsio in corpore fiet, corpusq; totum grauabitur.

Quod primū omnīū demonstrare decreuerat, id de subitis in uentre mutationibus fuit. Deinde ab hoc ad generalius quod & uniuersalius dicunt trāsiliens, de repētina omnī cōsuetudinis mutatione hucusq; percurrit. Nam cum specialiora in generalioribus & particularia in uniuersalibus cōtineantur, uentrisq; permutatio cum subita omnīū mutatione demonstrata sit, nunc rursū ad uentrē reuersus mutationū quæ in eo sunt differētiās edocet. Atq; longe grauiorē in uictus mutatione esse læsionē cum ex multa inedia repente plus modico ingeritur, q̄ si ex multo cibo ad inediā transmutatio fuerit. Simile huic fieri in toto corpore rursus ostendit. Nam minus læduntur qui ex motiōe ad quietē subito transeunt, q̄ qui ex quiete ad motionem demigrant. Rursū & hoc in loco permutationis intēpestiue emēdationes correctionesq; ueluti & in præmissis adscripsit, quāq; id ad præsentē non uideatur pertinere speculationē. Quæ autem adscripsit, hæc sunt, Qui ex motu quidem actionēq; in ocium segnicieq; transeūt, eos *ἰατρύειν*, id est cessare & toto quiescere corpore præcipit, quod idem huic sentētiæ existit. Vbi famies, laborandum non est. Verum qui ex multa fatigatione ad quietem transeunt, eos pauciora ingerere iubet, quod est et uentriculū quiescere. Quoniā qui toto corpore non laborās consueta ingeret, is multitudinem subalet. Quæ efficitur ratione ut totū corpus grauetur, laboreq; *πόνος*, id est labor nunc Hippocrati læsionem indicat, multis particularibus signis genus existens.

54 De mutatione quæ in hæc uel illa sit, plurima sum locutus, quo reuera hæc no-

Galen.

uisse cōmodissimū sit, cum ad omnia, tum ad id de quo nunc agitur, quod in morbis acutis ex uasorum inanitione ad forbitiōnes transitur. Transeundum enim uelut ego iam præcipio: deinde forbitiōnibus haudquaquam utendum priusquam morbus ad maturitatē perductus fuerit, aut si gnū aliquod aliud apparuerit, ut ni intestinis uacuatoriū uel proritatorium, uel in hypochondrijs qualia scribentur signa.

Rursus sermonem totum in summā unam coegit Hippocrates. In habentibus quidem similiter uictum haudquaquam permutare præcipiens, uerum in ijs qui ex sanitate ad morbū transeunt permutare quidem, non tamen ut ceteri permūtant. Deinde cōpendio quodam uictus scopum in acutis morbis declarauit. Nam si morbus maturuerit, transeundum ad cremoris pitisanæ exhibitionem præcepit; & si adhuc crudus fuerit, non transeundum, nisi forsan symptomā aliquod quod uires prosterнат apparuerit, ut uel uacuatio uentris immodica, uel aliud quippiam quod proritet. Communi autem proritationis nomine comprehendit omnia quæ quouis modo uirtutem ad infinitatem agūt: quō in numero censent & morsus quē acris humor, siue in intestinis, siue in uētriculo & præsertim ipsius ore parit, & uigilia, & ira, & moror, & lumbrici elmyntes qui ab intestinis ad uētreui usq; ascendunt, & cutis totius aut membri allicuius qui nocte aggrediāt pruritus: ita ut uirtus non solum ob iritationē, uerū quoq; & propter uigilias exsoluatur. Præterea inquit: Vel in hypochondrijs qualia scribūtur signa. Nam & ipsa dandam uel non dandam cōmonstrabūt alimoniam. Fieri siquidem potest ut intelligatur, utrunq; sed alterum magis pro sermonum cōsequentiā. Nempe præcipiens a pitisana abstinendum ante morbi maturationem, cum scilicet æger sufficere possit, adiecit. Nisi signum aliquod apparuerit uel in intestinis uacuatoriū aut proritatoriū, uel hypochondria qualia scribentur, tanquā hæc cremoris exhibitionem ante morbi maturitatē admoſneant. Forte hypochondria dicit quæ uehementē exaruerūt, & squalida admodum existunt. Talia nempe contingunt & mortiferæ faciei de qua in Prognostico dixit, Naris acuta, oculi concaui, & collapsa tēpora. Nempe is signorum concursus hypochondriū habet ita compressum, ut quēpiam ex inexercitatis fallat, tanquā reuulsum uideatur. Verū ap̄primi uehementer ob siccitatem, & propter phlegmonem reuelli idem non sunt, quāq; exuperās corporis siccitas tensionem septo trāsuerso & hypochondrio pariat maiorem. Sed maxime animaduersas distinguasq; à siccitate phlegmonē, quod sanatio nō una sit, oportet. Nempe qui hoc ipsum ob phlegmonem habet, tenui egent uictu: qui uero ob siccitatem, cōtrario, ubi sæpiuscule paucum exhibemus pitisanæ cremorem.

tom. 6

E Fortis

55 Fortis uigilia, potus cibosq; tum cru-
dos tum incoctos reddit: uerum ea quæ in
alia fit transmutatio, corpus dissoluit, exco-
ctionemq; & capitis grauitatem parit.

Sapius existimauimus librum hunc in typis repertum,
post mortem Hippocratis esse publicatum. Non
secus etenim q̃ hoc pacto facta esse uidetur inor-
dinata sermonum compositio. Nam quæ ab Hip-
pocrate inueniebantur exempla: hæc in libro ad
fidem uniuersalem scripta sunt, alia quidem in fa-
cie, alia in tergo. Neq; enim unicuique tum ascri-
pto tum addito suum assignare ordinem potuit. Er-
go quod ab Hippocrate in præsentiarum dicitur,
id manifeste tum in compositum tum in ordinatum
existit. Neq; enim loco in hoc ascribenda rei huius
ocasio fuit: quanquam bene paulo ante, cum de
ea quæ præter consuetudinem ad contrarium fit

A mutatione exempla scripsit. Nempe illis adscribi
debuisset. Quæ etenim ad uigiliam insueta sit muta-
tio, crudiores tum cibos tum potus efficit. Ad so-
mnium uero multum, eumq; studio quodam accessi-
tum segnicie corporis & capitis grauitatē. Quam
enim dixit *ἐπὶ τῇ νύκτι*, id est excoctionem, & dissolutio-
nem, & capitis grauitatem, uerbo uno coniunctam
comprehrehensamq; manifestat roboris exolutio-
nem. Commonstrat autem & nomen *ἐπὶ τῇ νύκτι*,
id est excoctionis, quæ ob calidam humiditatem fit,
non ob siccitatem. Nempe uigilia per halitum di-
gerere & siccare, non quæ in imo sunt coquerena-
ta est. Somnus uero humectare, spiritumq; & el-
fluiua cohibere. Non igitur absq; ratione in eorum
q̃ plurimum præter consuetudinem dormiunt
corpore halituosa redundant excrementa; atq; ob
B eam rem tota ipsorum constitutio excoctis simili-
ter exoluta redditur.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS

Commentarius tertius.



VIRVS autem notis uinum
dulce uinosumq; & album
& nigrum, melicratumq;
& aqua & oxymeli insi-
gniantur in morbis acutis,
distinguere oportet.

Non in compositis solū in-
ordinateq; uerum quoq; & diminute uinorum ca-
talogum fecit. Est siquidem una ipsorum differen-
tia in colore, Altera qualitas in gustatu facit, Ter-
tia cōsistentia respicit, Quartā odor progignit, Et
quinta in uirtute reperit. Quæ ergo in colore est,
ea album, nigrum, fuluum, flauum, & rubrum dici-
tur. Verum cum & alia quæ mediū obtineant sint
differentiæ, sanè ut in colore sic in uirtute permi-
stæ reperiuntur. Quæ autem ex uinorum gustatu
est differentiā, ea in dulce & austerum diuiditur: &
ex his medium, tum quod nullam quæ manifesta
sit habet qualitatem, tum quod ex utraque cōstat
qualitate; præterea et in id quod acre appellatur.
Verum quæ in consistentia reperitur differentia,
in aquosum secatur & tenue & in ualde crassum,
& in horum medium, atq; in ea quæ medium hoc
& extrema interiacent. At secundum eam quæ in
odore est, alia quidem boni odoris sunt, alia uero
non boni odoris existunt, sed feriētē quādam
& insuauem nata sunt qualitatem. Alia nullo pa-
cto odorem habent, sed sunt aquæ instar in odora.
Differentia uero in facultate est, ob quā aliud qui-
dem potens, aliud uero imbecillum, aliud mediū,
atq; aliud quod medium hoc & extrema interia-
cet. Vinum potens uehementer celeriterq; corpus
calfacit, caputq; ferit. Imbecillum contrarium agit
modo. Quæ uero medium obtinent, nota euadūt
si ab externis distinguantur. Potens uinosum ap-
pellatur, imbecillum aquosum. Nempe in quo ui-
num aquam euincit, id cum in aliquo uehemen-

tissimum esse uidebimus, iure uinosum appellabi-
mus. Sicuti & contrarium aquosum, quod aquæ
maxime in omnib. simile existit tenuitate scilicet,
& colore, & odoris carentia, et non manifesta cal-
factione. Hæc igitur in uinis propriam secundū na-
turam reperiunt differentia. Sunt qui his adij-
ciant eam quæ ex tēpore desumitur differentiam:
qua uetusta quædam sint admodū, alia recentia, &
alia quæ in medio horum cōsistant. Sed quod dif-
ferentiæ huiusmodi eorum sint quæ extrinsecus ac-
cidant, palam est. Nempe quatenus tēpore accio-
ra & calidiora fiunt uina, atq; unā cum his tum co-
lorem, tum substantiam, tum odorem mutant, ea-
tenus differentiam aliquam in uinis tempus face-
re uidetur. Quod si nihil horum immutetur, neq;
ab aliquo uinum uetus dicitur, neq; recens. Immo
neq; nunc ita dicunt tanq; uini ipsius annis opus
prima ratione habentes, sed tanq; simul cum an-
nis facultatem cōmonstrantes. Non enim ob tem-
pus uina uel iuuant uel lædunt, sed ex propriariū
differentiarum mutatione id habet. Ergo cum de
uinorum agimus differentiis, temporis mentionē
facimus per accidens, & non proprie neq; primū.
Cæterum inter proprias uinorum differentiās quæ-
dam iuuant læduntq; prima ratione, alia non per
se proprieq; sed per accidens. Dulcedo quidem &
austeritas propria ratione, sic tum potētia tum im-
becillitas, tum tenuitas, tum crassities. Sed differen-
tiæ quæ tum colore, tum odore desumuntur, non
primū sed per accidens: quoniam uinum hæc
quidem & aquosa & alba & fulua & nigra, alia a-
quosa & inodora ut aqua, uel instar aromatis un-
guentiq; beneolentia. Si igitur uinorū hæc sint dif-
ferentiæ quæ & secundum propriā uirtutē & per
accidens numerentur: iam tibi constat de eo tum
ordinis tum numeri qui in præsentī dictiōne sit de-
fectu. At si in sequentibus omnium quæ cōmodæ
sunt, differentiariū meminisse Hippocrates uide-
tur, ue-

tur, ueniam interpretationis defectui dabimus.

2 Vinum dulce uinoso minus caput grauat, minusq; mentem ferit, atq; quouis alio facilius per intestina descēdit, lienem tamē iecurq; tumefacit: picrocholisq; nullo pacto est idoneū. Nempe his sitim facit, superiusq; intestinum inflat, nō tamē inferiori profusus ratione est inimicum, etsi nō admodū penetret qui à dulci uino est flatus, sed diutius circa hypochondria moretur.

Vinū dulce secundum gustandī qualitatē nominatur, secundū quā & austerū & acre, ut aquosum pratermittamus quod non omnino ab alstringente degenerat; tamen sit languidam exolutamq; habeat alstringendi qualitatē. Nam si aquae cōparaueris, percipies manifeste ex ea cōparatiōe gustū huiusmodi uinorum, eorum esse quae modicā natura sunt alstringentiam. Aquosum autē uinum appellat homines quod aquae tum colore tum substantia simile est. Perspicuū siquidē ut aqua splendidum & purū, & substantia tenuē uidetur: Proti-
nus autem et facultate aquae simile existit, neq; imbecillum caput ferit, neq; infirmos nēruos, quando ne quidē manifeste calfacit. Sed de uino hoc rursum tractabitur. Dulce igitur uinum hoc quidem modo ab ea quae in gustu reperitur qualitate est nominatum, sed multis numeris ab aqua & colore & substantia recessit. Neq; enim tenue exquiri sit, neq; album uidisti aliquādo uinum dulce, sed plus minus à dictis recedit, & neutrum horum habet. Dulcia autem uina maxime sunt Theriūm & Scybelites, crassa utraq; & nigra. Dulcia quoq; & ea quae in Mæonia sunt, Theriū & Caryinū tanto dictis & crassitie & nigrítie superiora, quanto dulcedine inferiora. Præterea quod Hepsema & Sireon à Græcis, & à Latinis sapa appellatū ex cocto mousto conficitur, quo dulcius uino perficitur, eo & colore nigrius & substantia crassius apparet. Quarto autem De simplicium medicamentorum uiribus dulcem omnem saporem à caliditate, quae non immoderata & uehementer sit, fieri demonstrauimus, sicuti & acrem in uehementer calfacientibus. Acrimonia siquidem horū est inseparabilis. In usu uero uinum dulce mediocriter calfacere uidetur, sitimq; facit propter tum caliditatem tum crassitiem. Ita sanē & multum quo diutius in igne uersa, eo tum crassius, tum nigrius, tum dulcius euadit, quanquam supra modum coctum amaritudinem cōtrahat, quo modo & mel ipsum: quod quāquam omnium dulcissimum sit, longa tamen coctione amarum redditur. Sed ut iam reuli de qualitatibus omnibus gustabilibus in quarto De simplicium medicamentorum uiribus est tractatum, atq; hoc in loco ut in alijs super Hippocratis libros Expositionibus non demonstrationes, sed conclusa tantummodo recensio. Cum igitur uinum dulce uiscus calfaciat, sitq; ut dictum est substantia crassum, particulares ipsius facultates quas epotū cōmonstrat, secundas qualitates cōsequun-

Galen,

A tur. Color siquidē sua ratione nullo pacto uel iuuare uel laedere potest. Ergo uinum huiusmodi pro substantia crassitie tarde meat: quapropter tantū abest ut ex obstructis partibus aliquid adimat, ut etiā obstructions adaugeat. Atq; ob id hepatis adfecto maximū adfert detrimentū, praesertimq; ubi uel phlegma uel scirrhus occupauerit. Sed moderatus laedit ubi uel ab humorū crassitie uiscus oppilat, uel propter imbecillitatē afficitur, uti in affectionibus quae proprie hepaticae nuncupantur. Post hepar lien à uinis crassis laedit: nō tamē pulmo cum bronchia crassum habent humorē. Nempe in hepate ex amplis portae uasis ad angusta stritaq; uasorū tum gibbae tum simae partis procedit extrema: per quae eorū omnis quae in corpus totū digeruntur transmeatio fit. At in pulmone cōtrario euenit modo. Nam per uenas multas digestus cōfectusq; in amplā bronchiorū & primo minorū irruit capacitatē: atq; ab his ad maiora excipit, secū & crassos tollēs humores, quibus nō calidior solum, uerū quoq; & tenuior existit. Scis autē pulmonem ipsum ab humorib. crassis uiscosisq; per tussēs expurgari. Nā qui aquosi sunt, & exquisitē tenues, aerē qui tussiendo extramittit, cūcti sunt. Aer etenim tanq; manus quaedam existit, quae sursum crassos humores secum ferat. Sed crassitie humorū talē esse oportet ut ab aere sursum ferri possit, & nō ut lutū bronchijs illitam esse & infarctā. Ob id sanē uiscosos humores tussēs nō expurgāt. Nempe manent & interna uisci insit occupant bronchia. Ergo quae ad eductionem eorum qui in pulmone continentur crassorum humorum futura sunt idonea medicamenta, moderatam humiditatē habere debent. Quod si uiscosi humores fuerint: nō humiditate solum est opus, uerum quoq; & ea quae ab acidis fiat succis deterfione. Ob eam rem melicratum quidem ad crassorum humorum expuitionē est conuenientissimū, oxymeli uero ad uiscosorum. Post melicratum pitiana est: atque ab ea uinum dulce, si coctis iam tum peripneumonia tum pleuritide propinetur, idq; non uexatis inflammatione corporibus. Quod si uinū huiusmodi epotū sitim faciat, ad expuitionem minus idoneum redditur. Verum ut uno absoluta uerbo, uinum dulce in acutis morbis ad expuitionem tum propter dictas operationes, tum propter communem uinorum omnium rationem quā uires roborant, idoneum existit, & maxime ijs qui quēuis humida quae tum in thorace tum in pulmone continentur, expuit. Didicisti autem humida illa uaria tum substantijs, tum qualitatibus tum uirtute esse in Prognostico, ubi sputorum exposui differentiās. Nullum sanē bonum aliud uinum huiusmodi habet febrientibus propinatum. Minus tamen uinoso quod uehementer calfacit, laedere poterit. Commumodum præterea aliud, nihil habet præter antedicta nisi quod uentris permeationē modice uiuet. Ob id igitur Hippocrates ubi à minus sedentibus quae multa sunt, doctrinae exordium fecit, ad iuuenta ipsius quae pauca sunt circa finem sermonis transit. Percurramus igitur quae recenset, dictionem

tom, 6

E 2 ipsius

ipſius perſequētes. Vinū dulce minus q̄ fortia po-
tentiaq̄ mentem ferire ait, id eſt minus deliria pro-
gignere. Fortia ſiquidē uina uehementē calfacien-
tia caput humoribus uaporibusq̄ & caliditate re-
plent. Vina igit̄ dulcia quo magis à uehementi ca-
liditate abſunt, eo minus cum caput grauant, tum
mentē lædunt: ſed facilius per inteſtina deſcende-
re ait, et uifcera tuſificare, id eſt uifcerū tumores
augere. Sed de his dixi paulo ante. Præterea dulce
uinū nō idoneū eſſe ait picrocholis, id eſt, qui ama-
ram bilem ſibi acervant. Nempe medici *χλω*, id
eſt bilem ſimpliciter & pallidam & flauam dicere
conſueuerunt. *μέλανον* uero *χλω*, id eſt nigram
bilem hoc toto appellare & nō *χλω* id eſt bilem
ſimpliciter: ſed hæc quidem acida eſt, amara autē
quæ flaua. Ob eas res Picrocholos appellat Hip-
pocrates, qui redundantē habet huiusmodi bilē.
Permiſta autem aquoſis humoribus & liquidissi-
ma & pallida uidetur. Sola uero cū exiſtit, et craſſa
& flaua eſt. Quæ aut̄ huiusmodi bilem procreant,
ſunt calida & ſicca temperamēta, ad cuius genera-
tionē idonei ſunt & dulces omnes humores. Quo
ſit ut omnium horum maxime mel bileſcat, quod
dulciſſimū ſit: deſinde & dulcia uina. Non ſolum
autē quod caliditas multa tales humores amarus
reddit, propterea dulce uinū febrientibus, & præ-
fertim ubi calidi & ſicci temperatura fuerint, ido-
neum nō eſt: uerū quoq̄ & q̄ craſſa ſint huiusmo-
di uina, neq̄ per urinas uelociter deſcendunt, neq̄
cito diſſentur tranſpirētq̄. Quo ſit ut biliſoſos hu-
mores neq̄ ſecū agant, neq̄ excernant. Solis ergo
his unum ineſt bonum quod uentrem emolliant:
quod ſi nō fecerint, omni pacto nocent. Præterea
& ſticuloſa ſunt, hæc quod facile bileſcant, cō-
monſtrantia. Flatuſoſum quoq̄ uinum huiusmodi
eſſe aſſerit. Nempe incaleſcentes craſſi humores
ſpiritum ſibi ſimilem generant, tum uaporoſum,
tum craſſum. Qui autem talis eſt, inflatione parit.
Quapropter extenſibus uinis non generatur ſpi-
ritus, quanq̄ interdum quippiā generē, quod &
tenuium ſit partium & aereoſum, non nebulolum
uaporoſumq̄. Cæterū dulce uinum inferioribus
inteſtinis non eſſe inimicum ait, quanquam tarde
meet qui ab ipſo eſt ſtatus, moreturq̄ circa hypo-
chondrium. Ea autem ocaſio eſt ob quam nō ad-
modū turbet inferiora inteſtina, quia circa hypo-
chondrium moretur, donec perfecte coctus & te-
nuatus fuerit: q̄ ſi ſemel coctus fuerit, commeabi-
liorem tenuiorumq̄ partium habebit naturā. Qua
igitur ratio ē à ſuperiis ad infernas expellitur par-
tes, eadem ab infernis extra mittitur.

3 Vrinæ ſiquidem hoc minus, quàm ui-
noſum album omnino mouet.

Quodnam uocauit uinoſum album, conſidera-
bimus. Nam antea uinoſum uinum tum eſſe tum
appellari diximus, quod iure optimo aquoſo op-
ponit̄. Valenter igitur ipſum et calſcare, & caput
replere, & deſipientia procreare, & calorē febrili-
lem augere eſt operæpretiū. Sed uinū huiusmodi
album non eſt, neq̄ cum nouum exiſtit, neq̄ cum

A uetus, quando ne quidem aliud quippiā antiquo-
rum uinorum manet album, etſi quāmaxime cir-
ca initia tale fuerit: imò ſemper ſuluius redditur,
& tandem flauum. Videtur ergo Hippocrates di-
xiſſe uinoſum album, aſterum, quod neq̄ ipſum
urinas mouet: ſed ſi tale craſſum fuerit, circa hypo-
chondrium moratur: ſi uero non craſſum neque
multū moratur, ut nigrum; neq̄ albis ſimul & me-
diocriter aſteris ſimiliter ad urinas deſcendit. Ne-
pe uina hæc urinas ciēt, quod utraq̄ tarde per u-
rinæ deſcendendi effugerunt proprietatem, tum
eam quæ aque eſt quam ob frigiditatem naſta eſt,
tum eam quam uinum nigrum propter craſſitiem
habet. Vinum ſiquidem album & aſterum mini-
me calidum inter uina exiſtit. atq̄ ob id ijs quæ ad
uentrem ſiunt deſtillationibus idoneum. Non ta-
men abunde ciēt urinas hoc uinū. At forſan Hip-
pocrates uino huic nigrum comparans, minus cie-
re urinas ipſum ait.

4 Sputum autem alio efficacius educit
quod dulce eſt.

Quodnā aliud dicit̄ utrum' ne præſens ad quod
dulce cōparans dicit̄, Vrinæ ſiquidē hoc minus
q̄ uinoſum albū omnino mouet. An nō hoc ſolū,
ſed ſimpliciter omne id quod dulce nō eſt: Cū er-
go Hippocrates quantū ad diſtinctionē hanc attinet
obſcurus ſit, credibiliſſiq̄ ſit ipſum nunc de uino-
ſo alio ſermonē intelligere, rurſum & alia oriuntur
ambiguitas, eo quod quodnā ſit uinoſum album,
nō ualde manifeſtum ſit. utrum' ne id quod uehe-
menter calfacit: an quod ualde aſtringit: quod a-
cerbū Græci appellat̄, ueluti quod moderatius,
aſterum. Quonā igitur pacto quod in diſtinctione
eſt, ego impræſentiarū exponā. Sputū ma-
xime omnium uinorum dulce educit, ubi non ſu-
pra modum craſſum fuerit, ueluti & quoties non
uſque adeo ad ſuluū ſeceſſerit, ut exoluta in eo ſint
tum craſſities tum dulcedo. Prauum autem febrī
auxiliū eſt uinum ſuluū, quod uehementē ca-
lidum ſit. Verum poſt uinū dulce non admodum
craſſum ad eorum quæ in pulmone ſunt educio-
nem conueniens eſt aquoſum uinū, uirtutē ſcilicet
roboraſ, & humores tum humectas tum ma-
defaciens mediocriter. Quod cæteris uinis omni-
bus innocentius febrientibus exhibetur.

5 Et fanē quibus propinatu ſitim facit, his
minus quàm uinū aliud educit: quibus ue-
ro ſitim non facit, uino alio magis educit.

Vinū aliud nunc dixit, quod omnino ſticulo-
ſum nō eſt. Quare autem uinū ſticuloſum minus
ſputa educat, facile inuenies, ſi quæ antedicta ſunt
ad memoriā reuocaueris. Nempe ſitis quibuſdam
perſeuerat qui dulce uinū bibūt, quod febrilis ca-
lor in ipſis tū moroſior tum maleſcentior exiſtat.
Qui ſi talis fuerit, ſputum ſiccit̄ craſſiusq̄ & uifco-
ſius reddit. Quod autem ſputum huiusmodi diſſi-
culte educatur, uerbis non eſt opus.

6 Vinum autem album uinoſum iam plu-
rima maximaq̄ parte laudatum quidem &
culpa-

culpatum in uini dulcis enarratione. Ad uerum uero uino alio magis penetrat, urinasque prouocat, & perpetuo perrumpit: atque multa ad opem his morbis ferendam facit. Nempe etsi uino alio ad cetera inhabilius existat: ueruntamen quæ in uesica ab eo fit purgatio liberat, si propellatur quale oportet. Bonæ hæc cōiecturæ sunt de uino tum profectus, tum detrimenti, quas quæque seniores sunt, non didicerunt.

De uino hoc in dulcis uini mentione diximus, postea quæ uires ipsorum cōparauit, perquisiuitque. Dixi autem non parum esse quæstionē an album simul & austerum uinum album uinosum dixit, uel quod uel hementer inter uina alba calcacit. Nempe ex uinis albis nullum ualenter calcacere potest. Quod enim summe calidum est, id continuo & flauum existit, uelut quod ab ipso est fuluū. Mox ab his rubrum, & deinde dulce. Album autem minus quidem his omnibus calcacit: sed differentias particulares aliaque omnia pro pluris minorisque ratione habet interualla. Quod autem uinum huiusmodi dulci facilius ad uesicā pertinet, dictum antea. Sed ad alia dulci inhabilius esse ait, quæ sunt uentris subductio & educio sputorum, bonas autem has ait cōiecturas esse, id est notas facultatis uisum.

7 Fuluo autem uino & nigro austero in morbis huiusmodi ad hæc uteris, si neque grauitas capitis fuerit, neque mentis cōcussio, neque sputo uia concludatur, neque teneatur urina: excrementa autem & humētiore & ramentosa magis fuerint. In his autem ex alio bo migrandum, & ipsæ quæ similia existunt.

Dulce quidem uinum continuo & nigrum existit: non tamen nigrum omne continuo & dulce. Nam ex his quedam austeriora sunt, qualia apud nos in Asia prope Pergamō in Perperine & Aegis. Quod autem in Cilicia est Albates, austerum simul & dulce existit, qualitatibus cōstantibus cōtrariis: quo fit ut primum sit, quia neque distribuatur, neque descēdat, sed plus iusto in uentre permaneat superiore, atque ipsum inflet. At quod citra dulcedinē nigrum austerum est, id uentri utile existit, quādo uel plura iusto de scendunt uel ramentosa: tunc enim est id idoneum sicuti & uinum album austerum, & quæcunque alia astringentia medicamenta. In eum usum & fuluū uinum prodesse ait, non omnino simpliciter fuluū affirmans: sed fuluū austerum. Nam de utroque intelligere oportet quod in principio dictiois existit, quia dicitur, Fuluo autem uino & nigro austero, in morbis huiusmodi ad hæc uteris. Duplex siquidem fuluum, ut nigrum: aliud siquidem dulce, aliud austerum. Atque cum tertium præter utrumque existat ex utroque qualitatibus permixtione cōstante, atamen quod una est prædictum qualitate, id colore utroque duplex existit. Caput autem & mentem fuluum magis ferit quod & calidius nigrum existat.

Galen.

A Febres quoque ratione eadē auget, quibus idonea sola ea quæ aquosa sunt. Non immerito igitur uinis austeris utendum prohibuit siue ea colore fulua siue nigra fuerint, in capitis grauitatibus & mentis læsione ubi febris ipsam percussit, atque amplius in thoracis pulmonisque ægritudinibus in quibus sputum detinetur, uina huiusmodi inhabilia esse ait, atque cum urinae supprimuntur, propter crassitiem uidelicet & astringendi facultatem.

8 Quod autem superiora quidem omnia uesicæque minus offendet, si dilutius fuerit: intestina uero iuuabit magis, si meracius, neminem latere debet.

Vinum meracius, ut dixit, intestinis magis cōuenit: quo fit ut non abs re iuuat ipsa astringentis ratione, propter quam omnino iuuamentum habet. Verum huiusmodi astringentem labefaciat exolutumque si aqua temperatum fuerit, atque ob eam rem minus ipsa iuuat. Quo autem modo hæc iuuat magis astringendi ratione ubi meracius fuerit, sic thoracē caputque magis offendit. hæc sunt sanè quæ manifeste flauit inquires, Superiora quidem omnia lædit, lædit quoque & corpora ea quibus per urinas expurgari est opus. Nempe austerum uinum, excretiones omnes cohibet. De uinis hæc locutus Hippocrates, continuo ad melicratum trāsit, cæteris quidem ferē omnibus de uino demonstratis: at prætermisso uno quod non absoluit, & ego obiter percurram, quæ scilicet febrientibus maxime idonea aquosum sit. Est autem uinum hoc album colore, substantia tenuē, nullam earum quæ cæteris uinis insunt habēs qualitatē, neque austeritatē, neque astringentiā, neque dulcedinē, neque acrimoniā, neque odorem. Nempe uino huic omnium soli ut tum aquæ tum uini mala effugeret, est datum. Prodeunt autem talia in unaquaque gente aliqua. In Italia imbecillum Sabinum, quod febrientibus administrat. In Asia Titacenum & Tibicenum. Sed uini huius notas ubi intelllexeris, talia facile in qualibet gente reperies, ubi & ualde tenuia & aquosa producuntur uina. Reperi equidem talia in Cilicia, Phœnicia, Palestina, Scyro, & Creta. Imò ut retuli in regionibus uicinis omnibus: & quod mirum magis sit, in Aegypto. Crassa siquidem uina & odora & ualde fortia, in feruidis progignuntur regionibus. In Italia uero, & Bithynia, & Asia si multa producantur aquosa, nihil mirum. Sed quæret quispiam quam ob rem Hippocrates in antecedente dictione peculiarem de his uinis prætermisit sermonem, cum febrientibusque cætera omnia sint iucundiora. Sanè qui id petit, Hippocratem uinum huiusmodi nesciuisse haud quaquā offendere poterit. Nempe post paulo cum de melicrato agit, hæc scribit. Cæterum uino albo tenui paucifero, & inodoro quodāmodo fortius est, & quodāmodo infirmius. Hæc ait Hippocrates, uino albo tenui & paucifero, id est parum aquæ ferenti & inodoro melicratum cōparans. Vini igitur uinosi notas tum cōspicue tum exacte recensens percurrensque: quoniam scilicet pacto tum caput tum mentē feriat, de aquoso ipsi contrario discipuli

tom. 6

E 3 nam

nam sufficientē esse existimauit, cum aduersa contrariāq; ipsi inesse ratiocinari possumus.

9 Melicratū, id est mulsā, per totum morbum in acutis epota parte plurima tum picrocholis, tum his quibus tumefacta sunt uiscera (μεγαλοπλῆγχνος uocant) minus quam non huiusmodi est idonea.

Oratio hæc, Per totum morbum, ostendit Hippocratem de his intelligere morbis in quibus cretorem exhibere idoneum non esse demonstrauit prius quam ad morbi peruentum sit uigore. Nam si æger acuta febre laboret, neque tum in thorace tum in pulmone fuerit morbus, uiresq; ualuerint, & morbus quintum ultra diem sese prorogaturus non sit, aqua mulsā sola epota abunde ægro sufficere potest. Et cæteris quidem omnibus in morbis huiusmodi est conuenientissima: sed picrocholis minus propitia existit. Nam in ipsis bilescit, nisi prius uel intestina uel uesciam pertransierit. Quæ si pertransierit, non solum nihil lædit, uerum quoque & maxime iuuat. Nam secum biliosa deducit excrementa: hæc sanè cum ratione temperaturam quoq; ipsius demonstrauit. Nempe in huiusmodi naturis, dilutor exhibita mulsā cōfert. Neq; enim hoc pacto siticulosa existit, neque bilem generat. Ut autē picrocholis ita megalosplanchnis haudquaquam idoneum esse ait. Megalosplanchnos nunc dixit non eos quibus magna ex natura ipsa sunt uiscera, sed quibus ea ex affectu aliquo intumuerūt, siue scirrhum, siue phlegmonē, siue cedema nata sunt. Mala siquidem est in his quod cito pertransire uiscera ipsa non possit, & facile bilescat, præsertimq; in phlegmonis propter caloris magnitudine: in cæteris autē qui præter naturam sunt tumoribus, minus detrimēti affert.

10 Porro et siticulosa minus q̃ dulce uinū existit. Nempe & pulmonē mollit, & sputū mediocriter educit, et tusses mitigat. Habet etenim uim quandā exterēdi quæ plusquā mediocriter uiscosum facit sputum.

Quam ob causam aqua mulsā minus q̃ uinum dulce siticulosa sit, dixi antea, cū utraq; quatenus dulcia sunt, eatenus facile bilescere demonstrarē. Verū quod tenuior penetratiorq; ut omnia subeat, existit, ea ratio ē minus uino dulci est siticulosa. Quo fit ut si aliquādo plusculo tempore in uentre manserit, tunc uino dulci non minus siticulosa reddatur, quod rarēter cōtingit. Aqua uero mulsā, uino dulci citius uentrē intestinaq; omnia penetrat. Nec secus hepar ad usq; tum renes tum uesciā non rarēter quidem sed perpetuo. Ob hæc igitur uino dulci minus siticulosa existit. Hippocrates idem quanquā non ita sed modo alio dixit, mulsæ uirtutem ex ijs quæ in pulmone facit demonstrā. Nempe quod hæc non efficeret, nisi uias meatusq; ipsius penetraret abstergeretq; palam omnibus existit. Præterea sputum educere non simpliciter dixit, sed hoc aduerbium, mediocriter, adscripsit.

Neq; em̃ ualenter educit ut oxymeli, sed mitigat, quo oxymeli priuatur. Nempe oxymeli tusses incitat, tum irritans tum asperans, quatenus scilicet uehementer detergit. Mulsā uero & præsertim aquosa diluatq; deterforia quæ minima sit participat facultate. Vocatur autem huiusmodi facultas σμυγματική, à qua & nunc Hippocrates nomen fecit σμυγματῶδες. De mulsā ita scribēs, ἔχει γὰρ σμυγματῶδες τι, id est, habet etenim uim quandā exterēdi detergēdiq;. Mediocri autē participare ipsam facultatem huiusmodi ostēdit adiciēs uocabulo huic σμυγματῶδες uocabulum hoc τι. Nempe quibus uis adiciat, paucitatem indicat. Hæc igitur pauca uis extergēdi in mulsā, non quia exterioria est, ideo impotens est, sed quia pauca est. Ad glutinosum siquidem sputum, medicamentū uehementer abstergere oportet, q̃ glutinosum cum, quā in bronchijs pulmonis cōtinetur detergere possit humorem. Quod si talis quispiā in thoracis pulmonisq; medio acruatus fuerit, iam & maior ut probe spuatur, tum incisoria tum deterforia uirtutis est necessitas, quæ id à succingente costas membrana detergat, dissecet, & teneat. Nam & fieri non potest ut talis humor aliter per membranā, quæ uiscus ambit, ad pulmōis bronchiā trāsferatur. Non igitur bene est usus dictione Hippocrates cū huic orationi, Habet enim uim quandam extēdi, eam quæ sequitur adiecit: Quæ plusquam mediocriter λεπταλισχραίνε, id est uiscosum reddit sputum. Nam melius dixisset, Habet enim uim quandam extēdi detergēdiq; quæ exigua sit, & quæ sæpenumero uiscosum fieri sputum sinit. Non enim ob mulsam glutinosum fieri sputum contingit, cum id sanè sputo huiusmodi proprium inest. Mulsā igitur nil iuuat: sed excrementi naturam talem permanere sinit. Quapropter melius dixisset nihil glutinosum sputum iuuari, & non tale à mulsā fieri. Nam hoc uerbum λεπταλισχραίνε quod ab Hippocrate dicitur sputum à mulsā tale fieri, cum emphasi significat.

11 Ciet autem & urinas abunde mulsā, nisi ex uisceribus aliquod prohibuerit.

Mulsam ante, quod uias omnes quæ uentrē renesq; interfacent facile penetret, ciet urinas dixi, atq; ubi iecur male afficitur, usui haudquaq; conuenire demonstrāui. Leni præterea si phlegmonē obsideat molesta est, atq; multo magis intestinis uentrīq;. Nam cito ignescens ob phlegmones caliditatem in bilem conuertitur. Melle siquidem ob dulcedinem delectatur tum uiscera tum uenter, quo fit ut tum citius tū acruatum magis alliciant. Melli quoq; & dulcia alia idem habere quis dixerit, atq; ideo ut ad uentrem ita ad uiscera accommodari. Venter autem his oblectari uidetur. Nempe ubi ea deglutiuit, manifeste quodammodo ab assumptis delectat, ueluti ē cōtrario ab asperantibus amarīsq; offenditur, neq; solum cum adsumitur, uerū quoq; & ubi adsumpta sunt, ad aliquod usq; tēpus. Quo fit ut nemo ea nisi interdum uice medicamenti, ut ob collectos præter naturam in uen-

tre humores, ingerat. ubi enim secundum naturam habuerit, iniucunda ipsi talia omnia sunt: iucunda autem sola quæ dulcia existunt. Sanè in appellato gutture maxima ex deoratis dulcibus exoritur voluptas, corpore scilicet loci illius peculiare quippiam cum succo huiusmodi habere. Idem autem hoc corpus est etiam utriculi interna tunica ut & ea quæ linguam ambit. Verum in lingua evidentissima habet dulcedinis sensationem. In gutture autem voluptatis. Sensio uero manifesta continuo efficitur & in ventris ore, quod dulcibus assumptis delectatur, modo animans secundum naturam habuerit. Viscera igitur hoc pacto dulci gaudent succo, plurimumque ipsius celeriter euocantia cum ualent, frui, aliis: cum uero feбриunt & phlegmone obsidentur, in id quod biliosum est dulce cum succum conuertere par est. Videtur igitur quæ *συκωτή*, id est ficata ex caricarum esu appellatur, tum maxima cum suauissima esse iocinore ipso ut liquet ex dulci esu alimentum uberius accipiente. Verum in phlegmonis febribusque rerum huiusmodi ingestio non in probam alimoniam, sed in bilis generationem demigrat: febrilis liquidem calor exuperat: natius autem deficit, qui bene temperatus erat.

12 Biliosa quoque alui deiecit magis: inter alia quidè bona, sed interdum quam decet magis colore saturata spumantioraque, quod biliosis magis, & his quibus tumefacta sunt uiscera contingit.

Reuocare ad memoriam oportet dictionem ante enunciatam: in qua mulsam uino dulci comparans dicebat. Porro & siticulosam minus quam dulce uinum existit. Nam & hoc in loco mulsam eandem ad uinum dulce comparans biliosa alui excrementa deijcere magis pronunciauit. Nempe & biliosa deijcere uinum dulce potest. Verum mulla, biliosa interdum quæ bona sunt subducit, interdum & uisciosa, quæ syncere admodum biliosa existunt, bilem scilicet uel fuluam uel flauam habentia crassamque. Bilis igitur ea spumam accipit sæpius quidem ratio ne ea qua in ijs quæ uehementer igne calisunt, spuma exurgit, sæpenumero autem & in ijs quæ a flatu agitantur humoribus. Horum primam caliditatis exuperantis nota est. Secundum uero instrumentorum angustiam, & flatuosi spiritus interclusi, uiaque haudquaquam libera habentis agitatione denotat. Biliosa autem huiusmodi magna ex parte subducuntur in his febribus quæ liquefaciunt & ad tabem perducunt, quibus ferme omnium aduersissima, nocentissimaque est mulsæ potio, ueluti & modo contrario potio aquæ frigida iuuatissima. Excrementum huiusmodi autem a mulla magis generari ijs qui natura biliosi. immoderate calidi existunt, atque in his morbis quibus uiscus aliquod phlegmone infestatur. Commune liquidem nomen hoc in loco eorum quæ inflammantur peculiare factum est. Neque enim propter scirrhum uel oedema febris incenditur. Ergo quod in acutis morbis, de quibus agit Hippocrates, ubi tumor in uisceribus fuerit, phlegmones symptoma sit, non oedematis uel scirrhi, constat

omnibus. Hos autem nunc *μεγαλωπλόγους* appellauit, quasi uiscerosos dixeris.

13 Mulla igitur quæ dilutior est, sputum educit magis, pulmonemque mollior. Meracior uero spumosa excrementa, atque plus quam conuenit colorata biliosa calidioraque quam dilutior agit magis.

Mel in acutis morbis bile scire, atque ob id nobis afferre molestiam, antea dixi. Aquam præterea tarde penetrare, atque in hypochondrijs diutius morari, atque ob eas res fugiendum. At quod ex utrisque mistum sit, conueniens redditur, quæ ea constet temperatura qua aquæ plurimam tantum mellis permixtum fuerit, ut uiam aquæ paret, & ad distributionem agat. Nempe his ita temperatis, urinæ facilius penetrabit, oculusque sputum educetur. Quod si mellis plurimum admixtum fuerit, sitim facit, & uiscosum reddit sputum. Atque ob eas res aquosior mulla tum ad sputi educationem: tum ad penetrationem urinarum idonea magis existit: meracior uero ad utrisque deiectiones. Nempe quanto magis prorabit, tanto magis & uelocius subducet. Clysteribus ergo infusa quo meracior, eo magis excretoria reddet. Causa quoque deiectionum, tum earum quæ *κατακρέως*, id est *ικκρως*, hoc est ualde biliosa existit, tum spumofarum. Talia liquidem trahere magis potest quam intestina tum mordere, tum detergere. Adde quod & in bilem flauam transiens, ea occasione biliosorum excrementorum copiam simul adauget, quo fit ut ipsius usum non laudet Hippocrates. Declarat autem ex horum uerborum adiectione: *καὶ μάλλον τοῦ κρημῶ κατὰ κρέως χολώδεια*. id est plus quam conuenit ualde biliosa. Nam *μάλλον τοῦ κρημῶ* dicere consueuit pro *μάλλον τοῦ πρὸς σίμῳ*, id est plusquam conuenit. Spumofas item deiectiones & in Prognostico damnauit. Et *κατὰ κρέως*, id est *ἀλεγκρως*, hoc est syncere biliosa mala sunt. Neque enim *κατὰ κρέως*, neque *ἀλεγκρως*, sed mediocriter talia esse oportet. Horum igitur non immemor cum uel ex mulla exportauit ab eis ipsa quis spumosa simul & syncere biliosa deiecerit, febrem sciueris esse quæ liquefaciat & ab tabem perducatur: atque ob id ab usu mulsæ abstineto, atque in pituitiæ cremorem deuenito signum quoddam coctionis morbi quantumuis momentaneum ex urinis obseruans. Nam si tunc frigidam dederis, maximo eris praesidio.

14 Deiectiones autem huiusmodi habent quidem & alias quæ graues sunt offensas. Neque enim hypochondriorum extingunt ardorem, sed excitant. Inquietationemque & membrorum iactationem faciunt. Intestina autem sedemque exulcerant.

Consueuit Hippocrates *βλάκας*, id est offensas sine dicere, ut in libris De fracturis et articulis est demonstratum. Nam *σίναι* Iones dicunt pro *βλάπται*, id est lædere. Immo & *βλαβερὰ*, id est nocua, *σινεμογὰ* sæpenumero appellauit. Graues igitur offensas habent, inquit, præfatæ deiectiones, id est pure biliosa

bilioſa ſimul & ſpumofa. Conſuevit autem Hippocrates de ſignis notisq; uocibus uti, tum cauſarum, tū quæ læduntur corporum. Deiectiones ergo huiusmodi ſignificare commodius dixiſſet; ſed habere dixit, quanquam corpora affecta læſiones habeant, cauſæ faciant, & ſigna indicet. Sed quæ nam ſint quæ à dictis proueniunt deiectionibus offeſſæ, ab Hippocrate audi inquite: Neque enim hypochondriorum extingunt ardorem; ſed excitant. Hoc autem ideo dixit, quoniam ſæpius bilioſorum deiectione hypochondriorum feruorē protinus extinguit. Quare in malignis maleficiſq; bilioſis adiecit, quòd talia excernentibus iſtis nō extinguntur, ſed omnino uice uerſa increſcunt augenturque. Neq; ardor hypochondriorum ſedatur, quin potius uehementior redditur. Adde

15 Sed horum auxilia ſcribentur.

Quòd morborum ſingularum remedia ſeſcriptum propoſuerit, & in ſuperioribus indicauit, & hoc in loco non minus. Verum an & quæ libro huic poſt ſermonē de balneis adiecta ſunt, digna Hippocrate exiſtant, & quæ in libris De morbis uel de affectionibus ſcripta ſunt, inter exponendum conſiderabimus.

16 Qui ergo in morbis huiuscemodi reliſctis ſorbtionibus muſſa potionis alterius uice utetur, is ut multa feliciter cōſequetur, ſic ei nequaquam præter animi ſententiam ſuccedēt multa. Verum quibus danda ſit, & quibus non, & quam ob cauſam, iam magna ex parte eſt dictum.

Significauit & nunc maniſeſtiſſime, ad morbi uſq; iudicationē ſola uti muſſa cōſulens. Nēpe in ſolis qui colliqueſciūt morbis, uel in quibus hominū uirtus ad morbi uſq; iudicationem ſufficere non poſſit, ad piſanæ cremorem perueniemus. In alijs uero ſolam exhibere muſſam eſt cōmodius.

17 Damnata autem propterea ab hominibus eſt muſſa, quòd bibētes ad ultimum imbecillitatis agat, atq; ob id citam adferre mortem ſit creditum. Verum id ob eos qui ſeipſos fame conficere conſtituerunt, dictū fuerit. Sunt enim qui ſola utātur muſſa, tanquam huiusmodi exiſtat.

Dicere ſumme à muſſa imbecillitari & muſſam nullo pacto nutrire uel exigue, idem nō eſt. Quippe cum tria hæc inter ſe diſſent: Nam quæ uires euertunt, ut ſanguinis eruptio, deiectione ſuperflua, ſudor immodicus, & per accidens cibi abſtinen-

18 Sed hoc non omnino ita habet.

Non omnino ſiquidem uerum eſt eos qui ſeipſos fame conficere conſtituerunt, propter muſſam mortem obire. Moriunt etenim & ſi aliquam ſolam biberint; ſed quod exigua corpori præſtet alimoniam, ob id ſola uitam ſeruare non ſufficit. Quod etiam accidit ubi quis ſolius piſanæ cremorem perpetuo ſorbeat.

19 Sed muſſa q̄ aqua multo potētior eſt, ſola epota, niſi aluum perturbet.

Indicare uidetur per hanc uocem, potentior, quòd & aqua aliquam nutriendi uim habeat. eue nit autem eo quòd oris uentriculi ariditas irrigatur, ut diu, qui aquā bibant, magis durent, quam qui niſi alium aſſumunt. Secure autem, niſi aluum perturbet, addidit, de muſſa ſermonē faciens: illos enim ſure peius habere facit propter euacuationē, quibus aluum perturbat, ſimulq; uerbum id perturbat, immoderatam ſignificat excretionem & non mediocrem. Scire quidem oportet muſſam crudam aluum magis ſoluere, coctam autē bene, magis nutrire. Hoc autē obiter à te ſit cognitum. Videamus autē quæ deinceps ſcribit uino muſſam comparans.

20 Sed & uino albo tenui paucifero & in

odoro, quodammodo fortior eſt, & quodammodo infirmior.

Sunt qui dictionem ſcribāt ſine hoc uerbo, eſt, hoc pacto: Sed & uino albo tenui paucifero & inodoro, quodammodo fortior et quodammodo infirmior. Alij pro quodammodo legunt interdum ad hūc modum: Sed et uino albo tenui paucifero & inodoro, interdum quidē fortior, interdum autem & infirmior. Sed ex omnibus uis eſt eadem atq; idem intellectus. Nam Hippocrates muſſam uino huiusmodi quadantenus fortio-rem, & quadantenus imbecillio-rem dicit. Feci autē mentionem uini huius citra tractationem de uinis ubi

Hippocrates de eo tanquam quino nosset ipsum conticuit. Nunc uero clare docuit, tum substantiam memorans, ex hoc uerbo tenui, tum uirtutis imbecillitatem cum adiecit oligophoro, id est paucifero. Vocatur siquidem oligophorum siue pauciferum quod ut bibatur minima eget aqua missione. Contrario autem modo polyphorum uel multiferum appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam. ac si dixeris, quod aqua multum sustinere potest ad temperatam missionem. Quod uero pauciferum appellatur, id fractum infirmumq; & ad potum inutile redditur si multa diluetis aqua. Atqui quæ in uino hoc est carētia odoris, ea imbecillitatis frigiditatisq; maxima existit nota, ut in hoc aqua similis, non secus q; fortis odor maximum roboris signum. Vinum siquidem aquosum leuissimam in ligno uitis habuit transmutationē. Leuissimam quoq; & elementī terrei permissionem: ut aqua sit, quæ parum terreæ ac calidæ essentia assumpsit, & quæ ad harum unionem paucissima coctura opus habuit. Contrarium autem tum uinosum, tum multiferum, neque à leui coctione tale efficitur, utpote quod ab aqua longissimo recedat intervallo. Quò factū est ut insignem consecutum fuerit tum caliditatem tum odorem.

21. Vini autē mellisq; meracitas si robur utriusq; contemplatus fueris, insigne recipit discriminē. Nam si duplam uini meri mensuram ad mellis delinctū quis biberit, à solo nimirū melle ualidior longe reddetur, nisi uentrem turbauerit. Nam & multo plus stercoreis deicietur.

Si mulsæ & nō mellis dixisset Hippocrates manifestius enunciaisset. Nam de mulsâ hucusq; egit, ipsamq; uino ex aqua diluto comparauit, neq; ipsam per se sed ut iusta fieret comparatio. Ob id sermone suum ad mel uinumq; reuocauit. Sunt autem qui in huiusmodi comparationibus non reliquos modo uolentes: sed semetipsos quoq; inuitos circumueniant fallantq;. Ceteri meraciore purioraq; experti non puris solis sed quouis modo temperatis illorum uires contribuant. Non secus alij aquosiora experti ex illis de omnibus quoquo modo temperatis sententiā ferunt. Nō ita tamen de rebus iudicium est faciendum. At si iustā facturus sis de ipsis cōparationē, mulsam ad eorum quæ bibuntur uinorum tēperaturam in aqua permissione ita ex proportionē existimabis, ut uinum non meracius & mulsâ aquosior fuerit. Sed quoniā in missionē proportionē exacte seruare difficile est, ob id ad ea quæ uere immista & propriè pura appellata transtulit sermonē Hippocrates, uino nullo pacto diluto mel ipsum comparans. Atq; duplum uini epotū minus alere q; mellis simplicum. Verum quoniā plura uinorū genera existunt, nō quæ fortia sunt, caputq; ferunt, & desipiētias creare possunt, in hoc exprompsit sermō: sed uinum imbecillum aquosumq;. Melq; ipsum huic cōpa-

rans plus alere enunciauit. Ceterum cum uini duplo mel dimidium cōparare uoluerit, non quod solum utrunq; per se & citra aqua missionē ager sumere debeat asseruit, sed si post utrunq; dimensum pro arbitrio ingerat, nō minus differt. Pōtēst siquidem sires tulerit, mellis cyathum unum uel per se accipere, uel aqua quantū uolet mistū ingerere, atq; id quotidie bibere. Vel denuo uini cyathos duos diebus singulis ut uolet aqua temperatos. Tali siquidem experimento tum in plurimis similiter in ceteris habentibus hominibus, tum etiam in uno magis per idem tēporis spaciū cōgnosceretur exquisita utriusq; facultas. Si enim mel non ex naturæ proprietate uentrem turbat, qui melle utuntur, diebus pluribus abunde sufficiēt. Si ergo res ita habet, cur in principio orationis dixit Hippocrates: Sed & uino albo tenui paucifero & inodoro interdum fortior interdū infirmior, sed semper fortior secundū nuper dictā uidētur qm̄ prius q; de cōparatione iusta distinxisset, docuissetq; citra distinctionē absoluto sermone bene & secure dixit: Inuenietur mulsâ uino quadatenus fortior, & quadatenus infirmior. Si enim temperamentū utriusq; analogiam quis nō distinxerit, interdum quidem infirmius uinum, interdū & mulsâ esse uidebitur. Verum si hæc distinxeris ut est dictū, atq; eam quam mel in uentre facit turbationē contemplatū fueris, mulsam ad nutriendū ualidiorē semper deprehēdes q; uinum eadem proportionē dilutum tēperatūq;. Quod si & extremū quod ex mulsâ ita moderatū excernitur, ut uirtutē non exsoluat, adnota ueris, tibi etiā magis ex mulsâ copiosior uidebitur nutritio q; ex uino. Nā si etiā multo plus exeat excrementū, laborans tamen pluribus diebus ex mulsâ sufficiat, certe ad nutritionē mel uino, tum potentius tum ualidius uidetur.

22. Mulsâ tamen post pisanæ sorbitio nē epota ualde replet, inflat, & hypochondriorum uisceribus est inutilis. Sed si ante sorbitiones bibatur, non ut super epota lædit: sed iuuat.

De ordine ait Hippocrates quem in usu mulsæ pisanæq; quis optime seruare debeat. Verū uno mulsæ pisanæq; edoctus exēplo uniuersalē hunc accipe sermonē. Nā perpetuo prius ingerēda sunt quæ & facilius corrumpuntur, & quæ subducuntur magis. Posterius uero contraria. Pisana autē quā mulsâ difficilior corrumpitur, & descendit tardius. Si ergo mulsâ primo sumpta fuerit, ex ea quādā pisanæ ad deiectionem sit deductio. Verū si pisanâ primū sumptâ fuerit, subduci mulsâ prohibetur. In stabitq; hypochondria; atq; tandem in bilem conuersa, pisanæ etiam detrimentum afferet.

23. Cocta autē mulsâ, facie quidem crudâ longe est melior: splendida siquidem & tenuis & alba & pellucida existit. Sed quia ab ea euariet uirtute non habeo quod dicam. Neq; em̄ est suauior si mel bonū fuerit, imbecillior

becillior tamen & minus stercoreis ducens. Quorum neutro ut castigetur mulsæ opus habet. Cocto tamen probissimè utendum si mel uitiosum fuerit, impurum, nigrum, et mali odoris. Nempe coctura plurimam malignitatem turpitudinem tollit.

Tota dictione coctæ crudæq; mulsæ differentias docet Hippocrates: sed nullam desiderat expositionem.

De oxymelite.

24 Oxymeli uocatum potum sæpius quidem in his morbis commoditatem habere reperies. Nam sputum educit, & facilè reddit spirationem.

Καλὸν μὲν, id est uocatū aut quod uocat, & καλᾷ, id est uocari, atq; his similia adijcere Hippocratem non ignoras: interdum quidem q̄ hæc appellatio Græcis omnibus nullo pacto usitata sit, interdum uero q̄ abrogata, atq; interdum q̄ artificiosum quippiam demonstrat. ut ὡς τῶν κροταφίτων καὶ μεσσηνίων, id est temporalibus & mastoideis musculis declarauimus. Sed quod artificiosum nihil indicet oxymelitis appellatio, constat omnibus. Appellationem igitur ex adiectione το καλεσμένης uel damnaui, uel tanquā inusitatā indicauit: potest autem & utrunq; fecisse. Nam forsitan tunc primū in cōmunem uenit usum, forsitan & uocem damnat tanq; ex solis aceto & melle constare medicamentum explanantem, uel tanq; mellis differentiā indicantē. quasi ita quispiam diceret, Mel aut quod acre est, talē habet facultatē. Ergo de uerbis huius καλεσμένης adiectione nemo ignorat: quapropter ad id quod cōmodat descendamus. Non enim ex aceti mellisq; mixture tantum oxymelitis est cōpositio: uerum ex mulsā paulū aceti accipiēte. Sed ut coquatur melius est. Nempe uirtus aceti ita coctura imminuitur, ut mulsā quidem ab eo cui miscetur auxiliumumat, offensam autē non habeat. Auxilium autē in orationis exordio enunciauit, atq; postea enunciabit. Offensas uero ad dictionis totius calcem adijciet. Dictū est igitur in exordio, Sputū siquidē educit, & facilem reddit spirationem. Deinceps uero ea dicta sunt quæ ex intelligentia uerborum ipsius discemus.

25 Tempora uero hæc habet.

Καὶρς, id est tempora dixit, uel tempora quibus ex consuetudine utendum sit, uel tempora quibus iuuare soleat. Nēpe & in hoc significatu καὶρς id est temporis appellatione interdum uti Hippocratem ostendi.

26 Quod ualde acre existit, nihil medio-criter in ijs quæ nō facile educuntur sputis efficiet. Nam si quæ stridulā asperitatē faciunt educeret, gutturq; lubricaret & ueluti dilataret, pulmonē certe leniret: nēpe ipsum

A molliret. Quæ si contingeret, maxime prodesset. Interdū uero accidit, cum ualde acre fuerit, ut sputū nō educat: sed uiscosum reddat, adferatq; detrimentum.

In quibus acri oxymelite utendum sit, in his firmiter aliquando ex eo offensam docet Hippocrates. Nēpe in quibus nemo prorsus tali quod acre est medicamentū uteretur, tales recensere offensas superfluum est. Neq; em̄ simpliciter de acri oxymelite sermonē fecit, sed aduerbium hoc κάτα, id est ualde adiecit. quod λίαν & σφόδρα. i. admodū, uehementerq; significat. Tale igitur oxymeli nihil medio-criter in crasis glutinosisq; pulmonis sputis efficiere consueuit, in quibus eo solo quispiam utatur, sed ea uel secat, detergit educitq; uel facere id nō ualens, exiccat. Nempe ut huiusmodi medicamentum secandi uim habet, ita & exiccandi: utimur autem eo in crasis pulmonis sputis non tanquam exiccante (nēpe hoc pacto detrimentū adferret) sed tanquam incidente & detergēte. Cum igitur hæc facere nō ualet, tantum abest ut utilitissimū sit, ut etiā maxime noceat: sed quādo neq; secat, neq; detergit, in sequentibus docebit. Volo autē impræsentiarum de ea quæ in multis reperitur libris scriptura agere. Non em̄ per s, secundā huius nominis μέσς syllabam: sed β, scriptā inuenimus, ut dictio tota talis sit, καὶ βλὴν κάτα σφύδρα αὐτὸν αὐτὸν ποίησιν, id est, Quod ualde acre existit, nihil insignie efficiet. Sed id falsum est. Nempe inferēs magnum aliquando fieri ab eo iuuamentū ostendit, interdum & detrimentū. Quare perpetuo insignie quippiam facit, & nullo pacto leue paruumq; De quo autē est uerū dicere q̄ perpetuo magnum uel malum uel bonū facit, de illo melius nihil medio-criter ab eo fieri quispiam dixerit.

27 Potissimum autē ita afficiūtur qui aliās perniciose habentes neq; tussire neq; quæ intus continentur excreare possunt.

Sputa crassa uehementer glutinari, nihilq; ab exhibito, quod acre sit, oxymelite iuuari ait his cōtingere qui aliās perniciose afficiunt, id est qui bus crudus supra modum existit morbus. Nempe hī nihil expuunt.

28 Cum hæc ita habuerint, uires hominis perpende. Nam si de eo speraueris, dabis.

Postea quā eos qui aliās perniciose agrotant, ab oxymelite nihil iuuari prædixit, pauciq; ex ipsis adiuti liberentur, ob id & ipsius quod rarerent contingit non tacuit auxilium. Fit autem auxilium huiusmodi ab acri supramodum oxymelite cum ægri uires ualent. Nempe si non ualent, non iuuabit quod tale est oxymeli. Duorum siquidem alterum efficiet. Nam uel prorsus non secat: sed quod glutinosum est glutinosius reddet, uel dissecabit, abstergetque. Verum subitam uersamq; tum educationem, tum uacuationem quam molietur, non sufficere natura coninget irregulari hominem

29 Cum autē dare uolueris, perquam tepidum paulatimq; & non affatim dabis.

Si aeger ob sputorum tum crassitatem tum uiscositatem nihil expuerit, uirtusq; ualida fuerit, oxymeli dari iubet ualde acre, paulatim & ἀποχλίαν quod est ἀλγος χλίαν, id est perq; tepidū. Id autē calidi frigidiq; exacte est medium. Nam q; uentrem habeat facultatē propterea copiose ipsum uno hausit offerre ueretur. Pari modo & esta te frigidū porrigere ut antea precepit, ideo timet, quia tū pleuritides tū peripneumoniæ in quibus nihil expuitur crudæ sunt. Coctioni autē perpetuo calidum opitulatū confertq; frigidū uero renititur & aduersatur. Sed quam ob causam calidum etiam oxymeli deuitat Hippocrates? Certe ob morbi malignitatem malūq; morē. ne uidelicet protinus extali porione cruda persiluat affectio, hominemq; a calido oxymelite siticulosiorē fieri contingat. Nempe q; symptoma hoc uiscosum reddat sputū, exposuit. Tutius ergo mediocriter tepidū esse oxymeli arbitrat̃ Hippocrates, utpote qui calidi eam quæ succederet possit, frigidūq; de necessitate successuram fugiat læsionem.

30 Quod autem parum acre est, os faucesq; humectat, sputum educit, & sitim sedat, qua occasione hypochondrio uisceribusq; est beneuolum, mellisq; inhibet noxas. Nempe quod in melle biliosum est, temperat castigatq;.

Postea q; de supra modū acri oxymelite sermonem abolsit, ad id quod mediocriter acre est transit, humectare ipsum os faucesq; & sputū educere, & sitim sedare in textura orationis inquit; Nepe quod omnia quibus iuuari ægrotudines natæ sunt habet, id eorū quæ nocere ualent ob uim temperaturæ nihil habet. Nā mulsæ tantū aceti est admixtum, ut quod in ipsa biliosum sit, queat sufficienter καλῶς, id est καθελῶν, πεινῶσαι, id est castigare, inuertere, & suppressere. Nepe in quarto De simplicium medicamentorū uiribus dulcem succum acri maxime potētia aduersari demonstrauimus. Cū itaq; mulsæ facultas cetera quidem omnia quibus morbi huiusmodi opus habet, continet, in uno autē duntaxat cōtraria ipsi sit, q; scilicet supercalcfacta ipsa bile scat, migrationē sanē huiusmodi permixtio aceti cohibens, optimū efficit medicamentū. Nempe minime siticulosum erit, atq; ob id ipsa quæ nō omnino crassa glutinosaq; sunt, facile educit, has autē quæ dū numero existunt operationes, consequitur partium oris fauciumq; humectatio. Qua uero occasiōe hoc facit, ea tum leni tum hepatis maximam adfert suauitatem, uiscera suauiter iucundeq; expurgans.

31 Flatū præterea discutit et urinas mouet. Demediocriter acri oxymelite adhuc differēs, hæc protulit. Nam in pulmōis thoracisq; affectionibus plurimo est usus, maximeq; insignem habet patrocinarum ob metricam illam aquæ aceti & mellis permixtionem. Tale siquidem oxymeli spi-

ritū crassum glutinosumq; in hypochondrio scat; flatusq; abruptens, uias omnes expurgat; atq; ad urinas tum ferosa tum biliosa agit excrementa.

32 Sed partem intestini imam reddidit humentio rem facitq; ramenta.

Eam quæ supra id quod secundum naturam est innascitur partibus humiditatem, πλοσδύ Hippocratem nominare neminē ex nobis præterit. hoc igitur efficerē ait oxymeli. Nam quicquid crassi glutinosiq; succi superius infarcitur, id abradit scatq; atq; ad excretionem subducit. facile item et hac facultate ab iocinore facit excrementorum educationes, ita ut collectis superioribus cunctis humiditatibus in intestinis ipsis & potissimum in fernis, ob multitudinē quidem innascatur ea quæ supra naturam est humiditas, ob qualitatem uero intestini abrasio. Nempe & oxymeli detergente præditū facultate, tandem abradet intestinum. Eiusdem quoque est facultatis quod cum oxymelite descendat biliosum excrementum. Quapropter & sine oxymelite si aliquando exuperarit, intestinum abradet.

33 Interdū autē & hoc in acutis morbis est inutile, & potissimū q; non flatum modo foras prodire uiet, uerū quocq; & reuerti faciat. Præterea & maxime uires frangit, & extremas infrigidat partes.

In acutis interdum morbis abradi intestinum bonum non est. Nempe ea qua elici ramenta solēt affectio, partium quæ in superficie constant ulceratio est. Quæ cum talis existat, a perumpentibus omnibus & præsertim mordentibus, molestiam recipit intestinum. Quod affectum nisi protinus mordentia excreuerit, ad regionem superiorē, ea quæ perripūt, remittit. Quo fit ut ea occasiōe flatus etiam sursum recurrat. Naturalē siquidem functionem cūstringentem, experimentemq; sortita sunt intestina, ut in cōmentarijs De facultatibus naturalibus est demonstratum. Sed quæ cōtinentur a partibus quibus continentur reijci uelocitatis est opus. Cum igitur superne motus exordium habet, quæ continentur deorsum habent excretionem. Verū si motio inferne capit exordia, sursum feruntur. Quod sanē etiam in habentibus secundum naturam usu uenire uidetur. cum scilicet uniuersim raptimq; subeunt ad inferna intestina bile continemus excretionem, aut propter aliquam negocij curam quæ interpellari non possit, aut quod non propē sit quo uenter exoneretur locus. Nempe tunc emergere sursumq; ferri bile ita percipimus ut nō adhuc excerni possit. Sunt quibus ex huiusmodi bilis recursus stomachus male habet Alijs caput replei, & ob morbum dolet. alij patium tur utrunq;. hoc igitur pacto quæ ramenta habet intestinorū affectio, deorsum interdum exernit celeriter, ægrorum molestiam nequaquā sustinens. Interdum autē & a partibus inferioribus ad superiores, ubi quæ perripunt nō protinus per sedem prodierint, sed is qui sedem circulariter ambit mul-

sculus, tum contractus, tum recti intestini extremum ipsum adstringendo cōplexus, principium motiōis obstrictiorē ex infernis partibus ad superiores fecerit. Ob eam igitur causam nō flatus modo, uerum & excrementum in huiusmodi affectionibus reuertitur. Contingit autem & uires offendī ob eū qui in transitu ipso sequit̃ morsum. Nam quæ abraduntur, tamen si quod perumpit breuissimū habear morsum, uehementē tamen infestāt. Scimus aut̃ dolorem omnē uires exoluere euertere reſq; atq; ob id partes infrigidare extremas.

34 Et hæc sola est quam nouerim oxy-melitis noxa, quæ scribi digna sit.

Oxymeli mediocriter temperatum, noxas omnes quæ ex melle, aceto, & aqua emergunt, effugisse paulo ante est demonstratū. Quod si aliquādo nocuerit, solum nocet, quod abradat intestina: idq; facit in ijs qui imbecillam habent facultatem, & patī idoneum intestinum.

35 Exiguū aut̃ portionis huius nocte quidem & ieiuno ante sorbitionem dare expediat, quanquam & a sorbitione, modo longum intersit tempus, nihil uetet bibere.

Vbi facultatem quam habet percurrit, ad rationem temporis quo maxime ipsum quis porrigere debeat, in præsentī peruenit. & potissimum, cum qui oxymelite uti debet is sorbitionibus alatur. Nempe ubi quis nō sorbitionibus sed potione sola regatur, tempus in illis postea docet. At̃ ergo in sorbitione utentibus illud duntaxat obseruandum tēpus quo sorbitio ingeri debet. Præsanæ autem cremor sorbitio est, qui ut corpus alat roboratq; adsumitur. Ad quæ cōfert si nutritionis tempore solus in uentre contineatur. Nempe antea didicisti ea quæ ingerit̃ur multiplicia & præsertim facultate dissimilia, magnam progignere in uentre turbationem. Ob eam igitur causam non porrigendum oxymeli, nisi cremor concoctus fuerit. Qui si coctus fuerit, licet tum nocte tum appetente die ante sorbitionem sumere. Tempus autem inter sorbitionem oxymelīq; medium satisfacit si præsanæ cremor uacūū simul & purum ex ea quæ ab oxymelite facta est absterfione, uentriculum ingrediatur.

36 Qui autem non sorbitionibus sed potione sola utuntur, his non semper oxymelite uti expedit, præsertimq; quod intestina abradantur, ac exasperentur. Nam cum stercore uidua & destituta sint, magis hoc perpetientur: & quū uasorū uacuatio adsit, postea etiam aqua mulsa uires detraxerit.

Qui uictus rationem non ex præsanâ sed ex potu solo sibi instituit, ijs nō per totum morbum est conueniens oxymeli, & quod uehementius intestinum ipsum tum nudum tum humore alio destitutum abradat: nam a præsanâ quodammodo oblinitur ubi eam adsumpserint: & q; corpus nihil à mulsa accipiat auxilij. Mulse aut̃ auxiliū quod cor-

poribus adfert, cum de mulsa ageret, prædixit.

37 Quod si potum hunc & quidem multum per totum morbi tempus profecturū existimaueris, paulum aceti, tantūq; ut duntaxat sentiri possit, infunde. sic enim & ea quæ lædere solet, minime læserit: et his quæ auxilio opus habent, opem tulerit.

Cum sitim quidem mulsa inferat, sputa autem in bronchijs pulmonis contineantur uel glutinosa uel admodum crassa, tunc solo est utendum oxymelite. Neq; memoria excidat dicta hæc esse de ijs quibus relicta sorbitione potionis solius est usus. Si igitur ut dixi solo utendū sit oxymelite, paulum aceti mulse infundere cōuenit, ut aceti usu cōmodoq; fruatur, & fugiat qd̃ ab eo est detrimentū. Sed acetum mulse cōmixtum excoquere oportet. Nempe hoc pacto ad nocendū infirmius reddit.

38 Vt autem in summa dicatur, quæ ab aceto est acedo, picrocholis magis quam melancholicis prodest: amara siquidē dissoluuntur desciscuntq; in pituitam cum ab aceto in sublimē attolluntur. Nigra autem fermentantur, attolluntur, & multiplicantur. Nempe atra fursum ducit acetum.

Picrocholas naturas appellat Hippocrates, quæ amarum sibi contraxerunt succum, qui est bilis flaua. his idoneum esse ait acetum, quod melancholicis aduersissimum existit, Nam & bilem nigram acidam esse contingit, cum scilicet præter naturā habente corpore, & sincera & impermixta fuerit. Nempe cum recte ualeat, plurimū quidem prædictæ habet qualitatis, non tamen exquisitam ipsam. Reliqua dictionis manifesta sunt. Docet siquidem in ea quonā pacto acetum picrocholis qui in tēperamento calido ceteros uincit, adiumentum sit: utpote quod frigidum sit.

39 Mulieribus autem longe magis quam uiris aduersatur acetum. Nam uterum dolore afficit.

Quod acetum suapte natura nervos offendat, testatur experimētum, & ratio demonstrat. Nempe exangues sunt, et ideo frigidi facileq; ab ijs quæ perfrigerant simul & tenuous habent partes afficiuntur medicamentis. Læduntur præterea & a reliquis perfrigerantibus omnibus: sed substantia aceti quod tenuium est partium, in eorum mergitur profundum: atq; in omnes ita irrumpit partes, ut ne minimū quidem ex eis illæsum maneat. Sic igitur acetum nervosas offendit partes. Vterum autem anatomici ferē omnes nervosum esse dicūt. Verum et absq; eorum adnotatione, quam ex anatomica inspectione fecerunt, poteris & tu de eartiocinatione colligere: Nempe ad maximam laxatū molem, & ad minimam contrahitur. Quantus etenim foetus fuerit, tātum ipsum perpetuo circulariter ambit. Impleturq; spatium omne ab eo, etiam si foetus paruus fuerit uel magnus, ueluti uenter à

terā cibis. Sed uentris non magna est ad contraria permutatio, uteri autem maximæ. Plurimum autem dilatarī laxariq; neruoforum propriū est corporum, & non carnosorum.

De aqua.

40 Aquæ quæ in acutis bibitur morbis, nullum sanè aliud habeo quod illi concedā officium. Neq; enim in peripneumonicis tussim sedat, neq; sputum educit: imò cæteris minus, si quis aquæ potione prorsus utatur. Verum si inter oxymeli & mulsam paulum aquæ sorbeatur, ob qualitatis potionū transmutationē sputū educit. Nempe intus inūdationē parit. Aliās neq; sitim sedat, sed amarescit. Nēpe ei qui suapte natura biliosus existit, ea est biliosa. Hypochondrio præterea est infesta malaq; atq; etiā pessima biliosissimāq; & uiriū maxima labefacta u bi in uacuitatē uenerit. Adde q; lienem auget iecurq; ubi phlegmone obsidetur, fluctuatq; et innatat. Tarde siquidem meat, q; frigida & incoctibilis sit, neq; aluū deijcit, neq; urinas mouet. Atq; ex eo quoque nota est quod stercoreis ducendi suapte natura expers sit. Quam si pedibus frigentibus aliquādo quis biberit, ea his omnib. multo magis nocebit, ad quoduis eorum uenerit.

Neq; incidēdi uim habet aqua ut acetum: neq; calida est ut mel. quod sanè non calfacit modo, uerum quoque & detergit, secatur. Tarde igitur iure optimo meat aqua, difficulter cōcoquitur, atq; ægre descendit: quanquam alioqui & optima sit, & culpa omni uacet. Nam quæ uell limosa, uel male olens, uel salia, uel alterius cuiuspiam medicamentis qualitatis particeps existit, ea non simpliciter est aqua: sed cum tali quadā permissione medicamenti, ut si mel uitiosum, uel pisanā, uel acetum, uel uinū, uel quippiā tale designaueris. Non enim ex illo genus totum culpabis, sed id solū ad quod conuertis mentem. Cum igitur super singulis, de quibus enunciat Hippocrates, sermo de optimis sit, ita & nūc intellige, singula quæ dicunt ad optimam referens aquā. Ea aut purissima est, & omni aliena qualitate destituta. Hæc igitur quantq; optima sit, multo tamē tempore in uentriculo manet, fluctuationesq; plurimū parit. Quo fit ut cū biliosus uentriculus fuerit, corrūpatur & illa. Præterea & cum ex uentriculo ad intestinū intestinū ægre perueniat, non facile distribuitur, neq; in hepar, & minus in renes, thoracem, & pulmonem. Quo fit ut neq; urinas mouere nata sit, neq; sputū educere. Imò neq; per totum corpus molitur transpirationes. Id nanq; substantiæ, quæ tenuium sit partium, opus est, calidæq; non frigida & crassarū partium. Neq; præterea sitim sedat quod in amplis tum uentris tum intestinorum animalis instrumentis plu-

Galien.

sculo maneat tempore. Neq; prorsus imas penetrat partes, neq; siccitate humectat. Quod autem non alat, antea est dictum. Quo fit ut neq; facultatem uitale roborare possit. Atq; hæc sunt causæ propter quas Hippocrates ad mulsam, oxymeli, & uinum se contulit, in egris ab aqua abstinens. Iam igitur ob eas causas nunquam ea quis utatur. Utuntur tamen & alij quidam medici, atq; etiam Hippocrates: sed hic minus, cæteri magis. Nempe quod cæteris perperam utantur circumuenti ad aquam ipsam recurrunt, quæ non insigniter quod præter animi sententiā succedat, habet, quando ne uirtutem quidem. Sic enim Erasistratus dicebat: Fortes tum ciborum tum poruum facultates tempestiue quidem adsumptæ maximum iuuamentum: intempestiue uero maximam offensam adferunt. Quem autem uitiosum esse dico, tum oxymelitis, tum mulsæ, tum uini usum, is quidē oritur, & ob repentinas mutationes, ut ipse ostendit, & magna ex parte ob synceram quæ à medicis fit permissionem. Cum igitur feni quidam ægrotanti quotidie uinum aquosum exhiberem, quidam ex huiusmodi medicis præfens, me uini minimum aquæ ipsi instillantem contemplatus risit, ægrumq; uinum non bibere sed duntaxat uidere dixit, non sanè intelligens missionis uini quod gratia uoluptatis datur, ad aquam aliam esse symmetriam, & aliam esse eius quod ad opem ferendam ministratur. Nam uini omnino minimum ueluti excitationem quandam quæ ad distributionem aquam trahat, permiscemus, quo duntaxat aquæ tollamus synceritatem, nō autem aquam uinum faciamus. Sunt autem pleriq; ex sanis qui uinum aqua dilutum bibant, sed in his aquam gustatu ipso euincere non oportet. In agris uero ita ut modica fit uini repræsentatio. Sic & de oxymelite pauloante dicebat aquosum laudans. Quod item tutius quispiam ea uteretur quæ aquosa est mulsæ. Nam syncerā puraq; nifi uentrē subducere anticipauerit, magis nocebit, & potissimum in amaræ bilis hominibus, & his quibus præter naturam tumefacta sunt uiscera. In his & aqua detrimentū adfert, cum plus iusto in hypochondrijs morata bilefcit. Nempe & præter hæc omnia quæ habet mala, stercoreis ducē dū adhuc est expers, neq; ullo pacto aluum subducit. Aquam aut in principiis accessionum potam lædere (quod manifestauit cum dixit: Quam si pedibus frigentibus quis aliquādo biberit, ea his omnibus multo magis nocebit) eorū est quæ omnib. & nota & certa & cōfessa sunt. Quando igitur bibi idonea est aqua? Cū scilicet potu solo eger usus fuerit, nullo pacto accepto pisanæ cremore. Tūc enim in potionū aliarum medio aquam tempestiue quis ingesserit, & præsertim cum siticulosus æger fuerit. Nempe eam *πνευμασθία* quandam, id est humidā cuiuspiam copiam abundantiamq; facere ait. Quo fit ut inter mulsam oxymelich parum aquæ exhibeat, quod ijs quæ expui debet, cōferat ad humectationē. Imò & cum uinum grauiter nocet, tunc aquam propinat. Quoniam autem pacto id demonstraturus sit Hippocrates, audiemus.

tom. 6

F Cum

41 Cum uero in huiusmodi morbis fortē capitis grauitatem uel mentis læsionem suspicatus fueris, à uino penitus est abstinendum: aquamq; tūc dare oportet uel uinum aquosum, fuluumq; & prorsus inodorum, atq; ab ipsius potione, aquæ exiguum superbibendum. Nam hoc modo uini potentia caput mentemq; minus tentabit.

Mens tentari lædiq; dicitur, cū æger febre correptus desipuerit. Nunc ergo mentis læsionem desipientiam dicit, in qua uino abstinendum præcipit. Pari modo & in uehementibus capitis doloribus. De utroq; antea est dictum. Sed impræsentiarum ubi in prædictis symptomatis à uino omnino abstinendum prædixit, consequenter aquosum fuluumq; omnino & quod odore careat, dandum ait. Aquosum quidem & inodorū dare bene dicitur, sed flauum non admodum recipio. Nam ad ea aquosum album melius existit. Etiam uero in eam gratiam cum uina talia sunt, superbibendam concessim aquā tutius præcepit: Minus enim, inquit, uini robur quod uehemens est, caput, mentemq; tentabit, ἀποτορο quidē uerbo usus libiphi usitato consuetudo. quo ἀποτορο id est mentis læsionem ab huiusmodi uerbo quod ἀποτορο nomine hominibus usitatus est sese fecisse ostēdit. Caput autē mentemq; uino tentari ait, q̄ propter caliditatem celeriter ad caput feratur, feruentemq; in corpore secum ferat humores. Quia autē ratione caput male afficit, ea & mentem. Nam in capite sapere ipsum situm est, & ea animæ pars quæ ratiocinatur.

42 In quibus autem maxime aqua utendum sit, & quando ualde multa, & quando modica, & quando gelida, & quando calida: partim quidē antea dictum est, partim uero suo tempore dicitur.

Erasistratus quidē in libro De febribus maliciose satis criminatur Hippocratē, discipulos ipsius propē accusans Apollonium et Dexippum, quos ait cereos cyathos duodecim ad sextantalem corylæ cyathum effinxisse, atq; unū ex his uel duos febrientibus admitti. Verum Hippocrates nō hic solum, uerū quoq; & in antedictis potionibus omnibus copiosius largiū ue manifeste uti uisus est. Quod & in præsentī dictione liquido ostendit inquitens: In quibus autē maxime aqua utendū sit, & quādo ualde multa. Nā & τὸ κατὰ πολλὸν, τὸ λίαν πολλόν, id est ualde & supra modum multa significat. sed sanē satis erat dicere multā aliquando dari aquā sine adiectione aduerbij huius κατὰ, in ostensionē malitiæ Erasistrati, qui de Apollonio & Dexippo mentionē facit, nec ullum horū librū ostendere potest, nec Hippocratē ipsum intelligit aperte dicentē, Et quando utendū ualde multa. Quinetiam & superiore oratione mulsam inter oxymelīq; aquā porrigens utilem esse ait, q̄ πλεμυρῖδα, id est humiditatis abundantiam parit. Scripsit & antea de mulsā & oxymelīte aquosis, quod os hu-

meant, & urinas quantitatē insignem, quā & os humectari, & urinæ cieri, & quæ pulmonē infestent expui possint. Præterea et de oxymelite ita scripsit. Quod si potū hunc, & quidē multū per totū morbi tempus profuturū existimaueris, adiiciens hie multum. De malitiā autē Erasistrati aduersus Hippocratem dicta hæc sufficiant. Cæterum recordemur Hippocratē quomodo ante, ita, & nūc polliceri se in morbis singulis propriā faciendum doctrinam. cum hoc in loco uictus instituendi artē non sufficienter conficiat: sed uniuersalia sola in exemplo morbi unius, scilicet pleuritidis prosequatur.

43 De reliquis potibus, cuiusmodi est horseaceus, & qui ab herbis uiridibus, uua pasia, uinaceis, tritico, cnico, myrtis, punico, & alijs parantur, cum horū aliquo uti tempestiuum fuerit, in morbo ipso scribetur: ubi & de compositis agetur medicamentis.

Habet quoq; suam & hæc dictio doctrinæ alterius quæ de morbis singulis sit, promissionē. Verum quicquid sit, liquido cōstat uel libros qui De singulorū acutorum morborū curatione ab Hippocrate scripti sunt non extare, uel prorsus nō scriptos esse. Nam qui nunc circumferuntur, Hippocrate non sunt digni. Sunt tamen multa quæ mentem ipsius oleant, ueluti & quæ huic libro adiacent ab eo qui de balneis est sermone. Sed, ut dixi, de singulis in horum expositione commodius differemus.

De balneis.

44 Balneum in plerisq; morbis cōfert. In his quidem perpetuū, in alijs uero nō, estq; tantum minus utendum sit quod imparitum homines habeant. Nā in paucis domibus parantur necessaria, reperiunturq; qui rem ut oportet curēt. Quod si exacte quispiam nō lauatur, non mediocrem incurret noxam. Tecto siquidem est opus quod fumo careat, copiosa item aqua, & crebra lauatio: sed quæ immediocris non sit, nisi res ita postulauerit.

Balnea huiusmodi, tēporibus Hippocratis nondum cōstructa fuisse uidentur. Nempē dicere, paucis in domibus parari necessaria, & reperiiri quire probe curent, opusq; præterea tecto esse non fumoso, copiosa aqua, & quæcūq; deinceps dixit, quod in domibus calefiebat adhuc intra lebetes aqua labrisq; infundebatur, argumentum habet. Quod autē in fine dictionis ait, crebra opus esse lauatio, sed quæ immediocris nō sit, nisi res ita postulauerit, si utiq; memoria nō excidat, in sequenti doctrina obseruabimus. Nā ipse inquit, Sunt qui immediocris aliquādo egēt lauatio. id autē cū æger multa, dum lauat, perfunditur aqua. Quod si dicere nō uideat, nos ipsi nō simpliciter quidē, neque ut inciderit, sed cum eorū quæ ab ipso scribuntur

tum consequentiæ obseruatione percunctabimur.

45 Neq; etiam defricare oportet, quod si aliquando defricandū sit, calido aliquo, atq; multiplici plus q̄ receptum est utēdum de frictorio, perfundendaq; aqua multa, & celesiter post perfundenda.

Nullus æger cum lauatur defricari expostulat, nisi sordidus sit, & pruritu vexetur. Nempe qui ægrotant, aqua citra laborem omnem lationemq; proliui debent. Defricatio autem purgatorijs medicamentis sit tūm mordentibus tū siccantibus, quō sit ut ea tum uirtuti tū usui balneorū aduersissima sit. Si uero æger defricari debeat, uel propter sordes uel propter pruritum, uim medicamenti defricatorij multa admixta aqua, immisso quoque oleo, suppressimè oportet. Quocirca inquit Hippocrates, Atq; multiplici plus q̄ receptū est, id est q̄ sanis consuetū sit, utendū defricatorio. Nō enim substantiam medicamenti defricatorij in agris multiplicem accipiendam præcipit, cum non defricare magis q̄ defricare uelit: sed defricatorij copiam in agris multiplicem fieri iubet per aquæ adauctionem. Ea siquidem ratio defricatoria quoq; uitare præcepit non excitante uel sortitie uel pruritu, acnibusq; ipsis & synceris non utendū. Sicut autem multitudine aquæ admixtæ dissoluit defricatis medicamenti acrimoniam, eodem modo totius defricatorij uim dissoluit, superinfundēs statim multam aquā calidā puramq;. Deinde rursus alia præcipit.

46 Via ad solium breuis sit.

Comune id est siue in balneo hominem laueris siue in domo aliqua extruxeris pyrā, et labrū aqua impleueris. Quod & nunc in castris sit sepius cum lauari quempiam deficiente balnei loco oportet.

47 Facilisq; tum ingressus tum egressus.

Prorsus siquidem citra fatigationem lassitudinemq; agrum seruare iubet, atq; ob id solium facilem tum ingressum, tum egressum habere uoluit. Id proculdubio fiet, si paries qui aquam continet neq; sublimis, neq; angustus fuerit. Maxime autē laudabile et a labore omni alienū est qd in aquarū sponte nascentium conficitur lauacris. Nempe folia humilia ita depressaq; prope omnes conficiunt ut nihil solij pauimento quod propē est emineat.

48 Qui lauatur, componat sese, taceat, & nihil agat: sed cæteros tum perfundere tum abstergere sinat.

Hæc quoq; prædictis similiter ut æger non lassetur, cōferunt. Nepe & egrotantis quies ut corpus in balneo tum laxius tū mollius reddatur, est idonea. Nam cū mouetur corpus, musculi extenduntur, qui minus tum molliuntur, tum relaxantur.

49 Multæ quoq; aquæ misturæ parētur.

Cū Hippocrates inquit, & μετὰ κέρσµα πολλὸ ἀνταίωδι, id est multæ quoq; aquæ misturæ parent, potest unico legi uerbo, μετὰ κέρσµα, potest etiā intelligi hæc præpositio μετὰ perse, & seorsum κέρσµα. Nam Hippocrates non in hoc solum libro,

Galen.

uerum & in alijs Ionum more per defectū uti præpositione μετὰ uidetur. Plene autem atq; integre ita legetur, & μετὰ τὰυτὰ κέρσµα πολλὸ ἀνταίωδι, id est multæ quoq; post hæc aquæ misturæ parentur. Siue autem quis uno intelligat uerbo μετὰ κέρσµα, siue distinguat distrahataq; pro μετὰ τὰυτὰ κέρσµα una est dictionis utriusque intelligentia. Vult siquidem misturam parari, eum qui in solio lotus est perfusus, quod medici huius temporis omnes efficere consueuerunt, cum agrum lateant. Neq; enim in labrum frigidum ingredi permittunt, sed tepida perfundunt aqua. Alij solia tota aqua huiusmodi replent. Nam ut corpus, tum laxius, tum rarius, calida lauatione est redditum: ita rursum quiete paulatimq; cōtrahere ipsum, & cogere, & densare in animo habet. Nempe id ad uirtutis robur confert, facitq; ut non facile homo lædatur, si subita quedam in ambiente aere fiat ad frigidum permutatio. Ob id sanē & qui recte ualēt, a balneo calido sese in frigidam projiciūt aquam.

Sed qui ægrotant, contactū frigidæ non sustinent citra lationē. Quapropter frigidam calidæ mistione suppressimus. Mistionis autem modum inueniemus, in primis quidē si corporis affectionē inspereximus: deinde & propriā laborantis naturā ætatemq; & anni tempus & regionem & præsentem cœli statum. Probe autem facient qui a calido balneo tepidas non minus trium generum aquas, quæ inter se differant, parabunt: ut prima quidem admodum tepida sit, secūda uero minus: & tertiā

adhuc quæ magis ad frigidum declinet. Tale autē quippiam uelle uisus est Hippocrates cum præcepit misturas multas parari. Nempe quod paratur, id non simpliciter modō multū, uerum & uariū multiplexq; esse est melius, ut paulatim a calido ad frigidum procedatur: cū subitā ad contrarium mutationem æger non ferat.

50 Celeresq; faciant perfusiones.

Ταχείας, id est celeres, referre oportet, non ad eam solum quæ in perfusione sit actionem: uerum quoq; ad illud quod actiones interioræ spaciūt: ut primam inter perfusionē secundamq; parum sit interualli. Quod si quis proprie nominauerit, nō ταχείας, id est celeres, sed πυνκνές, id est frequentes dixerit. Quamquam apud ueteres usus horum nominum πυνκνός & ταχείας confundatur. Nam aliquando πυνκνές, id est frequentes actiones, ταχείας, id est celeres uocant.

51 Et spongijs pro strigili utantur.

Neq; strigilibus in agris ipsis, neq; spōgia medicis huiusce temporis utunt: sed a balneo eos linteo cōtegunt, alijs uestibus & potissimū puris ut plurimū sudēt, obuoluunt. Sed nō semper agrū ipsū a balneo copiose sudare cōuenit. Nepe sæpius laborantē ad balneū non uacuandī corporis gratiā dūcimus: sed prorsus contrariā ob rationē, ut scilicet humectetur, madescatq; quod immoderatus exaruit. In talibus igit nō in balneo sunt expectandi sudores multi: sed quā citissime solij aquā ingredī, & postea balneo egressos detergere expedit.

tom. 6

F

2

Et

52 Et non ualde siccū perungant corpus.

Oratio hæc succedit quidem huic, Et spongijis pro strigili utantur. Sed qui sermonis proprietate contemplatus fuerit, is de unctionis in balneo usū intelliget, ne eorū quæ de necessitate dicenda sunt quippiā prætermisum esse uideat. Nam ubi post balneum spōgia aquam deterfit Hippocrates, ob scurum quidem est an corpus unxerit; bene tamē egri corpus cum humidum exsistit perungendum esse constat, nisi quippiam oleum cum aqua ipsum detergere rursus dixerit. Est igitur utile ut de unctionis in balneo usū discutiatur: sed necessaria magis est super unctionis tempore discussio, an oleū perfundere conueniat, uel ubi qui lauatur sudauerit, uel cum siccus adhuc est confestim ubi sese exuerit, & prius quā sudauerit, uel horum neutrum fuerit; sed ubi humescere cōperit. Sanē quicūque eorum meminit quæ de olei facultate in Simplicium medicamentorū tractatione dicitur, is exacte nouit optimum esse olei usū in ijs qui lauantur tempus, quod tertio dicitur loco: nouitque quonā pacto calfactum corpori exhibere cōueniat. Nempe id corpus mollius reddit laxiusque, cum frigidum suo contactu non solum horum neutrum efficere natum sit, sed & eos qui lauantur horrore afficiat.

53 Caput uero spōgia, quoad maxime fieri poterit, reficcare oportet.

Quod in balneo caput curiose detergendum sit, ut ne minimum quidem superfit humiditatis nequaquam est ambiguum. Nam quicquid relinquitur, perfrigerare consueuit. Non tamen a spongia ut fiat, effici potest, nisi statim ab initio post institurarum usum. Capitis tamen aquam lineo detergere est melius.

54 Neque caput ipsum modo, uerum & extrema, & quamuis aliam corporis partem a frigoris iniuriā prohibere conuenit.

Dixisse id per se seorsumque parum esse mihi uidetur. quod enim pars nulla omnino nuda esse debet, cum a balneo aquam eorum qui lauantur detergunt, constat liquido omnibus. Nam quæ ita denuantur partes, cito eas perfrigerari nemo ignorat.

55 Lauari quoque is non debet, qui nuper uel sorpsit uel bibit.

Nō in agris modo, uerū quoque & in sanis, nullus cōfestim a cibi uel potus sumptione lauari debet. Nā qui biberunt, his caput repletur: qui uero cibū sumpserunt, his nō caput modo, uerū & corpus totum alimoniam ad se prius quā concocta fuerit trahit.

56 Neque confestim a balneo forbendum, neque bibendum.

Sedata quæ ex balneo est turbatione, tum esse tum bibere melius est, ueluti & composita ea quæ ab exercitatione oritur. Nam cibum protinus uel potum sumere, caput replet, deuoratumque interdum superfluitare facit.

57 Magni autē admodum pendere oportet si æger cum recte ualuit, balneum ualde

affectauit, & lauari fuerit assuetus. Nempe tales magis appetunt, iuuanturque cum loti fuerint, adeo ut lædantur si nō fuerint loti.

Demōstrata sunt hæc per totū ferē horū cōmentariorū secundū ubi dictiones exposuimus, in quibus parte plurima cōsuetudinū uires enarrauit.

58 Peripneumoniæ autē magis quā ardentis febris confert. Nam lateris pectorisque & dorsi mulcet dolorē, sputum maturat, educitque, & spiritum facilem reddit. Lasisitudines tollit, mollit articulos, et cutem per summa apparentē, urinas ciet, capitis soluit grauitatē, & nares humectat. Tot ergo insunt in balneo bona, quibus omnibus est opus. Cæterū si in apparatu re una uel pluribus defectum sit, metus est ne nō proficiat, unum siquidem horum, quoduis fuerit, si à ministris nō ut oportet, præparetur, ualde lædit.

Quare peripneumonias magis quā febres ardentis iuuat balneum, ostendit Hippocrates cum inquit, Nam lateris pectorisque & dorsi mulcet dolorem, sputum maturat, educitque, & spiritum facilem reddit. Ob hæc etenim omnia peripneumonias maximo est prædicio. Sanantur siquidem qui contenta in pulmonibus sputa expunt. Pleuritici quoque ob doloris mitigationē ualde iuuantur. Quapropter duorum alterū. Nempe uel ita scribendum, Peripneumoniæ autē & pleuritidis magis quā ardentis febris confert: uel in peripneumonia pleuritidem subaudire oportet. Nam pleuritidis dolorē in latere habet; Peripneumonia nō habet. Cæterum cum peripneumonijs magis quā ardentibus febribus cōferre balneum inquit, docet quoque & æstuantibus quibusdā auxilio esse: uerum oratio hæc distinctionē exposcitat, quā nōdum efficere possumus, quia tempus quo lauari egrotantes uelit, nō definitur. Vbi autē sequenti dictione enarrantem Hippocratem quosnam haudquaquā lauare uelit intellexerimus, ad balnei tēpus ita perueniemus.

59 Qui in morbis aluum plus iusto humidiores habent, ij non sunt lauandi, neque hi quibus magis quā decet detinetur, & soluta nō sit: neque quibus uires languent, nec cibum fastidietes, nec nauisabundi, nec biliosos ructantes, nec quibus sanguis è naribus profluit, nisi minus quā decet fluxerit, nec quod decet te latet. Nam si minus quā decet fluat, lauabis, etsi uniuersum corpus in cæteris, etsi caput duntaxat iuuaret. Si igitur apparatus hi conuenientes fuerint, ægerque feliciter balneum suscepturus sit, quotidie lauare oportet.

Quibus complura per uentrē subducuntur, his balneū sistit, ea ad corpus uniuersum reuellēs, atque hac occasiōe detrimentū affert. Quod autē qui nullo modo

lo modo diecerunt eos antea uetustā faciem eua
 cuasit melius sit, nemo ignorat. sicuti neq; quod
 γυναικίς, hoc est ἡσκαταλευκίς, id est qui-
 bus iam non uigent sed cessant uires, balneū am-
 plius euerit. At præterea et ἀσώτως, id est cibum
 fastidiētes, & nauseabundos haudquāq; lauādos,
 Nēpe hos uiribus ita defici metus est, ut succedat
 ea quæ stomachica appellat̃ syncope. Succedunt
 his quibus os uentriculū bile redundat, quos nota
 indicauit inquis: Nec biliofa ructantes. Pari mo-
 do neq; eos lauare cōuenit quibus profluit abun-
 de ē naribus sanguis. Nā si minus fluxerit, lauare
 est consentaneū. Sunt autem ij qui uehementiore
 egent balneo, id est qui multa aqua perfundendi
 sunt, ut sanguis qui in capite est, uehementius mo-
 ueatur. Cōsimiliter lauabimus si sanguis nullo pa-
 cto erumpat, & erumpere debeat. Ex adiectione
 autem huius sermonis: Et si uniuersum corpus in
 cæteris, & si caput duntaxat inuerit: clarius adhuc
 significauit quod sapius in domo calfacta ægrum
 absq; solio collocet, & caput duntaxat citra reli-
 quas corporis partes calida perfundat aqua.

60 Lauandi autē cupidos si quotidie his
 laueris, nihil peccabis.

Qui Victori Romano principi librū De uictus
 ratione Hippocratis tradidit medicus, is dictionē
 hanc & alias quadam decurtatas scripsit: sicuti &
 illā in qua dicit, Nō proteleni primi forbēdi dies.
 Præterea & Qui bis die cibum sumere sunt assue-
 ti, his bis dare oportet. Verū utriusq; harū dictio-
 num dimidiā partem subtraxit: sed præsentis qui-
 dem nihil, tempus uero nō adiecit, ubi *ἐλαττω-
 νας*, id est lauādi cupidos eos intelligit, qui cū sani
 sunt, lauari gaudēt, atq; ob id sepius lauānt. Nempe
 hi cum lauantur, eū accipiunt qui ex consuetu-
 dine est scopum. In sequentibus autē ab Hippocra-
 te tempus quo ægros lauari uelit, audiemus.

61 Tutius autē longe balneo uti possunt,
 qui tota utuntur pitiana, q̃ qui solo utuntur
 cremore: quanquā & ij interdū uti possint:
 minime autem qui potu solo utuntur.

Tempus quo lauandum sit, hoc in loco patefecit
 Hippocrates. q̃ si ab initio pronunciaisset, multa
 sanē, quæ loco medio dicta sunt, non obscura &
 ambigua essent. Pitianam enim totam porrigit, ijs
 qui mitius queriusq; habent. solum uero cremo-
 rem ijs qui deterius degunt. uerum ijs qui pericu-
 losius acutiusq; laborant, potus solos. Quod au-
 tem toto in hoc commentario de thoracis pulmo-
 nisq; affectibus egerit, plurima quidem exempli
 uice in his morborū partibus, & præsertim pleuri-
 tidis uniuersalia præcipiēs sapius est demonstra-
 tum. Est expositū quoq; quonā pacto coctis mor-
 bis pitiana uti uelit, quo tempore & balneum sine
 periculo adhibetur, utpote quod ad sputorū quæ
 in thorace & pulmone continentur, expurgatio-
 nem maxime conferat. Qui igitur ita habent, &
 quæ ex consuetudine est accesserit indicatio, his
 lauationem duplicare nihil prohibet. At præterea

Galen.

balneum *ἡκιστα*, id est minimum iuuare eos qui so-
 lo utuntur potu. ubi *ἡκιστα τὸ ἐλαττωσις*, id est mini-
 mum significat, & non, ut quidam aiunt *ἐλαττωσις*,
 id est nullo pacto. Nam inferens, inquit.

62 Est sanē & quando uti possint. Ex his
 autē quæ ante scripta sunt, quosnam in sin-
 gulis uiuendi modis iuuaturum sit balneū,
 & quos non, conijcere oportet. Nā quibus
 aliquid eorum quæ balneum & bonū red-
 dere & iuuare possunt, deest: hos lauare nō
 expedit. Quib. uero nihil deest, signūq; ad-
 est ipsis in q̃ lauare cōueniat: lauare oportet

Non adiecit quidem quando his balneo uten-
 dum sit, sed nos qui sententiam ipsius sequimur,
 dicemus. Potum solum his exhibet Hippocrates
 quos acuti infestant morbi: ubi uires ad morbi us-
 que uigorem, qui interdum cum ipsa coctione ex-
 istit, ueluti in morbis thoracis, pulmonisq;, suffe-
 cturas sperauerit. Coctis siquidem qui affectum
 prognunt humoribus, confestim exstrebunt.
 Quod si qualia oportet solum expuere cœperint,
 in neutro adhuc modorum neq; in affectu, neq; in
 symptomatis morbus augebitur. Nam sapius affe-
 ctio ipsa qua laborant mitior quidem existit, sed
 symptomata augentur, ut in phlegmone obfessis
 particulis quo ipse inquit modo: Cum pus confici-
 tur, tunc dolores & febres fiunt magis quā cum
 factum fuerit. Sapius autem mutui exultant in-
 crementis diminutionibusq; symptomatum ma-
 gnitudines & ea quæ affectionis est. fitq; id in his
 phlegmonis in quibus pus effluit quod iam est cō-
 fectum, ut in uulneribus quibusdam fieri consue-
 uit, & in peripneumonij pleuritidibusq;. Possunt
 ergo in his morbis & hi quibus potus solus usus
 est, nō inutiliter lauari. Nempe dolorem ipsorum
 balneum mitigare ait, & sputa maturare. Sed sanē
 uacuato prius corpore, id faciendum. Sciuerisq;
 in uniuersum de balnearum uiribus, quod si non
 antea uacuato corpore exhibeatur, membris affe-
 ctis fluxionem parit. uacuato autem si exhibea-
 tur, coctionem iuuat. Nempe corpore toto ante
 uacuato adhibuit, insuper uacuatoriam obtinet
 facultatem. Quo fit ut ex febre ardente laborantē
 bus his tantū opituletur qui sine tumore uel phle-
 gmones uel erysipelatos laborant, feruente in ip-
 sis per totum corpus bile. Quod si coctionis signa
 habuerint, his multo magis conferet. Verum si e-
 stuosa febris ob saliam pituitam putrefactam oria-
 tur, aduersissimum illis esse balneum scire oportet.
 Neq; enim pituitosus humor ut biliosus per cu-
 rim euacuatur, propterea quod tum crassus tum
 glutinosus sit, neq; extinguitur longa egens con-
 coctione. Non sum autem immemor uerborum
 Hippocratis, quæ in principio libri huius hoc re-
 fert pacto: Quæ autem medicum ante anima duer-
 tisse agro non referente oportet, plurima præter-
 missa sunt. Hæc siquidem qui Hippocratem Do-
 gmaticum esse putant, locos affectos esse dixe-
 runt, & ipsorū affectiones ac causas. Sed qui Hip-

pocratem Empiricum esse existimant, anni tempora esse, regiones, aetates, consuetudines & ambientis nos aeris conditiones affirmauerunt. Haec equidem omnia tum quae a dogmaticis, tum quae ab Empiricis dicuntur, utilia esse non ignoro. Verum scopos multos hoc in libro recensens Hippocrates, ad quos quis respiciens uictus formam inuenire possit, nullius eorum quae dicta sunt, praeterquam consuetudinis mentionem fecit. Sed sane nonnulla alia quae reminiscantiam exigunt, tractauit. Atque ob id sermonem sum remoratus, ut haec quae breuis sit interpretatione eos, qui totum legunt librum, habeant sermonis huius per intelligentiam assecutores. Vnus sane & praecipuus scopus tanquam in exemplo pleuritidis talis in dictione ab Hippocrate enarratur: Siquidem siccor fuerit morbus quam ut quispiam putauerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem uel mulsam, uel uinum, utrum magis auxiliaturum putaueris, propinare conuenit. Post haec deinceps ait: At si os madescat, & quae a pulmone expuntur talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem ut dicam summam augere conuenit. Verum tum haec tum quae serie continuata dicuntur, non sunt a Gnidij sententijs definita. Post haec & morbi coctionem animaduertendam esse ait Hippocrates, qui sane scopus totius propemodum est Hippocrati uictus instituendi generis, atque earum quae in eo particulariter fiunt permutationum. Alias quoque & subinde apponit distinctiones quae tales sunt, Quibus enim cibus statim inclusus est, si quis non uacuato eo sorbitionem dederit, dolorem si adest adaugebit, & si non adest protinus inducet. Et amplius, Praeterea si lateris dolor asiduum est, calidusque fomentis non remittatur, sputumque non procedit, sed extreme citra coctibilitatem glutinosum sit, nisi quis dolorem uel alui subductione uel secunda uena pro utriusque significatione soluerit, pti-

A sanam autem ita affectis dederit, praecipitem ager in mortem. Proinde & rursus distinguens, ait: Si nuper pasto uelpiam, & alui oneribus haudquaquam purgato febris uel cum dolore uel sine dolore inceperit, a sorbitione tatisper est temperandum, donec cibum ad inferam intestini partem descendisse coniectum sit. Tum rursus: Si nuper cibato cibus prior non descenderit, uirtusque ualida fuerit, & floruerit aetas, subluere oportet. Si uero uirtus imbecillior fuerit, balano est utendum, nisi alius sua sponte probe deiecerit. Adiecit ergo in hac dictione eum qui a uirtute est scopum ueluti in sequentibus saepenumero, & id considerari praecipiens quae nam causa & affectio sit quae uirtutem prosternat, ubi & hoc a medicis ignorari adiecit. Praeterea adiecit quod ijs qui dolore ad hypochondrium peritinentem habent ea quae per talia medicamenta fiat, auxilio sit purgatio. Ceteris autem quibus dolor uel grauitas ad brachium uel pectus extenditur, uenae sectio. haec autem & reliqua huiusmodi, quae item de consuetudine dicta sunt, a Gnidij medicis omnino sunt praetermissa, multoque magis naturae & corporum temperamenta, de quibus saepenumero in hoc libro egit, hos picrocholos appellans, alios melancholicos. His autem scopis in haerens, de ea quae tum in sanis, tum in aegris sit uictus ratione agit, quoniam pacto & emendare & corrigere oporteat demonstrans. Praeterea & in eo quem de uino, oxymelite, & aqua facit sermonem, scopos recensuit eosdem. Meminit quoque & coctionis morbi saepius, non paruum scopum uniuersae uictus formae, earumque quae in ipsa sunt mutationum hunc efficiens. Pari modo & de morbi uigore quippiam dixit, ad quem respiciens neque tanquam ad abiectissimum in uictus ratione scopum alimoniam ministrat. Cuncta haec & reliqua talia a Gnidij medicis praetermissa sunt, quae medicum ante animaduertisse non dicente agro oportet.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS

TIS DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS

Commentarius quartus.

PROLOGVS



VAE in libro De uictus ratione post eum qui De balneis est sermonem scribuntur, iure optimo plerique medicorum Hippocratis non esse sunt suspicati. Nam ab ijs quae ante scripta sunt, & uel interpretationis & theorematum integritate longo discedunt intervallo. Neque tamen abs re adducti sunt qui & Hippocratis esse existimauerunt. Neque eorum quae scripta sunt sententia propositum ipsius mentemque usque adeo redolet, ut discipulum Hippocratis aliquem scripsisse suspicio sit, imo & ex his multa dictione una cum sententia ita absoluta inculpatamque habent, ut rursus & ea ab Hippocrate scripta esse suspicandum sit, utpote qui librum componere, ubi singulariter morbi cuiusque acuti cura-

tionem doceret, ut in libro De uictus ratione in morbis acutis promiserat, sese apparuerit. Praeterea & alias in praesenti libro reperies dictiones quae Hippocrate ita in dignae sunt, ut legitimis iussibus adscriptas esse suspicari te oporteat. Sicuti & in Aphorismis ipsis quidam huiusmodi uisi sunt, partibus libri ultimis adiecti adscriptique. Qui enim interferunt, in memoria multis primas descriptiones ultimis adscriptum. Quod & in libro De capitis uulneribus factum esse uidetur, & in secundo De morbis uulgaribus. Nec secus in eo qui nunc nobis proponitur libro reperimus quae interferuntur, atque adhuc magis partibus ultimis. Cum igitur quatuor ut quispiam dixerit, in eo repertantur genera, unum quidem & dictione & sententia Hippocrate dignum, Alterum quidem altero solum uel dictione uel sententia, Nonnulla uero horum neutro, in

finis

lingulis eorum quæ ad expositionē nobis exponuntur dictionibus idipsum declarabimus.

1 Causus, id est febris ardens fit, cum uenulæ tempore æstiuo exiccatae, acres & biliosas quæ tenues sint, trahunt ad se humiditates, quas *ἰχθῶνας* uocant.

Æstiuum anni tempus dicit calidum & siccum siue ultimo uere fuerit, siue prima æstate, siue in horum temporū medijs uel extremis, siue primo autumno. Quod autem aeris nos ambientis temperamentum dispositionē corporis secum mutet, siccum quidem ad sicciorē, humidum uero ad humidiorē, in cōmentarijs Epidemiorum morborum est demonstratū. Quod item & anni tempus mediocre & temperatum naturalem seruet temperaturam, cæteris quæ in uniuersa uictus lege agunt homines modo habentibus simili. Demonstratur præterea & corpus quod à naturali modo rataq; conditione sese alienauit commutauitq;, id propter quod alienatum est & cōmutatū ob illud peculiari egere auxilio, ut arefactum humectatione, humectatum exiccatione, calfactum perfrigeratione, & perfrigeratum calfactione. Cum igitur ob aliquam rerum, quarum exempla dicit Hippocrates, circumstantiam uenulas aliquas qualibet in parte corporis exiccare contigerit, à uicinis partibus trahunt hæ humiditates. Si ergo quæ ad arefactas uenas feruntur humiditates, ut substantia humidam naturam, ita & uim humectatoriā habuerint, pars naturalem cōmodationē recipit. Verū si humiditas qualitate acris fuerit, & facultate siccatoria, corpus in cēditur: ut si ex nobis quispiam siticulosus effectus liberaliter biberit uel uinum quod quia aqua marina largior mista sit, thetallafomenon dicunt, purum, uel aquam falsam. Scio equidem me aliquando ex æstiuo itinere siticulosum redditum bibisse uini ueteris paulo sincerioris calicem unum, atq; ex eo sitim magis auxisse, non placasse. Vt igitur nos quanq; mente quæ appetitum moderetur predicti interdum quidem negligenius, interdum autē & incontinentius, atq; etiam cum in promptu melius non sit, ad potū aliquem qui & falsus & acris sit peruenire cogimur. Sic & uenarū facultas attractoria perpetuo uicinis ex partibus humiditatem attrahit, substantiam ipsius qualis nam sit, nullo pacto discernens. Ratione etenim caret qua quippiam ex meliori scrutari possit. Sed ut pueri brutaq; ad casu oblatū humorem cum sitiunt irruunt, hoc pacto & illa. Si ergo in una quapiā corporis parte affectio ea fiat, in ea solum qui erysipelas referat, affectus quipsiā erit. Verum si uenæ totius corporis supra modū exiccatae calidas carnosae ē partibus humiditates traxerint, in toto corpore fiet quæ causum referet affectio. Causus uero proprie dictus non caliditatis quæ per totum sit corpus differt modo uehementia, uerū quoq; & siti. Nam sitis in eo uehemēs est, & incompefcibilis. Deest ergo præsentī dictionī singularis de causi generatione sermo, quem nos nuper adieciimus. Nempe in una corporis parte

quæuis illa sit, interdū causus gignitur, interdū & toto in corpore. Verum cum in toto sit corpore, sitim omnino parit; cum uero in una parte, non de necessitate, nisi pars ipsa sitim pariat. Omnī autē primū & maxime id facit os uetriculi, deinde uenitriculus, atq; ab eo stomachus, post pulmo, & sub inde ieiunū intestinū. Vtrū igitur ita tantūmodo sit causus, ut dixit, cū scilicet acres & biliosas quæ tenues sunt humiditates ad se traxerint uenulæ? An ne & carne id ferente erit causus? siue in parte una, siue toto in corpore pati eam contigerit? Ostendimus etenim etiā ipsam uim habere eorum quorū indiga est attractoria. Præterea & fieri potest ut modo altero similis affectio fiat. Modū alterum dico cum ex ualidioribus partibus ad imbecilliorē aliquā mittantur excrementa. Nēpe quod membrīs singulis ut attractoria, sic & expulsiua insit facultas, est declaratū, fieri ergo potest ut interdum quidem ex parte una, interdum uero et ex pluribus acres & biliosæ quæ tenues sint humiditates exacte ad dictas fundantur particulas, quæ scilicet imbecilliores sunt. Quod Hippocrates *ἰχθῶνας*, tenues humiditates appellet, liquido constat.

2 Febris quoq; uehemēs habet, corpusq; ueluti ab ossifaria lassitudine habitum laborat, doletq;.

Febris ergo uehemēs habet, propter naturā tenuium humiditatum quas & acres & biliosas ait. Nempe his superueniunt febres uehemētissimæ, id est quæ multā & acerrimā habent caliditatem. Sicuti & pituitolos sequitur succos quæ & minorē & minus acrē habet. Laborat autē corpus totū lassitudine ulcerosa propter tenuiū humiditatuā crimoniam. Sed de lassitudinū omniū differentijs abso lute in libris De tuenda ualitudine est tractatum.

3 Fit autem magna ex parte longū ob iter, longamq; sitim, cū uenulæ arefactæ, acres calidasq; fluxiones ad se traxerint.

Tum in principio dixit, tum rursus hoc in loco adiecit uerbū hoc arefactæ procatarticas appellatas causas ueluti exemplo manifestans: primiti uas nunc dicunt. Siquidem calidæ omnes, & sicce causos progignere possunt. Scio equidē nōnullos ob liberale uini quod thetallafomenon uocat portionē causo fuisse correctos. Veluti & alios ob falsamentorum falsarūq; carniū atq; aliorū quorundam falsorum usum immoderatum. Alius ex ambulatione & æstu ueniens, primum quidem lauit se, deinde domū perductus, uini misti quib; bibit, cepitq; protinus affici causo: alius autē ob iram, & alius ob uigilias causum incurrerunt.

4 Fit autem lingua aspera, sicca, & ualde nigra, uentrisq; morfu dolet, deiectionesq; & liquidæ & pallidæ fiunt: urgetq; sitis uehemens, & uigiliæ, atq; interdum mentis aberratio.

Percurrit hoc in loco quæ causum subsequuntur, quæ & *ἰχθῶνας*, id est cōsistentia siue cō-

sistentia uocant. Sunt autē hęc: lingua sicca, aspera, & nigra, uentris morfus, deiectiones pallidæ, uehemens sitis, & uigilia, interdum quoq; & desipientia. Lingua sanē arefcit, q̄ tota corporis affectio sicca sit & calida, febrisq; talis. Ventris uero morfus propter tenuium humiditatum, quæ illuc cōfluunt, oritur. Deiectiones autem pro succi redundantia. Liquidasq; eas dixit, nullo pacto concoctas exprimens. Coctio enim omnia cogit in crassatq;. Qui autē ita habent, uigilant ob siccitatē. Nempe humiditatē immoderatam profundas ad somnum delationes, multam uero siccitatem uigilias procreare est demonstratū. Accedit quoq; & ab alijs symptomatis fatigatio quæ uigiliarū causa est. Desipientiā autē fieri didicimus ob eam quæ ad caput recurrit bilēm, & ob temperaturę caliditatem siccitatemq;. Quod autē ubi quispiam bilēm simpliciter dixerit, amara significetur, antea est enunciatū, q̄ item bilēm eandem & pallidam & flauam appellent. Vt ergo nihil eorū quę ad causum biliosum spectant prætermisum uidē, nisi quod non solum sit per attractionē, sed & per tenuium humiditatum effluuium, sic abunde fuscq; scripta quædam sunt. Nempe ex ijs quę dicta sunt, quædam sunt symptomata causum indicantia, quæ πρὸς τοὺς νοσήσαντας dicunt, alia uero πρὸς τοὺς ὑγινοῦντας, id est confident. Verum quę causos procreant, alia quidem πρὸς τοὺς νοσήσαντας, id est antegredientia, alia uero πρὸς τοὺς ὑγινοῦντας, id est præincipientia à medicis appellantur. Omnium autem quæ dixi prægredientiū symptomatum, potes tibi ut lubet catalogum facere. Sed qui librū hunc scripsit, à prægredientibus fecit exordium. Venulas etenim excicari prægrediens causa est. Deinceps autem cum præincipientia ut ambulationem longam & sitim dicere debuit, non ea dixit, sed ex ijs quę affectum indicant quippiam dixit, ut febrem uehementem. Debit & hic sitim uehementē adijcere, quam postea simul cum alijs quæ confidentia uocantur symptomatis dixit, quorum quædam aliquando, alia perpetuo causis insunt, quod & ipse ostēdit inquis: Interdum autem & mentis aberratio. Nam interdum, perpetuo opponitur. Ego autē dico & uentrem morderi & biliosa deijcere nō esse ex ijs quæ perpetuo insunt. Nempe q̄ uehēmēs morbus sit, motusq; acrim & tenuium humiditātū ad interna sit, propterea hęc contingunt, ijs quidem qui uentrem heparq; causi ueluti sedem habent. Verū ijs qui pulmonem ueluti sedem habent, hęc non admodum contingunt, sed quæ de lingua dicuntur & desipientia magis. Difficulter etiā & hispirant, ea scilicet quæ densa & magna est spirandi difficultate, efflantq; continenter os aperientes, igneiq; spiritus effusione leuantur. uerum totā spirandi difficultatē prætermisit, quam in Prognostico dictā ostendimus. Ceterū incompolite atq; inordinate symptomata linguę recensuit. Nempe debuit primū sicā dixisse, deinde asperā. Nam ob immoderatam siccitatem lingua aspera redditur: ut si aspera sit omnino & sicca existat. Quod autē ob caliditatem immoderatā nigrescat, ut his qui-

A bus cutis sole usta sit, iam ante didicimus.

5 Huic aquæ, mulsæq; coctæ & aquosæ quantum uoluerit bibendum dabis.

Libet hic et si Hippocratis non sit, eum tamen legitimum operi iam tēporibus Erasistrati adiectū esse, ueterē esse declarat. Quapropter mirandum quonā pacto Erasistratus calices cereos in Apollonium & Dexippū retorsisse ausus sit. Nam qui librū hunc scripsit, mentem Hippocratis Erasistrato melius intelligēs, caulo laborantibus quantum placet bibere concedit. Demonstrauitq; & in legitima uoluminis huius parte ita sentire Hippocratem. Sed de Erasistrati malitia satis hęc sint. Et iam scrutemur quæ in oratione dicuntur. Præcipit siquidē neq; aquam solam, neq; mulsam solam his propinandam qui caulo laborant. Scis etenim aquā q̄ natura frigida sit, tarde penetrare, & quā plurimo tempore in hypochondrijs manentē cor rumpi in acutis morbis: mel autē facile bilefcere. Ob id mulsam aquosam dari iubet, ut aqua, nulla in superiore uentre facta mora à misto melle ad distributionē trahatur. Ob eas causas & coctam ipsam exhibet. Nempe quā cruda sitim magis arceat, & flatu magis uacat, urinasq; magis ciet, ut quæ cruda est, deiectionē. Minus siquidē acris sit quæ cocta est, non solum q̄ in coctura concoquatur: uerum q̄ & spumofum ipsius omne tollitur. Nempe quod acre & flatuosum existit, in mulsæ substantia. Cocta autē, tum morfu caret, tum flatu uacat, distribuitq; melius q̄ per intestina descendat: quo fit ut eam ob causam magis alarq; cruda. Ceterum qui ita laborant, citra pristinæ succum mulsæ nutriendi sunt. Sed quomodo in acutis morbis solos exhibere potius oporteat, in libri huius non spuria parte est prædictum. hęc omnia quæ ad presentis orationis expositionem pertinent, ijs qui & ante legerunt, & meminerunt eas quæ in illis factæ sunt expositiones, ad hunc modum & dicta sunt & dicuntur.

6 Quod si os amarum fuerit, uomere confert, & uentrem subluere.

Bilis amaritudo, amarum os reddit. Vna enim & cōmunis tunica est, & quæ uentri interna est, & omnis ea quæ os subungit. Non ergo sine ratione sermonis huius scriptor bilēm tum per uomitum, tum per clysterem euacuat.

7 Verum si ad hęc non soluatur, lacte asinæ cocto purgabis.

Quod omnino quidem eam quæ in uentre est bilēm uacuare uelit, timeat autē purgantia medicamenta, quod & acris & calida prorsus existant, ob id ad lac asinæ diuertit, utpote quod nullam ut non aliud ullum habeat acrimoniā, sed præ omnibus unum humiditate exuperat, atq; ob id solum uentrē subit. Præcoquit autē ipsum ob flatus. Sed sanē solo uti sero poteris, per oxymeli ipsum ubi lac ante coxeris, separans. Vas quoq; æneum frigida plenū aqua cōtinenter in lac demittes. Nam & hęc si probe fiat demissio, serū à caseo separat.

8 Salsum autem nihil neq̃ acre exhiben-
dum, non enim sufficeret.

Salsus succus qualis nam sit, ex sale apparet. De
acris autem tum substantia tum facultate, dictum
est in quarto Simplicium medicamentorum. Pi-
per siquidem, sinapi, pyrethrum, & quaecumq̃ ui-
ribus calida sunt, acria quoq̃ gustantibus appa-
rent. Quo fit ut tum acria tum salia tanquam cau-
sum augmenta uitare iubeat. Salia autem acribus
magis siccant, quanquam illis nō similiter, sed mi-
nus calificant.

9 Sorbitionē uero nisi iudicationes tran-
sierint, non dabis.

Sermonem ita ut robustam esse uirtutē subau-
diendum sit, intelligit. Nempe hoc pacto Hippo-
crates doctrinam facit magna ex parte quae singu-
lis in scopis praecipuntur scribens. Quo pacto cū
semel dixit, cōparare inter se quae demonstrata sunt
cōsideratis ipsorum uiribus oportet. Quod sorbi-
tio ante iudicationē danda non sit, in prima huius
libri, quae legitima est, parte est demonstratum.

10 Et si ē naribus fluxerit sanguis, soluitur
aegritudo: atq̃ si sudores superuenerint, iu-
dicatorij legitimi cum urinis albis crassissq̃
& leuibus subsidentijs.

In acutis febribus quod ex sanguine feruet, ad
caput fertur. cum igitur relessis ruptisq̃ uenis na-
tura idipsum unā cum acruatis uaporibus effunde-
rit, ceteris promptius dominatur & imperat. Pari
modo & cum per sudores eas quae tenues sunt hu-
miditates expulerit, morbum sanat, si utiq̃ mor-
bo iam cocto superuenerint. Nam de re huiusmo-
di iam saepius in alijs explanatorijs commentarijs
est dictū, atq̃ in ijs qui de iudicationibus sunt con-
fecti. Vigiter in prima libri huius parte, quam o-
mnes legitimam fateantur, cum qui a morbi coctio-
ne est scopum ad uictus rationē cōmodissimū ac-
cepit, sic & nunc ad praedictionem. Subiicit qui-
dem coctionis nomen: sed cōstantissimam ipsius
notam in urinis scripsit. Optima igitur urina est,
quae albam & leuem habet subsidentia, ut in Prog-
nostico est demonstratum. Neq̃ tamē ad spem sa-
lutis semper apparere exposulabis, cum si enae-
rema medio uale innata sit, naturali tū colore tum
substantia cōmodum uideris, satis tibi erit. Etiam
his ita habentibus in interpretatione exuberauit
dictio. Nam ob dictas urinas constat & sudores iu-
dicatorios esse, quapropter & frustra adiectū. Le-
gitimi praeterea non proprie dicunt. Nam de mor-
borum speciebus talem inferre consueuerunt ap-
pellationem, cum alij medicorum probatissimi,
tum Hippocrates ipse.

11 Et si abscessus aliquis factus fuerit.

Rarissime per abscessum iudicatur causus, atq̃
adhuc magis si citra partis corporis adiectionem,
recensionem quae fecerit. Nempe parotidibus, id
est abscessibus qui post aures sunt, causos scio iu-
dicatos, sed non legitimos. Id autē paulo post con-
dices post expositionem.

12 Verum si absq̃ his soluitur, reuertetur
aegritudo, uel coxa uel crus dolebit, ex-
puetq̃ crassa si sanus est futurus.

Vbi de sanguinis eruptione sudoreq̃ egit, si
absq̃ his causus desierit, suspectam ait esse solutio-
nem. Nam paulo post reuertetur: Erit siquidē ait
in recidiua crurum dolor uel coxae, spuetq̃ crassa.
Nempe quod iudicāus, sanguinis eruptione uel
sudore uel abscessu opus habeat, potest quis arbi-
trari recte dictum esse, si dictis adiecerit quae cura-
tioni intendens ipse scripsit, uomere scilicet praeci-
piens, atq̃ alium subducere, potumq̃ aquam &
mulsam aquosam coctam comministrans. Quare
si cum his quidem & sanguinis eruptionem, & su-
dorem, & abscessum causum soluere quis dixerit,
alias autem folui non posse, sermonem fortasse iu-
stum aequumq̃ dicere uidebitur. Iustum autem a-
equumq̃ dico quasi mediocriter uera loquentem
atq̃ priore magis, non tamē integrum absolutūq̃
prioris. Neq̃ enim uerus est sermo. Nempe quod
in Aphorismis dicitur: A causo habito rigore su-
perueniente solutio, uerissimum existit. Rigorem
autem hunc de necessitate sequitur interdum qui-
dem sudor solus, interdum uero & biliosorum uo-
mitus solus, atq̃ interdum deiectio sola: sed ple-
rumq̃ ex dictis tribus duo fiunt, & rursus quan-
doq̃ tria. Nempe horum duorum de necessitate
alterum in causo fit si ad integritatem desinere dea-
beat. Nā biliosi humores uel perfecte uacuabun-
tur uel extinguuntur. Praetermissa itaq̃ uidebitur
praecipua causorum sanatio: frigida scilicet potus,
quo causos prius crurauimus nullo ex his mori-
ente, quibus frigidam tempestiue propinauimus,
cuius expositionē priore quidem libri huius par-
te paucis percurramus: at in ceteris tum cōmenta-
rijs tum operibus suis. Sed forte quispiā me asse-
rere putabit nullum ex ijs qui causo laborant mori-
turū qui aquam tempestiue biberit, quanquam
id non asseram, sed quod omnibus quibus propi-
naui cū adeo multi extiterunt ut numerari non me-
minerim, successit auxilium & salus. quod idem
non est, ut si dices causo laborantes si frigidam
biberint, seruandos. Nam qui perniciosae insalubri-
terq̃ habent, eos neq̃ per aliud quippiam, neq̃
per aquam seruari est possibile, quibus neq̃ mi-
nistrare sum conatus. Quod autem in fine dictio-
nis narratur, Expuetq̃ crassa si sanus est futurus,
in his tantū causis obseruare debes qui passo pul-
monē oriuntur.

13 Causi genus aliud, alius soluta, sitis ma-
gna, lingua aspera, sicca, salia.

Veteres Græcos reperio nomen generis inter-
dum in homonymis usurpare. homonymis in quā
quae unum quidem habent significatum: sed ex
ipsius diuisione ad plures deducunt differentias.
In quo saepius dicere consueuimus genericas rei
huius differentias esse uel duas uel tres uel qua-
tuor uel quotquot esse possunt. Sed cum homō-
nyma duplicia sint, aliqua quidem nullo pacto in-
ter se communicantia, ut cum canem dicimus &
terre-

terrestrem & marinum. Alia uero quæ cum synonymis aliquatenus cōmunia existant, cum ab uno factam appellatōnem habuerint, ad quam interdu referantur, cōsiderandum ut dictum est duo esse causorum genera: quod exacte quidem cognoscetur, si substantiæ utriusq; ratio quæ in appellatōne est, ostensa fuerit. Sed quoniā a mentis cōcepturatio iudicium accipit, perscrutandū si mentis conceptum causi ita cōsonum habemus ut hominis, bouis, & equi. At cum oratio cōmentario prolixior futura sit, tum ipsam tum cāteras ad breuem contrahere summam conabimur, hoc exorsimodo. Febrem causum medicos reperio appellantes cum urens caliditas, sitisq; incompescibilis hominē torquet. Quod si ita habet, causum eum in quo corpus non uritur, sitisq; leuis sit, causum quidem simpliciter, exquisitum autem legitimūq; nō dicemus: eumq; qui pro dimidia parte talis sit, breuioris doctrinæ gratia causum nothum appellare haud malum fuerit. Quo autem modo tertianis in febribus appellatōne huiusmodi uti cōsueuimus, ita duo causorū genera esse intelligemus, ut tertianarum genera duo esse quispiam dixerit, unum exquisitum legitimūq; alterum uero nothum spurūq; cui uidelicet ex legitimis quidem symptomatis nonnulla insunt, aliqua uero non. Quod autem secundus causus de quo in hac parte docere institutus, tanquam diminutus quidam sit, atq; non exacte absolutus, certior fies si mentē ad ea symptomata quæ a scriptore ipso in eo fieri dicuntur, cōuerteris. Nempe principio ait: Aluus soluta, sitis magna, non eo adiecto quod in priore adiecit. Nothum siquidem causus ex legitimis symptomatis alterum quidem habet, alterū non. Deinceps autem linguā asperam esse inquitens & siccam, non adiecit nigram quomodo in priore: sed pro hoc symptomate saluam dixit. Nempe ut cum lingua amarulenta redditur, flauam redundare bilem ostēdit: ita cum salua, saluum saluginosumq; appellatum humorē, qui ex pituita generibus, quæ tria sunt, unum existit ut tibi innouit, acido scilicet dulci & salso. Quomodo igitur prior causus ex amara bile cōstans, pallidas geminas ob causam pariebat excretionē, tū quod tenuis fuerat, tum quod febris urens in ipso augebatur, augecēte in ipso insuper flaua bile: sic pituitosus humor neq; facile excernitur, neq; febrem auget, neq; sitim ardentem habet, neq; inflatur, atq; ob id de eo dixit aluus soluta, excernere ipsam solā ostēdens, quod ipsi non excernere aduersatur. Subit siquidem huius uenter, non tamen secundum humoris cuiuspiam formam speciemq; sed ijs quæ in alimentum ministrata sunt, corruptis. Non enim hi potu degūt, ut quamplurimi eorum qui priore infestatur causo. Deinde illi citam habent excretionē, tenuem scilicet & feruentē assecuti humorē. Seram uero hi ob frigidam glutinosamq; & crassam pituita substantiam, fieri ergo nequit ut qui ita laborant, solo utatur potu. Id siquidem didicimus in his morbis qui in quinta & septima die ualida existente uirtute coctionē sunt recepturi. Verū si morbus ad no-

num uel decimū quartū uel uigesimalē sese prorogatur sit, in eo circa initia pituitæ cremore utimur.

14 Urinæ defectus.

Dicid ab ipso cōsuevit uel cum non effatu digna uel nullo pacto emittitur urina. fit autem in instituto præsentī sermone causo propter humoris crassitatem.

15 Vigilia.

Causo utriusq; cōmune id est, atq; ob id in priore mentionem huius fecit. fit siquidem in illo magis q; caput accendatur, inflammeturq; magis.

16 Et perfrigerata extrema.

Symptoma hoc secundi est causi. Verū sermo, nem non simpliciter efferre conuenit, sed cum distinctione aliqua. Neq; enim perpetuū talis existit, at cum malignus fuerit. Nempe in biliosis uerentibusq; febribus, caliditatem ad extrema usq; corporis extendit, etsi nō malignus causus fuerit. At in pituitosis fumosa est caliditatis substantia, cum scilicet uel in uentre uel hepate uel pulmone saluus humor putruerit, ob quam quidē caliditas ignea redditur. Verū si malignus fuerit morbus, perfrigerantur extrema ob uirtutis imbecillitatē, phlegmonesq; totum ad se sanguinem trahentis magnitudinem. Nam absq; his nunquam letalis efficitur morbus.

17 Causus hic, nisi sanguis ē naribus fluxerit, uel circa collū abscessus fiat, uel crus doluerit, et æger sputa crassa excreauerit (hæc aut adstricta aluo fiunt) uel coxæ dolor, uel pudendi liuor superuenerit, non iudicatur, testis quoq; intensus iudicatorius existit.

Quod soluantur per abscessus magis quā pet excretionē quæ ex pituita putrescente oriuntur febres, sæpius est demonstratū. At in præsentī causo nō abscessus modo cōmemorauit, uerū quoq; & sanguinis profusionem adiecit, magisq; in his causis quorum sedes in pulmone existit. Nempe in huiusmodi affectionibus caput incalescit, sanguine repletur, effunditq; quod ex eo redundat tū ruptis tum adapertis uenis. Ob eandem causam ceruicis abscessus fiunt, & parotides ijs quita afficiuntur. Verū quibus affectionis sedes in ieiuno uel hepate existit, deorsum magis fiunt abscessus. quæ efficiē ratione ut crus doleat, pudendū liueat, testiculusq; his tendatur quā ita afficiuntur. Fit autē testis intentio interdū ab ea quæ in eo sit inflammatione, interdum quoq; & ob cuiuspiam eorū quæ superius inflāmantur ulcerationē. Quosdā autem eorum etiam sputa crassa spueri, de his qui in pulmone affectum habent, dictum est, facta iam concoctione. Ex eo igitur liquet doctrinā cōsulam esse inordinatam & indefinitā. quod tamen etiam quæ librorum gratia fit delineationē deceat, libro tamē nullo pacto est peculiare propriūq;. Nā cum multis mēbris passis tales fiant febres, deinceps et ex ordine symptomatum catalogū scribere oportebat, & non inordinate indefinitēq; sed secundū peculiare propriūq;, & præsentē morbum effi-

cere. Et sanè in huic dictum est modum, alius soluta, non q̄ causis symptoma hoc perpetuo insit, sed ut interdum. Nam quibus uenter ita ut dictū afficitur, his corrupto cibo defectiones liquidæ existunt. Verum quibus pulmo ita habet, uentre haudquāq̄ patiēte, his defectiones huiusmodi de necessitate non fiunt, cum interdum modo cōtrario ita affectis dura aluus contingat, & difficulter excernant. Præterea & quibus in locinore caussi subest radix, & qui ob iecur causo laborant, ijs quæ excernuntur, interdum quidem liquida existunt, & interdum sicca ueluti quæ *συνεπαθόν* appellantur, quasi caprini stercoreis pilulis similia dixeris, cōbulsis scilicet à uisceris phlegmone excrementis, *σύνβαλα* Græci uocant. Cum igitur uiscus huiusmodi solū phlegmone obsideatur, id efficitur. Verum si cum phlegmone fuerit & imbecillitas, liquida deiciuntur, uiscere scilicet alimentū ad se trahere nequeūte. Sed defectiones huiusmodi ab ijs quæ uētre affecto fiāt, succositate distinguunt.

18 Sorbitiones dato attractorias.

Quod sepius dicere solitus q̄ scilicet obscura lectio nihil doceat, id & nunc dicam. Nam qui ex p̄tute uitio laborant, oxymelitis quidem potus his est cōmodissimus: sed alimentū p̄tisana cremor. Ego tamen quanq̄ hoc noscam, atq̄ à nullo didicerim, diuinare non possum quas nam dicat attractorias sorbitiones. Oxymeli siquidem & secatorium, & incisorium, & absterforium dici potest, attractorium tamen nullo pacto, quia sanè quod ab ipso attrahatur demonstrare nō possumus. Ad hunc modū neq̄ p̄tisana cremor attractoriū esse asseremus. Sed forte quispiam dicet uelle ipsum uentrē subducere attractorijs, id est quæ crassum trahunt succum, cuiusmodi est etiam p̄tiuita. At uero sorbitiones non dixisset. Nempe hoc munus medicamentorum est & non sorbitionum, sicuti neq̄ potuum. Innouit ergo quoniam pacto in obscuris dictionibus nihil certi cōpertiq̄ habeamus. Quapropter neq̄ dictionem hanc aggregi conabimur, quod nihil in ea certum finitumq̄ reperiat. Cæterum non mihi constat quoniam homines pacto ut in alijs multis manifeste errent, sic & in eo q̄ ijs quæ obscure dicuntur gaudeant: quamquam omnes uno ferme ore perspicuitatē orationis uirtutē esse, obscuritatē uero uitii proclamēt.

19 In acutis morbis sanguinem detrahes siuehemens morbus uideatur, florueritq̄ ægrotanti ætas, & uirium adfuerit robur.

Sermo hic nimirum Hippocrate est dignus. Subiit mihi in admirationē q̄ inter aphorismos eum non scripserit, cum in paucis uerbis uis magna cōperiat, quod aphorismis usu euenire solet. De his ergo qui sanguinis egent detractiōe frequens apud medicos fuit sermo. Quorum quæ de ea detractiōe maxime probabilia uidentur, duobus à me scriptis secure sunt enarrata libris, quorum alter De sanguinis detractiōe inscribitur: in quo quæ cōmodant omnia docentur. Alter scriptus est, ut dixi, medicis tum Empiricis tum Dogmati-

cis. Verum amethodi, id est ab omni methodo alieni Thessalijs uti & cætera sine demonstratione simpliciter dicunt, sic & sanguinis detractiōem *χαλαστικόν*, id est relaxatorium censent esse remedium. *χαλαστικόν* uero non uno exponūt modo, ut per cōmentarios nostros cum de Methodica secta ageremus ostendimus. Qui igitur omnem de sanguinis missiōne historiā intelligere uoluerit, legere tum nostros tum reliquorum medicorum libros potest. Nūc uero summam ipsam in paucos tandem relata scopos audi. Sanguinem etenim primū detrahes si magnus tibi uideatur morbus. Tali autem remedio utitur propter uehementes affectus, quod à qualitate desumitur. Neq̄ refert si uel uehemētē uel magnum morbum dixeris. Secundus sanguinis detrahendi scopus est: si eger ætatē floruerit. Neq̄ enim puer neq̄ senex, sanguinis sustinent detractiōem, etiam si morbus quo ipsi laborauerint magnus fuerit. Tertium scopum non prætermisit libri huius conscriptor, qui uitalis facultatis robur existit. Neq̄ enim in ijs qui ætatē florent, cum languēt perpetuo robur apparet. Quam ob causam quis forte duo hæc sola pro scopis detrahendi sanguinis satis esse autumabit, magnitudinem scilicet morbi & uirtutis robur. Neq̄ enim senex q̄ annosus sit, per se sed propter uirtutis imbecillitatē nō fert sanguinis detractiōē. Ac certe pueri quanq̄ uitali facultate ualeant, tamen neq̄ hi sanguinis sustinent missiōē. Prompte em̄ eorū substantia tum propter humiditatē, tum propter temperamenti caliditatē euaporatur. Detractione igitur sanguinis non egent qui insitam naturalemq̄ habent uacuationē, ob eam causam scoporū sanguinis detrahendi numero non satisfacere reidentur magnitudo morbi & uirtutis robur. Meliusq̄ feceris si & florentium ætatē adieceris. Quod porò in fronte dictionis dictum est: In acutis morbis sanguinem detrahes, ut cōsideretur est dignum. Sed quomodo longorum morborū nō meminuit? Quoniā sanè De acutis nunc docet, atq̄ ob id solos eos memorauit. Nempe & ex longis multi sunt qui sanguinis egent detractiōe, cum & hi dictis tribus subiaceant scopis. Cæterū cum omnia hæc recte dicta sint, quosdam tamen non recte usos fuisse est putandum. Quo è numero est Menodotus Empiricus in sola plethorica appellata syndrome sanguinis missiōē obseruari asseruans. Nos autem & ea non existente, uenam secamus cum dolor uehementis hominem prehenderit, uel pars aliqua fracta fuerit, uel os ex loco pulsum sit, uel alius quispiam articulus cōtractus reductusq̄ sit. Neq̄ etiam plethorica facta syndromē sanguinem semper mittimus, sed & frictiōe, & balneis multis, & abstinētia quæ tribus uel quatuor diebus fiat, ad id quod naturale est reuocamus. Verum de his abunde tum in libro De plenitudine, tum in libro De sanguinis detractiōe est pronunciatum, præterea & in libro De morbis curandis. Ad præsens ergo hæc ueluti in sanguinis detractiōis cōmentario dicta sufficiant. Verū ut nihil desit, adijciā & eū qui ab ambiente nos aere desumi-

defumitur scopum, cum fuerit abunde calidus & siccus, tunc aut cito ab eo corpus euaporetur. Nempe tunc à sanguinis missione abstinemus, etiam si morbus magnus fuerit, florensque ætate homo. Id ergo autor solū prætermisit, reliquis scriptis, atque etiā patientis ipsius corporis habitū. Verū præcedēte oratione & mētiōē habitus fecit, qui & ætatis differētiās in se cōprehēdere potest, ut ostēdā.

20 Porro si angina fuerit, & si aliud quipiam ex pleuriticis malū, ecligmate repurgato: at si æger ob copiosam sanguinis missionem imbecillior fuerit, clysmum tertio quoque die uētri infundes, donec in tuto æger fuerit, & fame indigeat.

συνάχη, id est angina partium quæ in faucibus sitæ sunt phlegmone est, quæ post sanguinis missionē repurgari potest, id est quæ in partibus phlegmone obfessis cōtinent, per sputa euacuari possunt. Nempe corpus impurum excrementosumque quod uacuat, iure optimo expurgari quispia pro nunciauerit. Cæteris aut acutis morbis omisissis, de pleuritide mentionē facit, quomodo & in prima libri parte fecit: Si uero imbecillior, inquit, æger tibi esse uidebitur, uel propter sanguinis ablati copiam, uel ob aliā quamuis rationē, purgationis uice clysterē tertio quoque infundes die. Nempe relaxato per sanguinis missionē corpore, quod ex morbis humoribus qualitate uitiosum superfluit, per clysterem id euacuari iubet. Quod autem scopus illi sit non solū alimenti excrementa subducere uerum quoque & passum locum expurgare, palam est. Quod uero finem orationis facit: Est fame indigeat, ijs qui in primo libro à nobis demonstrata meminerunt, etiam manifestum euadit.

21 Obfessa inflammatione hypochondria non spirituum interclusione, septi transuer si intentio, uel spirituum protensiones, quibus orthopnoea sicca pus non subit: sed à spirituum interclusione pathemata hæc superueniunt, potissimum uero & iocineris dolores, & lienis grauitas, atque inflammationes aliæ, & superiores septo dolores, morborumque collectiones quas *σύνροφας* dicunt, solui non possunt, si quis primum purgante uti medicamento aggressus fuerit. Nam uenæ sectio in his præferenda uenit. Dein de clysmis est opus si non uehemens & magnus fuerit morbus, si uero non, etiam postea medicamēto opus est, & sanè id etiam post sanguinis missionē secure & cum moderatione porrigendum est.

Morborum qui primū sanguinis egent missione, deinde ab ea purgari expostulant, catalogum facit. Primumque inter omnes scribit, *φλεγμαίνοντα ὑποχόνδρια*, id est flagrantia flammantiaque hypochondria. Neque uocē hanc *φλεγμαίνοντα* ex Hip-

pocratis consuetudine audias uelim. Nempe flammantes morbi omnes & calidi, uoce hac significantur. cuiusmodi sunt erysipelata, herpes et carbunculi, & quæ proprie phlegmonæ appellatur. Verum recentiores medici omnes speciei flagrantium corporum uni uetus cōmune nomen indidit, uocantque hoc pacto solum eum tumorem qui durus cum dolore & multa caliditate existit. Verum cum & alij præter naturā existunt tumores ut scirrhus, & qui à recentioribus medicis œdema appellatur: Fuit siquidē & id aliquando cōmune nomen tumorum omnium præter naturā atque ipsius inflationis: Diximus quidē alibi libro uno de tumoribus præter naturam: uerum impresentiarum ut cætera, ita & hoc summam dicatur. Scirrhus

quidē durus tumor est, & doloris expers. Verum inflatio bifariā est: Nempe collectio in quibusdam cavitatibus uel sensui expositis uel ratione cōtemplabilibus flatuoso spiritu. Fuerunt sanè qui aliquando tumores præter naturam in musculis secuerunt, tanque pus in imo reperturised nihil aliud præterque spiritū qui totam per carnem minutatim disseminatus esset inuenerunt. Præterea & thrombis solis aliquando ita sectis humiditas uel uiscosa uel mucosa est reperta. Verū in talibus tumor uel ex thrombo uel mucore erat, carne ad hūc affixi modum apparente: spiritus autem in ea per minutam est disseminatus. Non igitur in præsentī dictione, Phlegmone obfessa hypochondria, secundum aluerum Hippocrati significatū dicta esse uidentur.

Nempe quam mentē habebit quod ipsi adiicitur, non flatuum interclusione sed cum flamma caliditas in hypochondrijs siue cum flatu fuerit, siue non, eandem habeat indicationē. Neque etiā ita dicere est uisus, ut acuatim coniunctimque tum inflammationem tum spirituum interclusione fieri dicatur, cum id falsum sit. Nunque enim spiritus interclusio flagrantē hypochondria infert affectionē. Qui ergo hæc scripsit: Phlegmone obfessa hypochondria: dicere est uisus quæ in tumorem sublata sunt. Post hæc autē mentionē de septi transuersi interensione fecit: deinde & protensione spiritus. Septi transuersi intensio manifesta est omnibus. Sed spiritus protensus dicere uisus est ueluti interruptus. De quibus in prima libri huius parte scriptum est: Spiritus offendens in ea quæ extra sit aeris delatione. Super quo in dictionis illius expositione est enarratū. Siccā autē orthopnoeā dixit eam spirandi difficultatē quæ sine sputis uel tussis usque adeo uehemens est, ut inclinari citra suffocationē qui ita afficit, non possit, quam fieri non ignoras ab angustia earū pulmonis capacitati quæ spiritū deferunt. quæ id patiuntur, iacentibus magis, minusque stantibus, & profecto recte sedentibus omnibus quæ in thorace existunt partibus. quod sit ut & orthopnoea appellitetur. Sed cum ea interdum fiat ob uisceris phlegmonem, ut in peripneumonij, interdumque & oppletis bronchijs, sanguinis missione ait egere eos qui orthopnoea sunt affecti, eos inquam quibus pus collectū non sit. Nempe quibus collectū sit, eos puris uacuatione egere constat

constat. Qui autem à spiritus interclusione (quod in angustia actio pulmonem fieri solet) hæc patiuntur, eos sanguinis missione iuuabit. Pari modo & iocinoris dolores splenisq; atq; ceteras omnes inflammationes sanguinis detractio iuuabit, atq; vniuersas morborum collectiones, Græci *συσφοπίας* dicunt. Quod autem *συσφοπίας* morborum dixerit eas quæ ab intumescētibus fiunt partibus, par est. Audio siquidem & nūc multos in Asia nostra tumores præter naturam omnes ita nuncupantes. In his siquidem prius quàm sanguis mittatur, purgationem interdicare oportet, quamquam & hanc quoq; mentē rationemq; deinceps dicat in ea quæ sequitur dictione.

22 Quicumq; autem ea quæ inflammantur statim morborum inter initia medicamentis soluere conantur, ij non solum ab intensa inflammatione parte nihil adiunt, cum non cedat obsequaturq; quæ adhuc cruda est affectio: uerū quoq; & quæ morbo aduersa, & sana sunt, absument contabesciuntq; ductoq; ad imbecillitatem corpore, morbus superior euadit, qui ubi corpus uicerit, remedium non habet.

Hunc exposuimus aphorismum cum illum exponeremus. Cocta medicari et mouere, atq; in eisdem quibus & nunc symptomatis. Recte autē ad sanguinis missionem propius deueniendum præcipit, ubi uisiosi aliqui humores in partē aliquam confluant atq; in ea acceruerint, quod modo quodam ut dixi *συσφοπίας*, id est, colligi in ea parte dicitur. Quod autem in fine ante hanc scripta dictionis scribitur, quidam dignotioni inaccessum efficiunt, nomen *συσφοπίας* in casu accusandi pro nominatio legentes ad hūc modum, *συσφοπίας* *ἐν τῇ μερίδι* *καὶ ἐν τῇ φλεβῶν καὶ ἐν τῇ φλεβῶν καὶ ἐν τῇ φλεβῶν*, qua dictione significari uolunt ad sanguinis missionem à medicamento ueniendum. Verum in tota dictione prius ad sanguinis missionem ueniendum, deinde ad medicamentum præcipitur: non autem econtrario ut ij scribunt assumendum medicamentum, deinde ad sanguinis detractiōem deueniendum. Cætera dictionis dilucida his sunt, qui exacte dicta nostra animaduertunt.

23 Quod autē quis repente obmutescat, id uenarum interceptiones occlusionesq; faciant, si sano absq; occasione uel forti alia causa id contigerit.

Venarum *ἐκλειψις*, id est interceptiones, appellat oppletiones quæ a copia exoriuntur. Cum igitur supra modū oppleta fuerint uenæ, præmi uirtutē grauariq; est necesse, atq; in extinctionis agi periculum naturam caliditatem, quæ ob multitudinem copiamq; suffocationi quippiam simile patitur. Oriuntur siquidem epilepsiæ, & apoplexiæ, & syncopæ cardiacæ. Nempe uno cōmuni Aphonia, id est uocis carentiæ symptomate, symptoma

ta huiusmodi significauit. Adiecit autem orationi, Si sano absq; occasione uel alia forti causa id contigerit, ubi *συσφοπίας*, id est occlusionem dixit, causam evidentē manifestamq; ut si quis in luctu uel pancratio ex cubitorum complexu ad periculum suffocationis circumductus fuerit. Causam uero aliam formem dicit qualis uel timore uel maximo animi mœrore perturbatis accidit. In ægris autem uocis priuatio huiusmodi fieri potest, læsis duntaxat ijs quæ uoci efformandæ subseruiunt instrumentis, uel etiā ijs quæ respiratori deputauit natura. potest quoq; contingere ob recentem quandam exolutionem & afflictionem uirtutis. Vt autem ab huiusmodi aphonij uocisq; priuationibus eam distinguat quæ in oratione appolita est, adiecit, si sano contigerit.

24 Venam igitur brachij dextri internam secare oportet.

Velocissime & plurimum ex ijs quæ principes sunt partibus uena ea corpus uacuat, atq; ob id in acutissimis morbis ad eam sese confert.

25 Sanguinemq; auferre inspecta secundum habitum ætatemq; plurius minorisue ratione.

Superius cum de scopis missionis sanguinis ageret, corporis habitum quidem omisit, sed hoc in loco uirtutem non meminit. Verum habitus nomen pro uirtutis nomine dictum esse opinantur nonnulli una de re ambo dici perperā existimantes. Nempe habitum ad corporis constitutionem referētes dicimus, utpote cum quis uel mollis uel durus fuerit. Robur uero uirtutis functionum uehemētia attribuius. Ex quo fit ut duō hī sint scopi uacuandi quidem indicationē quod cōmunes sint, habentes, sed inter se differentes, ueluti & ab ætate. Verum ætatem ipsam ad corporis habitum referre est melius, & non uirtutem. Nam pueris propter habitus mollitiem, succi perspirabili cute facile digeruntur. Senibus uero non facile propter siccitatem & frigiditatem, satisq; esse tres hos detrahendi sanguinis scopos quispiam dicere potest, indicationem accipientibus nobis & a morbi cui curatur magnitudine, & habitu, & uirtute. Cuiusnam autem ambiens nos aer sit temperatura inspicendum esse est supra dictum.

26 Quamplurimis autem horum accedūt hæc, faciei rubores, oculorum constantia, manuum porrectio, dentium stridores, pulsus, maxillarum contractio, perfrigeratio extremorum, & spirituum in uenis interceptiones.

Inter hæc quæ deinceps accedunt, faciei solius qui ante scribuntur, rubores sanguinis copiam indicant. Succedit oculorum constantia, id est immobilitas & manuum porrectiones. Nempe & eas le di ob neruorum principium contingit, sed aliter quàm fit oculorum constantia. Nempe ea ueluti

torporem quendam functionum in nervorū primordijs indicat. Manuum vero porrectiones & dentium fremitus neq; ob quietem, neq; ob principij immobilitatem, sed propter uitiatam motionem exoriantur. Quid autem pulsus indicet, non omnino constat. Nempe ueteres in motionibus doctorem in membris inflammatis excitantibus, hoc promunt proferuntq; nomen: in palpationibus quoq; & præterea in uehementi artieriarum motione. Maxillarū contractio conuulsionis est symptoma, manuumq; porrectiones & fremitus dentium. Extremorum uero perfrictio in huiusmodi affectionibus caliditatem natiam ab humorum multitudine grauari ostendit. Quod autem in fine dictionis apponitur, id ut de pulsus carentia *ἄσφύξια* Græci uocant, dicatur probabile est. Nam ueteres, arterias, uenas appellabant. Spirituum sanæ interceptiones quasi inclinationes & quietes ab autore dici possunt. Sunt qui sequentis dictionis alteram habentis sententiam principium constituent dictionem hanc, cui quæ deinceps scripta est, coniungunt copulantiq;.

27 Cum dolores accefferint, bilis atræ fluxionumq; acrium distillationes fiunt. Dolent morsâ interna, morsæq; atq; admodū arefactæ uenæ intenduntur, trahuntq; inflammata quæ influunt, quapropter corrupto sanguine nequeuntibusq; spiritibus naturales pertransire meatus infrigidationes fiunt ob stationem, uertigines, aphonias, capitis grauitas, & conuulsiones, si iam ad cor, uel hepar, uel in uenam peruenerint. Hinc epilepsia, & paraplexia si continentes locos fluxiones inuaserint, atq; a spiritibus exire nequeuntibus exaruerint.

Eiusdem cum prædictis generis est sermo qui nunc effertur, quem & nonnulli illis copulant, atq; ob eam causam bisariam uerbum hoc *πρὸς ὅρα* id est accefferint, scribi reperitur. Sunt enim qui præsentem sermonem cum prædictis coniungant scribentes *πρὸς* syllabam cum s elemento, alij uero non coniungunt, scribuntq; *πρὸς* sine s. Verū quod in oratione dicitur, huiusmodi est: Dolorum motione fluxione humiditatum ad eam quæ dolore uexatur partem excitare cōsueuit. Quæ igitur uitiosis succis corpus refertum fuerit, bilis atræ cæterorumq; acrium humorū fluxiones exoriuntur, ob quas dolet ager magis, mordenturq; interna, grauanturq; morsæ a prædictis humoribus quæ in affecto loco sunt uenæ: idq; ipsum rei alterius sit causa. Nempe repleta fluxionibus huiusmodi quæ afficitur particula, corrumpitur quidē in primis sanguis ipse, deinde uasa opplentur, & hoc in eo cunctas spirituum uias arcet cohibetq;. Nempe & id declarauit inquitens: Nequeuntibusq; spiritibus naturales pertransire meatus, quod sanè spirituum interceptiones paulo ante uocauit. Cum autē san-

guis constiterit, atq; cum eo spiritus, infrigidationes fiunt, uertigines, aphonias, capitis grauitates, & conuulsiones, quibus succedunt paraplexia, & epilepsia, cum in locos oppletas uenas continentes desiderint fluxiones. Locos dixit corporis partes, quas autor ante scripsit, Cor, hepar, & uenam quæ prædicta coniungit uiscera. Venam inquam postea a medicis caum appellatam, quod uenarum omnium quæ per corpus animalis disseminantur, latissima sit. Iure igitur sanguis in locis huiusmodi propter uenarum repletionem spiritum penetrare non permittit, sed uelut in mortuo corpore congelatur, quod & autor ipse ostendit inquitens: Atq; spiritibus exire nequeuntibus, exaruerint, at proprie magis dixisset a spiritibus. Congelantur siquidem & quæ siccantur, & quæ perfrigerantur. Nunc autem non propter exicationem concrefcit congelaturq; sanguis, & qui in ipsum defluunt uitiosi succi. Nempe exeuntibus ipsis, & incorruptus & naturaliter fusus liquidusq; redditur sanguis. Verum cum manent, natiuamq; caliditatem respuunt ac extinguuntur, is tanquam mortuo in corpore congelatur. Cum ergo ita affectis sanguis detrahatur, is frigidus crassusq; & uix effluens apparet, idq; propter huiusmodi perfrigerationem. Interdum autem & toto corpore conuulsionem fiunt. Interdumq; salubriter & commode. Nempe corpus totum quatientes, uniuersas calcant partes adeo ut ex multitudine aliud per cutim digeratur, aliud ad aliquam ex non præcipuis expellatur partem: ubi cum indissolubiter impa- cum fuerit, paraplexia facit. Nam quod eas quæ apoplexia uel epilepsia ad aliquam ex non præcipuis partem irruunt, paralytes, id est resolutiones, Hippocrates ita appellet, est demonstratum. Interdum quoq; & facta absq; conuulsione apoplexia nonnullis morbus in partis resolutionem finiuit, qui paraplexia appellatur. Cætera dictionis sunt manifesta.

28 Talibus sanè prius adhibitis fomentis, uenam confestim ab initio secare oportet, cum nondum fixa sint omnia quæ contristant, tum spiritus tum fluxiones. Facilius etenim remedijs patent.

Qui ita habent, his ante fotus adhibere oportet, quoniam congelatus est in ipsis sanguis, difficulterq; effluit. Sed quoniam & in foru ipso frictio fiat, facere quod scripsimus est melius: secare scilicet internam cubiti uenam. Non enim semper ita concreuisse sanguis reperitur ut effluere non possit. Fricanda igitur in eo tēpore multis ab hominibus cunctæ corporis partes, etsi mediocriter sanguis fluxerit, rursus fricanda, superq; auferendus sanguis. Si uero non fluxerit, fricanda & fouenda donec fluxerit: ubi uero in paraplexia desierit affectio, breui fricare expedit tempore & fouere. deinde rursus fricare & fouere donec citissime hæc desierint, dum fixi adhuc non sunt spiritus, & euacuationi contumaces.

29 Postea reficere expedit, & habita iudicationis ratione superiorem uentrem si non leuetur, purgare: inferiori uero si non deiecerit, clysmum iniicere. Coctum deinde asinae lac dabis, bibetque heminis duodecim non minus; & si uirtus tolerauerit, sexdecim magis.

Ab ea quae per sanguinis missionem fit uacuatione, refici hominem roborarique praecipit, ut si nihil leuatus uideatur, ad eam quae per superiores partes, id est per uomitum fit purgationem agatur. Verum purgans medicamentum neque nominatim perscrixit, neque ipse fecit delectum. Nempe quod ad morbi magnitudinem uirtutisque robur respicientes uel album ueratrum, uel ex alijs quae uomitum cient quicquam exhibeamus nemo ambigit. Quae autem de aluo inferiore dicta sunt, clara existunt, expositorisque haud indiga. Neque admirationi sit lactis copia, cum antiquis omnibus ita fuerit assuetum. Quod autem lac asine propter humiditatem exhibeant, supra est dictum; atque amplius, quod non spissetur epotum ueluti quae crassa sunt. At cum eo mellis quippiam salisque miscere oportet.

30 Synanchus, id est angina fit cum hyeme uereque fluxio multa & uiscosa ad iugula res defluerit uenas, plurimamque haec propter latitudinem traxerint fluxionem. Cum autem & frigida & glutinosa fuerit, spiritus obstruit permeationes, sanguinemque coercens, quae uicina sunt inspissat; sanguinemque ipsum immobilem reddit, & constantem, quippe cum frigida natura sit & obstrictoria, ob id suffocantur liuente lingua, atque in rotundum acta, flexaque propter eas quae linguae subduntur uenas. Nam praecisauua quam nonnulli cionida, id est columellam uocant, uena utrinque crassa appareat. Cum igitur haec oppleta fuerint, linguae quae ob siccitatem & sicca & spongiosa existit innituntur. Lingua autem ui ex uenis humidum accipit, atque ex lata rotunda, ex bene colorata liuens, ex molli dura, atque ex facile flexili flectenti contumax efficitur. Eam ob causam cito iugulat, nisi cito aduersus eam pugnaueris. Sanguinem ergo ex brachijs detrahes, mox uenas quae sub lingua sunt secabis, deinde medicamentis quibusdam delinitu commodis uteris, calida exhibebis gargarismata, caput abrades, ceratumque tum collo tum capiti circumpones. Lanisque circumuolues, mollique spongia ex aqua ca-

Galen.

lida expressa fouebis: bibet autem aquam, & mussam non frigidam, cremoremque assuetum, ubi ex iudicatione in tuto fuerit.

Siue synanchon dicere uolueris siue cynanchon uel alterum quidem horum synanchen, alterum uero cynanchen, siue utrumque synanchen uocaueris, duas synanches sciueris esse rationes. Nempe ad curationem non omnibus opus nobis non est. Cori fureuit siquidem eam docere longe melius quam ij qui in nominibus falsa enunciant. Subscribam autem tibi compendiose doctrinam ipsius peculiarem, suscepto ita exordio. Fluxionum quae ex capite deferuntur, quaedam substantia tenues existunt, aliae ex crassis uiscosisque humoribus constant. Quae igitur tenues sunt, haec latius penetratis uenis in angustioribus detinentur. Tales autem sunt quae summum guttur ambiunt. Contrarium autem in crassis contingit, quod non ingredientur uniuersas quae strictae admodum existunt uenas, ante scilicet in capacioribus detentae. Cum igitur in faucium uenis tales impacti fuerint humores, pars in tumorem attollitur, ueluti summum guttur ex alijs, quamquam summi gutturis quam faucium strictiores multo existant uenae. Corpus autem totum uacare excrementis debet, & non plethoricum esse gemina ob causam. Nempe tum ob eam quae uacuatione est reuulsionem, tum quod uacuato corpore cum a parte affecta quod influit expellimus, id facilius suscipiet, nihilque si calido aliquo euaporare uolueris a corpore ipso parti calidat mittitur. Corpus igitur totum uena secta uacuare oportet, & purgatione & clysteribus. Verum ad affectas partes medicamentis astringentibus quae profluentes retrudant humores, atque ex infarctis qui non admodum infarcti sunt, & glutinosi & crassi, calidisque acribus quae contentos in membris passis digerant humores. Venae uero quae sub lingua sunt, eam quae faucibus est phlegmonem sine medicamentis uacuant. Sed quoniam humorum crassi alij glutinosique sunt, acrioribus propterea indigent medicamentis, quae scilicet & secare, & in tenuia diuidere, & tum glutinosa, tum crassa costringere possint. Praeterea & ad exteriorē superficiem reuellere oportet circumpositis collo quae attractoria polleant facultate medicamentis. Nempe colli superficialias partes quam imas affici est melius, quod spiritus quidem cum inspirationes fiunt, ad fauces gutturque summum irruat, & cum expirationes fiunt, per ea foras deferatur. Saepius uero quae ad partes praedictas procedunt fluxiones, et ad partes quasdam alias exprimente natura mutantur, atque interdum principio ita deferuntur, ut rursus aliae oriantur tum faucium, tum summi gutturis fluxionum differentiae. Quod autem quae ad cutem recesserunt, ijs quae in profundum decubuerunt multo faciliora curatu existant, constat omnibus. Comune tamen in utrisque tum collo, tum capite, a quo fluxiones fiunt, auxilium tibi sit. Sermo hic synancharum species, & causas & affectos

tom. 6

G 2 locos

locos & curationes docuit. Neq; si uel synanchen uel cynanchen, uel synanchon uel cynanchon appellaret, fuit sollicitus. Qui igitur librum hunc scripsit, neglectis nominibus omnes, qui tum in faucibus tum summo gutture existunt, arstantq; respirationem affectus synanchos appellans, duas horum species esse ait, alteram quidem quæ à glutinosa frigidaq; fluxione facta sit, quæ pituitosam uocare possis. Alteram uero à calida acrisq; quam si picrocholam biliosamq; simpliciter appelleueris, non peccabis. Priorem autem fluxionem in latiores decumbere uenas ait, biliosam etiam in tenuiores peruenire ostendens. Cætera dictionis sunt manifesta. Ad ea autem quæ retuli, conuertas animum oportet, & si primum non intellexeris, bis & ter lege & intelliges: ego autem ad secundam synanchi speciem transibo.

31 Cum æstate uel autumno fluxerit ex capite calida & nitrosa fluxio, quasi ab anni tempore tum acris, tum calida fuerit, atque huiusmodi sit, mordet, ulcerat, spiritu implet, orthopnoeam parit, siccitatemq; multam, præterea quæ intuenti apparent haud quaquam tumentia uidentur.

Quo modo & quam ob causam hæc fiunt? Nimirum à calidis & acribus. Priorem si uidem fluxionem quæ pituitosa est, hyeme uel uere defluere ait, hanc autem secundam in autumno aut æstate. In alijs anni temporibus ex proportionem ut antea est dictum. Orthopnoeam autem hanc superuenire anginæ generi ait, quæ insignis nota est angustia, partem ex ijs quæ respirationi subseruiunt aliquam fatigantis, ut supra est demonstratū. Quod si hos amplissime aperire os uolueris, linguamq; represseris cohibuerisq; ut quæ in faucibus sunt inspicere queas, nullum sanè præter naturam tumorem ut in ante dictis inuenies, quod scriptor explanauit cum inquit: Præterea quæ intuenti apparēt *ἰσχυρά*, id est non tumentia uidentur. Nempe quod in faucium meatu inflammatum est, non uidetur, quantum autem ex apertis uidetur, id omne citra inflammationē existit, partesq; non tument. Nempe hæc uox *ἰσχυρά*, tumentis præter naturam interdum opponitur. Quam uocis huius nunc dictam significationem ignorantes nonnulli, dictionem ridicule exponunt. Alij autem transmutant, uelut hi qui ad hunc scribunt modum. Præterea quæ intuenti apparēt, *ἄχρωα*, id est decolora uidentur. Cæterum ita affectus sit interdum ut & fluxionis partem recipiāt summo gutturi uicini atq; à tergo siti ordinatq; muscoli, ubi et gula siue stomachus, qui sæpius & ipse afficitur. Post hoc itaq; in præsentī dictione scriptum quoq; est quod sequitur.

32 Tendines quoq; ceruicis posteriores contenduntur, apparentq; tetani modo insendi.

Quod deinceps dictum est, magis adhuc summum guttur affici ostendit. Nempe & uocis gene-

rationem in ea animalis absoluti parte est demonstratum. Quapropter inquit,

33 Voxq; *ἀπρόσῳγος*, id est abrupta est, & spiritus paruus est.

Nempe uox omnino *ἀπρόσῳγος*, id est *ἀπρόσῳγος* id est dispersa abruptaq; est, passio ut dictū est summo gutture. Respiratio autem parua redditur propter meatus angustiam. Recensetur autem in commentarijs De difficultate spirandi quod breuior tempore sit & interuallis frequens, quod scriptor in hunc enunciauit modum.

34 Spiritusq; reuulsio frequens & uiolenta accedit.

Spiritum & eam quæ inspirationi succedit expirationem, & eam quæ expirationi succedit inspirationem dixit. Ex utroq; enim frequens redditur spiritus. Nam ita affectis quæ inspirationi succedit quies breue tempus habet, similiter & quæ expirationi succedit ante inspirationem. Demonstrationes horum in libris Despirandi difficultate enarratæ sunt.

35 Talibus arteria ulceratur, incēditurq; pulmo, neq; externū aerem admittere intrō queūt, quibus nisi ad exteriores partes malū sua sponte perferatur, hi grauius inuitabiliusq; habebunt & propter anni tempus, et q; à calidis acribusq; id sit humorib.

Arteriam quoq; ulcerari ijs qui ita affecti sunt dictum est & propter humoris acrimoniam, sed pulmonem ardere uiduatū destitutūq; ait, doctrinæ ueræ sermonem cōiungens copulansq;. Nempe in cōmentario De usu respirationis demonstratum est animal in respirationis priuatione non ob substantiæ penuriā perire: sed q; calor natuius tum refrigerio tum uentilatione destituatur, quapropter nō immerito qui immoderatio exiit pulmonem accendit. Hanc igitur anginæ speciem tum grauiorem tum inuitabiliorem esse priore ait, tum propter ante dicta, tum q; æstiuū autumnalesq; sit anni tempus, & q; ex acrioribus oriatur humoribus. Qua efficitur ratione ut ea quæ cum coniunctione est dictio, melior sit quam ea quæ sine coniunctione est. significat autem ab ijs quæ ante dicta sunt, & propter anni tempus in quo sit, & propter humorē à quo oritur, maioris esse periculi secundam anginæ speciem. Nō est ergo simpliciter scribendum q; tum grauior tum uitiatū difficilior sit propter anni tempus. Quod si & absq; cōiunctione scriptioem seruare quis uoluerit, coniunctionem eam ita subaudire oportebit ut si in dictione esset. Multa siquidem atq; alia apud antiquos defectiuo modo scripta reperiuntur.

36 Si febris hominem prehenderit, uetere excremento non descendente, uel nuper cibatum, siue cum lateris dolore siue non, is quieti tantisper permittendus donec cibus primum ad uentrem imum descenderit.

Diſtiones quoq; huiusmodi ea quæ libro De
nſtū in acutis morbis apponuntur Hippocratis
ſcripta non eſſe oſtēdunt. Non enim quæ perfectæ
De pleuritide in legitima libri huius parte tracta-
uerat, cum rursus hic pauca apponere oportebat.

37 Sumat autē in potu oxymeli. At cum
grauitas ad lumbos uſq; deſcenderit, tū uel
clyſmum dare, uel medicamēto purgare o-
portet. Atq; cum purgatus fuerit, ſorbitio-
nem primum mox aquam muſſam, deinde
cibaria, & coctos piſces miniſtrare, uinūq;
quod aquoſum ſit & exigū noctu, inter-
diu uero dilutam muſſam. Cum uero ſtatus
male olentes fuerint, balanūs uel clyſmus
conferat: ſi non, bibentem oxymeli tantisper
cohibere oportet, donec ad inferiorem al-
uum deſcenderit: deinde clyſmate ſubdu-
cere conuenit.

Indefinite indiſtincteq; diſtū eſt, quanq; quod
hic ſcriptum eſt, definite diſtincteq; in legitima li-
bri huius parte diſtū ſit, & quæ poſt id uſque quo
piſcium meminit Hippocrates, quoniā adhuc de
languētibus in libro ipſe agebat, & non iſs qui ex
morbo reualeſcūt. Cetera diſtinctionis manifeſta ſūt.

38 At ſi liquidam aluum habenti cauſus
ſuperuenerit, ſi tibi purgatio idonea uideat-
ur; eam non tribus primis diebus adhibe-
bis, ſed quarto.

Quod intempeſtiue quidem hic de cauſo ege-
rit, prædictis ſcilicet in principio tum differentiſ-
ſimum curacionibus, nemo eſt qui ignoret. Nempe
& diſtiones ex mente ſunt aphoriſmi illius, Co-
cta medicari & mouere, non cruda, neq; in princi-
pio niſi turgant. Plurima uero non turgent. Qui-
dam aliter ſcribunt cauſos ab initio medicari uo-
lentes ut diſtū talis ſit, Intra tertium diem adhibe-
bis. Expedi igitur non omnino à tertio medicari
die: ſed ut aphoriſmus canit, In acutis morbis raro
& in principiis medicamento purgante uti. Rem
ergo ſecundum aphoriſmorum mentem definire
oportet, ſcrutariq; cum in principiis purgatione
utendum ſit, & cum morbi coctio expectanda ſit.
Qui autem uel in principio ſimpliciter dixerit, uel
neutrum deſinierit, fallitur.

39 Cum autem purgaueris, ſorbitio-
nibus utitor, obſeruatis ita febrī accēſionibus
ut nunq; cum adſunt, neq; cū futuræ ſunt,
exhibeas: ſed uel cum ceſſant, uel quicue-
runt & maxime à principio receſſerunt. Fri-
gentibus ergo pedibus, neq; potū neq; ſor-
bitionem, neq; aliud quippiam huiusmodi
dabis. Sed maximum exiſtimato ſi id tantiſ-
per obſeruaueris donec ualde incaluerint.
Deinde ita quod conferat exhibe. Frigiditas
liquidum pedum, parte plurima febris ac-

Galen.

ceſſuræ ſignū exiſtit. quo tempore ſi quid
porrigas, maxime proſus peccabis. Nema-
pe & morbum non parum augebis. At ue-
ro cū febris deſierit, cōtrario modo pedes
reliquo corpore calidiores ſiūt, Nempe cū
aueatur, pedes perfrigerant: in cēſaq; ex tho-
race ad caput flammā mittit. Calore igitur
toto ad ſupernas partes cōcurrente atq; ad
caput expirante, non abſq; cauſa pedes fri-
geſcunt, utpote qui natura & carne uacent,
& neruis abundant, præterea & à calidiſſi-
mis ſeparati locis perfrigerātur, ſeſe ad tho-
racem colligente calore. Rurſum & cum fe-
bris ſoluitur: & in minutas redigitur par-
tes, calor ad pedes ex proportionē deſcē-
dit. Quo tempore caput & thorax refrige-
rūt, atq; ob id ſorbitio danda. Nempe cum
pedes frigidī fuerint, uenter de neceſſitate
calet, faſtiditq; cibū, intenditur hypochon-
drium, iactatur propter internam turbatio-
nem corpus, mens fixa non eſt, dolet æger,
lancinatur uelliturq; uomere affectat: &
ſi mala uomuerit, dolet. Ergo cum calor ad
pedes deſcenderit, curritq; urina, & ſi non
ſudet, omnia ceſſant. quo tempore ſorbitio
nē dare expedit, nā aliās pernicioſa exiſtit.

De particulari cibi miniſtrandi tempore diſtū
quidem eſt paucis in legitima libri parte: ſed eque
& nunc prolixius maniſeſtiſq; dicitur, quali ſer-
mo præſens alterius ſit explanatio ſeruata Hippo-
cratis mente, quam tum in cæteris dixit tum in eo
quod febrem ex thorace accendi, atq; in caput
flammam mittere ait.

40 Quibus autem aluus per febres perpe-
tuo liquida eſt, his pedes maxime calfaciēs
ceromatiſq; contegens atq; faſcijs obuol-
uens ita attēde ut reliquo corpore frigidi-
ores non ſint. ſi uero pedes calent, calorificū
nullum exhibe: ſed ne frigeſcant obſerua,
potu autem eſt utendum quamminimo, a-
qua frigida uel muſſa.

ὅς τελευτῶς idem cum ὅς παντός τοῦ χρόνου, ſemper
& perpetuo ſignificat. At cum multi exiſtant affe-
ctus in quibus per totum malum aluum liquidum
eſſe contingit, fieriq; nequeat ut curacionem habe-
ant unam, quomodo ſæpius eſt demonſtratū, tan-
tum abeſt ut ex diſtione quicquā utiliter dicatur,
ut etiam ſacturam ſacturus ſit, qui ſcriptū curatio-
nis modū in affectibus multis iuuare crediderit.
Nā ut cetera omittā, cum aluus liquida eſſe poſſit,
tū propter uentris phlegmonē, tū propter cōtabe-
facientē colliquantēq; febrem, frigida potus phleg-
monē cōtrarius eſt: colliquantib. uero febrilibus cō-
uenientiſſimus, eo qd didiciſti tēpore exhibitus.

tom. 6

G 3

Quibus

41 Quibus per febres alius liquida est, & mens turbatur, horumque multi floccos uelunt, naresque fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed ex se nihil quod compositum sit dicunt: talia his melancholica esse arbitror. His igitur ita habentibus, si uenter liquidus fuerit, ac colliquerit, forbitiones frigidiore crassioresque exhibendas esse puto. potusque qui sistant, uinosioresque quam astringentes.

Phreniticorum sane reliqua sunt symptomata. Sed uenter quidem interdum cum phrenitide liquidus efficitur, non tamen id proprie ipsi inest, quapropter liquidam aliam distincte curare expedit. Phrenitum uero alia seorsum persequi sanatione, in ea autem quam autor scripsit sanatione nullo pacto animi intentione ad phrenitidem dirigit, sed curare eum magis uelle arbitror affectionem quandam ex uentris quidem parte aliqua prodeunt, sed caput ita ad condolentiam trahente, ut ex uentris affectu desipiat. Talia autem non recte melancholica esse dictum est. Magis enim ea a flaua perficiscunt bile, cohibita aluo.

42 Quibus ite febribus uertigines a principio, & capitis pulsus sunt, & urina tenuis, his ad iudicationes usque febris accessiorem expectare oportet, quod si delirent quoque, nil mirum.

Cum caput circumagi uideat, *stiv*, id est uertigo uocat affectio: cum autem & tenebricosa simul fuerit uisio, *stiv*, id est tenebricosa uertigo appellatur: fit autem ob inordinatam spiritus flatuosi motionem, qui uel in capite localem habet generationem uel sursum ex infernis fertur partibus. Omnes autem spirituum huiusmodi generationes turbationem indicant, ob quas et cum symptomatis tumultuosis iudicationes fiunt. Scire etenim oportet affectiones huiusmodi medium quodammodo obtinere tum earum quae periculum uacant, tum perniciosis. Conatur siquidem caliditas natua corporis humores tum dissoluere, tum effundere: sed tenuia re ipsos & per inuisibilia foramina excernere non potest. Cum uero perfecte languet, neque soluere incipit, atque ob id spiritus flatuosus non summe languente natua caliditate ortum habet. Aegre igitur ualere periculo omni uacat. Natura siquidem morbo superior existit. Verum maxime aegre ualere letale est. Natura enim non parum a morbo uincitur. Cum autem non uincitur, praedicta fiunt symptomata, atque posteaque languerit, iudicationes absoluntur, alia ad salutem, alia ad mortem. Pulsus autem qui in capite fiunt, id est sensibiles artierum motiones, caliditatis multae symptomata existunt. Ob quas saepenumero deliria fiunt. Ad hunc itaque modum uniuersim habentibus quae dicta sunt, cum ubi quis parum ualere coeperit, ab urinarum quidem tenuitate cruditas morbi iudicetur, caput autem flatuoso impletum esse spiritu significant uertigines cum pulsibus, scire oportet naturam haudquaquam quiescere: sed interdum contentos in corpore prauos humores ita aggredi, ut a bonis eos separet, atque quouis modo excernat, uel ad eam quae minus praecipua sit reiciat partem. Praedictus igitur sermo ad antedictorum praenotionem praesentionemque maxime confert. Nempe interdum ab initio male febres quidem moderatae fiunt, sed symptomata huiusmodi caput infestant propter contentorum in corporis uentre humorum calorem atque exhalationem. Sane capitis solius quouis aliter modo habentis caliditatem, balneum iuuabit, pitisanaque cremor pro sorbitione satis erit. Verum cum spiritus calidus flatuosusque ob humorum prauitatem ad caput fertur, lauare hos non confert. Tute igitur singula haec facienda sunt. Distinctio autem affectionum una sola est ex urinarum cruditate & concoctione, quorum autor recte meminit inquiriens: Urina tenuis, quod saepius cruditatis signum esse est pronuntiatum. Quo fit ut nullus sit medicus qui in morbis huiusmodi negligentius urinas contempletur.

43 Quibus principio urinae & nebulosae & crassae existunt, hos annuentibus cateteris purgare conuenit. Quod si urinae inter initia tenues fuerint, tales non purgabis. at si uideatur, clysterem exhibebis. Tales enim ita curare conuenit.

Siue ijs quae in antedicta oratione relata sunt haec coniungit, siue non, quod ex ipsis utile quis habere comune potest, quod scilicet corporis purgationem prorsus uitare oporteat cum in humoribus adest cruditas, id manifestauit inquirens: Urinae tenues, tantum crassae concoctionis notas habent, in ipsa adeo substantia, & hoc uerbum *requisitum*, id est nebulosae, urinas significat nebulas habentes. Nempe nigrae adiecit, si nos eas audire uoluisset. Multa siquidem nomina communia citra distinctionem dicere consueuerunt, cum id quod in significantiis rerum melius est, declarare uoluerint. Sic sane cum iudicationes ad salutem fuerint, simpliciter dicunt, iudicatus est. Defuncto uero iudicato non simpliciter efferunt, sed hoc totum iudicatus obijt. Praeterea cum quis excreta bilem simpliciter dixerit, pallida & non nigra intelligimus. Sic certe, & impraesentiarum urinas nebulosas audire oportet eas quae albas habent nebulas, quae concoctionis nota existunt. Quoniam igitur cocta medicata, ob id & nunc ita scripsit libri huius autor. Tales autem ita curare confert. Nihil autem de sanguinis missione locutus, ea particulatim enarrat ex ordine omnia, non quod interdum ita habentibus, sanguinis missione opus non sit, sed quod nunc sola alia docere uelit. Nempe de sanguinis missione abunde supra est dictum.

44 Corpus quieti permittere, ungere, & aequaliter contegere oportet, nullamque aquosam bibendam & pitisanam cremorem uesperis sorbendum dabis. Ventrem ab initio clystere duces: sed medicamentum purgantia non admovebis. Nempe si uentre mor-

ueris,urina non maturabitur, febrisq; citra
tum sudorem tum iudicationem in longum
protrahetur tempus.

Sermonem quoq; huc percurrit, scopum in eo
habens eam quæ cū moderata calfactione sit quie
tem. Cremorem aut prisanæ ab initio elargitur, q
nulla ad uigorem usq; & iudicationem sufficere
non possit. Morbus siquidem crudus est, & longe
absint concoctiones. Præterea mulsam quæ aquo
sa sit, adhibet, propterea q aquam per se & solam
nihil boni habere demonstratū sit. Vesperī autem
prisanam mauult exhiberi quā mulsam. Nempe
cū antea in legitima libri huius parte didicerimus
prisanam mulsā posterius exhibendam, melius fu
isset & nunc ita dicere: Mulsam quidem prius, po
steriorem uero prisanam exhibe. At uero cum ue
sperī pro posterius dixerit, particulariorem efficit
doctrinam & non uniuersaliorem. Cur autem eos
purgare haud uelit, in quibus summa inest crudi
tas, causam recessit epilogisticā magis q analogi
sticā, quam recensere ad eum spectat, qui quod
fit, sola citra Logicam demonstrationē experien
tia nouit. Dogmatici autem uiri erat docere quam
ob causam purgantibus nobis ita habētes non co
quatur urina, febrisq; sine sudore et iudicatiōe per
seueret. Perfectius quidem & diligentius alibi hæc
omnia sumus contemplant: sed impresentiarum
quod præsentī enarrationi prodesse possit, summa
tim dicemus. Tu ergo animū ad me cōuerte. Cum
facultates, ut scis, quatuor sint, atq; inter eas non
minime ualeat alteratix, perquam dispensatis ab
ea corporibus natura alimentū adsimilat, coctio
hec nuncupatur nutrituræ substantiæ permutatio
secundum qualitatem existens. Natura igitur ad
sumpto in uentrem deuoratoq; alimento, a cæte
ris quidem motionibus cessare debet, ut soli quod
coquendis cibis deputatum sit operi uacet. sed au
xilio externo aliquo indiget, si aliquādo imbecil
lior reddita fuerit, quo modō & in ea humorū quæ
in uenis sit cōcoctione contingit. Quiete quidem
indiget sequentem ante caliditatē, q calfactum,
frigefactumq; uel exiccatum, & humectatum sit,
singulis horum alio & alio tempore factis. ob id
igitur qui hæc scripsit, hominē curari uoluit quie
ti permissum, unctū, & æqualiter uestimentis ob
uolutum. Nempe aduersus uim febris humiditatem
eam quæ uentionibus cōparatur, remedium
esse putauit. præterea & neque ualenter calfacere
neq; perfrigerare, sed tepescere, quibus maxime
indigent quæ coquuntur maturanturq;. Quod si
hæc coctioni humorū conferant, purgationes cō
trariæ existit, Nempe corpus uehementer mouen
tes frangunt. Tali siquidē uirtute prædita sunt o
mnia quæ purgāt medicamēta. hæc est ergo causa
cur purgatiōes coctionibus aduersent. Ad eā autē
quæ sermoni huic continuatur seriem pergamus.

45 Cum iudicatio propē fuerit sorbitio
nem ne dederis, si perturbetur: sed cum per
turbatio desierit, atq; in melius profectum

A sit. Obseruandæ autem febrium omnium
iudicationes, sorbitiones quæ hoc auferen
dæ tempore.

Mentem Hippocratis etiā hoc in loco seruat
qui librum hunc scripsit. In principio quidem mul
sam & prisanæ cremorem exhibens, & cum propē
est iudicatio cremorem tollens.

46 Consueuerunt febres hæc protrahi &
impetuosos humorum de loco ad locum il
lapsus habere, siquidem infernæ partes fri
gidæ fuerint, circa aures & collum. Si uero
non fuerint frigidæ, alias mutationes ha
bent. Nempe fluit è naribus sanguis & uen
B tres hi turbantur.

Quibus urina ob humorum cruditatē tenuis
est, his iure optimo protrahuntur febres, quæ an
te coctionem solui nequeunt. Quod aut tales per
impetuosos humorum de loco ad locum illapsus
iudicentur, sæpius iam est dictum. Rarius autem
& per excretionē solutiones horum fiunt. Vrum
autē in superiore corporis parte uel inferiore ab
cessus ex his humorum illapsibus generabit, quæ
hic dicuntur, ijs quæ in prognostico scripta sunt,
concordant consentiuntq;.

47 Quibus febres graues & implacidæ
sunt, & hypochondria contendunt, iacē
C tesq; ægri sese continere non possunt, atq;
extrema frigescent, absolutissima tum dili
gentia tum custodia indigent: eosq; ita de
gere oportet ut nihil præter oxymeli aquo
sum tangāt, sorbitiōne aut nō dabis donec
sele malum remiserit, & urinæ maturentur.

ἄσώδης febres appellat in quibus ægri ἀσώρη
ται, id est grauiter afficiuntur, atq; implacide mo
lesteq; habent: difficilis autem tolerantia atq; im
placiditas inquietatioque sequitur interdum fe
brem immobilem & astuosam, sæpius quoque &
stomachi malitiam. Os autem uentriculi ita me di
centem audi. Incepit ergo à febris ipsi, ἄσώ
D δης, id est graues & implacidas inquires, & hypo
chondria contendentes, deinde ad febrentes per
transiit. Nam quod iacentes sese cōtinere nō pos
sint, de febrientibus est dictum, ueluti & quod ex
trema refrigerantur. Iacentes autem sese non cōtin
ent, grauius languentium, atque difficulter se
rentium, implacidorumq; & inquietorum nota
est. Extrema autem frigere, magnæ uiscerum
phlegmones, quæ ex crasis succis orta sit, ut an
tea demonstrauimus, cum de secunda causi spe
cie ageremus. Quod si uehemens frigus fuerit,
quod uirtus ualde imbecilla sit, iam tibi coniectu
ra est. Non immerito igitur ita languentes pluri
ma, tum custodia, tum diligentia indigere ait. Por
rigit autem & ipsi non absque causa oxymeli, ut
pote crassos glutinososq; propter humores fati
gatis. Adiecit autem sermoni aquosum tanquam
contrarium illi, quod his exhiberi solet, in quo

rum pulmonibus tales continentur humores. Nam acius longe illis esse conuenit, quod propter longam in distributione ad affectum partem delationem de necessitate soluat uirtus, his uero tale hypochondrio incurat quale eorum est. Nullo autem pacto sorbitionem ita habentibus dare prius quam morbus ad maturitatem deductus fuerit, indistincte est pronunciatum, seruantibus nobis quod edocuit Hippocrates. Adijciendum sermoni, si ager suffecerit, quod ut patet forte prætermisit.

48 Iacere autem in conclau obscuro debent, & lecto ualde molli, diuq; positum eum sustinere, & quamminime sese proijcere & iactare. Nempe id tales maxime iuuat.

Nunc decubitus obscura in domo non tanquam maturatorium auxilium, sed tanquam difficilis tolerantiae inquietationisq; quæ ob ἀσυνε, id est molestiam angoremq; sit correctorium uoluit. Gratia cuius & lecti mollis meminit. Tentare autem seipsum non proijcere sed conuiescere, laboranti modo utroque commodat, tanquam & morbi totius concoctionem iuuans, & uirtutem ipsam conseruans.

49 Hypochondrium autem lini semine illines, cauebisq; ne cum apponitur, æger horrescat: sit autem summe tepidum ex aqua & oleo coctum.

Mollit lini semen, idq; habet ut non manifeste calfaciat, quæ maxime expostulat phlegmone omnis. Et sanè tactu tale ipsum præparat, quale & secundum uirtutem est, perquam tepidum ipsum adhibere præcipiens. Caterum aquæ & olei mixtura tepidam generat caliditatem, mollitq; mitigat: utpote moderatam habens facultatem. Cuius potissimum esse debent ut demonstrauimus quæ & maturant & per halitum digerunt.

50 Coniectura autem colligere oportet ex urinis quidnam futurum sit. Nempe crassiores pallidioresq; meliores, tenuiores uero & nigriores, perniciosæ magis.

Non quicquid futurum ex urinis docet, sed uel salutem uel mortem. Salutem indicant crassiores & pallidiores. Crassiores autem dixit tenuibus & non naturalibus comparans, ut & paulo ante intelligere uoluit. Neque enim crassas neque tenues quæ secundum naturam habent dixeris, si recte uolueris interpretari. Porro tenues & nigrae, deterrimæ sunt. A tenuibus siquidem solis, morbi cruditas indicatur. Nam quod exacte tenue est, id aquosum est, quapropter & album. Sed prænotiones ex urinis, in commentarijs Prognostici dictæ sunt.

51 Si autem mutationes habent, tempus indicant, morbusque de necessitate modo ad peius, modo ad melius permutat inæqualitatem.

A Nempe si id & in laborantibus obseruaueris, uere hominem ex urinarum uarietate in longius decidere tempus reperiēs, atq; medias incurere permutationes. Plures namq; significantur affectiones quæ non eadem egent curatione, neq; qualem habent solutionis præfinitionem.

52 Inconstantes febres donec constent finire oportet: ubi autem constituerunt, uicū & curatione conuenienti occurre, qd naturale est contemplatus.

Febres inconstantes dixit in quibus nihil *κατασυνός*, id est constans quietumq; exiit, quod significat *καὶ βίβασις*, id est, certum compertumq;. Sunt autem certa quæ in periodicis & urinis apparent. In superq; in exactis febrium speciebus. Sed periodi omnino non apparent primis diebus: urina uero superueniunt alias aliæ, & sæpenumero ter quaterq; interdū & noctu meiere contingit. Dissimilesq; inter se apparent urinae. Formam ergo talis febris inconstantem esse ait, quod idem est perinde atq; dices non exacte formam unam seruantem. Exposui tibi exactas febrium formas & in commentarijs De febrium differentijs & in secundo Iudicationum libro. In huiusmodi itaq; febribus non in principio uicū uti præcipit: sed finire donec qualis nam sit febris cognoscamus, & tunc uicū formam præfinire.

53 Sunt autem facies ægrotantiū multæ.

C *ἁλίας*, id est facies dixit, quasi differentias uel modos uel species. Ægrotantium uero, proijs qui ægrotantibus fiunt morbis. Nempe sapius est demonstratum eam esse antiquis omnibus consuetudinem ut à pathematis ad patientes, & à patientibus ad pathemata transferant appellationes: quæ si febrium uel febrientium differentias dicere nihil referat. Sic & pleuriticorum uel angina laborantium, aut pleuritidis uel angina. Facies ergo dixit laborantium, quoniam eos oculis cōtemplantes reperimus differentias.

54 Quo fit ut animaduertere debeat medicus, ne quampiam manifestarum causarum ignoret.

D Quod manifestas causas Græce *προφάνους* appellet, didicimus, & sanè nunc eam de his appellationem ferre constat. Inferat igitur.

55 Neque eas quæ ad ratiocinationem spectant, neq; quæ in numerum parem uel imparem apparere oportet.

Quasi causarum alias quidem manifestas absq; ratione artificiosa cognoscant omnes, alias uero soli qui ratione artificiosa utuntur. His quoq; & attendendum ait quas in numerum parem uel impari apparere oportet.

56 Maxime uero numerus impar est obseruandus. Nempe hi dies in hanc uel illam declinantes partem reddunt.

Dies impares multa pollere uirtute non simpliciter

citer, sed in acutis morbis est intelligendum. quod A
insignes in utranq; tum salutem tum mortem mu-
tationes efficiant, id enim significat uocabulum
quod Græce *ἰντροπῆς*, id est huc & illuc de-
clinantes dixit. In acutis quidem hi sunt, tertius,
quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus-
quartus & decimusseptimus. In longis, hexage-
simus, & octogesimus. Medij horum sunt uige-
simus, trigessimusquartus, & quadragesimus. Im-
pares autem & hi sunt.

57 Obseruare autem oportet primum
diem quo æger parum ualere cepit, prin-
cipiumq; unde & quando inspicere, existi-
matur siquidem id scitum præcipuū. Cum
autem agrum interrogaueris, atq; omnia B
fueris perscrutatus, in primis quidem quo-
nam habet caput modo, si dolore careat, ni-
hilq; graue in se habeat, deinde si hypochō-
dria latusq; dolore infestentur, si uidelicet
hypochondrium laboret, uel attollatur uel
obliquitatem habeat uel satietatem, aut la-
tus doleat, simulq; cū dolore tussicula fue-
rit, uel tormina dolor uel uentris: cum in-
quam horum quippiam hypochondrio ad-
derit, potissimum uentrem clysmis soluere
oportet, bibat autem mulsam calidam co-
ctam que. Ad hæc perdiscendum si cum ex-
urgit, defectu animæ corripiatur, & si facile
spiret. Inspiciendum quoq; utrum ne deie-
ctio nigra admodum colore fuerit, uel syn-
cera qualis sanorum existit, & si febris exa-
cerbet die. Nempe in huiusmodi morbis,
tertianæ considerandæ sunt exacerbatio-
nes, cōspiciendæ præterea & alia, & si quar-
ta dies tertiæ quippiā simile attulerit. Nam
tunc æger in periculo est. Quantum autem
ad signa attrinet, nigra deiectione mortem in-
dicat. Quæ uero sanæ similis, cum omni die
apparuerit, salutem.

Obseruandam in primis ait primam esse diem, D
in qua morbi causam cognosci iubet. Nempe hæc
oratio *ὅς θροῦ γὰρ ἐστὶ*, id est unde & quando quis-
nam sit morbus indicat. Interrogari autem præci-
pit in primis quidem quonam modo habet caput,
mox hypochondria, deinde latus; hypochondria
quidem si dolor quispīam afficiat, uel attollantur,
uel quandam habent *σκολιότητα*, id est *ἀνωμαλία*
id est obliquitatem siue inæqualitatem, quod in
Prognostico hac dictum est oratione. Si inæqua-
liter affecta sunt dextra ac sinistra parte. Vel si *κό-
πῃ* habent, inquit, quod ciborum repletionem es-
se arbitror. Interrogari quoque & alia quæ in di-
ctione habentur iubet. Deinde hypochondrijs ita
affectis soluere aluum clysteribus præcipit, mul-

samq; bibere calidam & coctam. Sed indistincte
hæc locutus deinceps scribit. Ad hæc perdiscen-
dum si cum exurgit, defectu animi corripiatur, &
si, inquit, facile spiret, quod defectu animi cor-
repto opponitur. Conspiciendam præterea iubet
deiectionem utrum ne nigra sit, uel syncera & in-
culpata, qualis in sanis esse uidetur: ueluti & si fe-
bris tertio exacerbet die. Et si his ita habentibus
quarta dies tertiæ quippiam simile in accessione
attulerit, periculosam eam esse asseuerans. Nem-
pe quartam diem quæ septimæ index est, rem no-
uam edere ex grauib; est notis. Res autem nouæ
editio designationis patet omnibus. Nam si prima
die & tertia fiat accessio, & secunda facta haud-
quaquam fuerit, quod quinta accessionem habi-
tura sit par est, & non quarta, quapropter si quar-
ta habuerit, mali cuiuspiam alterius generationē
demonstrat. Si autem & nigra deiecerit, mortem
indicat fore. Tu autem multa ex dictis prætermi-
tens, memoriam rei huius habe. Nam si prima &
tertia die proportionalem attulerit accessionem
febris, atq; nouiter quidem quarta paroxysmum
fecerit, sed æger nigra deiecerit: signum est letife-
rum. Quod si diebus omnibus sanis similia deiece-
rit: salutem agro spera.

58 Cum autem uenter glandi non obe-
dierit, spiritusq; tum placidus, tum quietus
fuerit, surgensq; æger in sedem, uel dum in-
lecto est animæ defectu corripiatur: si hæc
uel mari uel scœminæ inter initia fuerint, de-
lirium fore expecta.

Confusa est dictionis huius intelligentia. Nem-
pe ubi glans nihil profecerit, uideturq; æger placi-
dus quietusq; esse, si utiq; & cum exurgit defectu
animæ corripiatur, delirium expectandum, perpe-
ram dictum esse mihi uidetur, cum rei huic neque
experientia neq; ratio patrocinentur, quanquam
tale quippiam aliquando fiat. Prenotiones tamen
non eorum sunt quæ raro accidit, sed eorum quæ
semper uel magna ex parte.

59 Manus quoque contemplari oportet. Nam si tremulæ fuerint, huic sanguis e
naribus profluet.

Sermo quoque hic neq; quod perpetuum est,
neque quod magna ex parte sit, sed quod raro ac-
cidit docet.

60 Nares quoq; inspiciendæ. Nam si
per utranq; spiritus æqualiter trahatur, &
si multus ex ipsis feratur, cōuulsio fieri con-
sueuit: quæ si fiat, propinqua mors est, quā
prædicere pulchrum fuerit.

Cum tremunt manus, nempe ita dicere expē-
dit, si spiritus multus per utranq; narem feratur,
conuulsionem superuenire ait. Consueuit autem
ita appellare conuulsivam affectionem, quæ in
musculis naris pinnas mouentibus fit.

61 Si in febre hyemali lingua aspera red-
ditur

ditur, prehendantur animæ defectiones, huic tamen si febris remitti consuevit, in eo tamen qui per famem fit cruciatus, conferuare ægrum oportet, & aquæ, mulsæque potione & ptisanæ cremore, neque febris quieti est fidendum. Nempe qui signa huiusmodi habent, his mortis periculum impendet. Ergo cum hæc noueris, optimè que contemplantus fueris; ita prædicere pulchrum fuerit.

Sunt qui febre hyemale simpliciter intelligant eam quæ in hyeme fit, alij eam quæ hyemi natura peculiaris sit. Ea autem ex pituita est, ueluti æstiva ex ipsa bile. Si ergo inquit in huiusmodi febre lingua aspera fuerit, atque animæ defectus, eam periculosa esse est fatendum, atque ob eam rem febrium quieti fidendum non est, si cum prauis sitant tum symptomatis tum signis, ueluti in præsentiarum cum animæ defectu & linguae asperitate. Nō negligenter itaque ait regendos ægros, aquam & mulsam & ptisanæ cremorem exhibendum. Sed sanè hæc pugnare uidentur aduersus id quod fame cruciandos dixerit. Nam huiusmodi cruciatus qui Græce *λιμοκτονία* dicitur, maxime quidem abstinentiam omnimodam significat: aut si non, saltem eam quæ in potibus solis fit uictus rationem. Sic sanè & mulsam & ptisanæ cremorem dare permisit. Videtur ergo eos ob id fame cruciandos dicere, quod qui remissiones huiusmodi quietissimas habent, longo ita tempore in his morientur, protrahantque, ut falsi circumuenti; nonnulli ualidiorem ministrauerint alimoniam, & potissimum ob animæ defectionem. Quo fit ut ad uictum huncis qui per mulsam atque ptisanæ cremorem multis sit diebus recte dictus sit ex fame cruciatus, uel inedia.

62 Cum autem in febribus quinta die terrificum quippiam fuerit, uel uenter repente liquida deiecerit, & animæ defectus prehenderit, uel uocis priuatio, uel conuel-latur æger, uel singultiat, ex his angustia grauius affici consuevit, sudores que circa tum mustacem, tum faciem, tum ceruicem ab occipitio esse consueuerunt. Qui autem hæc patiuntur spirituosius paulopost moriuntur.

Ex ijs quæ per observationem empiricæ à medicis scripta sunt, quædam talia existunt, id est ex semel aut bis inspectis modis uniuersalis annotationem habent, tanquam sæpenuero in eisdem & similiter considerari possint. Tale autem quiddam & id est quod nunc dicitur. Nempe contemplantus ægrum quandam liquida quædam deiecit, atque animæ defectu prehensum, uocemque priuatum, alium uero conuulsum, & postea uel ambos uel alterum *ἄσθης*, id est anxietate plenum grauius aff-

Afectum, partesque, tum faciei, tum colli sudantes, deinde obijisse, hæc scripsit quod signorum Empiricorum cōcursum existimaret. Sed sanè hæc possunt & stomachicam prægredi syncopen, fierique ualent & propter copiam oppressa uirtute, uel ea ipsa alio languente modo. Vnumquodque liquidum eorum quæ dicta sunt, per se malum est, nedum si omnia concurrunt. Nempe ex repentinis defectionibus deficere animam periculosum est, ueluti & uoce priuari, & angore plenum esse, partibus uero tum faciei, tum capitis dumtaxat sudare non bonum. Quo igitur modo hæc tum multa tum mala existunt, sic & alia quæ in Prognostico scripta sunt. Potestque quispiam hæc inter se conueniens uideri nouum quippiam docere. Quod si & B defectionem obscuram ambigamque ueluti enigma sermoni miscuerit, iam plebeijs & ex ea sapientior esse uidebitur. Admirantur quidem plebeij quæ non intelligunt. Viro autem qui superuentientia symptomata ab eorum quæ morbum indicant concursu distinguere nouit, sermo is uariis quidem deprehenditur, sed inutilis. Nempe pathognomonica syndrome (ita enim Græci symptomatum egritudinem indicantium concursum uocant) morbi speciem demonstrat. Superuentientia uero symptomata mansuetudine ipsius & malitiam, eumque qui singulorum horum symptomatum uires didicit, quæ apparent, tum æstimare, tum inter se comparare oportet. Et siquidem tum fortiora, tum plura uidentur quam bona mala, hoc C minem in periculo esse est sciendum. Verum si bona malis & fortiora & plura fuerint, de ægro bene sperandum. Quod te facere iubet & ipse Hippocrates. Nempe in Prognostico singulorum, tum symptomatum, tum signorum uires particulatim docuit, atque circa libri finem ita ait: Oportet autem eum qui recte sit, tum conualituros, tum morituros prædicturus, præterea & in quibus ægritudo pluribus diebus, & in quibus, paucioribus permansura sit, signa omnia perdiscere, atque æstimationis eorum inter se uiribus, ut scriptum est, ferre sententiam. Signorum autem uires æstimari precipit, atque ex ipsis prenoscere quidnam futurum sit. Vbi ergo bona malis permixta fuerint, uiribus quodam modo paria æquaque, exercitato est opus uiro D qui in operibus ea sæpenuero fuerit contemplantus. Vbi uero omnia uel mala, ut nunc, fuerint, uel bona, cuius patet quid futurum sit. Cum enim deficiente alio deficere animam signum per se malum sit, pari modo & malum uocis priuatio, si præterea æger nervorum distentione conflictetur, uel singultiat, uel anxietate refertus sit, manifestius indicabit periculum. Si præter hæc & aliud quodpiam malum superuenerit signum, ut circa faciem ceruicemque sudores, atque adhuc quæ nunc à scriptore huius libri dicuntur, nullo quod bonum sit malis permixto signo, quod talis de necessitate ex signorum malorum aceruatione morietur, notum euadit. Adiectionem autem in fine dictionis *πρόθυμος*, id est spirituosius facti, tanquam anigma, *κατὰ φύσιν*, *εἰς*

ceū quippiam eorum quę de necessitate fore non reclamant, quicquid significet, siue spirituum copiam quibus uenter inflari possit, siue magnam et frequentem respirationem, quam sanę his quas comitatur affectionibus haudquaquam bonam esse didicimus, ueluti & eam quę uentris est. Quę propter uestiganda alia signa non sunt, his de necessitate antegredientibus. Ex his enim, & non ueluti ex nonnullis quę casu eueniunt, futurorum futura quędam sit prænatio.

63 Quibus per febres crura tuberculis afficiuntur, ea quę tractu temporis manente etiamnum febre non maturuerint, faucibusq; haudquaquam tumentibus irreperit suffocatio, non maturuerint in quā sed extincta sint, ijs sanguis ē naribus fluere consueuit, qui si multus fluxerit, morbi solutionem portendit: si non multus, morbi prolixitatem. Quare quo minus fluxerit, eo deterius & prolixius erit malum. quod si & alia facilia fuerint, pedum dolores sunt expectandi, qui si pedem affecerint, & dolorosus perseveret, inflammaturq; & non leuetur, dolores post paulo ad ceruicem peruenient, clauiculam quę, et pectus, & articulum. Nempe & hic tuberculosis fieri debet. Quibus extinctis, si manus uel contrahantur, uel tremulę fiant, talem nervorum distentio comprehendit, & desipientia, supercilijs oriuntur quę *φλυδαίαι* uocant, rubores quę agrum habent, & ex palpebris altera ad alteram germinat: duraprehendit phlegmone, tumet uehementer oculus, & delirium ualde crescit, interdum indicatur. Signorum autem multa fiunt in numero impari magis quā pari. Vtro tamen horum fiant, pernicioſa superueniunt.

Qui librum hunc confecit, is hæc omnia quę dicta sunt, deinceps inter se contemplatus uniuersalem quandam particularem ex obseruatione sermonem temere fecisse mihi uidetur. Melius siquidem erat, si quo Hippocrates modo in epidemijis morbis scribere consuevit, is ita fecisset, præfatus quidem ab initio patientis nomen deinde dies in quibus singula facta sint, narratione affectus, ut & in ipsis quę nunc dicta sunt symptomata facere potuit. Nempe in cuiuspiam cruribus orta sint tubercula, eaq; non recipiant maturitatem, febriar quoque is, & suffocationem incurrens ab his liber sit tuberculis, existimabit profecto quis sursum factam humorū qui crus infestabant transformationem, quę in horum transitu suffocatio-

nem hominī peperit. Si ergo talis euasurus est, profluere per nares sanguis poterit. qui si multus fuerit, morbum soluit: si non, protrahetur æritudo. Et si reliqua bene fiant, succedantq; rursum ad pedes decubere huic dolor poterit. Quod ita factum esse statuatur, ueluti ex his hominem *πυριφλεγμῶν* factum esse, quod caliditatem multam circa pedem manifestare consuevit, uel febrem multam igneamq; & flagrantem. Et si post hæc non soluta fuerint symptomata, reuersa iterum ad superiores partes humorum copia dolores pariet in collo, clauicula, humero, & pectore. Vt autem huic omnia hæc absque ratione contigerunt (nempe id extincta esse fuit) ita manus tremulas factas esse statuatur: deinde nervorum distentionem quod ad nervosas partes decubuerit humorum copia, principiumq; ipsorum prehenderit, unde desipientia, subsecutam esse. Contemplatur igitur auctor quendā ex ijs qui ita affecti sunt, *φλυδαίνας*, id est pustulas in supercilijs habentem (nempe id significant *φλυδαίαι*) omnibus ita habentibus futurum symptoma hoc temere pronunciauit. Idemq; de ijs quę continuata serie scripta sunt, sermo existit. Nempe quod unī ita affectorum uel duobus factum est, id ad omnes extendens, ait & ipsos rubores habere, & ex palpebris alteram ad alteram germinare, duram quoq; fieri phlegmonem, & uehementer tumere oculos. Quorum cetera quidem cuius patent, sed ex palpebris alteram ad alteram germinare est ambiguum, utrum ne significare uoluerit, quandam ex parte earum exurgentem consensionem, uel carnosam quandam generationem, ab altera quidem enascentem, sed ad alteram sese extendentē. At uero si rei huius quo pacto inuētio quippiam utilitatis afferret, de ea amplior fusiorq; mihi facta esset scrutatio.

64 Hos si ab initio purgare uolueris id ante diem quintum facito, ubi uenter murmurauerit: si non, à medicamentis abstinet. Verum si murmurauerit, fuerintq; excrementa biliosa, scammonia mediocriter purgato. quantum uero ad aliam pertinet sanationem, quamminime exhibebis tum potus tum sorbitiones, ut melius æger habeat, nisi remissione facta decimamquartam fuerit egressus.

Sanationem prædictæ concursionis scribit, quam nominatione perstringere mihi, ut dixi, non placet, cum etiam & sanatio nihil commune habeat præter ea quę sapius ante sunt enarrata. Ait siquidem considerandam alium, quam per murmuraciones cognitam, purgandam esse præcipit. & si biliosa deorū repant, scammoniam biliosa expurgārem exhibet. Quod uero ad reliquum sanationis attinet, sorbitiones ualde exiguas ministrari præcipit, quousque remissione facta decimumquartum pertransierint diem, quæ oratione morbum

morbū ante decimumquartum diem coqui nō posse significatur.

65 Cum febricitanti decimoquarto die uox intercepta fuerit, tantum abest ut morbus celeriter tum solui, tum discedere consueuerit, ut etiā diuturnitas ipsi indicetur. Cum ergo in eo die apparuerit uocis interceptio, morbus protrahitur.

Dictio hæc his superfluit qui mala symptomata maiori prædita esse facultate didicerunt, cum in diebus iudicatorijs apparent. Nempe qui librū hunc scripsit, nunc in re una quæ decimoquarto diei est particularis, hoc est usus uniuersali. Nempe ut diebus cæteris iudicatorijs, sic & decimaquarta si malum aliquod symptoma apparuerit, id maiorem habet efficaciam. Adnotare autem oportet quod futurum est, neq; simpliciter, neque ut res tulerit, sed cum distinctione. Nam si ex signis bonis quæ maiorem habent efficaciam, laboranti adfuerint, longiori tempore saluari æger poterit. At si nullum tale fuerit, morietur, nequeunte morbi concoctioni satisfacere uirtute. Qui igitur hæc scripsit, prolixiorē omnino fore morbum male pronunciauit. Nempe & is cito mori potest cui uox decimoquarto die interrupta est, si cum sauis alijs notis factum fuerit hoc symptoma.

66 Cum febrientis lingua quarto die turbata quædam loquitur, uenterq; liquida biliosa deijcit, talis delirare consueuit. Sed ob seruare & assequi euentus oportet.

Id quoq; & in alio quodam die apparet, uerum si quarto apparuerit in primis periculosiorem septimum fore demonstrat. id est quæ illo die futura sunt.

67 In acutis morbis quæ æstate & autumno sit, repentina sanguinis distillatio, robur, multamq; in uenis inflammationem significat. Itemq; quod postero die urina tenuis apparebit. Et si æger ætate floruerit, fuerit que corpore ob exercitationes bene carnosus uel melancholicus, uel ex potatione manus tremulæ fuerint, delirium uel conuulsionem prædicere bene est.

Dictio quoque hæc symptomatum multorum quæ non in agro omni coeunt conueniuntq; implicationem permissionemq; habet. quo fit ut & inutilia sint, quæ ad hunc scribuntur modum, cum doctrina ab uniuersalibus recipiat commoditatem, quo Hippocrates modo facere consueuit. Dictum autem est uniuersalium quædam perpetuam quandam habere uirtutem usumq; alia uero ut plurimū. Quod si anceps quippiam uel rarum fuerit, id ad doctrinam inutile censetur. Quæ igitur recensuit, particulatim contemplemur, atque ante omnia quod primo est dictum. In acutis mor-

bis, quæ æstate & autumno sit repentina sanguinis distillatio, robur, & multum in uenis inflammationem indicat. Melius siquidem erat quod robur uenas curatione egere indicaret pronuciare. Nouimus enim quod sanguinis è naribus stillationes malum semper quippiam esse ait, propterea quod natura quidem concupiat quod superfluum est excernere, sed ob propriam imbecillitatem ne queat, uel sanguinis crassiciem, uel partium densitatem, uel quædam ex his, uel propter omnium concursum. Cum autem malum semper hoc signum sit, magisq; quod primis tum æstate, tum autumni temporibus uirtutem ipsius intendi contingit, (nempe in eis diebus flaua redundat bilis, ambiensq; nos aer calidus est: quo fit ut sanguinem utranq; ob causam, bene fluentem esse oporteat) magnitudo quædā causæ indicatur propter quam fluere inhibetur, quam robur esse ait, forte densitatem ita appellans. Quod porro ita affecti uenarum curatione egeant, nondum ostendit, prius quam astruat quam nam dicat curationem, nec tamen dixit. Prædictionem præterea primam dixit, quod scilicet postero die urina tenuis apparebit, non solo eo die de necessitate crudis apparentibus, uerum quoque & alijs præcedentibus. Conuulsionem quoque & desipientiam fore ait, sibilans ætate floruerit. Præterea & exercitati, & bone ipsius carnositatis meminit, & temperamenti. Nempē melancholicus, nomen est temperamenti. huc adde quod ex potatione eum manus habere tremulas ait: hæc sanē symptomata possunt inter se complicari permisceriq;, non tamen de necessitate, quibus magna ex parte succedent desipientia & conuulsio.

68 Etsi paribus quidem diebus superuenerint, melius in iudicatione autem perniciosum, nisi multus abunde effusus sanguis uiam redundantiæ fecerit, uel per nasres, uel per sedem, uel per abscessus, uel ad hypochondriorum dolores, uel ad testes, uel ad crura. Coctis autem his, uix patent sputis, urinæq; excernuntur crassæ, læues, & albæ.

Gemina est scriptio in hoc uerbo *επιτείνω*, id est superuenire, una quidem scripta per τ elementum tertia syllaba, altera per γ. Verū siue per priorē scriptiōnē ægros diebus paribus *επιτείνω*, id est intendi dixerit, siue secundum posteriorem prædicta symptomata diebus paribus, *επιτείνω*, id est superuenire affirmauerit, non continuo existit & melius. quanq; id dixit: Neq; enim si pares fuerint intueri oportet, sed si & iudicatorij. Nempe quartam quæ par est, & ipse ex ordine paulo ante maximam habere facultatem asseruit. Ceterum quod deinceps dicitur, uerum existit. Nam si sanguis multus, quouis modo id fiat, excretus fuerit salutis spem habet. Præterea & per abscessum ipsos & per commutationem seruari ait: abscessum

scellum quidē ferē sua peculiari appellatione declarans. Sed cōmurationē cū ait ad hypochondriorum dolores, uel ad testes, uel ad crura. Differūt autē inter se. *ἄποσις*, id est abscessus iudicationē infert, ægrumq; à molestiis omnibus liberat. *μυρίασις* autē, id est cōmutatio aliarum habet principium accessionum offensionumq;, ut & aliud exigat tempus ad cōctionem malī corporis locus, ad quem instantium humorū facta sit cōmutatio. Eam ob causam adiecit, Cōctis autē his permeationes sunt sputis, uel crassis urinis leuibus & albis. signa cōctę cōmurationis edocens ex cōctis, tum sputis tum urinis.

69 Febri singultuosaē aserpitij succū, oxy meli, daucum tritum propina, galbanūq; ex melle & cyminum in eclegmate, sorbens dumq; ptisanā cremorem dato. Talis autem euadere non potest, nisi sudores super uenerint iudicatorij, & somni æquales, urinæq; exierint crassæ & acres, aut in abscessum confirmetur morbus.

λύγας & *λύγας*, id est singultus appellare consueuerunt. Sunt autem motiones quædam stomachi cōuulsivæ, quas quidem fieri aiunt propter immoderatam, uel inanitionem, uel repletionem. Quæ si propter inanitionem fiant, ferē sanationem non recipiunt: si uero ob repletionem fuerint, ab ijs quæ infarcta secant absterguntq; sanant medicamentis. Quo cū numero sunt quæ hoc in loco scripta sunt. Videtur autem & nunc morbus is fieri propter acrimoniam stomachum mordentem, ut cum quipsiam pipēris plus uel simile quippiam deuorarit. Et sanē fuerunt ex febrienti bus qui in singultu rodentem acerrimumq; uomuerunt humorem, à quo tandem symptomate sunt liberati: uerum febris huiusmodi nequaquam singultuosa appellatur. Nempe ut singultuosa uocetur, permanere amplius debet singultus, uel etiam per totum morbum simul cum febre exacerbare. febre hanc per sudores iudicatorios, somnosq; æquales, uacuitasq; urinas, tum crassas, tum acres sanari ait, talibus quidem uel excretis, uel in abscessum confirmatis.

70 Cocalus, id est nux pinea & myrrha in eclegmate exhibeantur, bibantq; oxy-melitis per quam exiguum.

Scriptum quoq; inordinate hoc est. Commo dius siquidē fecisset, si paulo antea in ea orationis parte qua eos sanauit quibus tum thorax, tum pulmo per sputa expurgari debent, id scripsisset, & non febri singultuosaē adieciisset. Et sanē quod dicitur obscurum est & claritate destitutum. Nempe *ὡκυμνος* ab ipso dictus, non ita sed *ὡκυος* magis ab antiquis Græcis appellatur, ueluti à recentioribus medicis propæmodum omnibus *σπύβιλος*. Consueuit autem ex eo eclegma cōficere ubi maxime pinguis fuerit, id est ubi multā circūfusam habuerit quæ peculiaris sit resinam. Coquunt au-

Galen.

tem fructum hunc in aqua cum prasio recenti, mox decocto mellis exiguum miscuit, coquuntq; iterum donec mellis accipiat crassitudinem. quo ad hunc modum confecto medicamenta utimur ad thoracis pulmonisq; expuitiones. Quo autem modo & alia quædam medicamenta huic sapius immittunt, ita & authorem libri huius myrrham immittere uerisimile est, quod postea uelut compendio manifesta uit inquit: Cocalus & myrrha in eclegmate exhibeantur. Potest autem & ipsos qui eduntur cōnos cum myrrha exhibere, atq; huic fortasse mel non perperam medicamentum misceri intellexerimus. Sunt qui dictionem hanc ab ante scripta separant, seorsumq; scribunt, alij finem ante scriptæ principium huius efficiunt hoc pacto, Si autem abscessus confirmetur, cocalus & myrrha in eclegmate exhibeantur, ut morbis in abscessum confirmatis ea medicamentum esse intelligamus, quod à ratione alienū censet propter id quod ita infertur. Bibantq; oxy-melitis perquam exiguum. Nempe in singultuosa febre formidandum acetum præcipit ratio. In his uero quæ in abscessum cōfirmantur nequaquam. Eam ob causam sunt qui dictionem hanc quadantenus quidem antea scriptæ cōiungant copulēq;, sed quadantenus separant. atque adiecta cōmurationem autem, ita scribunt: Si autem in abscessum firmetur morbus, tanq; de singultuosa antedicta febre id dictum sit. uolente autore si in abscessum aliquādo firmari cōtigerit singultuosam febrem, cocalum cū myrrha exhibere, & copiosam oxy-melitis uitare potionem. Syllaba autē ultima uerbis huius *σπύβιλος*, id est firmetur, siue per *β* literā scribatur, siue per *φ*, nullam quæ in signis sit facit sermonis mutationem.

71 Quod si supra modū siticulosi fuerint, bibant aquam hordei.

Quod potum hunc tanquam sitim adimentem exhibeat, est manifestū. Sed melius fecisset si prius quonam pacto parare hordeum oporteat enunciasset. utrum ne simpliciter madefacere, uel ex eo zythum ut huius temporis homines, conficere, uel quouis alio parare modo.

72 In peripneumonijs & pleuritide ita considerare oportet, si febris acuta fuerit, si dolores lateris uel alterum, uel utrunq; infestent, & si æger in ea quæ sursum sit spiritus latione laboret, tussisq; adsint, et sputa educantur, rufa uel liuida, uel & tenuia & spumosa, & florida, & si quippiam aliud discrepans habeat ab his quæ illis fieri solent. Hunc sic degere oportet.

Pleuritidis peripneumoniæq; tum magna, tum effatu digna quidem omnia in legitima libri huius parte sunt definita distinctaq; sed quæ medicis omnibus parent, ea sunt prætermissa. Talia autem sunt quæ in præsentiarum ab authore scribuntur. Et primum quidem à ueteribus Empiricis appel-

tom. 6

H lata

lata syndrome, quam ueteres affectibus confiden-
tia symptomata appellabāt. si uidelicet febris acu-
ta, dolorq; lateris uel alterius uel utriusq; & potissi-
mū qui in expiratione fit. Nēpe id est, Et si aeger in
ea quæ sursum fit spiritus latrone labore. tussis ad-
sint, & sputa educant, rufa & liuida, & tenuia, &
spumosa, & florida, & quouis aliter modo præter
solutum euariantia. Nempe hoc significat in quies-
Et si quippiam aliud discrepans habeat: præter ea
omnia quæ in pleuriticis ac peripneumoniacis ap-
parere solent, ea quæ his contingunt, dicit. Hunc
sic degere oportet.

73 Si dolor sursum penetrauerit, uel clau-
culam, uel mammam, uel brachium, uenam
brachij internam secare oportet qua dolor
afficit parte.

Rursus & in presenti loco partis legitimæ sentē-
tiā elaborat. quoniam in ea prætermisum est, qd si-
mul cū dictis intelligit, adiicitq; illud uenam scili-
cet secandā recto à latere dolēte tramite: qd expo-
suit in quies, Venā brachij internā secare oportet
qua dolor afficit parte. sed manifesta usus breuita-
te, orationē negligentius percurrit. Nam uenā cu-
biti dicere debuit cū uenam brachij dixit.

74 Sanguinēq; auferes pro corporis ha-
bitu, anni tempore, ætate, & colore. ampli-
usq; non ueritus si dolor acutus fuerit, ad
animi usq; defectionem detrahet.

Rursus hoc in loco plus q̄ medicocriter scopos
detractionis sanguinis omnes recensere conatus,
quosdā silentio præterijt. Neq; enim uirtutis me-
minit, neq; sanguinis mutationis, nec uero regio-
nis, nec constitutionis aeris. Plus autē auferre atq; ad
animi usq; defectionē id audacter agere præcipi-
ens, deliquit sanē in dictione cū adiecit quam ob
causam audere cōueniat. Nempe q; dolor acutus
sit, plus quidem sanguinis uacuamus: sed fluere si-
nimus, nō quia acutus sit, sed ob alia: utpote si ui-
tus robusta fuerit, floruerit ætas, sanguis abunda-
uerit, & laborantis natura tum densior, tū durior,
atq; ægre magis perspirabilis, & sanguinis copio-
si fuerit, anni etiā tempus, & aeris constitutio
temperata. sic sanē & regio. Nempe quod ad ani-
mā usq; defectionē sanguinem auferre non uerea-
mur, nobis ex his accidit.

75 Clysterem postea exhibebis.

A sanguinis missione clysterem exhibere sub-
bet. Sed melius erat adiecis-
se distinctionem Hip-
pocraticam: si nō sponte probe deiecerit aluus.

76 Si dolor sub thorace fuerit, ualdeq; in-
festauerit, pleurítico uentrem medicamēto
subpurgabis, nihilq; dū purgabitur dabis.
à purgatione aut oxymeli: ueruntamē pur-
gans medicamentū quarto die ministrabis,
tribusq; primis diebus clysteres exhibebis:
quibus si nō leuetur, adhuc purgabis mo-
dum. Custodies deinde ægrū donec ad fe-
bris priuationē et septimū peruenit diē, qui

A si in tuto esse uideatur, in primis exigui te-
nuemq; cremorē, eumq; melle conditū da-
bis. si uero facile sputū educat, & facile spi-
ret, lateraq; nō doleāt, sensim crassiores co-
pioresq; & bis die ministrabis.

Pleuriticum nominauit, id quod ab Hippocra-
te in legitima libri huius parte est dictum: ubi ita
habentes pleuriticos purgat, facit autē id duobus
modis. Quarto uero diē medicamētū indistincte
pronunciauit. Neq; enim omnino aliquod reme-
diorum huiusmodi ægro iniungere oportet de-
sumpto à numero dierum scopo. Sed quod Hip-
pocrates recensuit, est exequendum. Nam uel ita
tū ab initio prius quā in partem aliquam con-
firmantur humores medicandum, uel postea cum
ad maturitatē perducti fuerint. Quam ob causam
& prima interdu die, & secunda, & quarta, & in-
terdu quinta medicamenta dedimus, & non in
quarta solum quomodo is dixit.

77 Quod si non facile liberetur, potionis
minus, sorbitionem exiguam, cremoremq;
tenuem, & semel exhibebis: atq; eo quo me-
lius degit tēpore, quod ex urinis deprehen-
des. Nēpe in istiusmodi morbis sorbitio
ante urinarum sputorumq; concoctionem
danda non est. Quod si purgatus multa de-
iecerit, dare oportet, minus tamen & tenui-
us. Non enim ob uacuationē dormire neq;
concoquere poterit similiter, neq; iudica-
tiones sustinere. Verum ubi crudorū collis-
quatio facta fuerit, & quæ renituntur reie-
cta, nihil obstat.

De particulari cibi exhibēdi tēpore agens Hip-
pocrates, & libri huius autor in ijs quæ supra scri-
pta sunt, eā quæ tū in thorace, tū in pedibus est ca-
lidità animaduertendā esse uoluerunt. Nēpe uri-
narū cōsideratio ad uniuersalē uictus formā, non
ad particularem cōmoda esse uidetur. Quo fit ut
non recte hoc in loco cremorē tenuē semel exhi-
bendum eo quo melius degit tēpore, deprehen-
dendumq; ex urinis. Nempe tametsi breuissimam
in particularibus accessionibus ad melius inclinā-
tionem urinae habuerint, tempus tamen huiusmo-
di nō usq; adeo prōtrahitur, ut has recondamus,
expectemusq; utrū nebulas uel sublimes uel sub-
sidentes habuerint. Hæc siquidē nō pauco sūt tē-
pore. Atqui in acutis morbis interdū ægri in decli-
nationis principio de necessitate sunt alendi.

78 Cocta autem sunt sputa, cum puri simi-
lia fuerint. Vrinae aut cum hypostases erui-
modo subrubras habuerint. Cæteris autē
laterum doloribus tepefactoria apponere,
& ceromata nihil uetat, cruraq; & lumbos
oleo calido inungere, & pinguedine illinire.
hypochondrijs quoq; ad usq; mammas ex
lini semine cataplasma imponere: ubi autē

peripneumonia ad statū peruenierit quādo non repurgantur, auxilium non habet. & mala est si laborās ægre spirauerit, fuerint que urinæ tenues, & acres, atq; si sudores circa ceruicem caputq; oriantur. Nempe sudores huiusmodi mali sunt, uincente obestum impetumq; et uiolentiam ægritudine nisi urinæ multæ et crassæ prodierint, & cōcocta exierint sputa. Vtrum autem ex his sponte euenerit, soluit morbum.

Neq; authorem hunc de coctis urinīs supra ad hunc scripsisse modum recorder, neq; Hippocratem aliter asserere, q̄ quod urinā optima sit, quæ sedimentū habet, tum album, tum leue, tum æquale. Ceterū quæ de peripneumonicis pleuriticisq; in orationis textura narrantur cōspicua sunt, tum ubi libri huius author ab Hippocratis recedit sententia, tum ubi maxime, uel prorsus, uel aliqua ex parte huic annuit & consentit.

79 Peripneumoniæ eclipton seu eclegma. Galbanum & nucleum pineum ex melle at tico dabis, uel abrotonum ex oxymelite. Pīper quoq; & nigrum elleborum ubi feruefeceris pleurítico etiā circa initia dolenti bi bēdū offeres. Quod si panacē ex oxymelite feruefactā percolatāq; propinaueris, bene facies. Proderit autē & hæc hepaticis, aut ex septi transuerſi dolore affectis, atq; his omnibus qui aut per aluum aut per urinas expelli desiderāt ex uīno & melle. Verū quæ uentri expurgando exhibiturus sis, ea cum mullā aquosa, & multa propinabis.

Medicamentum primum secundumq; sputa educunt. Sed quod ex elleboro nigro conficitur, uentrem subducit. Quod uero ex panace est, quibus nam utile sit recensuit.

80 Dysenteria quæ cessauit, abscessum aut tumore aliquem pariet, si non ad febres, aut sudores, & urinas crassas & albas ac ualde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad uaricē, aut ad testem, aut ad crura, aut ad coxam dolor decubuerit.

Sermo quoq; præfens sine definitione & distinctione est prolatus. quod neq; qualē dicat dysenteriam demonstrauerit, neq; quomodo quæ cessauerit, hæc inferat.

81 In biliosa febre morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus morbum soluit; si uero absq; rigore præter occasionē superuenerit, pestiferum.

Neq; procul dubio ante septimum diem cum rigore enatus morbus regius febrem soluit, neq; post septimum. Sed sane ita distinguere oportet. Febrientibus morbus regius superuenit, interdū

Galen.

A quidem tanquam affectionis hepatis symptoma. Interdum quoq; & natura bilem per cutim excernerē contendente, sed nequeunte. uelut in impetuosis humorum a loco ad locum illapsibus omnibus fieri cōsueuit. Verū in Aphorismis de huiusmodi morbis regijs est enunciatum.

82 Lumborū tetanus, atq; in melancholicis per uenas spiritū interceptiones cū fuerint, sanguinis detractione soluantur.

Cum inquit propter melancholicum sanguinem in uenis redundantem spiritū interceptiones fiunt, sanguinis missio soluit, si interceptionē dicit spirituum qui in arterijs sunt (nam & arterias, antiqui uenas appellabant) quamquam alia fuerit quam pulsus carētia priuatioq; Græcis *ἄσπυζία* dicitur: si uero eorum qui in pulmone sunt spirituum, interceptionem dicit, rursus & appellatam apnoeam quasi nō respirationem dixeris, obscure insinuat. Potest quoq; sanguinis tum copia, tum crassitudo non arterias modo inflare ut permeare non possit, uerum quoq; & propriē appellatas uenas.

83 Cum autem ob tendines uehementer in anteriore reuelluntur partem, sudoresq; circa ceruicem faciemq; oriuntur, morsis ob dolorem areſcentibusq; ijs qui ad *ὀψάσιον*, id est caudam uergunt tendinibus. Crassissimi hi spinā continuant, qua maximæ enatae copulae ad pedes usq; finiuntur. Is si neq; febris, neq; somnus superuenerint, fuerint que securæ coctionē habentes urinæ, sudoresq; iudicatorij, uinū creticū uinosum bibat, edatq; farinā coctā. Cerato quoq; perungat, & crura ad pedes usq; calida in pelui madefacta, superposito uelamine contendant, brachia itē ad digitos usq; inuoluantur. Spinā præterea à ceruice ad coxā usq; molli pelle quæ pinguedine et cera illita sit, uelabis, ita ut anteriora etiā cōplectat. Et interposito tēpore p utriculos calida aqua infusa fouebis, & linteo obuolues, & in cōclau cubare ægrū facies. Vetrē aut ipsū nō admodū solueris nisi balano, si longo iā tēpore se cōtinuerit, idq; si bene tibi processerit, satis est. Sin minus, mei radicem in uino odoro tritam & daucum mane ieiuno prius q̄ madefeceris propina. Post hæc cito farinam coctam tepidam uoret plurimam, uinumq; cum uoluerit bene temperatum superbibat: idq; si ad melius tibi pcesserit, satis est. si non, prædicere te oportet.

Sermo quoq; hic indistincte et indiscrete est prolatus, præter id q; & nomina quædā improprie scripta sunt. Nepe ob dolore morderi tendines improprie

tom. 6

H 2

prie

prie est dictū, uerbo hoc mordere acribus humo-
ribus & non doloribus quadrante: præterea & qđ
in principio dictiōis dicit, Vehemēter in antero-
rē reuellunt partē. Deinde ait: Arescētibus qui ad
ἐνδοχίον, i. caudā uergūt tendinibus, qui crassiores
spinā cōtinuant. Eos qui usq; ad caudā protēdunt
ita uocās. Appellāt aut̃ ἐνδοχίον osis sacri extremū.
Quod si partē utraq; tendi manifestare uoluerit,
atq; tū in anteriore, tū in posteriore tetanū inten-
dī, fieri sanē potest. quo modo paulo ante dixit,
Tetanus lūborū. Non tutō aut̃ morbi facilitatē ex
urinārū cōcoctione prænoscit. Nēpe tācti febris
cruditates per urinas manifeste iudicent, morbo-
rum tamē musculos infestātū, haudquāq; secura est
per urinas significatio, sed hoc quidē exiguū est.
Vinū aut̃ his indiscrete exhibere utrūne ob frigi-
ditatē passus eger fuerit, an aliā ob causā nō exigu-
um est delictū: imo petulās potius immodestūq;
Abstīnētē ratiōe dictū est uentrē soluendū nō esse
nisi balano. Nēpe in eiusmodi morbis cōmode in-
terdum soluit. Cætera dictiōis manifesta sunt.

84 Morbi omnes soluuntur uel per os,
uel per aluum, uel per uescicam, uel per aliā
quæ talis sit, partem, sudor autem morbis
omnibus est communis.

Sermo hic neq; uniuersalis est, neq; cōmuniter
inest omnibus, neq; enim per hæc solum morbi
soluuntur, uerum quoq; & per uterum, & per san-
guinis enaribus eruptionem.

85 Quibus à capite fluxio est, his ellebo-
rum dare oportet.

Elleborum dare omnibus quibus à capite flu-
xio est, non est necesse. Nempe interdū capiti soli
providere consueuimus.

86 Qui cūq; propter abscessum, uel phle-
borrhagiam, uel incontinentiam, uel aliam
quampiam fortem causam suppuratur: his
ne elleborū dederis, neq; etenim proderit.
& si quippiam afficiatur æger, fecisse id ui-
debitur elleborus. Si uero corpus dissolu-
atur, uel caput doleat, uel oppleatur aures,
uel nares, uel sputū, uel genuū grauitas affi-
ciat, uel corpus præter solitū tumeat: quod
cūq; horū cōtigerit, dabis. modo hæc neq;
ob potū fiant, neq; ob ueneres, neq; ob tri-
stitiā, neq; ob curas, neq; ob uigilias. Si e-
nim quippiā horum causam fecerit, ad id cu-
rationem dirigere oportet.

Phleborrhagiam, uenarū ruptiōē dicit. Quod
aut̃ neq; ex huiusmodi causā suppuratis, neq; ijs
qui ppter abscessum, neq; ob causam aliā, afficiūt
dare elleborū oportet, nemo ignorat. Sed qui ob
incontinentiā intēperantiāq; suppurant, perperā
in hoc recenserent catalogo. Intēperantia ipsa per
se intēperantes lædente, ut redundantia, cruditate,
crapula, uenere multa, uigilijs & quibuscūq; simili-
bus. Ceterū prædicens quibusinā elleborū exhibe-

re oportet, inquit: Si uero corpus dissoluatur. i. fra-
ctum admodū reddat, absq; scilicet manifesta cau-
sa, uel dolor in capite diuturnus & solutus difficilis
fuerit. Nēpe & id te subaudire oportet in capitis
dolorē, & deinceps in ijs quæ serie continuata di-
cuntur omnibus, oppletis scilicet auribus, naribus
& sputo. Adijcit & genuū grauitatē dolorēq;, &
corporis præter solitū tumorē. In omnibus liqui-
dē ijs quæ sine manifesta causā facta sunt, uult elle-
borum exhiberi. Diuertens aut̃ sermonē uniuersa-
lem ad particularia inquit: Modo neq; ob uene-
res, neq; ob curas, neq; ob uigilias dicta facta sint.
Si enim ex horum aliquo facta sint, pugnantū ad
uersus efficientē causam præcipit. Quam autē
ex his omnibus quæ recensuit, uere diligenterq;
dicta sint, & quæ non, didicistis tum in Hippocra-
tis libris, tum in commentarijs nostris.

87 Dolores ex itinere si fuerit, lateris, dor-
si, lūborū, & coxæ, et qui inter respirādū do-
lēt occasionē habētes. Sæpius em̃ dolores
ex crapula cibisq; inflātibus ad lumbos &
coxā uenire cōsueuerunt. Quibus talia fue-
rint, urinæ difficultas accedit. Horum iter
causa est, corizæ itēm & raucedinis.

Sine ordine hæc memorauit. Nā prædicēs dolo-
res ex itinere, laterū, dorſi, lumborū, & coxæ, rei in-
anis exhibitōnē repræsentationēq; fecit, perinde
atq; quonā modo hæc curenē esset dicturus. Dein
de facto ita additamento, Sæpius em̃ dolores ex
crapulis cibisq; inflantibus uenire cōsueuerūt. In-
tulit, Quib. talia fuerint, urinæ difficultas accedit.
Posthæc quoq; inquit: Horū iter causa est, corizæ
itēm et raucedinis: acephalū ut quispiā dixerit, id
est sine capite & uertice rei faciens sermonem.

88 Quæ ob uictus rationē eueniunt, mul-
ta quidē unusquisq; p nō afflueta uictus for-
ma maxime annotat. Nā qui prædere nō cō-
sueuerunt, & prāsi fuerint, his tumor uētris
ingēs accidit, dormitatio, & plenitudo: q; si
supercoenauerint, uēter turbabitur. hi à bal-
neo (cōfert em̃) dormiāt. expgefactiq; plu-
res lenta ambulatiōe absoluāt circuitus: et si
uentrē exonerauerint, coenēt, parumq; uini
sed meracioris bibāt. Si uentrē nō exonera-
uerint, corpus oleo calido perungāt. Et si si-
tuerint, uinū aquosum albū & dulce bibāt:
si uero nō obdormiāt, amplius quiescāt. Re-
liquus aut̃ talis instituat uictus, qualis ex
crapula laborātib. institui solet. Pocula a-
quosiora tarde meāt, ac ueluti in orbē agun-
tur, circaq; hypochondria innatāt, & nō de-
currūt ad urinas. Quib. qui repletus fuerit,
nullū celeriter ex his absoluet opus quæ in-
tentū corpus ui & celeritate cōficere pōt.
Maxime aut̃ quiescat donec cū cibis conco-

cta fuerit: Meraciora uero & austeriora pal-
pitationē in corpore atq; in capite pulsū
efficiūt. His bene fuerit si superdormiāt, ca-
lidūq; quippiā sorbeant ex ijs q̄ suauissima
habēt. Ieiuniū em̄ aduersus capitis dolorem
crapulāq; malum est. Qui semel tantū die ci-
bum adsumūt, imbecilli fiunt: & calidū min-
gunt, utpote præter cōsuetū uacuatī, os ip-
sis salūm efficitur, & amaricat, atq; in quo-
uis opere cōtemiscunt, tēpora cōtendunt,
coenāq; nō ita cōcoquere perinde atq; prā-
si fuissent, queunt. Minus igitur q̄ cōsueue-
runt bibāt, liquidiorēq; mazam panis loco
adsumant, atq; ex oleribus rumicē, uel mal-
uam, uel betas, & prīsanam. Dum aut cibantur,
uinū modice bibant, aquosiusq; atq; à
coena parū ambulent, donec excurrat uri-
na minxerintq;. Vtātur aut et piscib. coctis.

Totum hunc sermonem in legitima libri huius
parte abunde, tum elaboratum, tum explanatum
scimus: quo fit ut ex illis quæ modo dicantur simi-
li possis cum discernere, tum iudicare. Neq; mihi
diutius morari in his est necesse.

90 Cibi aut maxime notas et indicia faciūt

Eduliorū uim nō ex ratione aliqua sed experi-
entia iudicari conuenit. Neq; hic refert βρώματα
uel εσθια. i. cibos uel edulia dicere. Ceterū qui
hec scripsit, tale quippiā ostendit per hoc uerbum
ἐπιτομαίνεσθαι, id est notas & indicia facere. Nemp-
e nota corporibus signūq; fit (ut inquit) secundum
unamquamq; quæ ex cibis ualentibus fit mutatio
nem. Consequenter aut ea enumerat.

91 Allium flatum parit, caliditatemq; in
thorace, capitis item grauitatem facit, & an-
xietatem si & alius quispian dolor ex con-
suetudine ante infestauerit, ipsum irratat.
Cæterum urinas ciet, estq; hoc præditum
bono. eumq; qui potaturus sit et ebrius est,
uorare allium optimum est.

Si unumquodq; eduliorum experientia iudica-
dum sit, non recte dictum esse uidetur flatuosum
esse allium, neq; caliditatis maioris sensum quam
cepam comederitis inferre. neq; in ulla alia cor-
poris parte, neq; etiam in thorace, neque similiter
ἀνξία, id est anxietatem, & potissimum ubi quis
ipsum parum ante seruēfactum adsumperit. Edu-
liorum autem multa corpus si plethoricum fuerit
calfaciunt: cum uero ante uacuum fuerit, siccat
abunde. Peccauit igitur libri huius author qui in-
discrete rem enunciauit. Nam melius erat uti di-
ctum est definire. Impraesentiarum autē simplici-
ter de allio censuit, sed melius fecisset, si & exicca-
re & calfacere ipsum dixisset, et nō flatuosum esse.
Nempe aduersus indiscretum indistinctumq; fer-
re sententiam consuetudo non est. Subaudire aut

Galen.

oportet ubi tēpestiue datū fuerit, qd̄ parato ante
corpore manifestat. Ante aut paratū si neq; pletho-
ricū neq; cacochymū fuerit. Nō recte igitur capitis
grauitatē ab eo fieri ait. Nepe si prauacuato cor-
pore allū obtuleris, capitis grauitatē sanabis, par-
tisq; alterius omnis. Demiror aut quoniam pacto
quæ hucusq; percurrit præfatus, deinceps dixerit:
Eumq; qui potaturus sit, & ebrius est, uorare ip-
sum optimum est. Videtur autem ex his neq; cra-
pulam neq; ebrietatem efficere, sed ab his ita præ-
seruare ut & grauitatem expellere possit, & flatūs
sanare. Vera quidem hæc dixit, atq; adhuc ex cien-
tibus urinas unū esse allium. Sed alia falso adiecit,
simulq; & pugnantia inter se dixit.

92 Caseus flatum parit, atq; adstrictionē,
cibosq; accendit, & crudum quoque inco-
ctumq; existit, atq; ijs qui se potu repleue-
runt deterrimum est.

Caseus recens & mollis duro & sicco flatuosi-
or existit, minusq; quam durus siccusq; astringit,
id est uentrē sistit. Siccus etenim flatuosus minus
est, sed uetrem magis sistit. præterea & siticulosus
magis existit, quod ostendit cū inquit: Cibosq; ac-
cendit. Crudum aut & incoctum in dictionis ia-
cet medio, quod exacta enunciatione caret. O-
stendit autem qd̄ crudum omne incoctumq; in cor-
poris humoribus contractum ex huiusmodi edu-
lijs fieri natū est, cuiusmodi est caseus, crudum &
incoctum existens edulium. quasi ita diceret: Ca-
seus flatū parit atq; adstrictionē uentris: æstuosusq;
est. præterea & crudū & incoctile est edulium, ta-
lesq; succos generat. Ait præterea & deterrimum
esse ijs qui se potu repleuerunt, qd̄ & idiotis ipsis
pater. Neq; siquidē aliās bonū est edulium caseus,
utpote qui crassum succū & coctū difficilē pari-
at. Si uero inter bibendū eo quis utatur repletus,
deterrimū omniū eduliorum redditur. Grauat si-
quidem os uentris primumq; corrumpitur, & alia
deinceps secum corrumpit.

93 Legumina omnia flatuosa sunt, & cru-
da, & cocta, & fricta: minime autem uel ma-
cerata, uel uiridia. His autem utendum non
est nisi cum cibarijs. Sed horum singula su-
um uitium habent.

Ventrē implēt legumina omnia, coctūq; difficilē
ma sunt quæ cruda existūt. fricta flatuosa minus:
sed cōcoctioni nō minus renitunt. Quæ aut pluri-
mum cocta sunt, ea existūt moderatiora. Quod au-
tem sequitur in exemplaribus nonnullis scriptū est
ita, Et macerata, & uiridia, ut & talia præfatis uitijs
sint prædita. In q̄ plurimis uero non ita scriptū re-
peritur, sed principio altero in hunc modum: Mi-
nime aut uel macerata, uel uiridia. Viridia dicunt
quæ sicca non sunt, neq; exacte perfecta. Macerata
uero quæ in aqua fuerint madefacta. Cæterū le-
guminibus haudquaquē sine cibarijs utendum esse
præcepit. cibaria nimirum eos qui ex tritico panes
fiunt, affirmās: uel simpliciter omnia quæ quouis
modo parantur, uel forsitan & alia omnia ex qui-

tom. 6

H 3

bus

bus panes conficiunt: zeam scilicet, tīpham, & hor-
deum. rustici ex milio panes conficiunt.

94 Cicer flatum parit crudum frictūq;
& dolore.

Sunt qui cicer scribant ob id flatuosum esse q̃
pudenda intendat. Attamen quum in fine dictio-
nis dolorē dixerit, id ad eum referre oportet, qui
propter inflationem fit dolore.

95 Lens astringit, atq; turbationem facit,
si non detracto cortice ingeratur.

Vocem hanc *αψαθυ*, turbationem quādam &
ueluti pugna quē in uētre ex discrepantibus facul-
tate cibarijs oritur, significari dixit, quo modo &
nūc significat, si cū cortice adsumat utpote quā q̃
caro ipsius longe coctū difficilior existat.

96 Lupinus inter hæc minime mala habet
Vocabulum hoc *ἡλυσ*, id est minime, uocabu-
lo huic *μάλιστα*, id est maxime contrarium indicat.
Lupinum autem minime prædictorum omnium
ait habere mala.

97 Lasepitij tum caulis, tum succus non
nullis quidē maxime, inexpertis uero per
uentrem non descendit. Nominatur autem
hoc malum cholera arida.

Lasepitij radicem homines æqui uoce cum to-
ta herba uocare consueuerunt, hanc & herbæ suc-
cum inexpertis, id est inassuetis siccam generare
cholera ait. Sed quānam ea sit, post paulo ipse
docebit ita inquires: Ab arida cholera uēter infla-
tur, & strepitus insunt. Patet ego spiritum flatuo-
sum ex lasepitij ingestione colligi in uētre. est e-
nim acre & æstuosum. Quidnam autem significet
uocabulum hoc, Nonnullis, nihil ex dictione est
manifestum. Atque ob id explanaturus quispiam
quod maxime probabile uidebitur, id esse affir-
mabit. Nempe in talibus dicere quod ex ratione
est, incertum existit.

98 Maxime aut id fit, si cum multo caseo,
aut bubularū carniū edulio misceatur.

Siccam ab eo uocatam cholera ait maxime
his fieri qui lasepitium simul cum caseo mul-
tum ingesserunt, aut cum carne bubula. Nempe
flatu qui ex lasepitio oritur, cum opulentibus &
tarde penetrantibus edulij mistus manet in uen-
tre, & non descendit.

99 Bubulæ etenim carnes melancholica
proritant pathemata. Nempe harum natu-
ra insuperabilis est, nec quiuis uentriculus
eas concoquere potest.

Agebat quidem de lasepitij uirtute: sed bu-
bularum carniū esum supermiscuit, factūq; ad
Pathemata melancholica transitū, ea à bubulis car-
nibus proritari ait. Deinde uelut assignans cau-
sas hoc ait: Nempe harū natura insuperabilis est.
Vfus est igitur hac coniunctione, Nempe, eorum
modo qui dictorum causas referunt. Non tamen
curā bubulis carnisbus melancholica proritantur

A pathemata, causam dixit: quanquam aliam quam
piam communiorem dixerit, qua scilicet natura
ægre conficiatur, & ualida sit. Natura enim ea in-
superabilis est, quam nullus superauit.

100 At optime liberabūtur, qui coctis ue-
tentur & perquam uetustis.

Hæc quoq; sermonis textura uniuersaliorem
habet admonitionem nō in melancholicis. Nam
bubulis carnisbus & coctis & uetustis uti præstat:
sicuti & alijs omnibus quæ difficulter concoquun-
tur. At improprie uoce hac *βέλτισ*, id est optime,
est usus. Neq; enim melancholico laborātes mor-
bo, neq; homo alius quispiam, uel sanus uel æger,
optime liberatur bubulas carnes & coctas & ue-
tustas ingerens. Nam omnibus ipsas edentibus,
hæ non bonam præstant alimoniam; bene tamen
talia ingerentes cæteris minus læduntur. Si ergo
pro uoce hac *βέλτισ* dixeris *ὀυ ἡλυσ*, id est non
minime, sermonem reddes integrum.

101 Caprinæ carnes quæ in bubulis mala
sunt, omnia habent, & cruditatē. Suntq; fla-
tuosiores, ructusq; magis generant, & cho-
leram pariunt. Verum quæ odoratissimæ,
solidæ, & suauissimæ sunt, hæ optimæ sunt
tum coctæ, tum crudæ; quæ uero suauitate
omni carent, male olent, & duræ sunt, hæ
detrimentæ atq; non recentes.

Cur caprinæ carnes bubulis uitiosiores sint, cau-
sam hoc in loco dixit. Nempe cum coctū diffi-
ciles bubularum modo existant, flatuosiores etiam
sunt, & sæpius mouent ructus qui malam habe-
ant qualitatem. Cum uero bubulis & aciores &
calidiores sint, si incoctæ maneant, cholera pari-
unt. Qua efficitur ratione, ut frigidas eas magisq;
calidas esitare oporteat.

102 Optimæ autem æstate, autumno ue-
ro penitus illaudabiles.

Optimas esse ait caprinæ carnes, inter se qui-
dem non cum cæteris comparatas. oportebat igitur,
quantum ad anni tempus attinet, uitiosissi-
mas ob temperaturam esse. Contingit autem ca-
pris tempore æstiuo meliorem esse alimoniam.
quomodo praua sunt quæ herbas uorant anima-
lia, ubi uiridem herbam non habeant. Capris au-
tem maxime idoneam præbent alimoniam ger-
mina arborum caulesq; quos à fine ueris æstas lar-
giter & copiose habet. Quod autem alimoniam ad
carnis bonitatem plurimum possit, potes ex uul-
pibus certior fieri, qui autumno probatissimam
ob uuas habent carnem. Sic passer & ficedula ma-
xime laudabilem carnem obtinent. Autumno igitur
capræ nutrimento idoneo destitutæ, tum de-
terrīmæ, tum per quam tenuem habent carnem.
Hyeme autē meliorem sanguinis consequuntur
habitum, naturalem intemperiem à temperatura
temporis contractam corrigentes.

103 Porcelli carnes prauæ sunt, cū uel cru-
diusculæ uel ambustæ fuerint, Nempe tum
chole-

cholerae sunt & turbatoria. Suillae autem carnum omnium optimae sunt: ualentissimae uero quae non admodum neque pingues neque graciles sunt, nec uictimae ueteris aetatem sunt affecutae. Edendae uero sunt detracta pelle & frigidiusculae.

χοιρῶν proprie appellabatur ueteres porcum ualde paruum, ut apud poetam reperitur, ἔδην νῦν ὃν ἔβην τὰν ἀπὸ θυμῶτος· κέρπει χοίρε ἄτερ συνάλας γὰ οὐκ ἐμνήσθη. id est uescere nunc ob hospes. seruorum ciibus porcelli sunt. Proci etenim plus quam absolutos edunt fues. Non sane uideo quo pacto fyalos edere possint: (nam & fyalos ueteres appellabatur fues eos, qui perfectos absolutosque supra essent) nisi quod & ignarissimi essent dignoscendorum tum eorum quae facile concoquantur, tum suauium dulcorum, quales & sese ostendebant cum uetres caprarum pingui & sanguine plenos esitarēt. quod sane quod difficilius concoquat edulium reperies nullum. Caro autem optima tum ad suauitatem tum ad concoctionem eorum est qui media aetate sunt affecuti: ueluti deterrima est porci uetustissimi, atque eius qui coestimam a paru uorae porcelli. Nempe hi terrestrium ferē omnium quae uorant homines animalium, maxime humidam obtinent carnem. Atque ob eam rem cum nuper genitorum caro exuperanter humida sit, plurimam inde generat pituita: & si subcruda fuerit, multo adhuc magis. Simili quoque ratione pinguis sima suum carnem ea quam medij & bene carnosum habent, deterior existimat, suspitione humiditatis habens, ob quam pinguedo omnis carne sui generis deterior tum ad concoctionem tum nutritionem existit. Quae autem ob assationem ambustae sunt, tum ad succi bonitatem tum ad concoctionem sunt inhabiles, choleraeque parit propter eam quae his accidit acrimonia. Nepe ea cholerae eorum dulcorum communis est malitia, cum & humida & acris fuerint. Talia siquidem similiter corrumpuntur, suae acrimonia ualorem eorum quae ad uentrem decubunt, ora remordent: atque fluxionum earum quae ex toto corpore in eum fiunt, causae efficiuntur. Quod autem porcelli absque pelle, id est absque cute edendi sunt, nemo ignorat. Non enim cutis animalis carni similiter concoqui nata est, utpote quod frigidior existat. Frigidiusculos quoque & hos manifeste edendos praecipit, calidas omnes carnes ueritus, ac fortasse calidas frigidiusculis tum effusiores tum flatuosiores esse existimans. Ego autem in capitulis carnis & quaecumque calida sunt, sermonem admitto. In moderatis uero tum caliditate tum frigidityte, cuiusmodi suillae carnes sunt, simpliciter indiscrete ita dici non admitto. Nempe ei qui distinxerit, calidae frigidis idoneae magis erunt.

104 Ab arida cholera uenter inflatur, strepitus fiunt, & dolor tum laterum tum lumborum, nihilque alius deiecit, sed astringitur.

Cholera ab hominibus simpliciter appellata ab arida per humiditatem distinguit. In utraque autem nomine communis est usus: generationis modum qui communis est respiciens. Ut enim cholera

humida ex acribus oritur humoribus qui ex eorum corruptione prodierunt, sic arida ex spiritu flauo acris. Quo fit ut quae prope uentrem sint neruosa corpora mordeantur, intendanturque, & dolorem pariant. At cum spiritus hi possint interdum quidem retineri, interdum & exire, aridam propter retentos spiritus generari cholera afferre non possum. Nam probabilius fuerit, ita appellare quae penetrant egerunturque.

105 Ita affectum ne uomat seruato, uenterque subducatur. Clysterem ergo ex calido & perquam pingui adhibebis, perunctumque in aquam demittes calidam, & quamplurimam in scapha reclinans, & calida sensim perfundes: & si calfacto uenter subducitur, morbus solutus est.

Quamcitissime clysterem exhibere & uomitum prohibere praecpta sunt communia omnium quae in uentre praeter naturam continentur, & quae ut excernantur apprimere contendimus. Simili modo & calidum exhibere clysterem. prouocat siquidem calidum: & frigidum reprimat. Clyma autem pingue aridam proprie sanat: quoniam & uirtute contrarium est siccitatem nimirum humectans, morbumque leniens. Eundem habens scopum si in scapha fouedo tum aqua tum oleo & calfacis & mitigas solaris.

106 Confert quoque & huic dormire.

An eum dum in scapha fouetur dormire uelit, an sine illa, non constat. Quod autem ipsum dormire per se cruditatebus omnibus maximo remedio sit, consideranti patet.

107 Bibere item uinum tenue & uetus & meracius.

Vinum quidem exhibet ut concoctioni adiumento sit, sed tenue ut in uentre non moretur, uetus uero & meracius ut calfaciat magis. Vinum siquidem omne habitum calfacit, magisque quod uetus est.

108 Oleum quoque dabis ut quiescat & uenter subducatur, & soluitur morbus.

Oleum quae acris sunt lenit, placatque & siccitatem emendat, uentremque moderate subducit, quibus omnibus ei qui curatur est opus.

109 A cibis autem atque alijs abstineat.

Si corpori nihil desit, nullaque apponendi quippiam premat necessitas, & cruda quaedam concoctionis indiga contineantur, his requie est opus & non cibarijs prius quam contenta medicocriter concoquantur.

110 Verum si dolor non cessauerit, lac asinae bibendum donec purgetur dabis.

Si feceris quod dictum est & dolor non soluitur, contristantis causa maiorem esse acrimoniam existimandum, atque ob id corpus purgare oportet. Lacte asini utendum praecipit, quod purgantia inter medicamenta omnia mitius tranquilliusque existit: id quoque & lacte omni humidius est, & uentrem magis subducit.

112 Si uenter liquidus fuerit, bilisq̄ excernatur, uexetq̄ tormina, & uomitus, & suffocatio, quiescere his est optimum, nullam bibere, & uomere.

An de arida adhuc cholera agat, an per se hec intelligenda sint, nō satis cōstat. Sed quocumq̄ res erit, contineri in uētre uidet̄ bilis quæ acris & elui cōtumax sit. Ventrē aut̄ moderate subducere atq̄ quæ in uentre continēt concoquere molit̄. Subducetur autem mediocriter aqua multa: & per requiē concoctio fiet. Quia aut̄ in affectione. huiusmodi sæpius ualenter auxiliatur, is cacochyiam ualente medicamento affatim expurgat, uires cōtemplatus, agri habitū, anni tēpus, ætatē, & aeris constitutionē. Quod aut̄ in fine dictionis dicitur, nullam bibere & uomere, quali superiore uentrem expurgari autor uoluerit, melius cum aduerbio, non, dicitur. Nam multa detergendi pollens facultate, quæ corrupta sunt in naturālē præuertit usam, idq̄ citra oris uentris tum lationem tum periculum quæ per uomitum contrahi possunt.

113 Hydropū duæ sunt naturæ, quorū hypofarcidius si hominē aggreditur, uitari nō potest: alter ex flatibus constat, multaq̄ & bona indiget fortuna. Curaturq̄ tolerantiā, fotu, & tēperantiā. Sicca aut̄ & acria edat. Ita enim maxime tū minget, tū ualebit. Si difficulter spirauerit, fueritq̄ anni tempus æstiuū, & floruerit ætas, uiribusq̄ fuerit ualentibus, sanguinē à brachio tolles: deinde calidos panes ex uino nigro & oleo tinctos dabis, isq̄ quāminime bibat, et quāplurimū laboret, suillāq̄ edat carnosā ex aceto coctā, ut aduersus arduas resistat inambulationes.

Sunt quī nō hypofarcidiū: sed epifarcidiū scribant. Neq̄ tamē anasarca & catasarca alicubi scriptum reperi, quantq̄ recētiore ista nominēt. Cum autem hydropū naturas duas affirmauerit, atq̄ de posteriore flatu citra quoduis aliud symptoma dixerit, de priore aut̄ nihil omnino, nō solū in aliquo cōfusus uidetur, uerū quoq̄ & in hydropum differētijs falli apparet. Quidam ergo ex medicis quatuor hydropū differētijs esse affirmant, à iusto recedētes: aduersus quos uerba impræsentiarū facere tempestiuū non est: uerū qui hæc scripsit, manifeste defecit. Nempe hydropū unus humidi substantia tenuis copīa in tota inferiore thoracis regione acuat, quā aliquādo perpūgentes humidi modū euacuamus. Alter locū hunc nō aqua sed spiritū plenū habet, & ferē superiora omīa tumētia, hunc tympaniā appellat. Qui autē habitū totū pituitā plenū habet, cum hypofarcidiū nōnulli appellat. Quo fit ut nō exacte duas hydropū esse naturas dixerit. Neq̄ etiā recte protulit *ἐν ὑδροῦ γινώσκων*, id est si aggredis. Nam uerius dixisset ita scribens: Interficit aut̄ protinus posteaq̄ factus fuerit. Scripta est aut̄ ita dictio, sed perperā ab eo qui

A primū scripsit. Alterius sanē hydropum quæ ex flatu cōstare ait, sanationē scribit, quæ profecto hydropū omniū quod cōmune est, habet. Principio aut̄ scripsit tolerantia, fortū, & tēperantiā, calida & sicca gustare admonens, quod solius anasarca est, quem ut insanabilē prætermisit. Nempe hic solus cum incipit, eget interdum sanguinis detractio cū scilicet ex retentione uel hæmorrhoidis uel muliebrium uel ex quapiā quæ ita plethorica sit causa, inceperit. Tympaniā uero & ascitē nullus per sanguinis missionē sanare est ausus. In eo igit̄ qui sanguinis detractioe eget, fiat quæ subleues est curatio, quæ scilicet calfacit et siccatur. Sanē libri huius autor ad id quod expedit intētionē direxisse uidetur. Non tamē recte dixit, Si difficulter spirauerit, sanguinis eget detractioe, si nō propter plethoram hydropa incurrat, propē scilicet ad extinctionem accedēt naturali caliditate ut igni cōtingit. Nempe ut ignis propē extinguit̄ immisiss lignis tum humidis tum multis, nisi quis multitudinē sustulerit: sic & in frigidiorē ob copīa sanguine, ubi calor natiuus propē extinguit̄, præsentissimū est remedium sanguinis missio, quo tempore periculum ita prehenderit. Perperā itaq̄ dictioni apponitur, fueritq̄ anni tēpus æstiuū. Nempe plus minus auferendi sanguinis alia quædā scopi esse dicta sunt, sicuti & anni tēpus: auxilij uero huius, affectionis natura. Dioscorides nō æstiuū anni tempus scripsit, sed uernū, uirtutis exolutionem æstate ad futura suspicatus, hyeme uero affectioni perfrigerationē. Vulgariter autē et inepte admodum panes calidos ex uino nigro & oleo ei cui sanguis est detractus exhibet, scopū quidem uerū roborandæ uirtutis habens, ut exercitationū patientijs sufficere possit. Sed materiā scopo dignā nō inuenit. Vinū etenim nigrū, sanguinē plurimum generat, sed tantum ut & superfluous sit, & melancholicus fiat. Verū huic melius est uinum dare solum, tenue quidē substantia ut urinas moueat: sed non ætate nouū, quo modo sanē multis contingit. Vinorum etenim nouorū nullum est solum: sicut uel albu uel rubrum uel nigrū. uetustate autē sunt & fulua et flaua. Atq̄ quāminimū bibere & quāplurimū laborare rectissime est dictum. Nempe talis uiuēdi modus calfacit & siccatur. Suillæ carnes si quo dictum est modo edantur, florentibus ætate & ualidis dari possunt. Caterorum autē nullus eas probe coquere potest, utpote qui iam propē est ut caloris natui patiatur extinctionē. Melius ergo ita affectis dare quæ probe coquent.

114 Qui uentrē inferiorē calidum habet, subeuntq̄ acres deiectiones & inæquales, hi à colliquationē id patiuntur, qui si ualentes fuerint, reuelles elleboro albo: si non, cremorē tritici horni crassum frigidūq̄ dabis, & lenticulæ frefæ decoctum, panemq̄ subcinericium, & pisces febricitibus quidē elixos, nō febricitibus uero assos: uinū præterea haud quaq̄ febricitibus nigrum dabis. Alijs ue-

30 aqua aut a mēspilis, aut myrtis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut uitiū cenanthe.

Excrementa his ob inuersionē non ob colliqua-
tionē subire proprie magis dixisset. Nam colliqua-
tio in eo fit absūmpta cōstabeſcētiaq; propter febrē
morosam uel pinguedine uel molli carne. Inuētio
uero in uentre oriū propter acrē eorū quā ingesta
sunt caliditate, ob quā & febris cōtingit. Ellebo-
rū præterea huius albi exhibet, quod indicauit per
hoc uerbū *ἀνταρὰ* (anti), id est reuellere: nempe per
uentrē superiorē. Si uero æger quauis ex causa nō
possit elleborū adsumere, uiceritq; acrimonia, edu-
lia & pocula dare iubet tū astringētia tum perfri-
gerantia. Adijcit autē edulj & quæ assiccare pos-
sunt, ueluti panes subcinericios, atq; assos pisces.
His ita & nō sine ratioe enunciatis, quēmnā uentrē
inferiorē dicat, eū contēplandū. Veteres enim
thoracē interdū uentrē superiorē appellantes, ali-
mētū receptaculū omne quod a septo trāuerso est,
uentrē inferiorē nomināt. Interdū autē uentrē supe-
riorē appellantes in quē cibi adsumunt, quē ab eo
sunt omnia uentrē inferiorē uocitāt. Interdū quoq;
& sola quæ crassiora sunt intestina. Sunt qui col-
lon duntaxat uentrē inferiorē uocant. Forſan igit
quæsiuissimus quam nam uel quas nam ex prædi-
ctis particularibus probabilius impræsentiarū intelli-
gere sperabamus, si esset dignum quippiā perce-
ptū eramus. Sed quoniam horū inuētio nihil nos
admonet magis q̃ ea quæ ipsi & ſcimus & discerni-
mus, q̃ nōnulla quidē recte dicta sunt, nōnulla
uero nō, cognitionisq; curiositatē magis q̃ cōmo-
ditatē habet, melius est cito relinquere, & potissi-
mū cū huiusmodi lib. Hippocratis legitim⁹ nō sit.

115 Si uero febris non fuerit, uexentq; tor-
mina, primū quidē lactis asinini calidi pau-
xillū deinde sensim paulatimq; plus bibat,
& lini semē, & triticeā polentā & fabas Aeg-
gyptias, exēpto eo quod in ipsis amarū est,
molita ac trita inspergat. Aut oua semicon-
creta assata edat, & similia, & milium, &
chondrum ex lacte coctum. Cocta hæc &
refrigerata edat, atq; his similia tum pocu-
la, tum edulia ingerat.

Quæ plurimi exponentiū cōueniētius hæc cum
prædictis cōponunt, præsentē sermonē adhuc de
his qui calidū habēt uentrē inferiorē fieri existimā-
tes. Alij pauci q̃ separāt, & seorsum exponūt, sco-
pusq; his est ut interdū quidē caco-chymia expur-
gent, interdū uero & contēperant infrenētq;. Inter-
dumq; reficcēt, & interdum perfrigerēt. Lac er-
go asinini expurgare potest & contēperare. Lini
semen tū siccare, tū perfrigerare. Quæ autē ex triti-
co conficiunt polentā, contēperant, quibus non
perperā remiscunt hordeacea, utpote quæ siccēt
& perfrigerēt. Fabæ Aegyptiæ mediocriter perfri-
gerare possunt. Oua autē et similia & chōdrus, cras-
si sunt succi & boni, & humorum acrimonia infre-
nāt. Siccat autē in edulio mīlū quo perfrigerat mo-

do. Omnia hæc frigida exhibet, ppter humorū qui
affectum procreāt tū acrimonia, tum caliditatem.

116 Eius medicinæ partis quæ uictū me-
ditur, maximū est februm tum intētiōnes,
tū declinationes, nō in acutis modo: uerum
quoq; & in longis obseruare, ut tēpora qui-
bus cibi offerendi non sunt, & tuto, & qui-
bus offerēdi existūt, cognoscas, atq; adhuc
quādo plurimū ab intētiōne aberint.

Artis ciborū exhibendorū maximū esse ait par-
ticulari cibi porrigēdi tēpus nosse: scopūq; unum
ait, q̃ scilicet tēpus illud quo cibi exhiberi debet
quā plurimū ablit ab febris intētiōne, quam *ἐν τῇ
συν* dicit, accessiōis principiū intelligēs. Id autē nō
in diuturnis solū sed quoq; in acutis uerū esse uide-
tur. Sed quare lōgis in morbis adiecit? Nempe q̃
in his magis & forſan solis euident sit scopus. In a-
cutis etenim morbis deprehensa in pedibus cali-
ditas, cibi tēpestiue offerendi signum sufficiēs est.
Non tamen in longis ita nutriti oportet, sed me-
lior declinationis pars est expectanda, quod in a-
cutis haudquaq; est expectandū timore cito futu-
ræ accessiōis. Sunt qui dictionē hanc ita scribāt,
Eius medicinæ partis quæ uictū medet, maximū
est ut in acutis ita & in longis obseruare & scire
quādo cibū dare oporteat. Alij finem dictiōis ita
scribūt. Atq; adhuc cū plurimū a febris accessio-
ne aberūt scire oportet: ut præter cetera quæ nos
in ægro contēplari uoluit, & id admonēat. Quod
si quis perquirat, & nō particulari tēpestiue cibandi
inuentiōni copulat, id importunū esse de alimo-
nia præceptum atq; re nulla dignum uidetur.

117 Cognoscere autē & eos oportet qui ca-
pite dolēt uel ob exercitatiōes, uel cursum,
uel iter, uel uenatū, uel quēuis aliū importu-
num laborē, uel uenerea. Decolores itē, rau-
cos, lienosos, exāgues, spirituofos, sicce tus-
siētes, siticulosos, flatuosos, & uenarū inter-
ceptiōes. Huc adde quibus extēta sunt tum
hypochondria, tū dorsum, tū latera, torpen-
tes, obscure uidentes, eos quibus aurium
tinnitus est molestus, eos qui urinas non
continent, morbo laborantes regio, quorū
uenter cruda egerit, sanguinē ē naribus uel
sede uehementer profundentes, inflatos, &
quos uehēmēs dolor infestat. Nulli etenim
horum nisi superuicerint, medicamentum
exhibebis. Nam periculo ægrum expones,
nihilq; iuuabis: spontaneasq; tum permu-
tationes, tum iudicationes adimes.

Quod inordinate & preparationis ad cōmenta-
tionē modo omnia hoc in libro scripta sint, cuius
patere arbitror. Multa sanē ut dixi in hoc bene di-
cta sunt, ob quæ ad ea quæ dicta sunt, nō recte qui-
dam animo & studio incubuerūt, magisq; qui sibi
conscij fuerunt ueluti discretoria eorum quæ scri-
bunt.

buntur scientia carētes. Quæ ergo hac in dictione dicuntur, catalogū habēt eorum qui ut medicatio nem recipiant idonei nō sunt. καβαρεῖς αὐτῶν, id est purgari, & φαρμακιδίαι, id est medicamēto purgāte uti, idē significāt, uelut etiā φαρμακιδίαι & καβαρεῖς. Videamus ergo quibus nam ab initio purgationem interdīcat. Capite dolentes recēset, uel ob exercitationes, uel alium quemuis importunū laborē: summam eos intelligens qui ex intempestiuis laboribus capite dolent haudquā expurgādos. Labores autē intēpestiui importunūq; omnino sunt, quos præsens hoc tēpore corporis affectio ferre nō potest. Admonebo autē tete impræsentiarū rei quæ ad multa est utilis, quā semper in memoria haberi uelim. Corpore igitur nostro ad morbosam affectionē parato ita ut prope completa sit, externum quippiā obueniens eam affectionem manifestat, febrem uidelicet accendens: uel capitis dolorem, uel catarrhū, uel tussim excitans, uel aliud quod tale sit. Deinde ex eo continenter ad morbosam affectionis preparationem nō sine periculo languent: neq; cursū morbum excitante uel uehementi omnino motione, ut neq; intemperātia, uel perfrigeratiōe, uel alia quauis simili causa. Nihil etenim horū suapte natura, uehementem generare languorē potest. Nam si febris ab horū aliquo fiat, hæc ex diariarū genere erit: aut si symptomata aliquod aliud generet, id sapius paucodurabit intervallo. Et hoc sanē ut retuli propter corporis affectionem. unūquodq; enim horū nō morbi causa, sed πρόφασις, id est occasio est. Nam huiusmodi causas propriissime quis appellauerit πρόφασις, nō simpliciter euidentis & manifestas, ut hi sapius uocare cōsueuerūt, cum ab aliqua manifestarū causarū noxa in corpore euidentis fuerit. Si enim nulla alia corporis affectio adfuerit, neq; morbus effatur dignus subsequet, eiusq; quod in corpore fit detrimenti quod ipsum fecit, causa est. Sciueris itaq; hoc in loco de his agi quas quæ nō sua ratione corpori adferūt detrimentū. Summa autē horū est una quidē & prima labores qui ex parte multas species habent, cursus scilicet, luctus, pancreas, ueneria, fricatio, æstus, frigus, uigilia, ira, mœror, & timor. Venereorū quidē meminī, uerū cætera subtrixit, quanq; uirtute eadē prædita forēt. Nam quæ ut dictū est spiritū perturbāt, ea purgatione non egent, q; morbus huiusmodi a cacochymia cōtractus nō sit: ab his autē digestus indicij autor quos prius dixit declarauit. Proprie autem ἀχρόος, id est decolorēs, λευαίμοις, id est sanguine carētes uocāt: eosq; qui corpus aliter q; secundū naturā sit affectū habent λευοχρόος, id est malī coloris appellant. Hi ergo decolorēs calidiori expostulāt tum exercitationibus, tum uini facultate calidi potu, & cibis qui talem obtineāt facultatem. Raucos deinde subiungit. Nempe & horū humiditātē & frigiditātē ob delapsū ad summū guttur rheuma sanare cōuenit, exiccatis scilicet topicorū auxiliorū usu tum capite tum cæteris quæ adfecta sunt mēbris. Præterea & lienosos purgatione haudquāq; egere inquit, quod non recte di-

ctum arbitror, cum lienosis, si quibus alijs, purganda sint quæ nigra exsunt. Post lienosos meminī, λευαίμοις, id est eorū qui sanguinis inopiā habent, etiā nō aperte manifesteq; fuerint decolorēs. Deinde mentionē de spirituosis facit, sicce tussientibus, & siticulosis, obscure ita locutus ut nō cōstet utrum nē singuli horū seorsum intelligēdi uenīāt, an hi tres unā comprehendēdi. Neq; adhuc in singulis horum seorsum intelligēdis peripicius est sermo, ut & antea iam est enunciatū. Nempe πνευματώδεις, id est spirituosos sapius eos duntaxat uocant, qui cū inspirāt, aeris indigent. Interdū autē & inflatos, quorū uterq; multas habet causas, quas omnes si percurro, prolixior q; parit sermo est: futurus, præter id q; quidā ex his sanguinis missio nem exigere uident. alij purgationē, & remediū aliud alij. Sic & sicce tussientes nō affectione una fiunt, neq; siticulosi. Neq; etiā impræsentiarū certiores fieri possumus an nē de febrientibus siticulosis sermo sit, an de nō febrientibus, an de utriusq;. Quod si unius horū quod in Aphorismis recensetur, meminerimus, quod uniuersale est tollet. Dictum autē in Aphorismis, Si nō febriēt inappetentia fuerit, oris uētriculi morsus, tenebricola uertigo, & oris amaror, id per superiora purgatiōe indigere significat. Si autē os amaricat siticulosi sunt. Pari modo & quinā flatuosi ab ipso dicitur haud scio, an uidelicet cū uenarum interseptione flatuosi effecti intelligēdi sunt, cū sint nōnulli qui per selegāt. atq; adeo singula dīctiōis huius si possem transmutare, possem omnia quæ cognoscere uide sit nō citra librorū multitudinem docere: ueluti & de ijs quæ deinceps dicunt. Ait em, Quibus excreta sunt tū hypochondria tum dorsum tum latera, torpētes obscure uidētes, eos quibus aurī tinnitus est molestus, & qui urinas nō continēt. Nempe in singulis his pathematis & causis & affectionibus sunt multæ, uarijsq; egētēs curationib. Quarū profecto nō nulla eam quæ per bilis eductoriū medicamentū fiat, purgationē expostulabit. De his ergo omnibus, atq; adhuc de ijs quæ deinceps dicunt, nō enunciationes indistinctas, sed distinctiones doctrinasq; tū claras, tū longo rerū usu probatas habes in nostris tractationibus: quas qui intellexerit, omnia quæ ab autore hoc recitātur discernere ualebit. Atq; si partim meminerit quā & legitimā & cōmodā doctrinā plenā falsi sumus. In ea siquidem parte cū demōstrationē & explanationē cōgredientibusq; distinctionib. scripta sunt omnia. Sed quæ ita disseminata sunt ut præsens oratio, nihil iuuare possunt. Nēpe si quis nūc singula horū simpliciter & indistincte audierit, is multa aduersus artē perperā moliet. Quod si singula ut oportet distincterit, primū quidē nihil impræsentiarū ad eorū inuentionē iuuari deprehendē, deinde ad eā quæ de præsentibus sit cōtemplationē multis egere libris uidebit. Nec uero plerisq; hominū persuaderi potest ut aggrediant quidē sola ea scripta quæ manifesta sunt, ea autē relinquant his qui scripserūt quæ talia non sunt. Nam iustū hoc est, quū illi nullam curā adhibuerint, ut nos ea quæ ipsi scripserūt

intelligeremus: neq; nos adeo sedulo incumbere, quarentes ac diuinantes de his quæ dicunt.

118 Si cuipiam sanguinem auferre cõfert, uentrem cõfirmare oportet, & ita auferre, mox in ediam præcipere, & uinum tollere. Deinde congruenti uictu & fotibus humidis reliquam curationem absoluere.

Fluente aluo sanguinem non detrahes. Nam si post detractiõnem perseuerat fluor, uirtutem pro sternit. In ediam autẽ præcipere quibus detractus fuerit sanguis & uinum tollere recte dictum est, ut & congruo uti uictu: sed fotibus humidis curare si de omnibus quidem quibus sublatus fuerit sanguis dicatur id falsum est, si uero de aliquibus, dicere oportuit.

119 Si uero uenter densus astrictusq; tibi uideatur, mollem huic adhibe clysterem.

Dignum conscriptione quod omnibus pateat, hoc non est.

120 Quod si medicamentum opus sit, esseboro tute sursum expurga. Deorsum uero talium neminem.

Tanquã ægritudine prædixerit, in qua hæc fieri uet. Ieronem non facit. tamen si nihil prædixerit. Vel ergo exempta est quadã oratio in qua ostendebatur ægritudo, uel obliuiosus fuit qui hæc scripsit. uel talis qualis ab antiquis appellatur *uictu* 120, id est nondum fixo animo, sed suspensus.

121 Optimum autem est si urinae cieatur, sudores prouocentur, inambulent, & transquille ita sese perfricent, ut non densiorem reddant habitum. Quod si in lecto iacuerit, perfricent eum alij.

Scripsit quoque & hæc ita tanquam ægritudinem prædixerit.

122 Et si in thorace supra septum transuersum infestet affectio, resideat frequentius qui afficitur, minimèq; reclinent donec uires ualeant, sedentèq; calido multo diu defricent. Si uero dolor uentrem inferiorem sub septo transuerso infestat, iaceat is (conuenit enim) nulloq; pacto corpus moueatur, extra defriciõnem.

Oratione ex hac quis cõiecerit tum hæc tunc que ea præcedunt omnia, de doloribus scripta esse. Prætermissa igitur principio distinctionis sunt hæc, peccante primi libri huius scriptore & manente postea peccato. Quamobrè fieri non potest ut quispiam in his ueritate peruestiget, ne cui plus q; temere in huiusmodi tempus contere uideamur.

123 Quæ autẽ ex uentre inferiore soluuntur tunc per urinas, tum per sudores, si medio criter per se delabuntur, quæ parua sunt soluuntur, uehementia uero perniciofa sunt. Nempe tales uel intereunt, uel non sine ma-

lis alijs sanescunt. Nam eiusmodi incumbunt ac firmantur.

Per talem quoq; dictionem consicere licet de dolorum curatione omnia quæ ab ipso ante scripta sunt, dicta esse.

124 Poculũ hydropico. Cantharides tres abiectionis singularitum capite, tunc pedibus, tunc alis, in cyathis aquæ tribus terantur, atq; cum bibens doluerit, calida perfundatur, ungatur autẽ prius. Et ieiunus bibat, & panes calidos ex oleo uel pinguedine edat.

Quidam dictionis huius mentẽ haudquaquam intelligens audax medicus prædictas partes à cãtharidibus abiecit, deditq; hydropico corpora, cui cū à primo die abscessus in sura cõparuisset, post tres alios dies sectus est, effusaq; copiosa aqua, curatus esse uisus est, q; pars tumoris præter naturam plurimam statim ad modulationem redacta sit, ueruntamen non multis post diebus obiit. Quam ob causam medico quidam crimen ingessit perperã data esse cantharidum corpora iniquiens. Nempe propinanda ablatis corporibus, tum caput tunc pedes, tum alas, idq; esse quod in dictione enuncietur. Quare nõ cunctatus audax ille medicus hydropico alteri ita propinauit, moxq; facto similiter in femore abscessu, sectoq; multis post dieb. hominẽ mori contigit, quanquam urinarum prouocatio medicamento ex cantharidibus confecto quidam citra bibentium incommodum uisum fuit.

125 Sanguinem supprimẽtia quæ Græci *Χαμα* dicunt. Fici succũ lana susceptũ intus ad uenam appone. Vel coagulum in uolutum ad nares immitte. Vel chalcitidẽ digito ante tractam preme, cartilagineq; utrinq; foris cõprime, & uentrem lacte alinae cocto solue. caputq; rade, & perfrigerantia si calidũ anni tẽpus fuerit, adhibe. Sesamoides superiorẽ uentrẽ purgat dimidiã drachmã pondere in oxymelite tritũ & potui datum. Miscetur aut ueratrĩs ita ut tertiam efficiat partẽ. Nempe id hoc pacto minus suffocat. Ad trichosin. Filũ ubi acui foramẽ habenti subieceris, cellioremq; atq; acuminatam supra tensã palpebrã partem ad inferiorem usq; traieceris, quod superius est inferiori liga, fila autẽ extendens consue & colliga donec deciderint. Et si satis quidẽ fuerit, bene est, si nõ deficitq; aliquid, hæc repetite. Hæmorrhoidas modo simili transmittes. Nam acui crassissimum lanæ succidã filũ & quãmaximũ immittes ac colligabis, securior etem est huiusmodi curatio. Deinde comprimes, & contabescẽte uteris medicamẽto, neq; priusquã deciderit perfundes.

unamq; perpetuo relinques, & postea refectis uiribus purgabis elleboro. Exercitetur deinde, & sudet, & mane multum perfricetur. A cursu contineatur, & crapula, & ab acribus, excepto origano. Vomiat per dies septem interpositos, aut ter in mense. Nam hoc pacto optime corpus habebit. Vinum fuluum bibat, austerū, & aquosum, & paucum. Purulentis dissectos scyllæ orbiculos in aqua excoque, aquamq; ualde feruefactā effunde, aliāq; infunde & coque, ita ut tangent percocti & molles appareāt. Deinde ubi triueris, cymīnū frictū misce, sesamāq; alba, & recentes quæ tritæ sint amygdalas, atque ex melle eclegma facito, datoq;. Post hæc uinum bibat dulce, & peplum appellatum Meconium album, tritū acetabuli parui mensura, in aqua loturæ farinæ recentis dilutum ac coctū, melle affuso tepidum sorbeat. Sicq; diē transigat. Deinde ad ea quæ contingunt respiciens cenam dato. Fabarum item purarum quadrantem accipe, furculosq; rubiæ duodecim immisce, atq; excoque, & pingui addito delingenda porrige. Ad oculos. Spodium lotum abundanterq; uelut farinæ massam subactū non liquidum leue teres, acerbosq; uuæ acerbæ amaræq; succo humectabis, in sole desiccabis. humectare autem oportet ut ad illitionem commodum sit, cum autem siccū factū fuerit, læui, trito, & sicco perunge oculos, & angulos consperge. Ad eosdem. Ebeni drachmā, æris usti obolos ix. & croci obolos iij. in cote tere. quæ ubi triueris, uini dulcis cotulam atticā infunde. deinde soli expone, contege, atq; ubi coctu exaruerint, ipsis utere. Ad eorum dolores. Chalcitidis drachmā, uuæ expressæ partes duas, myrrhā crocumq; tere, mustum permisce. In sole excoque, & eo dolentes oculos perunge. sit autem in uase id æneo. Quonā pa-

cto uulua strangulatio cognoscatur. Digtis duobus comprime: si sentit, ea est: si nō, conuulsio est. Ad Hydropicos. Peplimeconij appellati acetabulum parū Atticum rotundum, potio una, squamæ æris specilla lota tria. Hæc leuiter trita, & cum farina receti agglutinata, ac in catapotia efformata, deglutienda dato. purgant aquā deorsum.

Aliud, quod stercora per aluū expellit. In caricas tithymalli succum instilla, in singulas septies. deinde in uas nouum compositas reconde, ac exhibe ante cibū. Aliud, Peplū quod & meconium appellatur, aqua affusa terito ac excolato, & farinam placentarum torrefactarum ammiscens, & mel coctum affundēs, hydropicis edendum dato: & uinum dulce aquosum, aut aquā mullā aquosam, insuper bibēdam. At meconium quod primum excrementum à pueris prodit, collectum recondito ac curato.

Liber hic ex his planè ostenditur cōmentarius esse uarijs mistisq; constans theorematibus, quod in eo incomposite inordinate quæ ab alijs in alia fiat transitus, quomodo & hic in ea quæ per nares fit sanguinis profusione scripta sunt auxilia. Nempe alia parti ipsi quæ sanguinem profundit exhibentur. Alia reuellunt, ut alui solutio. Alia caput adensant astringuntq;, ut perfrigerantia. Quæ deinceps sunt, omnia medicamentorum scriptiones habent, & quædam commissa auxilia. De appellato igitur sesamoide sermonem in primis facit. Mox pilorum in palpebris manualet operationē scribit, quam ἀναεργασμὸν appellant. Pari modo & hæmorrhoidon, alteriusq; earum sanationis meminit. Postea purulentorum tum medicamentorum sorbitiones scripsit. Atq; ab his compositiones eorum quæ ad oculos deputata sunt medicamentorum. Præterea de strangulationis uulua dignotione egit. Mox de meconio: Postea de aquæ eductorio medicamento. deinde de eo quod stercora expellit. Et demum hydericis de meconio & placentis exhibitis sunt autem eorū quæ serie continuata dicta sunt plurima quidem manifesta, alia nequaquam manifesta sunt, de quibus deinceps faciam sermonem.

CL. GALENI IN LIBRVM

HIPPOCRATIS QVI QVAE IN MEDI-

CATRINA FIUNT, INSCRIBITVR, COMMENTARIORVM
LIBER PRIMVS.

Ioanne Bernardo Feliciano interprete.

PROLOGVS.



EDICVM hunc librũ

Qua in medicatrĩna
fiũt, inscripsit, melius
tamẽ erat, si dixisset,
de ijs quã in Medica
trĩna fiunt, quẽadmo
dũ nõnulli, Dioclis,
necnõ Philotĩmi, &
Mantiẽ libros inscri
bitũ nam cũ hi quoq;
de eodem argumẽto

conscriperĩnt, in quibũsdã exẽplariis absolute
sine prepositiõẽ [de] & pronomine [ijs] hoc est,
quã in Medicatrĩna fiunt, in paucis cum preposi
tione & pronomine, id est de ijs quã in Medica
trĩna fiunt, inscriptio reperit. Sed illorũ libri plura
cõtinent documenta. hĩc vero Hippocratis, post
enumerationẽ eorum quã manuũ operationem
absolunt ac cõplent, De ligandĩ ratione pertra
ctat, idq; in primis exercendũ esse censet. Quã sa
nẽ exercitatio in lignis quoq; ad hominũ imitatio
nem formatis fieri, sin minus, in puerorũ certe cor
poribus non incõmode potest. Atq; hac quidem
anteq; ad singula particulatim exponenda ueneri
mus, a libro ipso coacti, diximus. Nunc ea dicam
quã nõ liber, sed illi a me exprimunt, qui exẽpla
ria scribenda transmutat, & quaslibet ueterũ auto
rum lectiones, prout ipsi uoluerint, facile admittere
cõsueuerunt. nõnulli enĩ sunt, qui ualde anti
qua exẽplaria uel trecentos iam annos descripta
hinc inde cõquisierĩnt, alia in mẽbranis, alia in ti
liã codicibus exarata, cuiusmodi apud nos Per
gamĩ reperimũ. Omnia igitur apud eos qui primi
explanauerunt, aduertere proposui, ut ex plerisq;
autoritatẽ dignissimis ueras lectiones ac germa
nas inuenirẽ, resq; mihi in hoc melius q; speraue
ram, celsit. nam omĩa ferẽ tam Hippocratis exem
plaria, q; explanatorũ cõmentaria inter se consen
tientiã offendi. ut eorũ audaciã nõ demirari fũ
mopere nõ potuerĩm, qui heri ac nudius tertius cõ
mentaria cõscribunt, omniũq; Hippocratis libro
rum peculiarẽ quandã editionẽ faciũt. inter quos
sunt Dioscorides etiã et Artemidorus qui Capito
appellatus est; qui circa ueteres lectiones multa in
nouarunt. Verum quia longã nimis orationẽ no
stram euasurã uidebam, si cõmemorare lectiones
omnes uoluissẽ, melius esse existimaui, ut uete
res tantũmodo ascriberẽ, paucis tamen quibũ
dam adiũctis, quã parũ uariarent. atq; ex ijs ipsis
illas præcipue, quã apud priores libri huius expla
natores comprobant. Veteres autem explanato
res quatuor sunt, duo qui in omnes Hippocratis

libros cõmẽtaria composuerunt, Zeuxis & He
raclides: duo qui non in omẽs, Bacchius & Ascle
piades. Ac de hĩs quidem satis. Sed quo clariũres
pateat, a principio breuiter perinde ac si nihil di
xerimus, repetemus. Liber hĩc Hippocratis qui
quã in Medicatrĩna fiunt, inscribitur, in principio
commune totius medicinã exordium cõtinet, ut
paulo post demonstrabimus. ac propterea nõ im
merito nõnulli eũ ante cãtera omnia legendũ
esse censuerũt, eam hinc doctrinã polliciti, quam
postea in ijs quã Introductiones inscripserunt,
quidam tradidere. Deinde post commune exor
dium de ijs quã in Medicatrĩna loco uidelicet ad
medicationem idoneo exerceri queunt, ea docet,
quã medicam artẽ discere incipientibus utilissi
ma sunt. atq; hoc ita se habere perspicies, si uerbo
rum ipsius Hippocratis explanationibus hĩce no
stris diligenter attenderis.

1 Similia an dissimilia sint, a principio in
spiciendum, ex maximis, ex facillimis, ex
ijs quã omnino quocunque modo cognos
cuntur.

Sĩre sanum esse, siue sanitatem, siue quĩdpiam
aliud huiusmodi medicã artis finẽ esse quĩpiam
dixerit, id per se ab ijs qui artẽ tractant, conside
ratur: perspicuum enĩ est contemplationẽ quan
dam esse, quam discere is debet, qui naturalem siue
dispositionem, siue dispensationem, siue consi
tutionem, siue aliud aliquid appellare libeat, cor
recturũ est. reliqua uero omnia huiusce artis non
per se uel discimus, uel docemus, uel omnino au
dimus, sed ob id quia unũquodq; eorum ad finem
ipsũm conducit, ac consert. ut exẽpli causa, discre
tiua artis pars, quam significatiua recentiores uo
cant, exercenda prius quã curatiua ab ijs est, qui
recte medicinã sunt tractaturi, ut differentias mor
borum in ægrotis discernere exacte ualeat, ubi si
militudinem aliquam habuerint. nihil interit au
tem in præsentĩ hac tractatione, si dispositionem
contrariã naturali corporis nostri cõstitutioni ut
risq; nominibus appellauero, sicut Gracis omni
bus mos est. quĩmodo totum hoc genus morbũ,
modo passioem seu affectionem uocare consue
uerunt. Huius igitur discretiua partis, nõ secus ac
curatiua maxime generalis scopus ac finis nunc
traditur. sicut enĩ in illa contrariorum contraria
esse remedia discimus, qui communis totius cura
tionis est finis ac scopus: ita hĩc discretiue commu
nis maxime scopus est, posse discernere in quo
maxime ægotantum corpus sanorum corpori si
mile sit, quemadmodũ ipse Hippocrates in Præfa

gij tractat, Si ipse, inquit, sibi ipsi est similis aliquam in parte, optimū est. id quod etiā in libro De articulis declarauit, ubi uult ut membro corporis quod naturaliter sese habet, id quod affectū est, cōparemus. nō em̄ absolute illic cōparationem esse faciendam inquit, sed male affecti hominis dexteras partes sinistris cōferre iubet, neq; alienos articulos inspiciēdos, id est aliorum hominū monet. Idem nunc tibi faciendum censet, cum inquit, similia an dissimilia sint inspiciendū a principio est, ex maximis, ex facillimis, perinde ac si ita dixisset, egrotantiū corpora statim a principio dignoscere ac discernere debemus, in quo similia sanis ac ualentibus, in quo item dissimilia sint, si em̄ ita fecerimus, ex maximis facultate, cognitu uero facillimis morborū significationes sumemus. Sciēdum em̄ est, nō alia esse maxima, alia facillima, quippe cum ipsdem signis cōtingat, ut facultate maxima, dignotione facillima sint, ut ea sunt quae in Praefatione statim in principio ad hunc modū cōmemorat. nares acutae, oculi cōcaui, collapsa tempora, atq; huiusmodi cetera, quae deinceps enumerant. nam haec et maxima habere uim ad praefagiendū, nemo est qui nesciat, qui uel mediocriter in tractatione artis uersatus est, & facillimā dignotionē exhibere omnes etiā imperiti artis nō ignorāt. quippe cū statim ubi quis ad agrotū ingredit, nulla alia corporis pars prius cōtemplanda se offerat, q̄ facies, si igitur aeger sibi ipsi cōferatur, ut iussit, & certior dignotio habebitur, & ex maximis simul ac facillimis exordio facto artis ipsius negociū tractabitur. Sed errare fortasse aliquis in ijs posset, qui acutas nares, oculos cōcauos, collapsa tempora ex naturalis sua corporis cōformatione habet. quocirca si agrotantis corpus simile multorū hominū corpori inueniamus, certo dignoscemus nullo eum prauo morbo, aut praua affectione esse occupatū. sin, ita ut ab Hippocrate describit, inspexerimus, caetera uero in reliquo corpore signa fuerint salutaria, naturalem eam faciei dispositionem esse sperabimus; quoq; certior dignotio nostra efficiatur, hac de illos qui prius quam agrotaret, hominis habitum noscebant, percontabimur, siq; hi nobiscum consenserint, tunc demū certiozem praenotionem habebimus; nō tamen ita certam, ut si nos ipsi agrotantem prius cognouissemus, consuetudineq; eius usi essemus, nam si eum saepe sanū inspexerimus qui tunc prater naturam affectus est, fiet, ut quanta sit differentia signorum quae in eo sunt, melius perspiciamus. licet em̄ audiuerimus ab alijs, consijctamusq; agrotantem natura & nares acutas habere, & oculos cōcauos; id tamē solus ille ita scit, qui uersari cum eo consueuit: si modo hoc cognoscere medicis necessariū est. nō em̄ tantum utile nobis est, si prater naturam esse affectum corpus nouerimus, sed etiā quanto acutiores nares sint, scire oportet, quanto cauiore oculi, quanto item magis collapsa tempora, quam naturaliter soleant, & unumquodq; aliud, ut inquit, nō absolute graue est, sed quod simili maxime est cōtrarium, id grauissimū est. maxime cōtrarium

A quod uidelicet à naturali cōstitutione plurimum recessit, grauissimū, nō absolute graue periculum indicare asserens, quatenus & magis & minus id significatur. quae ex facie igitur apparent signa, & cognitu facillima sunt, & uim maximam habent, quae tum in principio statim dixit, tum de oculis deinceps commemorat. nō pauca uero ex ijs quae in praefatione recenset, alia non maxima, alia non facillima, alia neq; maxima neq; facillima consideranti tibi uidebuntur. de quibus latius quidem in explanatione illius libri dictum à nobis est; pauca tamen nōnulla exempli causa etiam hic repetentur. Nam supinū iacere, manusq; & crura non secus ac resolutos iactare, non ex praua affectione interdum, sed ex mollitie nimioq; luxu agrotantis euenit: ut nisi mores quoq; eius nouerimus, erraturi simus. At ut omnīū quos inuicimus mores cognoscamus, fieri nō potest. quocirca uix in paucis aliquib; ipsa haec nō requirēda sunt. quippe cū non magnum quid significare interdum ipsa inueniamus, ut in cubatione: quandoq; maximū, ut in modestis, si aspectum audaciorē, uocemq; habeant. simili modo quoq; uox strepens, uel dolorem, uel delirū indicat in ijs qui id facere audientibus aliquibus uerētur. nam si praesentes non uereantur, nullius id erit nota. quare etiam hic agrotantis mores scire oportet. quēadmodum etiam consuetudinem eorum qui in uentrē dormire cōsueuerunt, & naturam eorum qui dormiendo aut dentibus strident, aut nō exacte oculis cōiungunt, ita ut palpebrae committantur. Huiusmodi enim omnia uel ab consuetudinem & natura agrotantis uel prauouerimus, uel ab aliquo qui praeuocrit, audiuerimus, dignotionem nobis asserere poterunt, & quandoq; bona, quādoq; mala denunciant. ac nigra quidem urina, uel nigrum sputū, uel nigra bilis inter initia morborum apparet, & uim maximam habet, & dignotionem facillimam affert. quēadmodum ecōtrario in acutis morbis ex facili spirare, & in urina subsidere album, laue, & quale, maximam uim ad salutem habere consueuit. Sed quoniam uisum iam de ijs quae ad dignotionem attinent, dictum à nobis est, in exemplū eorum quae & magnam habent uim, & cognitu facillima sunt, & omnino ac quocūq; modo cognoscuntur, siue experientia, siue ratione, non tamen tantam habent uim, tamq; facilem dignotionem, sed praecognitione, uel interrogatiōe ad agrotantum consuetudines, mores ac naturas percipiendas indiget, deinceps de ijs quae manu tractatione exercentur, nōnulla differemus, atq; euidentē causa exemplū proponemus, quod statim in principio libri de articulis scripsit Hippocrates, ubi de brachij luxationibus agit. In hoc enim & maximū & facillimū ad dignotionem inest, si rotundus tumor ac durus in ala apparet. fieri enim id non potest, nisi caput brachij ē iunctura sua excedit, in locumq; alae fuerit prolapsus, nam superhumeralis quam *ἐπ' αὐτῆς* appellant, sinus, tum luxationis brachij, tum auulsionis summi humeri qui alitius recessit, cōmune signum est. Quocirca si labo-

rantem partem sanæ cōparatis, atq; ubi uisum fuerit in suo naturali statu non consistere, brachium excidisse iudicaris, nota hæc non ita in ala magnâ statim uim, faciliemq; dignotionem habet. ac magis quoq; in ui deficit indicium, quod ex brachij motu sumitur, nam attollere brachium non potest homo etiam cum qui ibi sunt musculi uel contusi, uel iniecti, uel inflammati fuerint: quemadmodum etiam cum fibræ aliquæ ipsorum auulsæ in ima parte sunt. Ego sanè tale quid contigisse olim meminî, quod referā: Cum in summo humero auulsio cuidam prius accidisset, deinde alteri brachiū postea luxationem esset passum, in palæstra autē hoc evenit, medicus quidam utrorumq; brachiorum superhumerales similes conspīcatus, temere statim pronūciavit, percussum fuisse eo loci hominem asserens, ac propterea non immerito dolore afflicti: articulum uero absq; lēsiōne ulla esse. consultitq; ut in balneum quāam citissime profectus oleo multo uterē, in solioq; aqua pleno immoraretur. cumq; inde fuisset egressus, contēctā percussā parte lanis oleo tinctis ei parū cerę fuisset adiectum, cubaret, ac quiesceret. quod cum fecisset ille, tota nocte dolore vexatus est, atq; agitata. unde & eundem illum medicum, & nōnullos alios qui uidelicet absq; ratione & experientia uti in arte tractanda consueuerunt, conuocandos curauit. at ille qui priore die deceptus temere atq; inconsiderate articulum naturaliter sese habere iudicauerat, cum ad ægotantem peruenisset, uidissetq; ibi duos peiores medicos atq; ignobiliores, indignatus est, quasi fuisset contemptus. id tamen minime præ se ferēs, procacius adhuc ex indignatione in naturali sede esse articulationem asseuerauit, cum utriusq; brachij superhumerales simili modo sese habere nihilo minus inueniret. cūq; inflammatio quēdā percussū humeri existeret, iussit ut aqua multa calida locū foueret, oleūq; alsidue copiosum interfunderet, ac lanis rursus inuolutus, nō secus ac prius, quiesceret. sed quia ita etiam faciēdo nihil ex his opis consequēbatur, tertio die ego quoq; fui conuocatus. quo cum uenissem, & uidissem dolore carentem humerū excavationem superhumeralē habere q̄ ille qui affectū erat, ut pote cum aucta inflāmatio fuisset, diligenter eum qui naturaliter sese habere uidebatur, inspexi, atq; in eo aduertī summum eius sursum recessisse. quare motus, necnō quia nihil ex cōuenienti curatione inuari homo uidebatur, sub alam inflāmātū humeri iniectis digitis explorās, in ea ferē caput brachij eminere deprehēdi. ac certioris cognitionis causa ala alterius humeri inuestigata, nullaq; exturbatione huiusmodi ibi deprehēsa, luxatū esse brachiū dixi, medicosq; id ignorasse, propterea q̄ alterius brachij summū humerum fuisse auulsum nescientes, ei quasi in naturali statu esset constitutus, alterum percussum cōparabāt. faciliē id nos posse cognoscere aiebam, si ab ægrotō requireremus, an in summo alterius brachij humero icūm aliquem aliquando fuisset perpassus, at ille interrogatus principio quidem negabat, postea tamē,

Galen.

A cum ei succurrisset, confessus est se olim ē uehiculō delapsum ea parte fuisse contusum, ita tamē ut facile tribus aut quatuor diebus lana ex oleo supra percussione imposita conualuerit. Sed quorsum à me dicta hæc sunt? ut ostēdam scilicet quantum notæ quibus necessariarū affectionū cognitio acquiritur, dignitate inter se differant. cum enī non potest quis brachium affectum attollere, cōmune id etiam aliorum multorū indicium est. quippe cum sæpe fiat, ut tendones musculorum qui ea parte sunt, & ipsi etiam quandoq; musculi uel prædurati, uel inflammati, quin etiam contusi, aut in profunda sui parte scissi, aut fibras aliquas abruptas habentes, imbecillum ita brachium reddant, ut in sublimē attollī nequeat. ob hæc quoque non tam in hoc brachij motu quā in reliquis etiā indolēscunt. cōcauitas uero in superhumerali cōmunis etiam ipsa ad auulsionem significatio est. at tumor sub ala durus, ac rotundus satis superq; brachium luxatum esse denūciat: ut si soli ei fidem adhibeas, nunq; erraturus sis. quin facillimā etiā dignotionē asserit. quippe cū oporteat digitos sub alam tantummodo inijcere, & eminētiam contēctare, & cōfestim caput brachij ibi manifeste appareat. affectus autem musculorum: cum neq; attollere brachium quispiam potest, neq; sine dolore mouere, exercitata ratione multaq; cōsideratione indiget: unā tamen cum ijs quæ maximam habent uim, facillimaq; sunt cognitio, horum cognitio fit, siue experientia, siue ratione artem quispiā tractet. experimentarius enī qui utiq; experientia sola rem persequitur, inspicit eos qui ab ipsis concursus appellant, quæ sunt eorū quæ acciderunt collectiones: cumq; sæpe eadē uiderit una in occasione, omnia memoria tenet ac cōseruat. atq; ubi ex hac obseruatione multos cōcursus fuerit expertus, tūc quæ in multis cōcursibus, quæ item in uno tantū euenisse cognorit, diligēter aduertit. atq; ita demū in cōmuniū & propriorum cognitionem uenit. quam consequitur signorū in ui & efficacia diuer sitatis animaduersio. quod enim in multis cōcursibus fuit obseruatum, q̄ quod in paucis: quod in paucis, quā quod in duobus: quod in duobus, q̄ quod in uno tantū, maiorē uim habet. Verūtamen experimētarius medicus sicut propria ita cōmunia quoq; obseruat, ac memorat. nam ea unā cum proprijs utpote quæ cum illis eueniant, animaduertit. At ille qui ratioē signorū inuisuūq; morbi inuentionē indagat, multo magis ac citius cōmunia & propria cognoscit, non modo multo tempore, ut experimētarius, sed ne die quidē uno aut hora una expectata. ubi enim brachium e propria sede excidit, & in alā prolapsum esse aduertit, reliqua omnia etiā simul intelliget: primum tumorem ibi præter naturam esse appariturū, deinde sinuatum in superhumerali locum futurū, capite brachij quod in alam recessit, priuatum: tum scapulæ ceruicem cum superiecta brachio sit, esse cōturam ut non nisi agere attollī queat: nec non dolore uehēmētī infestandos musculos: quippe qui ubi mouere ita brachium conati fuerint, uiolē-

tom, 6

1 2 ter

ter distendantur: simili modo etiam euentum, ut
brachium deoleat, si admouere id ad costas quispiam
uelit. atque ita omnino ac quocumque modo non solum
ea quae maximas habent vires, sed etiam reliqua
omnia cognoscet. quippe cum una hac via omnia
reperiatur, quae altero modo non ex facillimis co-
gnitu, sed ex ostensione inueniuntur. caput igitur
brachij in ala deprehensum propitissimam habet
viuam. at musculorum affectio maiore quidem con-
sideratione indiget, sed tamen etiam ipsa, licet u-
trisque & facilitate dignotiois, & ui a tumore qui in
ala apparet, superetur, eadem cōtemplatione ab
artificibus medicis percipi consuevit. Merito er-
go Hippocrates iussit, ut morborum dignotiones,
quas recentiores *συμπτώσεις*, id est significationes
seu notationes appellant, ex similibus ac dissimi-
lium consideratione sumamus, ante alia artis ope-
ra: quae uidelicet & praecognitione & curatione
fiunt: merito itē & ex ijs quae ui maxima, & digno-
tioē facillima sunt: & praeter haec tertio loco ex il-
lis quoque quae omnino ac quocumque modo cogno-
scuntur, licet & dignitate & facilitate dignotionis
alijs sint inferiora. Posteaque uero hic ex quibus di-
gnotiones affectionum sumere oporteat praedi-
xit, id est ex similibus ijs quae naturaliter sese ha-
bent, & dissimilibus, qualiaque ea fuerint docuit: in
sequēte oratione ad ea nominatim declaranda de-
scendit, in hunc modum inueniens.

2 Quae & uidere, & tāgere, et audire licet.

Cum artis partē quae morbos discernit, primū
omnium exercendam esse censuerit ex ijs quae in
aegrotantis corpore sanis sunt similia uel dissimi-
lia, eaque esse dixerit partim maxima & facillima,
partim eiusmodi ut cum his necessario cognoscā-
tur: nunc quānam haec sint, ut dixi, docet, dum in-
quit. quae & uidere, & tangere, & audire licet. ui-
dere quidem, quae sunt uisibilia uidelicet: tāgere,
quae tactu: audire, quae auditu percipi queunt. nā
quod de facie in principio praefigiorum scriptum
est, uidere licet nares acutas, oculos concavos, tē-
pora collapsa: tāgere, aures frigidās: uidere simul
& tangere, faciei cutem, cum dura & arida, & di-
stenta est: audire, quae deinceps in eodē libro sub-
iungit, sternutamentū, tussim, flatum, strepitum,
cum praeter naturam aegrotus uocem emittit, quae
uel delirium, uel clangorem, aut rauedinem, aut
tale quippiam praese fert. in ijs uero quae ad chirur-
giam attinent, uidere licet ea quae nigrescunt, quae
rubescent, quae quocumque alio modo naturalē colo-
rem uel immutant, uel seruāt. praeterea sicut in hu-
meri articulo, sinū superhumeralis, & summi hu-
meri prominentiam uidere, caput uero brachij in
ala attrahere licet, aut audire possumus sonitus
qui de aegrotantis corpore contingunt, quem ad-
modum in cōfracto thorace cum spiritus ad uul-
nus efflatur.

3 Quae uisu & tactu, et auditu, & naribus, itē & lingua, & sententia possumus sentire.

Sensibus omnibus sententiam deinceps substi-
tuit, id est cogitationem & rationem, quam men-

tem, & intellectum communiter homines appel-
lare consueuerunt. Quoniam uero eorum quoque
quae uoce proferuntur, est quaedam ratio, distinguen-
tes philosophi antedictam hanc internam siue in-
tus affectam uocant, quae & consequentia & repu-
gnantia ijs quae cognoscuntur, & diuisio, & com-
positio, & resolutio, & demonstratio, & cetera hu-
iusmodi continentur. cur autem cum prius narium
& linguae sensuum mentionē nullam fecerit, cum
dixit, quae & uidere & tangere & audire licet, nūc
unā cum mente quinquē sensuum deinceps memi-
nerit, merito in quaestione uenit. quae de re multa
multi dixerunt, alij absurda & indigna quae com-
memorentur, alij digna, & satis probabilia. Dicunt
enim hinc exordio sumpto Hippocratem iubere
ut ex similitudine & dissimilitudine sensibilium di-
gnotionem affectionum & morborum sumamus,
sensibilia autē proprie quidem ea dici aiunt quae
nulla alia facultate indigent, ut discernantur, sed
sola sensus perceptione contenta sunt. sed impro-
prie sensibilia quoque eadem appellatione nuncu-
pare, quae non nisi a pluribus dignoscuntur, sensu ui-
delicet, & memoria, & ratioē ea quae tū composi-
tiua, tum in summā collectiua uocatur. colorē au-
tem ex ijs esse quae proprie sensibilia sunt, non se-
cus ac succū, & uaporem, & uocem, necnon duri-
tatem & mollitiem, caliditatemque & frigiditatem,
& ut summarim dicā, omnes tactu perceptibiles
qualitates. at neque malum, neque punitū, neque apium,
neque aliam aliquam substantiam totā sensu cogno-
sci posse affirmat, sed opinione, ut dicebat Plato,
cū sensu irrationali coniuncta. opinabilia uero om-
nia huiusmodi esse, ac propterea fieri saepe ut in-
dignotione ipsorum nonnulli decipiantur, cum uel
figurā tantū, uel utraque haec inspexerint similia ijs
quae antea profuerant. nam & mala & punica &
apia & uuas & nuces, aliosque multos huiusmodi
fructus ē cetera fictos priusque olfactu, & gustu, & ta-
ctu tententur; a ueris differre minime uidentur: ut qui
omnibus sensibus usum ipsorum superauerit falli
omnino nequeat. superare autem omnibus sensi-
bus quempiam non sine memoria & connumer-
atione posse. connumeratōē uero neque sensus ef-
fere, neque memoriae, sed sententiae, id est mentis asse-
runt. appellant autem connumeratōem non hoc
modo solum, uerum etiam connumeratōē seu in
summam collectiōem quae *συγκρίσις* dicitur.
inquit igitur Hippocratem, quando dixit
quae & uidere & tangere & audire licet, sensibi-
lium ipsorum loco exempli mentionem fecisse:
quando uero ab ijs recedēs quae simpliciter & pro-
prie sensibilia sunt, ad totas substantias transiit, me-
rito & omnes sensus commemorasse & unā cum
ipsis mentem quoque posuisse, ut tota ipsius oratio
huiusmodi sit. conuenit medicum morborum di-
gnotionē ab ipsa similitudine & dissimilitudine con-
templatione incipere, aliquando in simplicibus quali-
tatibus, aliquando in totis corporibus facta com-
paratione. atque haec quidem expositio non aliena
a ratione est. est tamen etiā altera quaedam huiusmo-
di. Hippocratem aiunt quando dixit quae & uide-
re &

re & tangere, & audire est, de medico, quando posita subiungit, quæ & visu & auditu & tactu & naribus & lingua, & sententiæ percipiuntur, de ægrotante intellexisse. ut nō modo ex ijs dignotionem habendam censeat, quæ ipse medicus uidet, & tangit, & audit, uerum etiā ex ijs quæ ægrotus uidet, audit, tangit, olfacit, & gustat. quæq; mente uel intelligit, uel delirat. nam ex mente ægrotantis si de lirar, aut minime, quandam medicum utilitatem ad dignotionem faciendam cōsequi perspicuum est. alij asserunt, uisu, tactu, auditu, naribus, & lingua ad ægrotantē, mente autē ad medicū referri de bere. quippe cum medicus ex ijs quæ uidet ægrotus, audit, tangit, olfacit, & gustat, non secus, atq; morbo, mente ad cōfecturā faciendam de ægrotante ratiocinetur. nam si omnia ipsi ægrotō gustant amara uideantur, quemadmodū morbo regio laborantibus usu uenit, flaua bile: si falsa, falsa pituita: si acida, acida imbuta ei lingua iudicabit. ita quoq; propriam sudoris, si forte in os defluxerit, qualitatem interdum percipere posse ægrotantē affirmant. Sed ijs qui hoc modo interpretātur, illud aduersatur, quod medici olfactus esse prætermissus uidetur, quo in multis uti consueuit. nam & in deiectionibus, & urinis, & sputis, ulceribus item, & ipso ægrotātis anhelitu persentiēdo ad significationē sumendā olfactu uti medicus solet. tamen si liceat dicere id à librarijs fuisse prætermis-
sum. quæ admodum alia multa in multis & Hippocratis & aliorum libris inueniuntur partim errata, partim prætermis-
sa. adde quod talem etiam expla-
nationem nōnulli tradiderunt, ut dicant, nō idem esse uidere, tangere, & audire, & visu, tactu, & auditu sentire. quippe cum uidere, tangere, & audire sine comprehensione possumus, sentire uero sine cōprehensione minime ualeamus. hac sensus expositio Simiæ Stoici est. atq; idcirco à Quinti di-
scipulo Iphitiano qui Stoicā philosophiam secta-
tur, admittitur. Quod isti dicūt huiusmodi est. Al-
teram partē aiunt huiusce orationis de genere so-
lorerū docere ex quibus significatiōes nostræ du-
cuntur. alterā quæ sequitur, de eo quod per se ex-
quisitū ac certum est. perinde ac si ita esset scriptū.
dignotiones faciendæ sunt ex similibus & dissimi-
libus ei quod naturaliter est constitutum, quæ in
ægrotantis corpore apparent. ea aut sunt sensibili-
lia. atq; ex his ipsis nō quæ aut hallucinatus est, aut
obaudivit, aut aliquo alio sensu perperam sensit,
sed quæ comprehensibiliter, ut ipsi dicunt, uno-
quoq; sensu necnon etiam sententiā, id est mente
sensit quispiā. menti enim hic uerbū sentiēdi attri-
buisse Hippocratem asserūt. unde in prima parte
huius orationis Hippocrates unus aut duorū etiā
mentionē fecit. totū siquidē ipsorum genus exem-
plo indicare uoluit. in secūda omnia unā cū men-
te cōmemorauit, certam atq; exquisitam enuncia-
tionem faciens. quippe cum omnibus his commu-
ne sit, ut comprehensibiliter obiectarum rerū spe-
cies expressas percipiant. Quoniam uero id quod
pollicitus fuerā, iam præstiti, commemorauiq; ea
quæ probabiliter à quibuscumque hanc in rem dicta

Galen,

A sunt, ut non sæpe Hippocrates dixisse de ijsdē ui-
deatur: meū quidē iam est ut ad sequentiā pertran-
seam: tum, ut quæ ex his commemoratis optima
opinio sit, consideres, etq; assentiare. De nomine
item sententiæ, id est *νόμος*, nōnulla addit, apud
ueteres afflens in significatio mentis, siue cogita-
tionis, siue intellectiōis accipi consueuisse. cuius
testimoniā cū multa sint, satis erit si pauca hic sub-
iunxero. Critias in primo Aphorismo hæc scribit.
Neq; quæ reliquo corpore sentiunt neq; quæ senten-
tia cognoscit. & item. Cognoscunt homines an sa-
nus sit aliquis sententiā, & in primo Congressio-
nū libro. Si ipse ita te exerceas, ut sententiā præ-
stares, minime ab ipso iniuria hac fuisses affectus.
& sæpe in eodem, & in secundo à sensibus ex ad-
uerso distinguere sententiā uidetur. quemadmo-
dum etiā Antipho in primo De ueritate, Qui hæc
cognoscit neq; uisu uidet longitudinem, neq; qui
cognoscit longitudinē, sententiā eam non cogno-
scit. Item. Omnibus enim hominibus sententiā in
corporis sanitatem, & morbum, & cætera omnia
diffunditur. & Plato in quinto reipublicæ. Igitur,
inquit, huius cogitationē ut cognoscētis, senten-
tiā, ut opinantis, opinionē recte esse diceremus.
Lyfias etiam contra Polium. Ille enim in omni-
bus quæ sua ipsius sententiā usus pro nostra multi-
tudo egit, sicut multorum bonorum in causa fu-
isse ciuitati nostræ, ita plurimis in cōmodis & ma-
lis hostes affectisse conspicietur. Aeschines quoq;
Socraticus in eodem significato quo isti nomine
hoc usus est. Nec non Hyperides in oratione con-
tra Dioclem, & alij complures tum oratores, tum
medici, & Poetæ obseruasse idem uidentur: quos
omnes hic cōmemorare superuacaneum est.

4 Quæ quibus cognoscimus, omni- bus licet cognoscere.

Hic quoq; nō immerito in dubitationem uenit
quæ nā illic facultates præter sensum & men-
tē à natura nobis traditæ, quæ ad dignoscendum
idoneæ sint ea quæ extrinsecus obijciuntur. quasi
enim omnes complexus non sit, nūc ita subiun-
git, quæ quibus cognoscimus omnibus licet co-
gnoscere. cur igitur in hunc modum dictum hoc
esse existimē, iam explicabo: si prius necessarium
quoddā ad ea quæ dicēda sunt, proposuero, quod
à multis etiam ueteribus dictū iam est, quibus pla-
cet nullam esse opinionē, quā quiescas constitue-
runt, philosophi uideātur inuenisse: sed omnia illa
priori tempore iam dicta sæpe simul cum aliorum
memoria interijisse. quocirca ne putes Pyrrhoniā
sectam, aut Academicam, aut Stoicā, aut Peripa-
teticam, aut aliquā aliam post Hippocratem exti-
tisse, rerum ipsarum opinione inductus. ipsi enim
Pyrrhoni in antiquissimos uiros suam sectā refe-
rent. uerisimile igitur est Hippocratis tempestate
imō non esse uerisimile, sed necessarium, eos qui
tunc erant, inter se de naturalibus iudicādi facul-
tatibus altercari ac disceptare consueuisse. ut alij
sicut postea Pyrrhoni, nihil esse huiusmodi asse-
rerent, alij sensum solum talem esse statuerent: alij

tom. 6

I 3 sensu

sensu postposito uerum esse dicerent id quod circumfertur. Mens uidet, & mens audit, reliqua surda & caeca sunt; quidam item utraq; hanc naturaliter iudicandi uim habere affirmaret; ac sensu sensibilia, mēte & intellectu intelligibilia percipi posset: nonnulli prāter has alias quoq; esse animae nostrae facultates existimarent. ut igitur calumniam ipsorum euitet Hippocrates, duarum ipse facultatū in genere mentionem fecit, sensus & mētis: quas me etiam nostris solas semper ostendere diiudicatas cognitionum in nobis esse. captiosorum tamen & sophistarum causa postea adiunxit, quae quibus cognoscimus omnibus licet cognoscere, ac nonnulli quidem mentem alterius esse naturae opinātur, cogitationē alterius, alterius item eam, quae interna, atq; intus affecta ratio appellatur: atque harum plures facultates statuunt. sed à me in libris De communi ratione demonstratum est tres esse omnes in nobis facultates, quibus ad constitutiones & artium & librorum utimur, sensum utiq; mentem, & memoriam. ac memoriam quidem recondere ac seruare in se ea quae sensu & mente cognita fuerint, quasi cellam quandam & receptaculum eorum, non inuentricem. nam inuentricem & iudiciū quaesitarum rerum sensus ac mentis in nobis esse. Veruntamen cum de his ipsis oratio est, cōcedit unusquisq; aliam intellectiōis, aliam rationis, aliam item si ita uoluit, mentis & cogitationis esse facultatem. quippe cum satis ipsi sit, quod euidenter omnes homines & malū & mēsum & uiram & aliorum fructuū corpora dignoscunt, siue ea dignotio una, siue duabus, siue pluribus facultatibus efficiatur. simili modo persuasum omnes homines habent & motionem esse, & causam, & signū tum hae ipsa quae antedicta sunt, tum mentem & memoriam, & electionem. quae, sicut alia multa, quasi nō essent. Asclepiades subuertere conatus est. His ita expositis planum iam esse factum puto quae de causa Hippocrates hic licet satis superius rem explicasset, subiungendum censuerit, quae quibus cognoscimus omnibus licet cognoscere. auspiciari enim medicus opera artis ab affectuum dignotiōe debet, ea quae in aegrotante apparent, cum sanis cōparādo, & spectando quae illis similia, quae item dissimilia sint, cognitionemq; horum aliorumq; omnium sensu & mente percipere. & si quid aliud prāter hae de omnibus communiter uidetur posse iudicare, simili modo eo antedictas res discernere, quacūq; scilicet ratione cognoscere homines possumus. sensibilia em̄ significat dum inquit, quae & tangere & audire licet, horum autem iudicatricem duplicem facultatem, sensum uidelicet & mētem sequentibus uerbis declarat. cum ait quae & auditur, & naribus, & lingua &c. sentire est. quae quidem utraq; manifeste memoriae inseruiunt. quod si aliquam aliam introducit quispiam facultatem, eam nos non repudiamus, si re uera esse utilis conspiciatur. dicendo enim quibus cognoscimus omnibus licet cognoscere, & sententiam, id est mentem cōplexus est, & copiam fecit ijs qui esse quandam aliam iudican-

di facultatem opinantur, eam nobis ut ostendant. Quae autē hucusq; ab Hippocrate hoc in libro scripta sunt, medicae materiae communia sunt, ac propterea uicem exordij ad totam artem obtinere ea dixi. quae uero sequuntur, iam ad manuum operam, eamq; chirurgiam pertinent, quae in Medicatrina uel discere uel tractare illi possunt, qui in arte exercentur. Sed ne existimet quispiam me prāter meam consuetudinem expositionem hanc longius protraxisse, is sciat, quaecūq; res ad totam artem communes sunt, eas prolixius tractari debere, q̄ quae parati alicui conueniunt: & praesertim cum de eis aliquo in libro quispiam ita dicat, ut non amplius sit mentionem facturum. quemadmodum ego in librorum Hippocratis explanatione facere proposui: ut & omnia sensu & mente discernam, & quae dicta à me modo sunt, amplius non repetam. Adde quod neq; pro dignitate rei produxi orationē. nam cū potuissem cōmemorare & in iudiciū uocare dissentionē quae de numero animae facultatū existit, melius esse duxi ad eum qui de cōmuni ratione scriptus est tractatum relegare eum, qui de his cognoscere accuratius uellet. prāterea cū alia questio incideret, dum dicebatur à similibus & dissimilibus cōtemplatione esse incipiendum, utrū quia non omnino quispiam in omnibus distinctū atq; absolutū reperiebat, idem differret à simili, spōte hoc alibi explicatū hic praetermisi. nā in eam cōsiderationem hoc quoq; incidebat. Illud etiā omisissum à me fuit, utrum ex ijsdem an ex similibus obseruationes ab experimentarijs fierent. nonnulli enim ex ipsis etiā experimentarijs ex similibus asserunt. alij qui diligentiores sunt, totius suae institutionis conuenientiam seruantes omnes suas obseruationes ex ijsdem fieri aiunt, tam quae morborum dignotiae, q̄ quae praecognituae, aut curatiuae appellantur. nam Dionem phrenesi laborantē eundem esse dicunt cū Theone; phrenesi eadem affectū in eo utiq; utriq; phrenesi laborant. alij sunt qui simile absolute dici negēt, sed duobus modis & dici & intelligi asseuerent: uno, cū simile id intelligit quod nullo modo uariat. ut gemini Iouis filij in omnibus prorsus similes; altero, cū aliquid alicui magis uel minus accedit. apud antiquissimos tamen & medicos & philosophos, quorū adhuc scripta extāt, talis usus similitudinis nō reperitur: quippe qui cōfuse & indistincte similitum appellationē usurpare consueuerint: aliās de ijsdem quae formae inter se nullā habent diuersitatem, ut si nistrū oculū dextro simili esse dicant, cum utriq; in uno & eodem homine cōsiderantur: aliās in diuersis etiā hominibus siue caesus, siue fuluus, siue niger sit. quatenus em̄ oculi sunt, eatenus similes esse eos dicunt. licet magis usitatum sit fuluū fuluo, caesium casio esse similem asserere. quemadmodum etiam nasum aduncum adunico, simū simo, rectum recto esse similem dicere consueuimus.

5 Quae autem manuum operam spectat, ex medicatrina.

Tales breues loquutiones manifeste dedita opera ab

ra ab ijs fieri videntur, qui enunciare obscure aliquid volunt. ubi enim unus aut duorum aut ad summum trium nominum aut verborum adfectione clara reddi tota oratio potest, quo pacto obscuritatem non fuisse affectatam dicendum est: ego igitur formam loquutionis referam qua quis usus hoc planius atq; evidentiùs exposuisset, quæ huiusmodi est. medicina omnis communem habet scopum ac finem ad affectiones, agrotationesq; dignoscendas, similitudinem ac dissimilitudinem quam cum sanis habent, ex ijs quæ evidenter sensui et intellectui apparent inventionē comparans ac iudicium. Ego autem ea tantum dicam quæ ad manuum operam spectant, quæ in medicina & ostendi discitibus, & in affectis exerceri possunt. in hunc modum fere dixisset, qui apterem enunciare voluisset, nonnulli autem sensibunt medicatrinam hic, id est *ιατρειαν* in ultima syllaba per *κ*, ut sit *ιατρικη*, id est ex medicina, seu ex medica ratione, non ex loco ad exercendas huiusmodi medicationes idoneo, quem *ιατρειον*, hoc est medicatrinam vocamus. ac si ita dixisset. quæ vero ad chirurgiam attinent, quæ ex arte medica fiunt, sunt hæc. deinceps tamē videtur libri huius author siue ipse Hippocrates fuerit, siue filius ipsius Thessalus, neq; omnium operationum & chirurgiarum mentionem facere quæ ex medicina fiunt, neque omnium quæ in medicatrina exercentur, sed earum tantum modum, quæ discitibus & ijs qui introducuntur, utiles sunt, & tamen à medicatrina libri sumpta inscriptio est. quam postea Diocles, et Philotimus, & Mantias est imitatus. melius vero fuisset, ut dixi, si de ijs quæ in medicatrina tractantur, liber hic fuisset inscriptus. miror autem quod Alcibiades cum lectionem *ιστη ιατρειαν* servavit, eam idem significare existimaverit, quod in medicina. cum tamen *ιατρικη*, id est ex medicatione, *ιατρειον*, id est ex medicatrina id significet. nisi medicatrinam quod est *ιατρειον ιατρικη*, id est morborum medicationem interpretetur. Sed hæc ad verborum considerationem spectant, quæ non multi facere consueverunt, qui rerum veritati incumbunt. propositarum autem rerum doctrina ex sequenti lectione principium sumit.

8 Aegrotas, agēs, ministri, instrumenta, lumen, ubi, quo modo, quot, quo modo, quādo, corpus, cōmoda, tēpus, modus, locus.

Hac oratione omnia commemorat, à quibus & per quæ, & cū quibus pars operaria artis, id est chirurgica exercetur, atq; unumquodq; ordinate percenset, quale esse debeat, quoq; modo & tēpo rein usum deduci. quorum pleraq; aperta sunt ac clara. aegrotas enim, & agēs, & ministri, & instrumenta, & lumen nulla indigent in præsencia expositione, præsertim cum ipse etiam author de ipsis his insequentibus differat: doceatq; quo modo aegrotus exhibere se medico debeat: quo modo medicum circa ipsum operari: quo itē modo qui astant, ministrare oporteat. De instrumentis quoq; & lumine quæ cognoscēda nobis sint, tra-

dit. postea vero de deligatione longā producit orationem dicendi breuitate minime servata, qua in toto reliquo libro utitur. quanq; id fecit, ne quicq; quod utile esset, prætermitteret. quæcumq; igitur præter aegrotantem, & agentem, & ministros, & instrumenta, & lumen dicta hic sunt, inspicienda sunt, atq; exponenda. ac primum quoq; primo positum est ubi, quod græce *δου* dicit Ionico more pro *δπου*, π in κ verso, locum significat in quo quippiam collocatum est: quo circa de omnibus antepositis dictū id esse asserere non absurde possemus. nam & aegrotans loco idoneo indiget. uocantur autem aegrotantia ea de quibus est chirurgia. medico itē & ministris nihilominus quam aegrotanti loco est opus. instrumenta etiam convenientem locum requirunt. lumen quoq; quod artificiale est, ut hoc in loco efficiatur in nostra sitū est potestare. *δπως* autem quod subiungit pro *δπως* id est quomodo, tam apud Ionas quam alios qualitate quasi quandam rerum quæ traduntur, significat. non modo enim debent qui discunt artem, locum cognoscere, ubi uel cubans, sed sedens aegrotus operatione manuum curandus sit, verum etiam quo habitu, quaq; figura sit collocandus, aduertere. Idem de eo & qui operatur, & qui ministrat, intelligendum est. necnon de instrumentis, quæ non solum loco accommodato esse apposta, sed eo ordine præparata esse debent, ut & a medico, & à ministris capi facillime possint. hic commoda videtur prætermisisse, cum subintelligi cum instrumentis apte queant. de quibus quo pacto deinceps inordinate meminerit, paulo post videbimus. nunc quæ sequuntur explicemus. subiungit quot, quo modo, quæ utraq; ad unumquodque eorum quæ dicta iam sunt, referuntur. ea enim omnia quæ præparanda ad chirurgiam sunt cognosci discitibus debent. & quot sunt, & quomodo eis uti oporteat: ut quod paulo superius posuit quo modo post ubi in situ & collocatione: quod nunc dicit, in usu qualitatem significet. unde illud post ubi constitutum est, quod est loci adverbium: hoc, post quot relativum, quod operationes quasdam per instrumenta quasdam; accommoda videtur præ se ferre. Quod subiungit quando occasionem manifeste exprimit qua unaquaq; re utendum est. de ijs vero quæ postea addit in hunc modum, corpus, cōmoda, tēpus, modus, locus, merito queritur, quid sibi uelint. nam corpus affecti hominis ea parte significauit, ubi de egrotante meminit. tēpus item cum quando, modum cum quo modo, locum cum ubi dixit, manifestavit. cur igitur hæc adiunxit: ut non omittam q; commoda etiam hic præter ordinem interiecta sunt, cū melius uel cum instrumentis statui, uel si etiam omnino nihil de eis scriptum fuisset, à nobis unā cum instrumentis intelligi potuerint. sed de his illud responderi potest, scalpos, te-rebellas, hamos, rasoria, laminas, mēbranæ custodes, & cætera huiusmodi cōmodorū nomine hic ab eo non fuisse appellata, cū simul cū instrumentis utpote ipsis cognata intelligi à nobis satis que-

ant. sed ea tantum quæ ex domestico apparatu utilia ad curationem sunt. quemadmodum in libro De uictu in acutis morbis dixit, ubi de balneo agit. paucis enim in domibus inquit, comoda præparata habentur, & ministri idonei. alueos igitur, rotas, pelues, labra, & cætera id genus, *apud uic* hic, id est comoda uocari censendum est, quæ comoda ipsi qui curantur, & necessaria sunt. de reliquis quæ dicta hic sunt, restat absurditas. fortasse igitur hic corpus partem affectam uocauit: tempus uero id, quod ipsi est annexum. scire enim oportet in chirurgiis quota sit affectio quæ in curatione uenit. quippe cum ipse neque extendenda membra neque articulos reponendos tertio aut quarto post die moneat. potest etiam ipsius curationis operariæ tempus intelligi. eo quod nonnulla eiusmodi sunt, quibus manuum operam adhibere quam citissimam tentandum sit, cum uidelicet ex refrigeratione maximè impendat periculū. ut in ijs quorum uulnera consuenda sunt. nam si longiore mora trahatur curatio in magnitudinē doloris protinus incidunt. alia longioris temporis chirurgiā requirunt, ut suffusiones: in quibus opus est posteaquam fuerūt deductæ, aliquandiu eo loco inter punctoriā acum detinere, ubi manere eas cōpressas firmiter uolumus. modus autem hic de morbi creatione dictum uidet, ut quo modo fractio, aut articuli luxatio facta fuerit, cognoscendum esse doceat. quæadmodum in libro De uulneribus in capite modos refert quibus uulnera efficiuntur his uerbis. Os in capite tot modis uulneratur. & deinde horum autem modorum unius cuiusque plures formæ fracturæ in uulneratione euadunt. Item postea: cōtundi autem posset os in sua ipsius natura, sic ut nulla ossi fissura accederet. ac secundus iste modus est. tum deinceps ubi alium dixit, subiungit: ac tertius quidē hic est. & rursus: hic est quartus. postea: quintus hic modus est. Cæterum absurdissimum hic uidetur, quid loci rursus hic meminerit, cum superius ubi aduerbium quod locum significat, posuerit: hinc enim sit, ut nonnulli orationis huius aliam expositionem comminiscantur: diuersamque in super lectionem afferant. pro hoc enim *ὅς*, id est ubi. quod antedictū est, legunt: cum tamē et qui librum hunc explanarūt, & plerique ex experimentarijs lectionem priorem agnoscant. uerba ipsa clarioris euidentiae causa iterum repetam. ægrotans: agens. ministri. instrumenta. lumen. ubi. quo modo. quot. quo modo. quando. corpus. comoda. tempus. modus. ubi dicunt igitur Hippocratem cum dixit ubi in superiori parte horum uerborum absolute id accepisse, cum & corpori ægrotantis, & rebus commodis & necessarijs accommodari queat. comoda siquidem hic uocare ea quæ prius appellauit instrumenta, in fine uero corpori ægrotantis & cōmodis distincte illud attribuisse. quippe cum & ægrotantis corpus & commodæ ipsæ res & necessariae accommodato loco collocandæ sint. Sed si priorem lectionem sequamur & antedictam nostram explanationē, locus qui in calce huius ora-

tionis positus est de membro affecto corporis dictus esse intelligitur. medici enim sicut membra corporis, ita loca etiā appellare cōsueuerunt atque integri libri à nonnullis scripti sunt de locis affectis. Hucusque capita rerum demonstrandarū tantūmodo exposita sunt. doctrina ipsa cum sequenti lectione insitum sumet. Quocirca his quæ sequuntur attendendū diligēter tibi esse censeo. nam quod nō recte in his intellectum fuerit, non mediocriter in artibus operibus damnum afferet. si autē quæ hæcenus dicta sunt, non bene perceperimus, non magnam iacturam faciemus.

7 Agens uel sedens, uel stans congruenter ad se, ad id quod tractatur. ad lucem.

In superiori oratione catalogū ipsi de rebus factū esse dixi à quibus, & per quas, & cū quibus, & circa quas operationes manū adhibere necessariū est. à quibus, sunt & medicus, et ministri. per quas, instrumenta. cū quibus, lumen & locus. circa quas & totū corpus eius qui tractatur, & pars affecta. quarū singule eiusmodi esse debeant, & hic & in sequentibus docet, non seruato tamē ordine, quo prius eas enumerauit. ab ægrotante enim cum inceperit, de medico primum hic agit. id autē ueteribus omnibus consuetum est. à quibus innumera huiusmodi exēpla colligi possent. sed in presentia id satis erit quod à Poeta in Iliadis secundo innatum enumeratione ita dictum est.

Quis nam inter uirtute uiros fortissimus atque Inter equos fuerit, mihi tu Iouis inclyta proles Musa refer, qui sunt Atidarum arma secuti.

Hic cum prius uiros dixerit, deinde equos, nō prius uiros recenset, sed equos in hunc modum, Inter equos longe superabant uiribus omnes Admeti huiusque, quas tunc Eumelus agebat, Sicut aues uolucris penetrantes agmina cursu, Aetate inter se, atque æquo discrimine dorsi, Atque colore pares. quas olim pulcher Apollo Pieria in sacra pauid, fera bella mouentes.

Ast hominū Telamone satus fortissimus Ajax Omniū erat, quando iratus cedebat Achilles.

Alibi item cum dixisset.

Illic ploratus audiri & uota uiroꝝ, postea ad secundum prius respondens subiungit. Qui aut occidebant, aut sæua morte peribant. at in septimo Iliadis libro quasi dedita opera uellet ostendere talis loquutionis curā habendā non esse, cum oēs res ordine enumerasset, quod secundum dixerat primū resumit, deinde quintum aut quartum, postea tertium. Carmina autem ea sunt quæ in hunc modum exordiantur.

Illic Boeotus, longis & uestibus Ion, Locrenses, phthij, & præclaræ stirpis Epæi. De ordine igitur quo in oratione utitur, hæc nūc semel dicta sufficiant, ut nō amplius alibi audienda sibi esse censeat quispiam. quæ autē hic de agente ipso dicit, id est de operante medico, clara unicuique sunt, qui attendere uerbis his uelit. inquit enim siue sedentem, siue stantem eum qui operatur exercere chirurgiam debere, congrue & accommodate se habere

se habentem ad id quod tractat, & ad lucē. eam rationem ordinis quam modo diximus, etiā hic feruat. nam hanc ad unamquamque rem medicū cōgruitatem deinceps explicando, id quod ultimo loco dixerat primum resumit. quā est lux.

8 Ac lucis quidem duæ sunt species, communis altera, altera artificialis. communis in nobis nō est. in nobis est artificialis.

Despecierum quoque nomine si semel nunc audiveris, perpetuū id habere. mos ueteribus est, ut ea quæ ex diuisione generalium rerum euadunt, differant, species, & modos appellēt. Ita hic Hippocrates lucis duas esse species ait, perinde ac si differentias, ac modos duos esse dixisset. Alteram igitur lucem cōmunem esse dicit, quā omnes homines utimur, præcipue sub diō, secundo in domibus exercens, atque amplius, quā magnis fenestris atque ostijs copiosum lumen accipiunt. cuiusmodi nunc etiā plerisque in urbibus curantibus medicis dari conueuerunt. quas a medicatione quam in ipsis exercent, medicatrinās appellant. lumen autē artificiale etiā ipsum primum sit, cum lucernas, aut faces, aut funalia, aut tale quidpiam incendimus: secundo cum fenestras aperimus aut totas, aut ex parte, aut alijs clausis alias aperimus. ac de ostijs eadem ratio est.

9 Quarum utriusque duplices usus sunt uel ad lucem, uel sub lucem.

Utrisque ex speciebus splendoris & communis & artificialis duo usus sunt uel ad lucem uel sub lucem. ad lucem uocat, cum ad lumen aduersum fuerit quod inspicitur & curatur: sub lucem, cum ab ea parum declinat. ut in suffusionibus sit, atque omnino in oculorum affectibus, quippe cum neque dignoscere morbos eorum exacte, si ad lucem aduersus sit, qui ægrotat, neque curationem adhibere liceat. quo circa in his cauendum est, ne qui curari uult, ad lucem conuertatur, sed sub lucem, id est auersus à luce, aut oblique collocatus maneat. quod de oculis ipsis non de palpebris à medicū intellige. circa has enim operari possumus etiā si homo conuersus ad lucem sit. quem admodum in uesticariū aquosarum sublatione, aut illaqueatione pilorum aut sutione, aut demum ubi medico apertis palpebris opus non est. si tamē ulceratus admodum fuerit qui lippitudine laborat, habeatque eam quam uiam uocant, prorsus auersus à luce esse debet omni tempore, nisi cū medicamentū oculis medicus imponit. tūc em̄ absque luce inspicere medicus læsam partē nequit. sicut si aut unguē excidere, aut suffusionē deducere, aut tale quippiam operari uelit. nam tunc oblique ad lucem collocandus æger est: ut neque à fulgore lucis oculi pupilla feriat, neque medicus frustretur, quin spectare curandam partē ualeat. atque ille qui dem planē qui à luce auersus est neque ad lucē, neque sub lucem, sed à luce magis appellabitur. nec non qui obliquus ad lucem collocatus est. melior tamen Hippocrati uisa est hæc enuntiatio, quā si per lucem, aut ab luce dixisset.

10 Sub lucem & paruus usus, & aperta moderatio est.

Superius demonstratū est, nullum ex alijs morbis exceptis oculis tali chirurgia indigere. quā uero, ut dixi, fieri non potest ut auersus à luce penitus quispiam sit, qui curatur, in medio statu & ab auersione à luce, & ab aduersione ad lucem collo care hominem uult. non tamen æque in omnibus morbis auersum à luce esse cōuenit, sed quatenus ipse morbus requirit. qui enim ulcerati sunt et suppurati, & uia laborant, inflammationēque aliquam magnam, aut fluxionem acrem habent, paruam tiam fulgore ita percutiuntur, ut & doleant & fluxu statim infestentur. illi autem à fulgore minorem molestiam percipiunt, quorum aut suffusio interpungitur, aut unguis, aut tuberculum excidit, quod in uesticariis, id est in angularis appellatur. moderatio igitur quā illum, qui curatur, à lucis fulgore esse auersum oportet, tibi si duobus his artēderis, inuenietur. ut uidelicet medicus clarē in oculo id quod in operatione agit, inspiciat. & qui tractatur non uehementi aliquo dolore crucietur. nam uterque ex his scopos contrariam collocationem tibi præscribet, prout alter alteri præualere conspicietur. quod si neuter præualuerit, medium habitum & statim eliges eorum qui tum ad lucē prorsus aduersi, tum ab ea auersi penitus sunt. Ego tibi uiam exposui, quā si uteris moderatā conuersionem reperire facile poteris. Hippocrates uero ita dixit, existimans moderationem facile omnibus, si inuenire uoluerint, manifestam euasuram. nō enim in eruditos homines, ut nos nunc, sed admodum exercitatos in disciplinis docebat. qui ex consequentione eorū quæ prius fuerant demonstrata, talia ex sese excogitare non difficulter possent.

11 Quod ad lucē uero attinet, ex præsentibus, ex cōferentibus luminibus, ad claritatē cōuertere debemus id quod curare uolumus.

Ut quæcunque ait medicus in curatione ex manu in ægrotantis corpore diligenter inespiciat, in omnibus corporis partibus, exceptis oculis clarissima lux eligenda est. clarissima autem lux est in subdiali loco à sole illustrato, cum nulla res lumen eius impedit: sed interdum in diuerso rio eius qui curandus est, nihil huiusmodi reperitur. sæpe si reperitur, eō prodire non confert, cum per hyemē frigus, per æstatem calor infestet. quorum utriusque propria quadam læsio est. adde quod uenti quoque cauendi sunt. horum enim causa sæpenuero sit, ut nō modo in liberum aerem, uerum etiam ad ianuas, & fenestras quas uentus uehementior perflat, deducere ægrotum uitemus. nam sicut in illis cauendi uenti maxime sunt, in quibus neruos pati aliquid timemus, sic in putrescentibus sol euitandus, cū ad sanguinis eruptionem apti sint. recte igitur adiūxit ex præsentibus, ex conferentibus. non enim ex præsentibus luminibus claritas tantummodo est eligenda, sed illud insuper considerandum, an quod clarissimum est, ex conferentibus sit.

12 Præter ea quæ aut latere debent, aut A uidere turpe est.

Non clara locutione sententiam hic suâ explicauit autor, sed uidetur dicere partes agrotantium tractandas quæ aut latere debent, aut uidere turpe est, ad lucem non esse conuertendas, cum tamen non id uelit. nam ita postea subiungit.

13 Atq; ita quod tractatur aduersum ad lucem, qui tractat aduersum ei quod curatur, collocari oportet, sic ut ne obumbret.

Hoc enim modo tota sententia ab eo erat explicanda. Quod ad lucem uero attinet ex præsentibus ex conferentibus luminibus ad claritatem conuertere debemus id quod curare uolumus, ita quidem ut puram, & non adumbratam lucem usq; quaq; seruemus. sed in ijs quæ uel latere oportet, uel uidere turpe est, ita collocare se medicus debet, ut & alios omnes impediat, quo minus inspicere tractandas partes queant, & sibi nulla ex parte obubret. atq; hic totius huius orationis sensus est. sed fortasse quispiam clare audire cupit, quam obrem medicus eos qui circumstant, celare quipiam uelit. nonnulli sunt ex præsentibus quos exactas quasdam ex manu curationes docere fortasse non uult, cum digni non sint. domesticici ite aliqui & familiares ipsius agrotantis incidere interdum partes aliquas uenit, quæ eiusmodi indigent curatio ne. dolent enim atq; indignantur aduersus medicum, & carnificem uocant. cum tamen sæpe etiam alterum ex testibus putrefactum excidere prorsus ne cesse sit, & neruum per transuersum secare ne in cõuulsionem incidat agrotus. alij item ex uulgaribus hominibus puris copiam spectare non pariumtur. quidam ne permittunt quidem, ut quod pus continet corpus aperiat. quibus in rebus medicus dat operam, ut ipsi inscipientibus locum affectum fecerit, & pus totum educat, arque exprimat.

idem quandoq; ob laborantium timiditatem a nobis fit. quippe cum adeo timidi nonnulli sint ad huiusmodi curationes suscipiendas, ut priusquam facti fuerint, ex doloris expectatione animæ defectu collabantur. his quod probabile est, est dicendum: cras nos de curatiõe & chirurgia consideratos, in præsentia satis esse, si locus aut foueatur spongij, aut aqua perluatur, atq; ad emplastrum, aut medicamentum recipiendum præparetur. atq; ita inexpectato sectio homini adhibenda est. atq; in his quidem medicus inspectioni præsentium obstabit, ea causa ut lateat id quod agit. in alijs ob pudorem agroti locum curandum a conspectu auertat. quæ enim agrotat aliquando summopere curat, ne à plerisque uideatur, si in sede, aut pudendis morbus sit. hæc enim loca occultare consueuerunt. si fœmina sit, circa nates & pectus. circa uentrem etiam, ac multo magis circa pubem uerecundia causa conspectus uitandus. Sed quidam hic Hippocratem damnant, ridicule hæc dixisse eum asserens. quippe cum qui uideri nolunt, dum huiusmodi in partibus curantur, facile possint omnibus qui inter sunt, è cubiculo exclusis soli medico rem cõ-

mittere, uno solo aut duobus admisis, qui familiarissimi sint. at is planè nescit, neq; expertus est, & multos esse qui sicut inspicere morbos suos erubescunt, ita prohibere à conspectu nonnullos atq; amouere uereantur. & multos quoq; qui etiâ si prohibeantur, cõtendentes ac curiose agrotantis affectum nem scire affectantes cum familiares & amici sint, impudenter remanere uelint. Quapropter in huiusmodi occasionibus medicus, quod nullo negotio facere potest, obsequi agrotanti debet, & solus ipsum tractare, & nemine aduertente ita exercere chirurgiam ut plerofq; lateat. potest enim ut dixi cum uel aqua perfundit, uel spõgij fouet, quasi nihil operaturus sit, repente opus absolueret, dum aliud quid agunt, qui curiose inspecturi singula assitebant. atq; hæc quidẽ quæ in huiusmodi alterationem uenire possunt præter medicinæ contemplationes sunt, quæ tamen nos ex rei consequutione, imò propter calumniantium cõtadictionem coacti fuimus commemorare. Sed iam ad ea quæ sequuntur transeundum est.

14 Ita enim & qui agit, inspiciet, & quod tractatur, non inspicietur.

Hic quoq; integra loquutio huiusmodi esset. ita enim qui agit, inspicit partem quæ curat. ea aut pars ab alijs non inspicitur. non enim ad medicos utraq; spectant, ut & uideatur, & non uideatur.

15 Ad se autem ita, ut si sedeat, pedes in superiorẽ partẽ processioẽ directi ad genua sint, interuallo uero parum distent, genua autem inguinibus paulo superiora existant, ea distantia sit quæ idonea cubitis, tum positione, tum appositione.

Vbi conuenientiam quam ad lucem habere debet medicus explicauit, ad congruentiam quam ad seipsum seruare oportet, deuenit. cum enim superioris dixerit, Agens uel sedens uel stans congruenter ad se, ad id quod tractatur, ad lucem; deinde id quod ultimo loco posuerat, id est ad lucem declararit, & simul cum eo ad id quod tractatur quoq; necessario exposuerit: nunc conuenientiam perséquitur, quam ad sese habere medicus debet. ipsum autem ad seipsum conuenienter se habere in situ, simplex & quasi per articulos distinctum nihil potest, ita ut alias aliam collocationem uarijs in figuris obtineat. sed si inter se compositi partes ipsæ spectentur, ita admittere conuenientiam poterit. nam si quis uel sedens uel stans quam plurimum inter se mēbra abstrahat ac diducat, is incongruenter erit collocatus. quæadmodum si prorsus eadẽ cõtrahat, ut uel se mutuo tangant, uel alterum alteri superiectum sit. nec non si in longitudinem totum crus producat. aut non directe ad genu, sed longe retrorsum pedem teneat. Qua de causa memorio hic Hippocrates uniuscuiusq; ad seipsum conuenientiam in sedendo membrorum inter se habetum esse definiuit. ut pedes uidelicet directe ad genua collocati sint. sed quia directum & in rectitudinem duobus modis intelligi potest, & cum in longitudinem

gitudinem cruris protenditur, & cum in altum attollitur, & erigitur, merito subdit, in inferiorē partem processione, nam *isfy*, id est processione seu igitur refectionis situm & collocationem appellare consuevit. distare igitur pedes inter se aliquantulum censet, genua uero in inguinibus paulo esse superiora, id in omnibus spectans, ut & honestatem ac decorum seruet medicus, & promptus ad operandum, firmusq; ac stabilis in collocatione sit, quippe cum qui ita sedeat, circumagitari, ac quasi difficulter queat, unde & genua, & tota femora usq; ad inguina tanto intervallo debere esse disuncta inquit ut & honeste, & firmiter, & apte ad operandum sese habeant. quo interdu cubitis supra femora innixi, interdū ex utraq; ipsorum parte appositio brachio operari ualeamus, nam quod inquit positio supra ipsa, appositione in lateribus collocationem notat.

15 Indumentum succincte, syncere, æqualiter, similiter cubitis, humeris.

Succincte, id est *συνκτείνω* apte & expedite, ut neq; nimis astrictum, neq; nimis laxum corpori medici circumiectū sit. syncere autem de ipso indumentō dictū est, distincte atq; explicate, ut nullam partem eius duplicatam esse significet. quod aut subdit, equaliter, similiter cubitis, humeris, ambiguum est. uel enim utrisq; in brachijs circumiectū esse indumentū æqualiter ac similiter humeris & cubitis censet, ut alterum brachium alteri conferatur, id quod pleriq; cōparare appellant. uel cubitos & humeros in singulis brachijs æqualiter ac similiter indutos esse, ut cubitus humero, & humerus cubito cōparetur. nam q; non supra cubiti gibbum retractum esse amictū uelit, perspicuum est. quippe cum non medico solum, qui tam seriam artem exercet, inuolutos ac nudos habere cubitos turpe sit, uerum etiam ijs qui in forensibus tumultibus causas dicunt, quos uidemus admodum uereri super cubitos retractam tunicam gestare, perinde atq; illi qui ad pancratio decertandū præparantur. possumus etiā talem amictus habitum alia causa reprobare, quia uidelicet non tam partes circa cubitum, q; totum etiam brachium refrigeret. quanquā quantā partem eius ultra cubiti gibbum occupari conueniat, non expressit: ob id fortasse quia clarum est, atq; eiusmodi, ut à quocunq; nostrum inueniri queat. nō enim difficile est conijcere in singulis operationibus quantū producti ultra cubitū debeat indumentū; hic quoq; id attendentes, ut & honestatem seruemus, & apte instructi ad propositam chirurgiam simus. nam sicut paulo superius ubi late oportebat, cōtrarios esse scopos ac fines dixit; alterum umbrosi aeris ne agrotans pars inspiceretur; alterum clari luminis; quo ipse se qui curaret, uidere posset. ex quibus eum sequi deberemus, ut maiorem uim habuisset. q; si uterq; æqualiter propendere uisus fuisset, medum planē inter utrosq; esse eligēdum. eodem modo & nunc, & prorsus semper faciendū est, ut ubi in cōtrarias res diuersi fines æqualiter deducunt,

medium utrorumq; eligamus; ubi alter præponderat, ad eum tēdamus. in operatione igitur, quantum ad ipsum attinet, totū brachium nudū esse oportebat. honestas uero totum idem esse contentum postulabat. mediū tamen seruatur. Quocirca semper mediū utrorūq; eligendū est, cum sunt æquales: cum sunt inæquales, ad eum qui magis urget, concedendum est.

17 Ad id autem quod tractatur, ultra & prope & sursum & deorsum, et hac uel illac uel in medio, ultra & prope termini sunt cubitorum gibbi si ulteriorem partem genua in citeriorem costas non pertranseunt. sursum si non superius quam mammae sunt, summas manus teneat: deorsum, si non inferius, quam ut pectus supra genū habes, summas manus angulares ad brachia efficit, atq; in medio quidem, hoc modo. at hac uel illac si non extra sedem, sed pro ratione conuersionis corpus & operantem corporis partem protendat.

Cum medicum iussent conuenienter se habere ad seipsum, ad id quod tractatur, ad lucem siue sedeat, siue stet: primum de sedentis conuenientia ad unumquodque ex his tribus aggressus est dicere à luce principio sumpto: deinde ubi ad conuenientiam quam ad seipsum habet transiit, eamq; explicauit; ad tertium quod adhuc restat nunc descendit, congruentiamq; eius ad id quod tractatur et curatur exponit. nam neq; admodum prope id quod curatur sedere medicus debet, ne ex angustia manuum tractatio impediatur. neque adeo distare, ut attingere id quod pertractat, uix possit. statuit em̄ hic quosdā terminos citra quos remanere, aut ultra progredi medicus minime debet. illud uero memoria tenendum est, de sedente primum haberi orationem. tātum igitur abesse eum qui medetur ab agrotante uult, ut cubitos neq; ultra genua protendat, neq; citra costas retrahat. qui distantia ante & retro termini sunt. distantia autem hæc & dimensio per lōgitudinē appellatur. cū uero duæ reliquæ sint, altera per latitudinem, altera per profunditatē & altitudinē, utrolibet em̄ modo nominant, de ea que est per altitudinem terminos hos statuit, ut qui operatur, neq; superius mammis manus attollat, neq; inferius deprimat, quā ut pectore genibus incumbente angulares manus ad brachia figuret. angulares appellans, cum in curatura rectum angulum cubitus cum brachio efficit. quippe cum media hæc sit figura inter perfectam cubiti incuruationē, qua fit, ut inflectere ipsum arctius nequeamus, & perfectam diductionem, qua distendere brachiū magis non licet, eius quæ per latitudinem fit in laterales partes, terminos in utraq; partem ponit, in dextram & sinistram ita conuersiones facere ut sedes non dimoueantur, id est partes corporis quibus consideremus, & inniti mur, atque horum quidem

dem termini deinceps hic per diuersa tempora explicati sunt. quippe cum quo tempore de intervallo per longitudinem dicebat, eodem de eo quod est per latitudinem & altitudinem docere nullo modo potuerit. quemadmodum neque cum de altero reliquorum duorum egit, de longitudine, sed medicum tamen, ut puto, monet, ut quocumque tempore ad omnia quae dicta sunt, animum aduertat. eo quod omnibus simul in omni operatione opus sit. nam cum media quaedam sit medici constitutio in sedendo, cum uidelicet spectans nihil operatur, eam speciosissimam atque honestissimam esse oportet, perinde ac si pictor quidam, aut fictor imaginem eius imitaturus sit. sed cum ad manu operandum iam peruenit, manus ei mouendae sunt ante simul & sursum alias, alias ante & sursum & sinistrorsum, interdum retro uel utraque manus, uel una tantum retrahenda est, atque id uel deorsum, uel sursum, uel dextrorsum, uel sinistrorsum. dimensionibus enim his inter se conexis multiformes figurarum uariationes euadunt. in quibus omnibus communis ille scopus tenendus est, ut sedes ipsa inuariata conseruetur. quam nonnulli distantiarum harum terminos transgrediendo turbare consueuerunt. nam si ita alte pars curanda fuerit collocata ut medico supra mammam suas manus attollere necesse sit, cogetur is interdum altius seipsum a sede subleuare quasi surrecturus, ita ut neque stet proflus, neque sedeat: sed in medio quodam instabili ac nutante habitu constituitur. & si multum ad dexteram, aut sinistram partem procedendum fuerit, eodem sede ipse attollitur, ut periculum sit, ne ex ea delabatur. in inferiore, & citiore parte idem continget. si deorsum autem magis demittendae manus sint, praeter quam quod sibi in operando obtenebrabit, in indecoro etiam habitu confidebit.

18 Si uero stet, utriusque quidem pedibus exaequo insistere oportet. Sed agere altero inscendente, qui utique ex parte operantis manibus non sit, sublato genu ad inguina sic, ut in sessione. & alij termini iidem.

Ubi orationem de sedente expleuit, de stante agere incipit. iubetque eum eadem profus seruire quae paulo ante in sedentibus praecipit. nisi quod hic pedum stationem inaequalem esse uult. alterum enim altero altius esse debere inquit, sicut non edirecto operantis manus talis statio sit, quam medicum in tota operatione seruaturum esse, si neque nimis alto loco, neque ulterius quam oporteat siue longitudine, siue latitudine membrum quod tractandum est, fuerit collocatum: unicuique qui ante dicta meminerit manifestum est. nam si ita alte erit collocatum, ut medicus manus supra mammam suas cogatur attollere, efficietur, ut dum immoderate extenditur, is sede excutitur. si uero longius distabit, ita ut progrediendum aliquantulum sit, medico pristina sedem deferere erit necesse. Quia uero supra aliquid innixum, ac firmatum alterum pedem esse uult, id in quantam altitudinem fieri debeat, declarat. eundem habitum inquit ipsius ge-

nu ad inguina hic esse seruandum, quae in sedentibus superius explicauit de illis enim ita dixerat. genua autem inguinibus paulo superiora existant. eo quod eiusmodi sessio sicut tutissima est & maxime decora, ita ad operandum quoque expeditissima est. nunc uero alterum tantummodo genua promineat altius uult, ut eadem ad inguina ratio seruetur, plurali autem numero dixit inguina, quo ad inguina utrorumque crurum aequalem altitudinem habere genua intelligamus.

19 At qui tractatur reliqua corporis parte curanti inseruiat, uel stans, uel sedens, uel iacens facillime ea figura qua permanet, subfluxione, subsidentia, diuersione, de cluiuitate seruans. Sic quoque debet seruari & figura & forma eius: qui tractatur, in exhibitione, in tractatione, in posteriore habitu.

Diuerfas interpretationes loci huius tradiderunt, qui in librum hunc explanationes conscripserunt. nam tum quatuor horum nominum ambiguitas, subfluxionis uidelicet, subsidentiae, diuersionis & decluiuitatis, tum orationis breuitas qua multa complecti uoluit Hippocrates, dissentiendi ipsis praebuit occasionem. cum enim obscura adeo sit auctoris huius sententia, coniectura magis quam certo aliquo iudicio ducti id fecerunt. sed ego id quod in omnibus huiusmodi facere consueui, nunc quoque praestabo. ut omnis omnibus quae uidetur absurda ea tantummodo persequar, quae probabiliter excogitata mihi esse uideantur. meamque praeterea in hoc sententia non celem. ab obscuriorum autem horum nominum explicatio exordium sumam. Cum simplex prius sit, quam compositum, & saepe fiat, ut licet nulla obscuritas in simplicibus sit, obscuritatem tamen afferat compositio: id in praesentia hac oratione plane contigit. nonnulli enim subfluxionem intelligendam censent, quae ex humidis euenit. atque horum duplex etiam sententia est. alij, ex ijs quae e corpore moventur, alij, ex ijs quae extrinsecus in funduntur. quidam quoque de ijs mentionem hic esse factam dicunt, quae in curationis operatione ipsa effluunt. alij de ijs, quae post operationem eueniunt, dictum esse hoc asserunt. Eadem de subsidentia nomine discrepantia est. nam cum subsidere contrarium fluxioni humorum sit, merito de eo esse eadem ambiguitas debet. alter explanatorum coetus non de humidis, sed de siccis & solidis animalis partibus subsidentiae & subfluxionis nomen esse accipiendum contendunt. ac subsidentiam quidem seu subsistentiam malis dicere, id est *καταρροια*, suspensionem ac subleuationem uel partium quae induritur, uel totius etiam corporis dici opinant. subfluxionem quae *καταρροια* uocat, eorumque ad inferiora declinationem ac delapsionem non secus ac si de fluxionem, id est *καταρροια* dixisset. nam defluere hoc significato in praesagijs dictum esse aiunt, ubi inquit atque procubant, & defluat e lecto ad pedes, illud uero grauius est. his qui ita exponunt, nomen quoque diuersionis & decluiuitatis attestatur, quae deinceps

deinceps subsequuntur. Diuersionem enim, id est *ἁποτροπή* conuersionem in latus significare dicunt, siue totius corporis sit, siue eius tantū partis, quæ curationem suscipit. Decliuitatem uero ad ea quæ proprie *κλάω*, id est membra longa nominantur, quæ sunt brachia & crura, referendā esse, sicut suffluxionem ad totum corpus. quādo enim corpus eodem in loco detinet quispiam, neq; id dimouet, sed uel crus tantum, uel brachium deorsum inclinatur, eum situm decliuem appellari dicūt, atq; hæc quidem quamuis uera sint, siquis sigillatim ea consideret, in tota tamen oratione non correspondēt. nam alia quædam etiam ipsorum omnium duplex diffusio est, cum nonnulli putent Hippocratem uoluisse ægrotates ea seruare quæ quatuor his nominibus significantur, subsidentia, suffluxione, diuersione, & decliuitate: nonnulli non putent. Illud uero ad totam orationis huius sententiam nihil refert, quod in nomine diuersionis tres lectiones circumferuntur. alij enim diuersionem, id est *ἁποτροπή* per τ & ρ & ε in secunda syllaba legūt. alij σ adiuncto *ἁποτροπή*, detortionem, seu inuersionē. alij per τ & ρ & ε *ἁποτροπή*, detersionem seu expressionem legendū affirmant. unam enim tantum lectionem in explicatione sententiæ explanatorum posueramus. eo quod cum manifesta nominum horum significatio sit, ab *ἁποτροπή*, id est à digrediendo & diuertendo diuersio, ab *ἁποτροπή*, id est inuertendo & detorquendo inuersio, ab *ἁποτροπή*, id est exprimendo & detergendo detersio, facile intelligamus, seruanda hæc esse ab ægrotate, uel nō seruanda. At enim omnes hi in loci huius expositione ex parte quidem sententiam Hippocratis uidentur perpexisse, totā tamen exquiliite assequi minime potuisse. si enim quis aduertat ijs quæ in calce dicuntur, ubi inquit in exhibitioe, in tractatione, in posteriore habitu, omnes uera quidē dixisse, cum alia aliter in tribus his occasionebus exhibitioe, tractatione, posteriore habitu ab ægrotante potestari utile sit; non tamen componere omnia potuisse uidebuntur. planum autē hoc erit, si tres has occasionēs manifeste distinxerimus. prima est cum exhibent se ægrotantes ad medicis exactā morborum dignotionem percipiendam: quam exhibitionem hic uocat. Secunda, cum aliquid medicus in parte affecta operatur, ac tractat: quam tractationem appellat. Tertia deinceps, quæ nuncupatur posteriore habitu, cum ægrotanti in eadem figura seruare partem affectam propositū est, ab habendo enim eam eundem in modum habitus appellationem fecit. in omnibus igitur his tribus occasionebus quoddam commune, & quoddā propriū est. cōmune est, ut membrum affectum immotum seruetur, nisi cum motione quodāmodo à me dico sit tractandum. propriū autem bonū ex eo ad perfectam sanationem cōparatur. cum in exhibitione exacte dignouerit eam partem medicus, quam curaturus est. in tractatione, si sit fractura, extenderit, & conformarit apte, & obligarit. si luxatio sit, extenderit, & reposuerit, tum conuenienti deligatione affectum loco cū circumdederit. si scal-

Galen.

pellio opera adhibita sit, pus omne expresserit, & putrefactum quippiam aliqua parte uel ferro præfecerit, uel igne deusserit. His autem & humidorum suffluxio & subsistentia utilis est. altera, ut fiat, quippe cum quod præter naturam humidum est, excernendum sit. altera, ut ne fiat, quod enim prauum est, manere intus non conuenit. inter dum tamen subsistentia utilis euadit, quemadmodū in quibus uel uniuersum exinanire pus ex magno abscessu, uel humorem inter cutem nolumus. multo item magis in brachijs & cruribus quæ subiecta manuali curationi sunt, suffluxio, & subsistentia seruanda est. simili modo in solidis animalis partibus. seruari hæc in tribus his occasionebus exhibitioe, tractatione, posteriore habitu ab ægrotate debet. nam si attollat partem eam ægrotus, atq; ingerat curanti, medicum cogit non conuenienter incisio nem facere, dum neq; quantitatē, neq; locum seruare permittit, ex eo quod scalpelli admotionem præuertit, atq; anticipat. Si retrahat uero, deficientem operationē reddit, ac mancā. cum medicus uel in media ipsa curatione tantum sit, uel dimidia tum opus relinquat. atq; hæc quoq; fiunt cum iam deligati sunt. interdum etiam dum manu curatur, ut puta si in uentre tractentur, in dorsum sese attolles in latus diuertuntur. id quod nomine diuersionis significatur. uel si nihil horum faciāt, musculi uel uementer intendunt. quā mutationem uideatur significare cum subiūgit. sic quod debet seruatur et figura et forma eius qui tractatur. nā quantum malum afferat, si ægrotus, dum ei interponitur oculus, figuram & formam nō seruet, uel eam immutet, uel adeo uehementer intendat, ut facies sanguine repleatur, cuiuslibet patet. simile est, cū æger excidente os capitis medico paululū id uel sustulerit, uel depresserit, uel in latus diuerterit, ac deflexerit. exactā enim ex manu curationē labefactat ac turbat. idem facit, si uehementius se extendat qui curatur. quippe cū in mutatione habitus, partis quæ tractat sit immutetur: diffinitiones uero in alijs partibus sanguinis eruptionē efficiant, in musculis autē non solū eandem lesionē afferant, uerum etiā cum partē eam altiorē interdū reddāt, interdum depressiorē, in causa sint, ut ubi suspensifuerint, os, ubi depressi, ulceris sedes subiiciatur. id quod in locis circa intercostia & uentrē usu uenit.

20 Ungues neq; excedere debent, neque deficere digitorū uertices. in usum exercere digitis quidem summis, pleraque in dice ad magnum applicato. tota autem manu prona utrisque aduersis.

Posteaquam dixit de eo qui tractatur ex communicatione, nunc ad tractantem redit. quantūq; ungues eius esse debeāt, quales digiti, quo pacto que attollendi sint, exponit. nam quantū ad summorum digitorum operationes attinet, quæ sanæ propriæ etiam digitorum sunt, illud optimū est, si ungues neq; excedant, neq; deficient. Sed cum in primo de usu partū hoc latius tractauerimus, ubi omnem summæ manus naturā explicauimus,

tom. 6

K in

in praesentia satis erit si sola uerba hic clarius exponamus. Cum igitur duplex lectio circumferatur, utraque explananda à nobis est. una est in hunc modum. Ungues neque excedere debent, neque deficere digitorum uertices; eo quod ita fiat, ut parua corpuscula ad quae capienda summorum digitorum operatione indigemus, facillime comprehendendi queat. deinde quasi ab altero principio subsequatur. In usum exercere digitis quidem summis, plerumque indice ad magnum applicato. ut uide licet prioribus uerbis de magnitudine unguum digitorum doceat, sequentibus de usu ipsorum digitorum agat. altera lectio est huiusmodi. Ungues neque excedere debent, neque deficere. deinde ex altero principio. Digitorum uerticibus usus. uerticibus in datuo casu, ut talis tota sententia euadat. ungues neque excedere neque deficere longitudinem digitorum debent, sed plane ipsi adaequari. quippe cum summitatibus ipsorum usus sit. id quod neque esse falsum uidebitur, si rem diligenter perpendimus. nam licet nonnullae sint operationes in quibus totis utrimus manibus, cum uidelicet circumplectentes utrisque ipsis uel cubitum, uel femur, uel tibiam cruris, uel tale aliquid atque in diuersa trahentes extendimus, digiti tamen ibi tanquam partes manus operantur, non secus ac uola, & ceterae partes. at cum interpungimus, aut resuimus, & cōsumimus, aut ungues ex oculis excipimus, digitis ut digitis, non ut manus partibus. uti consueuimus. simili modo cum scalpello, aut tali aliqua re operationem exercemus. in omnibus siquidem digitorum operationibus summitate ipsorum utimur. ac propterea recte dictum esse, digitorum summitatibus usus non negauerim. postea item ab alio principio subiungunt. Exercere digitis quidem summis, plerumque indice ad magnum applicato. hac oratione declaratur plerumque digitorum operationes ad magnum, quem pollicem uocant, indice obiecto fieri. ita ut utrorumque summitatibus id quod capitur, continetur. tunc enim solis his duobus digitis operantibus est opus. nam si etiam tribus captio facienda sit, sicut cum specillo subtilissimus, aut interpungimus, licet medius aliquatenus etiam ipse opituletur duo hi antedicti maiorem partem operationis exequentur. tota autem manu utimur in chirurgijs, cum caua eius parte corpus id circumplectimur, circa quod operamur. ac digitos quidem affectos extendere, & conformare, & fingere uel una sola manu possumus. brachium, aut cubitum, aut femur, aut tibiam una non possumus: sed utrasque adhibeamus inter se aduersas atque oppositas necesse est: quo circum circa membrum queamus comprehendere. tota etiam manu prona utimur, cum cucurbitulas admouemus atque imprimimus, cum ex paruo cauterio exprimimus, cum spongiam superdamus, aliaque multa huiusmodi facimus. de quibus fortasse ob rei claritatem haec quoque dixisse, superfluum fuit. quippe cum & digitorum & manuum operationes omnes, quae utrisque manibus, quae digitis solis, quae tota manu faciendae sint, facile meminisse per se unusquisque possit.

21. Digitum diducere oportet magnum id quod inter digitos medium est. atque oppositum pollicem indici reddere.

Non enim alio modo fieri potest, ut in operationibus pollex indici opponatur, nisi quod medius inter utrosque est, magnum sit. id in reliquis quoque digitis optimū est. ut cum undequaque corpus aliquod magnum comprehendendum est, id quam plurimum distantes circum circa complectantur.

22. Morbus uero est, ex quo etiam in laeduntur, quibus in ortu, aut educatione assueuit pollex ab alijs digitis contineri.

Duplex lectio hic est. sed quia in utrisque eadem seruatur sententia, ab ea quae clarior, euidentiorque est, incipiam. Quibusdam inquit mala quadam educatione usus in consuetudinem abiit, ut reliquis digitis pollicem continerent. atque ob id is ocio marcescens paruus, atque attenuatus euasit: interuallumque quod inter eum & indicem est, exiguum effectum est. hoc autem in morbum manus, hoc est in laesionem definit. alij à morbo hoc contingere inquirunt, qui uel ex pollicis luxatione euenit, uel ex ulcere aliquo inter indicem & pollicem orto, quod in curatione duram cicatricem contraxerit. ita ut uel obduratus musculus is medius inter duos digitos, uel tabefactus amplius non alatur, neque crescat. adde quod cum magna aliqua interdum putredo inter duos hos digitos contigerit, carnemque corroserit, ac postea dura cicatrix obductus locum fuerit, efficitur, ut paruo interuallo pollex & index inter se distent, et quasi uinculo inter se connexti adhæreant. ac praecipue, si dura, sicut dixi, cicatrix supercreuerit. nam haec ita per negligentiam inolescere pueris uerisimile est. adulti enim à medicis edocti molliendo ac mouendo pollicem medium locum efficere ad alimenta suscipienda idoneum possunt. ut omittam quod huiusmodi hominibus totum corpus auctum iam est. ut si etiam males res ipsis cesserit, non nisi in macie, alimentorumque destitutione laesio euadat. at in infantibus in primo incremento affectione aliqua huiusmodi corripiantur, digitosque propterea non moueant, sit ut & partes affectae non amplius augeantur, & quicquid inter utrosque digitos intercedit, exiguum ac tenue remaneat. dicunt igitur nonnullis in hunc modum euenire. alij cicatrice dura induci locum: atque id ex dura quadam affectione partium, quae inter digitos sunt. ac propterea à uinculo quodam contineri pollicem, id est prohiberi quo minus ab alijs digitis separari queat. quidam enim sunt, qui ita uerbum contineri interpretentur, quamuis illud repugnare maxime uideatur. quod si horum explanatio admitti deberet, necesse esset ab alijs per praepositionem dictum fuisse, quae quidem praepositio ab loco distantiam notat, non per uiam, quae actionem significat. quae autem in media sede inter duos digitos affectiones existit, eam paruum & connexam reddunt. ac de his quidem illud eligere, quod maxime probabile tibi uisum fuerit. nam ita

in ita obſcure loquutionibus explicandis diuina-
tione potius quam ſapiētia opus eſt. Ad ueterem
ſectiōē iam uenio. nam hanc Aſclepiades etiam
corruptam eſſe exiſtimauit. ſanctiorem uero
rem talem eſſe cōiecit. Morbus autem eſt ex quo
etiam iſ lāduntur; quibus in ortu, aut educatione
aſſueuit pollex &c. quæ fortalle etiā ab ipſo Hip-
pocrate ſcripta ſunt. Tarentinus tamē Heraclides
diſpoſitio ſeu affectio ſubintelligendū cenſebat;
ut integra oratio huiusmodi eſſet. morbus autem
eſt, ex quo etiā lādens affectio iſs contigit, qui-
bus in ortu & educatione, & cetera quæ ſequunt.

23 Opera omnia exercere alterutris mani-
bus agentem oportet; & utriſq; ſimul; ſimi-
les enim ſunt. utriſque quidem coniectan-
tem bene, pulchre, celeriter, inſatigabili-
ter, concinne, expedite.

Omnia utriſq; manibus exerceri iubet, eo quōd
utiſſimum id ſit, ut & celeriter, & pulchre opera-
tiones ſiant. qualiſcunq; igitur fuerit medicus de-
xtera manu dexterum oculum, ſiniſtra ſiniſtrum
aggreditur. ſiue interpingere, ſiue ungum ex-
cideri, ſiue quippiam aliud huiusmodi facere opor-
teat. unde etiā addidit, coniectantem bene, pul-
chre, celeriter, inſatigabiliter, concinne, expedi-
te. eo quōd ex ea quam ſuperius dixit exercitatio-
ne hāc nobis acquirantur. quorum unum quodq;
quo pacto efficiatur, paulo poſt docebit. in præ-

ſentia illud tantum animaduertamus, horum do-
ctrinæ caput eſſe - quo modo - quod unum ex iſs
eſt, quæ in prima diuiſione continentur. aduerten-
dum item manus ſimiles ob id dixiſſe, quia ſpecie
& forma à ſe mutuo non variant.

24 Atq; inſtrumenta quidem & quando
& qualiter, dicitur. ubi oportet non impe-
dimento eſſe operi. non impedimento eſſe
aſſumptioni circa operantem corporis par-
tem. ſed ſi alius det, promptus paulo prius
ſit. & faciat quando iuſſeris.

Non ſolum ſpathulares crepidines, ſcāmna, at-
que alia huiusmodi quæ machinarius habent ap-
paratum, ſed ea quoque quæ commoda, id eſt æp-
pulae communi uocabulo appellantur, inſtrumen-
torum nomine intelligi, manifeſte hic declarat,
cum dicit: aſſumptione, & ſi alius det. nam & aſ-
ſumimus huiusmodi omnia in curationibus exercē-
dis, & ab alijs accipimus.

25 Qui autem circa ægrotantem ſunt, tra-
ctādā partem exhibento, ſicut uiſum fue-
rit. reliquum uero corpus detinēto, ut non
moueatur, tacentes, atque audientes eum
qui præeſt.

Clara oratio eſt ut nulla noſtra indigeat expla-
natione.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRA

TIS QVI QVAE IN MEDICATRINA FIVNT,

inſcribitur, commentariorum

Liber ſecundus.



DELIGATIONIS duæ ſunt
ſpecies, operata & ope-
rās. atq; operans quidem
celeriter, inſatigabiliter,
expedite, concinne. celeri-
ter, abſoluendo opera. in-
ſatigabiliter facile agēdo, expeditio autem
ad omnia prompta eſt. concinnitas uiſu iu-
cūda. ex quibus uero hāc exercitationibus
comparentur, dictum iam eſt.

Alia communia utriſq; deligationibus, alia pro-
pria alterius tantummodo ſunt. expedite & celeri-
ter deligationis quæ ſit, propria ſunt; bene & pul-
chre, iam factæ. deligationem enim quæ ſit, ope-
rantem, quæ facta iam eſt, operatā uocat. inſatiga-
biliter autē & concinne utriſq; ſunt cōmūia. inſa-
tigabiliter nomine & ſignificato utriſq; conueni-
t. concinne nomine quidem etiam ipſum utriſq;, ſi-
gnificato tamen non ſimili modo. in ea enim quæ
adhuc ſit deligatio, concinnitas ex manuū mo-
tione exiſtit; in ea quæ iam facta eſt, ex lin-
teorum ſam obducitorum circumiectione, tamen ſi liceat
etiā dicere dum adhuc ſit circumuolutio facia-
rum, exiſtere in ſecunda deligationis ſpecie cōcin-

Galen,

nitatem poſſe. ſed inſatigabiliter quoq; in deliga-
tione quæ ſit, q̄ in iā facta magis ſpectat. ea enim
quæ iam facta eſt, ſola ſaſciarū compreſſione fati-
gat, ac dolore affert. quæ autē ſit, & hac eadē re mo-
leſtat, & eo quōd uel apte uel minime continetur
membrū, quōd curatur. ex eo enim cōprimi inter-
dum ſolet, licet ipſa ligaminū iniectione recte admo-
dum perficiatur. poſſumus item dicere ex tange-
tium quoq; congreſſu uel moleſtante, uel non mo-
leſtate utriſq; deligationibus cōmune hoc eſſe. in
ea quidē quæ ſit ab iſs qui tenēt membrū quōd cu-
ratur, cum uel comprimūt, uel non cōprimunt. in
ea quæ facta iam eſt, ex appenſione in manu cum
mitella ſuſpēditur, ex depoſitione in crure cum
iniectione ei illa ſunt, quibus firmatur, atq; in colloca-
tione ſua detinetur. adde q̄ ad inſatigabilitatē de-
ligationis quæ ſit, operationis celeritas nō parum
conferat. quæ quidē celeritas ab ipſa expeditione
maxime abſoluūt. atq; hęc quidē deligationis que
ſit, bona præcipua ſunt. ut & detentio ipſa non cō-
primat, & expeditiōis promptitudo adſit. nam er-
ror qui in habitu & figuratiōe cōmittitur, com-
munis etiā deligatarum partium eſt. nunc uero ſer-
monem inſtituit de deligatione quæ in cōmoda fi-
guratione ſit. figuratiōnū autē propriæ uirtutes ac
uitia ſunt, nō ſecus ac deligatiōnū. de quibus tan-

tom. 6 K 2 tum

tūmodo in praesentia omīssis figuratōibus agit. A Quando igit expeditē deligatio sit, celeriter opus absoluit. nam expeditiōē quam *ὀυροπία* uocat, quid nam significet: declarat, cum inquit. expeditio ad omnia prompta est. hoc aut fit cum ita praecognouit omnia ille qui deligat, ut nulla ambiguitas, nullaq; deliberatio incidere ei possit, quo modo si prius alter operatus fuerit, ut debet, quo itē modo, si non debet, inducenda deligatio sit. expeditio igitur cum idem sit quod promptitudo, facillimā reddit operationē. at ipse infatigationem ex eo quod facile agamus, existere dixit. expeditis aut & facilibus operationibus annexā esse celeritatem perspicuū est. infatigatio itaq; seu indolentia utilissima ijs est qui tractantur: atq; ob ipsam expeditio quae celeritatē facillimam operationibus B expedit, ac suppeditat. cōcinnitas uero quae, sicut deinceps ipse dixit, insipientibus uoluptatem affert, ex superabundanti appēdice medico adiuncta est, ad famā apud imperitos augendā. cui qui studiosus gloria est, succumbit, ut amator ancillarū. qui uero hominū est studiosus, non succumbit ille quidē gloriae, sed conciliare sibi eam nihilominus studet: datq; operā ut laudetur, quo maior ei ab aegrotatibus fides adhibeatur. ita enim sit, ut magis obediētes eos habeat. id quod in utilitatē maiore ipsorū cedit. nā huic apud uulgus et imperitos gloriae acquirendae nō medicus tantū, uerum etiā philosophus studere consueuit. quippe cū si in honore & admiratione sit, magis prodesse ipsis possit qui & imitari magis ea quae agit, & parere ijs quae iubet, perinde ac dei alicuius mandatis parati sunt. ex quibus uero exercitationibus haec a medicis cōparentur, id est ut celeriter, infatigatē, concinne, & expeditē agant, dictū esse inquit. dictum enim est, praecipue quidem, ubi superius ita ait. opera exercere alterutris manibus agentem oportet. & utrisq; simul. similes enim sunt, sed & paulo ante cum inquit. exercere digitis quidem summis plerāq; indice ad magnum applicato. tota autem manu prona. utrisq; aduersis.

2 Operata aut bene, pulchre. ac pulchre quidē simpliciter, syncere. uel similia & aequalia aequaliter, & similiter: uel inaequalia & dissimilia inaequaliter & dissimiliter. ac species sunt, simplex, rotūda, fascia, sima, oculi, rhombus, & dimidiata. accommodando specie species, & affectiōi eius qd deligatur.

Cum duas deligationis species esse dixerit, atq; ex eis alterā quae adhuc sit, operantem, alterā quae facta ita est, operatā appellatā, in superiori oratione quō pacto operans optime efficiatur, declarauit. hic de operata prosequitur. quam pulchre quidē esse factā oportere ex eo inquit, qd simpliciter & syncere inducta sit. simpliciter quidē, si neq; implexam partem aliquā lineē, neq; duplicatā, neq; rugosam habuerit, sed plana tota, ac laeuis fuerit. ac syncere, cum secunda ac tertiā eodem in loco reuolutiones apte effectā fuerint. Ac mihi quidē

uideatur hic quoq; cum duo esse dixerit ex quibus pulchre deligatū esse quidpiā potest, alterū, id est simpliciter, sine ulla expositione, utpote clarū, reliquisse: alterū, quod est syncere, explicans subdidisse omnia quae hic sequuntur. aduerte igitur animum, ac memor sis eius quod modo dixi, cum syncere apte interpretatus sum, fit enim ut secunda reuolutio fasciae interdū prorsus aequalis prima, & ab ea nulla ex parte discrepans inducatur, interdū non aequalis. aequalis aut est, cum orae latitudinis exacte inter se ita superiectae sunt, ut neutra aut excedat, aut deficiat: sed utrarumq; perinde ac si una sit unius duplicatae fasciae inuolutio, unus atq; idē terminus esse uideatur. simili modo & tertia super inducitur, & quarta, si tot opus fuerit. nā in ea deligatione quae rhombus, & in ea quae semirhombus appellat, seruari hoc exquissite oportet. in ea uero quae fracturis est, accommodata, cum cubitus aut brachium aut femur deligatur, synceritatē alio modo fieri cōtingit, in ea si quidē duci primam fasciam sursum iubet, secundā prius quidē deorsum, deinde iterum sursum, quoad in eundē terminum cum prima perueniat. id quod nisi orae latitudinis lineorū inter se uariant, fieri nullo modo potest. synceritas tamen inest, si in tota deligatione declinatio a rotūda & circulari inuolutione aequalis seruatur. rotūda enim siue circularis ea uocatur quae toto circulo absq; ulla declinatiōe affectā partem circumdat, in qua quidē orae latitudinis fasciae tam secundae q̄ tertiā reuolutionis ita supra se mutuo iniectae sunt, ut neq; quicquam excedant, neq; deficiant. at declinantis ab hac rotunda deligationis reuolutione uel ad superiorem partem membri affecti, uel ad inferiorē duci necesse est. siq; in hac declinatio similis prorsus seruet, syncera prorsus deligatio est. qd si ijs quae diximus animum aduertis, perspicuū iam tibi esse debet, unū esse modum rotundae ac circularis fasciarū circumiectionis, qui in se non admittat, ut magis, uel minus esse talis queat. declinantis aut deligationis non unū. quippe cum fieri possit ut magis & minus altera q̄ altera declinet. hic enim Hippocrates eā quae parum declinat, fasciam, quae multū, idem per translationem appellat. nā *ὀυροπία*, est fascia fabri lignarij instrumentū quoddā uocat, quod in summitate qua ligna incidit, prominens quoddam supercilij incuruat, perinde ac crepido. sima uero a Graecis dicitur loca ea parte qua planities colli cōmittitur. cum tamē neutri ex his simi per se sit. planities enim plana atq; humilis procurrit, collis accliuis est, atq; editus. ubi uero inter se cōcurrunt, ibi figura sima efficitur. idem in uia fit qua parte declinitas alteri parti coniungit. sic in naribus sima ea pars dicitur, quae media inter eminentiores subdidit. totus itē nasus ab hac parte simus nuncupatur. quippe cum multae appellationes eorum quae partes aliquas afficiunt, toti corpori etiam attribuantur. ut cum simum totum hominē appellamus. non enim eo modo homo simus dicitur, quo crassus & tenuis, aut albus & niger, sed sic ut caesus, aut fuluus, aut gibberosus, ab oculis uidelicet & dorso

dorso sumpta appellatio. in naribus igitur, & a
 uis simitas proprie nominatur. per trāslationē
 uero ab Hippocrate hic in deligationibus, non se-
 cus ac crepido atq; ascia pro specie quadā inuolu-
 tionis fasciarū sumitur. nā cum fasciatim plagulas
 circumficerē brachio uel cruri subet, nihil aliud fa-
 cit, q̄ declinationē ad circuli inuolutiōē ea forma
 faciendā esse definit, qua ascia fabrilis est. nō enim
 admodū obliquā eam esse uult, ut ad rotunda mul-
 tum abeat, sed eatenus tantū, ut ad cōfasciārū pā-
 rium colligationē firmissimā sufficiat. non obscū-
 rum aut est inesse in utraq; ex his inuolutionibus;
 ut magis & minus esse eiusmodi possint, cum neu-
 tra ex ipsis simplex sit, aut uniformis, sicut rotun-
 da. rotunda enim & circularē quasi simpliciter ad-
 iungit. deinceps uero asciam & simam utraq; pri-
 uatim & separatim ponit, quemadmodum defini-
 tum est. syncere igitur quasi discrete & distincte si-
 gnificat, ut dixi. cum omnes fasciæ inuolutiones
 uel oras in latitudine easdem, uel declinationē sta-
 tam. statam appello, cum partes fasciæ in latitudi-
 ne extātes inter se mutuo æquis interuallis distāt.
 id quod sit, si is qui deligat, ei quam a principio in-
 stituit, æquale subinde declinationem seruarit.
 At uero Artemidorus et Dioscorides sicut in alijs
 innouant, & ueteres lectiones immutant, ita hic
 quoq; pro simplex rotunda, simplex rotunde scri-
 bendum censent. recte quidem illi hic intelligen-
 tes, sed audacter tamen immutantes: cum in ple-
 riq; licet nō bene intellexerint, simili audacia usi
 sint. atq; iccirco effectum est, ut mentionē eorum
 hic fecerim, cū in alijs innumerabilibus quæ huc
 usq; transcribere, nihil dicere uoluerim, propte-
 rea q̄ mihi uidebatur hic recte quidē intellexisse,
 dum tamen clariorē in modo rem audent trans-
 mutare, errasse in paruis, neq; eo modo intellexisse
 sicut scriptor uolebat. Sed de his semel dictum
 esse sufficiat. Cum igitur prius dixerit Hippocra-
 tes, bene quidē simpliciter, syncere, & postea sub-
 iunxerit similia & æqualia, æqualiter, & similiter;
 uel inæqualia & dissimilia, inæqualiter & dissimi-
 liter, quasi cōmunem quandam scopum syncera-
 rum deligationum docuit. nam æqualia & similia
 membra corporis æqualiter & similiter in omnib;
 suis partibus deligari debent, inæqualia uero &
 dissimilia inæqualiter ac dissimiliter. Verum tamē
 uetera exemplaria, & qui librum hunc explanaue-
 runt, per defectum lectionē hanc scriptam esse at-
 testantur. inæqualia enim & dissimilia tantūmodo
 legunt, inæqualiter & dissimiliter subintelligen-
 dum censent. quippe cū propterea ab auctore fue-
 rit prætermisissimum, quia manifeste ex cōuenientia
 eorū quæ sunt antedicta, intelligi queat. At enim
 huiusmodi loquutiōis modus breuitatis minime
 proprius est, sed per errorē inductus uidetur. quo
 circa melius est, si ita scriptum inuenitur, existima-
 resicut multa etiā ex antiquis exemplaribus
 deprauata reperiuntur, ita hic quoq; per errorem
 librarij contigisse ut uerba ea prætermisissint. atq;
 ita errorē ad nos usq; deuenisse. in brachio igitur
 fasciarum inuolutiones æqualiter & similiter face-

Galen.

re possumus. in femore & cubito, ac paulo magis
 etiā in tibia deficere necesse est. nam in humero,
 & coxa oppositis partibus est opus ad deligatio-
 nem faciendā. quemadmodum etiā in lateribus
 capitis. partes enim frontis, & narium rotundam
 fasciationē requirunt, quæ æqualiter & similiter
 inducta sit eodem modo in uertice & si nō rotun-
 de, æqualiter tamen & similiter deligamus. Sed de
 his in sequentibus accuratius dicemus, nunc ad re-
 liqua pergendum est. Cum tres enumerauerit Hip-
 pocrates fasciarum inuolutiōes, rotundā, asciam,
 simam, deinceps quasdam compositas cōmemor-
 rat, oculum uidelicet, rhombum, & dimidiatam,
 quam etiā semirhombum uocāt, postea subiungit,
 accōmodando speciem speciei, & affectioni
 eius quod deligatur, speciei deligationis accōmo-
 dandam esse inquit, & speciei, id est formæ partis
 affectæ, & affectioni ipsi quæ in ea est. species
 siquidē deligationis quam oculum uocamus, oculi
 lo adhiberi consueuit, uel cum procidentia labo-
 rat, uel ea causa, ut quæ imposita ipsi sunt, cōtinean-
 tur. Rhombo in capite uti solemus, cum uel futu-
 ras relaxatas, uel ucleris oræ expansæ constringere,
 uel cutem aliquantulum detractam cōtrahere
 atq; agglutinare uolumus. pro ratione horum se-
 mirhombi quoq; usus adhibetur. hæc enim ut ex-
 empla scripta ab Hippocrate sunt: ut pro ratione
 ipsorum uniuicq; parti & affectioni accōmodatā
 deligationem aut inuenire, aut ab alijs qui inueni-
 runt, discere ualeamus. melius aut est, ut qui etiā
 docet, non absolute ac simpliciter iubeat, sed si-
 mul quoq; usum tradat, quæ ipse deligationem in-
 uenerit. nam qui discunt, facile ita uel in memori-
 am reuocari, si eorum obliuiscantur quæ didicere,
 uel quæ non didicerunt excogitare insuper pote-
 runt. quocirca satius fortasse erit, ut nos quoq; pro-
 priam in unoquoq; commentario traditionem fa-
 ciamus de deligatione, quæ & parti corporis, &
 affectioni conuenit.

3 Bene autem deligādī duæ sunt species,
 ualiditatis, quidem, uel compressione, uel
 multitudine linteorum.

Species appellari hic differentias superius di-
 ctum est, quæstionis aut non parux occasione ex-
 planatoribus hoc loco attulit, cum non explicarit
 nominatim duas species, sicut in alijs paulo ante
 fecit. altera igitur species in quantitate effectiōis
 consistit quam ipse *ἰσχύς*, id est ualiditātē appellat,
 cum inquit ualiditatis quidē uel cōpressionē, uel
 multitudine linteorū. est enim quædā moderatio
 ualiditatis in deligādō, quæ cū excedit ex cōpres-
 sione membrorū, eos dolore afficit qui ægrotant:
 cum deficit, fasciationē laxā reddit. alterā bene de-
 ligandi speciem non dixit. sed deinceps post hæc
 quæ de ualiditate scriptis in hūc modū subiungit.

4 Ac partim quidem ipsa deligatio mēde-
 tur, partim medentibus inseruit.

Hæc autem bonæ deligationis species minime
 est. sed cōmunes omnium deligationum usus, uti-
 litatesq; in uniuersum comprehendit. in ijs etiā

tom. 6

K 3

quæ

quae subsequuntur quo pacto deligationis moderatio seruetur, ostendit. postea de nodo agit. tum sequentem doctrinam aggrediens, certo tamen inquit scientem, in declivia & in acutum abeuntia deligationem omnem effugere, atque elabi: ut in superiorem partem in capite, in inferiorem in tibia. & cetera quae subdit. deinceps de qualitate deligationis pertractat. cumque in ea scire oporteat, unde initium fasciae singulis partibus, singulisque affectionibus iniiciendum sit, quò finis deducendus, quara-
 zione mediae inuolutiones faciendae, qualesque esse debeant, haec quoque edocet: nam, ubi inquit, at quae mouentur, ut articuli, qua parte inflectuntur &c. modum iniiciendarum fasciarum tradit et deinceps quo pacto fines seruari firmiter queant, ostendit. atque inde quae nam deligationum opera sint, commemorat. ita ut bene factae deligationis altera species quae ualiditati opponitur, uniuersa qualitas totius deligationis sit. quia autem difficile erat particulares huiusce speciei differentias uno communi nomine complecti, ideo hanc ualiditati oppositam speciem una appellatione explicare non laborauit. nam hoc ita esse ex ipsis Hippocratis uerbis patebit, si singula in clariorem capitum distinctionem immutentur. nominetur igitur totum hoc genus euidentioris ac breuioris intellectionis causa quantitas deligationis. nam ualiditas uel compressione uel multitudine linteorum eo significato accipienda est, quo *δυσκλινος*, id est potentia aliquando consuevit. interdum enim eam imbecillitati opponunt & impotentiae, interdum latius ac communius ita sumunt, ut potentiam atque impotentiam significet. quemadmodum etiam magnitudo modum magnum duntaxat significat, modo magnum & paruum comprehendit. atque alia multa quae cum particularia sint, communi cum uniuersalibus uocabulo aequiuoce appellantur. ita enim nunc ualiditatis nomine usus est. quippe cum neque ualide comprimere, neque adeo imbecilliter fascias circundare affectas partes oporteat, ut qui egrotat, eas sibi esse circuectas non sentiat. multitudine enim linteorum pro quantitate accipiendum est. nam neque hic ea multitudo intelligi debet quae paucitati opponitur. sed quae tam multum, quam pauca continet. medio-
 critas enim in deligatione bonum, id est utile & con-
 ducens efficit. quamquam si inter se cõparentur duae deligationes, quae compressa magis erit ualidior, alteram imbecillior dicemus. quippe cum abs-
 ferdum nihil sit, si licet pro subiecta affectione moderata semper sit deligatio, ad alteram tamen comparata uel ualida, uel imbecillis appelletur. quando autem soluendum sit, quando uel intendenda deligatio, uel linteorum multitudo augenda uel minuenda, in libro De fracturis ipse euidentissime docuit.

5 Atque ad haec quidem haec lex est.

Leges in ciuitatibus orationes quaedam sunt, quae quod agendum est precipiunt, utant quod agi non debet. his similia esse ea quae dicta hic sunt, inquit: cum nullam in se coniecturam, aut ambiguitatem habeant, sicut alia nonnulla quae in medica arte tra-

duntur. Idem in libro De fracturis dixit, moderatius tamen enunciatione prolata. non enim absolute sicut nunc enunciauit, atque ad haec quidem haec lex est: sed inquit, atque haec quidem oratio tanquam iusta lex de fracturarum curatione constituta est.

6 In his autem maxima deligationis ea sunt: compressio, ita ut imposita neque abscedant neque innitantur, sed affulcita quidem sint, non tamen allisa, atque id in extremis minus, in medijs minimum.

In his, inquit, quae ad ualiditatis speciem attinent, maxima praeccepta deligationis ea sunt, ut imposita supra affectam partem, id est linteum, neque abscedant abstantque a corpore, neque id prorsus compriment, sed affulcita quidem sint, hoc est firmiter sint applicata, non autem allisa. id est non ita stricim, ac uehementer circumuolutum sit linteum affectis partibus, ut dolore creet. atque haec de compressionis quantitate praeccepta minime ea parte qua morbus est, transgredi debemus: in extremis autem partibus licet seruanda sint, minorem tamen quam in medijs curam requirunt. pulcherrimum si quidem est ut nullum prorsus errorem in arte committamus, sin autem alibi errare contingat, ea in parte id esse debet, unde minus damnum resultat. ubi uero nocumentum alicuius momenti extat, ibi minime peccandum est.

7 Nodus et acia distributa esse debent non deorsum, sed sursum, in exhibitione, & respectu, & deligatione & posteriore habitu.

Cur huic de deligatione tractationi preter ordinem hoc interseruerit, paulo post uidebimus, nunc prius tentandum est, ut quid sibi uelint haec uerba, intelligamus. Est inter explanatores dissensio: alij sursum ac deorsum de productione in longitudinem accipiendum censent: alij de ea quae ad affectionem membri spectat. quid autem distribuit esse aut in acia aut in nodo significet, neutri explicauerunt. Nodum quidem uocari uinctionem, quae ex fascijs inter se conexis, complicatisque fit, siue duobus capitibus, siue altero tantum in duo crura discisso, siue tertio extrinsecus iniecto quod cõprehensum uocant, nemo est qui nesciat. notum item uni cuique est, aciam dici filum per foramen acus tractum, quo uel partes corporis dissectas inter se committere, uel caput fasciae subiectis partibus assuere consueuimus. atque hic de ea acia agit, quae ad futuram fasciae iniiciendam praeparata est. cuius distributionem sursum ferri uult. quid uero distributionem appellet, ex ipso licet cognoscere, qui sepe hoc nomine, pro fasciarum ab initio usque ad finem inuolutione utitur. nam in fracturis initium utrarumque fasciarum supra ipsam fracturam collocandum iubet, tum primae distributionem sursum, secundae primam deorsum, deinde sursum esse faciendam censet: distributionem uocans totam fasciarum quasi progressionem, quam a principio usque ad finem inuoluendo circum agrum corpus efficitur. simile quid in acia distributio significat. cum enim acus

& ex superioribus partibus ad inferiora, & e contra in inferioribus ad superiora trajecti queat, quin etiam neutro modo, sed declinando à sinistra ad dexteram, uel à dextera ad sinistram, in unaquaque distantia sursum ferri ipsum iubet. nam si caput fasciæ subiectis eius partibus assuendum est, in quibus deligationibus oppositis regionibus opus non est, ut in brachio, & cubito, & femore & tibia, uel à sinistra ad dexteram, uel à dextera ad sinistram acum traiciamus, necesse est, atque utrolibet modo dare operam debemus, ut declinando semper in superiore partem finem fasciæ subiectis inuolutio nibus assuamus. ubi uero oppositæ partes requiruntur, ut in humero, & coxa, illud studendum est, ut finis fasciæ in superiore partem feratur: atque ibi acu ab inferiori parte sursum traiecta sutura iniiciatur, ita ut non superiorem partem ad inferiorem detrahamus, sed inferiorem e contrario ad superiorem attrahamus. quippe cum alterutrum effici in consuetudine liceat. quo circa traiecta acu filum trahente inferiorem partem ad superiorem attollere, non deprimere superiorem ad inferiorem debemus: id spectantes, ut à superioribus fasciæ partibus inferiora sursum attrahatur. atque hoc facere nos iubet dum æger dignoscendam affectam partem medicis exhibet, dumque eam ita collocant, ut respectu ad medicum habito curationi suscipiendæ sit accommodata. tertio nodum deligatur, primam occasionem in exhibitione appellauit: secundam, in respectu: tertiam in deligatione. sed quarta quoque est, quam *ἡ πρὸς τὴν ἐξω*, id est in compressione uocat. nonnulli tamen pro *ἡ πρὸς τὴν ἐξω* legendum censent *ἡ πρὸς τὴν ἐσω*, in posteriore habitu, quod mihi magis placet. cum post absolutam curationem in eo habitu membrum reseruatur, qui maxime est accommodatus. hanc enim occasionem posteriorem habitum superius quoque nuncupauit. in omnibus igitur his temporibus sicut unam formam inuolutionis fasciarum seruari, ita nodi quoque & aciei distributionem sursum semper attolli uult. quo caput uidelicet fasciæ summiter sublatum à totis reliquis inuolutionibus contineatur. Illud uero consideratione dignum uidetur, quod ab explanatoribus prætermissum fuit. quo pacto nodi et aciei distributio sicut in reliquis occasionibus, ita tunc quoque sursum ferri debeat, cum ægrotantes medicis inspicientes sese exhibent. nam cum alij ad medicos ingrediendo ipsi accedant, alij gestatione deducant, sicut ipsis uisum fuerit, membris affectis aliquando uel appensis uel deligatis, aliquando utroque modo iam dispositis, penes eos qui prius hæc fecerunt, nodorum & aciarum fuit facultas, non penes medicos qui postea inspecturi ipsos sunt, uel curaturi. fortasse igitur tunc quoque medicis esse opus existimat. quippe cum incidat interdum, ut in itinere, aut in agro percussiones nonnulli, aut luxationes, aut uulnera patiantur, ubi neque medicorum plurium conuentus diligentioris considerationis causa fieri potest, neque instrumentorum, aut suppellectilium necessarium, aut linteorum, aut laqueorum, quæ omnia ad curationem requiruntur, copia adest. Ea itaque in oc-

casione quæ aderit medicis quibuscumque potuerit linteis membra affecta deligabit, atque excipiet. & si uel nodo uel futura cōstringere opus fuerit, accommodate id præstabit. in urbem autem reuersus æger consuetis medicis sese exhibebit. primum, ut accuratius quid passus fuerit, cognoscatur: deinde, ut uel luxatos articulos reponant, uel fracta ossa conforment, uel uulnera consuant, uel cōtulis cōuenientem curationem adhibeant. quæ cum fecerint medicis postea deligabunt. post deligationem membrum accommodato habitu deponendum curabunt.

§ Initia iniicere oportet, non ad ulcus, sed hinc uel inde ad nodum.

Quid nodum nunc uocet, ex modo explanatis manifestum est. in superiori enim oratione nodum & aciam inter se distinxit. nunc alterius tantum meminit, eo quod acia quoque potest in nodum desinere. imò in eum omnino finit in omnibus quæ sunt. quippe cum non absolute acus trajecti per ea quæ suntur, consueuerit, ed cum acia in erta, quæ inter se partes eorum nodo astringit. sæpe igitur fit, ut prope inter se & initium aciei & nodus sit. quemadmodum cum cutem cōsumimus. interdum multum inter se distant. ut in fascijs euenit, in quibus sæpe ex multo interuallo partes aciei in communem nodum colliguntur. uidetur igitur nunc dicere non ea parte iniicienda esse initia aciei, qua ulcus est. quo præcepto intelligitur, neque nodum intendi supra ulcus debere. quippe cum sic fiat, ut non tantum à nodo, sed à fasciâ quoque ipsa ulcus cōprimatur uehementius dissipata qua parte nodum cōstringi paulo uiolentius debet, ut cōtinere possit. ita quoque si absque acia nodus sit aut capitibus fasciæ inter se innexis, aut aliquo extrinsecus iniecto uinculo, fieri supra ipsum ulcus minime conuenit. ipsum enim cōprimit præsertim si uel tenuis ea parte fasciâ subest, uel sine lana circūiecta est. mihi tamen hic uidetur Hippocrates de cōnexionem in nodum tam aciarum quam mitellarum intellexisse. nonnulli uero existimant initia fasciarum iubere eum supra ulcus non imponi, quorum alij locum hunc ita etiam legunt: uere illud quidem, non tamen ita ut proposita res postulat, quippe cum non de fascijs, sed de acia & futura præsens instituta non sit. nam uera sanæ & arti congruens huiusmodi lectio est, qua dicitur, initia fasciæ non supra ulcus sed hinc & inde esse iniicienda, id est ex alterutra parte uel dextera uel sinistra. ita enim fit, ut quod in libro De fracturis scripsit, recte dictum esse, neque aduersari præfenti huic orationi uideatur. cum enim ibi initia fasciarum supra partem affectam siue fracturam ea fuerit, siue ulcus, neque superius, neque inferius iniicienda esse iubeat: de distantia per longitudinem intelligit. hic non ad longitudinem, sed latitudinem spectans initia non supra ulcus sed hinc & inde iniicere oportere asserit, ex alterutra latitudinis parte ultra ulcus. non enim hoc impedit quo minus neque superius neque iniectionem hanc esse factam. intelligamus: qui tamen librum hunc explanauerunt, lectionem hanc non agnoscunt, quæ circa

merito dubitant quid sibi uelut hic Hippocrates. ac quibusdam placet initia fasciarū pro extremis esse intelligenda, cum tamen extremum seu terminus quod *πῶς* dicunt, generalius sit quā initium quemadmodum Plato etiam nos docet, extrema inquit & terminos & initium & finem significare. quod si generaliore appellationem pro speculiori sumere possumus, licebit initium extremum appellare, non secus ac finem: finē tamen esse initium dicere non licebit. at enim cum nullius alterius rei initium intelligi queat quā fasciarū, aut aciarum, aut mitellarum, fieri autem non possit, ut de fasciis intelligamus, de acijs & mitellis intelligendū est, seu si placet de fimbrijs. nam hae quoque deligationem possunt continere. quemadmodum etiam angustiae habent quae extremis partibus inter se innexae uinculum efficiunt.

9 Nodum autem neque in mora, neque in opere, neque eo ubi inane, ne in uanum iaceat.

Cum in superiore oratione initia eorum quae nodum efficiunt, non esse supra ulcus statuenda censuerit, sed alio in loco, quo uidelicet nodus quoque poni debet, nunc loca ipsa ubi ponendus nodus est, docet rerum enim doctrina aliquando fieri ex earum accidentibus consuevit. ita autem appellant ea quae cum possint accidere, nodum tamen acciderunt. estque oratio haec huiusmodi sententiae. nodum collocare debemus non supra ulcus, sed ea parte qua distributio eius ferri sursum ualeat, obseruantes ne in mora, aut opere, aut inani eum constitutamur. moram uocat eam partem membri quae uel in flexum, uel extentum, uel in latus morans operatur. estque mora ingrediēti homini planta pedis, cubanti totum dorsum, & maxime extantes eius partes, capitisque occipitium, sedenti natiū inferiora. quod si quis deligatus operaturus manibus est, qua operatione usus sit, & circa quae extrinsecus, diligenter inspicies: quo morā eius possis inuenire. operationes autem circa de articulationes fiunt. quocirca eae tibi sunt obseruandae, ac praecipue illae quae deligato membro operaturae sunt. nam bene Hippocratem hic praecipisse ne nodus qui totam deligationem contenturus est, supra partes ponatur, quae in motionibus immutantur, perspicuum est. quippe cum alioqui interdum laxiores, interdum compressiores quam conueniant, nodi ex qualibet motione euasuri sint. quod aut in fine huius orationis dixit, inane, id est *ῥηδὴ*, uanum omnes interpretantur, ac si inefficax atque inutile dixisset. Graeci enim *ῥηδὴ* eos uocant, qui ab ortu & nutu & indistincte loquentes nascuntur: qui uidelicet in uitae actionibus prorsus inutilis sunt. ita igitur quod deligationem nihil iuuat, appellasse uanum & inutile Hippocratem aiunt. quanquam fieri potest, ut per *κ* litteram scripserit Hippocrates *ῥηδὴ*, & per errorem postea omissa prima littera *ῥηδὴ* librarij posuerint. ex qua tamen lectione eadē sententia existet. *ῥηδὴ* enim ionica lingua id dicitur, quod communiter *ῥηδὴ*, id est inane, & uanum, atque inutile appellamus. quoniam

igitur multos scimus uel ex ignorantia, uel dum uideri uolūt esse diligentes, inutiles nodos fasciis inducere, ideo subiungit. ne in uanum iaceat. id est in inane & inutile. uisum autem est cuidam ex interpretibus huius libri inane hic dici uacuum locum. id est alam, poplitem, inguen, quae humero, genu, coxae opposita sunt. corpori enim esse impressum atque innixum oportere nodum aiebat, non in concauitate depressum. cuiusmodi esset, si sub ala, aut poplite efficeretur. quod si hoc non admodum probabiliter dictum esse uideatur, non est tamen reiiciendum. uti si quidem eo possumus. quippe cum in ijs quae tui sunt, modicoriter etiam probabile satis esse debeat.

10 Nodum & aciam mollia & non magis na esse conuenit.

Rursus hic, sicut in principio, duorum nominum fecit mentionem, inter se ea distinguens. aciamque appellat illud quod una cum acui traiecitur, siue linum id sit, siue lana, siue quippiam aliud huiusmodi. nodum autem quod ex habenarum aut crurum fasciarū implexione, ac nexu fit, quorum proculdubio utrunque molle esse debet, ne locum aegrum comprimat. item non magnum, quippe cum id celeritatem, quam in operationibus laudat in paruis acijs praeseferat. item in habenis, & fasciarum cruribus, & comprehensamentis. nominibus enim his appellat. nodi siquidem magni dependebūt, molestiamque insuper exhibebunt, dum uulnera nexu ipso quandoque attingent. apte autē, non magna dixit, cum posset parua dicere, propterea quod sicut magnum ob has quas dixi absurditates fugiendum est, ita paruum quoque non est admittendum. cum in operatione ipsa interiorū digitorum prehensiones facile elabatur, & in moram temporisque longitudinē rem inducat. saepe etiam e connexionē ob breuitatem effugiat, atque ita iterum nos operari circa idem cogat. quin etiā sit interdum, ut parui nodus innexus esse uideatur, & postea in depositionis tempore dissoluatur. consentaneum igitur est, ut & nimis paruum non secus ac magnum euitantes, quod mediocre est, sicut in omnibus ita hic quoque eligamus. id autem per alterius extremorum negationem interdum nominant. quemadmodum hic Hippocrates fecit, dum non magnum dixit. qui si non paruum etiam dixisset, idem potuisset exprimere.

11 Certo tamen. scientem in decliua & in acutum abeuntia deligationem omnem effugere, ut in superiore partem in capite, in inferiorem in tibia.

Si pro certo scientem certo scire dixisset, perfecta esse oratio ex se, & non pendere uideret, nunc uero suspensa esse adhuc uidetur. unde nonnulli cum sequentibus eam connectendam censent, ut integra huiusmodi euadat. certo tamen scientem in decliua & in acutum abeuntia deligationē omnem effugere: ut in superiore partem in capite, in inferiorem in tibia, deligare oportet dextra in sinistra, & sinistra in dextra, excepto capite. sed hoc

hoc nullam habere convenientiam uidetur. non enim propterea eiusmodi deligationes faciendæ sunt, quia nodus in decliuia & in acutum tendentia fieri consueuerit. sed alia de causa, ut deinceps ostendimus, dexteram partem in sinistras, & sinistras in dexteram deligare iubet. nā hoc certo scientē in decliuia & in acutū abeuntia fugere deligationē, eo usq; pendet, ubi inquit. insuper autem circumij cere oportet tum comprehensionis causa eorum quæ circa hæc sunt, tum reprehensionis uniuersæ fasciæ in quiescentibus, & celsioribus partibus corpori. & quæ sequuntur. quæ quidem ego paulo post explanans hoc idem manifestius declarabo. nunc cum præter ordinem interiecta hæc sint, per se ipsa sunt consideranda.

12 Deligare oportet dexteram partem in sinistras, & sinistras in dexteram excepto capite, id enim per processione est deligandū.

Huiusce præcepti maximus usus in fracturis est. circumducere enim semper est necesse in contrariam partem, cum in altera ulcus reperitur. si dextra pars affecta est, in sinistram: si sinistra, in contrariam. quemadmodum cum totum os per transversum fractum fuit, æquilibrem deligationē adhibere, plagulis ea figura quæ rotunda & circularis uocatur, circumiectis, consueuimus. quod igitur inquit huiusmodi est. deligare debemus dexteram partem affectam, ad sinistras fasciam circumducere, sinistras uero in contrarium ad dexteram. id autem fit, cum initium fasciæ in parte affecta ponimus, non supra fracturam quidem, aut ulcus planē, sed hinc uel inde. altera uero manu in contrariam simul astringendo circumducimus. ubi aut ad oppositam partē fasciā circumuoluta iam deuenierit, non amplius simili modo cōstringimus, sed ita tamen prorsus circumducimus, quoad circumuoluta in orbem fasciā suum initium repetuerit. quod ubi factum fuerit, partem eam fasciæ quæ illuc deducta est, supra initium quod manu altera continebamus, iniecit eadem manu firmiter detinemus. atq; inde alterā inuolutionē exordimur eodē modo quo in prima fecimus, cōstringendo & circumducendo in cōtrariam partem. postea circumuolutam fasciā ad initium similiter continemus, & rursus altera manu attollimus pari modo, ut prius astringendo, & circumducendo ad partem oppositam. neq; tantū membra longa, id est crura & brachia ad hunc modū solemus deligare, uerumetiam costas. si em ea quæ affecta est, in dextra parte fuerit, initio fasciæ ibi imposito in sinistram, sicut dictū est, conuoluimus. sin in dextra fuerit morbus, inde quasi progressum & uiam deligationis exorsimur in dextram partem deuenimus. caput autem ita in orbē circumligare non licet, propterea qd cōlū quod ei annexum est, impedit. quo circa in capite siue in dextra, siue in leua parte uisū sit, quod deligatione indigeat, deligationem per processione, id est per directum, adhibere cōsueuimus. fasciā uidelicet a uertice ad extremā usq; mandibulam deducta, atq; inde sursum reducta, deinde ite

ru ultro citroq; usq; in finē uel bis uel ter, si toties opus fuerit, conuoluta. finis autem in uertice, quæ sedes est est stabilissima, omnino collocandus est.

13 Cōtraria uero ex duobus initijs. quod si ex uno, ad id quod simile est in stabile deligandum est. ut est mediā capitis pars. & si quid aliud huiusmodi.

Duas sententias admittit hæc oratio. uel enim de omnibus partibus corporis, uel de solis capitis partibus intelligenda est. cum enim dixerit, excepto capite, id enim per processione est deligandum, postea de capitis partibus inter se contrarijs agit, quarum altera retro est, circa occipitium, altera ante circa frontem, quas ex duobus initijs deligandas censet. deligationes aut ex duobus initijs sunt, cum mediā parte totius fasciæ supra locū affectum collocata aequalis hinc inde pars in oppositum deducitur ita ut fines in frontē, ibi enim ita bilior occipitio sedes est, deueniant. at si de omnibus corporis partibus intelligere uelimus, contraria dicemus hic appellari alterutras partes simili modo affectas, id est uel dexteram et sinistras, uel anteriores, & posteriores. nam cum hæc simili modo affectæ sunt in fracturis quæ caulatim factæ appellantur, deligationes ex duobus initijs sunt faciendæ, quemadmodum diximus fieri in plagulis quæ asciatim circumuoluebantur. quod si ex uno initio deliges, inquit, hæc, ex similitudine deligationis quæ ex duobus fit, fasciā circumuoluens in stabilem sedem finem eius applicabis. instabilis autem sedis exemplum mediā capitis partē posuit, id in præsentia satis esse existimās, propterea quod paulo post totā hanc rem est accuratius tractaturus: ubi docebit, quo pacto finis deligationis fieri debeat, ut tota deligatio firma atq; immobilis conseruari queat. quod em inquit ad id quod simile est, de utriusq; tam de tota fasciæ distributione & uolutione, qd de fine eius est intelligendum.

14 At quæ mouentur, ut articuli, quæ parte quidē inflectuntur, sicut poples, qd minima ac succinctissime sunt obuoluenda, quæ distenduntur, ut patella, simpliciter & late.

Quam minima obducī lintea in poplite, & simili bus partibus iubet, et maxime succincta, id est in breue spaciū cōtracta & collecta. oppositam uero popliti partē cōtrario modo deligandum censet. contrario autē modo est, omnibus expansis, nullaq; ex parte contractis, quatenus fieri potest. omnia uero membra articulis connectuntur in flexu simili modo ut poples, in extēsiōne, ut patella, patellam autē quā *πυλιν*, id est molam hic uocat, *πυλιν* *πυλιν* nonnulli, alij *πυλιν* *πυλιν*, id est supergenualem appellant. in hac igitur latam atq; explicatam in iniici fasciā debere inquit, quæ totā ipsam cōplectatur. nisi enim ita fiat, uel in superiore, uel inferiore partem ob eius incuruationem lintea celabentur. popliti autē contractā fasciā obuoluī iubet, quippe cum locus is in latitudinē explicatam fasciā neq; admittere ualeat, neq; conseruari.

Insuper

15 Insuper autē circumijcere oportet tum comprehensionis causa eorū quæ circa hæc sunt, tum appensionis uniuersæ fasciæ in quiescentibus & cassioribus partibus corporis, ut est & supra, & infra genu.

Breues huiusmodi loquutiones laudandæ sunt, cum uno nomine sit, ut tota oratio clara euadat. quemadmodum hic, comprehensionis nomen totam orationem hanc declarat. cum dicimus finem deligationum in articulis firmiter contineri oportere quadam superabundante circumiecta obligatione extra dearticulationē. appensionis item uerbum, id manifestat. quomodo cura habēda sit, ne uel in decliuiā fasciā delabatur, uel recurat in incuruata & gibba, quæ ipse superius ἐπὶ ὄψι, id est in acutum abeuntia nuncupauit, ubi dixit, certo tamen scientē in decliuiā & in acutum abeuntia effugere deligationem. atq; hinc simul patet, recte a nobis dictum esse ea quæ hic dicuntur ab Hippocrate antedictis illis consentire, ac continuari quæ modo cōmemorauit, ubi uidelicet aiebat, certo tamen scientē in decliuiā & c. Adde q̄ breuissime idonea loca ubi fines fasciarū collo candi sint, duobus nominibus est complexus, quiescentium, & cassiorum partium. quiescunt enim quæcunq; extra dearticulationes sunt, ut in utriq; oisibus quæ sibi mutuo innectuntur, ut in genu pars uel circa femur, uel circa tibiā huiusmodi est. nam hæc quoq; cassiores sunt, quatenus humiliores. ita siquidem uocat partes quæ contrario modo quam eminentes sese habent, id est quæ sunt demissæ, & humiles. cassum enim omne, quod λαπαρόν dicit, humile ac depressum est. λαπαρόν enim, id est cassum uanum propriè ac uacuum significat, sicut etiam λαπαίρει uerbū quod est cassare, nihil aliud est quam exinanire. unde etiam apud Homerū ὁ λαπαίρει decassare, ubi inquit, Decassare altæ bene condita moenia Troiæ, urbem euacuare ac diripere significat. cassas quoq; id est λαπαράς corporis partes eas uocant, quæ inter iliorum ossa, & aduterinas costas intercedunt. postea omne quod depressum est, & subsidit, cassum & λαπαρόν uocant, propter ea q̄ quod uacuum est, depressum esse consuevit, translatione ab eo sumpta q̄d cōmuniter accidit.

16 Humeri deligationi ea quæ sit per alteram alam circumductio cōsentit. inguinis, quæ per alterum ile fit. tibiæ, quæ supra surā obuoluitur. quibus sursum elapsio abit, deorsum, quibus deorsum, e contrario appensum faciendū est.

Deligationis omnis quæ uidelicet per se, nō eorum quæ imposita sunt membro affectio continendorum causa suscipitur, scopi ac fines sunt, ut partem affectā sic ut conformata fuit immobilem contineat, sineq; inflammationem cōseruet. id quod in libro De fracturis satis edocuit. sed quia id praestare nequit deligatio, nisi ipsa prius stabilis sit, nec inferius aut superius dimoueat, iccirco fit, ut illæ membris & sanis circumducere fascias coga-

A mur: ut qua parte sursum ferri eam uerisimile est, appensio detrahat ad inferiora. ubi ne deorsum delabatur timemus, superius attrahat. in quibusdam etiā appensio quæ per oppositas partes fit, utilior est. quemadmodum in humero & inguine. in humero quidem non circum alterum humerum, sed circum alam, in inguine circum ile aduersum fieri obligatio debet. quippe cum neq; humerus, neq; clunis, sicut ala & ile, seruare & desinere obligationes firmiter queat. ile autē, id est κνημῖς, ut modo dixi, locus appellatur, qui est inter thoracem et os coxæ, propterea q̄ κνημῖς, id est cassum & uacuum, id est depressum est. perspicuum autē est consentire hic pro cōuenire & cōgruere esse sumptū, eo quod qui paciscuntur & consentiunt in honestis rebus non modo cōtrarium quicq; neq; agunt neq; dicunt ijs quæ pepigere, sed præstant omnia. sic sedes hæ legi deligationis obsequuntur, & congruunt simili modo quoq; in tibia cum facile effluere possit deligatio, utile est, si supra suram lineum circumducatur, in illis uidelicet deligationibus quibus complexi posteriorē carnosam tibiæ partē, quā γαστροκνημῖας uocant, necesse est. nam si iuxta malleolos deligandū sit, inde stabilitas ac firmitas cōparabit: cū inter duas prominētes partes fasciā sit collocata: habetq; infra extuberantes suræ ossis & tibiæ terminos, q̄s talos nō nulli non rectè appellat: supra uero ipsius carnosū tibiæ tumore.

17 In quibus uero hoc non est, ut in capite, his in planissima parte comprehensiones faciendæ. minimeq; obliqua deligatione utendum est. quoniam quod stabilissimum est, postremo circumiectum uel maxime ex rabunda continet.

Quibus membris neq; appositum quippiam tale est ut in tibia, neq; oppositum, ut in humero & inguine, in his qualem facere deligationem oporteat docet, nominatim capitis facta mentione. iubetq; in his in planissimo loco totius deligationis facere cōprehensiones. quod fit, cum finem ipsius neutram in partem declinantē rectissima terminatione seruamus, siue in frontē, siue in mediam partē capitis, ubi sinciput est finis enim fasciæ quæ ad mentum deducitur reduci apte in mediam partem capitis potest absq; ulla declinatione. at quæ orbiculariter circumducitur, in frontem simili modo neutram in partem declinatione facta extremum caput remittit. nam in circumductione posterioribus quoq; capitis partibus obuolui cōsuevit. quæ occipitiū est. quod inter collū & posteriorem caluariæ gibbū subdidit. propterea igitur dixit extremā fasciā cōuolutionē minime obliquā esse oportere, quia cum reliquis priores sæpe obliquas efficere cogamur, quo locus affectus quialias alijs in partibus reperit, circūtegi ualeat, fit, ut extrema cōuolutio nulla obliuatione circūiecta reliquis obliquas cōtineat. quippe quæ hac firmitate stabilitate immota etiā ipse permaneat. sicut in capite: sic uel supra uel infra genu animaduertendū est, ut extrema inuolutio planē recta absq; ulla de-

clinatione seruetur. at in inguine & humero ubi aduersas quoq; partes cogimur obligare, conuolutiones extremæ fieri orbiculares absq; ulla declinatione debent, per utraq; ilia, cum inguen, per utraq; alas cum humerus deligandus est. his consentienter in cubiti articulatione deligatio fit.

18 Quibuscunq; neq; comprehensio, neq; appensio apte adhiberi linteis potest, acijs coniectione aut confusione appensiones faciendæ.

Quod inquit huiusmodi est, in quibus partibus aut affectionibus difficile est linteis ipsis comprehensione capitis fasciæ, & reprehensionem facere, in his acijs aut circumiectis in orbem, aut finem fasciæ consentibus comprehensiones faciendæ sunt, quæ autem corporis pars eiusmodi sit, ut comprehensione & reprehensione linteis difficulter, acijs facilius admittat, neq; ego dicere cum reliquis ex planatoribus queo. quemadmodum tamē an sint aliqua quæ ralem deligationem non tolerant, ignoro, ita illud noui nonnulla esse in quibus uel minima affectæ partis motio dolorē maximū creet. quemadmodū non multo ante tempore cuidam contigit, qui ex casu adeo circa spinam dorsī afflictus fuerat, ut ne si minimum quidem moueretur, ferre magnitudinē doloris posset. qua ex causa cum detraheda ei esset tunica, coacti furimus nō eam exuere, sed omnibus dissolutis futuris quam plurimos adhibere qui totū hominis corpus detinentes sublime æquali ponderatione supra fellam latā porrectū subleuaret. quod ubi factū est, supra fellā imponi per latitudinē iussimus panniculū, qui superiectum lanæ hapsū haberet, idq; ita, ut spinæ suspensū hominis supponeretur. nosq; alterum lanæ hapsū oleo calido imbutū paratū habentēs, simulatq; tunica fuit detracta, celeriter spinæ circumiecimus, atq; hominē supra alterum subiectū collocauimus. atq; ita primū madefactæ lanæ, deinde siccæ, postea panniculī capita ad superiores corporis partes altrinscūs alterum attracta inter se futuris cōmisimus. Quod si nō futuris hic, sed acijs tantummodo uoluisset quispiam firmitatē deligationis efficere, ipsas primas omnium non post deligationē infra panniculū subiecisset. simili modo in partibus circa coxam, necnon circa femur, circa brachium item aliquando, & circa colli posteriorem partem operatio succedit.

19 Fasciæ mūdæ, leues, molles, tenues sunt

De materia fasciarum hic docet, quas mundas, leues, tenues, & molles adhiberi iubet. mūdās, ne si sordidæ sint, & aspritudine infestent, & prohibeant, quo minus uis infusorum humorū ad corpus possit penetrare, leues, ne locum affectū grauent, tenues, propterea quod quæ sunt huiusmodi, tum leuiiores et molliores etiā esse, tum infusiones facile transmittere consueuerunt. molles autem, ne locus affectus comprimatur. Euidēs præterea est, unumquodq; horum ad id etiā conferre ne inflammationi aliqua ea in parte excitetur.

20 Inuoluere utrisq; simul, & alterutris separatim exercere opus est.

Quod superius cum de omnibus quæ ad manuum operationē attinent, exercendis ageret, in uniuersum alterutris & utrisq; simul manibus operandum dixit, id nunc de sola inuolutione præcipit. talis enim manuum exercitatio ad celeritatē operationis, id quod est maximum in dolentibus, utilissima est. cum duæ uidelicet manus simul in deligationibus ex duobus iniitijs iniectis, altera tantū in reliquis fasciam inuoluit. quantū in his quoq; alterutris utendū est per uices sibi mutuo succedentibus. nam in illis quæ ex duobus iniitijs sūt, utraq; uno eodemq; tēpore simul operantur. cum enim mutuo sibi succedāt, altera circūuoluens fasciam præcipuum deligationis partem exequitur, altera ad ministerium huius utilis euadit.

21 Ad latitudines & crassitudines partium coniectans conueniente uti debet.

Præcipit ut ad latitudines & crassitudines deligandarum partium spectantes cōuenientem unius cuiq; deligationē inueniamus. nam cum superius dixerit, quomodo deligatio recte absoluat, cum docuit unde incipiendū sit, quomodo inuolui linteæ debeant circa partem affectā, ubi finis fasciæ collocandus, quo pacto comprehensiones faciendæ, qua ratione, nodis, & acijs utendū sit, animaduertendum est eum nihil de his quicquā dixisse. non enim ex latitudine aut crassitudine deligandorum membrorum quicquam sumptū superius est; sed ex affectione ipsā, & figura membri quod morbo afficiebatur. Nunc igitur conuenit, ut doceat quæ bona in deligatione eueniant, cum ex latitudine & crassitudine partium quæ deligantur coniecturam sumimus. ex his enim linteorum latitudo & crassitudo percipitur. uerbi gratia in paruo puero fasciis & longitudine breuibus, & latitudine angustis uti consentaneum est; in grandi iuuenē & longis & latīs. similiter & in alijs corporibus quæ inter magna & parua sunt, pro cuiusq; ratione modus seruandus. nam si pars deliganda & latitudine & crassitudine utrorumq; prorsus media fuerit, lintea quoq; efficiemus media inter ea quibus in magna, & ea quibus in paruo corpore deligando utebamur. si autem uel paruo uel magno propius accedet, pro rata eius portione fasciā uel augendo, uel minuendo immutabimus.

22 Conuolutionis capita dura, æqualia, sincera sint.

Cōuolutio utrisq; inest, fasciis uidelicet & prius quam ægrotantis corpori circumjiciantur, et cum deligatio circa affectum locū sit. capita autem fasciarum quæcunq; sint, utrorumq; sunt cōmunia. nam siue iniitia, siue fines fasciarum, siue utraq; capita hic appellari intelligamus, siue etiā extremas per latitudinem oras, omnia hæc cōuolutionibus utrisq; fasciarū cōmunia sunt, cū per se solē sese habēt, & cum corpori circūuolunt. hoc enim licet inter explanatores huius libri in controuersia uenerit

nerit, difficile dictum non est: quippe cum de conuolutis per se, & de circūiectis corpori sermo hic manifeste sit. quare de omnibus terminis intelligendum censemus. non ut nonnulli de extremitatibus tantum per longitudinem, aut alij per latitudinem. illi de solis capitibus fasciarum per se, hi de constrictione conuolutionis dictum esse hoc asserentes. sed debere fasciam per se etiam esse constructam anteq̃ corpori iniiciatur, perspicuum est. ita enim fit, ut facilius sit, aptiorq̃ ut suscipiatur, quippe cum tenuior reddita sit, tenuioresq̃ complicationes ex eo habeat, q̃ extensa atq̃ expansa cōuoluta in spiram teretem fuit. constringi si quidem aliter nequit. nam capita sola constringi oportere, falsum proculdubio est. non enim sola capita, sed tota fascia constructa esse debet. Cum igitur ambigua adeo res sit, quid etiam mihi uideatur, iam dicam. Capita accipienda sunt pro omnibus fasciæ extremitatibus siue longitudinem, siue latitudinē consideremus. sed ipsa tamē dura hic non proprie esse dicta existimandum est, ac propterea obscuriorē orationē euasisse. nam cum superius dixerit, fascias mundas, leues, molles esse debere, quod fieri potest, ut duras easdem esse hic fuisse: quocirca ita usum esse cum hac duri appellatione existimari, prout rei cōuenit, de qua loquitur. sæpe enim contingit, ut in extremis linteorum partibus, quæ quatuor sunt, duæ in longitudine, in latitudine itē duæ, uel stamē solum sine trama, uel trama sine stamine propendere reperiat. uel alterum horum laxius extare, uel aliqua in parte inherere, in alia supergredi conspiciat. in quibus sanē linteis molliora capita sunt, quam in ijs quæ in extremitatibus stamen æque subtegmini coherens, coniunctumq̃ habent. hæc enim quatenus mollitudini aliorum contraria uidentur, dura possunt appellari. melius tamē erat, si non mollia, dixisset, quemadmodum superius de nodo agens, non magnum eum esse debere asseruit. quæ enim in medio duarum immoderationū constituta sunt, negando, ut dixi, utramlibet immoderationē significare consueuerunt. qui igit̃ nihil aliud ne mediocriter quidem probabile habet quod hac de re dicat, ita probabilissime intelligere duritiam capitum posset; præsertim cum de errore hoc, qui, ut dixi, in linteorum capitibus contingit, nullo alio in loco loquatur Hippocrates. eque aut̃ id hic significat quod omni ex parte prorsus simile est. id uero est, si nulum inter ipsa capita neq̃ durius, neq̃ latius, neq̃ mollius, neq̃ angustius sit, neq̃ deficientē partem aliquam aut corrosam habeat. quod in prætexturis cōtingere aliquando solet. at uero sinceritas in capitibus est cum extēsa simili modo omnibus in partibus sunt. ut non alicubi explicata atq̃ expansa, alicubi duplicata & inuoluta reperiantur.

23 Quæ uero futurū est ut decidant, peiora cito decidentibus. ea autem, ut neq̃ comprimant, neq̃ decidant.

Per solacissimum hæc loquutio prorsus est, quomodocūq̃ eam intelligere quispiam uelit. siue e-

nim decidentibus, id est *ἐπεσόντων* attici in morem accipiamus, pro *ἐπεσόντων*, id est decident. ut est illud. dixit in curriculum prodeuntibus, id est prodeant. siue absolute ita positi esse ablatiuum hunc casum dicamus, neutro modo euitare solēcū poterimus. nam si priori modo interpretemur, talis euadet oratio. quæ futurum est ut decidant, peiora cito decidant. si secundum, sic: quæ futurum est ut decidant, peiora sunt cito ipsis decidentibus, id est si cito ipsa decidant. melius tamen erat, si in hunc modum scriptū fuisset, quæ futurū est ut decidant, peiora sunt cito decidentia. perspicuū tamē est sicut in alijs multis ita in hac quoq̃ lectione cōtingere potuisse, ut uel ipse autor aut detractio, aut additione, aut immutatione unius aut duarū literarum in scribendo errauerit, sicut sæpe euenit. uel à primo librario error fuerit cōmissus, dū quæ aut obscurioribus literis fuerunt exarata, aut chartæ corrosione alioiū aliquo casu deleta ac confusa euauerunt, percipere planē non potuit, sed cōiectura usus prauē descripsit. accedit quod nonnulla etiam errata ex transpositione quam *περὶ γαμμουλομῶν* nominant, antiquitus inuoluerunt, dum immutat̃ pleriq̃ ex ueteri literatura in recentiorem. ex his enim omnibus multi in exemplaribus errores emanarunt. Sed de his satis sit semel dixisse. longum enim esset, si in unoquoq̃ errore eadem repetere semper uellemus. At enim si errore uacare lectionem hanc concedamus, quæ est, quæ futurum est ut decidant peiora sunt cito decidentia, querendum est, de quibus hoc dicatur: de membris ne corporis, an de fascijs, an de ijs quæ curandi causa affectis locis imponuntur, cuiusmodi sunt cataplasmata atq̃ alia medicamenta, linamenta, & laquei. præter enim tria hæc nihil aliud esse eiusmodi uidet̃, ut decidere ab ægrotantibus corporibus queat. nam & de unoquoq̃ horum ab exemplatoribus huius libri dictum est. at si singulaalicui probabilia uisa sunt, omnia etiam sanē uideri potuerunt. ac mihi quidē linamenta non absurde uidentur posse hic intelligi quæ sæpe uel sola iniiciuntur, ut in sanguinis eruptionibus, uel medicamentis quibusdam illita imponuntur, uel extrinsecus loco operimenti ipsis superdantur. debent enim ea quemadmodū etiā laquei prorsus decidere, non tamē cito. sed ubi exquisitè suppurato mēbro sanguinē fundentibus uasis producta accreuerit caro. sic etiā crustæ quæ aut ex candentibus ferramentis, aut ex adurentibus medicamentis extiterunt, cito decidere non debent. Quin etiā multa medicamenta, ut sunt liquida, quæ putrescentibus membris instillantur, quæ item insperguntur arida, quæq̃ supra lienarias affectiones, & intercutaneas aquas imponuntur, si non celeriter decidere rint, mirū in modum profunt. necnon quæ supra alia membra, aliaq̃ uitia iniiciuntur ex ijs quæ *ἐπεσόντα*, id est glutinosa, seu glutinum habentia appellantur medicamenta, multū iuuant, si aliquandiu supra locū affectū immorentur. nam in fracturis, & alæ luxationibus frequenter cōtingentibus, in podagris, coxendicibus, renalibus morbis, om-

nibusq; articularibus, dolore item capitis, alijsq; non paucis maximum in medicamentis si non cito deciderint, presidium experti sumus. Sed medicamenta quidem, si sint ex ijs quæ glutinosa appellantur, propterea qd ita corpori adherent, atq; agglutinantur, ut difficulter auelli queant, nulla extrinsecus deligatione indigent. alia uerò decidunt, nisi fascijs contineantur. de quibus nunc sermo ipsi est. inquit enim, ea autem ut neq; comprimant, neq; decendant: ac si ita diceret. quæcūq; medicamentum utile est ut non cito decendant, ea deliges ita necesse est, ut neq; affecta pars à deligatione comprimatur, & ipsa firmiter contineantur. contrari enim & non decidere eandē uim habent. Ac de ijs quidem quæ extrinsecus imponuntur, satis dictum sit. nunc de partibus corporis uideamus, an in his quoq; uerum sit, quæ omnino futurū est ut decendant, ea non cito decidere oportere. nonnulli enim falsum esse opinantur à putrefactis partibus decepti, quæ quo citius excidentur, eo utilius est. quod quamuis uerum sit, non obstat tamē quin illud quoq; esse uerū censeatur. quippe cum longe differat futurum esse ut decingat quippiam, & opus esse ut excidat. sæpenumero enim euenit, ut osium rescissa quædā fragmenta, ac squamæ post aliquod tempus decendant. meliusq; est, si à natura ipsa expulsa paulatim id quadam temporis mora consequantur, quàm si festinemus ea uel medicamentis irritando, uel instrumentis euellendo inde resolvere. quæcūq; enim repente uireuellunt fistulares cauitates efficere cōsueuerunt. quæ autem succrescente uel callosa quadam materia, uel carne excidunt, ea ubi exciderunt plenum statim locum relinquunt, qui postea cito sanescit, cicatriceq; inducit, si uel mediocriter exiccās uel astringens medicamentū aliquod imposuerimus. quin etiam neruosa aliquæ particula, & membra nec sæpe excidunt, sine periculo quidem si paulatim longo tempore suppurarint: si uero uiolenter aut medicamentis uim inferentibus, cuiusmodi acia sunt, tentent, aut instrumento aliquo, uel digitis etiā nostris auellant, reliquis membris malū per contagionē transmittunt, ita ut & inflammationē patiantur plerumq; ægroti, & febricitent, & delirent, in cōuulsionēq; incident. Sed iam ad reliquum & tertium illorū quæ decidunt, genus deueniamus. id autē est, ut nonnulli opinati sunt, fasciæ. quas dicitur cum sunt laxæ, & effluxuræ sunt in longiore tempore utilius decidere, at id falsum est. nō enim melius est, ut quæ male fuerunt circumdata, longiore temporis mora delabantur, sed qd citissimè. imò neq; expectandū est, ut decendant, sed celeriter dissoluendæ, ac rursus apte deligandæ sunt. unde quidam ex ijs qui ita explanant, fatētur quidem melius esse ut cito laxæ fasciæ decendant. sed nisi tamē aliquid aliud extrinsecus subintelligant, deficiens oratio est. ita enim esset absoluenda: quæ futurū est ut decendant, peiora sunt cito decidentibus. id est qd quæ cito decidunt, ea quæ longius in tempus cōposita permanent. quod licet etiā concellerimus, ita decidere de fascijs dictū esse proba-

Galen.

A bile non est. quis namq; est qui tantū tempus sibi expectandum censeat in ijs quæ sponte sua delapsa sunt, cum possit & celeriter solui, & rursus bene deligare? Alij autē in contrariam sententiam uersi, uera quidem dicunt, uerba tamen ipsa uiolenter detorquent. quo modo enim uiolentū non est, si in hunc modum interpretemur: quæ futurū est ut decendant, peiora quidē sunt ijs quæ non decidunt. melius tamen ipsis est, ut celeriter decendant. ut uidelicet priorem partem huius orationis quæ est: quæ futurū est ut decendant, peiora una sententia circūscribamus: ac deinde ab altero principio legamus, cito decidentibus, hoc est cito decidunt. Sed hæc est, ut dixi, uiolenta interpretatio ex genere loquutionis, qd inarticulatum uocamus, extorta. præter qd falsum in uniuersali hoc est, quæ futurū est ut decidat, esse peiora. multa enim sunt quæ bene et utiliter decidūt. Quocirca melius est, sicut dixi, ut Hippocratis hanc orationē, omīssis fascijs, ultimaq; hac expositione, de ijs quæ extrinsecus imponunt, & omnibus corporis particulis quæ decidere debent, dictam esse intelligamus.

24 Quæ autem sequitur deligatio, & subligatio, aut utraq;.

Subaudiendum est hæc sunt. deinde legenda ea quæ sequunt. id est subligatio quidē in causa est, ut quæ uel abscesserunt, attrahantur, &c. usus autē est hic uerbo sequi pro appetit, & affectat, & coniecat quæ sanè omnia eam uim habent, ut significet, quānā uires, & quæ opera deligationis sint. appello autē opera nunc non operationes, sed effecta. sicut adificatoris domus, fabri lectica, textoris uestis est. cum uero in deligatione ac præcipue ea qua in fractionibus uti cōsueuimus, duæ ante plagulas fasciæ assumantur, & duæ aliæ post, proprium nomen duabus prioribus imposuit Hippocrates, subligamina seu subfasciationes, & quæ ex ipsis sit deligatio, subligationē uocans. quæcūq; uero & quæ proprie subligatio, & quæ cōmuniter deligatio nominatur, efficere ualeat, ex ipso deinceps hic docente audiemus. oportebat quidē dici prius qua de causa deligatio à medicis fieret, sicut in principio distinxit. cū dixit, partim ipsam mederi, partim medentibus inferuire. quo modo item adhibita unūquodq; ex antedictis curaret, ut ad scopum curationis spectantes conuenientem unicuiq; deligationem inueniremus. qui quidem scopus ab ipso qui curandus esset, morbo innotesceret. Hippocrates tamē non ita scripsit, sed ubi qualis debeat esse deligatio, hucusq; differuit, ad opera & uim ipsius declarandam descendit.

25 Subligatio quidem in causa est, ut uel quæ abscesserunt, attrahantur, uel quæ expansa sunt, contrahantur, uel quæ contracta sunt, distrahantur, uel dirigantur distorta, uel contraria.

Quæ abscesserunt, hic appellat omnia, quæcūque, cum corpus secundū naturam sese habet, uel unita aliquibus alijs partibus sunt, uel eas attin-

tom. 6

L gunt

gunt: cum præter naturam affectum est, unionem uel contactum non amplius seruant. unio in omnibus fracturis, ulceribus, rupturis, contusionibus, cõtractus in abscessibus, quæ *ἀρσενικὰ* dicuntur, sinibus, inflationibus, & tumoribus interruptus est. expansa autem uocat, quæ plurimo intervallo inter se distant. id quod duobus modis contingit. uel in toto, uel in labris tantummodo. scopi igitur curationis sunt hi in abscedentibus, uidelicet attrahere, in expansis contrahere, in distortis dirigere. comune tamē omnium est corrigere & dirigere. *ἡ γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς ἀσθενείαις* de omnibus dicere consueuerint, quæ electa quocūq; modo in se conuenientē statū restitunt. atq; hi fines proposti subligationis sunt. uis aut ipsius non horum tantum effectrix scoporum est, uerum etiā quandoq; cõtrariorum. cum bene adhibetur, horum: cõtrariorū, cum male. merito igit in fine orationis subiunxit, uel cõtraria: quippe cū propositū ipsi fuerit quid possit efficere subligatio dicere, non de sola bona subligatione tractare. nam in principio etiam huius orationis, ubi inquit, quæ autē sequi deligatio aut subligatio, aut utraq; de omni deligatione, non de optima tantum sermonē instituit. q̄ si de bona etiā sola dictū esse hic uelit quispiā, quod in fine positum est, in hunc sensum erit accipiendum. ut sicut præter naturam alia sunt abscedentia, alia expansa & aperta, alia distorta, ita alia affectiones his cõtrariæ sint. nam cum totum corpus conuenientiam & æqualitatem in se habeat, morbus omnis ex eius corruptione exoritur. si igitur quæcūq; cum naturalē cõstitutionē habet, unita quibusdā sunt, uel quædam attingunt, quando uel unionem uel contactum amiserunt, ea ægrotare, & præter naturam esse affecta dicimus: simili modo quæ neq; unita sunt aliquibus, neq; attingunt aliqua, si uniantur, & contingant, in morbum inducunt. hæc igitur contrariam correctionē requirunt, & contrarios scopos habent. sed huic repugnare ea uidentur quæ distortis opposita sunt, quæ uocantur recta. nam quantum antedicta ratio postulat, hæc quoq; distorquere oportebit. id quod non amplius bonæ deligationis, sed errantis & malæ est opus. at si quis meminerit, quæ de femore & brachio dixit Hippocrates, is præter naturā in his reëctitudinem esse cognoscat, in quibus pars exterior & anterior incuruata natura est. quod cū quidam oblitus fuisset, femur uel brachium caulatim fractum primum quidem manu in reëctitudinē cõfinxit, deinde in ea figura deligādō referuauit. sed uicī naturalī formæ olisium animū aduertit, cognouitq; eam esse seruandam, cum nondum fracturæ illi callū increuisse offendisset, aqua id multo oleo admixto fouisit, postea fortiter extensum, primum fregit eo modo quo a principio erat, deinde in naturalī habitu confluxit, tum in eo naturæ callo cõferruminandum cõmisit. ut ita uerum sit, non solū ignaros & malos medicos ex prauis deligationibus imprudenter, uerum etiam optimos studiose contraria antedictis bonis circa ægrotantes efficere. dum quæ præter naturam duplicata sunt in

contrarium admovent, & quæ coniuncta sunt, & coaluere, dissolunt, & distrahunt. quippe cum in nonnullis ex coeluratione & digitos coherentes, & labra, & palpebras interdum uideamus, antedictarum igitur affectionū curationis scopi hi sunt, quorum unicuiq; accommodatam deligationem deinceps docet. sed prius tamen qualia præparanda lintea sint sequenti oratione declarat, cū inquit,

26 Lintea præparanda sunt leuia, tenuia, mollia, munda, lata, quæ neq; confusiones habeant, neq; extantias. & sana sint ut ferre extensionē possint, & paulo amplius. non arida, sed insuccata succo, cui singula commixta sunt.

Dixerat superius de linteis, sed non plene. ut pateat nihil tunc ad editionem exquisitè fuisse absolutū, ne a filiis quidē. sed post Hippocratis mortem in eodem libro De iisdē uel breuibus uerbis dicendum sibi censuisset nemo. sed uel quæ hic ponuntur, detraxisset, uel quæ superius dicta sunt. superius enim ita scripsit, ut uidimus, fasciæ munda, leues, tenues, molles sunt. hic uero adiungit latas etiam easdem esse debere, atq; eiusmodi, ut neq; confusiones, neq; extantias habeant, sanasq; item non eatenes tantum, ut si uolentius intenduntur, rumpi nequeant, sed uiolentiam quoq; diffidentiam tolerant. hoc est ualida & robusta sint, quo firmitus continere ac stabilius possint. non habere autem confusiones inquit, quæ inæqualiter cõcurrant. neq; eas, quæ uocantur extantia, id est extantes partes in textilibus, atq; oblongæ eminentiæ interdum dedita opera, interdum temere ita euenientes, quandoq; ex ipso subtegmine, quandoq; è purpura intertextæ, ut in ijs quas prætexas uocant, uidere licet. cuiusmodi omnia mulieres ubiq; efficere consueuerunt. cauenda igitur hæc omnia in fasciis esse inquit. Cum autē lata debere esse lintea dicit, hoc eorum est, quæ non absolute, nec sine respectu enunciant. nam cum ad angustia deliganda proponuntur, posset quispiam ipsa, si ad ea quæ supra modum sunt dilatata comparari, calumniari: si ad moderata, eodem modo. quicquid enim a moderato uariat siue additione, siue detractiōe, prauū id est. de tenuium & leuium & mollium & mundorum usu dictum superius est. quod uero in fine ait, non arida, sed insuccata succo cui singula cõnutrita sunt, id etiam de linteis dicitur. quæ autem ratio præcepti huius sit, obscurum nō est. censet enim ipsa in nulla deligatione dura esse assumenda, sed insuccata & imbuta succo, cui singulæ ex affectionibus quæ curandæ sunt, sunt cõnutritæ, id est assuetæ, accommodatæ, & cõuenientes. cerato siquidem liquido simplici, & picato, & uino nigro austero, in libro De fracturis & articulis irriganda lintea esse inquit. nam sicca præter q̄ quod utilitatē quæ ex madefactione euenit, nullam præstant, cõstipant insuper partes supra quas imposita sunt, caliditatemq; in ipsis augent, atque ob id humore ex uicinis locis ad affectam partem eliciunt

eliciunt. id quod maximum esse malum ad tumorem ortum omnibus patet.

27 Atque ea quidem quae abscesserunt, ita ut suspensa sedem attingant, non tamen premant. incipiamusque à sano, & ad ulcus finiamus. ut quod subest, emungatur, aliud uero quippiam non colligatur.

Siue ossa fracta, siue cohaerentia abrupta, siue uulnere aliquo magno illato partes praeter naturam abscedant, ea cogenda & coaptandae inter se sunt eo usque ut attingant se, non tamen comprimant. nam quae ita preesse apponuntur partes, dolorem, inflammationemque excitant. maxime autem de ulceribus qui uocatur sinus, seu uentriculi, causa exempli, sermo ipsi hic est. id quod in sequentibus manifeste declarat. sed prior tamē pars huius orationis quae est atque ea quidem quae abscesserunt, ita ut suspensa sedem attingant, non tamen premant. communis esse ad reliqua omnia etiam potest, quae à naturali contactu, uel coalescentia recesserunt. reliqua uero, quae deinceps sequuntur, ubi inquit incipiamusque à sano, & ad ulcus finiamus. de ulceribus dicta manifestissime sunt, quibus & fanies euacuari, & nullus humor affluere tempore conglutinationis debet. id autem fit, cum fundum ipsius sinus eatenus comprimimus, ut non collidamus, & paulatim usque ad os ipsius deligatione relaxando perducimus, osque ita apertum in figuratio-
ne ea, quae deorsum uergat, cōseruamus. sinus sanē cum purgae uolumus & cōglutinare, hoc modo deligamus. at in summi humeri auersione non ita, sed eleuatā eius partē uolēter deprimimus, & cōgendo compellimus. nihil enim ex huiusmodi collisione euenire mali potest. sicut neque in fracto iugulo, quando altera eius pars maior multo est, tametsi minus in hoc quoque quam in summo humero comprimere solemus. in alijs uero fracturis partū acminum comprimimus, cauentes ne inflammatio oriatur. atque ego quidem de omnibus quae abscedunt, disserui. at Hippocrates de solis sinibus, ut exemplum afferret. in quibus moderata deligatione utendū esse manifeste declarat, cum inquit ita ut suspensa, id est ea quae abscesserunt, sedem attingant, sed non premant. sedem appellans abscedenti corpori subiectam partem. cui quod applicat firmari ac considerare proculdubio debet. prius enim quam pars altera alteram prorsus attingat, uniri inter se nullo modo queunt. unio autē fit, si se absque allisione contigerint. perspicuum autē est non abolere quempiam consilium fuisse, ut sinus qui cōglutinandi sunt, ita deligentur. quippe cum inflammatione prius uacantes, cum puris & siccis reddere, sique carnes forte contabuerint, alere debeamus. adde quod neque rupturas & cōtusiones quae ex genere ulcerum & sinuum sunt, statim ubi exiteret, hac deligatione curamus: sed posteaquam inflammatio sedata ipsis fuerit, humiditasque exiccata. utraque enim hae continuitatis solutiones sunt in carnea parte effectae, unā cum sanguinis quadā in mediam regionē affluxione. id quod abscessus

& sinui cōmune est. quoad enim pars ita affecta in exteriorē summam oclusa est, atque os nullū habet, abscessisse quidem ipsa dicitur, affectio uero abscessus proprie, id est *ἀπόσπασμα* uocatur. at ubi aliqua ex parte aperta est, ut qui continetur humor excernatur, non amplius abscessus, sed sinus iam appellatur. Quocirca omnia huiusmodi uitia deligatione quidem semper, sed non simili indigent. cum enim ad est inflammatio, neque opus prorsus prima ratione & per se deligatione est. sicut etiam cum suppuratio fit. Cum sinus uero iam factus est carne plenus, mediocris admodum deligatio est adhibenda, ita ut sedes abscedētia minime attingat. per os enim purgantia medicamenta & aperientia insinuantur sunt. at ubi iam eo peruenit, ut conglutinatione requiratur, ea quam nunc dixit Hippocrates, deligatio est accommodata. Haece necessario mihi scribenda existimaui, ne quis locū hunc praetere intelligens omnes sinus ita deligandos censere Hippocratem arbitraretur. nam sicut demonstratum est, non omnes sunt deligandi, sed illi tantū, qui nullo alio malo infestantur, neque inflammatio ne, neque carnis tabe neque sorde, neque humore aliquo qui in ipsis continetur. Qui sanē uniformem ac olam sui curationem requirunt. Ceterum de huiusmodi distinctionibus in libris De medendi ratione satis dictum à nobis est.

28 Deligare oportet recta quidem in rebus, obliqua oblique in figura infatigabili, in qua neque constructio, neque abscessio fit, ex qua cum in appensionē uel positionem transeunt, non mutantur. sed similia haec, musculos, uenas, nervos, ossa habeant, & disposita, & bene detenta sint.

Non partes affectas corporis rectas & obliquas nunc uocat, sed abscessus ipsos: de quibus in sinus exemplo haec docet. qui rectus ne an obliquus sit, ex longitudine partis in qua est, spectatur. rectum enim decliuem intellige, obliquum, qui eiusmodi non est. rectum siquidem sinum appellat, cuius os in inferiore parte, fundū in superiore est. obliquū, qui in latere declinat. sunt tamen contrario etiam modo sinus, quibus deorsum fundum, sursum os uergat. sed nos his fundum, quo facilius sanari exitus pateat, aperimus. quod si non prorsus in inferioribus corporis partibus plaga reperitur, sed in latere, eam ampliari scalpello cōsueuimus. figura autē membri & situs, & modus deligationis esse eiusmodi debet, ut ad excernendam sanem idoneus sit. tāta enim in his figurationis uis est, ut nos saepenumero plagā, quae superius esse uidebatur, ut inferius esset, immutata figura fecerimus. nam cum in femore sinus esset, cuius os prope inguen, fundum iuxta genu erat, cum figuratione ita curauimus, ut genu altius inguine detineretur. id autē puluino molli popliti subiecto facile & sine ullo dolore fieri potuit. eodem modo sinus in posteriore carnosa tibiae parte poplitem uersus ora habentes sanauimus, crus eo habitu collocātes, ut altior

poplite pes extaret. cubitum item sinu laborantē sepe simili ratione ad sanitatem perduximus, eum ita mitella iniecta excipientes ac suspendentes, ut manus gibbo cubiti esset superior. at cum gibbus ipse ita patitur ut à superiori parte à brachio, ab inferiori à cubito sinus contingatur, maxime idoneus habitus is quem diximus, est, quo gibbus ipse cubiti humilior utriusq; ossibus, brachij uidelicet, & cubiti redditur, quo in casu duabus fascijs utimur, utriusq; ad os & foramen sinus quod in gibbo est, desinentibus, incipientibus uero utrinq; à sana parte. siq; sinus sit plane rectus, rectā deligationē neutram in partem declinantem adhibemus, perinde ac si fractum brachium deligandū sit. similisq; modo deponimus. at si in obliquum declinet, deligatio quoq; sinus ipsius declinationem imitari debet: eamq; figurationem, ut effluere sanies queat, qua enim figuratione depositurus affectam partem es, in ea quoq; deligationem iniicias, sciens maximum inde euenire damnum solere, cum iam deligata in alterum habitū transformantur, quippe cum necesse sit, ut cum id sit, nonnulla quæ incuruata erant, extendant, alia uero quæ erant depressa attollantur. efficietur igitur, ut sicut quæ intumuerunt, à fascijs comprimantur, sic quæ subdere laxata ibi fascia nequeant contineri. de ijs quæ comprimuntur constrictionem, de laxatis abscessionem dixit Hippocrates, in ea figura accomodatam sinui deligationem nobis faciendam censens, in qua neq; cōstrictio, neq; abscessio sit. nam si ad solum deligationis tempus respicientes obliquum sinum oblique deligemus in eo habitu qui in depositione, aut appensione seruari non possit, sed immutandus sit: aliæ deligatæ partes constringentur, aliæ laxabuntur. quæ autem partes in habitus mutatione sinum immutēt, ipse nominatim exprehsit. cum inquit, musculos, uenas, nervos, & ossa, quippe cum hæc tantummodo sint, quæ tumorem in corpore efficiant. uenarum autem nomen non tantum eæ quæ uenę nunc appellantur, sed arteriæ quoq; ex ueteri consuetudine intelligenda sunt. atq; hæc totius orationis sententia est. cuius uerba nonnulla licet non admodum obscura sint, non ab re tamen erit, si breuiter explicetur. Appensionem in manu uocat eius ubi deligata fuit, depositionem, cum lata mitella totus cubitus appensus excipitur. positionem uero in crure. perspicuum tamen est appensionem significato positionis tanquam generi subijci. in fine item subiungens *ὑποκατα*, id est disposita, quæ bene deposita sunt, *ὑποκατα* id est bene detenta ea quæ bene accepta atq; appensa sunt, uocat, illud ad crura, hoc ad manus referens.

29 Appensa uero esse debet, uel posita in infatigabili habitu, qui secundū naturā sit.

Infatigabile id est, quod fatigationem & dolorem non affert, & secundū naturam diuersum minime est, sed unum & idem. quod quid sit & in libro De fracturis satis ab Hippocrate dictum est, & nunc etiam loco suo dicitur.

30 At in quibus abscesserit, contraria.

Nonnulli legunt, in quibus non abscesserit cum negatione. & ita exponunt in quibus abscesserit aliquid, antedictum modum deligationis adhibemus. in quibus uero non abscesserit, contrarium. nam si antedictum fuit, ut à sana parte incipientes in ulcus desinamus, relaxando subinde cōpressio nem: contrariū erit, ab ulceratis & fractis incipiendo ad inferiorem partem relaxando descendere. at qui sine negatione legunt, dicunt iubere Hippocratem, cum uolumus ea quæ præter naturam coniuncta sunt, & coheserunt, abscedere & separari, antedictum deligationis modum immutare. nam cum uolumus ea, quæ quocūq; modo inter se coniuncta coheserunt, dissiungere, debere nos contrarium in modum uti deligatione perspicuum est, in magnis item uulneribus plerūq; in quibus uel cum ima pars aperta atq; inconglutinata permanferit, summa cutis consolidata coaliuit, uel summæ oræ inter se duplicatæ coniunctæ ita sunt, ut altera alteri infederit: in fracturis quoq; distrahenda ac dissiungenda esse constat, quæ commissa sunt, cum in ima parte nō secus atq; in uulneribus fracti ossis capita non coeunt. adde quod in illis quoq; ossibus idem sit, quæcūq; sinus, & fistulas alicuius momenti intus habuerint. At enim sicut hæc per se utilia esse scimus, ita nunc ut non recte dicta reprehendi merito possent. quippe cum nullo modo cum Hippocratis uerbis cōsentire uideantur. quæ inquit in quibus abscesserit contraria non enim idem est si dicamus in quibus abscesserit, & in quibus abscedere uolumus. quocirca debebat hi qui in hunc modum explanāt, sicut priores illi, adiuncta negatione suæ sententiæ cōsentientem lectionem faciebant, ita ipsi quoq; scripturam immutare, atq; inde eam pro suo arbitrio interpretari. cum uero eam ita sicut est, reliquerint, alienam à uerbis explanationem attulerunt. non igitur de ijs quæ abscedere uolumus docere hic Hippocratem censendum est, in sequentibus enim id faciet, sed de ijs quæ abscedunt, & nondum integre abscessere, sermo ipsi est: uel de ijs etiam quæ perfecte abscessere, sed nondum tamē eruperunt in sinum. quippe cum hæc dolore sedante, & pus mouente curatione primū indigeant, quoad ad id emittendum ora aliqua aperuerint: deinde ubi uid effectum est, si aliqua inflammatio non infestetur, liberanda, tum exiccanda, & carne, ut dixi, repleda sint: postea cum iam solus sinus relictus est nulla alia affectione mala adiuncta neq; inflammatione, neq; sorde, neq; humore superuacuo, neq; carniū defectu, postremam sanationem, ac cōglutinationē suscipere debeant. non esse itaq; mirum debet, si iubet, ut contraria in ijs quæ abscedunt, faciamus. quicūq; enim non negligenter in artis operibus est uersatus, optime nouit, in abscessibus qui ad maturitatem perducī queunt, non esse inutile, ut nihil eius qui adhuc suppurat, humoris excernatur. nam si intus maneat, sit ut reliquus ei melius, faciliusq; accedat. quocirca pars affecta, quantum

quantum ad morbum ipsum attinet, neque ulla pror-
sus indiget deligatione. quæ tamen eatenus ad-
hibetur, non ut curationem ullam afferat, sed ut
curantibus inferuiat, atque opituletur. abscessum
igitur à sinuum curatione diuersa curatio est. illis
enim ut nihil humoris effluat donec perfecte ma-
turerint, his ut nihil intus remaneat, per quam u-
tile est. illorum nullum esse os, hos apertos esse con-
fert. quæ abscedunt præterea cataplasmatibus hume-
stantibus & calefacientibus maturanda: sinus ual-
de exiccantibus & purgantibus sicci & puri red-
dendi sunt. adde quod sinibus antedicta deligatio
medetur. in abscessibus, ut alijs medentibus infer-
uens assumi consuevit. At uero Asclepiades to-
tam horum uerborum sententiam de deligationi-
bus esse intelligendam censet, in hunc modum. de-
ligare oportet in eo habitu in quo neque constri-
ctio neque abscessio sit. hoc autem totum secundum
naturam est. at in quibus deligatio abscesserit, in ijs
contraria age, id est in contrario habitu deligatio-
nem adhibe. hoc est in quo habitu partis deligata
fascia abscesserit, in contrario ei habitu deligatio-
nem facias. uerbi causa, si extento cubito brachium
deligatum non permanet, sed laxatur, contrariam
figurationem experire, atque in eam rursus deliga. Co-
traria autem figura erit, si cubitus inflectatur. quo-
niam autem crurum habitus secundum naturam
accommodatus est in extensione, si inflexa cura de-
ligaris deinde extendere ea iussis, efficietur ut
musculus alium in locum abeuntibus fascia absce-
dat. quapropter contrario habitu, id est extensa tibi
erunt deliganda, in quo uidelicet etiam deponen-
da sunt. atque hæc tibi Asclepiadis sententia est. no-
strum uero iam est, ut ad ea quæ sequuntur, expla-
nanda descendamus.

31 In quibus uero expansa contrahere
oportet, reliqua quidem eadem fiunt, ex mul-
to tamen quodam spatio coactio, & sensim
facto progressu compressio facienda est: mi-
nimum primo, postea magis. terminus, qui
maxime facta sit, est contactus.

Memoria repetenda nobis sunt ea quæ de sub-
ligatione dixit ab eo principio ubi ait, subligatio
quidem in causa est, ut uel quæ abscesserunt, attra-
hantur, uel quæ expansa sunt, contrahantur, & cæ-
tera huiusmodi. ita enim fiet, ut orationem hanc de-
pendere à superiore intelligamus, in hunc modum.
in quibus autem expansa contrahere opus fuerit,
reliqua quidem eadem agemus, ex multo tamen
spatio coactionem faciemus, & cætera quæ deinceps
subiungit. expansa autem seu aperta ea uoca-
re hic Hippocratem censendum est, quæ præter
quam quod distat amplius quam par sit, utriusque la-
bris expansa atque aperta inter se sunt. id quod in
uulneribus ex uehementi inflammatione euenire
interdum conspicitur. cum enim caro ad multum usque
altitudinem diuisa, & musculus per transuersum
sectus fuerit, coaglutinatio autem & consolidatio fue-
rit impedita, tum inflammatio superuenierit, ex qua

Galen.

A cutis distenta utrinque labrum sibi annexum retraxe-
rit, utraque in parte expasum os uulneris reddidit.
huiusmodi autem speciem præ se ferunt & labia ipsa
oris inflammationem cum patiuntur et palpebre, &
præputium. quin etiam si cutis capitis accommodata ad
terebrationem compresserimus, orta inflammatio
expansorum speciem præbet. & maxime id fit, si com-
pressa hinc inde cute medium inter labra locum li-
namentis compleuerimus. quod & in transuersa
musculorum incisione profunde adacta, facere con-
sueuimus, dum uel ob sanguinis eruptionem con-
cerpta linearum fila, quæ linamenta appellant, in
uulnūs coniicimus, uel ex eo quia timemus ne cu-
tis consolidescat, diuisæ uero musculi partes utrin-
que inconglutinatae permaneant. atque huiusmodi
quidem affectiones omnes quamuis alias etiam cura-
tiones requirant, quæ inflammationem sedent,
hic tamen, non enim de omnibus nunc proposuit
scribere, eas solas tradit, quæ chirurgicæ propriæ,
id est, manu operæ exhibitæ appellatur. expan-
sorum igitur deligatio reliqua quidem eadem habet,
quæ etiam in illis quæ abscessere, fieri consue-
uerunt. nam & à sanis partibus incipit, & paulatim
inde ad cutem manifesta ulceratione affectam
perducitur. in eo tamen differt, quod hic longius
quam in illis quæ abscessere exordium sumit, com-
pressionemque usque ad expansas ipsas partes pro-
tendit. in sinibus enim à fundo ipsorum incipit deli-
gatio. in expansis non ab extrema eorum quasi ra-
dice, sed longinquius à sanis partibus cutem paula-
tim ad ulcerationem adducimus. non relaxando
& remittendo, ut tibi faciebamus, deligationem, sed
intendendo paulatim prima eius circumuolutio-
ne ex cutis conuersione compressionem effici-
mus, ac postea etiam magis. Hoc autem quidam in
una & eadem operatione, quidam in pluribus in-
telligendum putant. in una quidem, si uerbum pri-
mo principium deligationis significet: in pluri-
bus, si eodem uerbo primam totam deligationem
indicari intelligamus. quorum tamen utrumque esse
uerum potest, alterum in altera affectione quæ non
specie, sed magnitudine diuersa sit. mediocrem enim
inuersionem cutis in naturalem statum redu-
cere, uel una tantum deligatione enitemur. maio-
ri prima deligatione uim non afferemus, quippe
cum eo tempore inflammationis curatio, non expan-
sorum correctio attendenda sit. iccirco uero
in fine subiicit, terminus, quod maxime facta sit,
est contactus, quia cum possit quispiam magis in-
ter se quæ expansa sunt, contrahere ac cogere, quam
ut ora eorum tantummodo sese mutuo tangant,
fit, ut quæ ita coacta fuerint, sese alliant: id quod
dolore parit, augetque inflammationem. eousque
igitur contrahenda huiusmodi sunt, quo ad sese
contingant, & non amplius. Aduertendum autem
duplicem hic lectionem reperiri. altera est, termi-
nus, quod maxime facta sit & cætera, quam etiam
agnoscit Asclepiades. altera, terminus, quod ma-
gis facta sit. cæterum sicut melior, ita antiquior
quoque ea est quæ maxime habet.

32 In quibus uero contracta est distrahes

tom. 6

L 3 re

re debemus, cum inflammatione quidē cōtra-
ria, sine ea, apparatu quidem eiusmodi, sed
deligatione contraria utendum est.

Contracta contrario modo quā expansa se-
habent. nam cum expansa plurimum inter se sepa-
ratas oras habeant in cōtrarias partes, ita ut altera
in dexteram, altera in laeuam hiet, ac recedat: con-
tracta contrario ita inter se coierunt, ut uel altera
ipsorū ora superiecta alteri sit, uel utraq; quasi du-
plicata, & complicata fuerint, quemadmodū ea
sunt, quæ conuoluuntur. id quod ex inflammatione
quoq; euenire non secus ac cōtraria affectio, con-
sueuit. neq; mirum esse debet, si in contraria affec-
tione eadem mala creet inflammatio. quippe cum
non in partibus tam magnam quā paruā inflam-
mationem patientibus utraq; & expansa & con-
tracta efficiantur. id quod in oculis uidere manife-
ste licet. nam cum cutis palpebrarum extrinsecus
ualde inflammatur, atq; id eousq; ut uicinæ regio-
nis pars aliqua occupetur, palpebra inuertit. cum
arero modica quidē in cute inflammatio est, at mem-
brana quæ intus ad irim usq; extenditur, ualde de-
ficit, tunc fit, ut intro palpebra conuertatur. quod
auxilium cum utrisq; palpebris accidit, *Quuoris*, hoc
est capistratio nuncupat: cum diducere eas æger
atq; aperire ita oculum nequit. eadem uisita in pu-
dendis quoq; mulierum cōtingunt in uulneribus
quoq; & omnibus quocūq; modo exulceratis exi-
stere consueuerunt. in quibus cum partes quæ ex-
trinsecus sunt, inflammatione infestantur, labra ulce-
rum introsum cōuertuntur. quod cum fit, emacia-
ta ac tenuia & flaccida esse ea proculdubio neces-
se est. quo enim alio modo fieri posset, ut ita prom-
pte in interiorē partē deuoluerentur: an interiorē
partium defectus incidit uel ex tabida macie
cum locus non alitur, uel ex manuum & scalpelli
opera, quæ immoderate subiectam carnem exci-
derit, uel ex putredine quæ eam corruerit. his

igitur affectionibus deligatio accommodata adhibi-
ta prodest. inflammationi uero tantū abest ut profit,
ut nocumentū quoq; asserere grauādo soleat. ea ta-
men quia medicamentis inferuit, quæ inflammatio-
nem sedant, propterea necessario interdū assumi
consueuit. atq; ideo hic Hippocrates cōtracta in-
quit cum adest quidē inflammatio, contraria agen-
tibus nobis, id est, deligationē euitantibus curan-
tur: nisi maxima necessitas urgeat, quod uidelicet
imposita aliqua partibus inflammatis cōtineantur.
nam ubi absq; deligatione permanfura medica-
mēta speramus, nulla prorsus fasciā est opus. quin
etiā ea quæ cōtinendi medicamēti causa assumit,
extenuissimis leuissimisque linteis faciēda, et quā
paucissimis potest cōuolutionibus, uel etiā una
tantū circūdanda est. id quod multos medicos la-
tet, qui extrinsecus supra tumorem inflammationis
& cataplasmata crassa, & linteā dura & grauiā, &
lanas multas, fasciarumq; insuper copiam impone-
re non uerentur, quæ omnia cum inflammationē au-
geat inflammatis maxime cōtraria sunt. at si ea quæ
cōtracta sunt, inflammatione caruerint, linteorū ap-
paratū eundē cū priore esse iubet deligationē ue-
ro cōtrariā ei quæ expansis adhibebat. nam si illic
principiū deligādi ē longinquo à sanis partibus fa-
ciebamus circumuoluendo ac protrahendo, com-
pressionēq; augēdo, usq; ad expāsa, in cōtractis
a parte ipsā affecta initio iniecto ad partes quæ cir-
cumcirca sunt, cutem retrahemus. intelligendum
tamen hic est quod ab Hippocrate fuit pretermis-
sum, non enim omnē ille horū uitiorū curationē,
sed eam tantū quæ manuū opera exhibetur, descri-
bere proposuit. quocirca ego, ut integra oratio sit,
quod deest adiungam. Quando aliquid eorū quæ
cōtracta sunt, inuertere uoluerimus, prius replere
subiectū locū, in quem conciderunt labra, uel lina-
mētis, uel accommodato medicamēto eousq; debe-
mus, quoad cōtracta pars reliquæ cui equalis red-
datur: deinde ita deligationē, quā dixit, adhibere.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS

QVI QVÆ IN MEDICATRINA FIUNT, INSCRI-
bitur, commentariorum Liber tertius.



DISTORTIO dirigere oportet reliqua quidē eadē faci-
ciendo: at quæ abierunt, subligatione, agglutina-
tione, appensione redu-
cendo, & contrario mo-
do contraria.

Distortiones fiunt, cum uel à sua sede elabitur
aliquid in exteriorē corporis partem, uel intro-
sum in inanitatem aliquam prolabitur. ut in nari-
bus, si in exteriorē partem aut os, aut pinnula ea-
rum ab ita eam partem: si in foramen descendit,
introsum distortio fit. simili modo quoq; in alijs
membris euenit, quorū omnium cōmunis cura-
tionis scopus auxilia ostendet. at communis om-
nium scopus est, contraria contrariorū esse reme-

diā. quare etiam nunc quæ abierunt, cum alijs re-
medijs de quibus nunc dicere propositū non est,
tum fascijs reducenda sunt. fasciarum autem mo-
dos ad hæc utiles ipse iam dixit. subligatio igitur
adhibēda, sicut superius & in abscedētib; & ex-
pansis, & cōtractis dictum est. agglutinatio uero,
sicut in libro De articulis de naribus & maxilla
scripsit. sed appensio, ut in libro De fracturis, ubi
inquit in hunc modum. Nam si uel ossa utraq; con-
fracta sint, uel inferius tantummodum, & cui deliga-
tio adhibita est, is mitella quadam manum habeat
appensam, mitellaq; ipsa ea parte qua est fractura,
plurimum contineat, ita ut hinc & inde manus
dependeat: in hoc alterum os in superiorē partem
distortum deprehendatur, necesse est. at si fra-
ctis ossibus & manus, & pars iuxta gibbum cubi-
ti mitella sustineatur, reliqua autem cubiti pars su-
spensa non sit; in inferiorē partem os distortum

inuenietur. oportet igitur ut mitella molli quæ latitudinem habeat, & plurimam cubiti partem & articulum ipsum manus æqualiter suspendamus. Hæc oratio pravam appensionem cum doceat, quæ distortionem efficit, curationem etiam distortorum ostendit. faciamus enim alicui in inferiore partem cubitum esse distortum, hunc in inferiore parte angusta mitella subiecta excipiemus. si in superiore partem uero distortionem habeat, appensionem adhibebimus, quæ ad inferius distorqueat. ea autem est, cum mitella partes iuxta articulum manus & cubiti gibbum suspendens, reliquum in medio interceptum cubitum insuspensum relinquit. quemadmodum etiam si in articulo manus sursum cõtigerit distortio, deorsum distorquentem deligationem afferemus, quæ partem circa gibbum cubiti reprehendat, eam quæ circa articulum est, pendulam omittat. eodem modo in distortionem quæ est ad gibbum in superiore partem, ea adhibenda est appensio, quæ solum ipsam sine stabilimento destituens reliqua sustingat: quæ uidelicet etiam non distortum locum in inferiore distorquere partem posset. nam ut semel dicam quæcumque nondum distorta distorquet, eæ quæ in contrarium modum distorta sunt, diriguntur. ac sicut in his simili modo circa tibiam & femur in totius cruris positionibus uel peccamus, uel recte nos gerimus. quod enim in brachio est appensio, id in crure positio est. unde hic una cum appensionis nomine positio quoque insuper est subintelligenda. quod autem in fine orationis huius dixit & contrario modo contraria potest etiam de ante dictis deligationibus intelligi: ut dicat contrarias his affectiones corrigi ac sanari, si contrario modo deligentur. uerbi causa, abscedentibus cõtraria ea sunt, quæ præter naturam in rectitudinem fuerunt constituta. de quibus utique satis à me superius dictum est. Sciendum autem in hoc De medicatrina libro primum omnium De naturalibus iudicijs scriptum fuisse, quibus omnes homines uti consueuimus & ad artes omnes, & ad uniuersam uitam pertinentibus. non enim tantum ad propositam materiam spectans, quæ de curatione ea est quæ manu opera adhibetur, sed ad omnes morborum quæ in medicina sunt, dignotiones, quas significationes uocant, agere de iudicijs uoluit. Secunda dissertatio de medicina est quæ manuum opera exercetur, quæ docet, ex quibus consistent, quibusque munus eius compleatur. Post hæc tertia de deligatione subsequitur: ubi qualis debeat esse deligatio edocemur, tum ab affectæ partis natura, tum ab ipsa affectione sumpta significatio. Quarto hic de fracturis agit, quæ sub generali affectionem subiiciuntur, quæ est continuata dissolutio, ita enim ego totum hoc genus soleo appellare. at Hippocrates abscedentia corpora, quæ ita affecta sunt, uocat, ut & affectio ipsa abscessio merito nominetur. tamen si una quædam species generis huius sit, quam proprie abscessionem & abscessum, id est, ἀποσσειν & ἀποσναι nuncupet. Cæterum hæc ea causa dicta à me in præsentia sunt, ut ea quæ superius exposui, in memoria reuocentur, nunc ad reliqua iam descendamus.

A 2 Plagularum longitudes, latitudes, crassitudines, et multitudines eiusmodi sunt. longitudo, quanta est deligatio, latitudo, trium, aut quatuor digitorum. crassitudo, ut triplices aut quadruplices sint. multitudo, ut circundata neque excedat, neque deficiat.

In fracturarum tractione quæ nunc ipsi proposita est, de plagulis, quæ splenia à splenis forma appellant, primum mentionem facit. iubetque eas longitudine esse equales deligationi, quippe cum ob illam assumatur, quo eam stabiliant, & firmam atque immotam contineant: latitudine uero trium aut quatuor digitorum, eius uidelicet qui deligatur. crassitudine, ut triplices aut quadruplices sint. nã ubi tutior ac stabilior custodia deligatio desiderat, quadruplices esse debent: ubi non ita, satis est, si triplices adhibeantur. cõfracta autem minutim ossa maiore custodia indigere perspicuum est. at plagularum multitudinem tantam esse oportere inquit, ut circum circa deligatum membrum lögum, quod *λωλον* uocat, comprehendant. nam ut in iuguli aut costarum fracturis circum circa locum affectum comprehendant, fieri non potest. sed magnitudo quidem fracturæ plagularum numerum tibi indicabit. in iugulo tamen tribus quadruplicibus plagulis uti consueuimus: ac duas priores in similitudinem X literæ imponimus, ita ut media utriusque pars qua inter se coniunguntur, supra fractum locum iniiciatur. tertia supra has per membrum longitudinem porrecta superimponimus, quæ & subiectas constringat, & fractam partem iuguli constipet.

C 3 Quibuscumque ad directionem adhibentur, longitudinem ex circuitione, latitudinem & crassitudinem ex defectu coniectare debemus, neque uniuersa explere.

Miror cur plagularum prius usum non dixerit, deinde quo modo unaquæque ipsarum sese habeat. usus enim ipsarum duplex est: unus ut subligamina contineant: alter ut ea membra circum expleant, quæ in acutum abeunt. quæ ipse tum *ἀπὸ τῆς* tum *ὀπίσθῃ* appellare consuevit, quasi deacuminata, & subsiccanea dixeris. cuiusmodi et cubiti iuxta manum, & tibiarum iuxta pedem pars est. quibus plagulas circundandas orbiculariter censet, ut post iniectionem fasciarum extrinsecus æqualis crassitudine futura deligatio sit. Cum igitur duo hi usus plagularum sint, detentionis uidelicet & expletionis, quam ipse directionem hic uocat, eas esse uult tanta longitudine ut circum circa deligatam partem comprehendant. crassitudine autem & latitudine pro membrorum defectu. nam si maiores longitudine fuerint, quam ut membrum circummeant, necesse erit ut alterum eius caput supra alterum positum altiore eam partem reliquis duabus quæ utrinque sunt, reddat: atque ita deligatio inæqualis, ac propterea laxa efficiatur. si contra, breuiiores, quam ut capita attingere sese mutuo ualeant, locum in medio uacuum relinquet. ac deligatio contrario modo inæqualis euadet. sicut enim si longiores

giōres sint, tumorem quēdam atq; incurationem existere: ita si breuiores, defectum ac concauitatem quandam ea parte subdile necessarium est. plagularum autem harum circumflectionem non semel uniuersam, sed paulatim faciendam censet. ut crassitudine eae sint tenuiores quae superius; crassiores quae inferius imponuntur. nam si semel omnes circūficias, forma deligationis eiusmodi euadet, qualis membri a principio fuerat.

4. Linteorum aut subligamina duo sunt. primum quod a noxa in superiore partem: secundum quod a noxa in inferiore definit.

Dictum a me etiam superius est, fascias quae ante plagulas primum omnium corpori affecto circumficiuntur, subligamina ab Hippocrate nuncupari: quarum utriusq; circumflectionis usus in libro de fracturis scriptus est. prima enim fascia non solum uetat, ne quicquā eō defluat: uerum etiam quod in affecto loco continetur, in superiorem partem aliquid repellit. secunda superuacuum sanguinem ab affecta parte ad membri finem elidit. utriusq; autem communis utilitas ea est, quod compositum os ne dimoueat, continent.

5. Iuxta noxā maxime, extrema minimum. reliqua pro ratione comprimendum est.

Horum quoque ratio in libro De fracturis dicta est. in uniuersum enim in omni deligatione ubi quidem subiecta caro magis cōstringitur, humor qui in ea cōtinetur, ad circumuicinas partes elidit consuevit: ubi minus, is locus ex alijs magis compressis partibus affluentem humorem admittit.

6. At deligatio multam sani loci partem occupat.

Huius etiam consilij ratio perspicua est. nam dum multam partem sani loci deligatio occupat, fit, ut & firmitus repōita ac confirmata ossa contineantur, & magis ab affecto loco in circūuicinas partes humores elidantur: magisque hi ne a superiori parte eō defluant, impediantur.

7. Fasciarū multitudo, longitudo, latitudo, ea sit. multitudo quidē ne a noxa superetur, ne uel ferulis illisio sit, neque pondus, aut declinationem, aut effecminationē afferat.

Reliqui fere omnes inter *ενδεδεσμεναι* & *συνδεδεσμεναι*, id est fasciae & subfasciationes, seu subligamina, nulla usi sunt distinctione. at Hippocrates fascias, quae ipsi corpori circūdantur, subligamina seu malis subfasciationes appellat: quae plagulis extrinsecus superligantur, fascias seu superligamina uocat. quarū sanē quanta esse debeat multitudo, longitudo, & latitudo hic docet: longitudinē tantam esse debere asserens, ut ipsum os repositū ac conformatū firmiter contineat, neque a noxa superetur. nam si non cōtineant fasciae, uincuntur, ac superabuntur a noxa, id est a parte laesa. nā si dum cōformationem immobilem conseruant, uincunt fasciae, dum ipsae aliqua in parte moueantur, superari ac uinci merito dicendae sunt. Quod aut inquit ne

ue ferulis illisio sit. id significat, ne pauciores fasciae, quam par sit, adhibeantur, ita ut ferulae impositae illidant, id est uim & compressionē ad noxam usque pertingentē efficiant. uerum si etiam tam multas fascias inuolueris, ut grauet aegrotantē, ita quoque nihilominus a mediocritate aberrabis. Quocirca utrunque finem ac scopum fasciarum diligenti obseruatione cōiectare debemus. fasciarū enim scopi duo sunt, ut neque comprimant, neque grauent. Sed neque declinationem afferre debet multitudo, ut inquit. declinatio autē quā *πρὸς ἑνὶ μέρει* uocat, quasi deuersionem dicas, est, cum in alteram partem uel dextram uel sinistram tota deligatio deuergit, ac declinat. id quod immoderata fasciarum multitudo euenit. quam uero appellat effecminationem alij ad partes ipsas referunt, in quibus est noxa, utpote imbelles ac molles futuras ex linteorū multitudo quae circūficiuntur: alij de deligatione ipsa intelligūt, quam remissam fieri ex multitudo necesse est. nam impositarū etiam ferularum cōstrictio multis subiectis linteis resoluti cōsueuit.

8. Lōgitudo & latitudo, ut trium aut quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum longitudo, digitorum latitudo sit.

Digiti uidelicet & cubiti illius eiusdem qui deligatur, intelligendi sunt. terminum autem longitudinis & latitudinis non unum tantum statuit, propterea quod nulla fascia longitudo in omnibus aequalis est: sed pro magnitudine fracturae multitudines, & longitudo, & latitudines linteorum immutandas censet. in tota uero hac tractatione de deligatione agit, quae in fine adhibetur: quā in libro De fracturis eo tempore faciendā tradit, quo pars affecta finita inflammatione in ferulas conijcitur.

9. Tot item simbriae circumuolutiones, ut ne comprimant.

Toties circumuoluere simbriam fascijs iubet, quoties ipse ille inuolutus sit: simbrias, id est *συντρίβες* appellans, quae ex uestimentorū repleminibus ad uinciendum accommodata sumi consueuerūt. cum uero inquit. ut ne comprimant. de modo cōstrictionis eorum docet. eousque enim cōstringi simbria debet, quoad firmiter quidē maneat. non comprimant tamen. Sed partes huius orationis in hunc modum coniungendae inter se sunt. tot simbriae circūuolutiones faciendae sunt, ut non comprimant: eo quod comprimere ualde multa soleant, sed melius esset, si pro tot tales legeremus parua immutatione unius literae in graeco uerbo facta. *σ* em̄ litera in *κ* conuersa pro *συντρίβες*, id est tot simbriae, id est tales efficietur. quippe cum simbriae circumuolutiones qualitate magis quam quantitate convenientem deligationem contineant.

10. Mollia autem & non crassa sint.

Omnia haec uidelicet, mollia non crassa assumi iubet, sicut de linteis superius diximus, ita hic quoque illud cauens ne subiecta corpora illusione offendant.

11. Atque omnia, pro longitudine, latitudine

dine, & crassitudine eius quod affectū est. A
Dicitur antea hoc de alia simili materia est, & in tota hac tractatione memoria tenendum, quicquid de longitudine, aut latitudine, aut crassitudine, aut numero linctorum dicitur, id ad partis affectū longitudinem, aut latitudinem, aut crassitudinem esse referendum.

12 Ferulæ uero sint læues, æquales, simæ in extremitatibus, minores hinc inde quàm deligatio est: ea parte crassissimæ, qua fractura erupit.

Ferulæ non secus ac plagulæ seu splenia, firmamenta sunt, ac stabilitatem deligationis. Sed plagulæ tamen subligamina, ferulæ omnia quæ subiecta sunt, continent. ita ut quatuor cuncta sint, quæ utilitatē singula suā præstāt. primo enim intus subligamina conformantur ac repositum os continent, prohibentque ab affecta parte inflammationem. supra hæc ne dimoueantur ac deurgant, plagulæ imponuntur. deinde fasciæ seu superligamina superius conuoluuntur. postea circumdantur ferulæ, quæ deligationē stabiliant, ac firment: quas Hippocrates hic & læues, id est læuigatas ac planas, & æquales adhibendas censet. læui aut asperum opponit, æquali inæquale. atque id quidem quod est asperum, continuo etiā est inæquale. quod aut est inæquale, asperum necessario minime est. quæadmodum neque uia continuo est aspera, si sit inæqualis. quippe cum si ascensus habeat & descensus non asperos, & esse & dici inæquales possit. ita fieri potest, ut ferulæ quoque læues sint, & non æquales. nam si uel in latus, uel in superiorem, uel inferiorem partem sint distortæ, æquales quidem non erunt, sed tamen læues. ut autē neque asperæ, neque distortæ ferulæ sint, fracturæ perquam utile est. utroque enim modo cōprimunt. quæ tamen distortæ sunt, illud insuper efficiunt, quod deligationem simul distorquebunt: qua distorta, pars etiā fracta distorqueatur, necessesse est. Simas præterea in extremis partibus assumi ferulas monet. id autem est derasas leniter ac retusas in inferiori parte. nam quæ usque ad extremum caput æqualem crassitudinē seruant, æqualem unumdequaque deligationem reddent: id quod fieri nullo modo debet. uult enim ut in media parte ferulæ deligationem magis astringant: inde uero usque ad extremum relaxent. uult item minores eas esse longitudine quàm sit deligatio, ne cutem ultra deligationem attingant: quæ sæpenumero ex eo quod humores à fasciis expressos suscipit, paulo altius turgescit, atque extat: supra uero ipsam fracturam crassiores propterea esse ferulas iubet, quia locus is potissimum compressione ipsarum indiget.

13 Quæcumque autem gibba et carne carentia natura sunt, cauendæ eorum eminentiæ sunt: ut circa digitos & malleolos, uel positione uel breuitate.

Cauere iubet ne supra ossium extuberationes ferulas imponamus. id autem fieri duobus modis potest: si uel omnino nullas supra illam deligatio-

nis partem posuerimus, uel adeo breues, ut accedere ad tuberositatem nequeant, sed prius quàm eam tangent, finiantur. id quod facere melius est. dum enim inquit positione nullis omnino impositis ferulis cauendam lesionem significat: dum inquit breuitate detrahendū de longitudine ostendit. perinde ac si diceret, uel omnino nullis, uel breuioribus impositis ferulis cauendum esse, ne pars eminentior attingatur.

14 Fimbrijs uero affulcire est opus, non comprimere primum.

De fimbrijs paulo etiam superius mentionem fecit post fasciarum explicationē, non tamen quicquam ibi adiunxit nisi de ipsarum circuncisione, id quod ordinis cōsequutio postulare uidebatur. nunc uero inquit affulcire opus est, hoc est stabilire ac firmare absque compressione. atque id facere primum, id est prima deligatione. nam sequentibus diebus, si interrogatus æger nullam sentire se compressionē dixerit, astringere fimbrijs ferulas possumus: nonnulli tamen non in fine præcedentis præcepti, sed in sequentis principio. primum ponendum esse censent: ut talis sensus sit. primum cerato molli, læui, puro illinendum. cerato sumpto in ablatiuo recto non in recto. melius tamen est, ut legamus in recto, quo intelligere possimus, fasciam quoque dum circa fractam partem cōuoluitur, eo esse inungendam.

15 Ceratum molle & læue et purum.

Non enim solum cutem affectæ partis cerato inungi uult siccis fasciis iniectis, sed ut unaqueque fasciæ inuolutionem sequamur illinendo, iubet. si enim solam cutem illinendam intelligamus dum sicca fasciæ iniiciuntur, fiet, ut cito affecta pars cerati auxilio destituatur. cum lineæ ipsa imbibitura humorem sit, atque ita cutem squallentem redditura. cur igitur molle ceratum esse uelit, perspicuum est. loco enim madefactionis eo utendum censet. quippe cum possit quidem madefactione idem præstari, sed tutius tamen cerato fiat, præcipue ubi fieri nequit, ut ægrōtanti semper medicus assistet, & ministrum non admodum diligentem in cura adhibendam cognoscimus. uult autem ceratum non molle tantum, uerum etiam purum esse, id est nihil in se habere immixtum neque propolis, neque fordīs, neque aut terræ aut harenolæ substantiæ alicuius præter ceram. quod si ita sit, continuo etiā læue & planum idem manifestū est. nisi ob ea quæ cera caret, & ob id *expidit* uocatur, læue & planum amplius quid significare, quam purum intelligamus. legitur autem non solum læue, id est læue, uerum etiam *λευκόν*, quod est lene. magisque ita illi scriben dum est autumant, qui in puri significando lauorem quoque contineri putant. lene autem opponi sicco aiunt. id quod in puro non intelligitur.

16 Aquæ caliditas & multitudo spectatur. caliditas, ut supra suam ipsius manum infundat. multitudo ad laxandum, & attenuandum plurima: ad carne implendum,

& molliendum mediocris optima est.

De aqua item dicere ad fracturarum curationē necessarium est. dum resoluunt enim fracturas medici omnes calida aqua perfundunt, ac fouent, presens ex ea auxilium experti. in cuius sanē usu duplex cōtingere error solet. in qualitate unus, alter in quātitate. in qualitate quidem cum aut calidiorē, aut frigidiorē iusto ea utimur. in quātitate cum longiore aut breuiore tempore perfundimus, q̄ par sit. indicium moderationis in qualitate medici ipsius manum statuit. supra eam enim infundēs aquam qua fracturam est faturus medicus, conijcere inde quod fracturā conueniēt, potest. conuenientiam autem cum latitudine quadā intelligendam duco, quā ad cōmunem omnium hominum nō ad aegrotantis habitum referatur. interdum si quidem sit, ut medicō moderata, aegro eadem in conueniens, atq; immoderata uideatur. quocirca paululū ex ipsa supra eam laborantis membri partem quæ primum fuerit resoluta insperges, ab aegroq; requires frigidiorē, an calidior esse ei uideatur. atq; ita pro eius responsione tantum uel calidā uel frigidā adiunges, quoad temperatam ac moderatam ipsi quoq; aegrotanti aquam efficies. primum igitur aquā temperaturā iudiciū nostra manus affert, utpote quæ primo eam experitur. aegrotantis tamen sensus præcipuum, ac perfectissimum, ac potestate primū est. at usus ipsius quantitas cōmunes habet distinctiones cum frictione, omnibusq; remedijs quæ calefaciunt. ea si quidem adhibita non solum ē uicinis locis ad calefactam partem attrahere, uerum etiam digerere consueuerunt. unde etiam calida aqua efficere contraria eatenus uidetur, quatenus & corpus quantitate est præditū, & ipsa uel amplius, uel minus adhibetur. nam si inane sit corpus, digerit potius q̄ attrahit. si sit plenum, cōtra attrahit magis, q̄ digerit. si item breui tempore adhibetur, replet magis, q̄ exinanit. si longiore, magis discutit, q̄ replet. merito igitur plurimā aquam laxare & attenuare, modicam molliē & carne replere dixit. atq; ex euacuatione continuo quidem sequitur attenuatio, sed laxatio non continuo, sed per alia media. quæcumq; enim ex repletionē erant intēta, sicuti omnia quæ inflammationem patiuntur, ea dum euacuantur, laxari consueuerunt. quæ ex cōcretionē ob refrigerationem intensionem habent, dum calefiunt; quæ ex siccitate, dum humefiūt; quæ ex humiditate, dum superfluo humore exinanitiūtur. quoniam igitur calida aqua præstare quinq; hæc potest, cum amplius ac diutius corpori fuerit infusa, eam laxare atq; attenuare recte dictum est. Ceterum ne mireris si calidam aquam et superuacuos humores exinanire, & quæ sicca sunt, ac dura humefacere dixerimus. utrunq; enim alibi uerum esse demonstratum est. atq; hæc sunt, quæ calida aqua potest efficere, si plurima adhibetur. At si pauca sit, in uniuersum dicere quid possit, non licet. nam si quis ubi bis & ter aut perfusione usus fuerit, aut forione ex spongia, postea desistat, huiusmodi aquæ usus nullam prorsus utilitatem afferet. at si, ut ipse inquit, me-

A diocriter adhibeatur, carne implebit, & molliet ea quæ huiusmodi ope indigebunt. quæ indigebant, ex me audi. si in plenitudinis habitu corpus sit constitutum, & carne careat, mediocris aqua calida perfusio neq; molliet, neq; carnem creabit, sed superuacuo humore calefactam partem replebit. si uero carne quidem careat, sed non sit plenum, id & carne implebit, & molliet. carnis enim aggeneratio fit, cū & membra ipsa quibus agnaci aut circumnasci caro debet, temperate & caliditate & frigiditate sese habuerint; & sanguis qui illuc affluit, & qualitate salubris & quātitate fuerit moderatus. quæ sanē utraq; moderata aqua calidā perfusione fieri solent. nam & sanguinem ad perfusum membrū trahit, & carnem quæ in ipso est, temperatam reddit. si enim prius fuerit refrigerata, calefacit: si calefacta, refrigerat: dum calorem ad exteriorem partem euocat, & maledacido humiditatem bonam inducit atq; ita frigefacit, non alio modo, q̄ aquarum dulciū balnea. nam & hæc quoque mortuos fere illuc profectos calefaciunt, etiam si ualde frigefacti fuerint. exustos uero atq; incensos emolliunt. uidentur quippe post balneū sedatiore iam siti effecta temperatis potibus oblectari. sic igitur aqua etiam calidā perfusio si moderate adhibita sit, & carne implet, & mollius membrum ipsum reddit, quippe cum recēs caro ē concreto nuper sanguine effecta, non fecus accretenter coagulati casei procreationem habeat.

C 17 Mediocritas autem in perfusione hæc est. cum adhuc pars attollitur, prius quam concidat, desistendum. primum enim attollitur, deinde attenuatur.

Perfusionis aqua calidā mediocritas est, desistere, priusquam perfusa pars cōcidere inceperit. attollitur etenim primum, id est in maiore tumore naturali excrescit, propterea q̄ & sanguis qui in ea continetur, diffunditur, & ex superioribus locis eō humores affluunt. postea uero, cum discussa hæc sunt & quæ affluerunt, & quæ fuerunt circumfusa: attenuatur, ac desidit.

D 18 Positio, mollis, æqualis, sursum uersa in extatibus corporis partibus, ut in calce, & coxa, ut neq; retorqueatur, neq; inuertatur

Hanc lectionē nonnulli ut unam solam interpretantur; alij in duas diuidētes partes separatim utrāque accipiendam censent. utralibet enim ita circūscripta est, ut unam integram habere sententiam possit. nam membrorum positio siue generaliter sumatur, ut de appensione etiam intelligatur, quæ manu conuenit, siue specialiter, ut soli cruri attribuitur, mollis semper, & æqualis, & sursum uersa optima est. mollis, ne aegrotum ea parte comprimatur, ita ut & inflammatione ob dolorem periclitetur & dum habitū immutare cogitur, partē fractā distorqueat, quæ immobilis multa cum quiete seruanda est. inæqualis autē positio simul & dolorem affert, & membrū distorquet, cū aliquibus in partibus sine stabilitamento remaneat, in aliquibus cō-

primatur. unde merito æqualē laudat. at uero sursum uersa partem collocatā absq̃ fluxione conseruat, sicut quæ deorsum est uersa, cum fluxiōes pro uocet inflāmationis in causā est. atq̃ hæc prior est huius lectiōis pars, quā & unam habere posse sententiā, & recte sese habere perspicuum est. Secunda, si eam per se accipere quispiā uoluerit, talis sensus erit. In extantibus corporis partibus, ut in calce & coxa, optima positio ea est, ut neq̃ retorqueatur, neq̃ inuertatur. quia tamen adiunctū non est optima positio ea est, propterea quidā cū deficere sententiam hanc existiment, superiori annectere eam coguntur. at si ea priori annectatur, non amplius esse uniuersalis oratio, sed de sola extantū partium positione uidebitur. Experimenta rī tamē hunc locum ita connexum intelligentes, esse uniuersale præceptum asserunt. ostenduntq̃ Hippocratē nō in hoc libro tantum, uerum etiam in alijs multis uniuersales sermones in una, aut duabus rebus facere: quādo in his quod de rebus eiusdē generis traditur euidenter apparet. quemadmodum nunc quoq̃ in calce & coxa fecit. cum enim cætera omnia huiusmodi membra, cum patiuntur, in molli & æquali & adiuui habitu figurari debeant, maxime omnium requirere ea id uidentur, quæ extāt in corpore ac prominēt, cuiusmodi coxa & calx est. Sed enim dictū sape a me est huiusmodi Hippocratis loquutionē præbere occasionem aliter atq̃ aliter explanandi. ut quod quisq̃ interdu opinetur, probabile esse uideatur. quocirca neq̃ de eo quod quisq̃ uerum esse opinatur affirmandū est. scire igitur licet in dissentientibus expositionibus, modo sensus idoneus seruet, diu nos tēpus terere minime debere: sed melius esse, ut ad id quod utile in arte est, transeuntes, in eo immoremur. sicut nunc quoq̃ rectius uidetur, ut cū positionē in omnibus mollem, & æqualem, & adcliuem esse oportere, sed præcipue tamē in extantibus partibus, cuiusmodi est calx, & coxa, inter omnes conferat sequentia consideranda pergamus, ubi inquit, ut neq̃ retorqueatur, neq̃ inuertatur. hinc enim extantium partium positionis utilitas cōspicitur. nam si altior iusto positio sit, membrum retorqueri: si humilior, inuerti continget. & præcipue si alta prius fuerit. atq̃ hæc ad artem spectant. Præter artem autē circa uerba ipsa plures cōmentatiunculæ esse possent. sed in libro De fracturis sic de alijs omnibus præceptis quæ tradit, ita de calcis quoq̃ de positione dictū perfecte est. ubi inquit. Valde autē laborandū est, ut summus calx apte deponatur. nonnulli uero sunt qui orationes omnes alijs in libris positas quæ eundem sensum contineant, integras ubiq̃ ascribere non consueuerunt: id quod ne in duobus quidem cōtinuatis diebus fieri posset. unde etiam huiusmodi expositionum librum alique non citius q̃ anni spatio legit quispiam. Ego uero quia iam in librum De fracturis, & de articulis multa commentus sum, commemorandi tantūmodo causā nonnulla mihi esse dicenda hic existimaui. q̃ si quis quod nunc a nobis propositum est q̃ citissime prætergressus ad

illa procedat, a me uidelicet qui expertus sum edoctus, doctrinam illas quæ late & diffuse, non quæ presse & compendiose traduntur, perfectiores dedere artifices solere: is sciat, huiusmodi etiam compendiaras, cum summam totius rei breuibus cōplectantur, tanq̃ inutiles minime esse reiiciendas.

19. Canalem toti cruri, quā dimidio coniiciendum est. ad morbum tamen respiciendum. & cætera quæcunq̃ lædere solet perspicua sunt.

Ad eos qui & De fracturis & De articulis libros iam legerint, loqui huiusmodi uerbis uideat, ubi quæ ignota imperito homini sunt, perspicua esse inquit. nonnulla enim sunt uniuersū hominī perspicua, quemadmodū ea quæ modo dicta iam sunt, molliter siquidem & æqualiter deponēdum esse fractum membrum omnes intelligunt. at quā læsione iniectus canalis afferat, non omnes: nisi qui de hac ipsa re prius audiuerint in libro De fracturis ea oratione cuius initium illud est: De canali bus enim qui in crura fracta subiiciuntur, quid consulam, dubito. & quam ob rem dubitet deinceps explicat. & rursus eodē in libro alio loco ita inquit. Canalem si quis sub ipsum femur ita subijceret: & cum plura subiungat, postremo in fine orationis at in hunc modum: Si igitur fieri debet, perpetuus faciendus uel nō faciendus canalis est. Hæc uerba necessarium non esse canalis usum declarant. si tamen quis eum adhibere uult, toti cruri usq̃ ad inguen, non usq̃ ad genu esse subiiciendū. ex illis igitur perspicuum quoq̃ hoc effectum est, cum non per se apertum sit. quantum enim ad loquutionem spectat, cōiunctionem. quæ hic utitur, id est q̃ pro disiunctiua particula uel posse mus accipere, sed pro negatione tamē positā esse intelligimus. uult enim ut toti cruri absq̃ læsione, non usq̃ ad genu solum canalem subijciamus. autem, id est q̃ pro non-ab Homero etiā positum eo uersu est, Saluum ipse esse uolo populū quā morte perire, id est non perire. & Thucydides eodem in significato utitur. inspectandum insuper esse morbū inquit, cuius causa canalis assumitur: & cætera quæcunq̃ lædere solet. ac morbus quidem est ossium cruris uehemens fractio in qua nō si immobile plane crus seruetur, admittere curationem non potest. nam canalis a nonnullis laudari cōsueuit, ut pote in illis occasionibus utilis, quando electo æger surgit, ut uel uentrem exoneret, uel prioris cubilis durtiam nō ferens ad alterum transferatur. id quod ipse etiam in libro De fracturis ostendit. canalē quoq̃ ibidē declarat sicut non prohibere, quo minus crus moueat, ita molestū atq̃ immitem quoq̃ esse, & sape cōprimere. quapropter iubet hic ut & ad morbū cuius causa canalis adhibetur, & ad damna quæ canalis ipse affert, respicientes, eum modo assumamus, modo reiiciamus. nam si magis nocet, q̃ prodest, reiiciendus. si maiorem utilitatem affert, assumendus: ita tamen, ut toti cruri, non usq̃ ad genu tantum subijciatur.

20 Exhibitio autem, & dissentio, & con-

formatio, & reliqua secundum naturam.

Exhibitionem esse, cum ager medico sese curandum præbet, superius dictum iam est. quo in tempore quando medicus primum affectam partem aduertit, atq; ex ea significationem sumit, deinde ad curationem eius sese præparat, in habitu quodam esse affectum membrum cõuenit, qui secundum naturam eius sit. quippe cum ex eo qui præter naturam membri est, non parua contingere læsio consueuerit. post exhibitionem distentio fit, si ita paruum malum est, ut satis sit, si in superioribus partibus tantummodo id cohæbeamus. tunc igitur melius quoq; esse, ut ager membrum in sua naturali figura ne cõseruet, nemini dubium est. postea conformationis occasio sequitur, in qua eundem quoq; habitum seruari simili modo cõuenit. post quã depositionis & appensionis tempus est, quæ utraq; nominatim quidem nõ dixit, sed dum inquit, & reliqua significauit.

2 Natura uero in operibus existit, ex operis actione quid ea uelit, coniectandum, ad hæc autem ex immorante, ex communi, ex consuetudine. atq; ex immorante quidem & remisso rectas processiones debemus cõsiderare, ut in manu. ex communi, extensio nem & inflexionem, ut quod prope ad angularem cubiti ad brachium figuram accedit. ex consuetudine, reliquos habitus facilius minime ferri, ut crura extensionem. ex ea enim facillime plurimum tempus nõ immutata perdurarent.

Quoniam in priore oratione de eo quod secundum naturã est meminit, merito nunc quoniam ipsa hæc natura sit, quæq; eius notæ, exponit. atq; inquit, natura uero in operibus existit. ex operis actione quid ea uelit, coniectandũ. non secus ac si ita dixisset. secundũ naturã quidẽ habitus esse debent, at secundũ operationes scopi ipsorum, & utilitates, ob quas exercetur. ad hæc aut, id est ad quæ modo dicta sunt, exhibitionẽ uidelicet, distentionem, & conformationẽ, & positionem, utpote cũ ager affecto membro nullam operationem exerceat, alij scopi ad naturalem habitũ membri inueniendum proponendi nobis sunt, quos deinceps ipse enumerat, dum inquit. ex immorante, ex communi, ex cõsuetudine: immorans appellans, quod nihil omnino operat, sed prorsus quiescit. ex quo inquit rectas processiones sumit, sicut in manu docuit. ubi uult subiectũ esse os cubiti, os uero radij superiectũ. ex cõmuni uero figuram aduertendam censet, quæ inter inflectionẽ, & extensionem integram intercedit. quam prope ad angularem cubiti ad brachium figuram accedere inquit, angularem aut figuram appellari dicunt, quæ recto angulo constat, id est ita ut cubiti os ad os brachij rectũ angulũ efficiat. cum aut omnia antiqua exemplaria habeant, quod prope accedit, & omnes etiam qui hunc librum explanat, lectionem hanc agno-

A scant, duobus modis male id esse dictum constat, si angularem figuram eam intelligamus, quæ acutum angulum efficit. acutum enim angulum minorem recto appellamus. nam cum recta linea supra rectam collocata utrinq; angulos inter se æquales efficit, recti ij anguli sunt. cum inæquales reddit, qui recto est minor, acutus: qui est maior, obtusus dicitur. ac rectus quidẽ angulus maior & minor esse minime potest. eorum uero qui aut acuti sunt, aut obtusi, numero cõprehendi multitudo nequit. nam rectus angulus indeclinabilis est. quippe cũ a recta linea constituatur supra rectam collocata, ita ut in neutra partẽ insistens declinet. cum enim in alteram partem inclinatur, quanto id magis uel minus fiat, innumerabile est. q̃ igitur absurdũ esset, si uolens rectum dicere quispiam esse eum alferet, qui prope ad acutũ accederet: recti enim notio præcedit, acuti intellectio subsequitur. propterea q̃ rectus unus, sicut dixi, tantummodo est: acuti multitudo sunt infiniti. quo circa si quis acutũ prope ad rectum accedere affirmaret, iure id diceret. nam cum plurimi acuti sint, eum ex ipsis prope ad rectum accedere intelligeremus, qui parum a recto deficit, quicq; linearum quæ ipsum efficiunt, cõmissionem non admodum compressam habet. eodem modo cum quamplurimi sint obtusi, eos prope ad rectum accedere diceremus, qui linearum cõiunctionẽ mediocriter obtusam habent. at prope ad acutum accedere angulum aliquem, intelligi non potest, cum acutus unus non sit. præterea in eo etiam esset absurditas q̃ neq; *εὐωνυς* duobus *γ*, id est inangulares, quo uerbo hic utitur Hippocrates, neq; *δυσωνυς* per *δ* diphthongum, id est bene angulares figuras appellare, quæ angulum acutum habeant, ex Græcis consueuerit nemo: sed eas tantũmodo, quæ recto angulo consistant, necessarium igitur fortasse est angularem, id est *εὐωνυον* hic figuram intelligere, quæ recto angulo constituitur. quæ sit, cum cubitus rectum angulũ cum brachio efficit. Quarendum tamen uidetur, cur quod prope accedit, hic apposuerit Hippocrates. sed anteq̃ hoc explicem, illud quod sæpe consueuimus, etiam hic mihi dicendum censeo. Obscure hæc loquutiones nullam certam, scientiaq; effectricem habere explanationem possunt. quo circa in his satis illud esse debet, si unã cum probabilitate & uerum esse quod dicitur, & non repugnare sententia autoris uideatur. ad hoc igitur spectans explanare hæc rem conabor. Dico igitur angularem figuram, id est *εὐωνυον* id non admittere, ut magis & minus esse possit, propterea q̃ una est, nosq; talem in brachio figuram primum efficere non posse, quæ absq; ulla declinatione ex ossium inflexione angulus prorsus rectus cõstituatur, ut satis superq̃ sit, si ab eo procul non recedamus. deinde, si etiam possemus, huiusmodi esse brachij figuram minime debere. naturalem enim eius figuram prope ad angulum rectum accedere, ita ut paululum ad obtusum tendat, quæ uidelicet ad extensionẽ procedere incipit, demonstrabo. atq; huiusce rei demonstratio ex ijs ducetur, quæ ipse Hippocra-

tes hic scribit. ex immorante enim & consuetudine naturales figuras atq; habitus membrorum inuē-
 turos nos esse inquit. quæ sanē utraq; coniuncta
 cōpositum unum scopum efficiunt. perinde ac si
 quispiā in hunc modū dixisset. quæ figura cum do-
 lore afficiuntur, cōtinere singula membra consue-
 uitimus. ea figura in curationib; quoq; eligenda est.
 primus enim idonearum figurarum scopus do-
 loris esse uacatio uidetur. si igitur eos qui dolore
 afficiuntur, inspexeris, eo positum plerumq; manus
 tenereprehendes, ut nō prorsus mediā inter ex-
 tensionem & inflexionem, sed ad extensionē ten-
 dens figuratio earū sit. idem in alijs habitibus etiā
 cōtingit. nam in defesso eam figuratiōē omēs eli-
 gunt, quæ dolore maxime uidetur carere. non em̃
 mediū prorsus situm inter supinum & pronū in a-
 cendo suscipiunt, sed ad pronum paululum decli-
 nant. quapropter Hippocrates cum hoc uellet ex-
 plicare, orationi huic suæ quod prope accidit ad-
 iunxit. nam figuram hanc in brachio, quā dixi, ma-
 xime omnium dolore uacare illi etiam plane no-
 uerūt, qui uel talium artis operum periti sunt, uel
 ueritate orationis huius non ignorant. unusquisq;
 enim qui quolibet opus explanandum suscipit,
 duo quidē hæc debet spectare, ut & auctoris sen-
 tentiam, & rei quæ dicitur, ueritatem assequatur.
 ubi tamen ex loquutionis obscuritate auctoris sen-
 tentia est incerta, seruanda ē omnino ueritas est:
 qua prodesse discētib; potest. hunc scopū ego
 in omnibus explanationibus habeo, seruareq; sum
 moperē enitor. at nonnulli ex explanatoribus etiā
 amiti uellent, assequi eum non possent, cum & o-
 perū artis imperiti sint, & ad captiosum disserēdi
 genus sese contulerint, euaserintq; illi, qui rationa-
 les medici nuncupantur, quorum causa sit, ut qui
 recte etiam utuntur ratione suspecti apud uulgos
 habeantur. Hæc igitur etiam si breuib; & raro di-
 cta sint, memoria teneri debent. Sed iam ad re-
 liqua peragamus. Sicut in supina & prona figura
 illa dolore maxime uacat, cui plurimū uitæ tem-
 pore affuerit fere omnes fuerint: sic in extensione
 quoq; est. in hac siquidem figuratiōe crura tene-
 re absq; ulla mutatione q̃ diutissime possumus. ne-
 cessarium autem quoq; esse, ne in aliam, quā mi-
 nus dolore careat, figurā cras immutemus, in cō-
 mētarijs De musculis unā cum causæ propriæ af-
 signatione demonstratū est. ut hic non demonstrati-
 one, sed cōmemoratione opus sit. quædam modū
 etiam, cur cito rursus eodē redeamus, causam af-
 ferre hic necesse non est, cū longiorē orationē re-
 quirat. quippe cū melius nunc sit q̃ causam hanc
 explicare, alterū quoddā referre, quod simul cum
 Hippocratis sententiæ declaratione, maiorē ado-
 lescentibus asferre utilitatē poterit. q̃ a nobis in li-
 bris De musculorū motione dictum est. in brachij
 em̃ ad cubitū dearticulatione naturalis figura me-
 dia est inter utraq; excedētes, quib; uidelicet uel
 extendere, uel inflectere nullo modo amplius ua-
 lemus. ea enim sit, ut cubiti sinus quem duæ corni-
 ces, id est incurui processus terminant, in os bra-
 chij coaptetur, à cardinamētaliq; brachij rotunda

Galent.

A tione cōpleatur, quā duo utrinq; tubera quos cō-
 dylos uocāt, cōprehēdunt. nam in ultima extensi-
 one posterior cubiti cornix in posteriorē brachij
 sinū, sicut in ultima inflexione anterior in anteri-
 orem infigi consueuit. ita ut qui posteriorē brachij
 sinū cauiorē natura habēt, in extensionibus am-
 pliū in exteriorē partē cubitum reducant: qui ue-
 ro in eo deficiunt, contrā cubitū extendere peni-
 tus non ualeant. nō ergo fabricæ dearticulationis
 similes in omnibus, neq; certī extensionis termini
 sunt: ac propterea neq; idē mediū est in omnibus.
 quando igitur mediū inter ultimā extensionē, &
 ultimā inflexionē, habitū naturālē esse dicimus,
 medium id nō in certo quodā termino & exqui-
 sito, sed in latitudine quadā intelligēdū cēlemus.
 id autē, cōmune hic appellat Hippocrates. sed sicut
 fieri non potest ut in mediā figura exquisitē bra-
 chij cōstituiamus, ita ut ne acus quidē crassitudo
 uel addi, uel detrahi queat: sic in figuranda manu
 à medio eo certo procul recedendū minime est. in
 eo siquidem artificiosa coniectura à non artificio-
 sa distat, quod artificiosa, prope ad exactam æqua-
 bilitatem accedit, quæ arte caret, ab ea quā plu-
 rimum interdū aberrat. quocirca potest etiā hoc
 modo consulere Hippocrates, ut quod ad angula-
 rem figuram prope accedit, seruiamus: ut, angula-
 rem eam uocans quæ recto angulo constat, eodē cō-
 iecturam dirigentes non procul ab exquisita eius
 æquabilitate recedere nos uelit. quod autē dixi me
 docturū esse iuuenes quod ad præsentem rem uti-
 litatem maximā afferret, illud iam explicabo. Tan-
 tam sanē in omnibus quæ ad medicinā spectant,
 uim habet cōsuetudo, ut ea aduentitia naturā à mā-
 ximis medicis fuerit appellata: uideatq; ipse etiam
 Hippocrates inter maxime necessaria eam consti-
 tuere, eiq; secundā post naturam uidelicet indica-
 tionis uim attribuere, certā & exquisitā figuræ spe-
 ciem eam esse existimās quæ est naturalis, ut in o-
 mnibus ægrotantibus seruetur, nisi quatenus pro
 uniufcuiusq; consuetudine uariandum sit. Ego igitur
 cū nonnullos uiderē toto die considerare, cuius
 modi illi sunt qui sedentarias artes exercent, alios
 stare, alios deambulare: non ab re esse iudicauī, si
 magis extento habitu crus illis figurandū curarē,
 qui plurimū tēpus crura eo modo tenere fuerant
 assueti: minus uero extento, qui toto die cruribus
 inflexis confediscent. atq; id cū experimento cō-
 probassem, ita esse deprehendi, sicut sperauerā in
 brachijs quoq; eadē ratio seruanda est. sunt enim
 prope ad angularem habitū figuranda, sed magis
 tamen, & minus prout cōsuetudo dictauerit. ex
 perimento homines solent, rem quoq; hanc certā
 iam habere præcognitionem testimonio est cōm-
 probatū: neq; enim fraudare hoc ipsam uolui. ab
 omnibus siquidē amicis examinata, certa atq; ad
 talia utilissima euasit. Hippocratem igitur quoq;
 diximus exquisitam angularem figuram pro con-
 suetudinum uarietate immutandam censere, ita ta-
 men ut mutatio exigua, hoc est prope ad angula-
 rem figuram efficiatur.

tom. 6

M

In

22 In immutatioe aut ex distentione in ha bitum uel positione similia haec, musculos, uenas, neruos, ossa habeant, uel maxime disposita, & bene detenta.

Haec prius etiam dicta sunt, ut si quis ea penitus omittat, ac de medio tollat, nullam iacturam sit facturum. contingit autem in huiusmodi libris, ut quae multas res breui loquutione significat, aliter atque aliter ab auctore ipso scribatur, dum uidelicet spectat quae potissimum sibi dicendi forma utendum sit. & deinde cum librarius alia huiusmodi scripta in fronte, alia in margine exarata repperit, omnia in contextum libri reducat, quo maxime ordine sibi uisa fuerint apte collocari posse. Quod autem hac oratione significatur huiusmodi est, multa esse tempora aegrotantis iam diximus: primum id quo ad medicum accedit, in aliqua figura membrum affectum prorsus continens: deinde alterum, quo seipsum medicis exhibet, ut cognoscant & quo morbo affectus sit, & quo apparatu ad curationem indigeat: tertium praeparationis ipsius tempus est: distentionis quartum: post quod si fractura sit, conformationis, si luxatio repositionis occasio subsequitur: postea deligatio adhibetur: ultimum omnium tempus illud est, quo si manus laboret, appenditur, si crus, aut dorsum, aut caput deponitur. Habitu igitur hic uocat ab habendo post deligationis tempus membrorum deligatorum collocatione, a qua distinxit positionem eorum uidelicet quae deponuntur. quae sunt tria, crus, caput, & uniuersa dorso si spina. ut de reliquis omnibus habitu intelligamus, de iugulis, de manibus, costis, summo humero, scapula, maxilla utraque, & si quid aliud huiusmodi est. uult enim in immutatione horum omnium membrorum cum affecta sunt, alia bene poni, quaecumque poni possunt, alia quae poni nequeunt bene excipi ac detineri. illa *ὡς ἔστι*. i. disposita ac bene deposita, haec *ὡς ἔστι*. i. est bene detenta atque excepta appellans. commune autem in utrisque illud est, quod secundumfigurationem naturalem consistui debet. ad eam enim respiciendum nobis censet extremum illud tempus obseruantibus in deligatione facienda, quo diutius seruari eo modo possit. nam si alia figura deligationem faciemus, in extremo illo tempore immutanda erit. quia immutata sitis quoque musculorum, & neruorum, & uenarum necessario immutabitur. atque ita neque disposita, neque bene detenta, id est neque bene disposita, neque bene accepta erunt. atque appensa.

23 Distentio in maximis & crassissimis, & aequalibus, & ubi utraque praecipue fiat. secum de loco ubi subiecta pars tantum laesa est: ubi uero superius, minimum.

Distentio, inquit, praecipue illis in partibus fit, ubi maxima & crassissima ossa sunt, & quae circa ipsa sunt corpora, id est musculi. hi enim maxime extendi debent, propterea quod retrahi ad capita sua maxime consueuerunt. membra autem quae huiusmodi extensione indigeant, sunt femur: deinde bra-

chium, & tibia: tum cubitus: postea quae in summa manu, summoque pede existunt, exceptis istis in praesentia quae in spina dorsii sunt. uerum etiam ubi utraque ossa laesionem sunt passa, maiorem distentionem desiderant. ut in cubito & radio, minimum autem, id est moderatissime & leuissime distendi debent ossa quae superiora sunt, sicut in cubito radio. at omnia haec ut superius dixi, in libro De fracturis absolute fuerunt explicata.

24 Magis autem quam sit mediocriter, nocumtum affert, praeterquam pueris. accliuia autem oportet habere paululum.

Si fiat distentio magis quam sit mediocriter siue in fracturis, siue in luxationibus, laesionem affert, ac facit, ut membrum, si fractum sit, conformationem, si luxatum, repositionem frustretur. ac sane proprium eius nocumentum est quod & dum efficitur, maiore dolore afficit, & postea quae facta est, febres, conuulsiones, & resolutiones interdum inducit. id quod Erasistratus uidisse se in quodam testat, cui amplius quam par erat, distentus humeri articulus fuerat. pueri tamen ob corporis humiditatem ac mollitudinem facilius quam ceteri tolerare nimiam extensionem consueuerunt. sicut enim humida & molliora sine rupture uehementius extenduntur, dura uero & sicca rumpuntur: eodem modo & musculi et nerui si humidi & molles sint, facile extensionibus obsequuntur, neque uehementem dolorem sentiunt, neque abrumpuntur: si uero humidi & duri fuerint, cum sine magna ui extendi nequeant, non solum dum nimium distenduntur, uerum etiam dum mediocriter, uehementi dolore afficiuntur. quin etiam dum id fit, diuelli ac dirumpi musculorum ac neruorum fibrae interdum solent. quorum nihil pueris euenit. sed si neque in inflammationes, neque ob ipsas febres, aut deliria, aut conuulsiones, neque resolutiones incidunt atque ipse quidem Hippocrates de pueris sermonem fecit. nos ad Eunuchos & mulieres atque eos qui aut natura aut consuetudine humidi et molles carne sunt, transferre id hoc dictum poterimus. quippe cum huiusmodi omnes temperatura distentioni facile cedant: nullumque inde etiam si modum aliquantum ex cesserint, magnam nocumtum consequuntur. nam quibus uel natura, uel consuetudine corpus induruit, si & distentionem aegre tolerant. unde etiam minus extendendos a medicis esse huiusmodi inquit. nam si immoderatus paulo extendantur, non mediocriter laesione affici consueuerunt. accliuia autem oportet habere paululum. haec quoquefigurationem, sicut quod ante positum est, ob id eligendam censet, primum quia stabilior & tutior, deinde quia innoxia magis est. contraria enim ob dolorem nocumentum affert.

25 Directionis exemplum esto equiuocum, coniugatum, simile, sanum.

Non equiuocum sed uniuocum dici melius erat. equiuoca siquidem ea sunt, quae non sunt eiusdem generis. Nam homo homini uniuocus est. equus item equo. canis terrestris terrestris cani, marinus marino. quaecumque enim nomina unam speciem in multis

multis singularibus significat, uniuoce de ipsis dicuntur. quæ uero de multis diuersis specie dicuntur, æquiuoce nuncupantur. & res quæ ipsis subiunguntur, ab ipsis significatur, æquiuoca sunt. manus igitur cum eandem speciem cum manu habeat non æquiuoca, sed uniuoca esse merito dici debuit. Sed accurata hæc de nominibus consideratio non magni facienda quibusdam uidetur. quapropter omisissis his ea quæ ad artem pertinent, persequemur. lubet ut in affectis partibus dirigendis exemplo utaris æquiuoco, coniugato, simili & sano. æquiuoco, & cognomine, dum brachium brachio, cubitum cubito, femur femori, tibiam tibiæ confers. coniugato & compare, dum in eodem homine non in diuersis comparationem hanc facis: id quod in libro etiã De articulis monuit, cum inquit. neque alieni articuli inspiciendi &c. adiungit autem coniugato simile, propterea quod fieri potest, ut coniugatum quidem sit quod confertur, non tamen simile. sæpenumero enim contingit, ut & brachium alterum ex aliqua affectione aut alimentum non admiserit, aut abscessu laborarit, alterum crus uel uarum, uel ualguum euaserit. unde etiam subdit, sanum, non ueritus dicere, quod idem planè potestate est, ne quicquid prauè intelligere ualeamus. quod enim coniugatum est, sanum etiam prorsus est, si fuerit simile: nisi utraq; eandem affectionem fuerint passa. sed hoc rarum est. quod si dicamus, simile sano subiungi debere, eadem ratio erit. satis enim fuerat, sanum dixisse cum in se quoque similem contineat. sed fortasse hoc ex eo euenit, quod cum utraq; disquirendi causa scripsisset Hippocrates, ut in alijs cõtingit, non alterum tamen in contentum, sed utraq; librarius admiserit.

26 Refrictio soluendi, uinciendi, carne augendi, minuendi uim habet. uinciendi, si dura: soluendi, si mollis: minuendi, si multa: incrasfandi, si mediocris adhibeatur.

Vincire appellat densare: soluere, rarefacere, et mollescere. minuire uero, attenuare. par est igitur, ut dura frictio perfricatam carnem sibi similem reddat, dum comprimit eam, ac constringit: mollis item eodem modo sibi similem carnem efficiat, utpote quæ cõtraria ijs quæ dura efficit, agat. multam quoque cum plurimum digerat, attenuare sentaneum est. nutrita autem & carnem producit non ea quæ absolute multæ est opposita, id est pauca, sed mediocris. id quod etiam superius dixit, cum de calidæ aquæ usu ageret. pauca enim prorsus frictio, non secus ac pauca aquæ perfusio nihil efficit, quod sensu quidem percipi queat. eousque igitur frictum est, cum carnis nutriendæ causa id sit quoad eadem indicia extiterint, quæ in moderata aquæ perfusione superius dixit, his uerbis. Cum adhuc suspenditur, priusquam concidat, desistendum. primum enim tollitur: deinde attenuatur. nihil autem ex operibus fricationis prætermitti in secundo De salubribus libro demonstratum à me est. aduertendum autem est id quod plerisque est ignotum, ueteres Græcos *ἀνὰ τριῶν*, id est refri-

Galen.

ctionem, quo uerbo hic utitur Hippocrates, non solere appellare eam frictionem quæ ab inferiori parte sursum ducitur, sicut compositio uidetur significare. sed absolute omnem quomodoque factam. quin immo rarum inuentum *βίβλος* nomen appud ipsos est. solent enim *ἀνὰ τριῶν*, id est refractionem nominare, quam nos *τριῶν*, id est frictionem seu fricationem uocamus.

27 Tum uero deligandum est. ac primum quidem qui est deligatus, maxime ea parte qua noxa est, in extremis minimum dicat se fuisse compressum. atque affulcitas sibi esse facias, non aut compressas, multitudine, non uehementia. ac die et nocte ea paulo magis. minus posteriore. laxius tertia. ac posteriore quidè tumor mollis in extremis partibus, inueniatur. tertia, pars quæ deligata fuerat, soluta gracilior inter omnes ligationes appareat. secunda deligatione an iuste deligatum sit, cognoscendum. inde magis ac pluribus constringendum est. tertia itè magis, ac pluribus, at septima quæ à prima deligatione fuerit soluta ossa, gracilia, ac depressa reperiant. in ferulas deligata, si gracilia & absque pruriginibus, & ulcere sint, usque ad uiginti dies à noxa relinquenda sunt. si quid suspectum sit, solui in medio, ac ferula tertio post die firmari debet. appensio, depositio, deligatio uti eodem in statu sint, obseruandum.

Fulcimina i. *ἐγκύσματα* ea Græcos appellare quæ sustentandi & firmadi causa apponunt, perspicui ex Homeri eo uersu est, quo inquit. Fulcimina puppibus abstrahit. id è *ἐγκύματι*, id est affulcitas esse significat, hoc est firmatas atque applicatas esse. id aut multitudine magis & uehementia linteorum fieri debet. priuatim uero de deligationis cõstructione nunc præcipit. sed de hoc, & de alijs omnibus, quæ tum hic, tum sequentibus in orationibus docet, et in libro De fracturis, & in libro De articulis perfrictus explicatum est, ut quæ illic dicta sunt, non amplius huc esse transferenda existimem. turpe enim esse puro, si quæ satis superque alibi fuerunt explicata, ita etare cõmemorando uelim. quo circa his præteritis, quippe quæ clare ijs patere possint qui libros De fracturis & De articulis legerint, ad sequentia descendemus.

28 Figurationum summæ sint hæc. cõsuetudines, naturæ uniuscuiusque membri, species excurrando, ex ambulando, ex stando, ex iacendo, ex opere, ex remittendo.

Ex hac oratione perspicuum illud est, librum hunc commentariis exemplaris in modum scriptum fuisse, ac post auctoris mortem editum. fieri enim solet ut qui huiusmodi libros describunt, ea quæ uel duobus modis, uel extrinsecus ab auctore ea de causa fuerant exarata, ut diligentius postea consi-

tom. 6

M 2

dera-

deraret utro ex illis melius enunciare sententiam suam posset, in contextu operis inserant. cui enim credibile sit, Hippocratem his eadē scribere uoluisse, cum nulla id necessitas egeret: & praesertim hoc in libro, ubi summam loquendi breuitatē uidetur affectasse: ceterum quia qui ante me fuisse, haec quoque explananda esse censuerunt, ego quoque eos sequar. Summas igiturfigurationum, scopos eum appellare in quos respicientes in unoquoque membro accommodatam figuram reperimus, manifestum est. quin etiam consuetudinem unum esse ex his scopis superius dictum est, illis uerbis. Exhibito, & distentione, & conformatio, & reliqua secundum naturam. natura uero in operibus existit. ex operis actione quid ea uelit coniectandum. ad haec autem ex immorante, ex communi, ex consuetudine. atque ex immorante quidem ac remisso, rectas processiones debemus considerare, ut in manu: ex communi, extensionem & inflexionem, ut quod prope ad angularem cubiti ad brachium figuram accedit. ex consuetudine reliquos habitus facilius minime ferri, ut crura extensionem. ex ea enim facillime plurimum tempus non immutata perdurarent. Haec cum superius scripserit, uide quomodo non peius scripisset de iisdem in proposita hac ratione. nam cum scribat consuetudines & naturas uniuscuiusque membri, postea species, id est differentias ipsorum ex operationibus agnosci uult. nonnulli etiam species membrorum ascripserunt, ut oratio ita sese habeat: species membrorum. nam de cruribus exemplum subiungit, cum inquit, ex currendo, ex ambulando, ex stando, & postea inserit ex iacendo, quod profecto idem est cum eo quod superius dixerat immorari & cunctari. cum item subiungit, ex opere & remittendo, opus pro particularibus operibus, id est pro currendo, ambulando, & stando: remitti pro immorando sumit. ut nihil amplius in hac oratione quam de operibus, & quiete dixerit. neque enim quia in principio naturas membrorum nominauit, propterea putandum est eum aliam tertiamfigurationē dixisse, cum nullum aliud naturae praeter opera indicium protulerit. omnino siquidem quemadmodum in superiore oratione scriptum est, in omnibus occasionibus curationis morborum quae manuum operam requirunt, seruanda figura una est, quae naturae membri fuerit accommodata. ea autem inuenitur, inquit, & ex immorante, & remisso, hoc est quando quiescit quispiam. & ex communi, id est eo quod inter extremam extensionem & contractionem medium est. & ex consuetudine in qua uidelicet & opera & quies continentur. ut duo haec figurae secundum naturam uniuscuiusque membri indicia maxime generalia existant, & mediocritas inter excessus, & consuetudo. At ego in libris De motu musculorum de his cum differuerim, & fabricam membrorum quam ex dissectione inuenimus ostēderim, figuras quoque membrorum naturae accommodatas, sicut ipse etiam in lib. De fracturis Hippocrates, declarauit. Tamen fieri potest, ut alijs & nominibus, & uerbis u-

sus de iisdem rebus alia dicere uideatur. quoadmodum si quis figuram dolore carentem diceret. non enim in alio id reperit, quam in quiescente. idem quoque medium inter excessus erit. quin etiam ex fabrica membrorum idem inuenietur.

29 Quoniam usus corroborat, ocium tabefacit.

Hoc quoque scripsisse quasi commentarij in modum uidetur libri huius auctor, eo consilio ut fortasse in editione postea dilataret in alijs autem exemplaribus scriptum reperit in hunc modum. Cur usus corroboret, ocium tabefaciat. quasi id sibi in questionem auctor proposuerit, quod non modo in chirurgia, uerum etiam in ijs quae ad uictum spectant, utilissimum est. effeminatum enim corpus omne ocio uacantium, infirmumque redditur: sicut eorum qui eo utuntur & operantur, corroboratur, ac ualidum efficitur. duplex autem orationis huius probatio est. experientia, omnium qui attēdunt ijs quae euidenter apparēt. & naturalis fabrica indicio, sicut in salubribus commentarijs dictum est. in his igitur quae ad manuum operam curationemque attinent, non oportet quam plurimo tempore affectas partes immotas seruare, sed nonnulli tutelae causa facere consueuerunt: sic mouere eas mediocriter debemus, si absque inflammatione fuerint. atque id primum incipere cum aqua calida supra affectum locum infunditur, deinde etiam in balneis, tum absque balneis idem facere.

30 Multitudine quam compressione.

Hoc etiam in annotationibus scriptum ab auctore huc à librario translatum est. nam superius integre & aperte, non ut hic diminute & obscure dictum hoc idem fuit. oportet enim ut linteorum subintelligamus, quo integra oratio talis euadat. constrictio multitudine linteorum magis quam compressione facienda est.

31 Quaecumque excussiones, uel contusiones, uel uulsiones, uel intumescētia inflammatione carētes ex uulnere exhauriuntur, in superiore corporis parte plurimum, in inferiore parum, deligandum est. non decliui manu, neque crure habito, initia iniiciendo supra uulnus, & firmādo maxime, in extremis minimum, mediocriter in medio. ultimam partē ad superiora corporis reducendo deligatio ne, & compressione. uerum etiam haec multitudine magis quam uehementia. maxime uero his lintea tenuia, leuia, mollia, munda, lata, sana requiruntur. ac sine ferulis, perussione uero aquae ampliore utendum.

Contusiones *πλάσματα* per *φ* literam appellare Hippocrati mos est Ionica lingua, quae ab alijs per *θ* *θλάσματα* dici consueuerunt. sunt autem, cum graue aliquid supra corpus incidit, & collidit, ita ut carnea pars disrumpatur. cum uero caro contusa in locum sub cute cruore contrahit atque excusat, exuccatio, seu sugillatio uocatur. sique id sine ulla

ulla cutis diuisione. uenas tamē exiguas simul cū carne rumpi ac discindi in suggillationibus huiusmodi perspicuum est. at uuliones in fibris musculorum contingunt, dum nimis distent: interdum rumpuntur. quæ à recentioribus medicis *πληγμα* hoc est uellicationes seu discerptiones nuncupantur: ubi hæc dixit Hippocrates, subiungit intumescentiæ, quæ *οίδημα* appellat. omnes enim tumores præter naturam uno hoc nomine uocare consuevit. cum cæteri posteriores in inflammationes & duritias, & intumescentias eos distinguat. nam inflammationes Hippocrates incisiones ipsas nuncupat, unde etiam nomen calidis tumoribus impositum est. præter hos aliud quoque est quod *φυσίπλεες* dicunt, id est uicinātraham, quod incensum quidem atq; inflammatum semper est, cum tumore uero non semper. hæc autem omnia quæ ab Hippocrate comprehensa hic sunt, aliam quidem & ex uictus ratione, & ex medicamentis curationem habent. sed quæ manuum opera exhibetur, ea deligandi modo afficitur. præsertim cum ex deligatione præcedente noxæ hæc exortū habuerint: de quibus uidelicet sermo ipsi nūc est. nam quod inquit *ὑπερβύνη*. i. exhauriantur, significat exprimuntur, ac per expressionem extolluntur, atq; exurgunt. immo nonnulli scribunt *ὑπερβύνη*, quod est extolluntur, ut nulla expositione explicari amplius debeat. deligationem uero horum in libro De fracturis ab ipsa parte, quæ tumore affecta est: nūc à uulnere faciendam censet. uulnus autem appellari hic membri noxam satis constat, atq; eatenus à deligatione fracturarum nunc uariat, quod plurimam fasciarum cōvolutionē in superiorem partem: paucam in inferiore hinc duci uult. quod autem inquit, non declui manu, neq; crure habito: commune cum fracturarum deligatione est, sed quia maximam in his quoque de quibus nunc agit, uim habet, nunc etiam repetitū est. ne si negligentius nos geramus sicut quandoque consueuimus, in magnū aliquid damnum incidamus. quæcūque enim si recte uel non recte fiant, non paruā uel utilitatem uel læsionem afferunt, ea cōmemorare frequentius nō ueretur. ex quibus uero paruū uel no cumentū, uel emolumentum euenturum nouit, de ijs semel dicere satis sibi esse putat. in fracturis igitur cū statim deligatio adhibita est prius q̃ inflammatione circa partē affectā orta fuerit, uel aliquid aliud ex malis quæ nunc dicta sunt, ne quicquid ad partem affectā affluat, similis quidē cura, sicut in his, esse consuevit. ut uero discutatur quod in parte affectā cōtinetur, non ita danda opera est. unde etiam hic perfusionem aquæ adiunxit, non q̃ illic non omnino sed q̃ hic magis ea utendū sit. in huiusmodi em̃ affectionib. calida aqua fouere magis est opus, ut quod in tumefactis partibus inest, discutatur. quemadmodū etiam ipse ubi de calce agit, in quo ex eo q̃ ex alto quispā desiluerit, sugillatio quædam fuerit exorta, cum alijs quæ scripsit ad curationem huius accommodatis, hoc quoque apposuit. aqua calida plurima utendum esse, et nō compressione deligata parti præsidium compara-

Galen.

A ri dictum quoque hoc idem est de fracturis. est tamen in his, & ne comprimantur, & ut discutiantur, necessitas maior. unde ob eandē causam absq; etiam ferulis deligationem fieri iubet: ut duo sint, quæ à deligatione fracturarum ipsam hanc separant. quatenus uidelicet & minus cōprimi debeat: & lintea maxime leuia, et tenuia, et mollia, & munda postulat. his enim indigent ea quæ sicut minorem compressionem, ita maiore digestionem desiderant. addidit autem sine inflammatione unum quodque horum esse oportere, si præscripta hac deligatione curandum sit, propterea quod quæ in inflammatione infestatur, ne modicam quidem ex deligatione compressionem tolerare possunt: solentq; tum cataplasmatis, tum frequenti aque calida perfusione, tum medicamentis humidis curari, quæ uidelicet inflammationibus finiendis sunt accommodata.

32 Excidentia autē, aut tortiones, aut dissidentia, aut auulsiones, aut abruptiones, aut distortionē, ut manca & in alteram partem uergentia, unde quidam excessere, concedendo, quo intendendo deliganda sunt: ut deligata in contrariam partem declinēt, uel prius quàm fuerint deligata. paulo magis, quàm ut ex æquo sese habeāt & fascijs, & plagulis & appensionibus, & figurationibus, extensione, frictione, directione, nec non hic etiam ampliore perfusione.

C De omnibus his affectionibus in libro De fracturis, & articulis absolutissime edocuit. nūc uero sicut de alijs multis, ita de his quoque quasi cōpendium quoddam scribit. quod quidē per se ob breuitatem obscurum cum sit, ijs qui illos libros legunt, satis claret. & nos etiā propterea quia ea iam explanauimus pauca nunc memoriæ reuocandæ causā referemus. nam si quis ab hoc de ijs quæ in Medicatrina fiunt, libro auspicietur, ei magister ea omnia euidentia causa debet recensere, quæ de fracturis, & articulis scripsit Hippocrates. huc uero transferenda, ac describenda in commentarium minime mihi esse arbitror. Vocat igitur Hippocrates in hac oratione excidentias articulorum luxationes: tortiones uero, cum articulus quidē est illæsus, sed neruosa circa ipsum partes tortæ sunt. id quod maxime in ijs contingit quorum in uacuum gressus delabitur. Dissidentias uero appellat cum ossa quæ natura coherant ac sese mutuo contingunt absq; articulo, ob aliquam læsionem dissidentē a se, ac distant, cuiusmodi in libro De fracturis atq; articulis nominatim cōmemorat cubitū & radium in brachio, ad gibbum, & ad manum, in crure tibiā & suram, qua & genu & calci cōmittuntur. auulsiones autē osium fiunt, sicut ipse de summo humero disseruit, cum, quæ ipsum colligant, diuulsa plurimū a se mutuo secesserint. at abruptiones, quas *ὑπερλάματα* dicit, *ἑπὶ γυμνῶν*, id est abductiones à recentioribus nuncu-

tom. 6

M 3

pantur

pantur. de quibus in fine libri De fracturis meminit, & nervorum, uenarumq; fibris circa gibbum cubiti contingere eas inquit, abductionemq; ibi appellat. unde posterioribus sumpta appellatione abductiones fracturas uocare consueuerunt, quæ cunctæ prope articulum per totam ossium crassitudinem fiunt: ita ut à sese plurimum distent. hæc à recentioribus caulatim factæ fracturæ nuncupantur. Distortiones uero à tortionibus in eo differunt, quod hæ articulum quodammodo attingunt, paululumq; ipsum distorquet, & commouent. fiunt item circa unum os, ac præcipue circa tibiam in pueris, quam etiam unâ cum appositione eorum quæ dirigit utrinq; ex tiliâ, alioue aliquo ita ualido, ac molli ligno asserculis tenuibus factis deligamus. Recte autem fecit, cum loquendo de distortionibus, in alteram partem uergentia adiunxit. siue enim, ut nonnulli scribunt, ut manca: siue, ut alij, ut ualga, utriusq; lectionibus in utranq; partem uergentia conueniunt. quippe cum tam interiorius, quam exteriorius tota dearticulatio, & præcipue in cruribus circa genu, & circa malleolos se per numero inclinetur. quæq; in exteriorem partem uergunt, ualga, quæ in anteriorem, uarâ & manca appellantur. his omnibus affectionibus accommodata est deligatio duobus his modis. adhibita: ut & quo recessit pars, inde urgeat, ac propellat fasciæ. et unde recessit, laxa eo loco sint: ut quod per deligationem impellitur, ibi suscipi ualeat. quocirca concedere ea in parte, id est remittere, & non intendere deligationem oportet. ubi uero inquit, quod intendendo subintelligendū est, excessere. ut integra oratio eiusmodi euadat. Vnde excessere, cōcedendo, id est remittēdo, & laxando fasciā: quod uero excessere, intendendo, ut in contrariam partē ei in quam excesserant, abeant, & declinent. declinationis autem huius in contraria terminum non qui secundum naturam est, statuit. ita enim morbus adhuc deligationem superaret, cum membrum diutinae distortioni fuerit assuetum: sed paulo ulterius quam naturale sit, propellendum censet. hoc siquidē significat, cū dicit paulo magis, q̄ ut ex quo se habeat. ex æquo enim sese habet, quæ secundū naturam sunt. atq; hanc in contrarium declinationē cunctis esse faciendam uult, quæ ad deligationem assumunt, quæ uidelicet ipse nominatim percellit, fascijs, plagulis, appositionibus: extēsiōne in super, frictiōe, & directione. quippe cū omibus his fieri possit, ut deligatio amplius, q̄ naturale sit, in cōtrariā partē declinet. quin etiā hic perfusione ampliore utendū inquit. adiūxitq; hic ad uocē ampliore. quod superius etiam proxima oratione intelligendū prætermiserat. copiosius enim utrobique aqua calida perfundendum est, illic dirigendi causa, hic molliendi.

33 At uero diminuta multum sanae partis occupando spatij deligandum est: ut ex accursione quæ contabefacta sunt ampliore, quam ipsa fuerunt imminuta, diuersa deligatione permutata in auctionem tendant,

A reformationemq; carnis efficiant.

Orationem hanc nonnulli qui adhuc librum exposuerunt, sicut alia multa paucis quibusdā extrinsecus dictis percurrerūt. alij uero qui eā clare explicare conati sunt, à ueritate adeo aberrarunt: ut admiratione dignum sit, quomodo diminuta, mēbra uidelicet attenuata, atq; alimento carentia ad naturalem temperaturā reducerint, atq; ego quidem in artis operibus nullū damnum asserere discen tibus existimarem: si quis uel in significatio uerbi alicuius, uel in aliqua ad clariorem euidentia quaestione proposita non recte rem trahat. at cum aliena ab utili instructione tradunt, illa uero necessaria laedunt eos qui in arte exercent. Quocirca prius docebo quomodo ipse membra emaciata, nutritione q̄ carentia semper curare solitus fuero, quo iam discentes percipere inde utilitatē aliquā possint. deinde uerba hæc Hippocratis ueritati enitar accommodare. nam in ijs quæ obscure ita scripta sunt, dandam mihi esse operā censeo, ut ueritate rerum seruata uetustam lectionem ei, si fieri potest, consentire ostēdam: si uero id præstari nequeat, ueritatem saltem cognoscendā adolescentibus exhibeā. Pleraq; igitur, quæ in partibus quibusdā contingunt, attenuations, uel ex diutina membrorum quiete, uel ex modo deligationis fracturarū euenerunt. nam & quies uires quiescentium membrorum imbecillas reddit, atq; infirmas: & deligatio dum partium deligatarum sanguinē partim sursum, partim deorsum elidit, nutrimentum quoq; ipsis aufert. Quare malo huic curationē cōtrariā exortui eius adhibere debemus, uires affecti membri corroborando, & idonea ei sanguinis copiam suppeditādo. uires autē frictionibus moderatis, perfusionibus, & motionibus corroborantur. ut ergo plus influat sanguinis deligatione idonea, quā hic ponit Hippocrates, utendū est. tum aquæ calidæ moderata perfusione, & motione, & frictione opus est, quæ uires stabiliunt, & confirmant. esse uero omnia hæc moderata & qualitate & quantitate debent. non enim satis est, si uel frictio, uel motio, uel calidæ aquæ perfusio, neq; multa, neq; pauca admodū sit: sed oportet mediā quoque esse frictionē inter duram & mollem, motionem inter lentam & cōcitam. aqua uero temperata etiam ita esse debet, ut mediū sit inter nondū calfacientem, quæ tepida uocat: & eam quæ calore mordax iam est, & dolorem affert, quam feruidam dicunt. at quantitatē rationem superius docuit, cum dixit, cum adhuc suspēdit, prius q̄ concidat delidendum. quo tēpore uidelicet maxime rubicundū membrū conspiciē. nam cum membra quæ tenuata sunt, alimentisq; fuerunt priuata, manifeste sint alijs quæ naturaliter sunt affecta, exanguiora, rubescantq; difficulter cum perfricamus, calidatq; aqua perfundimus, eum scopum spectamus, ut ruborem contrahant. quo eodem tēpore turgidiora etiam apparent. q̄ si fricare ulterius, aut perfundere pergamus, & rubor euanescit, & tumor omnis cōcidit, et subdit. quin etiā inde faciliāne

cilia ne sint, an difficilia ut sanent, prænoscemus: si uel facile, uel difficulter rubra efficiuntur, & turgent: si sanatu sunt difficilia, soleo ego aliquo ex calefacientibus medicamentis liquidis uti, quæ frictionem efficiunt: & præcipue ipsæ, quæ parû thapsiæ non ueteris habuerint: atq; huiusmodi attenuationes picatis medicamentis illinere cõsueui, quæcunq; illa sint siue picata, siue dropacita, ut nō picem, sed dropacem dicendum censeas. dicas em̃ licet quomodocunq; uolueris. non enim docere Attice loqui adolescentes, sed commemorare eis utilissima artis medicæ opera his in cõmentarijs proposui, usumq; picatorũ medicamentorũ in præfenti hac re. nam si prima unctio satis plenũ, & rubrum membrum reddiderit, desistendum iam est: sin minus, iterum illinendum, atq; iterum. in quibusdam singulis diebus, in quibusdam tertio, aut quarto quoq; die: prout magis uel minus desiderare id affectum locum uideris. nō adinudi aut interdum pro ratione defatigationis calidũ fieri membrum, quod uel fricatur, uel picatur, propterea qd̃ simul cum rubore id intelligitur. eodem siquidem tempore ruborẽ cõtrahit & calorem. Huiusmodi mihi semper curationẽ adhibenti attenuatis præter naturã raro deligatione opus fuit. si aut̃ aliquãdo incidit ut ea indiguerim, hoc modo quo iubet Hippocrates deligauit, illis uerbis animum aduertens, cum inquit diuersa deligatioẽ diuersa uidelicet ab ea, quæ fracturis adhibet, quæ uehementiorem compressionem affectis membris affert. diuersa enim hæc deligatio in prima etiam statim linteorũ iniectione differt ab ea, quæ fracturis conuenit: cum nō supra ipsam partem quæ affecta est initium eius ponatur: ut in ulceribus & fracturis, fugillatisq; & contusis, alijsq; sit, quæ paulo superius diximus. deinde in eo etiã differt, quod comprimere circa affectã partẽ minime debemus: sed remissiore deligatione ibi uti. maxime uero unde incepimus, cõprimendum nobis est circa sanam partem: ac deinceps progrediendũ usq; ad locum qui affectus est: quod cum peruenerimus, maxime laxa linteorũ cõuolutione utẽdum est. Atq; hyeme quidem ipsi etiã læse parti fasciam circũdo: ita tamen, ut laxa cum sit, & ne minima quidem compressione astricta, non calefaciat. arastate sanam partẽ deligo, quo sanguis qui in ea continetur, ad eum locũ elidatur, qui restauratiõẽ indiget. ipsam uero sanã partem calefacere insuper, & digerere non conuenit. Si aut̃ multum totum crus, aut brachium extenuatione cõtaberit, alterum crus, aut brachium deligo ab inferioribus partibus initio infecto: & in crure usq; ad inguen, in brachio usq; ad alam & humerũ falcioniẽ deduco. nam cum in superiorib; partibus iuxta iugula à magna uena discindantur uenæ quæ brachiũ nutriunt: in inferioribus autem iuxta os sacrum, quæ cruribus alimentum deferunt, si fluxus sanguinis alterius uenæ, quæ ad coniugatum & compar membrũ tendit, interclusus fuerit, sit ut ad alterum membrum sanguis feratur: ac propterea deligatio, quæ in sano membro fit, eousq; astricta esse debet, ut cõpri-

mat quidem, non tamen ita ut dolore creet. pars uero affecta, uel nuda relinquenda est: uel si frigidus aer sit, paululum usq; ad femur lamis cõtegendam. nam si frigus non molestat, utilius est ut nuda sit, assidueq; aut linteis perfricetur, aut si difficulter calorem contrahere potest, medicamētis. si facile uero calefcit, oleũ tantummodo sufficit, cui parum ceræ adiectũ sit: ita em̃ & magis permanet, & minus digerit. eadem ratione in brachijs omnia faciendi sunt. nam & deligandũ sanum brachiũ est, ut in cruribus faciebamus, & quod emaciatur est, frictione & motione calefaciendũ. Cumq; ille qui ægrotat, non prorsus est solidus, querendum ab eo est, caliditatem ne transferri in membrum affectum sentiat, an id quiescere. nam si quiescere adhuc sentiat, tempus iam est, ut secundo loco calefacientia, & corroborantia medicamenta adhibeamus: quorum quatuor genera sunt, frictio linteis adhibita, aquæ calidæ perfusio, frictio itẽ uel medicamētis uel oleo facta, inunctio ẽ simplici dropacæ: aut si nimis frigefacta esse pars affecta uideatur, uariis dropax sumẽdus est, qui & bituminis, & sulfuris ignem non experti parum, & pyrethri habeat. Atq; ita quidẽ curanda esse extenuata corpora ex multorum sanatiõẽ cognoui. an aut̃ Hippocratis quoq; hanc orationẽ recte explanẽ, affirmare nō ausim: cũ obscura admodũ sit, & probabilitate quadam, non scientia aliqua certa declarari queat. expono tamen eam, nō ut pleriq; ea lectiõne. ut ex accursione contabefacta amplius q̃ ipsa fuerunt imminuta. sed aliter, ut nonnulli scribunt, cõrelatiuo nomine hoc modo. ut ex accursione quæ cõtaberacta sunt, ampliore, q̃ ipsa fuerunt imminuta. contabefacta enim uocat loca extenuata ex motionis, et nutritionis defectu, quæ inquit ex accursione. id est affluxu sanguinis curati oportere: qui amplior uidelicet eo deueniat, q̃ si in naturali habitu essent constituta. ita em̃ afficietur, ut in auctionem tendant quæ diminuta sunt: si diuersa à priori deligatione usi fuerimus, quamnam autem sit hæc diuersitas, paulo superius demonstratum fuit: cui sanẽ diuersam quoq; esse uim, necesse est. prior enim deligatio sanguinẽ à membro affecto arceat: hæc copiosiorẽ suppeditat, quàm si naturali in statu esset. nam quod secundum naturã sese habet, ei satis ille est, qui in ipso continetur: ac propterea non amplior influere eo oportet, q̃ qui in nutritionẽ eius, perspirationemq; absumat. cum uero uacuum, atq; exangue esset membrum, multo amplior esse ei debet, qui influat: ut uidelicet non tantum nutriatur, sicut cum sanum est: uerũ etiam restauretur. amplior aut̃ hic influxus ex assidua calefactione membri procuretur, necesse est. omnia enim quæ in curatione hac adhibentur, calefaciunt. frictio, morio, medicaminũ impositio, picatio & aqua calidæ perfusio, qua Hippocrates etiam esse usus uidetur, ob balneorum fortasse inopiam quæ eo tempore erat. mihi enim aqua in balneorũ solijs iniecta, & ad calefacienda moderate mēbra quæ curantur, & ad defatigationem in eis excitandam satis fuit. mouere insuper ea opus est opera-

tionibus cōfueris: atq; id nō semel ac repente, sed saepe ac paulatim uno quoq; die faciendum est, frictio item eousque adhibenda, quoad calefactum membrum sit: deinde intermittēda, atq; ego quidem in hunc modū orationi huic Hippocratis ueram curationem accōmodo, cuius uim re ipsa demonstrauit, cum quā plurimorū ex deligatione, & diuturna quiete extenuatorum membra restaurarim. sed iam cōuenit, ut super hoc quocq; eorū qui librum hunc explanarunt, sententiā explicemus, quorum pleriq;, ut dixi, extrinsecus tātummodo nonnulla cum dixerint, rem ipsam inexplicata reliquerunt. pauci eandem lectionem sequuti declarare totam sententiā hūc in modum conati sunt: iubere inquit Hippocratē diminuta ex deligatione esse curanda: ut contabefacta, id est extenuata amplius ipsa, q̄ prius fuerant, in contrarium immutentur. multos enim morbos ita curari cōsueuissē aiunt, exemplaq; afferunt. nauescentes enim nonnullos uomitum ciente medicamēto sanatos fuisse: alios acia quādā frequēter deijcientes, expurgate potione: tussietes alios tussim uehementiorem mouente medicamine conualuissē affirmant. adde quod nonnulli etiam sunt, qui id quod in definitionibus, quos aphorismos appellant, dictum est, in mediū afferunt, quā in hunc modum sese habent. Interdum autē in rigore absq; ulcere, si iuuenis carne præditus sit, aestate media frigida perfusio reuocationē caloris facit. si igit, inquit, non solum ex cōtrarijs, uerum etiam ex similibus remedijs curationes fiunt: nunc quoq; Hippocrates diminuta curare nos sic iubet, ut à deligatione incipiamus, quā attenuare magis ea possit. cum ex accursione, ut aiunt, contingat ut amplius contabefacta mēbra quā prius fuerant rursus nutritionem, carnisq; pristina restorationē recipiant. qui autem ita interpretantur, cum diuersa deligatione explanationē nullam apud eos admittat, pro *ἀλλοίς τῇ ἀνδρίᾳ, ἀλλοίς τῇ ἡσεί, id est pro diuersa deligatione, diuerso habitu legendum censent: ut tres differētes inter se lectiones loci huius euadāt. una - diuersa deligatione - altera - diuerso habitu - nam ita quoq; in quibusdam explanibus scriptū inuenitur. qui aut legunt diuerso habitu, eum non ad deligationē, sed ad partē affectā referūt: quam aiunt cum diuerso habitu prius ueretur, ex eoq; in extenuationē tetēdisset, hunc postmodū fuisse consequutam ex deligatione, quē amplius contabefaciebat, quasi nō amplius ex ea in gracilitatem membra, quā alimento caruerunt, deueniant, sed iam immutari incipiant: ea uero quae fracturis cōuenit deligatio communis cum sit, ut paulo superius demonstratum est, etiam alijs affectionibus, inter quas sunt fugillata, cōtusiones, & uulSIONES, attenuare membra cōsueuerit. hoc igitur habitu inquit, ex eadem deligatione alimēto carentibus mēbris restorationem cōparari. atq; hinc effectum est, ut tertiam lectionem nonnulli repererint, atq; ita scribiant, ut ex accursione contabefacta amplius q̄ sponte fuerāt imminuta. se hoc modo rei absurditatē euasuros ratū, si sponte dicerent*

membra fuisse attenuata. & quod hic docet Hippocrates, nō omnibus diminutis esse cōmune: sed de ijs tantum intelligi, quae sponte in eam affectionem inciderunt. cōmunem & uniuersalē huiusce doctrinae dissertationem in angustum admodum reducētes: cum paucissima sint, atq; admodū rara, quae alia ex causa nutrimentū non sentiant. reliqua siquidem omnia ex diutina deligatione, & quiete talem habitum cōtrahere. ac de his magis q̄ de alijs quibusdam mentionē fecisse Hippocratem consentaneum est, cum antedicta consequantur. cum enim superius de fracturis & quibusdam alijs affectionibus dixerit, quē similem deligationē requirūt: cognorūtq; ex illis attenuationē, gracilitatemq; membrorū cōsequi solere, quo modo curada ea esset, sibi docendū existimauit. quod autē maxime ijs crimini dare quispiā possit, qui de deligatione attenuante loqui hic Hippocratē existimant, illud est: q̄ cum attenuata restaurare propositum sit, id fieri nequit, nisi & uires ipsorū corroborētur, & materia nutriendi copiosa suppedietur. at quā ipsi assumendā putāt, deligationē, ea tum sanguinis affluctionem prohibet, tum imbecilem uim reddit: quam uero ego ab Hippocrate dici assero, diuersam ab ea esse dico, quē diminuta efficit. quippe cum à sanis incipiendū, non ab affectis sit: ita ut multis cōuolutionib. eousq; adstringamus, quoad nullus dolor, qui inducere inflammationē possit, excitetur: atq; ad affectum locum paulatim subinde relaxando deueniamus. adde q̄ si sequi horum explanationem uelimus, sanū crus deligare unā cum eo quod laborat, nihil ad rem facit. nam ut amplius contabescant, quae attenuata sunt, adsumi deligationē inquit, ut id fiat, nō modo nihil prodest, si alterum crus deligetur: uerum etiam nocet. sanguis enim qui in alterū deferebatur, totus ad partem affectam per deligationem propellitur. nam exempla illa, quae isti qui ita interpretantur, adducūt, q̄ praeue illata sint, perspicuum est: cum nihil in se habeant, quod doctrinae Hippocratis conueniat. sana enim eorū ratio est, qui uolunt uniuerse totā mali causam exinanire: quē uidelicet tunicis uentris ita inharet, ut ualelli inde difficulter queat. tunc em̄ acria eodem cōiecta cum uentrē irritet ad excernēda omnia simul facere cōsentaneū est. Simili modo quoq; ea quae modicam tussim mouent, uehementiori tussi excitata, expurgari cōsueuerūt. At enim nihil his simile est, quod isti dicunt, membrū attenuatum insuper esse contabefaciendū, quo principium restorationis cōsequi ualeat. ex ampliore em̄ extenuatione, & uires partium alimento carētium magis debilitantur: & materia quae alimentum praestet, suppeditatio nulla elicitur. Præterea de rigore hic mentionem facere absurdissimū est. quippe cum se imperitos esse artis Hippocratis manifeste declarent. ille enim ex curatrice arte cōtraria contrariorum esse remedia inquit. Nonnulli tamen uim orationis minime percipiētes, ad cōtradicensum conuersi sunt, perinde atq; illi, qui petulanter omnibus contradicunt, eaq; audent uituperare, quae

nuncq̃ omnino dicere. non modo enim cōtraria
 contrariorū esse remedia, non reprobatū ijs, quā
 in Definitionibus dixit Hippocrates. uerū etiam
 cōfirmatur: uel eo ipso aphorismo, in quo frigida
 aquam caloris reuocationē efficere dixit, calorem
 uero ea sanare. quem quidem calorē qui frigidis
 affectionibus mēdet, frictione aliquando, aliq̃
 do medicamento calfaciente, quandoq; exercita
 tionibus, aut aquae calidae perfusionē excitatus;
 quin etiam butirū interdū, & saepe, ut diximus
 pice oblinendo membrū, quod calfaciēdum est
 perfusionē item aquae frigidae interdum idem pro
 curamus. sed reliqua quidē omnia cum ex se cale
 faciendū uim habeāt, utilia semper ijs sunt, quē ca
 lesfactione indigent. Aqua uero frigida, quatenus
 frigida est, raro est utilis: ac nisi in corpore quod
 innatū calorem ualidū habeat, assumi utiliter nō po
 test. nam carne praeditus sit, oportet, ut inquit ipse,
 cui utilis futura frigida aqua est. neque huius quoli
 bet tempore, sed aestate tantummodo adhibenda
 est. quis enim ignorat? quisq; est ex ijs qui De fri
 gida aquae potione scripserūt, qui non dicat eam
 duo efficere consueuisse, uel damnum ex refrige
 ratione, uel caloris maioris ab imis partibus reuo
 cationem: nam si ualde calidum corpus sit, effici
 tur, ut eius calor a frigiditate minime superetur,
 sed potius densata cute, atq; idcirco cohibita per
 spiratione augeatur. si uero exiguo calore sit pra
 editum corpus, ut occurrenti frigiditati minime re
 sistere ualeat, cum usq; ad imas partes uis frigoris
 penetret: sit, ut in morbos ex refrigeratione cōtra
 ctos incidant homines. sed fortasse haec quoq; su
 peruacue a me dicuntur, cū alibi, sicut dixi, quae sint
 ea, quae primo curent, demonstrauerim: quae pro
 prius scilicet cōtraria esse debent. primo autē dicen
 tur, quae absq; medio ullo curationē afferunt, qui
 bus opponuntur, ea quae medium aliquod habēt,
 quae ex accidenti, nō primo profunt. quocirca nu
 gantur isti, cum & deiectionē alui, & tussim cien
 tia medicamenta, & frigida perfusionem comme
 morant: quae quidem quāuis interdum apte fieri
 consueuerint, nihil tamen cum proposita hac re si
 mile habēt. ostendendum siquidem ipsis est, quo
 modo quae modice attenuat deligatio, uel uires at
 tenuatis mēbris afferat, uel faciat, ut copiosius san
 guis eodē deferatur. quod quousq; ostendere ne
 queunt, sciat frustra se exempla adducere. ut omi
 tam interim quod nulla scientia effecitrix demon
 stratio fieri exemplis potest. exemplorū siquidem
 usus in cōmentarijs De demonstratione satis a me
 declaratus fuit. non em̃ discitibus ea sciendi cau
 sa afferimus, ut nōnulli putant, ac praecipue illi qui
 nō secus atq; oratores ad confirmanda omnia u
 ti exemplis consueuerunt: qui sanē magno in er
 rore uersantur. nam si Platonē tibi dixerint indu
 ctionibus plerūq; demonstrationes suas effice
 re, sciendum tibi est eum diluciditatis causa indu
 ctionibus fuisse usum. at uero qui inductionis &
 exempli uim exacte cognoscere cupit, is ad pro
 priam utriusq; tractationē relegandus est, alibi a
 nobis diligenter explicatam; nunc mihi ad propo

litum redeundū est. sed prius legētes monitos ue
 lim, ut ijs quae a me hucusq; dicta sunt, diligenter
 animaduertis, sic ad sequentis lectionis explanā
 tionem deueniant, superius dictis manifeste atte
 stantem: quae ut clarius pateat, non uniuersam si
 mul, sed particulatim ascriptam explanabo.

34 Melius autem est de super ut in tibia
 & femur & alterum crus unā cum sana par
 te deligare, ut similis sit, similiterq; cōquie
 scat: simili item modo alimēto excludatur,
 idq; admittat.

Diminutorum deligationem diuersam esse fa
 ciendam dixit ab ea quae fracturis adhibetur. in il
 la enim propositum est, ut prater quā quod infla
 xus sanguinis prohibetur, id etiā quod in affectis
 mēbris cōtinetur, huc illuc depellatur, quiescatq;
 ea nulla penitus motione agitata. illa enim deli
 gatione fit interdum, ut omni prorsus inflama
 tionē liberet partes quae affectae sunt. at hac neq;
 influxum sanguinis prohibere, neq; quod conti
 netur elidere, neq; immota seruare mēbra, sed con
 traria omnino cuncta his efficere studemus. qua
 propter deligationem hanc, sicut prius etiam di
 ctum est, a sanis partibus exordiri debemus. atq;
 ita sibi cōprimere ut ab ipsis sanguis ad attenuatā
 elidatur: sana uero ipsa alimentum suscipere inte
 gre prohibetur. ac cum tibia quidem aut cubitus
 aegrotat, satis est, si initium deligationis aut ab in
 guine, aut ab ala faciamus. cū femur uero aut bra
 chium esse affectum, oppositum membrum delige
 mus necesse est, ab interiorib; partibus initio sum
 pro ad inguen usq; aut ad alam. At si tibia admo
 dum labores, & femur superius & alterū crus de
 ligare melius est, ut simili modo sicut affectae par
 tis femur quod supra est, etiam crus sanum ocio
 sum sit, & nō alatur. propterea em̃ dixit ut in tibia
 & femur & alterum crus deligare, ut similiter con
 quiescat, id est, ociosum sit, & uacet alterum crus,
 quemadmodū femur eius quod aegrotat, & simili
 modo alimēto excludatur, alimētumq; admittat.
 non em̃ ita uult ab alimento excludi quod deli
 gatur, ut nulla omnino nutrimenti pars ad id per
 ueniat. nam si ex uehementi constrictione ab ali
 mento penitus excluderetur, periculum esset, ne
 aut statim membrum emortuū euaderet: aut si id
 non fieret, alimēto prorsus omni sicut femur, ita
 tibia quoq; destitueretur. sed nobis non erat pro
 positum attenuare femur, sed tibiam restaurare.
 quocirca cum modus deligationis gracilius mem
 brum necessario efficiat, huiusmodi damnum ali
 quandiu admittere consueuimus: deinde tamē ubi
 modice iam nutritionem sensisse tibiam aduer
 timus, utrorūq; & femoris & tibiae curam habē
 mus. Explodenda igitur explanatio eorum est;
 qui & superiores attenuati membri partes, & alte
 rum crus ea de causa attenuanda esse existimant;
 ut partium quae alimentum non admittunt, graci
 lius occultetur, membrūq; alterius sani compara
 tione deprehendi, atq; argui nequeat. ita em̃ non
 modo Hippocrates, sed ne quorūlibet quidē me
 dico

dicorum quispiam recte mederi nos censeret.

35 Atque hoc linteorum multitudine, non compressione.

Prius quoque ita facere se penumero precipit, ubi prorsus absque dolore servari deligata partem uult.

36 Remittendo primū, quod maxime indiget, frictioneque utēdo quae carne repleat, & perfusione, absque ferulis.

Primū, dixit uel tempore uel potestate ac tempore quidem uel in una deligatione, uel in multis deinceps inter se comparatis. quoniam uero omnia haec uera sunt, idcirco perspicua oratio est. nisi uidelicet ita scriperit eo consilio, ut cuncta haec ex uerbis eius intelligeremus. Ceterū in prima deligatione id consideremus. cum haec ex multo tempore facienda sit, ita ut primū linteorum iniectio- nem firmantes ac comprimentes, ceteras conuolutes subinde magis remittamus, ac maxime ea parte quae nutritione ac restauratione indiget: uerisimile est, ut primum potestate de membro quod curatur, primum tempore de prima deligatione dictum fuerit. sed si de omnibus deligationibus inter se comparatis intelligamus, sensus erit huiusmodi. si in primis deligationibus una cum sano deligaris, prorsus aliquando nudandum id exhibebit aegrotus, id igitur primum faciendum in ijs quae maxime restauratione indigent, ac propterea non bene aluntur. nam si ad affectam partem frictione, alijsque quae paulo ante dixi sanguis attrahatur: nutritio, carnisque restauratio in ea magis, citiusque efficitur. frictionis igitur, ac calidae aquae perfusionis mentionem fecit: medicamentū uero non meminit: propterea quod solius operationis praesidia hic agnoscit. neque enim praetermississe eum putare debemus, mouēda esse membra eousque quoad defatigantur. nam cum ipse docuerit cognata quoque ijs quae docentur, esse intelligenda, frictioni uero motus omnis extenuatur partium cognatus sit: manifestum est, eum, cum iusserit alterum crus simul cum parte sana membri affecti conquis- scere, & nunc frictione utendū dicat, mouendum quoque esse censuisse. quippe cum fieri possit, ut & cubitus sine brachio, & tibia sine femore moueatur. non enim dum attenuationem curamus, immotum cubitum, aut tibiā seruare opus est, quin ex superioribus partibus simul ac mota fuerint, curationem suscipere consueuerunt. nutrimentoque quod per loca non affecta pertransit, ipsa prius fruuntur. eo quod & frictionibus, & picationibus, & calefactionum medicamentorum appositionibus abundat. sanguinis autem ad membra defluentis maximum tibi afferet indicium calor & rubor qui in ipsis extiterit. Habes iam integram horum curandorum rationem: cum ijs quae Hippocrates dixit, calefactionum medicamentorum quoque usus a me adiectus fuerit. quo in genere etiam pica- tio est. Hippocrates namque hoc in libro licet non- nullas affectiones commemorarit, quae curationem ex medicamentis requirunt, nullam tamen omnino medicamentis fecit mentionem: propterea quod hic

A auxilia tantummodo tradere proposuit, quae ma- num opera exhibentur, atque illa non omnia, ut dixi, sed quae discere artem incipientibus necessa- ria maxime, atque utilia sunt.

37 Fulcimenta autē & stabilimenta pectō- ri, costis, capiti, & reliquis quae huiusmodi sunt, partim pulsuum causa ne incutiantur, partim ut dissidentiae compagum in ossibus capitis contineantur. atque haec fulcimenti causa adhibentur. in tussibus autem, & ster- nutamentis, alijsque motionibus, qualia circa thoracem & caput, fiunt stabilimenta in his omnibus eadem sunt deligationis mo- derationes. quae enim sunt noxae, maxime com- primendū est, subiiciendaque est lana aliqua mollis affectae parti accommodata. deligan- dumque est non constringendo amplius, quam ut pulsus non concutiant, quamque ut dissidentiae compagum ad extremum mus- tuo se contingant, tussescque & sternutamēta prohibeantur. sitque stabilimentum, ut neque cogatur quidpiam, neque concutiat.

Cum iubet neque affulciri, neque cōstringi deliga- tionē fimbrijs, ijsque quae extrinsecus circumjiciun- tur: idem dicere uidetur de deligatione ipsa quam linteis efficimus. notum est uerbi *ἐμμάτευ*, id est fulciendi significatū à fulciminibus sumptū quae *ἐμμάτευ* appellant, ut Homerus etiā meminit, ful- cimina, inueniens, nauibus astrahunt. quasi nihil referat, an fulcimēta, an firmamēta, an stabilimen- ta dixerimus. uidetur enim saepe fulciendi uerbo & de fascijs, & de plagulis, & de fimbrijs uti: quippe quod firmare significet, ac stabilire. atque ubique interpres uerbum hoc in eodem significato acce- pere, quo stabilire. nunc tamē cum duo haec nomi- na hic fulcimēta uidelicet, & stabilimēta simul po- fuerit, diuersam quandam eorum significationem intelligere uidetur. nunquid igitur fulcimenta ap- pellat deligationē totam, quae uidelicet, ut affecta pars immota seruetur, tam subiecti, quam circūda- ri cōsueuerunt. cuiusmodi sunt primū subligami- na quae licet alios quoque usus exhibeant, fulci- menti quoque uicē explent: deinde plagulae, quae etiā ipsae non solum fracturae, uerum etiam fasciarū fir- mamenta sunt: tū fasciae quae extrinsecus circūdan- tur: postremo ferulae & fimbriae. omnia siquidem haec cū cōtinendorū subiectōrū causa superspiciant- tur, fulcimentorum non tam subiectis, quam fracturis usum praebent. stabilimēta autem ea mihi uidetur uo- care, quae sine deligatione à dextris uel sinistris, supra uel infra toti affectae parti apponi consueue- runt, supra & infra uoco quantum ad crassitudinē totius corporis attinet. in ea enim quae subferuntur, infra: quae superponuntur, supra sunt, qua- liacunque ea fuerint. stabilitur autem membrum cum prostratum est, infra: cum est erectum, supra. caput sanē puluinis, & cervicalibus, lanisque etiam

& pānis mollibus. canales quoq; & ea quæ fractis
 cruribus utrinq; apponunt, stabilimēta dici pos-
 sunt. lana vero quæ rotūda forma in alam conjici-
 tur, quando luxatū humeri articulū repositū deli-
 gamus, potest tā fulcimētum q̃ stabilimentū nū-
 cupari. cum em̄ deligetur, pars etiā ipsa totius deli-
 gationis efficiē. nam quæ thoraci & capiti extrin-
 secus imponunt, aut apponunt, stabilimenta po-
 tius, q̃ fulcimēta dici debent. atq; hæc sanē omnia
 ob necessarias membrorū motiōes à medicis fue-
 runt excogitata. quarū quidem motiōnū aliæ na-
 turales sunt, ut respiratio in thoracis pulsibus &
 mēbranis cerebri; aliæ præter naturā, cuiusmodi
 est tussis, sternutamentū, & singultus. pulsus item
 in inflāmatis mēbris, & in temporū arterijs cū do-
 lore uehemētī caput infestatur, existunt, necnō
 & palpitaciones quæ sæpe in præcordijs, quæ *ἀν-
 γόρροια*, id est subcartilagiā appellant, aliquando
 in alijs etiā partibus eueniūt. indigent stabilimen-
 tis. stabilimenta uero hæc quandoq; sola faciēda
 sunt, ut in temporū arterijs in doloribus capitis ue-
 hementibus, aut in præcordiorū palpitatiōibus,
 aut in uulneribus etiā quæ sanguinis eruptionē mi-
 nantur. quādoq; lanæ fasciā circumuoluēda est.
 quin etiā sine fasciā interdū lana stabilimus. circa
 thoracē & ceruicē lana stabilimus. caput item cer-
 uicalibus mollibus, & sacculis milio calido opple-
 tis, quando simul & foueri, & stabiliri opus est. in-
 terdū uero extrinsecus mollibus stabilimētis uti-
 mur ex ijs quæ superimponunt. cum igit̃ cōmunis
 scopus sit ijs quæ proprie fulcimēta & stabilimēta
 appellant, merito qui librū hūc interpretati sunt,
 unū & idem utriq; his nominibus significari exi-
 stimarūt. & nos quoq; ipsi sæpe absq; ulla differen-
 tia utriq; his pro eodem utimur. cōmunis aut̃ sco-
 pus est, quē paulo ante dixi, ut in motiōibus par-
 tes nō concutiant. Sed quia tamē peculiaris quæ-
 dam differētia inter hæc est quā modo explicauim-
 us, cum exquisitè rem prosequi uolumus, stabi-
 limēta ea uocabimus quæ extra dignationē sunt:
 fulcimēta quæ in ipsa deligatione cōtinentur. atq;
 ita definiemus, ut quæ mēbris adhibentur necessā-
 rio motu præditis, quæ cohibere & sedare in no-
 bis nō est, stabilimenta: quæ in immobilibus uti-
 mur, fulcimēta appellētur. crus em̄ & brachiū mo-
 uere in nostra sitū potestate est: thoracē & mēbra
 nās cerebri nō est. palpitatio etiā in aliquo mēbro
 existēs, sicut neq; tussis, neq; sternutamentū, neq;
 singultus, in nobis nō est. nam licet resistere his ali-
 quādiu ualeamus, uim inferūt tamen postea: atq;
 excutiūtur, cum ualidas habent causas, unde exi-
 stunt. nā ita his resistere, ut ortus ipsorū prohibea-
 tur, soli robustissimi uiri posse uident̃. Et ipse quo-
 que Hippocrates separatim in hac oratiōe hæc ui-
 detur scripsisse. cū De pulsibus dixerit, ut ne in-
 cutiantur. de dissidētia uero cōpagum capitis, fulci-
 mentorū; de tussibus & sternutamentis, ac deniq;
 de motiōibus circa caput, & thoracem stabili-
 mentorum nomine usus sit. dissidentia uero cōpa-
 gum capitis in ijs, quæ uocantur futura, cōtingit.

quæ proprie quidem cōpages appellant, quæ par-
 te ossa capitis inter se mutuo cōpacta coaptantur,
 futurae uero ex translatione dici cōsueverunt. cal-
 uariæ enim ossa adeo exquisitè inter se cōiūgun-
 tur, ac coaptantur, ut propterea ipsorum cōiūn-
 ctio *καὶ ἀγνοῦται*, id est ex cōpage & coaptatio-
 ne facta, merito futura, ex pannorū qui consumun-
 tur, similitudine dicatur. hæc igit̃ futura aliquan-
 do dissident, ac distant: dolorēq; afferunt: quando
 copulæ quæ exteriorē caluariæ mēbranam, inter-
 riori quæ dura dicitur, annectunt inflāmatione
 aliqua correptæ fuerint. uenulæ item paruæ per fu-
 turas exeuntes sæpe inflāmātur: atq; inde fit, ut
 dura mēbranae motio quæ simul cum inflāmatis
 uenulis attollit, dolorē efficiat. dolor similī mo-
 do ex inflāmationibus quibuscūq; aut motiōib.
 arteriarū excitari cōsuevit. atq; hæc affectiones mo-
 derationē exquisitā stabilimentorū requirunt, ut
 neq; si nimis laxa affecto loco admota sint, facile
 concutiantur, atq; ita molestiā afferant: neq; si cō-
 trā amplius iusto, astricta fuerint, collisione facta
 dolores uehementiores intent. hæc autē modera-
 tio fasciarū circumiectionis superius etiā dicta ab
 ipso fuit alijs quibuscūq; in morbis, qui fractus cō-
 uenienter curatiōē & deligationē desiderabant.
 ac propterea nunc dixit. in his om̃ibus eadem de-
 ligationis moderationes. in his om̃ibus, inquit,
 quæ modo dicta sunt, eadem deligationis mode-
 rationes, quæ superius fuerunt commemoratæ. ac
 postea quænam sint hæc moderationes subiūngit,
 cum ait. quæ enim sunt noxæ, maxime cōprimen-
 dum est. quia, id est quæ parte pro aduerbio loci
 positum est. *¶* Græce cum circumflexo accētū, &
 aspiratiōe. hoc autē quod fulciat uel stabiliat, ac-
 commodatū affectui imponendū esse inquit. deli-
 gandumq; nō alstringendo amplius, q̃ ut pulsus
 non cōcutiāt, id est q̃ ut pulsus præ angustia à mo-
 tu suo prohibeantur: id quod dolorē efficiere cō-
 suevit. alterum insuper terminū constrictiones in
 futurarū dissidentia statuit, cum inquit. q̃ ut dissid-
 entia cōpagū ad extremū mutuo se cōtīgant.
 ad extremū uocans ultimam eam cōstrictionem
 qua se mutuo cōtīgere magis futurū nō possunt,
 quo uehemēs atq; immoderata collisio declarat.
 sicut enim neq; laxari, ita neq; ad summum cō-
 stringi cōpago ossium debet. quippe cum etiam
 id præter naturam sit. atq; hi ualidæ compressio-
 nis termini sunt. in sternutamentis item & tussibus,
 ut affecta mēbra non agitentur, & concuti-
 antur, si nihil ea contineat. uehementēs enim mo-
 tiōes quæ laxa & instabilia sunt, uiolētius quā
 membrīs affectis conueniat, cōcutientes, dolores
 irritant. moderatio igit̃ stabilimentorum ea est,
 quam in fine huius orationis scribit, cum inquit.
 ut neq; cogatur quidpiam, neq; concutiat. hoc
 est, ut neq; uolenter affectæ partes comprimantur,
 neque in motiōibus concutiantur, id est
 ut neq; uolentius, neq; laxius quā
 deceat, deligatæ
 sint.

De cubito, textu 18. lib. 1. De pede & manu, lib. 2. textu 8. De calce, textu 16. De tibia, textu 34. De femore, textu 67. Commentariorum Galeni in Hippocratem. lib. 1. textu 63. De iugulo. lib. 2. textu. 1. De gibbo cubiti. Textu 2. De manu. 3. De digitis. 4. De mala. 38. Denariis. 48. De aure.

A Lib. 3. tex. 54. De costarum fractione. 68. De femoris luxatione. Lib. 4. tex. 16. De denudatis ossibus cū luxatione. 34. De ossibus excidendis. 42. De moris ad coxam repositio. 65. De digitorum luxatione. 66. De genu luxatione. 67. De malleolo. 68. De pede.

CL. GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS DE FRACTVRIS COM MENTARIORVM LIBER PRIMVS

Ioanne Bernardo Feliciano interprete.

PROLOGVS.



NTE quā ad particulariū explanationē ueniamus, melius est, ut in uniuersum de tota explanandi ratione quippiam dicamus. uis enim eius ea est, ut quæ in operibus auctoriū obscura sunt, dilucidata ac clara efficiat. aliquid aut eorū

quæ scripta sunt, aut uerū esse demonstrare, aut falsum conuincere, aut si capiose quippiam accusarit, defendere, licet separatū quid ab explanatione esse uideatur, fieri tamen ab omnibus ferè consueuit, qui cōmentaria cōscribunt. & nihil uetat, quo minus explanator etiā hoc quoq; exequi mediocriter possit. at de auctoris decretis prorsus cōtenderet, illud uero explanationis terminis excedit. Quocirca ego non ad hunc scopum sed ad antedictum spectans, pauca quædam confirmandorum eorum quæ dicuntur, causa ueris ac proprijs explanationibus subinde adiungam. Cæterum cum duplex etiā in hoc explanationis genere sit differentia, propterea quod duplex quoq; illud est quod obscuritatē in se habet; rectius esse mihi uidetur, ut de hoc nonnulla etiā in medium afferam. breuis autem de his quoq; erit oratio, quasi compendium quoddam eorum, quæ priuatim latius in cōmentarijs De explanatione dicta sunt. demonstratum siquidem ibi est, quod obscurum reuera est, id per se esse eiusmodi. aliorum uero ortum obscuritatis in nobis esse, propterea quod audientium differentia quā plurimā existunt, ex eo quod aut prius eruditus quispiam fuerit, & exercitatus, aut sit prorsus rudis & inexercitatus; aut ingenio sit acutus & perspicax, aut hebes & tardus. Age em in hoc ipso lib. De fracturis, ubi inquit Hippocrates, dicendum igitur est quos nam errores medicorum uelim tū docere tū dedocere. hæc sanè per se obscuritatē habet oratio, cū nos nullos errores esse intelligamus, quos docere oporteat. Simile quoque illud est & retortio articuli retorta est in hac figuratione. figurationē enim extenti brachij retortū habere articulum inquit, qui in cubiti gibbo existit. dicere autem inflexum ac retortum esse, quod rectum est, absurdū uidetur. at illud quod

B subiungit, cum inquit brachij enim cardinamentum in cubiti sede in tali figuratione innixum ossibus cubiti & brachij directionem facit, perinde ac si unum totum sit. si quale utrūq; ossis nouerit quispiā, nullam obscuritatē præfert. si uero cubiti & brachij articulationis naturam ignores, merito tibi obscura oratio euadet. ac mihi quidē melius uidetur, ut quia pleriq; ex ijs qui librum hunc legunt diffinitionis sunt imperiti, huiusmodi omnia explicemus. nam quæ tale quidpiam non habuerint, prætereunda nobis esse existimari, hac tantum præmonitione usis ad eos qui lecturi sunt. Si quid ex ijs quæ exposuimus, obscurum esse putas, inspicere primum diligenter an erroneum librum habeas, eumq; accurate perpēde, cumq; exemplaribus auctoritatis alicuius cōfer: deinde si recte is se habere uidetur, eundem locum adhibito studio iterum atq; iterū perlege. Ego enim cum præsentī alicui coram librum aliquem lego, ad discendis habitum respiciens consicere quo explanationis modo utendū mihi sit, satis possum. cum uero omnibus scribo, neq; ad eum qui optime, neq; ad eum qui pessime instructus fuerit, specto. quippe cum illud obscurū, hoc molestū pleriq; si in aperitis diutius immoremur futurū sit: sed eorū rationē habeo, qui medio habitu præditi sunt. quod si his aliquando frustrari contingat, ad eos declinandū magis censeo, qui præstantiores sunt. nam quī medio habitu sunt inferiores, indignos iudico qui ad cōmentaria hæc accedant. satis em ipsi est, si ubi sæpe eadē à magistris alio atq; alio uerbo explicata audierint, intelligere ea quæ dicunt possint.

1 Medicū oportet luxationū, ac fracturarum q; directissimas extensiones efficere.

Nonnullæ orationes licet nihil quod magnificandum sit, edoceant, partes tamē explanationis esse existimātur. cuiusmodi sunt etiā quæ diuersas lectiones præmonstrant: id quod in propositis his Hippocratis uerbis existit. cum nonnulli scribant in principio. medicum oportet. alij absq; his duobus uerbis scribendum per defectum cēseant; eò quod Atticorum is mos sit, quorū lingua quædam ex parte Hippocrates etiam utatur: adeo ut quidam priscam hanc esse Atticam linguam asserere non ucreantur. sed quid ego de Hippocratis lingua

lingua sentiam alio breui libello separatim declaratum à me fuit. & nunc in exordio huius nostrae explanationis satis erit, si praemonuerò, me huiusmodi omnia esse praetermissurum: quae sicut partes propositi negotij minime sunt, ita sunt effectura, ut commentaria haec nostra in immoderatam longitudo abeat. Luxationum & fracturarum quam directissimas extensiones efficere: non luxationes & excidentias tantummodo uocat ossium excessus est propria sede, quae sine fractione fiunt, uerum etiam exarticulationes & exarticulata interdum appellat. De fracturarum uero nomine illud animaduersione dignum uidetur: quod cum saepe κατὰ γένος eas appelleret, raro admodum ἑκ μέρους, inscriptione eo nomine fecerit, quo rarissime uti consuevit, καὶ ἑκ μέρους librum hunc inscribens, unde nonnulli sunt, qui neque ab Hippocrate opera haec diuisa fuisse affirmant: sed huic adiunctum fuisse librum qui sequitur, De articulis, unumque utroque fuisse, qui postea in duos ab aliquo ob longitudinem fuerit distinctus: quando uero in unum utriusque erant coniuncti, communem inscriptionem quoque habuisse, quae erat, Quae in medicatrina fiunt, atque huius rei testimonium conatur afferre, non male illi quidem. upote cum ueterem hominem adducant dicantque unum opus Hippocratis Gnosidici filij librum esse De ijs quae in medicatrina fiunt, non enim debere nos existimare breuem illud libellum qui nunc ita inscribit, esse eum qui à magno Hippocrate fuerit conscriptus: qui inter Graecos optimus & medicus & scriptor habitus fuit, quoniam igitur in his duobus libris De ijs quae in medicatrina fiunt, agitur, ideo utroque eodem titulo fuisse insignitos: ac propterea neque doctrinae ordinem in alterutro seruari. quippe cum & in hoc De fracturis, luxationum quarundam faciat mentionem, & in eo qui sequitur De articulis, nonnulla De fracturis non pauca commisceat. alij uero sunt qui non distinctos fuisse in duos libros hos ab aliquo, sed à principio ita fuisse scriptos opinantur: putantque ex eo inscriptionem utriusque inditam, quod in uno quoque plurimam uiam habebat. atque hinc exoristi longam protrahunt orationem, dum demonstrare plerisque Hippocratis libros hoc modo fuisse in scriptos uolunt. ego uero sicut sub unam inscriptionem, an sub duabus utroque hos libros scripserit Hippocrates, differere nequeo: ita illud habeo pollicetur, me procedente oratione esse demonstraturum, & cum de luxationibus hoc in libro mentionem facit, & cum de fracturis in libro De articulis nonnulla dicit Hippocrates, accommodatissimo doctrinae modo usum fuisse. cur autem hic luxationum & fracturarum immutato ordine dixerit, cum deberet fracturas luxationibus antepone, quippe cum de eis prius docturus sit, unam rationem afferre possum: quod uidelicet saepe & apud Hippocratem, & apud alios ueteres idoneos scriptores huiusmodi locutionis genus reperitur, dum non ordinem eorum quae tradunt magis, quam ordinis congruentiam sequuntur. imò fortasse ne ullam quidem in huiusmodi rebus exquisiti ordinis curam habent. quae directissi-

Galen,

mas extensiones efficere, in quibus membris luxationes aut fracturae contingerent, ijs in membris quaderectissimisfigurationibus extensiones faciendas censet. cur autem extendi debeant nulla hic causa allata, figura qua id faciendum est, longa oratione prosequitur, cum tamen ei liceret quae nam in re ueritas sit edocenti, tacere de ijs qui aliter opinantur, sed enim non de hac tantum tractatione, uerum de alijs quoque omnibus scire illud opere precium est: nonnulla summam per capita tantummodo tractari, quae breuissima omnium sunt: alia e contrario fusa per excursum explicari, ita ut nulla omnino res quae utiliter dici potest, praetermittatur. reliqua uero omnia inter haec esse constituta. atque alia ad breuissimam, alia ad longissimam accedere, alia à medio paululum abeuntia. utraque autem haec ita legere unusquisque debet, sicut ei uel ocium suppetit, uel uoluntas. neque eos debet reprehendere qui uel ob breuitatem obscurius scribere, uel diluciditatis causa longius produdere orationem. neque enim praescribere legem his opus est, praesertim cum nihil profecturus sis: sed quod ipsi quisque utile esse uidet, id sumat: ac non idem omnibus in libris docendi propositum esse cognoscat. ut exempli causa, libri hic duo, De fracturis alter, alter De luxationibus, fusa & late tractantur. uetiarius, seu de moliendi ratione quem *μολιων* inscribit, cum eandem doctrinam quantum ad rem attinet, polliceatur, summam per capita absoluit. estque ea quae fusa sit, rei explicatio ad diluciditatem: quae summam colligitur, ad memoriam perque accommodata. atque hoc semel à me dictum memoria semper teneatur. iam uero ad eas res de quibus hic docet, differendas descendamus. animum tu diligenter aduerte. licet enim ipse postea cur extensio facienda sit explicaturus sit, siue conformare quod fractum est, siue quod est luxatum, reponere uolueris: mihi tamen nunc, quippe cui diluciditas in explanando proposita est, ad quam orationis ordo ex consensu omnium quamplurimum confert, nihil prius quam hoc demonstrandum nunc uidetur: quippe cum ijs qui explanant aliquid, non ordinis tantummodo, sed medicocritatis omnium quae singulatim dicunt, diluciditas esse scopus debeat. neque enim ob aliud quippiam explanationem scribimus. In libris igitur De musculorum motione iam docuimus maxime peculiare quantum ad alia corporis membra, inter se uero maxime communem ipsis illud esse, ut in seipsos contrahantur ac confidant, non secus ac catenae & chordae & funes. sicut enim cum horum capita apprehensa in contrarium distrahimus, distendi: cum relinquimus, contrahi haec in se consueuerunt: sic musculi cum ossi utriusque extremis innectuntur, similes apprehensionibus manuum innexiones eas habent, à quibus in contrarias partes distracti totum suum corpus distendi seruant ac propterea cum totas fibras ipsorum per transuersum absciderit quispiam, fit ut duae ipsorum partes à se mutuo plurimum retractae, sursum altera ad musculi caput, altera deorsum feratur ad finem suum, qua secundo membri ossi possit

tom. 6

N articu

articulum innectitur. cum uero absq; musculi præcisione os articuli è propria sede exciderit in eam partem ubi finis musculi inuenitur; quia totus in seipsum cōtrahitur, & ad propriū caput recurrit, simul annexa ei membri pars, quæ est ossis caput in dearticulatione retrahitur: quæ retracta totum quoq; os retrahi necesse est. in hacigit affectione euenit, ut caput ossis quod in dearticulatione depressius erat, altius pristino situ euadat: ut in propriā sedem reponi prius omnino nequeat, q̃ totū os extendendo tanto inferius cōstituat, quanto altius præter naturam fuerat prolapsū. atq; hæc causa est cur ossa quæ luxata sunt, prius extendere debeamus. cōtracta uero extēsiōe quoq; indigere inde cognoscere præcipue possēs: q̃ sicut luxatum extēdere opus est, ut reponamus, ita in fractis explicare sic affectum partē ac distrahare debemus, ut fracturę capita sese mutuo contingant. quippe cum fractura nihil aliud sit, q̃ continuitatis in osse dissolutio, sicut in carne ulcus: finemq; utraq; sanationis consequantur, si in pristinā unionem fuerint restituta. in fracturis tamē cura ea habenda quoq; est, ut partes in directum statuantur, quæ cōfirmatio appellari consueuit. nam si parua fractura contigerit, utraq; fracti ossis pars situm suum seruat. sin magna adeo, ut totū os fuerit cōfractum, in ea alterent partes, necesse est, altera in anteriore, si ita inciderit, partem, altera in posteriorem, hæc in dextram, illa in sinistram, prolapsæ, ac permutatæ. quocirca manibus ambabus utrinq; comprehendendum membrum est: osq; quod in anteriorem partem recessit, in posteriorem: quod in posteriorem, in anteriorem propellendū: quodq; in sinistram abiit, in dextrā: quod in dextram, in sinistram traducendū, ita ut omnes fracti ossis partes manibus fingentis ac conformantis in contrariū compellantur. quod cum sit, periculum est, ne fracti ossis eminentiæ aliquę refringantur. neq; enim ita penitus leuia capita fracturarū sunt, sicut quæ à ferris cultuarijs secari cōsueuerūt. nam quæ dentatę sunt ferræ asperitates etiam ipsę quasdam relinquunt. quapropter quia timemus ne admo- uendo partes quæ alternatę sunt, eminetias ipsarū aliquas defringamus, id quod proculdubio fieret, si inter se oppacta essent: propterea eas abducētes a se mutuo alias sursum, alias deorsum ad cōformationem deuenimus. Oppangere enim, id est *επιμαλ* nominat Hippocrates cū partes ossium quæ conformantur, ad propriam sedem aguntur, & se mutuo allidunt. ut igitur distantia inter se ad moueantur, alteram partem sursum, alteram deorsum trahere oportet. id quod omēs medici faciūt, interdum solis ministrorū manibus, interdum laqueis, si res uehementiorem extēsiōē postulare uideatur. Incipiendam igitur esse et luxatorum & fractorum curationem ab extēsiōe demonstratum est. nunc eam in qualibet figuratiōe non esse faciendam declarabimus. primūq; illud aduertendum est, cum quatuor sint operationes quæ in fracturarū curatione exercentur, extēsiō, cōformatio, deligatio, & depositio; unam cōmunem in

omnibus esse oportere figuratiōē. dum enim extenditur mēbrum, cōformatur. ubi uero cōformatum est, statim seruata eadē figuratiōe deligatur. quam rursus in depositiōe seruari necesse est. alioqui efficeretur, ut aliæ deligatiōis partes laxiores linteorum cōuolutiones, aliæ cōpressiones haberent, atq; ita quæ laxiores essent, cum moueri ossa permitterēt, cōformationē corrumpere: cōpressiores, dolorem afferentes inducerent inflam- mationem, ut hinc unam esse cōmunem quatuor antedictarum operationum figuratiōem pateat. Hinc uero iam considerandum est, quid spectando eam inuenire ualeamus. optima sanē in extēsiōe figura ea est, qua sit, ut sine magna intētiōe separata ossa in cōformationē deducantur: in de- positione uero ea, qua dolore membrum maxime careat, quæ utraq; ex ea figura eueniet, quæ in rectum fibras musculorum intenderit. in rectum autem ea intēdit, quæ in una membri parte totū musculum seruat. nam si ab interiori parte exortū habeat musculus, atque ita ipsum figures, ut media eius pars in inferiore membri parte, finis eius extrinsecus sit: uel media pars in superiore partemēbri, finis extrinsecus reducatur: fiet, ut hoc modo circa membrū cōuolutus amplius distendatur. unde si hac figura ipsum adeo extēdas, ut partes fracti ossis multū a se mutuo distent, sicut uehementi dolore corripietur, ita in discrimē ueniet, ne diuellatur. ex nimia siquidem intentione factum aliquid quando est, ut diuulsi musculi fuerint. quare planum sit, unā & eandem figuratiōē simul & dolorem q̃ minimum creare, & cōseruare musculos ne distorqueant. id quod Hippocrates aperte declarauit, cum firmandū in cubito totū brachium doceat, neq; penitus extēdū, neq; inflexū, sed in medio quodam habitu constitutum. optimam item esse figuratiōem hanc ipse ostendit. primum enim quoniam cubiti os longius quā os radij est, sedes ac firmamentum stabile ipsis efficitur. deinde musculi qui ex interiore brachij tuberculo exortum habent, fines in interiore quoq; parte totius brachij mittunt. qui contra ex exteriori exoritur, exteriori in parte fines habent. cuiuscunq; uero musculi initium & finis in interioribus totius brachij partibus est: eius & reliquæ etiam omnes partes ibidē reperiuntur: & propterea totus quoq; ipse musculus esse ibidē censendus est. cuius item initium & finis esse extrinsecus, simili modo in exteriori quoq; membri parte totum eundem esse constat. quin etiam dolorem quā minimum afferre hanc figuratiōē experientia quoq; ipsa manifestat. ex duabus uero reliquis quæ in utranque partem ab hac diuersæ efficiuntur, altera quæ supina est, & plurimum musculos distorquet, & dolorem maximum uidetur creare: altera, id est pro- na minore distorciōē, & minorem dolorem facit. omnia fere summatim dicta à medicis sunt, quæ de figura totius manus deinceps Hippocrates docebit, diffusa adeo ac clara oratione usus, ut pauca admodum sint, quæ explanationem desiderent: præcipue apud eos qui puerilibus discipulis in-

nīs instructi sunt; aut certe librum hunc apud magistros legerunt, quibus uidelicet commentaria hac nostra conscribuntur.

2 Ipsa enim iustissima natura est.

Perinde ac si accommodatissima dixisset, quādo enim quod unicuique rei accommodatum est, seruatur, iuste quodlibet sese habet, ac disponitur. aliud uero quod accommodatum in corpore sit, quā id quod naturaliter sese habet, ne excogitare quidem facile possumus. cum igitur unicuique membro, & figuræ, & colori, & magnitudinī accommodatum aliquid est, id optime se habet.

3 Quod si quicquid aut hac aut illac declinat, in pronā partem uergere debet. minor enim est error, quā si in supinum tendat.

Duarū hic figurarū supinæ & pronæ mentionē fecit: quæ cum de toto corpore dicuntur, de uno etiā eius mēbro, quod est totū brachiū, dicitur. ac totū quidem corpus pronū esse dicimus, cum in situ inferiorē partem uenter, superiorē dorsum obtinet; supinum cōtrā, cum sursum uenter spectat, deorsum uero dorsum ipsum sternitur. de quibus utriusque figuris hic cum meminerit, de manu, & brachio futurū sibi sermonē ostendit. quippe cum ut totum corpus aliusuius aut frangatur, aut luxetur, fieri nullo modo queat. cur autē cum peccans aliquis à recto aberrauerit, melius sit, ut in pronū declinet manus, ipse in sequentibus docuit.

4 Qui igitur nihil præcogitarūt, nihil ut plurimum errant. quippe cum ipse ille qui deligandus est, ita à iusta natura coactus manum deporrigit.

Medici, inquit, qui nihil præmeditati sunt de naturali manus & brachij figuratione, plerūque melius curant, quā qui prauis rationibus utuntur. ipse enim ille è uulgo homo qui deligādus est manum medico ea figura exhibet, quæ minimo dolore infestat, à natura ipsa edoctus. quam nūc quoque iustam nominauit; utpote quæ quod unicuique mēbro conuenit, accommodatumque est; & in prima generatione, & in sequenti totius uitæ traductione inuenerit. ipse enim qui deligandus est, manū deporrigit. Deporrigere, quod græce ἀργεῖν inquit, nonnulli in eodem significato accipiunt, quo porrigere; exponitque, deporrigit pro præbet, atque exhibet medico. alij deporrigere pro auertere intelligunt, ac prohibendo imperitiorē medicum in contrarium abducere; quippe cum omnes homines habitū eum in unoquoque membro eligere consueuerint, qui minimo dolore afficiat, quæ rectissimum esse Hippocrates ostendit, exhibet igitur seipsum medicis ægrotantes hac figura. & si me dici in alteram eos transformant, ægre ferunt, ac renituntur; neque ob dolorem obsequi uolunt. atque hoc inquit hī ab Hippocrate eo uerbo deporrigere significari. quod utrolibet modo accipiatur, res eadem intelligitur. nam medicis qui praua sapientiam uenditantes male manū & brachiū figurant, imperiti è uulgo sapientiores reperiunt, dum

Galen,

dolore uacantē figuram eligunt. alij uero sunt qui uerbum deporrigit commune esse utriusque existimant. sed cum res eadem quocumque modo quispiā intelligat, seruetur, superuacaneū est de huiusmodi ambiguis uerbis diutius cōsiderare: quippe cū quæ ita ambigue dicuntur, & inutilia sint, & eiusmodi, ut inueniri prorsus nequeant, quocirca prætereunda ab eo sunt, qui temporis rationē habet, quo ad utiliora id impendere ualeat.

5 Medici uero sapienter scilicet cōminiscetes sunt qui errant. studiū igitur nō multū est manum fractam tractare. imò cuiuslibet, ut ita dicam medici est.

Sapienter cōminiscetes, id est ὁρῶντες eos dixit, qui sapienter aliquid sibi uident inuenisse, & tamē errant. ac propterea neque ea obseruant, quæ ab imperitis quibuslibet recte cognoscuntur.

6 Cogor autē plura de hoc scribere, propterea quod medicos noui, qui esse ex figurationibus manus in deligatione sapientes uidentur, ex quibus imperiti uideri potius debebāt. at em̄ multa hoc modo in hac arte solent indicari. quod enim peregrinū est, quod an bonū sit, nondū intelligūt, magis approbant, quā consuetum, quod bonū esse iam cognouerunt. alienum item atque absurdū potius admittunt, quā quod dubio caret.

Ipse ex sequentibus quæ aperta sunt, & clara, tibi planum facit, cur longius de figuratione manus & brachij orationem protraxerit. cum tamen res ipsa neque difficilis, neque longa ex natura sua esset. ex hoc item causam statim reperiēs, cur nō exquiritur prorsus doctrinæ ordinem sequutus sit. unusquisque enim nostrum de re quæ magis urget, primū omnīū disserit: quia igitur medici eius tempestatis uniuersam luxatorum & fractorum curationem ab extensione auspicandā esse probesciebant, naturalem tamen membri figurationē ignorabant, propterea de hac primū sermonem instituit. atque ob id etiam magis, quia nonnulli medici cum pessimas figuras optimis anteponebant, prauis rationibus & sibi & alijs rem ita se habere persuadebant, nam si absolute tantū ignorassent, uerā duntaxat disciplina ipsi opus fuisset, sed quia non solum ignorabant, uerum etiam opinione cognitionis cōceperant, necesse Hippocrati fuit, ut prius eam euelleret, deinde in expurgatū ita animum ueram scientiam induceret.

7 Dicendum igitur est, quosnam errores medicorum de natura maris uelim tum docere tum dedocere.

Dedocere eos errores uult, qui cum à medicis esse errores non existimantur, reuera tamen sunt: docere autem eos, qui putantur esse, & non sunt.

8 Nam de alijs quoque ossibus corporis documentum affert hæc oratio.

Merito inquit communem ad fanationē multorum.

tom. 6

N 2 torum

torum quoq; aliorum ossium hanc esse orationē. scopi enim ad quos spectantes naturalē inuiscu-
lūsq; membri situm & figuratiōem inuenimus,
communes omnibus sunt, ut dictum antea a no-
bis est. qui cum duo sint, indolentiā unus, alter re-
ctitudinis: ille experientia, hic situ partium reperi-
tur, quem in dissectionibus discimus.

9 Manum itaq; de quo sermo, cum pro-
nam quidam deligandam dedisset, ipse coe-
git ita eam tenere ut sagittantes, cum hume-
rum iniiciunt, atq; ita deligauit, id ipsi esse
naturale existimans. testimoniūq; illud as-
ferebat, quod omnia quæ in cubito sunt ossa
directionem inter sese habent, colorisq; cō-
uenientia directionem illam eandē prae se
fert: idq; tam in exteriorē parte quam in in-
teriorē ita esse: sic quoq; et carnes et nervos
natura se habere dicebat. sagittariāq; artē in
testimoniū adducebat. dicensq; hæc & fa-
ciēs sapiens esse uidebatur: aliarūq; artium es-
rat oblitus, & quæcūq; uirib. & quæcūq;
artificijs efficiuntur. nō aduertens aliā in alio
figuratiōē naturalem esse: quin in eodem
quoq; opere aliā naturalem dextræ manus
figuram esse, aliā sinistrae, si ita incidat. alia
quippe naturalis figuratio est in iaculatione,
alia in fundibulatione, alia in lapidatione,
in pugillatu alia, alia in quiescendo. at
quot artes inuenire quispiam posset, in qui-
bus non eadem manuum figuratio naturalis
est: quin in unaquaq; etiā arte & ad instru-
mentū quod habet quisq; & ad opus quod
perficere uult manus configurantur.

Taliū opus est semel aliquando facere men-
tionem, ideo etiā a nobis idem efficietur. medicus
quidam ex ijs qui sapientes esse sibi uidentur, cor-
rigens præsentem hanc orationem quasi esset de-
prauata, ita scribebat. manum itaq; de qua sermo
est: eruditiōē suam uidelicet nobis ostentās, qua
apud grammaticos, & rhetoras fuerat instructus:
ita ut uisatissimū loquendi modum apud omnes
ueteres ignorare uideretur, per defectum uideli-
cet scientem. integrumq; erit si subintelligamus in
hunc modum manum itaq; de quo tractatu ser-
mo erat, cum pronā quidam deligandam dedisset.
plerunq; enim imperiti homines idonea figuratio-
ne exhibere manum & brachium medicis solent.
aliquando uero nonnulli ex curiositate, naturali
scopo præterito, qui indolentiā est, melius esse exi-
stimant, ut pronā exhibeant. supinam tamē eam
qui medicis præbeat, est nemo. quippe cum ea fi-
gura longe admodū ab indolentiā recedat. at me-
dici quidam ob imperitiā simul & sapientiā per-
suasionem eo modo admittere nolunt: sed ita figu-
randum eorum brachium censent, ut sagittantes fa-

ciunt: alij prorsus supinum, alij ferē supinum, non
in hoc tantummodo errantes, uerum etiam in eo
quod extentū id constituunt. quæ autem ipsorum
ratio esset, Hippocrates subiūgit. quia uidelicet si
quis totam manum sic ut sagittantes solent, figu-
rauerit, ei ossa in directum statuant, colorisq; cō-
uenientia partium totius brachij simili modo sese
habet. at hæc probabilia sanē sunt, ex sese mutuo
euenientia. quod aut inquit carnes & nervos in
hac figura nō secus atq; ossa directionē omnibus
suis partibus seruire, illud uero falsum est, nam si
uerum esset, non solum probabile, uerum etiam
certissimum indicium figuratiōis huiusmodi ha-
beretur, quod secundum naturā esset. sed hæc qui-
dem tolerabilia fortasse sunt, sagittariā autē artē
in testimoniū afferri stolidū summo opere esse: me-
liusq; erat si cōmemoratum penitus ab Hippocra-
te non fuisset, q̄ si hoc studio fuisset conuictū. quæ
enim prorsus sunt absurda ac stolidā, contēni po-
tius q̄ conuinci scriptis præsertim debent. nam in
uita in actionibus ipsis reprehensionē fieri, neque
ipse prohibuerim, maxime si is qui huiusmodi nu-
gas iactat, sibi cōmitti ægrotantis curationem sua-
serit. incidit tamen interdum, ut etiā scriptis stultis
his opinionibus contradicendum nobis sit: cum
multos ipsi quasi ueræ fuerint, persuasos uideri-
mus. id quod nunc etiam Hippocrates fecit, nihil
cōmune esse deligationi cum sagittariā arte osten-
dens. quæ uero de ossium, & neruorum, & carniū
rectitudine dicuntur etiam si nullus fuisset cōuin-
cendus, per se ac prima ratione erāt necessaria ad
optimam figuratiōem inueniendam, cuius caput
ab experientia quidem est indolentiā. quippe cum
imperitis quoq; id perspicuum sit. ex ratiocinatio-
ne uero & ex ipsa rei natura partium rectitudo: quæ
non imperitis, sed solis ijs qui dissectionē callent,
manifesta est. quæ uero deinceps dicit, aperta sunt,
neq; ullam quæstionem habent: atq; idcirco a me
prætereunda sunt. qui tamen legunt, nō cito tras-
gredi hæc, sed immorari aliquantulum in ipsis de-
bent. Ipse coegit ita eam tenere, ut sagittantes cum
humerum iniiciūt, obscurum est & incertū, quod
hic dicit. unde nonnulli ita dixisse eum existi-
mā, propterea quod cum manus & brachiū in to-
tum extenditur, caput brachij in cauitate ceru-
cis scapulæ iniicitur, atq; ingreditur: in quā quan-
do remissum erat brachium, non ingrediebatur.
adiacet enim ei tantūmodo antea, eamq; attingit.
id quod illis uerbis Hippocrates ostendit cum in-
quit conuersatur autem brachium cum cauo sca-
pulæ in latus, cum ad costas porrigit. alij sunt qui
ex translatione ita dictum fuisse arbitrentur na-
uium iniectiōe atque incussione, quam faciunt,
cum in prælijs signo dato infestis prorsus irruentes
aduersas deprimere ac demergere conantur. cum
enim ita uehementi impetu in aduersas feruntur,
ac præcipue a latere, ut totas eas impressione fa-
cta dissoluant, ac demergant: tunc præparatas es-
se ad iniectiōem atque impactionem dicunt. *ἐπὶ τῷ*
ἐπὶ τῷ appellant. apud comicos item corporis par-
tes protentæ quasi ad iniectiōem & impressiōem

nem paratæ dicuntur. Quemadmodum Aristophanes quoque ostendit, cum inquit: Fertur quasi ipse ad imprimendum cernuus. Cætera quæ sequuntur, si quis animum aduertat, clara sunt ac patent, usque ad id quod subiungit.

10 Ei enim qui sagittariam artem exercet hanc figuram alterius manus optimam esse consentaneum est. brachij enim cardinalium in cubiti sede in tali figuratone innixum oisibus cubiti, & brachij directione facit, perinde ac si unum totum sit.

Oratio ipsi est ad eos qui extentam ita totam manum deligant, ut à sagittantibus sinistra teneri cõsuevit. inquit enim merito in ea operatio opus esse ut tota manus sinistra extendatur, dum retro à dextra neruus retrahitur, à sinistra uero totus arcus in eodẽ loco detineri ita firmiter debeat, ut in neutram partem quicquid declinet. nam si dum neruus à dextra uehementer retrahitur, retro quoque totus arcus simul feretur: sagittæ impetus remittetur; quippe quam à durissimo ac maxime intento neruo emitti oporteat. quantum enim è summa intentione remittitur, tantum èiaculationis impetus ac uis imminuatur, necesse est. hoc prius ita cõcesso causam subiungit Hippocrates; brachij enim inquit, cardinalium in cubiti sede tali figuratone innixum brachij os & cubiti in directum cõstituit, ac totum brachium rectum firmiter seruat. cardinalium autem inferiorẽ partem brachij appellat, quam cum cubito dearticulatur: propterea quod cardines cõcauas partes quasdam, quasdam eminentes cum habeant: cauis prominẽtias eorũ quæ inferuntur admittunt, eminẽtibus cauitates eorundẽ ineunt. sic & inferior brachij extremitas cum in curuam rotundationẽ desinat quæ utrinque eminẽtias orbiculares habeat trochleis similis, ac trochleari rotundatione in similibus cubiti inserta firmatur. cum uero in sinibus sedes cauas habeat, alteram ante, alteram retro, utrisque his cubiti aducos processus quos cornices uocant, excipit. cubitus enim suum caput quo brachio innectitur, simile sigma literæ sic scriptæ. C. habet, eoque tota fere brachij trochlearem rotundationem complectitur. cum igitur ea figura cõstituta est totius brachij, ut os brachij cum cubito rectum angulum efficiat: trochlearis hæc pars media inter cubiti processus collocatur. cum uero cubitus quiescente brachio circum trochlearem orbem fertur, in anteriorẽ quidem partem gibbum inflectens, in posteriorem extendens; in extrema inflectione anterior cubiti cornix in brachij sinum quæ ea parte est ingreditur: in extensione contra posterior quæ maior est, in posteriorem etiam ipsam maiorem brachij cauitatem ineundo inferitur. ac propterea sit ut plurimum & extendere & inflectere totum brachium possumus. quod nullo modo possemus, si nullam brachij cauitatẽ haberet. cum igitur tali natura articulus qui in gibbo brachij est, præditus sit, cum totum brachium angularem figuram obtinet; ita autem

Galen.

Hippocrateam appellat, quæ brachium rectum angulum cum cubito efficit: trochleari rotunditas media in medio sinu cubiti *Cyrua* litera imitante cõstituitur. in extensionibus autẽ totius brachij, cum retro feratur cubitus, cornix quæ ea parte est, motionem regit: & tunc sistit ac cessat, ubi primum in imum brachij posteriorem sinum penetrauerit. quod cum sit, euenit, ut & articulus explicetur, & brachij cardinalium in cubiti sede innitatur. ita enim uocat Hippocrates sedem & fundamentum, id est *Balysida*, non solum hanc, uerum etiam reliquos omnes sinus, in quas processus aliqui oisium ingredientes insidunt.

11 Et retortio articuli retorta in hac figuratone est. consentaneum est igitur hoc modo rigidissimum ac contentissimum esse locum hunc, qui non superetur, neque cedat, dum à dextra manu neruus trahitur. atque ita quam plurimum neruum trahet, emittet autẽ ex firmissimo, & repentinissimo. ex huiusmodi enim sagittarum emissionibus celeres & uehementiæ & longinquitates efficiuntur. deligationi uero cum sagittaria arte cõmune nihil est.

Ex manus & brachij figuratibus ea quæ ex extensione eius existit, contraria est inflexæ figuratoni. figura item supinæ, pronæ figuræ aduersatur. atque hæc extremæ sunt, ac uelut excedentes figuræ quatuor. duæ autẽ aliæ mediæ existunt una inter extremam extensionem, & inflexionem, quam ut dixi, Hippocrates angularem uocat: altera inter supinam & pronam media est, in qua cubitum radio supponi inquit: quam iustam & rectam appellat non secus atque angularem in qua cubitus cum brachio rectum angulum efficit. si autẽ hæc recta est, consentaneum est, ut quæ extento brachio sit, non recta appelletur. quod si non recta est, reflexa proculdubio in externam partem erit. quemadmodum si os cubiti in posteriorem partem ita retorqueatur, ut angulum cum brachio efficiat: id quod in nonnullis fieri cõspectum est: quos necesse est posteriorem brachij cauitatẽ admodum profundam habere, in qua posterior cubiti processus infigatur. nam si profundissimus is sinus cunctis esset, omnes in posteriorem partem reflectere, ac retorquere brachium possemus. sicut econtrario non possemus id perfecte dirigere, si, ut in quibusdam euenit, sedes hæc posterior cauitatis naturalis modum non esset assequuta, sed deficeret.

12 Nam si ubi deligauit, manum ita tenere permittat, multos alios dolores uulnere ipso maiores adiunget. sin autem cõflectere iubeat, neque ossa neque nerui, neque carnes in eodem situ permanebunt: sed superata deligatione alio transferretur. quæ igitur utilitatẽ sagittaria afferet figuratio? quocirca qui sapientia ita sibi uendicat, fortasse non erraret, si uulneratum ipsum exhibere sibi manum sineret.

tom. 6

N 3 Qui

Qui manum & brachium extentum ac porre-
ctum deligauit, siue id in eadem figura postea ser-
uet, siue inflecti iubeat, utroq; modo ægrotum læ-
dit doloris quidem perpetuitate, si ita seruetur: si
immutetur, eo quod corrumpitur deligatio. cū em̃
ob id fiat deligatio, ut cōformatio et coaptatio os-
sium circūflectis linteis leniter cōstricta cōseruet:
mutata post deligationē figuratiōe, contrarium
eueniret, ut uidelicet deligatio nō amplius fractu-
ram contineret: sed immutaretur, & trāferretur,
unā cum trāsmutatis neruis & musculis; quos car-
nes hic appellat, substantiam eorum nobis osten-
dens. carnes enim hæ sensu præditæ ex eo, quod
inter alias quæ absolute carnes dicuntur, præua-
leant, ita appellatæ, musculi sunt: qui ex neruis &
copulis discissas fibras in se habent. quippe cum
musculus prorsus à natura ex his fibris procreet,
cum circum ipsas ea quæ absolute caro dicitur,
concreta est ac compacta. hæc siquidem propria
musculi substantia est. nam uenas & arterias ea
causa in se admittit, sicut & cæteræ aliæ partes, ut
alatur & uiuat, proprium uero eius corpus fibræ
sunt, quæ circumcirca agnatam carnem habent.
quæ quidem caro cum plurima in medijs muscu-
lorum partibus agnascatur, subinde decrescens,
iuxta initia & fines paucissima est. ac propterea
fit, ut his in partibus neruosiore, in medio carno-
siores musculi reperiantur.

13 Alius uero quidam medicus supinam
manū accipiens ita extendere præcipiebat, atq;
ita sese habentem deligabat: eam figu-
ram naturalem esse existimans tum ex colo-
re indicio sumpto, tum ex eo quod ossa na-
turali in situ esse sic arbitrabatur: propterea
q; os quod prominet iuxta articulū manus
qua paruus digitus est, directum esse cū os
se eo uideatur, ex quo cubitū homines me-
tiuntur. atq; hæc quidem ille testimonia ad-
ducebat, quod figuratio ea naturaliter sese
haberet: ac recte dicere uidebatur. Sed si su-
pina manus extendatur, uehemēter labora-
bit. quantū autē dolorem afferat figuratio
hæc, unusquisq; cognoscet, si suā manū ita
extēdat. nam & infirmior uir robustiorem
ita manibus cōprehensum, quia articulus
gibbi supinus reflectitur, quocunq; uellet,
posset deducere. quippe cū neq; si ea manu
ensem quispiā habeat, sciat quomodo sibi
eo utendū sit, adeo uiolenta hæc figura est,
tū si ubi deligarit, in hac figura manū relin-
quat, maiorem dolorem si deambulet, ma-
gnū nihilominus si iaceat, sentiet. sin autē
inflectere manū iubeat, contrahi musculos,
& ossa aliā figuratiōē habere q̃ prius ne-
cesse est. adde q; hæc quoque in hac figura

præter aliud nocumētū ignorauit: os quod
iuxta articulū manus extat, qua paruus di-
gitus est, os cubiti esse: quod autem est in
conflexione à quo cubitū homines metiun-
tur, id brachij caput esse.

Si quis supinā manū figuret, interior caput bra-
chij, quod etiam condylū uocant, ac tuberculū, su-
premiū esse cubiti finem putabit. propterea quod
directum quodammodo ad infernum eius termi-
num uidetur, qui iuxta manus articulum qua par-
uus est digitus, prominet. nō omnes tamen à con-
dylō brachij cubitum metiuntur. sed sunt qui con-
uenienter à gibbo cubiti, qui ἀγκυλὸν & ὀλεκρῶνον
etiam dicitur, cubiti mensuram incipiunt. Hippo-
crates aut cum dicat, à quo homines cubitum me-
tiuntur, significare uidetur uel omēs, uel plerosq;
hinc mēsurā illius initium sumere. at hoc quomo-
docunq; sit, inquirere superuacū est. illud dignū
commemoratione uidetur, inferiorem finem cu-
biti qui iuxta manus articulum est, recta dirigi ad
superiorem finem si naturali habitu manum figu-
rauerimus: ita uidelicet ut uolam eius in interiōre
partem, conuexum in exteriōrem uertamus. qua
in figuratiōe etiā sit, ut paruus digitus infra subij-
ciatur, pollex in superiore parte sit.

14 Hic autem idem esse os hoc atque illud
opinabatur, ac multi quoque alij.

Non ita dicit idem esse os hoc atq; illud, sicut a-
liquem eundem sibi ipsi esse dicere consueuimus.
ut Telamonium Aiaceum eundem cum Aeacide,
sed quia utrūq; eiusdem ossis terminum, id est cu-
biti esse existimabat.

15 Sed cū illo osse idem est ἀγκυλὸν qui os
catur, id est cubiti gibbus, in quē innititur.

Sicut modo dixi idem intelligi debere, ita hic
quoq; sumendū est, ut eiusdem ossis partes & quæ
ad articulum manus est, & quæ in gibbi cubiti ar-
ticulo eminet, dicere hic idem esse intelligamus.

16 Si quis igitur ita supinā manū habeat,
tum os distortum apparet, tum nerui à ma-
nus articulo tendentes ex interiōre parte,
& à digitis distorti etiam ipsi efficiuntur.
quippe cum nerui hi ad os brachij tendant,
unde cubitus mensuratur. hi tales ac tanti
errores, atque ignorationes naturæ manus
existunt. at si ut ego iubeo manum fractam
intendat quispiam, is in directum os quod
est ad paruum digitum ad cubiti gibbū ten-
dens conuertet: rectitudinemq; ita habe-
bunt nerui ab articulo manus ad extremas
brachij partes pertingentes: manus item cū
appendetur, in eadem figuratiōe perma-
nebit, in quā erat, cum deligaretur: & tam
ambulanti, quā iacenti nullum dolorem,
nullamq; defatigationem afferet.

Quando ossis alicuius nerui, aut musculi initium ex interiore parte membri est, finis uero aut extra, aut infra, distortum proculdubio membrum illud est. unde omnia hæc, cum manus supina figuratur, recte hic distorqueri dixit. uide enim, nerui qui in interiorē partem à manu demeant, in cubitum intuent circa interioris brachij caput. quod si manum supinam efficiamus, eueniet, ut neruorum initium qui circa cubitum sunt, in interioribus partibus, finis uero in superioribus conspiciatur. eadem & musculorum, & ipsius cubiti ossis ratio est: quippe cum omnium horum initia ex interioribus partibus sint, qua brachij condylus eminet. ad dolorem uero afferendum, atq; ob id inflammationem exitandam satis esse uel musculi soli possunt, si distorqueantur. At si, quemadmodum iubet Hippocrates, manum & brachium figurarit quispiam, musculi qui in interiori parte cubiti exortum habent, toti in interiori parte quoq; erunt collocati: qui in exteriorē incipiunt, ibidem permanebunt; qui item in superiore oriuntur, in eadem per totum membrum seruantur. nam in inferiore, cubiti parte ne ullus quidem reperitur musculus: si autē omnē cubiti musculorū situm cognoscere appetis, ex primo Disssectoriarū tractationū libro discere id poteris. scilicet propterea etiam eosdem reperies in musculorū dissectione. quo in libro cōpendiosius quā in Disssectorijs tractationibus omnium qui in corpore sunt, musculorum natura explicatur.

17 Deflecti uero hominem oportet ita, ut ossis pars eminēs ad clarissimū ex præsenti bus luminibus cōstituatur: ne tractantē in extēsiōne lateat, an satis directū fuerit. nam periti ne manū quidē admotam atq; attrahentem latere eminens os poterit.

Siue cubare siue considerare significet, cum inquit deflecti, hoc est *ναλιννυδω*, alterum ipsorum insuper cum hoc est intelligendum. nam tum ad uires ægotantis, tum ad fracturæ magnitudinē respicientes modo sedentē, modo iacentem hominem deligamus. utro autē modo fiat, ad claritatem præsentiū luminū conuertenda pars affecta est, ut clare inspicī queat.

DE CVBITO.

18 Ex ossibus autem cubiti quibus utraq; fracta non sunt, cum superius os uulneratum est, faciliorem curationem admittit, licet crassius sit: tum quia sanum loco fundamenti substratum habet, tum quia facilius occultari potest, nisi iuxta manus articulum id contigerit: quippe cum in superiori parte crassior caro superiecta sit: os autem inferius carne omnino careat, neque facile occultationem admittat, extensioneq; uehementiore indigeat.

Duo esse cubiti ossa significauit, cum dixit in quibus utraq; fracta nō sunt: quippe cum utraq;

A uerbum neq; de uno, neq; de tribus, neq; de pluribus, sed de duobus tantummodo dici solet. ex his itaque duobus ossibus id quod subiaceret, proprie cubitus nominatur, quod longius quoq; est. quod superius est, radius nuncupatur. aperta autē non hæc tantummodo oratio est, uerum etiam reliquæ omnes ut plurimū hoc in libro, nihilq; mihi uidetur diluciditate indigere, nisi ea quæ nunc ex plano. quo circa si præter hæc aliquid tibi obscurum esse uideatur, inspicere nunquid exemplar errorū habeas. nam si castigatū sit, licet ubi semel legeris, quippiā non intelligas, prorsus tamē id percipies, si iterum atq; iterum repetiueris.

19 Si uero hoc confractum non sit, sed alterum: uilior extensio sufficit. at si utraq; sint fracta uehementiore extensione opus est. in puero quidem uidi extenta magis, q̃ oportebat. pleriq; tamen minus quā oporteat, extenduntur.

Simpliciorē, & sine magno negotio factam extensionem uiliorem appellat. nō enim tantum quod prauum est, *καλῶς* apud ueteres significat, sed etiam uile, simplex, ac uulgare.

20 Posteaquam extenderis, uolas admo- uendo dirigere oportet.

Volas admouendo, id est *θῆναι*, *θῆναι* autem proprie uocant prominentes uolæ partes à uerbo *θῆναι*, quod est uerberare, ut nonnulli uolunt, qui etymologijs delectantur. quippe cum his prominentibus partibus percutere soleamus ea quæ percutimus. alij non omnes partes prominentes palmæ ita appellari aiūt, sed solas eas quæ sub pollicibus extant.

21 Deinde ubi cerato illeueris, non admodum quidem multo, ne deligamenta circūfluitent, ita deligare.

Duo deligationis usus sunt, unus ut partes extēti ossis à nobis inter se bene compositas firmiter contineat: alter ut lintea succo aliquo tincta, aut medicamentum impositum, quod inflammationem sedare, ac uetere maxime iudicauerimus, supra affectas partes conseruet. quippe cum nonnulli medicamentis meatus obstruentibus, emplastris uocatis utantur, quæ cum linteis exceperint, atq; imposerint, extrinsecus postea deligant: alij uinum aliquem idoneum ad hoc adhibeant, ut succum, aliās solum, aliās cū oleo. sæpe itē aliquod ex liquidis medicamentis: cuiusmodi est ceratū hoc: quod quidē duplici modo cōfici solet. uno, cū cera in rosaceo aut oleo colligatur: altero, cū picis etiā sicce aliquantulum assumit: quod picatum ceratū appellant. liquida autē medicamēta cōspissationē quandā habent, & crassitudinē: cuiusmodi hoc ceratum liquidū est. quod si oleo confectū fuerit, ex emplastris est, quæ inflammationem arcēt: de quibus in libris De uis simplicium medicamentorū non nihil: in curatrice uero arte, & in tractatione De compositione medicamentorū latius dictū à nobis est. Hippocrates autē liquido

cerato usus est, quippe cum inflammationi arcenda longe aptius id sit, quam durum: siue quomodo cunctis quispian appellare uelit. quo quam copioso uti debeamus nobis quidem declarauit, cum inquit Non admodum multo, ne circumfluent deligamenta: oppositum uero terminum utpote nobis satis notum, non expressit. nam neque ita paucum ceratum conuenit adhibere, ut lintea fasciarum prius excidentur, quam tertio post die resoluantur. At enim illud dignum consideratione est, cur cerato nunc uti iubeat, cum, ubi os extra cutem eminet, uino nigro austerio uti consueuerit? mihi sane uidetur uinum huiusmodi utiis quasi efficacius remedium existimare: ac propterea ipsum in alijs fracturis permittere, in quibus nihil ex contractis ossibus denudatum est, quia multam diligentiam eius usus requirat. nam nisi assidue madesfaciamus, maximum damnum ex linteorum desiccatione timendum est. assidue uero irrigare, & praecipue noctu plerique ex ijs qui aegrotantibus inseruiunt, nolunt, unde, quia ad extremas aegrotationes extremae quoque curatioes exquisitae adhibitae optimae sunt, propterea in quibus os extra prominet, uino utendum censet: ubi uidelicet id ob uim eius adhibet. nunc igitur dicere hoc tantum sufficit, quoniam reliqua fracturae etiam sine uino possunt curari, modo cerato hoc usi fuerimus: uinum adhibeamus in his, atque ita ob ministrorum negligetiam in errorem aliquem magnum incidamus, necesse non est. ubi uero magnum impendet periculum, tunc ministri & ipsi sponte labores subire uolunt, & nobis adhortantibus obediunt. quin etiam huiusmodi aegrotos ob periculi magnitudinem inuisere frequentius solemus, & interdum apud ipsos pernoctamus, si ministros rite omnia quae iusserimus, esse acturos, diffidimus.

22 Ut summam manum cubiti gibbo inferius non habeat, sed paulo etiam superius, ne in summam matrem sanguis defluat, sed intercludatur.

Ita figurandum esse cubitum, ut & radio subiiciatur, & cum brachij ossis rectum angulum efficiat, superius iam dictum est. quia uero id fieri potest, siue superiorem manum teneat quispiam quam cubiti gibbum, siue inferiorem: merito de hoc quoque definit, altiore quam cubiti gibbo teneri summam manum iubet. decliues enimfigurationes scimus esse in causa, ut fluctationes ad membrorum extremitates deferantur. quocirca quemadmodum qui aut toto die deambulant, aut calidiora quodammodo habent crura, in primis curant, ut ea sublimiora reliquo corpore per noctem habeant: sic in manu cauendam decliuem figuram monet Hippocrates: ac cliuem seruandam, iussissetque longe altiore etiam haberi cubiti gibbo, nisi ea quoque figuratio, cum quis in ea immoratur, cum toti membro, tum anterioribus brachij musculis dolorem afferret. doloris esse effectricem hancfigurationem experimentum te docebit. causam uero doloris, musculorum natura qui cubiti articulum mouent, patefaciet. sunt enim hi in anteriore

A & ex interiore etiam brachij parte collocati, quos cum cubitum inflectimus, ad proprium caput attrahere, atque intendere sursum solemus, atque una cum ipsis cubitum totum quoque, in quem suis inferioribus partibus innexi sunt, attrahimus, sursumque intendimus. ne in summitatem sanguis defluat, sed intercludatur. hoc ad primum orationis huius membrum inferri statim debuerat: sed alterum interiectum in utroque medium obscurior paulo reddidit orationem: ut hoc modo esset: ut summam manum cubiti gibbo inferius non habeat ne in summitatem sanguis defluat: sed paulo etiam superius, ut intercludatur.

23 Deinde linteo deligare initio supra fracturam iniecto.

Initium iniici supra fracturam uel non iniici, duobus modis intelligi potest: cum interdum longitudinem, interdum latitudinem spectamus. in longitudine quidem, cum prima fascia inuolutio in orbem ducta fracturam contegit. si uero uel adeo superius uel adeo inferius obuoluas, ut fracta partem omnino non attingat fascia, initium id supra fracturam non esse per longitudinem uere dixeris. per latitudinem uero initium iniicitur, cum primam deligationem neque interius quam sit fractura, neque exterius facimus. hic autem Hippocrates ad membri latitudinem spectans initium iniiciendum supra fracturam dixit, id est neque superius neque inferius quam fractura sit: id quod ex eo quod subiungit, declarat, cum inquit postea quoque uero circumiecimus eodem in loco bis aut ter, in superiorem partem deuoluas deligando. in lib. autem De ijs quae in medicatrina sunt, ubi ait: initium injicere non supra ulcus, sed hinc uel inde oportet: id ad membri latitudinem spectans dixit. sicut etiam uerba haec *ἢ ὑπὲρ ἢ ὑποῦ*, id est hinc uel inde uidentur significare, quibus uidelicet Graeci ad latitudinem exprimendam uti consueuerunt. in multis tamen exemplaribus ita illud legitur: injicere oportet non ad ulcus, sed hinc & inde ad nodum.

24 Innitendo quidem, non tamen admodum comprimendo.

Mediocris ac modum iniiciendarum fasciarum hic docet. oportet enim ut in eis inuoluentis adeo innitatur, ut inter se adiunctas ossium partes coherere immobiles queant: non tamen ita uehementer comprimantur, ut dolorem creent. quippe cum omnis dolor si inueteret, & praecipue ex collisione & compressione, causa sit inflammationis: atque hi quidem compressionis fasciarum limites sunt, quos accurate assequi a principatione possumus: ubi uero saepe deligauerimus, possumus. nam si quantum circumscribendo fasciam intenderis, diliger animaduertas, deinde requiras ab eo qui deligatur, qualem fasciae circumuolutionem sentiat: ubi iterum circumiicies, uel relaxare intentionem, uel augere tibi licebit. si enim se comprimere ille dicat, relaxandum: si laxum ita esse uinculum, ut neque circumiectum sit, sentiat, augendum esse perspicuum est. quin etiam ante quam in eo qui fracturam habet

habet, deligationē aſpiceris. puerū ſanum ſepius deligando, ac ſimili modo ſciſcitando exercere te poteris: ut promptior poſtea ſic eſſe ad deligēdas fracturas queas. illud quoq; aduertendum tibi eſt, corpora quæ ualida ſunt ac dura, uehementiorem: quæ imbecilla ac mollia ſunt, remiſſiorem compreſſionem requirere.

25 Poſtea q̄ uero circumieceris eodem in loco bis aut ter, in ſuperiorem partem deligando deuoluas, ut deſluxiones ſanguinis intercludantur: atq; ibi finias.

Ipſe cauſam dixit, cur in ſuperiorem partem linteorum diſtributionē faciendam cenſeat. uult enim deſluxiones ſanguinis à ſuperioribus partibus mēbris ita prohiberi. antedicta uero deligatione, non ſolum arcetur, quod inſluit, uerum etiam quod in partibus circa fracturā continetur, eliditur. deſluxus autem unam tantū uſam habet à ſuperiori parte deorſum. expreſſio utraſq; tam deorſum à ſuperiori parte quam ab inferiori ſuſum. quippe cum & in inferiorem partem membri, et in ſuperiorem elidi atq; exprimi aliquid ualeat. unde conſulit, ut utraſque has perfequamur, duabus uti faſciationibus iubens, quæ utraq; à parte affecta utrinq; per longitudinē initium habeant: ſuperius una, altera inferius diſtributa. melius enim eſt ut à laſo loco in ſuperiores partes, & totum corpus elidatur ſanguis. eo quod extremitas minor eſt, quam ut ſine damno ſuſcipere copioſum humorē poſſit. nam ſi poſt primam faſciam quæ ex parte affecta ſanguinem ad manum exprimat, ſecunda etiam uiolentius cōſtrinxerit, & circa articulum manus, & circa dōgitos inflammatio exoritur. propterea igitur à ſuperiore parte primū omne id, ſi fieri poteſt, quod moleſtiam aſſert, exprimendum eſt: ſi uero parum aliquid relinquatur, in inferiorem partem ſecunda deligatione elidi debet. certius tamen mentem eius totam intelliges, ſi doctrinam De deligatione fueris aſſequutus.

26 Oportet autem ut prima lintea longa minime ſint,

Conueniēter hoc dicit. cū enim prima lintea à fractura incipiant, & ſuſum referantur, atq; ibi deſinant: neceſſe eſt, ut minor eorum fiat longitudo, quam id ſit, quod ſecunda ſunt cōprehenuſura. quæ iubet deorſum primum à fractura deducentes, ſuſum iterum ad eundem locum conuoluere, ubi finem faſcię primæ feceramus.

27 At ſecundorum ad fracturam initium iniſciendum eſt.

Merito: hinc enim uult ut amplior ſanguinis copia elidatur.

28 Circumdandumq; ſemel ibidem.

Semel iubet ut ſecundi lintei initii circūſſiciamus, nō bis aut ter, ut prioris. uult enim ut ſuſum magis, q̄ deorſum quod detineſt in partibus circa fracturā, ob antedictam cauſam exprimat.

29 In inferiorem deinde partem diſtribu-

endum, minusq; comprimendum, traſciendum uero magis.

Minus ſtringendū mēbrum ſecunda faſcia inquit, ob eas quas dixit cauſas. neq; tamē frequētes linteorum conuoluſiones faciendas monet, cum prior faſcia ſatis frequentię uſum explerit.

30 Vt tibi ſufficere linteam poſſit ad recurrendum eò, ubi alterum deſierit.

Hippocrates quidem ante plagularū iniectionem duabus faſcijs utitur. nōnulli alij tribus: una ſuſum à fractura deuoluta, ut iubet etiam Hippocrates: altera à fractura deorſum: tertia ab inferiori parte ſuſum, quam ſupra utraſq; priores cōuoluit. atq; ex his quidē tribus ſecūda breuior utriſq; reliquis eſt: reliquæ duæ inter ſe æquales. propterea quod prima fracturæ ipſi circumiecta bis, aut ter, circa membrum frequentioribus conuoluſionibus circūdari ſolet. ſecunda uero præter q̄ quod ſemel fracturæ circūuoluitur, rariuſ quoq; membrū obducit: at tertia licet utriſq; circūdetur, quia tamen rariorē habet diſtributionē, longior prima non euadit. ueruntamen duas has faſcias ab Hippocrate cōmemoratas tres illas in ſe cōtinere, etiam ſi ego nihil dicā, ſatis liquet. quippe cum ſecūda duos uſus expleat, quos illi duabus faſcijs ſeparatim aſcribentes, alterā à fractura in inferiorem partem, alteram ab inferiori parte ſuſum ad primā faſciæ finem deuoluebant.

31 Atq; hic quidem lintea in ſiniſtrā, aut dextram deligetur. aut in utram partem ad fracturæ figuratiōem cōferat, & in utram declinare conducat.

In oſium fracturis inclinatio diſtortionis interdum in ſiniſtram partē mēbrī, aliquādo in dextrā tendit. unde oportet ut duabus primis faſcijs contrariā deligationē faciamus: ut ex ea parte in quā propendit atq; inclinatur membrum, initio facto in contrarium prouoluamus. ita enim fiet, ut fractū os in equilibrio conſtituatur. Hoc igitur eſt, quod inquit nunc Hippocrates, dum iubet, ut deligatiōnis diſtributionem ad fracturę figuratiōnem accōmodemus: id eſt in contrarium quā diſtorta oſa fuerint, propellamus.

32 Poſt hæc uero plagulæ cerati modi coillitæ ſuperextendendæ ſunt. mitius enim ſic, ac ſtabilius eſt.

Plagulæ, quæ & ſplenā uocant, duarum primarum faſciarum, quas peculiari nomine *παραρρηκτα*, id eſt ſubligamina appellat, firmamenta ſunt. contrario autem modo ſuperſciuntur. nam cum illæ tranſuerſæ circum membrum conuoluantur, plagulæ in longitudinē ſuperextendunt, ita ut totam primam duorum linteorum deligationem comprehendant, quas medico cerato illiniēdas inquit, propterea q̄ ſicut ſi nimia copia aſſuant, infirmæ, atq; inſtabiles efficiunt: ſic nec adharere quidē priuſ ſubligaminibus queūt, ſi nimis pauco cerato inunctæ fuerint. eſt enim quidam quaſi nexus

nexus cum fasciis ceratū. in cæteris quoq; omnibus quæ glutino cōiungunt, mediocritas optima censetur. at ex plagulis, si sicce imponant, collisio etiā efficitur, cui mitius oppositū est. quædamodū stabilis instabilitati aduersa, quæ ex cerati multitudine existit. unde merito subiūxit, mitius enim sic, ac stabilis esse. eo quod si nihil prorsus cerato illinantur plagula, mollitē omnē, ac lenitatem: si nimis q̄ opus sit, stabilitatē amittit: quippe cum cerati copia lubrica efficiantur.

33 Deinde ita linteis deligandum alternatim modo in sinistra, modo in dextram, ac plerunq; ab inferiori parte incipiēdo ad superiorem, aliquādo à superiori ad inferiorem deducendum est.

Subligamina non alternatim inter se, sed in contrariū cōuoluta sunt: cum utraq; à distortionē præter naturā mēbrū reducant. fasciæ uero quæ post plagulas circūiūciunt, cum eum scopum habeant, ut totū mēbrū deligent, uniuersamq; deligationem sicut acceperūt, cōseruēt: ex aduerso inter se distributionē faciūt, altera in dextrā, altera in sinistra partē cōuoluta. simili modo quoq; deorsum altera, altera sursum. ita siquidē ex aduerso inter se cōplicate, talem deligationē cōseruare maxime possunt, quales acceperē. atq; illē quidē, quē in dextram & sinistra obuoluunt, in omnes prorsus æquales esse debēt, quæ sursum ac deorsum feruntur, licet nō longe se mutuo excedant: inter eas tamē illa quæ ab inferiori parte sursum ducit, copiosior sit. tutius enim id est, ob paulo ante allatā causam, quādo in principium mēbrī à fractura elidendum sanguinem monebat.

34 Subsuccaneis autem mederi oportet plagulis circumuolendo: multitudinē quidē fasciationum non uniuersē, sed partiatim corrigendo.

Membrorum longorum, quæ κῶλα dicuntur, fines angustiores habent latitudinem, quos ἀπὸ φύρας, id est desiccaneæ, seu ὑποφύρας subsuccaneæ ea de causā appellat: eosdem etiā ἀπὸ φύ, hoc est in acutum abeuntia uocare consueuit: has partes iubet per transuersum circumuolutis plagulis explere, unā cum fasciarum infectionibus pluribus, quæ non uniuersæ tamen congerantur: inæqualis enim ita inuaderet deligatio: sed particulatim & paulatim deficientem locum compleant.

35 At circa articulū manus laxè insuper fasciandum est, aliter, atq; aliter.

Omnes quidē partes, quæ affectis locis uicinae sunt, simul inflāri consueuerunt: sed magis tamen extremæ membrorū partes: propterea q̄ parua & carne carentes prorsus cum sint, defluent à locis fracturæ materiā dolorose suscipiunt. uult igitur ut eas cerati impositione leniamus: qd̄ sine ullo tegumēto inijci super eas melius est, neq; opus est ut ullæ fasciæ illinantur, cū supra ipsas & initiū instabile & finē habituræ sint, & cito deflu-

xuræ uideantur. quo circa ipsi fracturæ fasciis ad hoc simul uti cōsueuerūt, quas laxas merito circūducēdas censet, ne molestia aliquā afferat. nam cū ibi fractura detentione ulla nō indigeat, ad solam inflammationē prohibendam adhibentur.

36 Multitudo linteorum prima, satis idonea duæ portiones sunt.

In prima omnium deligatione multitudinē linteorum pauciorē esse uult: utpote qua procedente tempore non indigemus. docuit enim te quāto pluribus linteis utendum sit paulo post. Cum autem multitudo linteorū tum numero tum longitudine fasciarum, et plagularum augeatur: quæres fortasse maioresne an plures fascias tibi faciendas censeat: quantum item unumquodq; esse cōueniat. sed enim longitudinem & latitudinem in libro De ijs quæ in medicatrina sunt, ipse præfiniuit, cum inquit: Trium aut quatuor cubitorū longitudo, digitorū latitudo. numerū uero neq; nunc dicere prætermisit. duo em̄ subligamina in tota deligatione uult esse faciendā, plagulas uero triplices aut quadruplices esse debere eodē in libro docuit: quorū numerū tantum esse par est, quantum ad cōplectēdum membrum sufficiat. fasciæ autem quæ extrinsecus supra plagulas inijciuntur, duæ etiam ipsæ ut plurimum sint, necesse est: altera quæ ab inferiore parte sursum: altera quæ à superiori deorsum cōuoluat. fieri tamen potest, ut tres, aut quatuor quandoq; adhibeantur. nos sanē duabus semper uti consueuimus. si ad hos igitur scopos unusquisq; respiciat, illud proculdubio studebit, ut inter initia quidē duabus linteorum portionibus utatur: quo uero tempore inflammatione affecta pars caruerit, tres etiam adhibeat. in libro itaque, ut dixi, De ijs quæ in medicatrina sunt, fasciarum longitudinem præscripsit, eas trium aut quatuor cubitorum esse debere affirmans: ut cubitos uide licet intelligamus eius ipsius qui deligatur. ridiculum enim esset, si uel puerulus uerbi gratia duos, aut tres annos natus tum longis linteis deligaret, quæ tres aut quatuor uiriles cubitos expleret: uel uir adultus adeo breuibus, ut triū aut quatuor cubitorum infantis mensurā non excederent. in hoc tamen libro neq; lōgitudinē fasciarū, neq; latitudinem præfiniuit, nobis eas facile cōiectandas relinquens. perspicuū siquidē est, si ad fracturæ magnitudinē fascias accomodemus, lōgitudinē earum facile nos esse inuētuos: quippe cū semper deligatio, ut ipse iubet, multā quoq; sanī loci partem occupare insuper debeat non semper aut eadem fumēda longitudo est, sed pro fracturā, ut dictum est, magnitudinē uarianda. nam si bis aut ter fracturæ ipsi primū fascia est circūuolueda, deinde frequētib; circumfectionibus utēdo, multam sanī mēbrī partem occupandum: tantum proculdubio esse primū linteū necesse est, ut tot circumuolutionibus esse satis possit. simili modo quoq; reliquarū fasciarū longitudo ea esse debet, quæ deligationibus, quas scribit, queat sufficere. latitudinem autem, si ad ea quæ dixit, spectes, facile inuenieris.

afflucitas quidem esse inquit, non autē cōpressas. afflucitas autē esse, id est *supradicta*, firmatas atq; applicatas esse significat. id quod fiet, si non ualde la-
 tum linteum preparatum fuerit. quod enim nimis
 latū est, in cōuolutionibus corrugatur. nā alioqui
 quo latior fascia est, ut ampliorē locum occupare
 possit, eō firmius ac stabilius partes ossiū fractas
 continet. & quantum ad hoc spectat, quo latissimū,
 eo optimū linteū esse uideretur. quia tamē quæ
 leuiora sunt, ubi applicata fuerint, contrahi in ru-
 gas solent, ac propterea laxiora effecta subiecto-
 corporū firmā cōprehensionem amittunt: idcirco
 non admodum lata assumenda sunt. eousq; igitur
 augere tibi latitudinē fasciæ licet, quoad nulla eius
 pars laxior efficiatur. hinc est, quod huiusmodi
 omnia ab experto & perito homine melius agun-
 tur: quippe quorum scopi sint coniecturales, nul-
 lusq; eiusmodi, qui uel scribendo tradi, uel legen-
 do percipi facile queat. Cur autē pluribus linteis
 postea uti iubeat, tunc audies, cum ad ea uerba in
 quibus hoc scribit, explicanda deuenierimus.

37 Signa autē bene curati hæc sunt, atq;
 is bene deligati terminus est: si ab eo requis-
 siueris, an compressus sit, ipse autem com-
 pressum quidem se esse dicat: sed leniter ta-
 men, & præsertim circa ipsam fracturam.
 hæc itaq; dicere debet perpetuo fieri, is qui
 recte deligatur.

Quia coniecturalibus scopis in linteorum inuo-
 lutionibus utimur, ideo signis certis uult, ut quod
 in his uel recte exequuti fuerimus, uel prauè com-
 miserimus, discernere ualeamus: ut si ualde à fa-
 scijs cōprimatur æger, cito resoluētes melius de-
 ligemus. si laxior quàm debeat deligatio sit, mul-
 tum tempus non differamus. uehemēs enim com-
 pressio cum dolore atque inflammatione fa-
 ciat interdum etiā emori membri extremum co-
 git. laxa autem circumiectio linteorū sicut quan-
 tum ad hæc periculo uacat, ita permittit ut mem-
 brum in fracturam distorqueatur. quocirca adeo
 urget nimia compressio, ut eodē die religare
 nos omnino cogat. laxa uero unum, & duos etiā
 quādoq; expectare dies potest. interrogare igitur
 diligenter eum qui deligatus est, debemus, qua-
 lem nam cōuolutionem linteorum sentiat: ut ex
 eius responsione discernamus, quid in deligatio-
 ne corrigendum sit. ac præcipue cōuenire inquit,
 ut circa fracturam magis dicat se fuisse restrictū,
 quàm alijs in partibus: propterea quod compres-
 sus locus ille duabus de causis sensum maiorem
 efficiat: cum quia affectus est, tū quia nos magis
 astringere fasciam ea parte consueuimus, dum to-
 tum sanguinem in utramq; partem membri pro-
 cū à fractura elidere studemus. ita enim sit, ut affe-
 cta pars inflammatione omni careat.

38 At signa mediocritatis sunt, si die quo
 deligatus est, & nocte non minus, sed ma-
 gis restrictus sibi esse uideatur: postero

A paruula quædam intumescencia in summa
 manu mollis illa quidem exoritur: medio-
 criter te compressisse signum id est.

Quoniam præcipua deligationis uis in quan-
 titate compressionis consistit, quantitas uero hæc
 uaria esse consuevit, cum ex differentia mollitiæ,
 & paruutatis membrorum, tum uero maxime ex
 eo quod quædam corpora hebetiore, quædam ue-
 getiore sensu prædita sunt: merito Hippocrates
 multis signis nititur certam agroti curationē ma-
 nifestare. idcirco sola ex interrogatiōe indicia mi-
 nime ipsi satis fuerunt, sed membris ipsis insuper,
 & præcipue extremis eorum partibus attenden-
 dum nobis censet. intumescencia enim paruulam
 inquit, exorituram esse in summa manu mollem
 secundo die, si mediocriter constrinxerimus: quæ
 uidelicet, si impositis digitis deprimamus, cædat.
 nam si uel nullum huiusmodi tumorem, uel du-
 rum aliquem inueniamus, scire aperte licet, mi-
 nus quàm oportebat, si nihil prorsus extiterit: ma-
 gis, si durus tumor apparuerit, à nobis fuisse con-
 strictum. perspicuum enim est, si deligatione hu-
 moris ad extremam membri partem exprimatur,
 atq; hi multi sint, adeo repletum iri extremitatem,
 ut digitis etiam deprimentibus celsura non sit. idq;
 tibi nimia compressionis signum erit. quemad-
 modū, si nihil intumuerit manus, nihil prorsus e-
 lissum fuisse à deligatiōe indicabitur. quippe cum
 magnitudini compressionis expressorum humo-
 rum multitudo semper respondeat: pro ratione
 uero multitudinis tumor excreseat. quare merito
 cum uehementius compressa est fractura, dura et
 magna intumescencia insurgit: cum leniter cōstri-
 ctum est, parua & cedens existit: sicut nulla
 prorsus apparet, cum nulla prorsus restrictio adhibi-
 ta est. Constat igitur, si magnū & renitētē tumore
 deprehēderimus in extrema manu secundo post
 die, reprimentum esse, & multa aqua calida co-
 pioso oleo interfuso perfundendū, mediocriterq;
 comprimendo deligandum. at si secundo die nul-
 lus penitus tumor extiterit, tertio die resolutam
 fasciam restrictius deligabimus. si mediocris ac
 paruus tumor apparuerit, Hippocrates quidem
 etiā tunc tertio post die resoluendum censet: sed
 ego in quartum diem differens, & in quintum eti-
 am quādoq; præsertim per hyemē, nihilo peius
 euasissem deprehendi.

39 Desinēte autem die si minus uideatur
 restrictus fuisse, tertio autē fasciæ laxæ es-
 se appareant, & si horum antedictorum ali-
 quid defecerit, scire oportet laxiorem deli-
 gationem esse quàm cōueniat: siquid supe-
 rabundarit, magis q̃ par sit, fuisse compres-
 sum. his indicijs mōitus postea magis uel
 laxando uel comprimendo deligabis.

Non profecto, ut nonnulli opinantur, ex disten-
 tione longioribus effectis linteis mora tēporis la-
 xior deligatio appareat: sed quia membrū attenua-
 tum, cū recte deligatur, gracilescere cōsuevit, atq;
 hoc

hoc semper in omnibus fracturis euidenter cōspicitur: ut ipse etiam Hippocrates manifestabit.

40 Resoluere uero oportet tertio post die ubi extenderis, ac direxeris. Et si prius mediocriter deligaris, tunc paulo magis quam antea tibi comprimendum est. iniiciendaque initia supra fracturam, quemadmodum etiam prius, sunt. si hanc quidem prius deligaris, ex ea sanies in extremas partes huc & illuc exhauriuntur. si aliam partem prius compresseris, in eam ex compresso loco ex inanitio fit. animaduersio sanè ad multa utilis est, ita igitur incipere semper deligationem, compressionemque ex hoc loco opus est. reliqua pro rata quodque portione, quanto longius à fractura abduxeris, tanto minus cōstringendum. laxa nunquam prorsus, sed adhærentia circumijcienda. deinde pluribus linteis in unaquaque deligatione utendum est. & si interrogetur, paulo magis compressum se esse dicat, quam prius, et præcipue circa fracturam. & cætera quantum uidelicet & ad tumorem, & ad dolorem, & ad recreationem spectat pro ratione prioris deligationis fiant. ubi uero tertius dies iam aduenerit, laxiores ipsi fasciæ uideantur. deinde resoluere oportet, ac rursus deligando paulo magis comprimere, atque id omnibus linteis quibus fuerat deligandus. cuncta postea ipsum inuadant, quæ in primis etiam deligationum circuitibus euenerant.

Si in primo die non compresserimus, quantum conuenit, propterea quod obiectum dolore afficiebatur æger, omnibus recte succedentibus tertio die sedatum iam aliquantum dolorem nacti, fasciarum contentiorem augebimus. neque tunc tamen eatenus quantum ipsa res postulat. id enim si omnia recte cesserint, quinto die fit. unde etiam linteis quamplurimis tunc, perfectissimamque intentione uti nos iubet. memoria tamen tenendum nobis illud est, hæc nobis tantummodo esse faciendam, si omnia conuenienti ordine rite successerint. nam si ob errorem aliquem, qui intercesserit, nondum prorsus quinto die inflammatione careat brachium: neque nos linteis omnibus utemur. firmatas enim deligationis fasciarum etiam ex multitudine linteorum, sicut ipse inquit, fit. quam præcipue eo tempore adhibemus, quo locus circa fracturam satis cōtractus ac depressus apparet: os uero fractum laxum iam atque agile ad directionem cōspicitur. quod si quinto die non contigerit, alterum resolutionis circuitum expectabimus: qui uidelicet, in septimum diem deueniet. tertio enim quoque die resoluendum, ac religandum censet, quoad fractura in ferulas iniiciatur: ea causa, ut calida

aqua perfundamus ac foveamus: quo exinaniantur humores qui in fracta parte cōtinentur, quia libi & serosi cum sint, diffilatione ac perspiratione indigent. adde quod perfusio hæc & ad mitigandum dolorem facit, & pruriginem medetur. quocirca cum æger neque pruriginem, neque dolorem amplius sentiat, omniaque antedicta signa recte peracta fuisse circa fracturam cuncta offenderint: si etiam quarto post die solus, præsertim per hyemem, nullum dampnum afferes. atque eò magis, si homines rustici sint, lotio ne uti plerumque minime consuevit. nam si per singulos dies lauari soleant, aut bis in die: differenda longius peritio non est: ac præcipue si etiam molli carne forte præditi fuerint.

41 Postea quam uero ad tertium diem iam deuenierit, qui septimus à prima deligatione sit: si recte fuerit deligatus, tumor in summa manu, neque is ualde magnus erabit: deligata uero pars in omnibus deligationibus tenuior, ac gracilior reperietur: in septimo uero die etiam admodum tenuis: & ossa fracta ita affecta ut magis moueantur, agiliaque in coactionem sint. si hæc huiusmodi fuerint, coaptare oportet, atque accommodate ad ferulas circumponendas deligare, paulo magis comprimendo quam prius, nisi dolor aliquis maior à tumore qui in summa manu est, infestarit. ubi uero linteis deligaris, ferulæ tibi circūdandæ sunt, uinculisque quam laxissimis comprehendendæ: eatenus uidelicet, ut quiescant: neque ferularum appositio ad compressionem brachij quicquam faciat: post hæc & labor, & recreatio eadem, quæ in primis circuitibus deligationum, fiant. Vbi uero tertio die subsequente laxam esse deligationem dixerit, tunc deinde firmandæ ferulæ sunt. præcipue supra fracturam. & reliqua etiam pro ratione exhibeantur, si uidelicet & deligatio laxa magis fuerit, quam cōprimat. crassissima enim esse ferulam opus est, quæ excidit fractura, non tamen multo. danda autem opera est, ne uel è directo magni digiti ferula collocetur, sed hac uel illac: uel è directo parui, quia os ad manus articulum eminet, sed hac uel illac constituatur. at si consferat ut supra fracturam hac parte ferulæ alique quæ ponantur, breuiores hæc cæteris faciendæ sunt: ne ad ossa quæ ad manus articulum prominent, pertingant. inde enim exulceratio, neruorumque denudatio cōtingat, periculum impendet. tertio autem quoque die ferulis admodum leniter cōfirmandum

dum est, eo consilio ut ferulæ custodiendæ deligationis causa apponantur: non deligentur, ut comprimant. si igitur probe noris in prioribus deligationibus satis ossa fuisse directæ, neq; pruritus aliqui infestent, neque ulla suspecta exulceratio sit: deligatur ita cum ferulis permittendum est, quoad uiginti dies excesserit. triginta enim maxime diebus cunctis connumeratis ossa cubiti plerumq; corroborantur.

Si talem fractam partem tertio die reddere possemus, qualis plerumq; septimo euadit: ferulas ei tunc necessario circumdaremus: sed quoniam, ut dixit ipse, in septimo die etiã admodum tenuis reperitur, quo uerbo significat eam tenuiorem q̃ in sana constitutione se habebat prius, euadere: propterea eo die diligentissime composito ac confortato membro, utpote quod ossa iam laxa habeat, ferulas circumponi iubet. ferularum autem usus idem est, quæ etiã plagarum superius diximus, ut fractum os contineatur. os enim coalescere inter se, ut caro, ob naturalem siccitatẽ cum nequeat, callo circa oras fractionis cõcrescente, quasi uinculo quodã quo cohareat, indiget. cuius quidem calli ortus ex alimentis fracti ipsius ossis excremento existit. quod si non recte ager uictu utatur, uel plenitudinis habitu præditus sit, sæpe id profusum crasso sanguini persimile totas fascias inficit. quicquid igitur ex hoc excremento, dum effluescit, in labris fracti ossis concreuit: id mora temporis ab ipso contingente osse immutatũ simile ossi euadit, uocaturq; callus, seu tofus, Græcè πῶς. si itaque ossis fracti capita atq; oræ ipsæ dimoueantur & quantantur, compressio eius atq; adhesio impeditur. idq; obstat, quo minus occalescere locus ac ferruminari queat. quod enim lignis quæ simul cõiunguntur, est gluten: id con fractis ossibus calus est. ut merito quæ callo cõglutinandæ sunt fracturæ quiete summa indigeant. quippe cum si calus concrevens agitur, & moueatur, dissolui nõ secus ac gluten, quo ligna committuntur: aut lac quod coagulatur, solet. quietem autem hæc accuratissima cõpressio affert, quæ & fasciis, & ijs quæ ipsas extrinsecus continent, procuratur: ipsas autem & multitudo linteorum, & ferulæ cõtinent. Quæ sequuntur omnia, si quis mentem aduertat, clara sunt. iubet enim si alicubi laxa fiat deligatio tertio post die ferulis constringendũ esse: nõ tamen deligationem totam resoluendã, nisi forte uel ager uehementi prurigne afficiatur, uel ulcerationem aliquam suspicemur. causa autem cur inter initia maior, postea uero minor pruritus sentiat, affectæ partis exinanitio est. cum enim ab excrementis uaporosis egrediẽtibus mediocriter mordentur, pruriunt. nam si uehementer mordeantur, cum dolore pruritus ipsis contingit. quando igitur uacuum membrum iam est, uel nullum uel paucissimum omnino huiusmodi excrementum gignit.

Galen.

A 42 Certum tamen nihil est. ualde enim & natura à natura, & ætas ab ætate differt.

Cum non absolute ætatem ab ætate differre dixerit, sed & cõiunctionem addiderit: alias quoq; esse causas significat, ob quas non omnes cubiti fracturæ triginta diebus, sed serius aliæ, aliæ citius consolidantur. est enim & tempus anni, & regio, & natura corporis quod curatur, anni item constitutio, & uictus ægroti, & deligationis modus, quæ omnia uariationem afferunt. citius enim corroboratur os, id est firmiter occalescit, cum & materia ex qua callus fit, mediocriter & quantitate et qualitate affecta est, & uis coagulantis ipsam facultatis est ualida. in diutinam autem moram incidunt fracturæ interdum ob materiæ defectum: quod enim pauciore tempore ob copiam materiæ facultates efficiunt, id ut præstent, si desit materia, diuturniorem moram requirunt: interdum ob nimiam copiam: quippe cum callus qui concreuit, ab effluente humore, si multus sit, & continuus, dilui atq; obrui consueuerit, ac crassitudo quidẽ materiæ idonea est, ut concreat, in callumq; euadat, tenuitas contra liquida atq; aquea ad callum procreandum ineptior est, nam facultatem, si ualida sit, citius: si imbecilla, tardius opus suum peragere nemini dubium est. ob hæc igitur contingit ut diuersis temporibus fracta ossa callum contrahant, hæc autem ipsa quæ nunc dixi ob superius commemoratas causas immutari consueverunt. amplior siquidem & paucior materia, crassior item & tenuior tum ex pristina temperatura uniuscuiusq; tum ex aduentitia eo tempore quo quisq; curatur, existit. accedit etiã uictus quo utuntur ægroti, & modus deligationis quo deligantur, ætas item, & tempus anni, & regio. ex quibus scilicet omnibus facultas & ualida redditur, & imbecilla.

43 Vbi uero solueris, aqua calida perfundere ac fouere oportet, et paulo minus comprimendo quàm prius, paucioribusq; linteis religare. & deinde tertio quoq; die resoluere item, ac minus comprimendo, paucioribus linteis deligare.

A principio & multitudinem linteorum & cõpressionem usque ad ferularum circumdationem auxit: quas ubi apposuit circa septimũ diem, quasi firmum quoddam calli generationi iacere furdamentum uellet, usq; ad uigefimum sine solutiõne membrum reseruauit. ubi uero concreuit iam callus, non amplius omnino in quiete seruandam fracturam censet. quippe cum nutriti debeat callus, cum iam firma radice adoleuit. nutritio autem suppeditatione materiæ fit: quam sicut à loco affecto ad alias partes à principio auertebamus, ita nunc aquæ calidæ perfusione reuocanda est. adde quod cum inter initia eam prorsus, ne ad partem affectam afflueret, & linteorum multitudine, & cõpressionem arceremus: nunc impedimenta hæc tolluntur, dum paulatim & linteorum copia detrahitur, & compressio laxatur.

tom. 6

O

Si

44 Si autem ubi ferulis deligaris, nō res-
te reposita esse ossa suspiceris, uel aliud
quid uulneratum hominem molestat: in di-
midia temporis parte aut paulo ante soluē-
dum, ac religandum tibi esse scias.

Quæ superius dixit, omnibus rite ac cōueni-
enter succedentibus fieri non uult. sed si interdu aut
dolor aliquis oboriatur, aut ulceratiōis timor inci-
dat, aut ne uel recte ossa fuerint cōposita, uel mo-
tio aliqua in eis contigerit, suspicemur: tunc resol-
uendam nobis deligationem ante uigessimū diem
inquit atq; ita nos pramonet, ne quis perpetuum
esse quod prius præceperat, ratus, fracturas omnes
usq; ad uigessimū diem seruare penitus immo-
tas uelit. ad id enim quod subinde urget, spectare
medicus debet: neque tanquam legem inuolabi-
lem præcepta sibi esse seruanda existimare; præser-
tim si non conuenienter omnia euenerint.

45 Viçtus ijs quibus neque ulcera à prin-
cipio cōtigerūt, neque ossa extra eminent,
subuulgaris sit: pauciore siquidē uictu usq;
ad decem dies utēdum ipsis est, utpote qui
iam commorentur.

Veteres ferē omnes *φάλημ* pro quolibet uili ac
simplici usurpare consueuerūt, cui exquisitum &
exactum opponitur, quod ab Ionibus *σκεβρόν* dici-
tur. sicut igitur exquisitum uictum *σκεβρόν* uocat,
ita qui contrarius ei est, *φάλημ*, id est simplicem ac
uulgarem appellat: & nunc eum qui inter uulga-
re, & exquisitū mediū est, *ῥαποφάλημ*, id est sub-
uulgarem nuncupauit. exquisito igitur uictu eos
uti uult, qui à principio fracturam cum ulcere pa-
tiuntur, & præcipue si extra cutem confractum os
prominet: simplici & uulgari, eos qui citra pericu-
lum constituti sunt: subuulgari & medio, eos qui
fracturam absq; ulcere, & ossis prominentia ha-
bent: in primis uidelicet diebus. primorum autem
dierum terminum statuit decem. nō quod uel tem-
pestiuus uel serius immutare cōsentaneē uictum
non ualeamus, sed quia plerunq; ita faciendū esse
cōtingit. propterea autem mediū adhibendum
uictum censet, quia neq; magnum est periculum,
sicut cum denudatum etiam os fuerit: neque adeo
in tuto res est, sicut cū quis ulcus simplex in carne
absque ossis fractiōe ulla habet. ijs itaq; qui me-
dio modo inter periclitantes, & periculo uacan-
tes affecti sunt, mediū quoque uictum statuit.
præsertim cum etiam qui confractam manum ha-
bent, usq; ad decimū diem prorsus quiescāt, at-
que ocidentur: quod *ἐλινύειν*, id est commorari Io-
nes uocant: qui autem ocidentur & quiescunt, ex-
quisitiore uictu uti, quā qui mouentur, consen-
taneum est. post decimū igitur diem cum pleri-
que manu iam appensa obambulant, merito usq;
ad illum diem, mediū uictum adhibendum con-
sultit. utpote qui iam cōmorentur, id est quiescant
et ocidentur. de tempore autem ut plurimum, tam-
particulam ponere consueuerunt. eandem etiam
statuunt cum probationem quandam & cōfirmam-

tionem significare uolunt: ut si dicamus, & alia, &
iam hoc credendum est, seu faciendum. quem in
modum hic Hippocrates uidetur posuisse. ut talis
oratio hinc euadat, uictu medio cri usq; ad decimū
diem utendum est, cum ob alia, tum iam etiā quia
ager eo tempore prorsus quiescit.

46 Obsonijsq; mollibus quæ descensui
mediocritatem præstent.

Vel ptisana uidelicet, uel beta, uel malua, uel a-
triplice, blito item & cucurbita, nec non piscibus
qui molli carne sunt.

47 A uino uero & carnis esu abstinen-
dum est.

Docuit ipse exquisiti uictus formā, & subuul-
garis quoq; quē nunc usq; ad decimū diem exhi-
bendū censet. qui cū uino & carne sit uulgaris est:
qui cremore tantum ptisanæ, & aquam mullam
admittit, bonus atq; exquisitus: mediū uero inter
hos utrosq; est, quē modo dixit: obsonijs mollib.
inquiens quæ descensui mediocritatem præstent.

48 Deinde tamē ex additione reficiēdi
sunt. atq; hæc quidem oratiō quasi lex iusta
de fracturarum curatiōe cōstituta est.

Reficiat restaurari eum qui fracturam habet,
postea consulit. ex additione autem dixit, ut signi-
ficet paulatim id esse faciendū. quod enim copio-
se et repente uel replet, uel euacuat, uel aliud quip-
piam facit, uituperare consueuit.

49 Quoque modo tractare debeamus, et
quo modo à iusta tractatione euenire opor-
teat, siquid autem nō ita euaserit, sciendum
est aliquid uel minus q̃ decebat, uel plus in
tractatione fuisse effectum.

Iustam tractationem uocat eam quæ omne id
quod agrote conuenit, attribuit, nihilq; transgre-
ditur, quod sibi faciendum sit. tractationem uero,
id est, *χέρειν* uel ex manu operationem & chirur-
giam appellat: uel omnem absolute rerum omni-
um administrationem. quippe cum Græci non so-
lum ea quæ manibus comprehenduntur, uerum
etiam omnia quæ aguntur, *μεταχειρίζεσθαι*, id est,
tractari atq; administrari dicant.

50 Præterea hæc insuper in hoc simplici
modo aduertēda sunt: quæ nō admodū cu-
rare medici uidentur: cum tamen omnē cu-
ram & meditationē, omnemq; deligationē
corrumpere, si non recte fiant, possint.

Simplicem modū & fracturæ & luxationis eum
uocat, cum neq; ulcus contigit, neq; os aut fuit de-
nudatū, aut multas in partes contritum, quod fra-
cturæ genus farinatim factum recentiores appel-
lant. horum siquidem omnium simplex modus non
est: sed ille tantū, cum fracturæ aut luxationi nihil
aliud insuper accessit. se enim uti hac appellatione
in hunc significatum hoc eodem in libro declarat
Hippocrates, cum nō post admodū multa ita scri-
bat. At qui buscūq; simplici modo fracta ossa sunt.

In hoc igitur simplici modo fracturarum parvus quidem species, si quis tamen diligeret omnia inspiciat ut maximus error committitur. hoc enim neglecto omnis prius habita diligentia corrumpitur. atque hoc quo modo fiat, deinceps docebit. aliter autem eadem lectio scribitur hoc pacto. cum tamē omnis cura & meditatio, omnisque deligatio corrumpi, si non recte fiat, possit. ut intelligamus diligentia eum damnare si male adhibeatur, quippe quæ cætera quoque omnia, quæ circa affecta partem bene fuerat administrata, corrumpere ualeat.

51 Nam si uel ossa utraque cōfracta sint, uel inferius tantummodo, & cui deligatio adhibita est, is mitella quadam manu habeat appensam, mitellæque ipsa ea parte qua est fractura plurimum cōtineat, ita ut hinc & inde manus dependeat: in hoc alterum os in superiorem partem distortum deprehendatur, necesse est.

Vult te insuper diligenter inspicere qualis nam totius manus appensio futura sit, cum non amplius facit homo, sed iam deambulat. hoc est post de cimum diem. ante enim ut plurimum iacuit manu deposita eafiguratione quā superius didicisti, qua extremam partem altiorē paulo detinebat. quando uero iam deambulat, collo, sicuti fieri consuevit, manum appensam gestans, mitella ei circumficienda est, ita lata, ut totum cubitum æqualiter sustentet: ne si ulla sui parte pendulus extra eam relinqueretur, ea parte os eius deorsum incurueretur, & distorteretur. prius enim quæ affectu fuisset os, continuum totum, atque unum erat quando uero confectione continuatē amisit, tunc fieri potest, ut altera eius pars supposita mitella firmē ac sustentetur; altera, utpote quæ non amplius cōtinuata cū ea sit, in inferiorē partem declinās distorteretur. potest item & eiusdem partis interdū alterū caput ob prauē subiectam mitellā quæ ipsum solū sustentet, altum permanere: alterū uero deorsum propēdens eam in partē distorteretur. quatuor igitur modis prauē mitella cubito subijci cōsuevit. primum quādo fracta tantū pars ab ipsa suspenditur, ac gestatur: quæ uero ex utraque parte sunt, propendent. secundo cum extreme cubiti partes & superior iuxta gibbum, & inferior ad manus articulum summatē bene mitella sunt, mediā uero sine sustentaculo dependet. tertio & quarto cū uel anteriora cubiti sola, uel posteriora sola mitella sustentat. Ex his quatuor modis duos tantūmodo cōmemorauit Hippocrates, qui quidē maxime etiā membrū distortum alteros duos omisit: quippe qui cum illis intelligi facile possint. ex his uero duobus quos refert, alter in proposita hac oratione exponitur: in qua primum docet intelligere nos id debere, siue utraque cubiti ossa fracta fuerint, siue alterū tantum quod inferius est, qui propriē cubitus nūcupatur. quanquā hoc cōmune utriusque modis est de quibus sermonē est facturus. sed illa sunt propria: prioris quidē de quo nunc agit, quæ subiecta cubito mitella

Galen.

A angustior cum sit, quæ ut totum membrum queat sustentare, solam partem fractam suspēdit: posterioris, quod e cōtrario mitella cum ex utraque parte attollat, solam partem fractā insuspensam relinquit. distorteretur autē inquit priori modo cubitum sursum: secundo modo deorsum, sicut in sequenti oratione declarabit: priori uero modo distortionē in superiorē partem fieri ita ostenditur: cum pars fracta à mitella sustentetur, reliquæ utrinque deorsum tendant, propterea quod nullam firmā sedem habeant, efficitur, ut quod à mitella gestatur, altiori loco callo conferruminetur. quæ autē figura membrū occalluerit, eandē reliquo omni tempore conseruet: adeo ut scire nos quæ ita fuerint distorta, iterum ad principium cogamur reuocare: atque exten-

B de nouo membro fracturā rursus eandem efficiamus. nam, sicut prius iam diximus, non unitur & coalescit unquam os, sed à callo circūcrescente colligatur & cōferruminetur. ubi igitur id extendēdo diuelimus, rursus curamus, ut in conuenientefiguratione calli conglutinatio efficiatur. non uniti autē prius & coalescere inter se quæ fracta sunt ossa, in alijs quoque animalibus cōspicere potes. nā si aliquando uel suum uel aporum, uel bouum, caprarum item & ouium, quinetiā gallorum aut galinarum os aliquod callo conferruminetur deprehenderit (deprehendes aut multa, sicut etiam nobis cōtingit, si id studiose inuestigaris) derao circūcirca callo fracti ossis capita inter se apposita tantum cernes, non unita & coalita, ut caro in uulneribus cōsueuit. cur autē si utraque cubiti ossa fracta sint & id quod proprie cubitus dicitur, et alterum quē radium uocant, maximā membri distortionem ex praua suspensione fieri contingat: si alterum tantum fractionē passum sit, id est cubitus, membrū minus distorteretur: si in radio fractura euenerit, nulla omnino distortio accadat, etiam si prauē appensio adhibita fuerit, non difficulter reperies, si ea quæ dixit, memoria teneas. subiectū enim & substratum os, ut inquit, qui est cubitus, loco sedis ac fundamenti superiori fracto iacet: atque ita distortionem eius prohibet. si uero cubito fracto radium illæsus permanserit, si recte quidem deligetur, dirigere etiā secum quodāmodo cubitum potest: cōtinere tamē ne penitus distorteretur, si in appensione peccet medicus, non potest: propterea quod in inferiori loco cōstitutus cubitus nihil habet, nisi deligationem quæ ipsum sustentet.

52 At si fractis ossibus & summa manus & pars iuxta gibbū cubiti, mitella sustentatur, reliqua aut cubiti pars suspēsa non sit, in inferiorē partem os distortū inuenietur.

Secundū ex quatuor modis quos modo superior cōmemorauit nunc docet, qui cōtrarius primo est. illo enim à mitella solus fracturæ locus sustentabatur. nunc alijs omnibus partibus suspensis sola ea in qua est fractura ingestata relinquitur. quē admodum igitur in superius cōmemorata appensione, quia sustentata à mitella membri pars fracta sublimior, reliquæ omnes utrinque depressiores, atque

tom. 6

O 2

humī

humiliores permanebāt: merito distorqueri in superiore partem totum cubitū dixit: ita nunc ubi fractura sola à mitella nō sustentatur, ea pars membri sola cum deorsum fluat inclinatur, ac deprimatur, atq; ut incuruetur cubitus eo loci, ac callo obducto in inferiore partē distorqueatur, facit. atque hæc tota disposita huius orationis sententia est. duæ aut huius orationis lectiones reperiuntur, quæ uerbis quidē ipsi maxime inter se contrariæ uideri alicui possunt: si quis tamen diligenter aduertat, in rebus cōsentiri. nam cum nōnulli suspensum cubitum, id est *μερὶ ὀστέου*, insustentatum intelligāt, qui solo aere gestetur: alij uero e contrario suspensum pro mitella sustentato accipiant, eo quod qui extra mitellā est, deorsum inclinatur, humiliorq; efficiatur, quod contrariū suspensio sit: merito duæ lectiones uerbis inter se repugnantes, re autem cōsensu inter se consentientes euaserunt. cum enim uerbum suspensum in contraria significata ab explanatoribus trahatur: iure sit, ut alij sine negatione reliqua autem cubiti pars suspensa sit: alij cum negatione legendum censeant: reliqua autem cubiti pars suspensa non sit: prout unusquisque uerbum hoc interpretatur.

53 Oportet igitur ut mitella molli quæ latitudinem habeat & plurimam cubiti par-

tem, & articulum ipsum manus æqualiter suspendamus.

In hac ratione prætermittas reliquas duas appensiones significat. eas in quā, quæ cōmune illud habent q; in extrema cubiti parte mitella subijcitur: proprium uero, q; uel iuxta gibbū tantū cubiti, uel iuxta manus tantum articulum eadem mitella superponitur. nam cum ante dixerit, cum circa solā fracturā circūijcitur mitella, & cum utriusq; extremitatibus applicatur, & postea in hac oratione moueat plurimā cubiti partem & articulum manus æqualiter à mitella sustentari debere: manifeste declarat se reliquas duas appensiones, quæ nō recte sese habent damnare: quippe cum neutra ipsarum articulum manus simul, & plurimā cubiti partem æqualiter firmet. sed propriam tamen de his doctrinam nullā tradit: præcipue quidē quia, ut dixi, cum prædictis intelliguntur: deinde propterea q; si deligatio recte facta sit, parū admodum hælesionem afferre cōsueuerunt. ante dictæ uero duæ appensiones ob id ualde prauæ censebātur, quod pars fracta contrario modo, quā utraq; adiacentes afficiebatur: cum aliquando ipsa sola nulla alia sustentata sursum traheretur: aliquando deorsum cæteris subleuatis sola ipsa dependere permitteretur.

GAL IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE FRACTVRIS COMMENTARIORVM

Liber secundus.



I autem brachium fractum fuerit.

Nōnulli ex ijs qui librum hunc explanarunt, sicut in superioribus, modo totū membrū quod inter duos articulos gibbi cubiti uidelicet & manus porrigitur, modo longius ex duobus eius ossibus cubitum appellabant: ita brachium aiunt ab Hippocrate nuncupari & membrum quod est inter humeri & cubiti articulum, & os quod in ipso continetur. alij membra quidem illa nominari asserunt, sed ossa ipsa habere appellationem hanc negant. quippe cum ita nos quoq; dicere consueuerimus, illi caput uulneratū est, aut mala, aut natus, siue in sola cute læso ipsa cōtingerit, siue alius penetrarit, ut uel membrā musculi, uel neruum uel arteriā, uel uenam offenderit: sic cum dicimus brachiū fuisse ulceratū affectionē eam in brachio cōtingisse declaramus, quod ulcus uocatur. quoniam uero in ratione ulceris caro cōprehenditur, eā licet propria appellatione non expresserimus, ulceris tamen uocabulo significamus. quippe cum quæ in carne contigit, diuisionē, ulcus uocemus: ita ut cū dicimus, Dioni, si ita incidit, brachium fuisse ulceratum, carnem tantummodo brachij significemus. eodē modo cum fractum eidem brachium dicimus, affectum eum passum esse ipsum ostendimus, quam fracturā uocant. unā uero cum fractura necesse esse aiunt, ut os quoq; intelligat.

Sed enim hoc cum in nomine tantū & significato alterationē habeat, neq; prodesse nobis, neq; obesse ad fracturæ curationem quicq; potest, quæ se quuntur, curationē quæ fracto brachio adhibenda est, nobis tradit. quæ sanē, ut mihi quidē uidetur, plana omnis ac clara est, nō secus atq; alia quæ superius de cubito scripsit: illa quoq; præter paucissima quædā, dilucida fuerunt. tamen si nos dum singulorū quæ ab eo fieri iubebant, causas apponeremus, produximus orationē: quod licet proprio explanationis munere aliquantulū abeat, cōsuetum tamen, ut dixi, explanatoribus est: uerū tamen cum has easdē ipsas rationes alibi ipse breuibus explicarit, neq; nos hic apponendā earum inuentionē, sed ordinē immutandū nobis esse duximus. Hic uero & per se cōsiderata oratio manifesta est, & singulorū causam superius ante dictā habet, ubi de cubito agebatur. quippe cū hac ad ea quoq; referant, quæ generatim ibi cōsulant. primum totius manus & brachij figuratio est, deinde extēsiō, postea conformatio, postquam extremo loco positio succedit: siue aliquo modo collocetur, siue appendatur. his igitur præcognitis si pauca aliqua occurrerint, quæ aperta non sint, insequentibus explanabimus.

2 Et distentā manū quispāam protrahens in ea figura extendat: musculus brachij distētus deligabitur, atq; ita efficietur ut cum qui deligatus fuerit, cubitum inflexerit, musculus brachij aliam figuram habeat.

Huic orationi addenda ea sunt quæ superius dicuntur. cum post deligationem musculum brachij aliam figuram acquirat, fieri ut nonnulli ipsius partes uiolenter à fascijs comprimantur, aliae laxas eas & diffuentes habeant: atque inde contingere, ut ex compressione inflammatio oriatur: ex laxitate membrum ipsum disforquetur: quare figuratione manus minime esse mutantur: sed eandem semper seruandam à principio usque ad finem, sicut etiam prius dictum fuit. ac si in ea figura qua deligatis, manum cōserues: sicut nulla deligationis pars aut laxior, aut strictior reddetur: ita quia ipsa figura praua est, ut superius demonstrata fuit, dolorem afferet, atque ex eo inflammationem excitabit.

3 Iustissima igitur brachij extensio hæc est. lignū cubitalis longitudinis, aut paulo breuius, cuiusmodi manubria lignonū sunt, ex utraque parte catena deligatum suspendendum est. tum hominis in sede alta collocati brachium transferendum est, sic ut sub ala manubrium aptetur: ea moderatiōe ut uix confidere homo queat, sed ferè suspensus maneat, postea aliquid aliud stabile appendendū superiecto scorteo puluino aut uno aut pluribus, quo ei altitudini satis sint, ut cubitus ad rectum angulum obliquetur. optimum quidem est ut corium aliquod latum & molle, aut mitellam latam circumijciamus, atque inde ex magnis ponderibus aliquid appendamus, quod intēdere medio criter ualeat. sin minus, homo aliquis præualens ea figuratione seruata cubiti ad brachium deorsum urgendo compellat.

Iustitia naturalis esse ut proprium unicuique non ex lege, sed natura ipsius attribuantur, & in philosophia demonstratū, & superius etiam dictū iam est. dictum item præterea fuit iustū esse figurationem eam quæ singularū membri partium proprium situm seruet: eandemque dolorē minime omnium aliarum afferre: quæ in brachio est, cum quis cubitum ita figurat ut rectum angulum cum brachio efficiat. iubet igitur ut homo figurato ita brachio in sede collocet: atque ante ipsum transuersum lignū prætendatur tantum ac tale, quāta ac qualia lignonum manubria esse cōsueuerunt. *σλαφία* enim rustica instrumenta appellat, id est ligones quibus terra foditur, inter quæ sunt etiam quæ bipalpia uocant. hæc à cōminuendis glebis *μυρῶν* ab Atticis, id est rura nuncupantur. uult aut prætentū hoc lignum immotū permanere, ita ut neque sursum neque deorsum in opere ipso transferri queat: id quod fiet, si catenis ex utroque capite annexis sublimi alicui loco suspendat. supra hoc transmittere brachium ægrotantē hominē iubet, ita ut transuersum manubrium ale impingat. homo aut ipse cuius brachium fractū est, ita alte debet sedere, ut ferè suspensū sit. uult enim eum sedere ut operationi sufficiat, et non

Galen.

stando delassetur: non tamen depressum atque humilem esse, sed ita ut quæ altissimus quisque esse sedendo potest. quin etiam medici ipsius causa, ut recte stando operet, & non plerumque inclinari deorsum cogatur. ipsi quoque qui curatur, melius est, ut ita sede atque cum ægrotantes in huiusmodi manuum extensionibus dolore affici cōsueuerint, sit ut propterea attrahentes sequant, & sese attollant. neque amplius pristina sessionē suam seruēt: atque inde intentio omnīs resoluatur. quod ne fiat, in extremo termino altæ sessionis hominē ferè suspensum collocandū cēset. ut si paulo attollat, stet: quod si fecerit, neque seipsum latere, neque alios possit: cum uero non lateat, rursum in pristinam figuram & ab alijs, & ex seipso etiam facile reducat. illud quoque accedit, quod si quis qui ita sedet, si stare uelint quam minima: humiliores, quam maxima mutatio sit: ut cum læsio aliqua ex mutatione illa eueniat, minima si alte quis sedeat: maxima si humiliter, euentura sit. perspicuum etiam est eum ligno transuerso sub ala uti ea de causa, ne dum manus extenditur, homo sequatur, atque ita intentionē resoluat. id quod nos absque ligno sæpenumero facere cōsueuimus laqueis sub alam circumiectis: quorum sanè capita retro intendenda sunt. tum aliorum laqueorum circumpositione in utraque partem os fractum distendimus, si manu facta intentio imbecillior sit, quæ cōueniat. nam ea aliquādo sola sperandū est ut res succedat. quæ admodū in pueris, ubi nullis laqueis est opus, ac multo minus machinis axes habentibus. quibus capita laqueorum circumuoluendo efficere uehementiore distensionē solemus. sed hoc modo distensionis in luxationibus. plerumque utimur. hic autem quem nunc adhibendum cenfet, huiusmodi est. uult ut cubitus super aliquod aliud innitatur stabile quod *ἐπὶ τοῦ πο* uocat, id est eiusmodi stabilitatis, ut in eo desiderare quispiam firmiter queat: supra quod scortē puluini iniiciantur. deinde ab inferiore extremitate brachij iuxta cubiti gibbū ponderosum aliquid appendi iubet. magnorū, inquit, ponderum aliquid, id est *σαθῆ μίω*. ea autē sunt quibus uti cōsueuimus, libralia pondera ex ære, aut ferro, aut plumbo constantia. prius tamen latum aliquod lorū & molle, aut mitella aliqua ualida ea parte circumijcienda ex qua pondera hæc appendantur.

4 Medicus uero rectus stans altero pede altiori loco firmato operetur, palmisque os componat. facile autem componetur, & dirigetur, propterea quod bona hæc extensio est, si quis eam recte præpararit. deinde iniectis fasciæ initijs supra fracturam deliget, & cætera omnia, quemadmodū prius monuimus, pertractet, & interrogationibus ipsædem sciscitetur, & ipsædem signis utatur, moderate ne se habeat, nec ne. et tertio post die soluat, & religet, & magis comprimat.

Hunc habitum utpote stabiliore ac firmiorem operanti eligit. quemadmodū in libro De ijs quæ

in medicatrina aguntur, docuit in hunc modū scribens. Si uero stet, utriusque quidem pedibus ex equo insistere oportet, sed agere altero inscendentem, qui utique ex parte operantis manus non sit.

5 Et septimo die uel nono ferulas circumdet. & si non recte positum esse os suspicetur, intra hoc tempus resoluat, & ubi recte composuerit, religet.

Id quod superius in cubito intelligendū tibi esse dixi, nunc quoque est dicendū. si omnia rite euenierint, in hoc præscripto temporis spacio ferulas tibi esse iniiciendas; sed in cubito septimo tantummodo die deligari ferulas iussit. in brachio uero disiumctiua copula usus, septimo die, inquit, uel nono ferulas circumdet. ob id uidelicet quod ob magnitudinem musculorum brachij longiorem temporis moram partes circa fracturam requirunt, ut graciles prorsus ac rugosæ reddantur. tūc enim ubi eiusmodi euaserint, apponendarum ferularum occasionem esse demonstratum est.

6 Corroboratur maxime brachij os in quadraginta dieb. quos ubi excefferit, soluedū, ac minus comprimendū, paucioribusque linteis deligandū est, ex quisioreque quodā tempore uictu, atque eo diutius utendum est: quandiu autē, ex tumore qui in summa manu extitit, coniectabis, uires eius spectans.

Callo colligari ac cōferuiminari separatas fracti ossis partes corroborari appellat, sicut etiam superius in cubito. quanto autem maius brachij os est quam cubiti, tanto etiā longius tempus ad calum contrahendum requirit. reliqua omnia ex his quæ de cubito dicta sunt, patent. ut nulla nostra explanatione indigant.

7 Aduertere insuper etiam hoc oportet, brachium in exteriorem partem incuruatū natura esse. atque iccirco si non recte curetur, folere distorqueri. nam reliqua etiam ossa quæ natura sunt distorta, ubi fracta sunt, si nō bene fuerint curata, distorqueri in eādē partem consuevere. quapropter opus est, ut cum tale quid suspicamur, mitella lata brachium circum circa comprehendamus ac circa pectus deligamus: atque ubi quiescendum est, inter cubiti gibbum & costas plagulam aliquā multiplicem, aut tale aliquid supponamus. hoc enim modo incuruatio ossis dirigi posset. cauendum tamen est ne nimis in interiorem partem uergat.

Quæ hac in oratione dicuntur usque ad finem ubi de brachio agit, omnia perspicua sunt. nam & causam distortionis in exteriorem partem ipse explicat: & quo modo ex propulsione in cōtrarium dirigatur, docet. tum plagulam multiplicē inter costas & cubiti gibbum ea causa interijciendam iubet, ne brachium costas attingat, sed locus medius

intercedat, in quem compulsum brachium astringente mitella corrigatur: dum naturalis curuatura in exteriore partem distorta ex depressione in interiorem partem restituitur.

DE PEDE ET MANU.

8 Pes hominis multis ac paruis ossibus, non secus ac summa manus cōstat.

Conuenientia partibus totius manus et brachij cū cruris partibus quædā est. quod enim in manu est brachium, id in crure est femur. quod in manu cubitus est, in crure est tibia. sic summa manus pedis correspondet, sed nullū nomen propriū summæ manus habet. Greci diuersum à manu, sicut pes diuersa à crure appellatione nuncupat. merito ergo pedem absolute dixit, neque addidit summū, manū uero summā uocauit, ut à tota manu, quæ brachium etiā totū apud Græcos comprehendit, distingueret: sed hæc de nominū usu satis, de rebus ipsis iam dicamus. Sequebat, ut ad ea quæ superius dixit, de summa manu tractationē subiungeret: sed ipse nō de ea sola, sed de pede quoque simul agit ac plura etiam de eo dicit, propterea quod per maiorem diligentiam postulat. ex multis igitur ac paruis ossibus hæc cōstare inquit: at nos duris etiā adiungemus. medulla enim caret, ac fistulosa minime sunt, paruis lapillis perque similia, sicut autem totum brachium toti cruri respondet, ita manus cū pede conuenientiā habet. qualis enim in manu est prima pars palmæ, quæ *καρπός* dicitur, talis in pede prima pars plantæ est, quæ *πτερόν* uocat. qualis item in manu palma est, id est *πτερόν*, talis in pede est planta, seu solū. digitorum cōuenientia, eū si ego nihil dicam, satis clara per se est. præter hæc in pede ossa calcis sunt. unde longior etiā de pede ab eo tractatio fit, quæ de manu. quippe cum quæ cōmunia cum manu habet pes, prius cōmemoret, deinde que propria, deinceps subiungat. prima igitur pars palmæ octo, palma ipsa quatuor, digiti tribus singuli ossibus cōstituuntur: ut omnia manus ossa septem et uiginti sint. at in pede digitorū ossa quatuordecim habentur: duobus enim tantū magnus eius digitus cōstat. quinque plantæ explent: atque ita simul omnia totidē quot in manus palma & digitis, id est decem et nouem sunt. nam licet palma uno osse à planta superetur: digiti tamē manus uno osse digitos pedis excedunt: atque iccirco utraque partes pedis utriusque manus partibus pari ossiū numero adæquant. præterea in manu prima pars palmæ octo cōstat ossibus in pede prima pars plantæ simul cū calce & talo & tesserali, & nauiculari, octo etiā ipsa ossa habet. ac calcis quidē os maximū omnium quæ in extremis his membris reperiuntur, & talo & tibiæ substatum, totum ferme, quando stamus, corpus sustentat: ab anteriore uero parte cum tesserali seu quadrato osse quod *κνέμης* dicunt, dearticulat: quæ admodum tali caput cum nauiculari, quod *σναφός* nuncupatur. quibus utriusque alia quæ in prima parte plantæ præcipue sunt dearticulatione annexuntur. & si quis uelit talum pedi attribueri, in utraque extremitate membrorum, id est, tam in ma-

nu, quam in pede idem numerus ossium reperitur: ut modo docendi, non ipsa rerum natura inter se discordes sint, qui uigintiseptē esse in pede ossa, & qui sex & uiginti esse tantummodo asserunt. si enim pedis talum ascribas, septē & uiginti: si eum a pedis numero auferas, sex & uiginti ossa tantum erunt. hac de causa igitur recte dixit pes hominis ex multis & paruis ossibus nō secus ac summa manus constat: utpote ad eos sermonem habens, qui introducuntur, et dissectionem iam uiderunt. atq; in memoriā eis reuocans ea quæ ad præsentem rem utilia iam didicerunt. non enim scire tantum oportet ex multis & paruis et duris ossibus utraq; ex his partē esse constitutam, sed in super & figura & magnitudine singulorū & respectu quem cum uicinis habent, quæ positura appellatur, memoriā repetēda est: ut cū ex propria sede aliquod ex his ossibus exciderit, prompte ei occurrere ualeamus.

9 Frangi autem non admodum ossa hæc cōsueuerunt nisi unā cum corpore ab acuto aliquo aut graui uulnerato. sed uulnerata ut curanda sint in ulcerationū loco dicetur.

ῥῥῥῥ quod hic corpus dictum est, Iones appellant, quicquid carnosum corporis nostri est: in quo maxime genere cutis & musculi sunt: deinde membrana & uiscera. ad ossium genus ῥῥῥῥ non uocant, sicut neq; cartilagineas, neq; copulas. ita quoq; Homerus usus nomine hoc uidetur fuisse, ubi inquit. Semper erit firmum generi ipsi corpus, & acre. & alibi.

Nesciens ipsa sibi corpus laceraret honestum. In antedictis igitur membris, quæ sunt pes, & manus, non admodum frangi ossa solere absq; ulcere inquit: quod enim ait unā cum corpore uulnerato, idem significat, ac si cum ulcere dixisset: neq; refert in præsentī oratione ulcus ne an uulnus dicatur. in manu autē & pede paucissimā carnulentia est, sicut in brachio & femore quāplurima. quocirca cum extrinsecus aliquid in manū & pedem incidit, quod cōfringere ossa ipsorum queat: partes hæ facile patiūtur. fractionis enim quatuor maxime generales causæ sunt, nam uel aliquid est quod cōtundere potest si uehementi impetu deferatur. id autem proculdubio corpus aliquod esse debet, quod durum substantia sit, & mole non exiguum. uel aliquid quod cutem solam, uel quod aliquid etiā quod subest cuti usq; ad ossa, uel quod ossa etiā ipsa diuidat: quod sanē malum ipse ῥῥῥῥ quasi defensionem dicas, in libro De uulneribus capitū, uocat: quinetiam ex alto aliquo loco desilientes nonnulli uel tibiarū, uel femoris os frēgerūt, quæ sicciora ipsi, neq; admodum densa fuerint. nam in palæstra nos quoq; uidimus ex circumrotatione, ita enim clare dici posset, fracturam contigisse, in quodā, cui cum fracta esset tibia unā cum sura magno cum uulnere ossa denudata sunt. fractura enim ea euenit, cum tibia crui aduersarij luctātis per trāuersum fuisset subiecta, ita ut utraq; eius capita & iuxta pedem et iuxta genu deorsum uiolenter deprimerentur: id quod in lignis quoq;

A quæ a nobis ipsis circumtorquentur, uidere licet. si enim ligna supra femur nostrum imposita ex utroq; capite deorsum uehementē manibus urgeamus, frangi ea in mediā parte cernemus. quemadmodum igitur neq; magnū neq; ualidum, sed paruum & imbecillum lignū circumtorquere ac frangere hoc modo solemus: ita si os infirmum sit natura, simili luctatione atq; operatione medium dirumpi cōsueuit. at talis non cōdus fracturarū in ossibus manus & pedis non cōtingit. neq; etiam si ex alto desiliant, neq; si in terram deferantur, neq; si uiolenter pedem diuellant. huiusmodi enim ictibus copulæ potius ossiū, quā ossa ipsa franguntur: id quod ipsis cum ob paruitatem, tum ob dūritiem magis euenit. addē q; neq; extrinsecus aliquid uehementē ipsis impingens, facile ea potest cōfringere, nisi & durius ossibus ipsis sit, & magnitudine satis amplū. eiusmodi enim cum est, neq; cuti parciat, quemadmodum neq; cum acutum est quod percutit. id enim cum diuidat, & secet, prius ossa affici, quā ipsa attingat. unde merito dixit ossa hæc absq; ulcere non frangi. quoniam uero de fracturis cum ulcere in sequentibus tractaturus est, horum sermonem in eum locum differt.

10 Si uero quid de sede sua motum fuerit, aut digitorū articulus, aut aliud aliquod os primæ partis plantæ, pellendū unūquodq; in suā sedē est, sicut & ea quæ in manu sunt.

C Non quia prædixerit aliquid de ossibus quæ in manu sunt, nunc ait: sicut & ea quæ in manu sunt: sed perinde ac si ita dixisset, pellendū unūquodque os pedis in suam sedem est. & simili modo etiam in manu faciendum est. legitur autē in nonnullis, pellendū, in alijs depellendū, id est deorsum pellendū. nam reponendū in propriam sedem os esse inquit, quod motū fuerit. mouetur autem os, cum quæ ipsum cum uicinis colligant copulæ abrupte fuerint: sed non omnes tamē quæ os circumcirca cōtinent abrumpuntur. raro enim prorsus id fit, ut relicta tota sua sede os læsum ad cutem resiliat: & maxime si laxa sit, ut moti ossis impetui resistere nequeat. propterea enim in inferiorē pedis partem prominere motū os plerūque non solet, quia crassa & dura cutis ibi est, quod ue stigium uocatur. sed ob id quoq; quod quæ ictum inferunt, ex superiore parte ferē semper pedē percutiunt: tunc enim tantummodo in inferiorē partem os prolaberetur, si ex alto loco desiliēs homo in asperas admodum aut acutas prominentias pedem impingeret. quæ igitur undecūq; absoluta penitus sunt ossa, cum a sede sua siue sursum siue deorsum excesserint, reponi in sedem difficilissimum est. nam licet id fiat, quod raro prospere succedit, semper tamen laxam sedē habent. si enim rursus uehementius moueant, cum copulas, quæ ipsa contineant, amplius non habeant, erumpunt: at quæ ex parte copulis quibusdam seruatis sunt annexa, ex parte soluta, perinde ac si abrupta sint, prominere cōsueuerunt. ea extento toto pede depellenda in sedem suam sunt.

11 Medendumq; ei est cerato, & plagulis & linteis non secus ac fracturis: omiſſis tamen ferulis, eodem modo comprimēdo, & tertio poſt die deligādo, interrogetur item ille qui deligatur ſimiliter ut in fracturis, cōſtricta ne an laxa deligatio ſit.

Qualem curatiōē adhibere in fracturis iuſſit, talem nunc quoq; in manu & pede ſi motum os fuerit, tibi eſſe faciendam inquit. nam & ab extenſione incipere debemus, quo reponere oſſa dimota ualeamus: & ubi repoſuimus deligare, eadem cura habita, ut abſq; inflammatione pars ea ſeruetur, cōſtrictumq; os repoſitum linteis detineatur. hæc autem fieri recte non poſſe ſuperius demonſtratū eſt: niſi ſanguis, qui in affectis partibus eſt, ad caput & finem membri exprimatur: ne uel aliud eo affluat, prohibeatur. Ad hæc igitur reſpiciētes, inueniemus totam deligatiōē quæ fracturis adhibetur, quam exceptis ferulis, faciendā nobis cenſet, propterea quod partis natura quæ curatur appoſitionē harū non admittit. quippe cū plana eſſe debeat ſuperficies partiū, quibus applicandæ ferule ſint, cuiuſmodi di prima pars plātæ pedis minime eſt

12 Sana autem in uiginti diebus perfecte omnia ſiunt: niſi ea quæ cum oſſibus tibię cōmunicationem habēt, & cum ipſa etiā, ipſa proceſſione. conſert uero ut per hoc tēpus cubent, ſed non tolerant, quin contemnentes morbum prius obambulānt, quā cōſanuerint. ob id ſit, ut pleriq; nō integre cōualeſcant, ſed ſæpe dolore cōmoneſcant, neq; id iniuriā. nam cum totū corporis pondus pedes uehāt, quādo nondū ſani ingrediuntur, agre conſaneſcere articuli qui moti ſunt, poſſunt. ac propterea interdum dolent quæ iuxta tibiam ſunt. quæ uero cum tibię oſſibus cōmunicāt, maiora alijs ſunt: & cum dimota ſunt, ſerius conſaneſcūt. cui ratio tamen eadem eſt.

Cum ipſa inquit, de tota tibia uidelicet intelligens. ipſa proceſſione autem eſt directio ſignificat: id quod cum in multis ſæpe dixit, tum uero inferius ter eodem loco hoc nomine deinceps utitur: ubi de tibia agit, cum inquit. femoris enim caput ſuperiorem corporis partem ſuſtinet: idq; in interiori parte cruris, non in exteriori eſt, ſed ex anterioris tibię partis proceſſione: tum reliqua corporis dimidia pars huic magis proceſſione appropinquat, quā exteriori. adde q; quod eſt intrinſecus, craſſius eſt, quā quod eſt extrinſecus. quemadmodum etiam quod in cubito eſt, ex proceſſione parui digiti tenuius eſt, & longius.

13 Linteisq; plurib. & plagulis utendū eſt.

Cōſuetū eſt, ut repoſita oſſa in ſede ſua permaneant, linteæ & plagulæ adhiberi præſertim, ſi locus ob inæqualitatē ferularū appoſitionē nō admittit.

14 Et in totum hinc & inde deligandum, cōprimēdūq; ut reliqua omnia: ea parte maxime, quā motū os eſt, primasq; circumuolutiones linteorū eodem modo faciendū.

Superius iuſſit in fracturum oſſium inclinatio- ne, ſi in dextram prolapsa ſint, in ſiniſtram nos propellere ac retorquere: ſi in ſiniſtram, contrariō in dextram reducere. in pedibus uero æqualis omnino faciēda deligatio eſt: quia in eis oſſa, quæ e propria ſede exciderunt, non in latus, ſed uel ſurſum, uel deorſum ferri conſueuerunt.

15 In ſingulis autem reſolutionibus multa calida aqua fouēdum eſt. in omnibus enim noxæ circa articulos multa aqua calida perfundendæ. at compreſſiones & laxationes iſdem temporibus eadem ſigna exhibeāt, quæ etiā ſuperius. tum religationes eodem modo ſiant. hi autem in quadraginta maxime diebus ſani perfecte euadunt, ſi cubare uoluerint. ſin minus, ea quæ & prius dicta ſunt, & magis quoq; patiuntur.

Vbi mitigari dolore, laxariq; intentionē corporū uult, ibi plurima aquæ calidæ perſuſione uti præcipit. id quod præcipue in huiuſmodi affectionibus circa articulos faciendum eſt, quæ & neruoſiores, & oſſeæ magis partes ſunt: ut & ab inflammatione collidantur, & maiorem dolore eo quod neruoſiores ſunt, ſentiant. noxas autem, id eſt *oira* nocumenta & læſiones uocat. nam & *oira* nocu- mento affici, a cladi appellat.

DE CALCE.

16 At uero quicunq; de alto loco deſcipientes calce uehementi impetu firmati ſunt, iſs oſſa diſtant: & uenulæ carne circum os con- tuſa exuccantur: tumorq; ſuperuenit, & dolor multus. os enim id paruum non eſt: & ex directo tibię prominet.

Exuccari uenas inquit, dum uult ſignificare eſ- ſundit extra ſecum qui in eis continetur, id eſt ſan- guinem, ac ſugillari. id quod ſit cum tunica ipſa cō- tuſa eſt. quæ enim contunduntur corpora, unionē naturalem amittunt multis ac paruis partibus ipſorū diſcerptis, eſt quibus etiā ſanguis unde quaq; eſſunditur. at eſſuentem hunc ſanguinem loca cir- cum uenam excipiunt. atq; ubi exceperunt, ta- lem, qualis à principio erat, minime conſeruant. nam mora quadā ſibi nigreſcit: perinde ac ſi foras eſſuſus inueteraſſet. contingitq; affectio ea quæ *θρόμβωσις*, id eſt concretio ſanguinis nūcupat, ex qua quidē affectione ſanguis ipſe, *θρόμβος*, id eſt cōcretus ſanguis, & eſt, & dicitur: tū niger etiā co- lore ſit, atq; inde etiam prauè putreſcit. ſed hæc qui dem exuccatis & ſugillatis grauiffima cōtingere non poſſunt, ſi à natura ſuperatus ſanguis, mureſ- ſicut ſit in inflammationibus quæ ad maturitatē per- ueniūt: ſicq; in pus conuerſat. ut aut natura quæ in partibus inſita eſt, ſanguini domineſt duobus his

studendum est; alteri, ne inflammatione laborēt par-
tes; quod quomodo fiat, superius didicimus; alte-
ri, ut interfusus sanguis discutiatur, atq; elidatur. hęc
igit spectans Hippocrates particulatim deinceps
omnia præcipit. distat, inquit, ossa eorū qui ita de-
siliunt, ac diducuntur, abruptis uidelicet quæ ipsa
connectunt, copulis; quemadmodum paulo ante
de ijs quæ in prima parte plantæ sunt ossa, diceba-
mus. calci autē à superiori parte talus annexus est:
ab anteriore quod *καὶ ὁ ὀστέον*, id est testellæ seu qua
dratū appellatur; quemadmodum talo ab anterior
re parte id dearticulatur, quod naviculare seu *σκα-
φοειδές* dicit. his uero utriusq; quadrato, & nauicula-
ri quatuor primæ partis plantæ ossa cōnectuntur.
de quibus omnibus ossibus tam pedis q̃ manus
in cōmentario De ossibus satis demonstratū est.

17 Cōmunicationemq; habet cum uenis
& neruis opportunis, tendo etiā posterior
huic ossi annectitur, hi cerato, & plagulis,
& linteis, aqua item plurima calida curandi
sunt, his inquam, & linteis pluribus uten-
dum est, præter hæc alijs insuper est opus
quàm optimis, & lenissimis.

Ossi calcis, inquit, cōmunicationem nerui ma-
gni habent; id enim ei hic significat opportunum,
sicut etiam uena non parua. connectitur item po-
sterior tendo, qui ex musculis carnosæ posterioris
tibię partis producitur. de his quoq; & in Disse-
ctorijs tractationibus, & in dissectione musculo-
rum satis dictum iam est. oportetq; ea probe didi-
cisse unumquemq; qui percipere hæc uult, quæ hic
ab Hippocrate traduntur.

18 Et si mollis forte cutis natura circa cal-
cem fuerit, ita sinendum, si crassa & dura,
ut nonnulli habent, incidendum, atq; atte-
nuandū, ita tamen ne uulneratio efficiatur.

Cum prædicta affectio circa calcem, atq; an-
exas partes accidit, periculum est ne & dolores ma-
gni, atq; inflammatio non parua consequatur. ossibus
plena enim loca ea cum sint, neq; ex quibuslibet
ossibus, sed admodum exiguis carticulata, si par-
ua aliqua ibi cōtingat inflammatio, sit, ut magni do-
lores ex compressione excitentur. adde q̃ innexus
calcitendo satis magnus cum sit, si inflammetur in
discrimen uenit, ne cōuulsione corripatur. nerui
item magni hac parte cōstituti sunt, qui ossa attin-
gunt: quemadmodum in neruorū dissectione di-
dicisti. Quocirca cum alia quæ ad curationē spe-
ctant, diligenter administranda sunt & in uictus
tenuitate, & in copia persufusa aqua: tum cutis infe-
riore parte, quæ uestigium dicitur, incidenda est,
atq; id moderate: ita ut in quibus dura est cutis, in-
cisionis altitudo duritia ipsa terminet. adeo enim
in nonnullis pars ea occalescit, ut ne minimū qui-
dem sanguinis profluere inde possit, nisi alte ad-
modum scalper adigatur. illius igitur uestigiū in-
cidendum est quod sanguinē non effundit illi par-
tendum, quod ubi primum incidimus, cruentari

consuevit. afficitur enim dolore dum inciditur. at
neq; duritia illa cutis absolute ita secari debet, sed
plane atq; æqualiter. ut autem æqualiter seces, tria
tibi obseruanda sunt. longitudo incisionis, altitu-
do, & tertio loco interuallum. nam & æquales lon-
gitudine & altitudine inter se incisiones faciendæ
sunt, & æquali quoq; interuallo inter se distantes:
ut totum simili modo uestigiū inflammationis tem-
pore absq; molestia extendatur. scimus enim om-
nia quæ inflammatione afficiuntur, distendi solet
dissectiones uero sicut dolores creare: ita quoq; in-
flammationes ipsas augere, & conuulsiones pro-
uocare. Quemadmodum igitur multa aqua calida
persufuso adiecto copioso oleo cum distentionem
remittat, magnopere adiuuat: sic incisiones
faciendæ excogitauit, quæ ad tantam altitudinem
descendant, ut sanguine tamen præditam cutem
nondum attingant. utiliter enim admodum leues
has cutis incisiones cōmentus est. quippe cum in
alijs quoq; partibus, cum magna aliqua inflamma-
tione infestantur, scarificare cutem cogamur; par-
tim ut aliquid ex affluetia sanguinis, qui in inflam-
matione est, demamus: partim ut perspirationes
procuremus: atq; insuper dissectionem soluamus,
quæ ex inflammatione extiterat. at in pede magis
quoq; ad scarificandam cutem deueniemus, etiam
si nondum inflammatio occuparit: propterea quòd
ea durissima cum sit, extendi in inflammationibus
non potest. quocirca cum distenditur, & dolore ue-
hementi ipsa afficitur, & dissectione adiunctas par-
tes, & præcipue tendonem annexum collidit, qui
ex una musculi unius carnosæ posterioris tibię
partis neruositate exoritur: qui si in dolorē & in-
flammationem incidat, periculum est ne toti mu-
sculo eadem impertiat. at si id fiat, conuulsionem
sequuturū esse uerisimile est. ob hæc igitur omnia
debet uestigiū incidi, ac deinceps attenuari, id est
tenue effici. id quod efficitur cum & duritia eius
mollitur, & copia detrahitur. quæ utraq; olei & a-
quæ multa calidæ persufusione cōparantur, si post
eam ante deligationem oleo inungamus, quod ta-
men nulla astringendū ui præditum sit.

19 Bene autem hæc deligare nō est cuius-
libet. nam si quis deliget, sicut cætera circa
malleolos consueuere, ita ut modo circum
pedem, modo circū tendonem fasciam con-
uoluat: hæc constrictiones calcem separant,
cui contusio accidit.

Bene, id est *ἀγαθός*, pro pulchre quod *καλός* di-
citur, & autor hic & alij ueteres sæpenumero usur-
pant. deligandum esse circa calcem censem, sicut in
fracturis solet, eos reprehendens qui ita deligant,
sicut sæpe consueuimus, cum uel medicamenta a-
liqua, aut cataplasmata, aut insuccationes cōtineri
supra affectum locum uolumus. modus deligatio-
nis quæ damnat, talis est. initio fasciæ obliquo cir-
ca malleolum iniecto distributio in inferiorē par-
tem pedis sitante prominente tibię extremitate,
quæ talū uulgo appellat. atq; inde rursus sub pedis
uesti-

uestigium per transuersum traducta fascia, ac totū pedem usq; ad oppositā partē cōplexa ex inferioribus & anterioribus tali partibus sursum obliqua reducitur eum ipsū attingens, quemadmodum prius etiā quando deducebatur. atq; ita dum eadē distributione utimur, necesse est, ut in anteriore parte pedis defussatione facta sibi ipsi fascia concurrat ad X literā figurā. tum inde circū circa malleolum deuoluta ad eundem locū unde inceperat defertur. sicq; iterū iisdē his obductionibus, quas dixi, conuoluitur, quoad ad principiū reducat. ac tertio quoq; eodē modo distributa, ac malleolo circumducta inītiū repetit. nonnulli tamen ubi sub uestigium per transuersum inuoluerunt, non statim eam oblique ad malleolū sursum reducūt; sed prius orbiculari conuolutione ad primam partem plantæ, id est *περὶ τὴν*; quemadmodum aliq; ad malleolum orbiculariter circūducunt, ut oblique fasciationes à circularibus comprehendantur, quæ igitur hic fieri solent cōuolutiones fasciarū huiusmodi sunt. quæ antedictis affectionibus minime sunt accommodatæ: propterea q; neq; aliud quippiā ante fascias subiici, quod continere deligatio, debeat; neq; calx læsione uacat, ut in illis in quibus deligatio hæc admittitur: sed primus ipse, affectus est. quare hic deligationis modus calcem separat. id est in calcem ipsū sanguinē elidens, eum à deligatione excludit: cuius contrarium erat faciendum, ut scilicet deligatio è calce in uicina loca sanguinē exprimeret. id quod circumiectio linteorū sola ea facit, quæ fracturis accommodata est, ut superius didicimus: quā nūc quoq; utendū esse censeat.

20 Atq; ita periculū esse ne os calcis sideret.

Totam substantiā uniuscuiusq; partis corruptionem siderationem, id est *σφακελῶν* ueteres appellant: sed in partibus carnosis alijs quoq; nominibus eandem uocant. quā ipse etiā tum putridam carnem, tum marcidam, tum uitiatam dicit, alijsq; huiusmodi nominibus nuncupare consuevit. de ossē uero quod in tota substantia uitiat, siderationis seu sphaceli nomine uti solet. tale autē uitii ossibus cōtingit, quando adiacens caro prauas sanies producit, quibus ipsa madefaciēdo corrūpit.

21 Quod si sideretur, morbus is idoneus est, ut toto æuo duret.

Æuum totam hominis uitam hic dixisse perspicuum est. etq; sensus huiusmodi. Si calx forte sideratus ac uitiat, insanabilis morbus euadit, læsioq; ex ea re toto uitæ tempore perdurat.

22 Nam & alia quoq; sunt, quæ non hoc modo siderantur, sed in cubatione, ut cum nigrescit calx ex figurationis negligētia: aut ex uulnere periculoso & diuturno in tibia, aut femore quod cōmunicationē cum calce habeat: aut ex alio morbo, cum diutina resupinatio cōtingit, sed tamē his quoq; huiusmodi uitia longinqua & molesta eueniunt, & quæ sæpe rumpantur: nisi diligētī stū-

A dio, & multa cū quiete curentur. nam quæ hoc modo siderantur, præter aliā læsionē, pericula quoq; magna corpori afferunt.

Non modo inquit, ex antedictis affectionibus os calcis uitari consuevit: sed diuturnis quoq; cubationibus, quas resupinationes uocat. nam negligenter collocatus & iacens calx sæpè numero nigrescit. negligētē autem iacet, cum supra durum aliquid positus est, nec frequenter attollitur, sed semper à subiecta re & calefit, & compingitur. unde tollendus est, faciendaq; è lana molli rotula, quam strophium nonnulli uocant, quæ pro ratione magnitudinis calcis sinum in se habeat: supraq; eam firmandus ita calx est, ut inferior eius pars supēdatur: atq; ita & sine collisione maneat, & perspiret, & sine calefactione conseruetur.

23 Febres enim peracutæ eueniunt, contumax, tremulæ, singultuosæ, mentem attentantes, paucorumq; dierum, et perimentes.

In sideratione calcis hæc cōtingere inquit, non quia os ipsius corrumpatur: nihil enim ex superioribus simul cum hoc existit, cum ex sua quodq; ratione delineationem propriam habeat: sed quia quæ circū ipsū sunt corpora, ipsūq; tangunt, annexaq; ei sunt, cum ex uitio eius læsionē percipiunt, superioribus partibus eam participant. nam tendo qui cum calce cōnectis inflammatus musculos totos carnosæ posterioris partis tibiæ ex quibus oritur, cōtatione malī proculdubio afficit. hi autē affecti, in neruos statim qui in eos disperguntur, morbū diffundunt, necnon etiā in arterias. at cum arterijs cor, cum neruis cerebrum pati necesse est. quocirca cum cor innati caloris fons sit, cerebrum ratio cinandi uim per se habeat, per musculos uero uim mouendi partes, motionibus uoluntarijs appellatis: consentaneū est, ut ex corde affecto febris: ex cerebro deliria: ex musculis tremores & cōuulsiones: ex stomacho, qui plurimū neruorum est particeps, singultus oriantur.

24 Venarum item sanguifluarū liuores, nauseationes, gangrænæ ex compressione existunt, atq; hæc etiam absq; alia sideratione. hæc autem quæ uehementissimæ contusiones sunt, dictæ nunc sunt. sed pleraq; leniter cōtunduntur, neq; ullum multū medicationis studium requirūt, modo recte tractentur. ubi tamen magna contigisse illisio uidebitur, & antedicta faciendā sunt.

Sanguifluas uenas eas appellat, quæ magnæ sunt, quibus ruptis sanguinis eruptiones cōtingūt: id quod ex paruis euenire non consuevit. nam & paucus ex huiusmodi sanguis effundit, & cito ad oras ipsas diuisionis cōgelatur, no cumentūq; non affert. nauseationes autē ferè appellant in uenis quas superius exuocationes, hoc est fignillationes uocant: cū uenę more eorū qui nausæ patiunt, et ppte rea euomūt, sanguinē expuūt, ac quasi euomūt, tū ex propria imbecillitate quā ex inflammatione con-

traxerunt, tum ex ipsius sanguinis copia, & prauitate, quem in huiusmodi affectionibus corruptum manifestum est. gangrenas uero emortuorum uenarum torporem nominat, qui ex nimia inflammatione consequitur. atq; hæc omnia, inquit, ex praua deligatione eueniunt, quæ duo præcipua mala efficiunt. cum & separet calcem atq; excludat, ita ut nudus remaneat: & reliquas partes uehementer comprimat meditatione autem, hoc est *μελέτη* ipsum diligentem appellare manifestum est: cum apud Ionas usitatum hoc sit: & ipse etiã sæpe hoc nomen in hanc significationem accipiat.

25 Et deligatio adhibenda, quæ calcẽ plurimum circumuoluat, & modo ad summas partes pedis, modo ad medias, modo ad tibiam lintea circumdet, uicina quoq; omnia insuper & hinc et inde deliganda sunt, sicut superius etiã dictum est, nec uehemens compressio est facienda.

Deligationem approbat quæ contraria ei est, quam superius damnauit, pleriq; consuetæ: quæ fiebat, ut ex alijs pedis partibus sanguis ad calcem exprimeretur. debet enim e contrario e calce ad alias partes humorum affluẽtia elidĩ calce ipso deligato, sicut in fracturis prius faciendum docuit, plerisq; linteorum conuolutionibus ei circumiectis: ita tamẽ ne uehemens compressio efficiatur.

26 Multis tamen linteis utendum est.

Stabilitatem deligationis uel compressionis uel multitudine linteorum censere esse faciendam, dictum à me etiã superius est.

27 Melius autẽ est ut ueratri potionẽ, aut eodem die, aut postero exhibeamus: ac tertio post die soluamus, & rursus religemus.

Veratrum exhibet non solum ut excrementitios humores euacuet, uerũ etiã retrahendi atq; auerendi causa. album enim proculdubio dat qui uomitus ciẽt, ut prius ex toto corpore in superiorem uentrem attrahat, quàm in intestinorũ anfractibus deferatur. nam albũ esse id quod dandũ censet, ex his quæ subdit, innotescit. cum inquit, sed si febre quidem uacat, medicari eum superiori parte debemus, sicut dictũ est. at enim in ijs qui ita sunt affecti, sicut & euacuare superuacua, & in contrarias partes ab affectis locis humores auertere, q̃ maxime prodest: ita an id ueratro albo faciendum sit, non constat. quippe cum strangulare interdum soleat, cum in corpore multi & crassi, & lenti humores continentur. iccirco prius dissoluendi hi sunt attenuandũ uicũ, de quo integrum nostrum commentarium habes. exhibere enim ueratrum prius quàm uicũ corpus præpararis, periculosum est: cum in plerisq; qualibus humoribus abundet corpus, ignoretur. sed fortasse tunc ueratrum albũ exhibebat, ob uicũ, quo homines qui ab eo curabantur, uti consueuerant, non uoluptuosum, & mollẽ, sed & multis laboribus occupatũ, & cibis contentum paucissimis, ita ut crassitudo humorũ

A colligi minime posset: quam otia & repletiones procreare certum est. nam si robur quoq; quod ex eo uicũ comparabat, consideres, adhuc magis ueratri potionem tradere ei cõcedes: quippe cum eius tempestatis homines afflictationibus resistere ualerent, quæ ex uomitibus proueniunt.

28 An recrudescant nec ne notæ hæ sunt: cum sugillata uenarum, & nigrefacta, & uicina his subrubra & subdura efficiuntur, ne recrudescant periculum est.

Maligna uitia recrudescantia, id est *πάλιν ποτὶ* appellat. et recrudescere, quod est *πάλιν ποταίνειν*, quasi rursus crudum fieri, atq; in pristinam malignitatem quippiam redire, ac rebellare. notas te docet malignitatis propositorũ affectuũ, de quibus est sermo, quæ ortum inflammationis præ se ferunt, quante omnia cauendus est. cum igitur inflammatio omnis rubicundior, & durior cutẽ efficiat, neutrum horũ fieri in affectis locis debet: sed mollia esse, ac subuirdia sugillata oportet. uult enim ut sine inflammatione suppurent. quare, si mollires inest mēbris, & rubor abest, non esse inflammationem locum significat. si autẽ neq; ruborẽ, neq; nigritudinem habeat, non suppurare manifestum est. rubor enim inflammationẽ indicat, nigritudo materiam à natura neq; superari, neq; concoqui: sed sanguinẽ in coagulationẽ abiisse: quod ei etiã si extra corpus effusus fuerit, immoranti contingit. sed extra tamen, nunquã ampliũ suppurat: in corpore, si ualida fuerit natura in pus conuertitur: sin minus, eodem modo sicut extra: quinetiã magis, propterea quod locus in quo continetur, calidus est, putrefcere consueuit.

29 Sed si febre quidem uacat, medicari eũ e superiori parte debemus. sicuti dictũ est: quicunq; item continua febre non laborat, nam si cõtinua sit, medicandum non est: sed à cibis & sorbitionibus abstinendum: positioneq; utendum, aquæ, nō uini, sed mellæ.

Mos ei est, ut *φαρμακὸν*, id est medicari nō de omnis medicamento exhibitione intelligat: sed eorum tantummodo, quæ purgant. iussit nunc eodem die aut postero dari ueratrum prius q̃ uidelicet aut partes affectæ inflammari, aut homo febricitare incepisset: quin etiã si febris anteuertisset, modo leuiter afficeret, eodem modo exhibẽdum esse censuit. nos uero ne febre quidem uacuo dare ueratrum audemus. si febris autẽ uehementer infestet, ipse etiã non dat: sed exquisitissimo quoq; adeo uicũ egrotos nutriendos monet, ut eis neq; cibos, neq; sorbitiones ullas exhibeat: sed sola portione uti uelit, non uini illa quidẽ: id enim perspicuum est, etiã si ipse nihil de uino prohibẽdo scripserit: sed melle, quæ est aqua mulla acida, quæ *ἰσχυρὰ* dicitur, & aqua mulsæ. hos enim potus in tenuissimo uicũ adhibere consueuit: & tertium quoq; præter hos acetum mulsũ: quod ex melle & aceto cõficitur. at mella dulcissimorũ fauorum dilutum & decoctum est: quod etiamnũ in Græcia

cia fieri in hūc modum solet fauos expresso melle in ollam mundam aquæ plenam iniiciunt, ac macerant: deinde eatenus decoquunt, quoad satis ipsius visum fuerit, ut faui humorē omnem quem in se habēt, decoctura in aqua deponere potuerint: postea ita recondunt, ac seruati utunturq; ætate, ut potius sit sedante, aqua frigida adiecta. hac igitur mella utendum etiam Hippocrates iubet; & si ea non adest, aqua mulsæ. nam acetū mulsū adhibere, cum neruosa partes laborant, non expedit. quippe cum acetum neruos attendet, ut & experimento compertum est, & ipse etiam declarauit. in quibus autem usus acetī multī admittatur, in libro De uictu in acutis edocuit: quem librum nonnulli aduersus Gnidiās sententias, alij de pituita, neutri recte inscribunt.

30 Si autem futurum non est, ut recrudescant, sugillata & nigrefacta, & circumuicina subuiriā, & non dura apparent.

Iam hæc potestate fuerant significata illis uerbis superius cum dixit, cum sugillata uenarum, & nigrefacta, & uicina his subrubra & subdura efficiunt, ne recrudescant periculū est. subduris enim & subrubris opposita nūc subuiriā & non dura scribit. subuiriā enim sunt cum paulatim in pus conuertitur materia: non dura, cum non magna inflammatione afficiuntur. hæc siquidem etiam fuit causa ut interfus sanguis in pus conuerteretur.

31 Bonumq; hoc testimonium est in omnibus sugillatis quæ rebellatura nō sunt.

Bonum dixit eo significato quo certum, stabile, uerum, & perpetuum testimonium uero pro signo posuit, propterea q; testificatur, & opinionem nostram quam in præsentī hac scriptiōe nos docet Hippocrates, confirmat. inquit autem hoc certum esse signum nō solum in sugillatis circa calcem, uerum etiam in alijs quoq; omnibus: atq; id merito. non enim ex indicatione horum membrorum, sed ex ipsa sugillatione cognoscitur. periculum igitur non æquale sugillatorum malignitas affert: quippe cum ex membrorum natura in quibus sunt, uarietas quædam ipsorum existat. exoritur tamen non ex mēbris habent: sed ex eo quod sanguis interfus non suppurat. non suppurat autem sanguis, cum inflammatio magna superuenit, aut ex prauitate deligationis, aut ex humorū malignitate & multitudine: quam ipse quidē exinanitione per medicamenta: nos sanguinis missione emendamus: qua quidem uel sola cur contentus non sit, non uideo, cum & eam agnoscere, & talibus in affectionibus adhibere uideat. inquit enim in libro De articulis cum contusionis costis accidentes curat, præter alia quæ facienda censet, etiā hoc: Tum uena ad cubitum secanda est.

32 At quæcūq; cum duritia liuescunt, ne nigrescant, periculum est.

Sanguis in terram effusus aliquando diutius per manet, aliquando flauior euadit, aliquando in nigricantē conuertitur, quandoq; etiam niger prorsus

fit: quod ei contingere uerisimile est, cum ex aere ambiēte, qui uel serenus, uel caliginosus, uel humidus, uel siccus, uel calidus, uel frigidus cūsit, uarietates eas colorum efficit: tum ex singulorū hominum natura potissimū diuersitatis huius causa existit. quippe cum nonnullis sanguis magis melancholicus sit, alijs pituitosior & aquosior, quibusdam eiusmodi, ut flauæ & pallidæ bilis quā plurimum trahat. sic quoq; in animalium corporibus sanguis ē uenis effusus cum à natura non superatur, neq; in pus à continentibus eum partibus mutatur, in uarios abit colores. interdum enim eo tempore liuidus apparet: propterea q; liuidus color mediū est inter planē nigrū, & aliquem alium ex floridis, cuiusmodi est præcipue ruber & flauus. liuidus igitur hic color, uel ex floridis in nigrum abeuntibus exurgere cōsueuit, uel ex nigro in albū cedente. quando uidelicet in pus iam conuertitur. sepe numero enim uidere licet, quæ antea erant nigrefacta, inter initia puris liuida apparere, ac paulatim à nigro recedentia ad colorem ignis tendere, atq; effici subinde albiora: puris siquidē color cinereus est. nunc igitur Hippocrates differentiam quandam suggillatorum tibi tradit, cum liuida apparent. si enim cum duritie sint liuida, inflammata esse membra ostendunt: si absq; duritie liuorē præ se ferunt, inflammationē abesse declarant. cum itaq; inflammatione carent: & naturam esse præualidam, & sanguinē ē uenis effusum concocturam, & in pus conuersurā esse indicant.

cum uero inflammata sunt membra, ex eo infirmitatem naturæ arguit: quæ tum ex imbecillitate partium inflammatarum, tum ex copia prauī humoris, qui in eis continetur, sugillatū concoquere, atq; ad pus perducere non potest, ut nihil aliud supersit, quā ut nigrescant, & corrumpantur.

33 Danda uero opera est, ut paulo altius reliquo corpore plerūq; pes cōstituatur. qui profecto si quiescat, sexaginta dierū spatio conualescit.

Si humiliori figura pes collocetur, ē crure eo sanguis influens inflammationē faciet. si altior sit, influere in eum nihil poterit: atq; iccirco omnino altius constituendus est, non tamen multo. quippe cum ex tali situ, si diutius maneat, dolor, ex dolore uero inflammatio oritur. figura igitur quæ dolore uacet, terminus sublationis ac finis tibi erit. eam autem inuenies, si quādo paululum sublatus pes fuerit, eum æger intendere experiat.

DE TIBIA.

34 Iam uero tibia duo ossa sunt: quorum quidem partim multo tenuius alterum altero, partim non multo tenuius est.

Hæc uerba attestari ipsi uidentur, qui cubitū & brachium, tibiam et femur, non totum id quod ex ossibus, & reliquis partibus compositum est: sed ossa sola appellari ab Hippocrate asserunt: non tamen hanc tantummodo, sed illam quoq; esse horū nomīnum significationem uerba hæc declarant.

quare fieri potest, ut duplici modo huiusmodi omnia ab Hippocrate appellentur: quemadmodum illi opinati sunt: qui modo de ossibus solis, modo de ossibus & circūiectis omnibus sumenda esse hæc censent: ut tibia tota ea pars nominetur, quæ inter articulum qui ad genu est, & pedem protenditur. quam sanè duobus ossibus consistere, quorum alterum tibia, alterum sura nuncupetur, & crassius tibiā, tenuius suram esse: nec non mediam in toto hoc membro ac carne carentem partem quæ desuper seorsum in longitudinem porrecta in gracilioribus conspiciat, quam *ἀλκύνιστον*, id est anteriorem tibiæ partē uocant, tibiæ esse non suræ partē, & quæcūq; alia de ossibus his cognitu digna, explicata omnia in commentario nostro De ossibus sunt, quod ad eos qui institutuntur, conscripsimus.

35 Coniungunturq; inter se iuxta pedem & appendicem communem habent.

Verbum cōmune quod hic inquit, non ita intelligendum est, ut continuam esse appendicem, atq; unam prorsus significet: sed duas simul ita cōiunctas & connexas, ut unius speciē præ se ferant, ita enim inter se cōmuniōnē habent appendices, ut una esse uideatur. partes autem horum ossium postremæ, quæ nudæ eminent forma rotundæ, à nonnullis non recte tali appellantur. nam coherens tendo talum intus continet ita occultatum; ut & tactui & uisui lateat.

36 Neq; ex directo tibiæ coniunguntur.

Non coniunguntur duo hæc ossa tibiæ ex directo & per rectitudinem tibiæ: id est per longitudinem non non coherēt, neq; attingunt se mutuo ea parte, neq; inter se colligantur.

37 Iuxta femur uero coniunguntur, & appendicem habent, & appendix discriminationem.

Tibiæ caput in dearticulatione genu, quàm sura multo plenius est: unde appendix tota tibi esse tibiā uidebit. ab exteriori parte autē sura ipsi est subnixa. discriminationē uero habere inquit, prominentiam quæ in medio est. nerueam & chartilagineam, discriminationē appellans: quæ uidelicet colluctantia femoris tubercula quæ sese in tibiā inserūt, discriminat ac distinguit. hæc saepe in mortuis corporibus putrescit: ut decipiantur nonnulli, falsumq; ab Hippocrate de ea dictum fuisse existiment: sed in recentibus cadaueribus apparet.

38 Longius autem alterum os paulo est, quod est è regione parui digiti, ac natura quidem ossium tibiæ huiusmodi est.

Ita ego scribendum censuerim: longius autem alterum os paulo est è regione parui digiti. nam si ita scripsisset Hippocrates, cōfirmaret appendicē circa genu cōmunem utrorūq; ossium esse, et non tibiæ solius: simpliciter igitur longius os suræ, non in inferiore tantum parte existit.

39 At enim prolabantur iuxta pedem utraq; interdum ossa una cum appendice: in

Galen.

terdum appendix tantū dimouetur: interdum alterum tantum os.

Nonnulli medici luxari uel exarticulari, id est *ὑπερβαίνειν* de ossibus intelligendum putant, quæ è sede sua penitus excidunt: prolabi uero de ijs tantum, quæ subluxantur, quod *παρὰ τὴν ἄρθρον* dicunt: id est quæ non prorsus è naturali dearticulatione excedunt, & non aduertunt quid in principio libri De articulis dicat Hippocrates in hunc modum. Humeri autē articulum uno modo prolabi in alam uidelicet noui. totum enim brachij caput è sinu in quo dearticulatum est, excedit. neq; esse in eo minor luxatio potest. quemadmodum ipse Hippocrates scripsit, causa etiam adiuncta: quam cum ad eum librum peruentum fuerit, ibi discemus.

40 Hæc tamen molestiam minorem afferunt, quàm quæ in prima parte palmæ manus sunt, si homines quiescere patiuntur. curatio uero eadem quæ in illis est. nam ex exertione sicut illic repositio faciēda est. quam eo magis extendendum quo ualentius corpus hic subest. ut plurimū enim uiri duo satis sunt, quorū hinc unus, inde alter intendat: sin minus, uehementiorem adhibere extensionem facile est.

Non solum ijs quæ sunt in prima parte palmæ minorem molestiam hæc afferunt: uerumetiam ijs quæ sunt in pede molesta multo minus sunt. sed quia cōmunem de pede & de manu tractionem fecit, propterea satis habuit nunc alterius tantum membri facere mentionem, quod primo & tibiæ & pedi correspondet. quantum enim ab ijs quæ sunt in pede hæc deficient, & maxime ab ijs quæ in calce contingunt, quæ longe sunt molestiora: paulo superius ipse declarauit.

41 Vel enim rotæ modiolum uel aliquid aliud ei simile defodere: deinde molli aliqua re pedi circūiecta cum latis aliquibus bubulis loris circūligare oportet, quorum capitibus ad pistillum, aut aliud simile lignum deligatis, ligniq; eius extrema parte in modiolum iniecta retorquendum est. ab alijs contrā tum humeris apprehensis, tum poplite retrahendum.

Lignū quoddā defodiendū in terra censet, quod caput uectis possit admittere, quo membri tibi faciēda extēsiō est. scire autē te existimo modiolū rotæ qui *ροτίνης* dicit, ab Ionibus *ἰωνικόν* appellari. quo uis hic uocabulo Hippocrates, & apud Homerū q; inuenit. quia autē Hippocrates expedita ac prōpta esse uult, quæ utilia ad curationē sunt: circū hic modiolū meminit, qui in locis omnib; qui ab hominib; incolunt, suppetere facile nobis possit. eadē de causā pistillo ad extēdendū loco uectis utendū monet. q; pacto autē utēdū ipsis sit, ipse uerbis suis, q; se is animū aduertat, manifeste explicat.

42 Fieri item potest, ut superiori corporis parti necessitas adhibeatur.

Validas ac uehementes distentiones necessitates uocat, ut uiolentiam ipsarum significet.

43 Hoc sanè modo si uis lignū teres leuigatum alte defodere potes, atq; inde partē ligni super extantem inter crura ad interfemineū applicare: ut prohibeat quo minus corpus eos qui iuxta pedes extēdūt, sequat̃.

Erectum hoc lignum stabiliter in terra desigit, ut qui extēditur, sicut prædictum est, eo inter crura ad interfemineum offirmato extensionem minime sequatur. interfemineum autem, id est *ἡμικύβητος* ex corporis pars uocatur, quæ inter anum & initium pudendī membri interiacet.

44 Deinde ne ad crus quod extenditur declinet: aliquis à latere assidere debet, ac clunē retrudere, ne corpus circumagatur.

In plerisq; exemplaribus post superiorem orationem hæc scripta reperitur: cum tamen tota sententiā intelligi etiā absq; ipsa queat. uult enim ut in medio duorū crurū ligno eo erecto offirmato affectū cruris extendamus: retrudente aliquo sursum hominis clunem ea parte, ne corpus circumiacēt atq; in alteram partē propendens extendentibus cedat. quod cum sit, intentio omnis resoluitur.

45 Quin etiam ita ad alas utraq; hinc & inde ligna affigātur, brachiaq; ibi porrecta seruētur. tum aliquis iuxta genu apprehendat, atq; ita retro intendant.

Alium modum te docet, quo reliquum corpus partem quæ extenditur, non consequetur. sub utranq; alam desigi lignum uult, quod obstrictis ac renitēs corpori, facit, ne agrotus deorsum trahenti cedat, ac sequatur. oportet tamē ut hic quoq; aliquis crus quod extenditur iuxta genu reprehensum sursum intendant.

46 Hoc etiam modo idem facies: si iuxta genu, aut circa femur alijs habenis deligatis alterū rotæ modiolum supra caput defoderis, habenisq; alteri ligno innexis, eoq; in modiolum defixo contraria ijs qui iuxta pedes intendunt, reduceris.

Si dum crus sursum retrahitur, res non cedat: licet tibi ex habenarū circūdatione idem efficere: si capita earum in superioriē partem adducta ad uerticem aliquē deligaris. oportet enim caput uectis quod in terrā desigis, subiectā aliquā concauā moram habere, cuiusmodi est modiolus rotæ cui obiectus ea parte uectis in contrarium intentionem faciat. quod autē inquit contraria ijs qui &c. si scriptum fuisset in cōtraria - tam sensu quam uerbis plana esset oratio ac dilucida. quia uero cōtraria scriptum reperitur absq; præpositione, existimādum est, uel præmissam fuisse præpositionem à libra aliquo, uel ipsum Hippocratē hac uoce absq; præpositione fuisse usum, quasi eandē uim etiam

A sine ea habeat, uel loco aduerbiij cōtraria posuisse, perinde ac si contrarie dixisset.

47 Hac item alia ratione, si placet, uti potes. loco modiolorum ad trabeculæ medio crīs sub lectulo substratæ hinc & inde capitā ligna offirmabis, ac reduces, atq; ita habenas intendes.

Duo modiolī antea, duocq; uectes distentionem efficiebant: unus infra crus quod intendebatur alter supra caput. quoniam uero, ut dixi, uult nos præputitudinē, facilitatq; remediū cōparare: alterū modum cōmīscitur, quo te ad inuentionē similitudinem exerceat. nam si non affuerint modiolī: substrato ligno aliquo longo per longitudinē lecti in quo æger cubat, reliqua omnia, sicut superius docuit, faciendā tibi sunt. circumdandæ habenæ ab inferiore & superiori cruris parte, ac baculis deligandæ: tum uero loco modiolorū extremis ligni illius longi capitibus uteris: quibus ex utraq; lectuli partē à capite uidelicet, & à pedibus modiocriter prominentibus uectes obiectos reduces: atq; ita molitionē facies. trabeculā lecto substratū lignū per lōgitudinē uocat, ac si paruā trabē dixisset.

48 Adde quod si uis, asellos quoq; hinc inde constituere potes, atq; illis extensionē ipsam facere. Sed multi quoq; alij extensionum modi sunt.

Axis ipsos asinos appellare cōsuevit, quem admodum inferius cum dicit: asini circūactio: nūc igit̃ paruos axes asellos diminutiuā forma dixit, quæ etiā fuculas uocant: sicut modo superius par uam trabē trabeculam uocauit. te enim nō solum ad parabilia inuenienda, atq; utenda esse exercitatum uult: uerū etiā ad ea, quæ apud medicos ad huiusmodi distentiones præparata sunt instrumenta. axibus igit̃ hinc & inde cōstitutis, id em̃ hoc significat, id est infra pedes altero, altero supra caput, eisq; habenarū extremis partibus circūiectis, ex eorū circumductione cruris distentionē efficies.

49 Optimum tamen est, ut qui in ciuitate aliqua magna medetur, is præparatum lignum habeat, in quo tum omnium fracturarum, tum omnium articularū reponendorum necessitates omnes contineantur, quæ ex extēsiōe & molitione fiunt. satisq; erit, si tale lignum sit longitudine, latitudine, & crassitudine, cuiusmodi columnæ quadratæ quernæ fieri consueuerunt.

Instrumenti cuiusdam & machinamenti quod uult medicum habere, mentionē facit. de quo, ubi fabricam eius docet in libro De articulis qui hunc sequitur, explanationem etiam nos faciemus. nūc ad reliqua quæ sequuntur, descendendum est.

50 Vbi igitur satis extenderis.

Posteaquam satis extenderis, crus uidelicet: de luxationibus enim tibiæ circa talum loqui instituerat: cumq; hucusque de distentione docuerit,

rursum ad id quod proposuerat, redit.

51 Articulum reponere facile iam est.

Ex huiusmodi eius loquutionibus inducti nonnulli articulum uocare eum dicunt capita ossium, quæ in sinus dearticulantur: ut totum id quod ex duobus constat, quæ ossium capita, quæ in porrectionibus & inflexionibus mouentur, inter se cōnectuntur, dearticulationem: ipsorum uero utrorūq; ossium extremitum alterius quod sese inserit, articulum: alterius finem qui inseritur excipit, acerbulum, & pupillam ab eodem appellari asserat. Sed hæc nominum ratio exploditur.

52 Quippe cum supra pristinam sedem è directo suspendatur, dirigere igitur & componere manuum palmis, hinc supra id quod excidit, innitendo, inde infra malleolum renitendo, decet, posteaquam reposueris, extensum ita si fieri potest, deligandum est. sin habenæ impediunt, illis solutis, quoad deligaris, distendendum est.

Comunem iam hic uniuersæ repositionis methodum ac uiam tradit: quemadmodum à principio in primo horum cōmentariorum libro nos etiam diximus, ubi de utilitate extensionis agebamus: fieri non posse asserentes, ut apte ossa reponerentur in sedem suam, nisi suspensa à se mutuo fuissent. simul etiā terminū docet, quousq; extendendū sit. cū enim satis iam esse tibi uisum fuerit, ut si spēs esse à se mutuo possint, ab extēsiōe desistes.

53 Deligare autē eodem modo debes initia similiter supra id quod excidit iniiciens, do, conuolutionesq; primas eodem in loco quamplurimas faciendo, ac plagulas plurimas ibidem imponendo, necnon eadem in parte maxime comprimendo.

Deligationis fracturarum quam superius ostendimus, capita hic summatis cōmemorat. sciendū autem est, luxationes quæ in manu, & pede, & calcē, necnon circa malleolos cōtingūt, esse deligandas modo deligationis quæ fracturis adhibetur. unde etiam hoc in libro omnia hæc cōtinentur. causam uero, cur siue fractura, siue luxatio euenierit, eadē deligatione utendū sit, superius didicimus.

54 Insuper autem hinc & inde satis multum deligandum est.

Hoc, in libro De ijs quæ in medicatrīna sūt, ita dixit. at deligatio multam sanī loci partē occupet. cuius causa antea explicata est. melius quippe est, ut affecti loci humores, non modo in adiacentes partes exprimantur: uerum etiam in multum spatium amandentur, longiusq; arceantur.

55 Magisq; hic articulus in prima deligatione est cōprimendus, q̄ qui in manu est.

Pro articulorum magnitudine & cōpressionis modum & linteorum copiam adhibet, & nervositate eorum, & sensus habita ratione. minus enim tales comprimendos ac collidendos esse censet.

Galen.

A 56 Vbi autem deligaris, superius quidem quam reliquū corpus haberi deligata pars debet. situs tamē is seruandus, ut pes quam minimum suspendatur.

Paulo quidem sublimiorem pedem relinquo crure esse debere, tantumq; esse attollendum, ut musculi distentione non afficiant: prius dictū etiā est. nunc de positionis stabilitate preceptū subiumgit. iubetq; ut ne parū quidem pes suspendatur, ac pendeat. id autē fiet, si lanæ molles undequaq; ipsi apponantur: ima q; eius pars ubi est uestigiū, molli aliqua re firmetur, aut puluino, aut ligno etiam recto, cui mollibus mitellis pes alligatus fuerit.

57 At corporis attenuatio talis qualē uim prolapsio habuerit. alia siquidem parū, alia multum prolabuntur.

Perpicuum est, sicut ea quæ parū prolapsa sunt, diligentia minore indigere, ita quæ amplius excelsere; & uictum, & reliqua omnia exactiora requirere, quibus corpus attenuatur.

58 Omnino uero & magis & diutius in uulneribus crurum, q̄ brachiorū attenuandum est. maiora enim hæc & crassiora illis sunt. quinetiam necesse est, ut quiescat corpus & iaceat. religare uero articulum tertio post dieneq; quod prohibeat, neq; qd urgeat, quicq; est. reliqua omnia simili modo ut in præteritis curanda sunt. Et si quiete curauerit, quadraginta dies satis sunt: si tantū in suā sedē ossa rursus descenderint. at si quiescere noluerit; & crure nō facile utē, & deligationē in multū tēpus cogetur adhibere.

Ipse causam præcepti huius sui subiunxit, cum dixit: maiora em hæc & crassiora illis sunt. & præterea tertium est, quod hic iacendo, non ut in manuum lationibus, deambulando homo sanescit, atq; hæc de omnibus articulis dicta nobis in uniuersum esse existimamus.

59 Quæcunq; autem ossa non perfecte in sedem suā desideret, sed aliqua ex parte deficiunt: tēporis processu attenuatur coxa, & femur, & tibia, & si intro, plapsa sint, exterior pars: si extra, interior attenuari cōsueuit.

Si aliquid ex sanis etiā membris aut in diuturna quiete detineas, aut raro moueas, tenuius q̄ prius erat, efficitur. motio siquidem corpora calefacit, & uires eorū corroborat, ita ut partes eorum nutriantur, ac pinguescant. cum igitur aliquid prolapsum non recte fuerit repositū, prius motiones efficiuntur, atq; id magis in opposita parte. propterea q̄ locus dimoto osse in contrarium inanis relinquitur: ut facilius in ea parte firmetur membrū, in quā articulus excelsit: nam cum superiores partes sede ac stabilimento indigeant, id inania loca non exhibent, sed plena: quippe cum nihil firmari supra inanē locum possit. propterea igitur, & crus

tom. 6

P 2 in

in eam partem proferre in quam os excidit, muscu-
lisq; qui ea parte sunt tantummodo operari con-
suevit. Nam musculi illi bene: reliqui ex opposita
parte qui ociosi sunt, male aluntur.

60 Pleraq; aut in interiorē partē prolabu-
tur. Sed cū utraq; ossa tibiæ sine ulceratio-
ne fracta sunt, ualidiore extensionem requi-
runt. ac si magnæ alternationes fuerint talis
quibus ex his antedictis modis extēdendū
est. uerumtamen satis etiā sunt quæ à uiris
fiunt extensiones. plerunq; enim sufficit, si
duo ualētes uiri alter hinc, alter inde disten-
dant. intendere aut oportet in rectū secūdu
naturalē habitū, & è directo tibiæ & femo-
ris, siue tibijs siue femoris fracti ossa intēdas.

Inferiores iuxta malleolos luxationes magis in-
tero prolabantur. causa est, quod supra processus ex-
trinsecus talum exquisitius cōplectitur, quā ti-
biæ intrinsecus.

61 Atq; utrū ex ipsis deliges, ita deligan-
dum est, ut exporrecta utraq; maneāt, non
enim eadem & cruri & brachio conferunt.
nam cubiti & brachij ossa fracta ubi fuerūt
deligata, appenduntur, siq; ea exporrecta
deligaris in conflexione cubiti carniū fi-
gurationes diuersificantur: quippe cum fle-
xura cubiti multo tempore extēta esse non
possit. nō enim sæpe in eo, sed in inflexione
assueuit. quinetiam cum deambulare homi-
nes possint, ubi brachium fregerunt: infle-
ctere id ad cubitū cupiunt. at crus & in am-
bulando & in stando cū modo extendi, mo-
do ferē extēdi in inferiorem partem natura-
liter, nec nō gestare reliquum corpus cōsue-
uerit: iccirco cū necesse ei est, facile extētu
permanet. adde q; in cubilibus quoq; sepe
numero in figura hac iacet. quapropter cū
uulneratum id est, est necesse ut animus suc-
cumbat: cū impotentes homines, ut attolli
nequeāt, reddātur: ita ut neq; inflecti, neq;
surgere in mentem eis ueniat: sed in ea figu-
ratione quiete iaceant.

Siue tibiā, siue femur deliges, ita te deligare
uult, ut uterq; articulus tam coxæ, quā genu ex-
tentus sit. causā cur id fieri debeat, ipse demon-
stratione usus subiūgit, cuius intellectu facilis sen-
tētia est. Summa hæc est: quia crus & stando & am-
bulando extensioni est assuetū: cum enim ad am-
bulandum corpus natura constituerit, figuram ad
id accōmodatam ei preparauit: iccirco etiam cum
cubant homines, extētum id plerunq; est. bra-
chia uero & in ambulando, & alioq; ut plurimū
mediocriter inflexa continere consueuimus. nul-
lus enim est qui extētis ac porrectis brachijs de-

ambulet. quocirca sit, ut etiam si quis brachiū de-
ligatum habeat, subiecta cubito mitella deambu-
lare adhuc nihilominus possit. at ubi crus fractum
est: ut prius quā prorsus occalluerit, ingrediat,
fieri ullo modo nequit.

62 Ob hos igitur prætextus neq; in exten-
sione, neq; in deligatione brachio & cruri
figura eadem cōfert. si igitur extētio quæ
à uiris sit, satis fuerit: nihil amplius frustra la-
borandum est. machinas enim afferre cum
non est opus, absurda affectatio est. at si nō
sint satis uiri, aliquid ex necessarijs & uiolē-
tis adhibendū est, quod accōmodatum
sit. cum autem satis extētu fuerit, ossa iam
componere, atq; ad naturalem statum redu-
cere manuū palmis dirigendo, ac coaptan-
do facile est. quod ubi feceris, deligare line-
teis extētum debes, siue in dextram siue in
sinistram circumducere prima lineā cōues-
niat. initia tamen supra fracturā inijciantur,
primæq; inuolutiones circa ipsam ducant.
deinde in superiorem partē tibiæ, quemad-
modū in alijs fracturis dictū est, distributio
efficiatur. lineæ uero latiora & longiora &
plura multo esse in crure, q; in brachio de-
bent. ubi deligatū fuerit, supra planū aliqd
& molle deponendū est: ne uel hac uel illac
distortū, aut gibbū, aut repandū efficiatur.

Manifestissimas causas & uerissimas prætextus
uocauit: cum tamen in usu sit, ut falsa causa præ-
textus appellentur. paulo item inferius rursus uer-
bo hoc ita utitur, ubi inquit. ob hos igitur prætex-
tus extētiore osse fracto celeres ingressiones sūt.
de sura enim loquens ueram causam attulit, cur si
ea fracta sit, uelox motio cruris efficiatur: si tibiā
fracta fuerit, non nisi post multum tempus ea uti
possint, qui id patiantur.

63 Maximeq; conducit, ut puluinus aut
lineus, aut laneus, non durus, sed latus in
medio per longitudinem, aut aliquid aliud
huic simile subiiciatur.

Tibiā hoc modo quo inquit, puluino magis
quā canali collocandam ac firmendam esse cen-
set. deincepsq; cur eos damnet qui canaliutantur,
in hunc modum subiūgit.

64 De canalibus enim qui in crura fracta
subiiciuntur, subiiciēdi nec ne sint, quid cō-
sulam dubito. nam iuuant quidem, non ta-
men tantum: ut illi qui eos supponunt, exis-
timant. non enim ut putant, immotum iac-
cere crus cogunt. neq; dum hac uel illac uer-
satur reliquū corpus, efficit canalis ne crus
sequatur, nisi ipse homo diligentiam adhi-
beat

beat. neq; rursus uetat, quo minus crus uel hac uel illac absq; reliquo corpore moueat. adde q; immite esse uidetur lignum subster nere, nisi simul molle aliquid in ipsum ini ciatur. in lecto uero transmutando, abeun doq; ad uentrē exonerandū utilissimū est. licet igitur cum canali & sine canali & pul chre & turpiter rem conficere. probabilius tamē apud populares est, medicusq; minus esse erraturus creditur, si canalīs subijciatur. licet id minus ex arte sit. debet em̄ in plano et molli hic poni prorsus in directū: propte rea q; alioq; necesse est, ut deligatio a distor tiōe quæ ex situ euenit, quocūq; & quantū cunq; uergat, superetur. respondeat item is qui deligatus est eadē quæ prius dicta sunt. nā deligatio eiusmodi esse debet, & tumor ita in extremis exurgere, laxationes quoq; eodē modo, & relaxationes tertio post die faciendæ. necnon tenuiorē inueniri deliga tā partē oportet: deligationesq; plures, plu ribusq; linteis fieri. circūdariq; etiā pes laxē debet, nisi fractio ualde iuxta genu sit. Sed & extendendū mediocriter est: & in una quaq; deligatione coaptāda ossa sunt. nā si recte curetur, & tumor p̄ ratione succedat: tū deligatus locus tenuior, & gracilior, tū ossa repositu faciliora, extensioniq; obrēpe rantiora reperiētur. ubi septimus aut unde cimus dies aduenerit, ferulæ, sicut in alijs quoq; fracturis dictū est, circūdandæ sunt.

Nunc quoq; scio medicos quosdā esse, qui cum femur alia affecta est, cruri canales, & capsu las supponere cōsueuerunt: toti quidē cruri, cum femur patitur: cum tibia affecta est, alijs totum crus simili modo, alijs tibiam solam in capsulam conij cientes. qui una cū tibia femur etiā cōprehēdunt, membro quidem lationē etiam ipsi afferunt: sed minus tamē quā alij lædunt. no documenta ab Hip pocrate manifeste declarata sunt: ut repetenda à me non amplius esse uideantur, sed si quid hac in oratione obscurū fore existimo, id tantummodo mihi explicandū censeo: ac primū illud, quid cap sula à canali differat. *γλωσσόκομον*, id est capsula artici appellant instrumentum quoddam scrinij in modum, in quod multa ex utilibus conijciunt ho mines, multasq; secretiores literas recōdunt: quo item in itineribus uti nonnulli consueuerunt. siue autem *γλωσσόκομον*, siue *γλωσσόκομίον* quispiam di cat: siue etiam per duo r̄ scribatur, siue per duo r̄: nihil refert. capsulam uero quæ cruribus subijciē, oblongiorē esse oportere & angustiorē ceteris consuetis perspicuū est. quippe cum ea quā lani tudo cruris sit, uel crassitudo, uel quouis nomīne

Galen.

aliquis appellet, latior multo esse non debeat: ut interiectis utrinq; lanis crus ita astringat, ut neq; si uel iteger crus desistere, id angustia permittat. tamenī deflexionē eius in dextrā aut sinistrā par tem prohibere lanarum iniectio potest: quin sur sum uero & deorsum moueatur, nō potest. Vnde etiā Hippocrati huiusmodi ligni usus non placet. præsertim cum etiā immode sit, id est iniucundum ac molestū, eo quod non cedit, ut puluini qui sub ceruicales, & subcubitales appellantur: qui cum subijciuntur, mediocriter cedentes cruri molestiā nullā afferunt. machinamentū tamen huiusmodi utile est cum egri uel aluū exonerare, uel ex altero lecto in alterū traduci uoluerint, quo cōmodius ac mollius cubent. ob hoc em̄ præcipue usum eius admittimus. quanq; loco ipsius huius ligni pului no nonnulli uti consueuerunt. nam statim a prin cipio per transuersum mitellas puluino subiectas, ubi crus imposuerint, utrinq; ad cruris altitudinē complicant atq; astringunt: tum eas in superiore membri parte inter se colligantes stabilem ita cru ris depositionē esse existimant. nam puluinus in agrotantis transmutationibus loco capsulæ cruri subtingitur. accedit q; in inferiore parte cruris ex tremā lignū aliqui erectū adiungunt, quo summū pedē propellunt, subiectis tamē prius lanis. atq; id ea causa faciunt, ut neq; crus trahat sursum, neq; deorsum ferat. quippe cum sursum tolli uinculū: deorsum ferri applicatū plantæ lignū prohibear. sed enim licet hæc ad tutelam præparata à medicis sint, per ea tamē non fit, ut motio articulorum im pediat: cum æger et malleoli, & genu articulū hac illac mouere paululū queat. nam de coxæ articulo ne dicendū quidē quicq; est: cum neq; à capsula, neq; à canali prorsus cōtineat. Canalis igit cū cæ tera cum capsula habeat cōmunia, in forma tantū differt, teres enim extrinsecus est, concavus intrin secus instar canaliū imbricū in tegulis, unde etiā nomen ipsi est. is autē ad præsentē usum apud q; capsula propterea uidet quia totū circūcirca crus cōprehendit. in capsula enim loca quedam inania post iniectionē cruris relinquunt. Vnde nōnulli medici sunt, qui plures canales habeant præpara tos, ut in singulis eo utant, qui unicuiq; cruri fue rit accommodatus. dantq; operā ut lignum eiusmodi reperiatur, ex quo excauato eos ualidos simul & albos, & molles efficiant. quidā etiā apud nos medicos cōplures huiusmodi canales ē tibia cōfe ctos habebat: eisq; subinde pro magnitudine uni uscuiusq; cruris utebatur, nō absq; uinculis. id qd à quibuldā in puluinis fieri dixi, sed in illis uincula laxiora esse cōtineat usum ipsorum corrumpunt. hic absq; ulla cōpressionē ob mollitudinē ligni in traducen do agro crus continent. uerum tamē à recentiori bus medicis ad firmiter cōtinendum utrumlibet os fuerit affectum, siue femoris, siue tibie, capsula machinaria insuper est adinuenta: quæ & fabricā & usum in modum quem subscribat habet, quæ sa ne non ab re mihi uidet fuisse excogitata ad callū siue femoris, siue tibie obducendū. adiacet enim in extrema eius parte axis, in quē laqueorum quī

tom. 6

P 3 disten-

distendunt membrum, capita reducta circumjiciuntur: qui quidem laquei extremis partibus ossium eius qui curatur circumdati fuerint. hi autem ex duobus aduersariis quæ perpetuis loris constant, quæ *si ueritas* nuncupant: ita ut quatuor uniuscuiusque laquei crura euadant, duo à dextra parte, à sinistra ite duo. hæc enim crura laquei inferioris per foramina quædā in extremo capite capsulæ facta sunt, traiciunt, atque ad axem perducunt. superioris uero laquei crura prius in superiorem capsulæ partem, reducta etiā ipsa simili modo per foramina à lateribus capsulæ traiciuntur. foramina autem hæc cochleas habent. postea utrinque extrinsecus capita hæc laqueorum ad axem reducunt. his enim ita apparatis una axis circūductio utrosque simul laqueos, deorsum eum qui in inferiore fracti ossis parte circumligatus est: sursum alterum intēdit. ita ut post depositionem etiā tibi per singulos dies laqueorum diffinitionē corrigere, siue intēdere, siue laxare eā uolueris, liceat. nam axis laquei qui inferiore parte membri est, recta intentione trahit eum qui supra est, non recta, sed ea quæ trāsumptiua appellat.

65 Adhibita tamē cura ne earum inflexiones è directo malleolorū, & supra tendonē pedis qui in tibia est, fiant. ossa autē tibię, si recte curētur, quadraginta diebus corroborantur. quod si suspiceris os aliquod directione adhuc indigere, aut ulcerationem aliquā timeas: infra hoc tempus resoluentū tibi est: atque ubi cōposueris, religandū. Si uero alterum os fractū sit, intentione quidē imbecilliore est opus: non tamē in extendendo deficiendū, aut ignaue agendū est. ac maxime quidē in prima deligatione semper fracturæ omnes, quatenus cōuenit, extendendæ sunt. sin minus id potest, saltē quamcūq; similes. quodcūque enim os non recte cōpositū deligatione fuerit cōpressum: dolore locū eū uexat. reliqua curatio eadē est. at os interiorius quod tibia uocatur, molestius in curatione est: maioreque intētionē requirit. et nisi fracta recte cōposita fuerint, occultari uitium non potest. apertū enim & carnis expers totū est: atque eo fracto in crus insistere multo tardius queunt. cū os autem exterius fractum est, multo & facilius & occultius ferūt, etiā si non bene admodū fuerit repositū. quippe cum & carne opertū sit, & cito in pedes qui id patiuntur, insistant. interius enim tibię os maiore oneris partē uehit. nā tū crus ipsum & pondus reliquū è directo cruris impendens facit, ut interius os maiorem laborem subeat. femoris enim caput superiorem corporis partē sustinet, idque in interiore parte cru-

ris, non exteriorē est, sed ex tibię anterioris partis processione. tū reliqua corporis dimidia pars huic magis processione appropinquat quæ exteriori. adde quod quod est intrinsecus, crassius est quæ quod extrinsecus, quæ admodum etiā quod in cubito est, ex processione parui digiti tenuius est ac longius.

Prominentes ossium partes cuiusmodi sunt tibię & suræ inferiora capita impositiones ferularū non tolerant. quod cauendū esse nunc inquit inflexiones autem dicit, perinde ac si inflexiones ac sedes dixisset: sed in præpositione adiuncta se euidētius id quod uolebat, significaturū existimauit. hæc igitur ossa, quia & extant, & nuda carnis sunt, à ferularū insidentia colliduntur. imò non ossa collidi dicendum est, sed musculos, & quasdam nervosas partes, & cutē, quæ super ipsa ossa sunt. cum enim inter duo corpora dura intercludantur, ferulas uidelicet extrinsecus, os intrinsecus colliduntur, & contunduntur: ac sæpe ita ægre afficiuntur, ut exulcerentur. in calcē uero ex posterioribus partibus in anteriorē tendo innecitur à musculo qui in carnosa posteriore parte tibię est, exortus: qui cum nudus admodū sit, & præcipue supra carnis expertia corpora, imposita ferula non ferit sed sensu maxime præditus cū sit, ex collisione inflammat. corpora ite malleolorū ossibus superiecta obduritiem eorū quæ ipsa utrinque confringunt, ut dictum est, collisa, adeo afficiuntur, ut elisiones patiantur. ita enim uocat Hippocrates quæ in summa cute exulcerationes ex cōprehensione existunt.

66 In articulo tamē inferiori longioris ossis subiectio similis non est, quippe cum cubiti gibbus et poples dissimili modo inflectant. ob hos igitur prætextus exteriorē osse fracto celeres: interiorē tardæ ingressiones sunt. Cum superius os suræ longius esse quemadmodum & cubiti, atque utrinque e regione parui digiti sitū, tenuiusque altero sibi annexo esse dixerit: quia inter se differat deinceps subiungit. dictumque perspicue à nobis quoque est in cōmentario De ossibus, cum de alijs, tum de dearticulationis huius differentia. ac radium quidē exteriori brachij tuberculo innexum circa ipsum moueri: & tam in exteriorē partē, quam interiorē uerti. in crure uero cum tibia sola femori articulo iungat, suræ motum nullū esse. non enim hinc & inde uersari articulum hunc, sicuti in cubito, posse: sed inflecti tantūmodo: & neque hoc quidē simili modo ut in cubito. illic enim cardinamentū brachij in sedē cubiti inferitur. in genu uero duo femoris tubercula duplices tibię sinus ingreditur. illic in brachiū duas cubitus cornices infigit, alterā à posteriore parte cū perfecte extēdit: ab anteriorē cū inflectit, alteram. at in femore nihil horū sit: quippe cū nullos huiusmodi uertices, ac cornices tibia habeat. cubiti igitur gibbus & poples dissimili modo inflectuntur. ipse superius cū de cubito ageret, ita dixit. sed

cum illo osse idem est *ἄγκυον* qui uocatur, id est cubiti gibbus, in quē innitimur. manifeste declarans acutissimam cubiti partem se cubiti gibbum appellare, quem *ἀγκυραν*, id est ulnæ uerticē, & cubitum etiam uocant. nunc uero dissimili modo inquit cubiti gibbus & poplitem flecti, perinde ac si ita diceret. dissimili modo articulum circa cubiti gibbum inflecti, ac poplitem. accedit quod ipse etiam inferius ait: quæ circa cubiti gibbum contingunt, molestiora sunt: cum de luxationibus loquatur. illud igitur memoria tenendum: proprietatem nominum apud nullum ex antiquis Græcis exquirite seruari; sed alias ppric, alias per translationem apud eos usurpari uocabula consueuisse. sic etiam poplitis nomen huiusmodi est, sicuti & alæ. alæ enim locum qui sub humero est: poples oppositam genu partem posteriorem, significat, nam & genu ipsam totam iuncturæ huius partem indicat. siue enim in cute loci huius ulcus oriatur, autem, hominem in genu habere ulcus dicimus: siue neruus qui cuti sub tenditur diuisus fuerit, in genu uulnus esse aiunt. non secus si patella ipsa patitur quæ *μύλλω*, id est molam & *ἐπιγονάτιδα*, hoc est supergenualem etiam uocant. quin etiam latera ipsa explicant nonnulli modo intra genu: modo extra genu esse ulcus affirmant. totum enim in latitudine loci hunc genu appellant. quemadmodum poplitem, & alam, & humerum. sic quoque cubiti gibbū, malleolos, primā partem palmæ totum locum Hippocrates uocat. sæpe etiā humeri, gibbi cubiti, genu, poplitis, malleolorū articulum appellare consuevit. patet ita quæ uarie nominibus utatur, quæadmodū etiā facere reliquos ueteres dixi, neque ista ista à posterioribus obseruata circa hæc mēta loquendi curiositate: quam qui exercent, appellare exquisitam diligentiam consueuerunt.

DE FEMORE.

67 At uero si femoris os fractum sit, extensio diligenter in primis facienda est: ne minus quam debeat, efficiatur. amplior enim sit, nullam læsionem affert. neque enim si ossa distātia ex uī intētionis deligari quispīam, detineri ita à deligatione possunt, ut distent. sed ubi primum dimisere qui intendunt, inter se coeunt.

Quoniam maximī musculi sunt circa femur, merito cauendum censet, ne extendendo membrum in aliquo deficiamus. id quod sæpenumero fit. nam licet amplius quam conueniat, intendamus, læsionem inde nullam esse euenturā inquit. quod enim alijs in mēbris suspicari posset aliquis, hic concedit. quid autē id est ut os fractum, etiam si distent inter se partes separate, deligetur. uidebatur enim e contrario fieri debere, eas uidelicet inter se prorsus coniungi: ne inani loco in medio relicto, in quo sanies colligeretur, os in fiderationis discrimen ueniret. sed hic, etiam si distātes ossis fracti partes deligentur distentione ampliore facta, post deligationem tamen non ita perma-

nent, sicut in alijs membris, in quibus fasciarum in iectio musculis immotos seruat. in femore enim ob musculorum magnitudinem timendum id minime esse inquit. propterea quod eam uim non habet deligatio, ut cohibere ipsos ualeat, sed ab ipsis superatur. nam cum deligationi propositum sit, ut in eo habitus seruet femur, in quo erat cū deligabatur: musculi uero, ut ad suū caput recurrāt: si deligatio preualuerit, naturalemque musculorum motum uicerit, fiet ut fracti ossis partes deficiant: sin autem musculorum motio deligatione fortior fuerit, musculi ipsi ad principium suum retrahentur: atque ita simul partes ossis fracti contrahentur, atque inter se committent.

68 Crassæ enim & ualidæ carnes hic cum sint, deligationem superant, non ab ea superantur. quod igitur dicebamus, bene distendendum est, & intortuose, nihilque deficiendum, magnum enim dedecus est, & nocuum, si breuius femur reddatur. nam brachiū si breuius euadat, & occultari potest, & nō magnum damnum affert, at cruris breuius effectum claudum hominem facit, propterea quod alterū quod sanum est, redarguit, ut utilius sit, si quis prauè est curādus, ut utroque crure potius quā altero tantum patiat. quippe cum æqualis sibi ipsi ita euasurus sit, ubi tamen satis extenderis, palmis manuum cōponere ossa diligenter debes, ac deligare eodem modo, sicut superius scriptum est: initiaque iniicere, & in superiore partem fasciam deducere, ut diximus. & æger eadē respondeat quemadmodū etiam supra: & laboret, & melius se habeat, & religetur simili modo, ferularum quoque appositio eadem esse debet. femur autem quadraginta diebus corroboratur.

Quos nos musculos modo diximus, eos hic carnes Hippocrates uocat, uulgari usus appellatio: propterea quod caro omnis sensu prædita musculi pars est, quæ in medio præcipue eorum reperitur. nam in extremis partibus neruosi magis musculi apparent, quàm carnosī.

69 Insuper intelligendum illud est: femur in exteriorē partem magis quàm interiorē: magis item in anteriorem, quàm posteriorem obstipum esse: ac propterea in has quoque partes, si recte non curetur, distorqueri solere: cumque ipsæ in partibus carne magis careat, occultari in distortionē nō posse. quocirca si tale quippiam suspiceris, machinari ea debes quæ in brachio distortionē faciendi consulimus.

Obstipū hic, id est *ῥυτισμῶ* obtortū ac curuum

significare ex ipsa re perspicuū est. femur enim rectum non planē est, sed in exteriorē & anteriorē partē magis incuruatur: ut in cōtrarium cavius euadat. siue autē *γανσός* dīcendū sit cum acuto accentu, an *γανσος*, cum circumflexo, in dubio est. cum non admodum in usu apud grēcos huiusmodi uox sit, sed ex analogia tamen nōnulli circumflectendū hoc nomen censent, nō secus ac *λευσος*, *μαυσος*, *γανσος*. quorum nominū primum febrem ardentem, alterum debilem & fatuum, ultimum superbū significat. alij cōtrā acuto accentu scribi debere asserunt eo argumento, q̄ omnia quæ morbos et affectus huiusmodi significant bisyllaba nomina acuto accentu pronuncientur. ut *χλωδός*, *τορδός*, *σπερδός*, *κυρδός*, *βλαυσός*, *φαιβός*, id est claudus, repandus, tortus, incuruus, ualvus, uarus. neque tantum bisyllaba, uerum etiā ferē omnia reliqua, quæ sunt affectuum huiusmodi significatiua, ut est *ἀρθριτικός*, *πλευριτικός*, *πυρετικός*, hoc est articularis, lateralis, iecinorarius. utro igitur modo quispiam proferre uelit, concedito: siue circumflexo accentu utatur, siue acuto: in quod tamen propendere eos tantum deprehendi qui librum hunc legunt, sicut igitur quisque uoluerit, etiā tum pronuncies, negligētis & accētibus & nominibus his, utpote quæ ad philosophiā nihil cōferant: ac multo minus ad geometriā, aut arithmetiā, aut musicā, aut astronomiā. q̄ si nulla ars ad finem suum cōsequendū miserorum ac perditorū horum uerborum minuta ista curiositate indiget, hoc hominum studiū non modo admittendū non est, uerum etiā quammaxime deridendū.

70 Circumijcienda autē pauca linteā sunt & circa coxam & ilia. ut & inguina, & articulus qui in eo loco est, qui dicitur gressura insuper deligetur. nam & alioqui confert, & ob id quoq̄, ne extremæ ferularum partes si supra indeligata applicentur, lædant.

Os quod femoris caput excipit, *ἰχίον*, id est coxa appellatur: quemadmodū concuias eius acetabulū dicitur. utrisq̄ his nominibus poeta eo loco utitur, cū inquit: Qua coxæ femur innexū est, acetabulū at ipsum Appellant. ilia autē, id est *ἰχίον*, iliorum ossa nōnulli interpretant: alij superiore partē, quæ propriē a laxitate *λαπαγία*, hoc est cassum uocatur. cuius nominis apud Homerum sit mentio eo uersu, perq̄ ilia uulnus adegit. sed ego sicut *λαπαγίω* & ex experientia, & ex usu tum Hippocratis & Homeri, tum ipsius morbi partē eā esse affirmare possum, quæ inter thoracis, & iliorū ossa subsidit: dicitur autem de ea suo loco: ita de hoc uerbo *ἰχίον* quid asseram dubito. nam cum singulari numero Homerus eo usus ita inquit: Illic circumdat zonā centum orbibus aptam, eam corporis partē esse ille existimaret quispiam, quæ inter thoracis et iliorū ossa interiacet: propterea quod ei loco cingulum circumdari uerisimile sit. cum uero rursus hac oratiōe Hippocrates plurali numero deligan

da ilia dicat, & par sit, ut ad iliorum ossa ascendat deligatio: hæc ilia hic dici opinari aliquis merito posset: ad presens autē negociū scire illud utile est: cū in superioribus femoris partibus fractura contigerit, tunc non solum usq̄ ad inguina esse deligandum, sed ad superiores etiā partes fasciatione progrediendū. quæ quidem partes sunt primum coxa, deinde iliorum os, tum ossibus carens ac uacuus locus, quem *λαπαγίω* aut *ἰλεον* nōminant. siue igitur hucusq̄ etiā producere deligationem uelit quispiam, concedendū est: siue iliorum ossibus deligatis contentus sit, non est laborandum, ut ea transgrediens ilibus itē tum fasciam circumducatur: cum ante omnia id curet Hippocrates, ut nullus locus dum deligamus absq̄ fasciatione relinquatur: sed omnes partes ex æquo linteis comprehendantur, quoad occupatum sani etiā aliquid uideatur. *πινυάδω* autē, id est gressuram alij per γ, alij per χ scribendū putant: locumq̄ significat mediū inter duo crura, quo uidelicet in diductiōne feminum gressum uicissitudines deambulant do efficiuntur. unde etiā *ἐκπεπλήθω* *διαπεπλήθω* uerba, id est egressum esse, & digressum esse apud ipsum habentur. quin etiā apud Homerum: campo hi gradiuntur aperto.

71 Deficere siquidē a nuda parte semper ferulæ et hinc et inde multū debet. semperque id prouidēdū est, ne aut supra os ex ijs qui iuxta articulos natura prominēt, aut supra neruū articuli impositio ferularum fiat.

Licet de una aliqua specie agat Hippocrates multa etiā communia & generalia docere interdum solet: quod cum facit, ut non ad solam eas species, sed uel ad omnes, uel ad plures, uel ad aliquas pertinere declaret: interdum semper sicuti nunc: interdū ad multa utile est hoc intelligere: aliquando ad omnia utile hoc est: atque huiusmodi quadam, orationi suæ adiungit. quod enim nunc præcipit, uere semper utile est: neq̄ in femore tantum, sed in omnibus quoq̄ fracturis obseruandum est, quæ ferulas admittunt. tanta enim eas longitudine esse conuenit, ut nudam partē non attingant. maximeq̄ id cauendū esse inquit, cū extremæ ferularum partes ossiū prominentijs appropinquant.

72 Tumores autē qui in poplite, aut pede, aut aliqua alia parte ex cōpressionē existunt, lanis multis succidis bene carminatis uino & oleo madētibus cerato sublinendo deligandæ sunt. & si ferulæ comprimāt cito laxandum. gracilescerent autē, si supra ferulas linteis tenuibus ab infima parte sursum fasciando tumores deligares.

Tumores qui ex humoribus ex uehementi cōpressionē illuc elisis existunt, atq̄ exurgunt: lanis multis succidis bene carminatis, oleoq̄ & uino irrigatis deligandō curandi sunt. prius tamen cutem supra quā hæc imponenda sunt, inungi cerato iuber. tum eandē deligationē ab inferiore parte sursum

sum faciendam censet. ac de modo quidem deligationis ipse edocuit, cum unde incipiendum, quoq; uoluenta ac deducenda fascia sit, iam dixerit. de uero autem medicamentorum quibus utitur, dictum quidem fufius in proprijs tractationibus est: dicentur tamen etiam nunc summatis ea quę sibi fuerunt declarata. Oleum igitur sensum doloris mitigat, discutiendiq; uim habet. Vinum exiccatur, reprimit, concoquit, emollit, discutit. patet item sordidas lanas, quę succidat appellatur, nec non ceratum una cum mitigandi uim discutere ac reprimere: ut merito ex huiusmodi medicamentis curationem constituerit. quoniam enim tumor ab humoribus à deligatione illuc expressis maior quàm par sit, euadit: primum spectandum in curatione eius illud est, ut quod in membro tumescente præter naturam collectum fuit, exinaniantur. id autem reprimendo, & discutiendo, & mitigando fieri maxime potest. reprimendo quidem ac discutiendo, ut prorsus quod superuacuum illic est, euacuetur. mitigando, ne ob dolorem fluxionē pars affecta patiatur. nam propterea in inflammationis minus discutiendibus, minusq; reprimendibus uti consueuimus: quia quę uehementē hanc uim habent dolores irritant. hoc consilio itaque Hippocrates ad hanc curationem succidas lanas, id est fortes habentes, oleumq; & uinum, & ceratum assumit. lanas autem bene carminatas esse iubet, id est subactas & concerptas lenitudinis et mitigationis causa. quę enim sunt lotę, ubi carminantur, facile mollescunt: succida uero ob sordem non faciles carminantur, conceptuq; sunt. quo circa si negligentius subigantur dolentibus membris sicca ac dure occurrunt. ideo cum sciret hoc aliquando negligētius fieri bene carminatis adiunxit. multas etiam assumēdas inquit, ut conseruare uini & olei humorem queant. facile si quidem arefuerint, quę pauca sunt. modus uero deligationis priorum scopum, sicut dictum est, seruat: ut ab intumescētib; partibus sanguinem ad superiora auertat.

73 Ita enim gracilis quam citissime tumor efficeretur.

Si proprie quis loqui uellet, intumescens membrum, non tumorem gracilem euasurum esse dixisset. is enim non gracilescere, sed tolli prorsus à nobis debet. sed ita plerunq; ueteres loquuntur: & præcipue ij qui facundissimi habentur, neglecta ista postea exercitata in nominibus minuta loquendi curiositate, quam qui tractat, exquisitam loquendi diligentiam appellare consueuerunt. qui sanè laudandi essent, si hac sua exquisita loquendi diligentia siue loquēdi proprietate, quomodo cumque uoluerint nominare, clarius res quàm ueteres scriptores, explicarent. sed si & obscurius & humiliter id faciunt, cur ueterum negligentia non eligenda magis sit, non uideo.

74 Transgredereturq; supra priores deligationes, sed hoc tamen deligationis modo utendū nō est: nisi periculum sit, ne tumor

aut pustulas contrahat, aut nigrescat. at nihil tale sit, nisi nimis quis fracturā comprimat, aut inclinātā habeat, aut manu scalpat, aut aliquid aliud quod iritet, corpori impingat.

Ex hac lectione alij supra deligationem ascendere humores ex tumoribus elisos uolunt: alij ad loca deligationis tantum peruenire, quorum sanè discordiam iudicare, si definiatur deligatio, difficile non est. nam si remissis ferulis tumētē partem eo quo dictum est modo deligaremus, aliquid sanguinis in loca deligationis deferretur. si uero de tractis ferulis resolutaq; tota deligatione statim de integro modo eo quo in fracturis solemus uti, à tumoribusq; exorisi deligaremus: fieret, ut humor elisus priorem deligationem in superiora loca transcederet.

75 Canalem si quis sub ipsum femur ita subijceret, ut poplitē nō excederet, obesset is magis q̃ prodesset. nō enim uetaret, quominus aut corpus, aut tibia sine femore moueretur. nam & molestus esset poplitem attingēs. & quod minime decet, id facere permitteret. minime enim decet, ut genu inflectatur, nam omnē confusionē affert deligationibus siue femur sit deligatum, siue tibia: quicumq; genu inflectit. necesse quippe ei est, ut et musculi aliās aliam figurationē habeant, & ossa fracta moueantur. ante omnia igitur curādum est, ut poples quoq; extensus sit. uidetur igitur canalis prodesse si simili modo à coxa usq; ad pedem subijciatur.

Deinceps postquam de tumoribus dixit, de canali scribit, de quo satis à nobis dictum superius fuit. nam & uelle eum docuimus, ut uel perpetuus, id est continuus et toti cruri substratum canalem subijciamus: uel penitus omittamus. & de capsula machinaria à recentioribus medicis recte exco gitata, nonnulla declarauimus.

76 Præterea sub poplitē mitella laxè circumdanda cum canali est, non secus atq; infantes in tunis fasciatur. deinde ubi femur in superiorem partem, aut in latus uersabitur, firmitus cū canali ita detinebitur. Si igitur fieri debet, perpetuus faciendus, uel nō faciendus canalis est.

Quod ait cum canali, duplici modo intelligitur à quibusdā. alij enim extrinsecus canali circumijciunt mitellā censent: ut inquit, mitellā utriq; rei simul esse circumdandā & popliti ægrotantis, & canali extrinsecus: ut nō solum poples ipse, sed etiam canalis, fascia circumiecta contineatur. alij uero ipsi popliti extrinsecus circumijciendam mitellam putant, ut unā cum canali ipsa quoq; crus sustentet: hoc est unā cum subiectione canalis. eo quod neq; ipsa sola, neq; solus canalis ad stabilitum sufficiat, sed utraq; simul requirantur.

Valde

77 Valde autem laborandum est, ut summus calx & in tibiæ, & in femoris fracturis apte deponatur. nam si pes suspensus fuerit, reliqua tibiæ affulcita: necesse est, ut in anteriore parte tibiæ ossa incurua appareant. sin autem calce altius quam conueniat fulcito tibiæ suppendula sit: os idem in anteriore parte tibiæ cauius iusto uideatur, necesse est. præsertim si calx forte hominis magnus natura fuerit. Cæterum omnia ossa tardius corroborantur, nisi naturali situ collocata sint, in eademq; figuratione quie

ta permaneant: imbecilliusq; occalescunt.

Superius cum de cubiti appensione loquebatur, diximus nonnullos sine negatione, alios cum negatione suspensum legere. eosq; qui addebant negationem suspensum interpretari dependentem, ac nullo subiecto sustentaculo firmatum. contra alios qui tollendam negationem afferebant, suspensum pro eo sumere qui supposita mitella firmiter gestaretur, ac stabiliretur. affulcitam autem id est *ἡµατιζομένην* inquit firmatam ac subnixam à uerbo *ἡµατιζέω* quod *ἐκ τῆς ἡµάτης*, id est à fulciminibus deduxit. fulcimina autē etiam apud Homerum agnoscimus, eo uersu, fulcimina puppibus abstrahunt.

GAL IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE FRACTVRIS COMMENTARIORVM

Liber tertius.



T QVE hæc quidem sūt ijs, quibus fracta tantum ossa sunt, nō autem extra eminent, neq; alioqui ulcus contingit.

De simplicibus fracturis hucusq; differuit, in quib. ne-

que os extra cutē eminet, ita ut nudū appareat, ne que omnino ulcus contingit. nā ossa extra eminere et nudari absq; musculorū qui circumiecti sunt, & cutis diuisione nō posse perspicuū est. ulcus uero fieri etiā si os fractū minime denudet, potest. tran sit igitur ita ad loquendū de fracturis quæ uel cum ulceratione sola, uel cum ossis denudatione fiunt.

2 At quibuscunq; simplici modo fracta ossa sunt, & nō multifarie, si eodem die aut postero reposita, atq; in sedem suam data sint, neq; sit timendum, ne fragmentum aliquod recedat: quibus item licet ulcus accesserit, ossa tamen fracta nō extra eminet, neq; modus fracturæ is est, ut fragmentorum timeri recessus possint: ij simplici modo curandi sunt.

Fracturarum cum ulcere duplicem curationis modum tradit. alterum, cum uel nuda aliqua ossis fracti pars, uel rescissum aliquod fragmentum cōminuti ossis extat; alterum, cum neutrum horum est, sed ulcus solum cum fractura conuenienter coaptata. Neq; enim si recte extensio & cōfirmatio adhibita fuerit, neq; extra cutē pars ulla ossis eminet, neq; recessio aliqua suspecta est: in his curandi speciem immutandam censet. alteram enim adhiberi uult, cū ulcus simul quidē cum fractura contingit, sed nihil tamen extra eminet, neq; timetur ne aliquod fragmentū à fracto osse rescindatur: alteram, cum fractum os licet occultetur sub cute, in opinione tamen est aliquando separatuū à natura aliquod fragmentum, ac per locum ulceris erupturum. cum prima affectio cōtingit, modo de-

ligationis utendum censet, quem in fracturis sine ulcere adhiberi docuit. cum secunda accidit, modum curationis, ut deinceps discemus, immutat. melius enim est ut rem ex ipso intelligamus.

3 Atq; alij quidem qui neq; magnum bonum, neq; magnum malum faciunt, ulceribus purgante aliquo medicamento imposito medentur: aut picato cerato, aut cruëto, aut aliquo alio, quod facere consueuerunt. eos ego qui plagulas uino madefactas, aut lanas succidas alligant, uel tale aliquid, laudo: ubi autē purgata ulcera fuerint, & iam coalescunt, tunc multis linteis deligare, ac dirigere ferulis conantur. hæc sanē curatio sicut boni aliquid affert, ita malum non magnum facit. sed ossa tamen nō simili modo in sedem suam coaptantur, sed aliquantulo turgidiora corpora ea parte, quàm oportet, tumunt sit, efficiuntur.

Fracturarum cum ulcere curandarum duplicem modum ab Hippocrate tradi dixi: à quorum primo nunc incipit: eosq; prius reprehendit, qui male ulcerationem illam curant, in qua ubi conformata apte fractura est, nulla suspicio est, ne fragmentum aliquod postea rescindatur. nonnulli igitur medici, inquit, eis qui ita affecti sunt, inter initia quidem medentur perinde ac si ulcus solum haberent: ubi uero satis medio criter id se habuerit, deligationem in fracturis accōmodatā adhibent. summa huius orationis hæc est. longius tamē Hippocrates ipsam produxit, dum sigillatim omnia percēset. ego eos uti curatione eiusmodi dixi, perinde ac si ulcus solū absq; fractura contigisset. ipse etiā ea quibus medentur, adiunxit. picatūq; ceratū, & cruentū medicamētū, & purgantis, plagarūq; uino imbutarum mentionem facit. cruentum autē medicamentum quod inquit, id est *σφαῖον*, nunc quoq; usitatissimum apud medicos nomen est. de illisq; medicamētis dicitur, quæ uulneribus statim

à principio ubi facta sunt, imponuntur, cum nondum sunt sicca, sed adhuc cruentatur: hoc est e cute uulnerata, aut etiam carne sanguis rorando destillat. at medicamentū purgās illud est, quod una cum eo quod exsiccat, id quod precipuum in ulcerum curatione esse, demonstratum est: quāda etiam abstergendi uim habet, qua ulcera pura efficit. huiusmodi medicamenta ex squamma aeris, & argine componuntur duplici modo. alij enim argini nem decoctā, alij crudam miscent: quae cruda confecta sunt, uiridia: quae decocta, uermicula appellantur. hos enim colores praeseferunt. atque haec quidem medicamenta, quoniam medio crebiter abstergunt, purgandorum ulcerum uim habent. huiusmodi autem esse ea quae sordem ex ulceribus expurgant, docuimus. quae autem abstersione carent, cruentis imponuntur. quae etiam ipsa non secus ac priora ex particularibus materijs uariantur. nam sicut de illis exempli causa eruginem, & squammā aeris dixi, alia quoque talia poteram eodem modo dicere: nuncque satis erit, si absque purgandi uicruenta ea medicamenta appellari dicamus, quae ex bitumine nascuntur. exempli enim causa haec commemorabimus, cum omnis eorum materia in libris De medicamentis fuerit explicata. picatum autem ceratum & sensum doloris mitigare, & pus mouere apud omnes ferè constat: tuncque praecipue conuenire, cum inflammationem iam ulcus inciderit. nam cum neque ad purgandum sorde, neque ad glutinandum, aut cicatricem obducendū ulcus idoneum sit, ad aliud uti eo potest nemo, at uino madefactae plagulae ob uitium reprimendi uim habent. & ab his, qui ita curant continendi causa assumi cōsueuerunt, eū ob ulcus subligaminibus, id est fascijs subiectis utantur. sed quaecumque sciēda ei sunt qui rite ulcus uult curare, tū in tertio & quarto Curatricis artis ordine unicuique accommodato, explicata sunt: tum in explanatione quoque libri De ulceribus quantum satis fuit, fuerunt commemorata. nunc ad praesentem rem satis haec sunt, quae diximus. quippe cum opus futurum sit, ut rursus de curatione huiusmodi affectuum agamus, quando Hippocrates ipse id docuit. nunc enim de alijs medicis loquitur. inquitque eos peccare, non tamen alicuius momenti errorem eorum esse uelut illorum de quibus mentionē facit. in quo igitur peccat? si hoc enim cognouerimus, illud quoque perspicimus: quod inquit, Neque magnum aliquod bonum, neque magnū malum ipsos facere. in eo uidelicet error eorum consistit, quod cum ulcerationi non male provideant, fracturā inter initia negligunt accommodatam ei deligationem postea adhibentes: qua utendum, à principio est propterea inquit, turgidiora ossa euadunt. nam cum melius sit, ut toto tempore reprimatur, & compingantur, ipsi primis diebus, atque illis quidem non paucis id facere omitunt. siquidem, ut ait, ubi iam ad coagulationem deuenierunt ulcera: ipsi tunc primum ut fracturis conuenit, deligant. patet enim cum suppurent ulcera, prius esse purganda quam edeueniant, ut coalescant. id autem triū, aut quatuor dierum numerum planè excedit.

4 Quin breuiora quoque redduntur, quibuscumque utraque uel tibiae uel cubiti fracta ossa fuerint.

Proprium breuitatis Hippocratis est, ut his quae subiungit, quae in superioribus praetermissa sunt, declaret: id quod etiam nunc facit. cum enim prius ossa turgidiora fieri dixerit eorum qui à medicis ita curantur: in omnibus ne an aliquibus tantum id fiat non definiuit. sed nunc aperte manifestat non in omnibus, sed illis tantum id contingere, in quibus alterum os tantum fracturam passum fuerit. partes enim fractae cum non omni curationis tempore compingantur & astringantur: non reprimuntur, sed turgescunt. non tamen breuius os euadit: quia alterū quod est illud os, atque integrum, ei longitudinem naturalem cōseruat, sed ubi duo simul ossa effracta sunt, fit ut partes altiores ossium fractorum, sicut superius demonstratum est, una cum musculis retrahatur. quam ob causam etiam ante conformationem extensionem adhibebat, & quia sine accommodata deligatione coaptatio ossium seruari non potest: propterea deligationi, quoad callus obducatur, accurate studendū censuit: quam qui negligunt ulcerationis tantum curam habita, non solum in maiorem tumorem, quam naturaliter conueniat, membrum inducunt: uerum etiam breuius efficiunt.

5 Alij sunt qui huiusmodi fracturas linteis statim curant: atque hinc & inde linteis conuoluentes, qua ulcus est, intermittunt: perfrigerarique id sinant. postea supra ulcus medicamentum aliquo purgate imposito, & plagulis uino imbutis, & lanis succidis, ita medicantur. curatio haec mala est. uerisimile quae est hos qui ita curant, cum in alijs fracturis, tum in huiusmodi maxime desipere. quippe cum praecipuum illud sit ac maximū, ut cognoscamus quo modo iniiciendum initium linteorum sit, & qua parte maxime comprimendū, quam utilitatem item consequantur aegri, si quis et recte initium fasciae cōficiat, & qua maxime est opus, comprimat. quod contra dāno afficiantur, si neque recte fasciationē incipiat quisquepiam, neque qua maxime conuenit, sed hinc et inde tantū cōpressionē faciat. quae sanè ex utrifque eueniant, & dictum etiam superius est: et ipsa quoque medicina testificatur. quippe cum necesse sit, ut ei qui ita deligatur, tumor in ipso ulcere infurgat.

Eorum qui maxime laedunt, mentionem hic facit Hippocrates, omniaque quae agunt clare explicat: erroresque ipsorum euidenter conuincit. ut si quis diligenter aduertere animum his quae dicuntur, uelit, mea opera non indigeat.

6 Nam si sanum corpus hinc & inde deligatum

gatum fuerit, in medio autem intermissum sit: id qua intermissio facta est, intumescet, ac decolorabitur. quomodo igitur ulcus hæc non patietur?

Quicquid carnosæ substantiæ est appellare Hippocratem corpus, id est *χρῶμα*, quo uocabulo hic utitur, dictum etiam superius est. sed aduerte mihi animū, ut intelligas rationalem medicū, si quod fieri debet inuenerit, longam experientiam non expectare. isti huiusmodi fracturam curant ulcere non deligato, sed utrinque ab eo fasciis circumiectis. & non ex ijs quæ ipsi agunt, sed ex morbi malignitate, inflammatione uexari ac male affici ulcus existimant. cum primus qui huiusmodi curationem ex cogitauit, eam praua deceptus ratione inuenerit: alij uero qui eam ex consuetudine susceperunt, eas seruent, eo quod immutare atque innouare quicquid non audent. ex qua re quid aliud euenit, quam ut magnum malū efficiant: id enim planè omnibus contingit qui experientia absque ratione artes exercent. qua re cum sola ratio ex ipsa rei natura profecta si duciam habeat, ea quæ ex longa consuetudine male aguntur, audent immutare. Sed quæ ratio est hæc? audacter Hippocrates istorū curationem immutare est aggressus, non probabilibus aut absurdis inductis summptionibus, sed scientiā afferentibus, & necessarijs. nam si in sanis corporibus modus hic deligationis in mediā partem, quæ inter fascias extat, utrinque sanguinem elidens inflammationem affert: quomodo in membris iam affectis idem multo magis non efficiet?

> Necesse igitur est, ut ulcus decoloratū, & digressum, ac euersum & lachrymosum euadat, nec suppuret. ossa quæ recessura minime erant, recedant.

Quæ ex praua deligatione accidunt, hic scribit: quæ omnia ex magnitudine inflammationis eueniunt. labra enim ulceris ob eam inuertuntur, non secus atque ea quæ labra proprie appellantur, oris uidelicet, quando inflammationem patiuntur. decolor item totus locus efficitur. atque id nō iniuria, nam hoc quoque inflammationem magnam consequitur. tum ex ipso ulcere sanies quædam tenuis, atque incocta emanat: perinde atque in oculis lachryma, cum laborant inflammatione. inde enim per translationem ita affectum ulcus lachrymosum hic uocatum est. præterea donec in hunc modum deligata fuerit pars, concoctio nulla humoribus qui inflammationem gignunt, contingere poterit. accedit quod necesse erit, ut ossium pars aliqua mora temporis noxam ex incoctorum humorum affluentia contrahat. quocirca nisi destiterit ab hac praua deligatione, qui ita curat: nihil mirum erit, si aliquid ex ipsis recesserit. Reliqua in tota hac oratione clara admodum sunt, si quis attendat, ut dixi: eaque memoria teneat, quæ prius edocuius. omnia enim hæc ad illa referuntur, illisque attestantur, sicut ipse etiam Hippocrates significat,

A Nec nō pulset ac febrile ulcus efficiatur: ut cogantur ob intumescentiam emplastra imponere. id quod inutile ijs qui hinc & inde deligati sunt euadit: cum nihil ipsis nisi pondus quoddam inutile ad pulsū illum superueniat. postremo uero cum iam recrudescit malum, fascias resoluunt, & sine deligatione postea reliquam curationem persequuntur. & si aliquod aliud uulnus huiusmodi deprehenderint, nihilominus eodem modo ei medentur. neque enim deligationem hinc & inde factam, et ulceris perfrigerationem esse in causa, sed aliquod aliud infortunium putat. ego quidem tam multa hac de re minime scripsissem, nisi certo scirem, & inutilem esse huiusmodi deligationem, & multos esse qui ita mederentur: necnō oportunum fore, si dedisceret. recte autē scripta esse quæ superius scripsimus, testimonio illud est. siue uidelicet maxime, siue minime comprimendæ fracturæ sint. oportet autem summam ita dicere. quibuscunque ossium recessio in expectatione nō fuerint, ijs eadem curatio adhibenda est, ac si ossa tantum fracta absque ulcere sint. nam & extensiones & directiones ossium, & deligationem eodem modo faciemus. super ipsum enim ulcus plagula tenuis duplex picato cerato illito imponenda, ac circum circa albo cerato inungendum est. at lintea tamē & alia latiora aliquatulo scindi debent, quàm si ulcus nō esset. id quod quo primo deligamus, latius multo quàm ulcus esse oportet. quippe cum angustiora ulcus ipsum cingant. id autem nō debet. sed à prima circūuolutione totum ulcus comprehendendum est.

Paulo ante dixit in his qui ita deligantur, ad ipsa ulcera intumescant elidi. intumescantiam *οἰδή* appellas. nam ex praua deligatione ex utraque ulceris parte facta sanguis expressus turgiditatem quandam præter naturam in medio facit: quam *οἰδή* & *οἰδῖμα*, id est intumescantiam seu tumorem nominare ipsi mos est. hic uero tumor cum pulsus ei, calorque ignitus accessit, eam quæ nō multo ante proprio nomine ita fuit appellata, inflammationem inducit. antiquitus enim ut sæpe à nobis demonstratum est, in censionem omnem *φλεγμονή*, id est inflammationem uocabant. à temporibus uero Erasistrati nomen inflammationis in consuetudinem abire coepit, ut de tumoribus illis diceretur, in quibus non tantummodo calor incensus & flammæus, uerum etiam repercussio, & pulsus existit: qui sanè ruborem quoque necessario habent. ex multo enim calore rubor exoritur, sicut

repercussio & pulsus ex oppletione. cum posset autem Hippocrates loco *πυρετώδης*, id est febrilis, *πυρετώδης*, hoc est igneum dicere: febrile dixit à feruore & igne deducta appellatione, ut significet, quemadmodum mihi uidetur, febre quoque ipsam, quæ *πυρετός* dicitur *ἀπὸ τοῦ πυρός*, id est ab igne fuisse nominatam: eamque esse febris essentiam, quod calore igneum habeat.

9 Ita ut hinc & indelinteum superexcedat.

Raro ab auctoribus *γῶγον ἢ γῶγον*, id est hinc & inde pro à superiore & inferiore parte dicitur. plerumque enim cum de partibus quæ à latere sunt, intelligunt, ubi hac loquutione consueverunt. hic tamē antiquo loquendi modo Hippocrates dixit.

10 Atque inijci quidem linteum debet ex ipsa ad ulcus processione: comprimendumque paulo minus quam si ulcus non esset. deuoluendaque deligatio, quemadmodum dictum antea fuit. lintea autem mollia quidem semper sint, magis tamen in his, quam si ulcus non esset: neque pauciora quam quæ prius dicta sunt: imò etiam aliquantulo plura esse debent, ubi deligatio fuerit, ei qui deligatus est affulcitæ quidem, non compressæ tamen fasciæ esse uideantur. dicatque is supra ulcus maxime affulcitas eas esse. isdemque temporibus affulcitæ, & isdem laxæ esse uideantur, sicut in superioribus fuit declaratum. tertio itē post die religandum est omnibus in similes modos, ijs quæ superius dicta sunt, immutatis: nisi quod in uniuersum minus aliquanto hæc comprimenda, quam illa sunt. & si pro ratione quæ ueri similia sunt, fiant: pars iuxta ulcus gracilior semper reperietur: gracilia item reliqua omnia, quæ à deligatione continentur. suppurationes etiam citius quam in ulceribus quæ aliter curantur, fient. & quæcumque caruncula in uulnere aut denigrata, aut emortua fuerint, celerius sub hac curatione, quam sub alijs circumabrumpentur, atque excident, præterea ulcus si hoc modo curetur, quam si alio, maturius ad cicatricem deuenit. omnium horum causa est, quod & pars in qua est ulcus, & quæ circum circa adjacent omnes, gracilesunt.

Ex processione, id est *κατὰ τὴν* semper pro ex directo ponit, aliquando per longitudinem corporis, aliquando per latitudinem, quemadmodum nunc. uult enim ut primæ fasciæ initio uel à dextra uel à sinistra parte ulceris posito, eam ita deuoluamus, ut totum ipsum comprehendat, ac nulla eius pars nuda relinquatur.

11 Sed reliqua quidem omnia in hac curatione simili modo faciēda sunt, quemadmo-

Galen.

A dum si fracta ossa absque ulcere fuissent. ferulæ tamen non sunt apponendæ. propterea lintea plura esse his debent quam cæteris: quia & minus comprimuntur, et ferulæ tardius apponuntur.

Cauetne ferulæ ulceratis fracturis apponantur, compressionem uidelicet ex ipsis formidans. propterea etiam linteis non esse comprimendum iussit: pluribusque ipsis esse utendum ob duas has causas dixit: id quod memoria tibi tenendum est: quia & minus comprimuntur, & ferulæ tardius apponuntur.

12 Si tamē eas apposueris, non ex processione ne ulceris id faciendum est: sed laxæ apponendæ, cauendumque ne ulla magna constructio ex ferulis efficiatur. dictum autē hoc quoque est in ijs quæ scripta superius sunt. Victu exquisitiore, atque eo diutius utendum illis est, quibus à principio ulcus contigit, quibusque ossa extant, idque in uniuersum dictum sit: quo grauiora uulnera sunt, eo exquisitior res, & diuturniore uictu utendum est.

Ex processione & ex directo per longitudinem audiendum nunc est. in longitudinem enim ferulæ apponuntur. ac prius quidem adhiberi ferulas prohibet: nunc quasi eas aliquando concedat, ita inquit: si tamen ferulas apposueris: quod quomodo ipse hic, & in crure facere consueuerit: asserere contentiose non possum cum nullam ipse hic distinctionem subiunxerit. quod autē ego facio illud uero explicabo. cum fractura cum ulcere interdum in longitudinem membri contingit, nunc ex utraque ulceris parte circumdari ferulas licet. cum transuersum ulcus euasit, id maxime si maius sit, uetat quo minus imponi ferulæ queant.

13 Eadem hæc ulcerum curadorum ratio illis etiam adhibetur, quibus ossa quidem fracta sunt, sed nullum à principio ulcus extiterat: si inter medendum uel ex nimia linteorum compressione, uel ex ferulæ infestatione, uel ex aliqua alia causa factum fuerit, cognosci an ulcus subsit, potest, dolore, & pulsu: & si tumor qui in extremis extat, durus efficitur: sique digitum impresseris, insurgit quidem, sed statim tamē recurrit. quod si tale quippiam suspiceris, soluendum tibi est. ac si sub subligaminibus, aut aliqua alia deligationis parte prurigo sit, picato cetero pro altero utendum est.

Nunc de ulceribus loquitur, quæ fracturis moratæ temporis ex ferularum deligatione superueniunt. causasque exortus eorum, & notas tradit, quibus an exorum ulcus sit, cognoscere quispiam posset. tum ubi id innotuit, in consuetu deligationis modo non esse permanendum: sed statim detractis fa-

tom. 6

Q

scijs

scijs convenientem curationem adhibendam monet: quam ipse dilucide satis scripsit.

14 Sin autem nihil horum fuerit, sed ulcus irritum inueniatur, nigrum aliquatenus aut impurum: futurumque sit, ut carnes suppurent, nerui uero simul excidant: hi nihil prorsus sunt perfrigerandi, neque suppurationes hæc terrere nos debent: sed curatio est adhibenda reliquis sanè simili modo, sicut ijs quibus à principio ulcus cõtingerat.

Perfrigerari pro nudari uidetur accipere: id est detracta fracturis acmodata deligatione, tanquam ulcus curare. non enim nihil imponere, & nudum penitus locum relinquere perfrigerare appellat: cum uidelicet dicat, nihil prorsus sunt perfrigerandi: quandam enim mediam medendi uiam significat. ea autem est, si aliqua ex antedictis notis in ulcere apparere statim deligatione fracturis accommodatam finiamus, curationeque ulceris uno die, atque altero adhibita mediũ modo quo ipse sequenti oratione iubet, deligemus

15 Sed linteis incipienda deligatio est ab intumescencia quæ in extremis partibus, insurrexit, admodum laxis. deinde in superiorẽ partem fascia semper est deuoluenda: ut compressa quidem nequaquam, sed supra ulcus maxime, in reliquis minus afflicta sit. lintea quidem prima munda & non angusta esse debent: ac tanta multitudine, quanta si ferulæ etiam adhiberentur: uel paulo minore.

In hac oratione manifeste ostendit uelle, ut deligatione incipiente à tumore qui in extremis membri partibus extitit, inde fascia continuata deuolutione sursum usque ad fracturam, ubi est ulcus, deferatur. ita ut hæc quæ curandorum tumorum causa sit, deligatio cum altera quæ fracturis idonea est, coniuncta unam intentionem ex paruis conuolutionibus conflata absoluat. fasciationem hanc uult afflucitam circa ulcus esse, id est applicatam atque inhaerentem, laxæ tamen, ne constringat: in reliquis uero partibus fracturæ, quemadmodum in fracturis absque ulcere minus esse compressam. obseruandum enim in omni deligatione illud censet, ut ea pars maxime comprimat, unde elidens sanguis est. linteorum autem conuolutiones in extremis partibus quæ intumuerunt, fieri laxiores iubet: ea diligentia ipsis duntaxat adhibenda, ut in unam unionem & coniunctionem deligatio deducatur: non in eis præcipuum totius curationis uim constituens. non enim nigrefacta & emortua in ulceribus, quæ nunc curat, eiusmodi sunt. de illis enim superius hi uerbis inquit. Et tumor qui in extremis extat, durus efficitur: siquid digitum imprefferis insurgit quidem, sed statim tamen recurrit: quæ sanè tumorum eiusmodi sunt accidentia, ut merito neque eos sicut molles esse negligenter

dos, neque eis præcipuam curationis uim, ut dixi, attribuendam censet.

16 Supra ipsum ulcus satis est, si plagula albo cerato illita detur: nam siue caro, siue neruus nigrefactus fuerit, excidet. quippe cum hæc huiusmodi non acribus curari, sed lenibus debeant non secus atque ambusta, religare uero tertio post die opus est: ferulæque non apponendæ. magisque quiescendum quam antea est: inediaque uacandum. Sciendum autem est siue caro, siue neruus ita computruerit, ut decidere debeat: hoc modo & multo minus late proferpet, & multo citius decidet: multoque graciliores circum adiacentes partes erunt, quam si resolutis linteis aliquod ex purgantibus medicamentis supra ulcus impositum fuerit. adde quod quicquid ita pure moto exciderit & citius carne repletur, & citius ad cicatricem perducitur: quam si illo modo, uel aliquo alio curatum sit. præcipuum quidem in his est, ut recte et moderate deligare scias. ad id tamenfigurationes etiam quales esse debent, & reliquos uictus, & linteorum conuenientia insuper conducunt.

Cur acribus medicamentis curare ulcera hæc non oporteat, ipse explicauit, cum ea ambustis compararit. quia uidelicet ex commistione acris, & calidorum humorum existunt. simul etiam illud significauit, picatum ceratum acrius quam album esse. pix enim quo calidior, eo etiam acrior quam cera est.

17 Quod si in nuper uulneratis deceptus olsui recessionem non futuram esse existimaris: ea uero recessura fuerint: modus curatiois timendus non est. nullum enim magnũ malum inde eueniet. si modo manu deligationes bonas atque innoxias facere non ignores.

Non timendus, inquit, est curatiois modus qui fracturis conuenit, etiam si signa olsui recessionis apparuerint: quænam ea sint, exsequentibus disces.

18 Si olsui recessio in hoc curatiois modo futura est, nota hæc erit. pus copiosum ex ulcere emanat, gliscereque pars affecta uidetur.

Quando copiosius est pus quod emanat, quod ulceris magnitudini par sit: suspicandum est, affectum esse, quod si gliscere quoque uideatur, quod *ἰσχυρῶς* uocat: id est ad excretionem festinare atque incitari pars quæ laborat: tunc pro certo id habere iam potes. sed quo pacto incitari ad excretionem locum deprehendimus? primum quidem cum labra ipsa ulceris coire inter se nequeunt: sed dissident, atque inuertuntur. deinde cum æger in intima membri parte morionem quandam latentem ac tacitam sentit, si auocata ab alijs rebus mente & sensibus

sibus huic soli membro, quod hæc patitur, diligenter attendere.

19 Frequētius igitur ob maiorē religandū est, nā alioqui & febres oriūtur; & si ualde à deligatione cōprimantur, & ulcus, & circumiectæ partes gracilescunt.

Madorem, id est *μαδον* superfluentes humiditates appellare cōsueuit, siue ex tenuibus, siue ex crassioribus humoribus constent: cuiusmodi nūc pus est; quod dixit copiosius emanare quando ossis pars recessura est.

20 Ac quæcūq; quidem tenuium admodum ossiū recessiōes sunt, nulla magna mutatione indigēt, nisi ut laxius deligetur, ne pus intercludatur: sed effluere facile queat. frequētiusq; religandum, quoad os recesserit: ferulæq; non apponendæ.

In quibusdam exemplaribus magna non est, sed absolute est scriptum, nulla mutatione indigēt: sed magis uidetur esse cōsentaneum, ut hoc modo legatur. nam cum tripliciter deligationis ratio quæ fracturis cōuenit, immutetur, ac uarietur: nō ita absolute nulla mutatione esse opus merito dixisset. præsertim cum etiā si particula ea adiūcta sit, reprehendere hominem fortasse, ac falsum esse quod dicat asserere quispiā possit. iubet siquidem nunc laxiora līnea deligare: frequenter resolueret ac religare: ferulasq; nō apponere: & quarto loco id quod in uniuersum consuluit, multitudine līn-teorum, quando intentio ipsorum laxatur, augere & ferulas non applicare. sed modus tamen deligationis fracturarum seruatur. ad quem spectās non indigere mutatione aliqua magna hæc dixit. subligamine enim utēdum tibi est, initioq; à parte affecta sumpto, terq; circum eam circumuolutione facta in superiorem partem finiendū reliquis distributionibus līn-teorum, sicut ipse edocuit, deductis, postea secundū subligamē eadem intentione iniectum deorsum deuoluendū, ac sursum iterum retrahendū est: laxioresq; inuolutiōes eius faciendæ. tum plagula, ut tradidit, imponendæ: fasciæq; desuper dandæ: sicut omnia in fracturarum deligatione didicisti. at si magnorum ossium fragmenta fuerint recessura: deligationē fracturarum nō amplius admittit, sicut in sequenti oratione declarabit. Merito igitur, nulla magna mutatione indigere hæc dixit. uerum si etiā absq; magna scriptū sit, ita accipi poterit, ut intelligamus modum deligationis fracturarum nulla ex parte esse immutandum. nam dum & subligaminibus utimur, non secus atq; illic, & initū deligationis idem facimus: primasq; inuolutiōes, ac deinceps reliquas nihilominus: simili item modo postea plagulas iniicimus, easq; ipsas desuper deligamus: eundem profecto modum seruare dicendū sumus.

21 Cum uero maioris ossis recessio in expectatione fuerit, siue inter initia prænoueris, siue postea aduerteris, nō amplius ean-

Galen.

dem curationem requirit: sed extēsiōes & directiones ita faciendæ, sicut dictū est, plagulæ uero duplices sumendæ sunt latitudinem non minore semidodranti, ad uulnus tamen quod fuerit cōiectando. lōgitudine paulo quidem breuiores, quā ut bis: sed multo longiores quā ut semel circumire fractum corpus queant. tot autem multitudine sint, quot conducit. has uino nigro austero madefactas à media parte incipiēdo, quemadmodū fasciæ ex duobus initijs deligari solet: sic circumuoluere debes: & dein de asciatim alternatis capitib. ita dimittere.

De inuolutione fasciæ etiā in libro De ijs quæ in Medicatrina fiunt dixit, fasciationem aliam simplicem, aliam rotūdā, aliam asciatim appellari. est autem asciæ reuolutio fasciæ, quæ cum parum à recto declinet, in obliquum tamen nondum euadit, à fabrorum fasciæ quæ paululum à recto abiens in summitate decuratur, ita dicta: uult igitur, ut plagulæ hæc figura membrū circūdent, ita circumiectæ, quemadmodum fasciæ, quæ ex duobus initijs deligantur: id est ita ut mediā plagularū pars mēbro primū applicetur: deinde reliqua quasi crura non orbiculariter circumuoluantur, sed paululum deflexe: ut ex opposita parte illi loco unde inceperāt inter se mutuo decussentur, similemq; coniunctiōnē x literæ efficiant. id quod si orbiculariter fuissent circūducta, nunquam euenisset. capita enim planè ex aduerso cum orbiculari conuolutio sit sibi mutuo occurrūt. plagularū longitudinem declarauit, cum inquit, breuiores eas paulo esse debere q; ut bis: & longiores multo q; ut semel sibi mutuo occurrant. uult enim ut sæpe ab ipsis continetur membrū, non semel ab unaquaq; ex ipsis circumdatū. nam si in quem locum sibi occurrisset plagula, nulla alia mēbri parte ulterius cōprehensa, ibi desisset: firma nō fuisset detentio. dimidiam siquidem ferē partem ulterius ab ipsis cōprehendi debere significat, cū inquit, & paulo minores eas esse debere, q; ut bis: & multo maiores q; ut semel circūdare membrū queāt, id autē fiet, si in mediā parte rotūditatē mēbri defināt. quare si pedali longitudine esse debent, ut semel circūrēt: sesquipedali faciendæ sunt, ut in medio defināt tanta parte eis adiūcta, quanta à sesquipedali longitudine deficiebant. coniicienda igitur diligenter tibi est membri crassitudo, quo tanta longitudine efficere plagulas possis, ut una & dimidia circumuolutione membrū cōplectantur. quod si cōiecturæ tuæ nō admodum fidās, longitudinē exacte inuenies, si alteri sano membro eas circūieceris. perspicuū præterea illud est, plagulas has ita cōtineret ac proxime inter se esse coniiciendas, ut nullus in medio uacuu relinquat locus. uino autē madefaciendas censet, quod colore nigrum sit, sapore austerū, crassum constitutione. nigrum enim & austerum ad huiusmodi affectus utilissimū est:

tom. 6

Q 2

cum

cum & commune bonum, cuius causa assumitur, afferat: & reliquis astringentibus, minus mordax sit. id quod in huiusmodi curationibus non leue existimari debet: quippe cum, ut docuimus, ex dolore inflammationes oriantur unde etiam si non admodum, sed mediocriter auferatur sit, magis probatur, quod enim admodum auferatur sit, cum carne supra quod oporteat, contrahat & cōpingat: dolorē inducit, quin etiam quod substantia tenuis est, cuiusmodi est albu aut flauum, aut vermiculum: huic rei eo ineptum iudicat, quod in tota ulcerata carnis profunditate penetrans, ex constrictione, & cōpactione quā facit sensum maiorem doloris affert, ut crassum quale est nigrum, cum non alte in carnem penetret, sed sola qualitatis diffusionē ipsam perfrigeret & contrahat: humores qui iam in ea continentur, reprimunt: influentes sistit. Acratio quidē nigro & aufero ita attestatur. Sed si experimento quoque uelis uim eius retinere, ac supra maxima & grauissima uulnera eorum utaris: me uerū esse deprehendes. Dictū autem etiam superius est, eo subinde madefaciendū ulcus esse: propterea quod cum lintea imposita paulatim exsiccentur & caleant, inflammatio præcipue æstate consequatur, necesse est, quo tempore ego multos curauim, qui apud nos Pergami in singularibus, gladiatura certaminibus, quæ a pōtifficibus celebrari cōsueuerunt, pessime fuerat sauciati. supra uulnus cōplicata lintea uino huiusmodi madentia imponebam: super præcipue ea spongias molles extrinsecus dabam, tū per totū ferē diem, totamque noctē madefaciēdū ulcus, subiecto prius corio leniter concauo sub membro uulnerato ad pedes, ut per id quasi per riuulū uinum ex infusione deflueret: in peluimque uacuā, quæ id exciperet, exinanires: inquam quod defluerat uinum iterū sumptū denuo infundebam. nam præter alia quæ hoc uinum in se habet cōmoda, illud est maximū, quod hebeti odore præditū est. cum enim alia quæ hunc odorem habent, caput uehementer feriunt: nigrū auferū neque hac in parte læsionē ullam affert. odoris autem hæc imbecillitas ex frigiditate temperaturæ contingit. Vinum enim auferū ex terrestri substantia consistit in lib. De medicamentis demonstratum est: quare cum huiusmodi uinum ex terrestri cōmitione frigida auferū euaserit, calidos uapores sursum emittere non potest. dixi autem in principio etiam statim horum cōmentariorū, propterea quod multi sunt, qui in fracturis defluxiones huiusmodi defluere non sinunt, qualem ego in gladiatoribus adhibebam: ceratū liquidū in simplicibus fracturis assumimus, quod licet uino sit longe imbecillius, eam uim tamen habet, ut efficeret ea quibus opus est, satis possit.

22 Hæc & ad ipsum ulcus faciēda, & hinc & inde ab ulcere, neque comprimendum, nisi quantum fulcimenti causa sufficiat.

Rursus hic non de latitudine sed de longitudine membri intelligit, cum hinc & inde dicit. seruatur autem perpetuum illud præceptum, quo iussit, ut deligatio semper non parum præcipue in magnis affectionibus sanæ partis occupet

23 Supra ulcus autem picatū ceratū dandum est, aut aliquid ex ijs quæ cruentis sunt accommodata, aut ex alijs medicamentis quod irrigationi connutritum sit.

Præcipua curationis uis in deligatione consistit primis diebus, quando ab ulceratis partibus quicquid humoris eo iam defluxit, elidendū: & quod ex superioribus partibus influit, prohibendū est. à tertio uero die picatū ceratū, cū ea quæ in ulcere sunt, cōcoquat, utilius adhibet. sed Hippocrates statim à principio cum ipso facultatē etiā uini afflūgit: cum non tota substantia id ulcerato loco occurrere, sed per qualitatis diffusionem uelit: ne alia qua molestia ex astrictione affertur. non enim gladio illatum uulnus nunc curat: sed quod omnino contusam uel magis uel minus circū circa carnem habet. quippe cum ea quæ fracturā inducūt, carnis etiam aliquid cōtundere cōsueuerint. merito igitur aliquid etiam cruenti medicamentū superinjciendum censet, quod contusis conducit, mitigationemque affert. quod tamen habere uim eam uult, ut infusionem extrinsecus non repudiet, sed admittat: id est conueniens ei, consentiensque sit, id enim connutritum hic significat.

24 Si æstiuum tempus est, plagulæ uino frequenter sunt irrigandæ. si hyemale, lanæ multæ succidæ ex uino & oleo superimponendæ sunt.

Quoniam in huiusmodi affectionibus nimia perfrigeratio conuulsionis intermedium periculum affert: uino autem frigido tam habitu quam facultate utendum est: iccirco ueritus ne molestia aliqua per hyemem contingat, in qua ad curationis modum temporis quoque frigus accessit: lanarum superpositione, mitioneque olei perfrigerationis uehementiam obrūdit. uult autem lanas succidas esse ob fordes quæ cum caliditate frigiditatis etiam non nihil obtinent.

25 Petula præterea substernenda est: defluiaque obseruanda, ut effluere facile possint.

Sive capræ siue alicuius alterius pellis petulca, id est isæla appellatur, disputare hic superuacaneum puto. non enim de uerborum interpretationibus: sed de curationibus morborum hic agere nobis propositū est: ad quam satis est, si cognouerimus raram non densam pellem eam esse debere: quæ substernitur. quæ non solum quicquid ex infusione confluit, uerū etiam sanies quæ eluuntur, excipere queat, ac deriuare: ita figurata in partibus iuxta pedes, sicut superius diximus.

26 Memoriaque id tenendū, loca hæc si multo tempore eadē figuratione permaneant, intertrigines curatu difficiles contrahere.

Partes circa os sacrū quod etiam latum appellatur, cum calefuit, & intumescit, torpore, atque sub ipsa etiam cute ulcera curatu difficilia faciunt. post eam enim charitilaginea ossium capita sunt, quæ nudata difficulter sanescunt.

27 Quos autē deligatione sanare non potes aliquo modo ex ijs q̄ antedicti sunt, aut dicentur: in primis curādum est ut ij disposite fractam corporis partem ē directo detineant: attendendumq̄ ut sursum magis q̄ deorsum uergat.

Non exquisitē ē directo tenēdum esse crus censeo, sed ita, ut aliquanto altior extrema pars sit. Nā sicut dictum etiam superius à me est, figuratio decliuis facit, ut plus humoris in crus defluat, accliuus dolorem creat. Quapropter decliuis semper fugienda est. accliuus quoad dolore non afficitur crus, eatenus admittenda.

28 Si uero bene quis & facile uult operari, is adhibere etiam machinamenta debet, ut pars corporis fracta iusta & non uiolenta extensione distendatur. machinamentis autē uti in tibia maxime licet, nonnulli sunt q̄ in omnibus tibiæ fracturis & quæ deligantur, et quæ non deligantur, pedem extremū lecto, aut alicui alteri ligno iuxta lectum de fossio alligent. ij sanē mala omnia, & bonum nullum efficiunt. neq̄ enim extensioni adiumentum ullum hæc affert alligatio, cum nihilominus reliquum corpus ad pedem concessurum sit: atq̄ sic nō amplius extendetur, neq̄ ad directi rectionem quicquam prodest, immo officit. si enim reliquum corpus uel hac uel illac uersetur, uinculum nō uetabit, quo minus pes & ossa pedi annexa corporis motionem sequantur. quin si non fuisset alligatus pes, minor fieret distortio: quippe cum minus in motione reliqui corporis destitueretur.

De extensione quæ instrumentis fit, quæ totum membrum aqualiter extendit, & nullam eius partem uel magis uel minus extendi sinit, de qua & prius egit, & nunc etiam dicit: à nobis quoq̄ superius latius fuit declaratum. quæ uero de ijs qui sumum pedem alligant nunc scribit Hippocrates, perspicua sunt. his igitur omisissis, ad ea quæ de sphaeris tradit, descendemus.

29 Quod si quis sphaeras duas ex aluta Ægyptia consuat tales, cuiusmodi gestare illi solēt, qui magnis compedibus uincti sunt, quæ quidem sphaeræ tunicas hinc & inde habeāt, à parte uulneris profundiores, breuiiores ab articulis. quæ tumidæ sint et molles: ita ut altera supra malleolos, altera infra genu cruri coaptari queat. tum à latere unaquæq̄ geminas utrinq̄ appendices annexas habeat, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breues illas quidem perinde atq̄ an-

Galen.

A fas, ex utraq̄ malleolorum parte alias, alias utrinq̄ à genu. nā et superior sphaera tales alteras ē directo habere etiā ipsa debet. postea corneis uirgis sumptis æqualibus inter se magnitudine, crassitudine digitali, longitudine uero eā, ut inflexæ in appendices apte inferantur.

Oratio hæc de sphaeris mihi quidem aperta esse adeo uidetur, ut explicanda à me aliter nō sit, quia tamen nonnulli sunt qui sæpe dicant, se ignorare ea quæ ab Hippocrate dicuntur: quid agam dubito. Nam coram ijs qui dicunt se hæc non intelligere, sphaeras ipsas in medium profero: ac dum legitur liber, sigillatim unum quodq̄ quod inquit, par ti illi sphaerarum applico de qua loquitur: atq̄ ita orationē totam claram ac manifestam reddo. dum scribo autem, quia in libro monstrari sphaeræ non possunt: haud scio quo pacto declarari oratio hæc queat. nam si quis Hippocratis perspicuā loquutionem non intelligit: is quomodo meam percepturus sit non uideo. Quocirca hunc monendum esse censuerim, ut sæpe orationem hanc perlegat, diligenterq̄ ei animum aduertat. nam si ita fecerit haud dubito, quin si nō antea potuisset, nunc saltem prorsus eā intelligetur sit. Quin ego quoq̄ quicquid facere ad intelligentiā aliquā eius posse existimo, in præsentia non omitā. Sphaeræ igitur hic accipiendæ sunt non pro globis aut pilis eiusmodi ut sunt illæ quibus pueri ludere cōsueuerūt: essent enim prorsus undequaq̄ rotundæ, sed pro circulis & spiris quæ similes compedibus sunt, ut ipse inquit. cōparatio facile percipi potest. similes eas intellige anguibus, aut oblongis farcinibus. quēadmodum enim coqui interiorē intestinorum inanitatem similagine & cōtulis carnibus, alijsq̄ nonnullis farcientes lucanicas cōficiunt: sic tu ad similitudinem inanis intestini alutam consuta temento, aut molli aliqua alia re cōpleas, ac confarcias. alutam autem Ægyptiam esse uult, hoc est ualidam ac mollē. cuiusmodi si in Italia, aut Thracia, aut alibi terrarum inueneris, Ægyptia tibi pel lis requirenda non erit: tanta autem huius consutæ alutæ longitudo sit, ut crus supra malleolos orbiculariter cōprehendat, non secus ac compedes. simili modo quoq̄ infra genu. dux em in unoquoque crure sphaeræ esse debent. Vnde etiam plura tibi harum sphaerarum paria preparanda sunt, quæ magnitudine inter se differant: ut unum par maiori cruri: alterum minori applicetur, quodcumq̄ ex ipsis unicuiq̄ accommodabitur. oportet autē tunicas harum spirarū non prorsus teretes esse, neq̄ omnino & latitudine & altitudine æquales: sed qua parte corpori inherēt quodāmodo sensim dilatari, ac plane esse debēt: rotundæ uero, qua in altū conuertunt, sed neq̄ id admodū exquisitē. ex interioribus enim partib. in altū protēdunt: inde uero per externas partes rotundas earum descensus usq̄ ad carnem fertur: ut in inferiore spira depressior earum pars pedi: in superiore genu appropinquet. quib. ita cōstitutis appendices in utraq̄ hinc

inde duplices instar aurium annecti uultur: ut alia in inferiore spirā concauitate & sinū sursum spectantē uersus genu habeat: quā in superiore sunt, ecōtrario deorsum. has autē ansas utriq; spirā late re, id est à parte quā sublimiorē diximus, hinc et in de annectēdas censet: in quas quatuor uirgarum capita cōiiciant. uirgæ autē cum cōiiciunt in flexu paululū debent: ut cōiectæ dum redire in naturā lem rectitudinem nituntur, spirā inferiorē deorsum, superiorē sursum impellant. quod cum sit, euenit, ut simul & partes fractæ in conformatione exacta seruentur: & sursum altera, altera deorsum distēdantur. uirgæ esse corneas iubet ob ligni soliditatē: cuiusmodi lignum ad usus hos magis esse idoneum perspicuum est. De capsula quidem machinaria quā utilis ad huiusmodi distēctiones sit, in superiore libro dictum à me est: ubi fabricam quoq; eius explicauimus.

30 Id studuerint, ut extremæ uirgarū partes non in corpus, sed in extremas sphaerarū eminentias appellant. tria autē uel plura etiam uirgarum paria haberi debent, alia alijs aliā quantulo longiora, alia breuiora & minora: ut si magis distendere uoluerit, possit. Virgæ utræque hinc & inde à malleolorū parte collocandæ sunt.

Appelland inquit, id est innitantē & firmetur. uult enim ut uirgæ quæ inter spiras utraq; collocatæ alteram sursum, alteram deorsum impellant: corpus ipsum nō attingant: sed suspensæ in appendicibus spirarum infixæ innitantur: quas, ut dixi, ob soliditatē materiæ esse corneas iubet: ut uiolenter inflexæ, posteaquam in flexu in ansulas fuerint: in pristinā rectitudinē reducantur. perspicuum enim est, eas si ita fiet, tantum spiras sursum ac deorsum repulsuras esse: quantum extentæ in longitūdinem creuerint.

31 Hæc igitur si bene machinatus fuerit: et extensionem iustam efficiet, & æqualem ex directo. uulneri item dolorem nullum affert: & expressiones, si quicquam exprimitur, tum ad pedem, tum ad femur abducuntur: & uirgæ bene dispositæ erunt aliæ hinc, aliæ inde à malleolorum parte, ut tibiæ positio minime impediatur: uulnusq; bene & impingat & sustentetur.

Iustā dixi appellari ab eo aequalē: unde aequalē seu aequā idem esse quispiā posset existimare. sed æquum seu aequale in partibus unius rei existit: iustum de duabus rebus ad minimum dicitur. ideo nunc iustā extensionē dici intelligendū est & penes distēctionē quā dux hæc spiræ efficiunt: & penes uirgæ corneas, quæ in ipsas injiciuntur. æqualem autē penes unam quantq; ipsarum tantum: eam uidelicet quæ ad malleolos fit tantū: aut eam quæ ad genu. tū penes eam uirgā quæ à dextra parte, tum penes eam quæ à sinistra parte est.

32 Neq; enim impedimēto illud est, si quis duas uirgas uoluerit, quæ superiores sunt, inter se iungere, & si quis leuiter superponere aliquid uoluerit, ut quod superponit à uulnere suspensum sit. Si igitur sphaeræ mites & pulchræ, & molles, & recēs consutæ fuerint, & uirgarum intentio recte fuerit intertā, quemadmodum iam dictum est: utile erit machinamentum. At si horum aliquid nō bene habuerit: lædet magis, quā proderit. oportet autem ut & alia machinamenta uel bene machinemur, uel non machinemur. turpe enim est, ab arteq; alienum, si in machinamētis efficiendis machinatione careamus.

Quatuor erant uirgæ, ex alterutra tibiæ parte duæ: de super sublimior altera, altera humilior. duas igitur sublimiores posse inter se iungi ac colligari inquit, ut rectæ permaneant. ne ex uiolenta inflexione qua inflexæ fuerant: retortæ in uicinas partes distorqueantur.

33 Pleriq; tamē ex medicis fracturas & cū ulceribus & sine ulceribus primis diebus, lanis succidis curāt. nihilq; hoc præter artē esse ipsi uidentur. nā qui in recēter uulneratis quia nō habent lintea, uti lanis coguntur, ipsi ignoscendū maxime est. neq; enim quispiā ad deligandā huiusmodi habere aliquid aliud potest, quod multo melius q̃ lana sit, quantq; esse ea debet q̃ plurima, & ualde bene elaborata, & nō aspera. nā si pauca sit & praua, imbecillā quoq; uim habet. At qui ad unū aut duos dies lanis sibi esse deligandū cēsent, tertio uero & quarto linteis deligando cōprimunt, & tunc maxime extendunt: it̃ multū in medicina & ualde opportuna in re desipiunt. tertio enim & quarto die uulnera omnia minime sunt exagitāda. & ut in summa dicā, specilli quoq; omnes admotiones uitandæ his diebus sunt, omniaq; alia quib. uulnera iritātur. In totū em̃ tertius & quartus dies in plerisq; uulneribus rebellatiōes parit. & quæ in inflammationem, & sordes incitantur, & quæ cunctq; in febres tendunt. unde magni admodum momenti perinde ac quoduis aliud documentum hoc est. cum quo enim quod opportunissimum in medicina sit, nō in ulceribus tantum, uerum etiā in multis alijs morbis communicationem non habet.

Prauam medicorum consuetudinē emendare uult, qui melius esse putant, si fractum membrum non statim extēdant: sed ubi prius duobus aut tribus diebus mitigarint, tunc demum tertio

aut quarto die post initium ad extensionem deueniant. Hippocrates enim id quod maxime huic contrarium est, cōuenire ostendit, ut in principio membrum extendatur: in tertio uero aut quarto die mitigationes adhibeantur. Si igitur animum aduersus ijs quæ hic ab eo scripta sunt, omnia patebunt, clare enim explicat.

34. Nisi quis alios quoque morbos ulcera esse dixerit, nam hæc etiam quādam habet æquitatem oratio.

Æquitatem, id est *ἰσότητος* pro probabilitate hic sumit, & uerisimilitudine. hoc aut inquit propterea quod nonnullæ orationes penitus improbabiles atque absurdæ sunt. sed quæ probabilitas esse in hoc potest quod dicitur nonnulli, dum reliquos morbos quoque esse ulcera asserunt: dolorem quidem asserentes morbos in ulcerum genere constitui probabile admodum est. quippe cum demonstratum iam à nobis sit, & ex continui dissolutione dum inciditur corpus, aut intenditur, aut colliditur: & ex intemperatura dolorem existeri. continui autem dissolutionem esse ulcus cuiuslibet perspicuum est. repetitam quoque mutationem in intemperatura solutione quoque ipsam continui efficere, in libris De medicamentis demonstratum est. caliditatem enim penetrare, & quasi perrodere id quod continuum est, patet. quod uero uehementer astringit, quandam dissolutionem continuo asserere, dum repente contrahit quod diffusum est: in iisdem libris demonstrauimus. ut in hoc probabilis oratio hæc futura sit, imò etiam uera, dum dolorem omnem in ulcerum genere constituit. si autem omnes quoque morbos ulcera appellet quispiam, licet non ita uerū, non prorsus tamen à probabilitate erit alienū, nam quia plerique morbi cum dolore existunt, à plerisque ad omnes fieri transitus poterit. si omnino quispiam in toto corpore aut intemperaturam aliquam, aut collisionem, aut distentionem, aut manifestam continui diuisionem contingere asserat: deinde necessitatem asserat, subiungens omnem intemperaturam aliquam omnino continui dissolutionem si non sensui euidentem, rationi certe contemplabilem & ueram efficere. distentionem uero & contusionem, & collisionem sine ulla dubitatione multo magis: quippe cum ea quæ hoc patiuntur, eò quamproxime accedant, ut diuellantur, quæ continui dissolutio est.

35. Multifarie enim alia alijs inter se fratrāt. Quod solemus dicere nos similia inter se sunt, & communicāt, & cognationem habēt: id dicit Hippocrates *ὁμοειδὲς*, id est fratrāt, consueuit, maximam rerum similitudinem & cognationem nomine hoc præ se ferens. nam cum multa cognata inter se sint, nihil familiarius ac cognatus quam fratres uidentur. quasi igitur maxima cōuenientia & similitudo eandem uim cum fraternitate habeat: eam uerbo hoc fratrādi appellat.

36. At qui lanis sibi utendū putāt, quoad septē dies præterierint, deinde extendendū

ac dirigendū membrū, linteisquē deligandū, si non ita desipere uidentur, nam & opportunissimum inflammationi tempus præterit: & ossa laxa iam, & apta post hos dies sunt, longè tamen curatio hæc ab ea superatur, quæ inter initia linteis deligat. ille siquidē modus ægros præparat, atque efficit, ut se primo die ad deligationē cū ferulis suscipiendam idonei euadāt, hic longè posterior est.

Cum superiori oratione eos reprehenderit, qui tertio aut quarto die fracturis accommodatam curationem incipiebant: nunc ad eos transit, qui post septimū diem eandem aggressi sunt, inquit: hos in eo minus peccare, quod partibus inflammatione minus uexatis distentionē adhibet. nam illos qui tertio aut quarto die idem faciebāt, quo maxime tempore lenius ac mitigare inflammationē est opus: non leue peccatum committere ostendit.

37. Nocumētāque alia quædam habet: quæ omnia longum esset commemorare.

Vbi longitudinem temporis damnauit, in ijs qui fracturis accommodatam curationem post septimum diem incipiūt: præter eam inquit alia quoque nocumenta euenire, quæ, ne prolixior sit, oporteat, omittit. sed nos ea subiugemus ex ijs quæ superius ostēdimus. Si mediocris sit fractura, ex tali deligatione segniora sicut superius docuimus, mēbra efficiunt. si uehemētiori & maligniori modo membrum fuerit effractū, & curatio fracturis cōueniens post septimū diem differat: periculū est, ne aliquod os sidere & corripatur. à principio enim assumi eam uult, propterea quod à partibus affectis superfluentē copia sanguinis in utranque partē elidit. quæ si ibi immoretur, interdum fit, ut ossa quoque à praua sanie corrola exputrescant.

38. Iam uero quibus ossa fracta & extra eam minentia in suam sedem collocari non possunt, ijs hæc restitutio est.

Græcis qui in Asia habitant, mos est, ut restituerē dicāt pro eo quod est in propriā sedem reducere. inde mihi uidetur Hippocratis restitutiois nomen, id est *κατάστασις* sumpsisse: ut idem significet, quod collocatio, quæ est in sedem repositio. male igitur nonnulli *κατάστασις* absque σ, id est extensio scribunt. cum non modo per extensionem, uerum etiam per molitionem nudata ossa in propriam sedem collocentur.

39. Ferramēta quædā parua facienda sunt eo modo quo sunt uectes, quibus lapicidæ uti solēt: parte altera latiora, altera angustiora. quæ esse debēt tria uel etiā plura, ut maxime cōgruētibus. uti quispiam possit: deinde opus est, ut inter extendendū unū ex his subiugiamus, ita ut inferiore sui parte depressoiori olis parti subiectum, superiore eminētiori

innixum molietur. atq; ut semel dicam, non secus ac si quis uel lapidem, uel lignum uali- de moliretur. sint autem hæc ferramenta ua- lida quāmaxime potest, ne inflectantur. hoc magnū præsidiū est, si & ferramenta ido- nea sint, & molitio ut debet, efficiatur.

Ferramenta hæc forma procul dubio nō magni- tudine similia esse ijs inquit quibus lapidæ utun- tur. nam quæ adhibere ad trudenda ossa ac molien- da cōsueuimus, nō maiora ijs sunt, quæ ad dentiū euulsionem à nobis præparantur. plura autem ha- bere præparata huiusmodi ferramenta hic debe- mus, quæ inter se & magnitudine & tenuitate, & paruitate differant, in extrema uidelicet sui parte, qua maxime exercere opus solemus. quomodo autem uti ferramentis his debeamus, Hippocrates ipse manifeste declarat. ut si quis hominis loquutionē nō percipit, is nō explanatiōe neq; interpre- tatiōe alia uideat indigere, sed inspectiōe. quippe cū nonnullæ res eiusmodi sint, ut nisi eas inspiciat, neq; credere, neq; intelligere quispiam possit.

40 Nam quæcunq; ab hominibus accō- modate machinamenta excogitantur ualen- tissima omnium tria hæc sunt: asini circūa- ctiō, molitio & discuneatio. absq; horū aus- tem aut uno aut omnibus nullū ex ualidissi- mis operibus homines exequuntur. hæc igitur molitio spernēda minime est. nā uel hoc modo, uel nullo alio ossa in suam sedem cō- pellentur. quod si pars ossis quæ sursum eua- sit, præacutū quippiam præferat, ineptaq; ob id ad sedem uecti exhibendam sit: inter- limandum illud est, quo uectis insidere fir- miter queat. molitione hac utēdum, atq; in- tendendum eodem die, aut postero, nō au- tem tertio: quarto uero aut quinto minime. his enim diebus siue nō reponas sed mole- stes, siue reponas, inflātionem afferes.

Asinos & asellos axes uocat, quos etiam fuc- las dicimus. horū circumactiōnem esse unum ex ualentissimis inquit: quemadmodum etiam moli- tionem quæ uectibus fit, & discuneationem. discu- neatio autem appellatur lignorū per cuneos ada- ctos disrptio ac discissio.

41 Si tamē reponas, cōuulsionem magis induces, q̄ si reponere non potueris. hæc probe sciēda sunt. nam si ubi reposueris cō- uulsio superuenerit: nō multæ salutis spes sunt. quin retro expellēdum os est, si id fieri sine molestia possit.

Cur cōuulsionē fiant in omnibus huiusmodi affectionibus, si ossa reponantur, deinceps omnia subiungit: satisq; habet, si sicut de alijs multis ad artem opportunis, ita de his quoq; semel tantum dixerit: eandem rationem ad omnia à nobis trans-

A ferendam censens, quæ eiusdem naturæ fuerint. iam igitur orationem eius tibi ascribam, in qua generale hoc, quod multis particularibus com- mune est, docet.

42 Nō enim laxioribus q̄ opportunum sit, conuulsionē superueniunt, & rigores: sed magis intētis qua de re igitur nunc ser- mo est, nō oportet uexare in antedictis his diebus: sed dare operā ut & minime inflam- metur ulcus, & ad pus maxime perueniat, ubi autem septē dies præterierint, uel pau- lo plures, si febre caruerit, ulcusq; nō fuerit inflammatū: tūc minus obstat, quin tētes re- ponere, si obtenturū te esse speres. sin minus, nulla frustra inferenda, & suscipiēda mole- stia est. si ossa uero in sedem suam reposue- ris, traditæ sunt ratiōes quibus curare opor- teat: siue recessura ossa speraueris, siue nō re- cessura. nam si speres, linteis modo eo quo dixi, in huiusmodi omnibus faciēda deliga- tio est, à medio ut plurimum incipiendo, si- cut ex duobus inītijs fascia subligatur.

Didicimus in libris De musculorū motu unius- cuiusq; musculi operationē fieri cum ad propriā originem retrahitur. hoc aut cum inuitis nobis sit ex inflātionis magnitudine, cōuulsionē effici- untur. quod cur contingat si ossa alternata tam in fracturis q̄ in luxationibus fuerint reposita, illud est, (in hoc em̄ quæstionis huius solutio maxime consistit) quod in fracturis et luxatiōibus breuius q̄ erat membrum euadit, cum pars ossium aliqua cutē perforauit: ubi uero ossa in naturalē sedem re- dierunt, pristinā longitudinē recipit. quare etiam inflammati musculi simul cum toto membro cogi- tur extendi, atq; ita duplici extensione afficiuntur, & ea quam ex inflammatione habebant, & ea quam tunc insuper extenti accipiunt.

43 Coniectandum autem ad formam ul- ceris est, ut minime hians & digrediens in- ter deligandum sit.

D Per translationē utriusq; his uerbis usus est. nam & hias quod *συναγός*, id est rīngēs de labijs oris dicitur. digrediens, id est *εκτετατός* de cruribus gradum faciētib; atq; inter se distātib; crurum enim diductio, id est digressio appellatur, *πλάγας*, id est gressura, sicut dictum est. quemadmodū hia- re se uringere, id est *συναγής*, labra aperire dici- mus absq; ulla mandibulæ motiōe, ita ut dētes in- ter se cōiuncti appareāt. cauendū igitur inquit, ne in deligatione labra ulceris expāsa faciamus. uult enim ut ea partibus cutis sitū suum recipientibus, inter se cōtrahamus & cogamus. eo quod si ita fe- cerimus, locus minus cōprimeretur, & subiectū ul- cus in musculis suis maxime conseruabī. sciendū enim tibi est omnia quæ sub cute sunt, cute admo- dum gaudere: nihilq; quod subiectū ipsi est, ea de- nudari

nudari absq; detrimento posse. Sed quid mirum, si ea quæ propriū, & cognatū ex cute tegumentum habent, eo semper delectentur; ab alijs uero omnibus male & moleste afficiantur. Vnde ego sæpe cū partes cutis minime præciderim, sed quod detractum fuerat, extrinsecus superimposuerim, glutinari id animaduerti: quodq; magis mirandum est, cum statim ex ictu nigrescat locus esset, quin etiam maiore admiratione dignū illud est, q̄ non in adolecētibus tantū modo, sed in senibus quoq; nō paucis cum detractas huiusmodi cutis partes plagasq; nigrescatæ applicuissēmus, adhærere ac cōglutinari eas uidimus. si uero excoriata carō ita nuda relinquitur, difficulter sanescit, ut omittā quod morsionibus prorsus afficitur, & sordescit, nam medicamenta infestationes sedantia, & mitigantia, cuiusmodi est id quod liquidum hoc est *πνεῦμα* nominatur, & quatuor medicamentorum compositio quam *παραφάρμακον* appellant, absq; inflammatione quidem affectam partem seruant: sordidum tamē ulcus reddunt, at quæ ulcus purgant, utpote extergēdi uī prædicta sensum morsionis afferunt, cum uero à cutē contacta est excoariatio, nihil horū patitur. huius simile est id quod in pustulis fit, quæ multis de causis exoriri consueverunt, in tumoremq; exurgere, magnūq; dolorem interdū asserre. eas eodem modo curo. acuta ac pustulam pungo, expressoq; inde sensum humore cutē adiacentē relinquo. & cum euenit ut rursus foramine ocluso repleatur: iterum eodem modopungitur, expressoq; humore cutis carni applicatur, ac deprimitur: seruaturq; ita, quoad quod sub ipsa carne ulceratum est, cōsolidetur. Hæc dicta à me sunt, ut manifeste perspiciamus, omne ulcus indigere, ut cognata cute contegatur. ulcus uero de quo nunc agitur, non quodlibet est & leue, sed in quo tota caro per totā altitudinem diuisa ossibus est. non em̄ per cutem ossa eminere extra potuissent, nisi prius tota caro fuisset dissecta. quam sanè operiri sua cute lōge melius est. si enim nuda relinquitur, substantias ipsas impositorū medicamentorū attingens ab oleo confectis, & mitigantibus sordescit; purgantibus quæ extergunt, mordetur, sin aut facultates medicamentorū quæ imponuntur, absq; substantiā in affectam carnem per cutem penetrauerint: sicut ipsi proderūt, ita nullū huiusmodi malū afferent. merito igitur Hippocrates in id præcipue dandam operam cēset, ut talium ulcerum labra inter se cogātur. id aut recte efficies si formā ipsorum exacte cōtemplatus fueris. nam si alterū ex labris inuerum in latus inspexeris: inde deligatione ossa in contrariam partem cōuerteris, si utraq; eodem modo hient: ea fasciā ex duobus initijs iniecta inter se applicabis ac coges.

44 Alijs em̄ coalitū est, ut ad dexteram, alijs ut ad sinistrā, alijs ut ex duobus initijs deligentur. quæcūq; autē ossa frustrata repositiōe fuerint, ea scire licet recessura esse, & quæcūq; penitus carnibus nudata sunt,

A nudatur aut nonnullorū superior pars: nō nullorum circum circa carnes emoriuntur.

Coalitum est, id est connutritum & accommodatum est, & cōgruum dixit, translatione nullam utilitatem afferente usui. unde etiam notatum à me est. translatione siquidem alij quoque omnes in dicendo periti ad euidentiorē rei explicationem uti consueverunt.

45 Aliorū ex ueteri uulnere ossa quædā emarcuerūt, aliorū minime. atq; aliorū magis, aliorū minus. atq; horū ipsorū quædā parua quædā itē magna. ac propterea uno nomine dici nō possunt, quando recessura ossa sint. alia em̄ ex paruitate, alia ex eo q̄ in extremo sunt, citius recedunt. alia uero ob hoc nō recedūt, sed arefacta, et marcida effecta desquamantur. ad hæc autē curatio etiā curatione differt. In totū tamen ossa eorum citissime recedunt: quorū citissimā suppurationē, citissimā itē & pulcherrimā carnis excrescētia fiunt. subnascētes enim carnes in noxa ipsa ossa plurimū eleuant, totus tamen testæ ossis circulus si in quadraginta diebus recesserit, bene recedet. nonnulla enim ad sexaginta usq; dies perueniūt. quæ enim sunt rariora, maturius: quæ sunt solidiora, tardius; reliqua quæ minora sunt, multū intra hoc spaciū: alia aliter recedunt.

Emarcuerūt, id est *σπασμῶς*, à marcido quod est *σπῆς* dicitur. Dictum autem est, quod corrupta uocant marcida. Verū quidā non recte dixerūt; omnia uetusta ac diuturna, appellari marcida.

46 Os autē quod extra eminet his prætextibus præcidendū est: si redire in sedem nō possit, parumq; quid abesse uideatur, quin promoueatur, possitq; detrahi. si præterea nocuū sit, aliquidq; ex carnib. rūpat, sensusq; molestiā repræsentet: si itē nudum carne sit, auferrī debet. reliqua recidantur nec ne, nō multū refert. certo em̄ sciendum est, ossa quæcūq; carnibus prorsus priuantur, atq; arefiunt: ea penitus quoq; esse recessura. quæ autē eō uentura sunt, ut desquamantur: præcidenda non sunt. quæ penitus fuerint recessura notis præstitutis cōiectandū. plagulisq; & uino, sicut etiam superius scriptū est de recessuris ossibus, curatio adhibēda. cauēdūq; est ne frigidis primo tēpo re attingamus. quippe cū horrorū febriliū, necnō cōuulsionū periculū impēdeat. frigida em̄ cōuulsionē semp̄ puocat: & in superiq; exulcerat, scire autē oportet necessario breuius

breuiora ibi corpora fieri, ubi utraque ossa A
fracta et alternata curantur: quibusq; totus
testa ossis circulus recessit.

Nunc quoq; Hippocratem nō falsas causas, sed
ueras, prætexus dixisse perspicuū est. tota hæc de
marcidis ossibus oratio satis clara est. iubet enim
ut quæ repositiones impediunt, resecentur: quæq;
tangentes carnes pungūt, & sicut ipse inquit, mo-
lestiam sensus repræsentant, id est grauem sensum
doloris afferunt, ostendit etiam ossa quæ carnibus
denudata sunt, & nō statim fuerūt reposita, quæq;
aruerunt, decidua esse.

47 Quibuscuncq; os brachij aut femoris
extra eminet, hi non admodū euadūt. nam
tum ossa magna sunt & medullosa: tū mul- B
ta ea sunt & peropportuna, quæ uulneran-
tur, nerui, musculi, uenæ. ut si ea reponas,
conuulsiones soleant superuenire: si non re-
ponas, febres acutæ, & biliosæ, & singu-
tuosæ contingant: atq; insuper nigrescant.
illi magis euadūt, quibus neq; reposita fue-
rint, neq; tentatū, ut reponantur: magis ue-
ro si quibus inferior ossis pars, q̃ quibus su-
perior extra eminet. supersunt etiā quibus
reposita fuerūt, sed raro tamē. curæ enim cu-
ris, & naturæ corporū naturis ad facilius to-
lerandū lōge præstant. multū item refert in
interiōrē ne brachij aut femoris partē ossa
extra emineāt. multæ em̃ & opportunæ ue-
narū productiones in interiore parte sunt,
quarū nōnullæ si uulnerētur, iugulant. sunt
etiā in exteriorē parte, sed minus. in huius-
modi igitur uulneribus qualia pericula im-
pendeāt, ignorandū nō est: prædicēdumq;
in occasionibus, & si reponere ossa cogaris,
speresq; te id exequuturum esse, nec multa
ossis alternatio sit, musculiq; nō concurre-
rint: solēt em̃ cōcurrere: molitio cum exten-
sione his quoq; bene ferre opem poterit.

Nam tam ossium magnitudo quē nudata sunt,
q̃ musculorum, & neruorum, & uenarum, & arte-
riarum uulnus, periculū affert. atq; insuper quod
id prope originem musculorum & neruorū est: di-
ctum autem est in tractatione de ipsis solere mus-
culos cum ossa alternātur, in seipsos cōcurrere: id
quod sæpe his in libris repetitum iam est. reliqua;
si quis animum aduertat, clara sunt.

48 Cum reponis aut ueratri mollis potio
nē exhibere debes eodē die, si eodē die re-
posueris: sin minus, ne tentādum quidē est.
ulcus uero eodē modo quo ossa capitis fra-
cta curandū tibi est. nihilq; frigidi admo-
uendū cibiq; penitus circuncidendi.

Quid molle hic significet in dubio est. nam uel
qualitatem uel quantitatē potionis eius indicare
non est obscurum. sed neq; quod paucum quanti-
tate est, molle recte dici existimaret quispiā. neq;
modum aliquem quo confici molliter queat, faci-
le est intelligere. nos sanē raphanos ex aceto mul-
to interdum damus, in quibus die ac nocte ueratri
ramusculus infixus fuerit. sed huiusmodi ueratro
facta purgatio imbecillia esset, inuenire tamen ue-
rum non licet, propterea quod ab ipso, quomodo
ueratrum exhibeat, scriptum minime est. complu-
res enim exhibendi eius modos à multis tum ue-
teribus, tum recentibus, tum medijs ætate medi-
cis scriptis traditos esse non ignoramus.

49 Et si amara bile natura præditus sit
mellæ odoratæ parū in aquā destillandum:
eoq; uictu sustinēdus æger est: sin autē ama-
ra bile nō abundet, aquæ potu est utēdum:
siq; febris continua laboret, quatuordecim
diebus ad minimū: sin febris careat, septem
diebus idem uictus exhibendus est.

Hanc lectionem Artemidorus qui Capito co-
gnominatus est, contrario modo scribebat: cum
amare biliosus exhiberi mellam: non amare bilio-
sis aquam, nollet ita igitur legebat. Et si amara bi-
le natura præditus non sit, mellæ odoratæ parum
in aquam instillandum: eaq; alendus æger est. sin
autem amara bile abundet aquæ potu est utendū,
quā sanē lectionē multi alij unā cum Artemidoro
priori anteposuerunt, & quidē cum idem Artemi-
dorus illam orationē in libro De uictu in acutis in
qua de aquæ potu agit Hippocrates neq; sitim fecit,
sed insuper amarefecit. naturæ enim biliosæ biliosa
est, et præcordijs mala. sed cū in inanitatē ingressa
fuerit, tunc uero pessima, & biliosissima est: imbe-
cillitatēq; maxime inducit. cum enim nōnulli scri-
bit, naturā em̃ biliosa est, et præcordijs mala: ipse
Artemidorus priorē lectionē admittit, in qua scri-
bitur, naturæ enim biliosæ biliosa est. nō absolute
cuiuslibet naturæ, & cunctis: sed soli biliosæ bilio-
sam esse aquam asserēs. qui sit igitur, ut eam nunc
amara bile redundantibus præbeat: nisi scilicet ama-
ra bile præditos alios esse q̃ biliosos existimet. sed
in quibus plurimum amara bilis gignitur, eos hic
amare biliosos, id est *πικροχολους* uocari, nemo est
qui nesciat. nam altera bilis quæ atra uisū est, aci-
da: quæ uero pallida & flaua cōspicitur, amara est.
patet itaq; in proposita hac oratiōe ob affectiōes
quibus æger opprimitur, abstinentum omnino à
uino esse. sed si quis natura amara bile præditus sit,
quia ei aquæ potio læsionē non mediocriter affert:
sicut in libro etiam De uictu in acutis dictum est:
parum mellæ tantūmodo ipsi exhiberi concedit.
quod *ἑφ' ὅλυνον* dicitur, quod etiā *ἀπὸ μίλι*, id est
mella seu mellis decoctū nuncupari solet. nam ne
neruofas partes attenet hoc eligi, quod dulcius
est. quippe cū minus noxiū sit, q̃ quod est acidius,
præsertim si ex melle & aceto fuerit cōfectum: &

non, sicut dixi, ex maceratis fauis. in Gracia enim & præcipue in Elide ita confici solet non id conficimus aceto cum melle commisto: tantisper tamē simul decocto, quoad & utrorunq; qualitates inter se uniantur, & aceti uis retundatur.

50 Deinde ex additiōe pro ratione uulgaris uictus inducendus. quibus autē ossa nō reposita fuerint, ijs eandē purgationē, & ulcerū curationē, & uictū simili modo exhibendum: & suspēsa pars corporis nō extendenda, sed contrahenda potius, atq; adducēda: ut laxior circa ulcus pars efficiat. at si ossiū recessio, quēadmodum etiā superius diximus, longinqua est. quare talia, si quis modo facere id honeste potest, præcipue fugiēda sunt. cum & spes paucæ subsint: & pericula multa impēdeant: & si nō reponas, impēritus artis existimeris: si reponas, propius ad mortē q̄ ad salutē hominē deducturus sis.

Vulgarē uictum, id est *quadrupedum* appellari ab Hippocrate eum qui tenui et exquisito est contrarius, dictum etiā superius a me est.

51 Prolapsiones & dimotiones ossium in genu quā in cubiti articulo benigniores multo sunt.

Prolapsiones ossium integras alterationes: dimotiones, non integras uocat. benigniores uero dixit, id est *obscure* in proprio significato sumpto uocabulo. significat enim eum qui bonis moribus præditus est, cum em benignus seu simplex qui *ἀνδρὺς* dicitur, pro stulto accipitur: improprie sumi consuevit: non secus ac dulce & pulchrum: cum & lucum qui dijs dicatus fuerit, bene auspicandi causa dulcem: & simiam pulchram appellamus. nam etiā hoc dicere soleamus, quemadmodum etiā Callimachus inquit, Bestia namq; unam ante horam non dicitur esse.

52 Nam femoris articulus pro magnitudine quam brachij expeditior est.

Genu ipsius iunctura duobus ossibus inter se connexis constat, femoris & tibiæ. in quibus cum sicut in alijs omnibus, sinum quendam esse oporteat, qui prominens alterius caput excipiat: caputq; hoc rotundum ita esse debeat, ut apte & sine ulla molestia in cauitatem eam inseratur: femoris extremitas inseritur: tibiæ caput insertam excipit, tibiā em cum femori subiecta sit, duo eius capita duobus sinibus suis qui nerueo & cartilagineo discrimine apte distinguuntur, admittit. cicero merito hic Hippocrates inter se iunctorū ossium articulum appellans, non eius ossis esse inquit quod eminentiam alterius suscipit, sed eius quod in alterius sinu insertū firmat, etiā nunc inquit, femoris articulus expeditior est, quoniam femoris tibiæ innexus articulus, id est inferior femoris extremitas expeditior, q̄ brachij est. qd perinde est ac si magnitudine minor dixisset, non tamen absolute mi-

nor hæc est q̄ brachij extremitas, quæ cubito innestitur, sed magnitudinis utrorūq; habita ratione. nā si inferior caput femoris magnitudinē eius corresponderet, longe maius id esset dicendum q̄ brachij, sed non ita res est. multo maius liquidem est femur q̄ brachiū. quocirca fit, ut minor femoris extremitas quæ ad genu est, q̄ brachij, quæ est ad cubitum, recte esse dicatur.

53 Et iustam naturam solum habet, atque eam rotundam.

Iustum apud Hippocratem, ut sepe dictum est, æquum seu æquale significat: sed quo modo solum hunc articulum æqualem naturā & formam habere dicat, consideremus. inueniemus enim ob id quia partes in eo non abundat: q; partes eius omnes inter sese similes sunt: q; totus unus dearticulationem habet. nam cum in duo rotunda capitula hac parte desinat femur, ea in duos æquales tibiæ sinus inserit. atq; ita equali & magnitudine & figura dearticulatioē connectit. accedit q; utriūq; & femoris & tibiæ extremum ē directio sui situm obtinet. unde merito articulum hunc iustam, atq; æqualem naturā habere dicere quispiam posset. pars em superior femoris ad coxā caput neq; ē directio femoris constituit (abire enim id in interiorē partē uidetur) neq; pro ratione magnitudinis habet: quippe cum longe crassius femur ipsum sit quā caput. caput igitur brachij magis q̄ femoris habita ratioē censetur, licet molē minus eo sit, neque ē directio brachij procedit. Verum si reliquas quoq; articulorum iuncturas inspicias, quæ omnes has equalitates quas in genu esse diximus habeat, reperies nullā age enim inferior tibiæ extremitas quæ sura cū talo dearticulat, neq; appendices, neq; sinus pro ratione ossiū habet. nam si ita esset, sicut tibiā longe crassior q̄ sura est: sic quoq; maiorem eius appendicē esse & in interiorē sinu ubi innestitur, & in exteriorē gibbositate, oportere. sed hoc non ita se habet. adde quod in talo quoq; ipso quæ dearticulatur, simplex figura nō est, sed uaria atq; in partibus longe diuersa. similia in articulo etiam manus & cubiti et radij inuenies, quæ omnia si uelim commemorare, in nimiam prolixitatē incidam: & multo magis si omnium aliarum dearticulationum naturam cogar explicare: puta maxillæ, uertebrarum, & ossis eius quod latū appellatur. Quapropter melius mihi uidetur esse, ut oratione hac tota in breuem summam collecta, ad alia pertrascam. breuis summa hæc est. De ossium omnium natura unus a me conscriptus est liber: ubi uniuersulq; magnitudo, & forma, & dearticulatio explicata est. si librum eum legeris, uerum esse in omnibus articulis hoc deprehēdes, quod in præsentia hac oratione asseritur: solum hunc uidelicet in genu esse articulum qui uisū & æquali prorsus de articulatione iungatur.

54 At brachij articulus & magnus est, & sinus plures habet.

Cum iuncturam genu & cubiti inter se cōparare proposuisset, affectionesq; ossiū in genu ostendere

dere, quàm in cubito mīiores contingere, dixisset; articulum femoris pro ratione magnitudinis quod brachij expeditior esse: satis erat si iustam naturam habere eum subinxiisset, & quidem quum solam circa cubitum dearticulationē conferat. sed quia solum quoque ex omnibus ita esse eum dixit: effecit, ut aliorum quoque articulorum mentionem facere necesse ipsi fuisset, quorum nullus reperitur, qui simplici natura præditus sit: sed omnes & figura & magnitudine inæquales & dissimiles in partibus conspiciant. nunc igitur cum ad brachij dearticulationē venerit, eiusque partes inæquales ac dissimiles esse declarat: orationē eius sequuti, singula quæ dicuntur, iam explicemus. Maius esse inquit caput brachij quod cubito innectitur quàm femoris non iniuria. latius siquidem ea parte euadit, in pluræque capita discinditur inæqualia, quæ *αὐλῆς*, id est tubercula uocant. Concauitas uero nullum horum excipit ut in genu, sed trochlea rem tantum rotunditatem quæ in medio eorum existit, ex ipsis uero cōdylis & tuberculis, id quod in interiore parte est nullum obiectum os habet quocum dearticuletur: alterum quod in exteriorē partem uergit, cum radio connectitur ab eius sinuata extremitate comprehensum. atque ita fit, ut cubitus & radius brachium excipiant. alio modo brachium contra cubiti uertices intra se admittit. duos enim utrinque accommodatos sinus, alterum minus descendente in anteriore parte: in posteriore profundior alterum habet. unde etiam cubiti uertices, quos *ἀγκύρας* sceminio & *ἀγκύρας* neutro genere, id est cornices uocant, qui in sinus inferuntur, inæquales etiā ipsi sunt. maiorque est qui in posteriore parte prominet. Quare articulatione quæ ad gibbum cubiti est, uariam & inæqualem, & dissimilem partibus esse, iam patet: ut recte dictum ab Hippocrate sit, articulum ad genu iustam habere naturam, brachij non ita. plures autem hunc sinus habere dixit, si ad genu comparetur. duo enim soli tibiæ sinus sunt, & femoris tubercula item duo, quæ eō inferuntur. at in cubiti iunctura unus est cubiti magnus sinus, quem duæ cornices quas diximus, determinant. tres brachij: duo excuati quasi fossilæ, in quos cornices cubiti insiguntur; unus in medio insitit trochleæ rotundatus.

55 Præterea tibiæ ossa similia inter se longitudine sunt: & paululum quid, quod momenti tamē nullius sit, exterius os excedit: idque nullius magnæ rei impedimentum affert: unde exterior tendo poplitis exoritur.

Paululo maius exterius os, quam suram uocant, esse inquit, id quod superius etiā dixit, ubi De curatione simplicium tibiæ fracturarum loquebatur, nos uero sicut illic, ita quoque hic dicimus, in inferiore parte suram excedere: in superiore ad genu supereminere tibiæ magis dici posse. femur enim cum sura dearticulatione non connectitur. sed ut modo diximus, exterius ipsius caput, in cavitatē tibiæ quæ ea parte est, insinuatur. quod asserit inquit nullius id magnæ rei impedimentum afferre, ipsi qui

A libros De usu partium legerint, esse manifestum potest: in quibus demonstratum est, omnium articulum iuncturarum fabricam ad duo hæc spectare, ut & operationes non impediat, & excidentibus, sicut nuper appellauit Hippocrates, id est luxationibus, impedimentum afferat. sinus superficie tenuis & non alte desidentes, & laxæ copulæ, operationes ne impediantur, præstant: ut uero luxationes prohibeantur, sinus & excuati, & magna supercilia habentes, copulæ ualidæ, sed longitudine breues, tum qui extrinsecus circumiecti sunt, tendones ualidi & solidi efficiunt, nihil igitur est, quod in iunctura suræ ad genu impedimentum hoc faciat præter partem quid, quod ipse etiam indicauit, sed dicitur unde exterior tendo poplitis exoritur: dum opus non est ut exactioris cognitionis causa dissectionē in quibuslibet expectes, quæ euidenter etiam ante dissectionem apparet tendones autem, id est *τένοντες*, proneruationes, id est neruas musculorum partes uocari sæpe à me dictum est. tendo hic in exteriori parte genu cum iuncturam astringat, præsidio cuidam est, & impedimento, ne in eam partem prolabi femur queat.

56 Cubiti uero ossa inæqualia sunt: & breuius, longe plenius est: tenuius uero multo supereminet & excedit articulum.

Cum cubiti ossa inæqualia esse hic dicat, id non ad tibiæ comparisonem ita dictum est, ut ea inæqualia non habere ossa intelligatur: quippe cum in ea quoque os exterius longius modo esse dixerit. sed quia quod in ea exterius os est, exiguo admodum excessu exuperat, cubitus multo excedit. nam si diligenter animum aduertas, suram in superiori parte parum quid deficere à tibiā deprehendes. ut licet in inferiori capite manifeste sit longior: quia tamen in superiori deficit parum admodum excedat. at cubitus toto gibbo qui *ἄγκυρ* dicitur, radiū exuperat. ac propterea inquit, articulum excedit, uel dearticulationem, & iuncturam totū articulum appellans, uel finem brachij, qui cum sinu cubiti sigmaroide, id est sigma C literæ figuram imitante connectitur.

57 Atque hoc tamen neruis in cōmuni ossium coniunctione annexum est.

D Neruos hic quemadmodum ubique solet, copulas ipsas appellat, copulas enim latas & membranas dearticulationis huius neruos hic nuncupari ex his etiam quæ deinceps subiungit, apertū est. uerum illud etiam constat, nullum ex his qui nerui propriè nominantur, in os aliquod definire, quippe cum id copularum proprium sit: sicut per ipsas etiam tendonum quod mistam substantiam ex copulis & neruis habet. Sed de huiusmodi omnibus in libris De moriōe musculorum satis dictum est. nunc quod in oratione hac inquit, explicandū est. Annexam esse inquit partem excedentē cubiti, id est gibbum copulis quæ articulationem hanc cōtinet, ea parte qua ossa, id est cubitus, & radius cōmunem habent coniunctionē. inquit autem hoc, propterea quod quicquid inde retro procedit nudi-

dum carnea substantia, nullam cum copulis iuncturam huius connexionem habet. ipsi enim innescitur iuxta ligamina dilatatus tendo musculi qui iuncturam gibbi extendit.

58 Maioremque partem annexionis horum nervorum in brachio tenue os quam crassum habet, atque horum quidem articulorum, ossiumque cubiti natura huiusmodi est.

Hæc oratio est, qua dixi manifestum fieri, totius dearticulationis copulas nervos ab ipso vocari; quæ ex inferiori brachij extremitate exortæ cubiti & radij capitibus quæ hac parte sunt, innescuntur. in omni enim iunctura hoc est. adeo uero lata hæc copulæ communes dearticulationis ossibus circumicte conspicuntur, ut crassæ membranæ quædam esse uideantur. atque hæc quidem licet radij capiti quoque innexæ sint: maiorem tamen partem cubiti occupant. propterea, inquit, maiorem partem annexionis horum nervorum in brachio tenue os quam crassum, id est cubitus & radius habet. nam annexi quidem sunt utrique copulis quæ è brachio exoriuntur, quos nervos appellare eam dixi: maiorem tamen annexionis partem cubitus habet.

59 Atque ideo ex naturæ modo ossa genu sæpe cum elabatur, facile redire consueverunt.

Ossium enim quæ utranque iuncturam constituunt, astricta in cubito: in genu laxior coaptatio est. nam cum ibi multæ prominentiæ ac multi sinus inter se inserantur, iuncturam cubiti undique stringunt. in genu uero cum tubercula femoris in sinus tibię supinos, neque excavatos ineant, merito fit, ut iunctura ea sicut ad lapsum proclivior, ita ad redeundum in sedem facilius sit.

60 Et neque inflammatio magna neque uinculum articuli euenit.

Cum ex uiolentiâ & luxationis & repositionis inflammationes oriuntur, merito in genu quia facile utraq; hæc efficiunt, nulla inflammatio superuenit. & cum inflammatio non fiat, neque uinculum articuli contingit. cum uidelicet articulus post curationem ægre mouetur, ut neque extendi neque inflecti facile queat. id quod euenire consuevit cum ex magna inflammatione reliquæ aliquæ affectiones in nervis & copulis superfunt. inde enim articulus motionem admodum difficilem consequitur: ut uinctus esse uideatur. nam cum tendones & copulæ neque in extensione neque in flexione sequi mouentes musculos possint, sed ex duritie quam contraxerunt, renitantur, uinculo perquam simili affectione euadit. adde quod in cubiti iunctura si ex prætenuis cornicibus cubiti capitulis aliquid tum in luxatione, tum in repositione refringatur, multa ibi ex retrimento congestio difficilior & molestius articuli uinculum efficit.

61 In interioriorem partem plerumque, interius dum in exterioriorem, quandoque etiam in oppositam prolabantur: quorum omnium res

Galen,

A positiones difficiles non sunt. sed cum extrorsum & introrsum lapsus est factus, hominem in humili aliquo sedili collocatum altius crus, non tamen multo habere oportet.

Qua parte magis constricta est iunctura, eam in partem minus labitur. firmissime autem constricta est in anteriore parte, ubi est patella: quæ nonnulli medici quia supra totum genu incumbit, supergenualem uocant. nam hanc extrinsecus tædo quidam latus confringit, qui cum originem ex anterioribus femoris copulis habeat, transcendatque patellam totam, tibiæ capiti innescitur: atque ita fit, ut anterior genu pars, tum patella, tum hoc, quem dixi, tendone in tibiæ usque caput innexo firmiter coarctetur. posteriorem uero partem quæ non admodum rotunda est caput musculi qui tibiæ inflectit, coercet. musculus is paruus cum sit, ac propterea in iunctura ipsa occultetur, dissectionis studiosos latuit: caput tamen crassissimum ex ualidissimis copulis constitutum habet. Reliqui duo iuncturæ huius loci sunt, exterior, & interior: qui nulli huiusmodi, ut anterior & posterior, tutela muniuntur. quod circa in has partes, atque in interioriorem magis, quæ minore constrictione firmatur, prolabi femur consuevit.

62 Extensio uero ut plurimum mediocris sufficit, ut altera parte tibiæ, altera femur in diuersa extendas.

Cum de extensione dixerit, de repositione nihil expressit: quasi clarum nobis id satis sit, in una quaque repositione in contrariam partem articulum elapsum esse propellendum. ubi autem eminentia aliqua ossis oblonga suspendi, ossis quod reponendum est, è directo statui debet: quid agere oporteat, non omittit. sicut in iunctura cubiti fecit. sed de genu & poplitis luxatione nihil prorsus dixit: cum eadem repositionis ratione utendum sit, quam adhibemus, cum uel in exteriori uel interioriorem partem articulus prolabitur. post extensionem enim quæ simili modo fit, articulus in anteriorem partem retrudendus est.

63 Ossa uero flexuræ cubiti turbulentiora quam genu, reposituræ: difficiliora etiam ob inflammationem: nisi statim quispiam ea reponat. minus quidem quam illa prolabantur, sed restituantur, & reponuntur difficilius: magisque inflammationem insuper patiuntur, & superoccalescunt. continguntque plerumque etiam horum paruæ declinationes: cum aliàs in partem ad costas, aliàs in exterioriorem dimouentur, non tamen ita, ut totus articulus excidat, sed subsistit aliquid in cavitae ossis brachij, qua cubiti partem supereminentem habet, huiusmodi lapsus siue hac siue illac fiat, reponi facile potest: satisque est, si extensio è directo brachij efficiatur.

tom. 6

R tur

tur, ut dum alter ad articulum manus intendit, alter circumiectis sub alam manibus retrahit: medicus altera manu ad articulum egressum palma applicata trudad, altera iuxta articulum retrudad. quippe cum huiusmodi prolapsiones obtemperare repositioni non tarde soleant: si quis prius quam inflammetur, eas reponat. luxantur autem ut plurimum in interioriorem partem magis. sed etiam in exterioriorem prolabitur. id quod figura facile innotescit. sæpeque hæc sine etiam ualida aliqua extensione in sedem restituuntur. oportet autem ut cum in interioriorem partem facta prolapsio est, articulum in naturam suam repellamus: cubitum in pronam partem magis circumagamus. ac prolapsiones quidem cubiti pleraque huiusmodi sunt. Si uero articulus uel hac uel illac transgressus fuerit supra os cubiti quod in cauū brachij prominere, quod quidem raro contingit: si tamen fiat, extensio que per directum fit, non amplius simili modo est accommodata. in huiusmodi enim extensione os cubiti prominens brachij transgressionem prohibet. Quocirca his qui ita luxati sunt talem extensionem adhibere debemus, qualem superius descripsimus, cum fracta brachij ossa erant deligenda: ut ab ala uide licet in superiorem partem intendamus, à cubiti ipsius gibbo deorsum urgeamus. ita enim maxime brachium supra suum sinum suspendetur. quod ubi factum fuerit, palmis manuum constitutio effici facile poterit: si altera egressam brachij partem tradamus: altera os cubiti iuxta articulum retrudamus. eodem modo utraque, sed minus tamen. extensio hæc huiusmodi prolapsionis iustissima est. reponi etiam extensione in directum posset, sed minus tamē quā hoc modo. At si in anteriorem partem prolabitur brachium, rarissime autem id fit, sed quidnam repentina eluctatio non eieceret? multa enim præter etiam naturam suam excidunt, etiam si magnum aliquod obstet impedimentum. huic autem eluctationi magnum quoddam obstaculum est, & os crassius quod superiacet, & multa neruorum intesio. nihilominus tamē quidam eluctantur. signum huiusmodi eluctationis est quod nulla ratione inflectere cubitum queunt, & articulus, si attrectetur, patet. si igitur non statim reposuerimus,

uehemētes & uiolentæ inflammationes, nec non febriles oriuntur. sin autem statim occurrat aliquis, facile reponitur. oportet enim ut duro aliquo linteo non magno conuolutō, ac per transuersum in flexurā cubiti cōiecto, cubitum repente consecretamus, ac maximum quammaxime ad humerum adducamus. his ita luxatis satis quidem hæc repositio est: uerum etiam extensio indirectum bene coaptare hunc modum repositionis potest. palmis tamen manus alter brachij extantem partem ad flexuram in posteriorem partem detrudere: alter ab inferiori sursum cubiti gibbum ex directo cubiti protrudere debet. potest etiam huic modo prolapsionis illa extensio adhiberi superius scripta, qua ossa brachij fracta cum deliganda sunt, extenduntur, atque ubi ita extensum fuit, sic palmis conformandum est, ut prius est dictum. At si in posteriorem partem brachium exciderit, quod raro euenit, maximosque omnium dolores, febresque continuas, meretque biliosas, & letales, paucisque diebus conficientes affert: quibus id euenit, si extendere, atque explicare brachium nequeunt. si his à principio accesseris, uim afferre debes, ut cubitum protendas: & sponte articulus restituetur. si uero febris præoccuparit, reponendum amplius non est. dolor enim, si cogere quicquam uolueris, augetur. ut autem in uniuersum dicā, neque alius quispiam articulus, cum febris adest, & minime omnium cubitus tentandus est. aliæ quoque noxæ circa cubiti gibbum molestæ, ac turbulentæ contingunt. hic enim quandoque os crassius ab altero dimouetur, ita ut neque consecreti brachium, neque extendi similiter queat. id autem manifestum fit, si in flexura cubiti iuxta uenæ dissectionem quæ supra musculum fertur, contrectemus. quibus hoc accidit, id in suam naturam restituere facile non est: quippe cum neque alia ulla duorum ossium communis coherencia quam *συμφύετα* appellant, ubi diuisa est, in pristinam naturam reduci ualeat: sed necesse est, ut ea pars qua disidentia facta est, turgidior appareat. quomodo uero in articulo facienda deligatio sit, in deligatione circa malleolum dictum est. At enim nonnullis os cubiti quod brachio subiectum est, frangitur: quādoque chartilaginea eius pars, unde tendo posterior

sterior brachij exoritur. quod cum sit, febris ac malignum euadit. articulus quidem in sua sede manet: æqualiter enim basis eius ea parte superexcedit. quando uero is abductus est ea parte qua caput brachij superstat: erraticus magis ac uagus articulus euadit: quàm si prorsus abrumpatur. minus noxia enim, ut summam dicam, sunt cuncta ossa quæ franguntur. quàm si non ossa frangantur, sed uenæ & nerui opportuni his in locis contundantur. hæc siquidem propius quàm illa ad mortem accedunt: præsertim si continua febris occuparit. Sed huiusmodi tamen fracturæ raro euenire consueverunt. Quandoque uero hoc caput brachij circa appëdicem frangitur: idque multo magis noxium uidetur, cum tamē multo benignius sit, quàm quæ in cubito accidunt. Quomodo igitur singula luxata & reponi maxime conueniat, & curari, scriptum est. confert enim ut articulus statim ob celeritatem inflammationis neruorum reponatur. nam si etiam statim postquam exciderunt, repositio fiat, solent nerui contendere, & aliquandiu extensionē quam facere consueuerunt, & inflexionē impedire. omnia autem hæc simili modo curari conuenit, siue frangantur, siue dissideant, siue prolabātur. cuncta siquidem hæc ex linteis multis, & plagulis & cerato, non secus atque aliæ fracturæ, curanda sunt. figuratio uero cubiti in his etiam prorsus facienda eiusmodi est, ut in ijs fiebat quibus brachium fractum aut cubitus deligabatur. communis enim maxime omnibus luxationibus, dimotionibus, & fracturis figuratio hæc est, nec non ad distensionem quæ postea facienda est, et ad singula extendenda, & inflectenda. hinc enim uiæ ad utraq; similes sunt. facillima præterea ægrotanti hæc figuratio est, ut & gestetur, & appendatur, adde quod si callus occuparet ex-

Galen.

tentum brachium, melius esset si non adesset: quippe cum multo impedimento et paruo adiumento sit. si inflexum, esse magis usui posset. at si mediam figurationem obtinens callo obducatur, illud uero multo melius usuique accommodatius est. atque hæc de figuratione. Deligandum autem est initio primi lintei supra læsam partē iniecto, siue fracta, siue luxata sit, siue dissideat: conuolutionibusque primis supra hanc eandem factis, ita ut maxime ibi, minus hinc & inde constringamus. deligatio uero communis & brachio et cubito facienda est, quæ multo maiorem partem utriusque occupet, quàm plerique faciunt: ut quamlongissime à noxa hinc & inde tumor exprimatur. acuta infusper cubiti pars circumdanda est, siue in ea noxa fuerit, siue non fuerit: ut ne ibi circa ipsam intumescencia colligatur. cauendum autem in deligatione est ne multum lintei in flexura cubiti collectum sit, quatenus fieri potest. comprimendumque maxime iuxta noxam est. cætera de compressione & laxatione ipsidem temporibus singula obseruanda, sicut superius in ossium fractorum curatione scriptum est. religationes item tertio post die fiant. tertio item die laxum esse uideatur, sicut tunc. Ferulæ etiam conueniente tempore circumdantur. nihil enim ab re est, tam quibus fracta ossa sunt, quàm quibus minime: nisi febriant. quam laxissimæ. tamen aliæ à brachio aliæ à cubito collocatæ, quæ non crassæ sint. inæquales uero esse eas necesse est, ut inter sese alternentur, quatenus conferat, coniectura à conflexione sumpta. Plagularum quoque appositio talis facienda est, sicut ferularum. crassiores enim paulo circa noxam applicandæ sunt. tempora autem ab inflammatione, et ab ijs quæ superius scripta sunt coniectare oportet.

Explanatio deest.

tom. 6

R 2

CL. GALENI IN LI- BRVM HIPPOCRATIS DE

ARTICVLIS COMMENTARIORVM

Liber primus.

Ioanne Bernardo Feliciano interprete.

PROLOGVS



LIBRVM hunc sequi A
superiorē De fractu-
ris licet in superiorib.
cōmentarijs dictum à
nobis iam sit; nunc ta-
men breuibz etiā de-
clarabimus. Hoc pri-
mū ex principio utri-
usq; libri cognosci fa-
cile potest. ibi em̃ ita
exorditur: Medicum
oportet luxatio nū & fracturārū q̃ directissimas
extensiones efficere, manifeste declarans De fractu-
ris et luxatiōibus sibi esse futurā dissertationē.
nunc uero in ipsa statim huius libri fronte. autem
coniunctionē posuit; quā orationem nunquā om-
nino incipit, sed antedictis alijs subiungi consue-
uit. tamen nōnulli sunt, eō sapientiā prouecti, ut
libri Xenophontis De re familiari faciant mentio-
nem; eiusq; testimonio confirmare existimēt, mo-
rem veterum scriptorum esse, ut autem coniun-
ctionem in principio etiā orationis constituent.
aiunt enim Xenophontē librum eum in hunc mo-
dum auspicari, Audiui autē ex eo cum etiam de re
familiari talia apud me differeret; non aduertētes
librum eum à superioribus dependere; atq; esse ul-
timum eorum, quos De Socraticis cōmemoratio-
nibus antea conscripsit. Sed rerum præterea ipsa-
rum doctrina librū De articulis subsequi ad eum
De fracturis indicat. nam cum in superiore De lu-
xationibus & fracturis dicere fuisset pollicitus,
quæcumq; ibi prætermisit, hic adiungit, ne doctri-
næ quicquā deesset. unde etiā dixi nōnullos asse-
rere totam hāc tractationē in duos libros ab Hip-
pocrate ipso minime fuisse distinctā, sed uno tan-
tum libro comprehendam, qui de ijs quæ in medi-
catrina sunt, ab ipso fuerit inscriptus; deinde ob
magnitudinē ab aliquo alio in duos libros fuisse
diuisam. nam in his nullum neq; luxationis, neq;
fractionis genus fuisse omisissim, præter eas quæ in
capite contingunt, propterea quod aliū peculia-
rem de illis librū conscripserit: clarum tibi esse po-
terit, si ea quæ in libro De fracturis docuit, & quæ
in hoc est pertractaturus, cōsideraris. in illo enim
primum de cubiti & brachij, tibiæ & femoris fra-
cturis scripsit. deinde ijs quæ in pede & manu ac-
cidunt; tum de ijs quæ cum uulnere cōtingunt, in
quibusq; ossa aliqua denudāt; postremo de omni-
bus quæ ad genu & cubiti gibbum euenire cōsue-
uerunt. restabant ex articulis, humerus, coxa, ma-
xilla, & ipsa dorsi; ex fracturis, quæ in costis, ma-
xillis, naribus, auribus sunt: de quibus omnibus

hic in libro disseruit. quinetiam De dissidētia os-
sium, & contusionibus circa articulos in utriq; li-
bris cum dicat; si quid in libro De fracturis præter-
misit, hic adiungit; ut nullū amplius neq; fracturæ
neq; luxationis, neq; ossium dissidentia genus re-
liquum omnino sit. acceditq; De contusionibus
quoq; dictum est, quæ circa musculos & uenas &
nervos cōtingunt, quæ sanē omnia licet satis ido-
nea sint, ut cōsequutionē libri huius ad superiorē
declarent; illud tamen non leue quoq; huius rei
argumentū est; q̃ cum eo in libro consuluerit præ-
parandam esse machinā ijs qui in magna aliqua ur-
be curaturi sunt; hic fabricam eius uniuersam de-
scribit; ac simul superius se de ea mentionē fecisse
refert. eam posteriores medici scamnū Hippocra-
ticum uocant. Sed ad demonstrādā libri huius
cōsequutionē satis hec sint; nunc ad explanatio-
nem uerborū eius uenimus, si tantum hoc, sicut
in libro quoq; De fracturis fecimus, præmoneri-
mus. Loquutionē Hippocratis hic adeo planam
ac claram esse, ut parua explanatione apud eum
præcipue indigeat, qui primis disciplinis fuerit im-
butus, ueterisq; alicuius auctoris loquutiōi assue-
uerit. q̃ si quis ita instructus in hominis aut saltem
Simiæ ossibus articulorum quoq; compositiones
inspexerit; ei multo clariora omnia futura sunt; nā
si muscularum etiam dissectionem calluerit, atq;
alioqui ingeniosus sit, haud dubito, quin multa
quæ his in commentarijs nostris scripta fuerint, su-
peruacua esse arbitretur: cum prius scriptoris huius
loquutionem intelligat, quā meis explana-
tionibus edoceatur: quia tamen non huiusmodi
solis scribimus; melius mihi uidetur, ut aliorum
quoq; ratione habita, si uel parua aliqua obscuri-
tas occurrat, non prætereamus.

1 Humeri autem articulū uno modo pro-
labi, in alam uidelicet, noui.

De articulatione inter se iunctorum ossium ap-
pellare articulum solere, non sinitum qui alterius
ossis caput in se excipit; sed ipsum quod inseritur
caput in superiori libro dictum à nobis iam est:
nunc illud etiam cōmemorādum: brachium cum
satis magnum caput habeat, in non admodū pro-
fundam ac desidentem cavitatem extremæ cerui-
cis scapulæ partis quæ ipsi incumbit, innecti. ab
Hippocrate præterea iuncturas huiusmodi inter-
dum hoc modo explicari solere, quo hic fecit, cū
inquit, Humeri articulū interdum non ita, sed ar-
ticulum qui ad humerum est. quemadmodum su-
perius in libro De fracturis articulum qui ad ge-
nu est: sapius dixit. unum autem modum, id est
diffe

differentiam unam tantum luxationis huius articuli agnouisse se inquit: quod an recte ab eo dictum sit, postea considerabimus.

2 Sursum uero, aut in exteriorem partem, nunquam.

In humeri dearticulatione sinus quem in extrema scapulæ ceruicis parte esse dixi, in anteriorem partem uergit, ita ut cum brachiū attollit quispiā caput ipsius totā penitus sinus cavitatē occupet. cum autē flex circum circa omnem dearticulationem sint loca, supra & infra, ante & retro, extra & intra: huius articuli pars interior qua planē sursum uergit, carnē musculi superiectam habet, qui deltoideus à Δ literæ similitudinē à quibusdā uocatur: qua uero ad collum uersus declinat, scapulæ dorsum, ubi ex iuguli cōiunctione summus humerus efficitur, qui ἀκρωμιον appellatur: qua intrinsecus spectat, processus ille scapulæ occurrit, quem ob formam, anchoralem alij, quidam coriularē nuncupant: qui profecto uetat, quō minus eam in partē excidere articulus queat. ut autem in posteriore partem prolabatur, cum inde scapula ipsa incumbat: quis nostrum est, qui uel concipere animo possit: reliquæ igitur quatuor partes sunt, quæ tutela carent: in quas elabi posse articulum uerisimile est, quarum omnium ipse mentionem facit. inferioris, in principio, cum inquit. Humeri aut articulum uno modo prolabi, in alam uidelicet noui- triū reliquarū nominatim deinceps: sursum enim primum, deinde in exteriorem partem, postea in anteriorem ait. aduertamus igitur animum quænam de duobus hisce modis dicat, quos in oratione hac protulit.

3 Non tamē prolabatur nec ne, cōfirmaturio: licet de eo habeā quid dicā. uerū neq; in anteriore partē excidisse mihi uisus est. medicis tamē ualde in anteriore partē prolabi uidetur. atq; in ijs maxime decipiuntur, quorū carnes circa articulum & brachiū tales cōfecit, in huiusmodi em caput brachij prorsus eminere in anteriore partē cōspicitur. atq; ego quidē cum huiusmodi articulum negarim excidisse, eam ob rem et apud medicos & apud populares male audiui. solum em ego uidebar illis ignorare, cū alij omnes cognoscerēt. neque hoc ita se habere persuadere ipsis, nisi difficulter potui.

Cum duos luxationis modos dixerit sursum & extrorsum, ac se neutrum ex ipsis uidisse asseruerit: postea quasi de utrisq; his adhuc loquatur, ita subiungit. nō tamen prolabatur necne cōfirmaturio: licet de eo habeam quid dicā. cū tamē dicat. licet de eo habeam quid dicam. aperte uidetur de altero tantum ipsorum loqui. si enim de utrisq; intelligere uoluisset, non dixisset singulari numero de eo, sed de ipsis. nunquid igitur de sola differentia in exteriorem partem hoc dicatur, consideran-

Galen.

dum est: quippe cum illi statim hoc subiūxerit. potest etiā, ut nonnulli intelligunt, ueteri loquendi forma de utrisq; ita dictū esse: perinde ac si in hūc modū scripsisset. licet de ea re habeā quid dicam. alij sunt qui fieri posse assument, ut error hoc loco ex librario qui primū nō recte descripsit, inoluerit: qui propterea q̄ nemo emendare eū ausus sit, huculq; fuerit referatur. ueruntamē ego in quodā exemplari ita scriptū deprehendi, licet de ipsis habeā quid dicā. in quo ausus est profecto aliquis in cōtrarium modū immutare lectionē, q̄ in alijs reperitur. ceterum siue de utrisq; modis, siue de altero tantū se non posse cōfirmare dicat: operæ præciū est, ut de utrisq; nos consideremus: ubi hoc tantum de loquutione ipsa adhuc addiderimus. Cōfirmaturio inquit, pro ad confirmandum paratus sum, & cōfirmare appeto, non secus atq; inspecturio: quod etiā ipsum ad inspiciendum paratum esse et appetenter inspicere significat. unde Homerus inspecturiētes dixit, explicare hoc idē uolens: cū inquit, Vnde illi se ipsos, hostes q̄ inspecturientes. Sed cur cū posset aliquid dicere, nolle se id facere inquit, cōsideremus. priusq; quænam sint ea quæ dicere potuisset, excogitemus. Perspicuum sanē est inuentionem eorum quæ fuisset dicturus, si sibi esse dicendū censuisset, ex ipsa partium natura existerē. partium autem ipsarum structura exacte à nobis tum in libro De ossibus, tū in Musculorum dissectione, quin etiā in Dissectorijs tractationibus demonstrata est: nam articularū, & uenarum, & neruorū natura nullā ad præsens negotiū utilitatē affert. propterea quod omnia quæ in articularū luxationibus accidunt, ex ipsis ossiū articulis, & qui ipsos continent musculis, & fiunt & prohibentur: nihilq; ad ea uel inferenda uel impedienda arteriæ, aut nerui, aut uenæ faciūt. age em, humeri articulus reliquis omnibus promptius excidit: tū quia uniformis est & simplex, nō quemadmodum qui in genu est, duplex: aut qui in cubito, uariis & nullo modo simplex: tum quia caput brachij magnū cū sit, & sine ulla oblonga ceruice in sinū altitudine carentē inserit. nā femur cum caput habeat paruum, & ceruicem oblongam, acetabulo etiā profundo excipitur. quod supercilijs satis magnis circumdatum est: præter q̄ quod copula ualidissima quoc; ex summo capite in intima acetabuli sedē innectitur. quocirca nō iniuriā fit ut femur raro, sæpe brachium excidat: quippe quod neq; copulam habeat, neq; in profundū sinu defecdat. principium igitur luxationis in eā partem fieri necesse est, in quā figurationis uiolentia impellit in ea tamen manere non potest & ob naturalem inclinationē qua deorsum fertur, & ob angustiam interdum loci, quæ uel ex ossiū eminentijs, uel ex musculorum ualiditate existit. superior igitur huius articuli pars summam humerum habet superiectam. unde si eō aliquādo excedat, fit, ut ab ossibus quæ ibi sunt, non admissus statim pondere suo deorsum relabatur. exterior aut pars etiam ipsa magnis quidem musculis munita est, & deorsum simili modo est procliujs: fieri tamen po-

tom. 6

R 3 test

test aliquando, ut uiolentus aliquis brachij habitus adeo sit, ut musculus inter se impetu dissociatus in mediū inter ipsos locū articulū protrudat: ubi interclusus à musculis strictim cohibeat. propterea igitur Hippocrates an excidat has in partes humeri articulus nec ne, confirmare se nolle inquit. nam cum deorsum natura tēdat, permanere neq; in anteriore loco potest. cum autem, sicut dictum est, dissociati uiolentia aliqua musculi interclusum eum coardare, ac continere queant: permanere posse ibidem uidetur. habere itaq; hæc atque huiusmodi Hippocrates, quæ de luxatione in alias partes q̄ in alam diceret: quia tamen nunquam id uiderat, causas sibi ex commentatione scribendas non censuit: probabilis ratus quod euidenter apparet, quàm quæ rationibus tantum inniuntur. sic quoq; in curationibus rationes suas experientia prius confirmat, quàm nos eas doceat. non sicut quidam posteriores, qui in libris De curatione ea quæ nunquam ipsi prius fecerunt, faciendā nobis esse scribunt. adde quòd in hoc quoq; libro Hippocrates ipse, ubi agit de ijs quæ in spina accidunt, cum excogitationem suam ex ratione refelli ab experimento dixisset: ita subiungit. Pulchre enim earum quoq; rerum disciplinæ sunt, quæ ad experimentum perductæ frustratæ apparuerunt: & cur frustratæ fuerint, apparet.

4 Si quis in brachio superhumeralem carnibus nudaret, quæq; musculus intenditur: tendonem item nudaret, qui ad alam est, & iugulum ad pectus: caput brachij etiam si non excidisset, in anteriorem partem prominere multum cōspiceretur. natura enim ita comparatum est, ut caput brachij in anteriorem partem prociduum: reliquum os in exteriorem incuruum sit.

Brachium appellatur quod inter duas iuncturas humeri et cubiti intercedit, totius brachij pars. superhumeralis uero, id est *ἐπ' αὐτῆς* superior humeri pars quæ ad collum uergit. nam humerus totū id quod in dearticulatione hac apparet, uocatur. nam quod nō apparet à posteriori parte est os scapulæ: ab inferiori est id quod dum totum brachiū attollitur, manifestum fit, quæ ala nuncupatur. cū igitur superius dixerit Hippocrates caput brachij in illis prominens apparere, ita ut uideat excidisse, quibus carnes circa humerū emaciatae contabuerunt: naturam eius ex dissectione totā nunc docet, si quis inspicere id euidenter uelit. iubet enim, ut superhumeralis carnis denudetur: hoc est carnes scapello eatenus detrahantur, quoad ossa dearticulationis huius denudentur, atque extant. nudetur item tēdo ad alam. tres enim musculi hic sunt: primus qui à scapula & iugulo proficiscitur, quem deltoidem uocant, huius musculi carnosa pars totam dearticulationē operit. tendo uero in os brachij per longitudinē innectitur: cui quidem tēdo alius inhaeret musculi satis magni qui à pectore exoritur, & cū predicto iuxta humeralis ue-

næ positurā defertur: cuius nūc meminit cum inquit, Tendonē item nudaret, qui ad alam est. dum aut ait, quæq; musculus intenditur, id potest de deltoide intelligi, cuius totū articulū carnosa pars operit: potest itē de anteriore qui iuxta ceruicē est, dictū esse, qui in duobus capitibus robustas copulas habet: alterā ex anchorali processu: alteram ex edito ceruicis scapulæ supercilio prodeuntes.

5 Conuersatur autem brachiū cum cauo scapulæ in latus cum ad costas porrigitur. cum uero in anteriorem partem totum brachium extenditur, tunc caput brachij est directio scapulæ cauum init. neq; prominere in anteriore partē uidetur. sed de quo nūc est sermo, neq; in anteriore partem unq; uidit ipsum excidisse: neq; de hoc tamen excidat ne ita, nec ne, confirmaturio. Quādo igitur in alam exciderit, utpote cum multis contingat, reponere multi id sciūt. cognoscere autem omnes modos quibus medici reponere consueuerunt, quoq; pacto uti his ipsis quispiam optime possit: eruditū est: horum tamē optimo si ualidissimam necessitatem uideris, utredum tibi esseucas, optimus uero est, qui postremo describetur.

Conuersari, id est *ὁμιλῆν* ueteres in uniuersum non pro colloquendo, quemadmodum plerique nunc solent: sed pro conueniendo & consulescendo simul sumebant: uerbumq; hoc ab eo deducebant quòd *ὁμιλῆν*, id est simul uoluerunt, & uersarentur inter se homines. Homerus quoque de ijs qui in clypeo Achillis à Vulcano efficti fuerant, ita inquit: Non secus ac uiui cōuersabantur. brachium igitur cum cauo scapulæ in latus conuersari inquit, quando ad costas brachium fuerit prætentum: hoc uerbo cōuersari simul esse & attingere ipsum significās. cum uero totū brachium extenditur, tunc ē directio brachium in scapulæ cauum inferi, ac non amplius in anteriorem partem ob erectionem prominere.

6 Quibuscunq; frequenter humerus excidit, ij ad reponendum id sibi ipsis ut pluri mum sufficiunt.

Dictum à me in libro quoq; De fracturis est, duas esse causas, quæ efficiant, ut frequenter & ex leui occasione articulus excidat, & luxet. nam uel quia sinus alte nō descendit, supinaq; ac reueta habet supercilia, id euenit: uel ex partiu quæ iuncturam circūdant, humiditate, qua sit, ut & laxæ sint, & facile extēdantur. ob has etiā easdem causas adeo faciles huiusmodi articulorum repositiones esse diximus, ut absq; etiam medicorum opera fieri ab ipsis illis qui id patiuntur, possint.

7 Iniectis enim condylis alterius manus sub alam articulum sursum propellunt: gibbum

bum uero cubiti ad pectus adducunt.

Primus repositionis modus hic est, cum uel ipse æger, uel medicus aliquis condylos ac nodos digitorum manus sub caput brachij subiicit, non ita absolute, sed ex interiore parte: ut prius in anteriorem infra à costis diductum, sursum postea retrudatur, & è regione ad sinum qui id excepturus est, constituitur. hic enim profecto & musculi etiam qui iuncturæ huic circumiecti sunt, opitulantur. dictum siquidem ab ipso est in libro De fracturis, sicut etiam à nobis in libris De motione musculorum, proprium, naturæq; insitum musculis esse, ut in seipsos contrahantur. à seipsis enim non extenduntur. sed musculi alij sunt, qui in contrariam partem porrecti, quiescentes illos & occidentes moueant. huiusmodi hic musculorum motus brachij quoque caput in alam delapsum sibi manere non sinit, sed retrahit ad costas, quoad scapulae ceruici subiiciatur, unde etiam repositio hæc ex tribus operationibus composita est: una cum in anteriorem partem, altera, cum in superiorem, tertia cum retro à nobis propellitur. hæc siquidem necessaria est, quocumq; modo quispiam reponere uoluerit. ubi igitur humida & laxa sunt corpora circum circa iuncturam, parua manus cōtentio ne brachij caput in anteriore parte reducitur: ubi dura & ualida, uehementiore opus est. propterea multi reponendi modi inuenti sunt, quorum omnium unum propositum est quod in tres quos dixi scopos reducitur. hos aut scopos ex maxime communi, maximeq; generali omnium inuenimus: qd & ab Hippocrate dictum, & à nobis in libris De curandi ratione demonstratum est: & nunc quoq; quam breuissime fieri poterit, commemorabitur. Nihil ex his quæ secundum naturam sese habent, emendatione indiget. conseruare enim id, non remouere proposuimus. sed quæ præter naturam sunt, ea in naturalem statum reducere nitimur. necesse autem est, ut qui in pristinum statum rediturus est, is eadem uia unde est digressus, reuertatur: qd perinde est ac si dicamus, ut cōtrarium iter faciat. his autem qui Athenis Eleusine reuertantur: ea uia parte quæ prima fuerat, dum Athenas proficiscerentur, ultima effecta. Considera igitur in unaquaq; luxatione unde nam articuli excessus inceperit, quomodo progressus fuerit, quod finem fecerit. oportet enim ut finem excessus principium reditus facias: atq; inde retro ad principium usq; luxationis progrediaris. age enim in propolita hac luxatione rem perspiciamus. cum è propria sede caput brachij in anteriorem lapsum, pondere suo deorsum deciderit, ac postea retro ad costas à musculis eam in partē se contrahentibus abductum fuerit: restitutionem in naturalem situm à posteriore parte exordiamur, necesse est. atque inde in anteriorem partem primum, deinde in superiorem promoueamus, ubi uero iam è regione sinus, in quem ingressum est, constiterit, alterum ex duobus faciendum est. nam uel musculis totum negotium

A committendum: uel simul etiam compellendum. illud tamen aduertere debes, si musculi rem commiseris, ne inferiorem locum immunitum destitueris. innitatur enim supra aliquid brachium ea parte opus est: ne si aliquo modo musculi imbecilliter trahant, deorsum prius delabatur, & reductum in propriam sedem fuerit. cum tres igitur hæc progressionēs sint, optimū est ut in rectam lineam singulas, primam in anteriorem partem, secundam in superiorem, tertiam in posteriorem faciāmus. sæpe tamen non ita facimus, sed circumuersato brachij capite ad scapulæ ceruicem repositionē moliri consueuimus. ac primus quidem modus qui ab ipso ægrotante aut medico, digitorum coniectio-
ne fit, ex hoc genere est: ab ipsoq; Hippocrate
B *πρὸς φασιν*, hoc est ex circumuagatione nuncupatur, qui sanè absq; læsione ulla in humeri dearticulatione proficit, in qua eminentia nulla oblonga extat, neq; in capite brachij, quod planè rotundum est, neq; in supercilij cavitatis quæ est exceptura. quibus igitur frequenter excidit, his necesse est dearticulationem laxam esse, cavitatemq; breuibus proiecturis, ac supercilij esse circumdatam. ac propterea fit, ut facile ipsi sibi reponere articulum ualeant condylis & nodis digitorum alterius manus sub alam iniectis, ita ut in medium locum inter brachij caput, & costas inserantur. uice enim uectis digiti funguntur, cum condyli ipsorum in acutum, tanquam metæ uerticē desinant: quo immisso facile reliqua eorum pars in eum mediū locum sese insinuet. in quem quidem locum ubi semel fuerunt recepti ob humiditatem corporū qui circa iuncturam eam sunt: repositio facile subsequitur. digiti enim statim admisi articulum in anteriorem partem à costis adducunt. gibbus uero cubiti ad pectus adductus brachium sursum atollit: cūq; interim digiti simul impellant, & ab inferioribus, anterioribusq; dearticulationis partibus conuoluuntur, caput brachij ad marginem cavitatis in quam ingressum est, ascendit. quo simul ac peruenit, leui momento in eam restituitur: atq; hic repositionis finis est.

D s Eodem quoq; hoc modo medicus reponet, si ipse ab interiore parte articuli qui excidit sub alam coniectis digitis à costis deducat: capiteq; renitēdi causa ad summum humerum obiecto genibus ad brachium iuxta gibbum cubiti appulsi ad costas retrudat. qua in re confert, si manus robustas habeat, qui reponit. uel ipse manibus & capite ita faciat, alter uero aliquis cubiti gibbum ad pectus adducat.

Medici dum articulum luxatū reponūt, quædam quæ communia cum uulgarium operationibus sunt, facere consueuerunt: quædam propria ipsi adiungunt: quemadmodum in hac quam nūc tradit, repositione uidere licet. cōmunia cum imperitis sunt, digitis hæc adhibita molitio, & bra-

chij sublatio: propria quæ addita sunt, reluctatio quæ capite fit, ad summum ægrotantis humerum, & genibus ad inferiorem partē brachij obfirmatis retrusio. ac reluctatio quidem ad summum humerum ea causa fit, ne homo ad brachium dum in anteriorem partem manuum molitione impellitur, consequatur. hæc enim primo facienda sunt; postea tertio loco adhiberi debet retrusio genibus accommodata sub id tempus totius operationis, quo caput brachij cum prorsus à costis recesserit, nondum cervicis scapulæ occurrit: tunc enim neque omnino in anteriorem partem impellendum est, sed sursum trudendum. id autem recte efficitur, si inferiorem extremitatē brachij ad costas quispiam compellat. cum enim hæc in interiorē & inferiorem partem tendit, ea quæ ipsi opposita est, in cōtrariū abit. ubi uero in superiorem & anteriorem partem caput brachij educit, facile in sedem suā redit. quod si quis genibus impellere inferius brachij caput nolit, alteri adduce re id ad pectus iubeat. id quod vulgares facere superius demonstratum est, quid agendum hac in re sit ex frequentī luxatione edoctos, at cui primum luxatio contigit, is agere id minime potest, nisi admodum fortis, atque interritus quidam sit. nam si huiusmodi fuerit: iussus à medico cervicem per se ipse attollet.

9 Repositio quoque humeri est, si retro ad spinam dorsi reducto cubito altera manu apprehenso eius gibbo sursum retorquesat, altera à posteriore parte iuxta articulum innitatur.

Modus hic repositionis per circumuagationem magis, quæ superior fit. estque etiā ipse ex tribus operationibus necessario cōpositus: ita tamen ut singulæ ipsarum proprijs terminis nō circumscribantur, neque in transitu angulos, sed flexuras circulares efficiant. nō secus ac si quadrangulæ figuræ anguli retusi, ac refracti fuerint. quid enim in huiusmodi operationibus per circumuolutionē & circumuagationem contingat, & ex figura huius descriptionis euidenter intelliges. Finge brachij capitis, quæ humeri articulum uocat, progressionē in prima operatiōe qua à costis in priorē partem impellitur in c—d lineā esse constitutam: inde uero sursum in d—b: postea cum illinc in cauitatem propellitur, in b—a. cum huiusmodi sit impulsio nulla circumuagatio consequitur. Sed cum angulis in d & b retusis non in tres rectas lineas, sed in unam tantum conflant progressionē efficitur: tunc evenit ut conuolutum brachium ad marginem dearticulationis descendat: in quam cum deuenit, paruo momento accedente intro in sedem suam circumuagando illabitur. atque hoc commune omnibus est; quæ ex circumuagatione reponuntur. quam uero nunc refert, repositio huic cognata est. nam cum retro ad spinā dorsi cubito reducto eō necessario brachiū quoque sequatur, caput ipsius ante & sursum promotum

A circumuoluetur primum inferiore dearticulationis parte, deinde anteriore, quousque ad marginem & supercilium sinus ipsius ascenderit: unde in cauitate deuolutum in sede sua stabilietur. hic enim repositionis terminus est. quemadmodum uero in ea quam ante hanc tradidit, ne homo in anteriorem partem sequeat, capite medici urgeri retro summum humerum iussit: ita nunc ne retro sequatur, e contrario faciendum censet: ut obiecta manu in posteriore dearticulationis parte in anteriorem retrudamus.

10 Hæc repositio & ante dicta licet secundum naturā nō sint: circumuagando tamen articulum ingredi cogunt.

B Non secundum naturam has esse inquit, propterea quod non per rectas lineas, sed per circumuolutionem, sicut dictum est, articuli motio sit. qua in re quidem periculum est, ne eminentia aliqua defringatur. cogunt autem dixit, ut uiolentiam earum significaret.

11 Qui autē calce reponere conant, si prope ad naturālē repositionem accedunt.

Cur hanc repositionem prope ad naturalem modum accedere dixerit, manifeste cognosces si prius totam ipsam audieris. id autem fiet, si uerbis ipsis attendas.

12 Homine supino humi collocato is qui reponit, utrā in partē articulus exciderit, ea sedere humi debet: deinde manu læsa manibus suis apprehensa ad se brachiū attrahere: calce uero in alam ægrotantis coniecto, dextro uidelicet in dextrā, sinistro in sinistrā, re trudere. in sinum tamen alæ rotundū aliqd quod congruat, subiiciendum est. ad quem usum accommodatissimæ sunt paruæ admodum pilæ ac duræ, quales multæ à futuris bus conficiuntur. si enim tale quid iniectum prius nō sit, calx attingere ad caput brachij nō potest. nā dum extēditur brachiū, alæ sinuatur: quippe cū tēdones qui hinc & inde alam cōstringunt, cōtrarij inter se sint. oportet autē aliquē ex altera parte confidentē in integrum humerum continere: ne corpus, dum brachium læsum in diuersam partē extēditur, circumagat. præterea alius debet supra ægroti caput sedēs habere mollis, atque idoneæ latitudinis, quæ pilæ sub alā circumiecta fuerit, eaque detineat, duobus capitibus apprehensis sursum retrahere, pede ad os summi humeri appposito. pila autē interiorē in partem, atque ad costas maxime, non ad caput brachij collocata sit.

Si quis ea quæ in hunc modum exponuntur, nō intelligit, is non explanatione quæ uerbis fiat, sed

commonstratione rei in operationibus ipsis uide
tur indigere. propterea sepe, quemadmodum etiam
prius dixi, consulo, ut qui librum Hippocratis le-
gunt, diligenter ei animum aduertant; atq; ea quæ
dicunt, intelligere conentur. Ego igitur quasi iam
sententiam horum uerborum per te ipse percepe-
ris, causam asserā, cur hanc repositionē alijs dam-
natis q̄ secundum naturam non fiant, prope ad na-
turalem modum accedere dixerit. primū itaq; ob
id, quia hæc brachium extendit, cum alia ei mini-
me faciant: ut merito laudanda huiusmodi reposi-
tio sit. dictum enim à nobis est in libris De fractu-
ris quanam utilitas extensionis sit: debereq; eam
ante omnem repositionem & conformationē pre-
cedere. secundū in hac repositione est, q̄ calce re-
tro homo impellitur, ne ad brachium dum trahit,
sequatur. duabus igitur his operationibus disten-
tio in diuersum efficitur. Verum alijs duabus alia,
dum habena circumiecta alæ in posteriorem par-
tem æger attrahitur, pede obiecto repellitur: qua-
rum utraq; in diuersum extensionē unus exequi-
tur. atq; hæc quidem secundum naturam in hac re-
ponendi ratione sunt; molitio tamen deficit, cum
parua pila nequaquam in mediā partē inter co-
stas & caput brachij ingredi, ac multo minus calx
possit. nam si eò nihil inseratur, quo pacto molitio
efficietur: si uero ea non effecta sit, neq; repositio
secundum naturam profus erit.

13 Alia item repositio est cum ægro alter
subhumerat. maior tamē esse debet qui sub
humerat, & comprehensa manu humerum
suum acutum in alam subijcere.

Primus repositionis modus commemoratus est,
qui digitis aut ægroti, aut medici fit. secundus qui
calce efficitur. tertius hic refert per subhumerationē:
ita enim uocant. propterea q̄ ipse inquit, cū ægro
alter subhumerat: id est humero suo subiecit in a-
lam ægrum sustollit. quod quo modo fiat, manife-
ste ipse edocet. iubet enim, ut qui subhumeratur
ægro est, brachium luxatum eius manibus ap-
prehendat: suumq; humerū in acutū porrectū sub
alā ipsius subijciat, ita ut in cavitatis eius sedem
prominentia humeri insinuetur, ac firmetur.

14 Et deinde subuersare, ut sedi inaptetur:
ea coniectura habita, ut circa humerū suum
hominē ex ala suspendat: ipse uero seipsum
altiore in eum humerū quā in alterum
reddat: brachiumq; suspensū ad suum ipsius
pectus quamcūq; compellat: in eaq; fi-
guratione concutiat, cum suspendet homi-
nem, ut contra brachium quod continetur,
reliquum corpus propēdeat. si uero admo-
dum leuis homo sit, aliquis leuis puer ei à
tergo insuper appendatur. hæc repositiones
omnes in palæstra usitate sunt: propterea
quod alijs instrumētis minime indigēt. sed
alibi tamen etiā uti ipsis unusquisq; potest.

Subuersare inquit, de humero eius qui sustulit,
intelligens: quemadmodū fieri solet, ubi primum
in sellam considemus. circumuersamur enim pau-
lulum, ut desidere in ea, ac firmari cōmode ualea-
mus. cum autē ex sustollentis humero homo post
terga suspenditur, proculdubio protracta in prio-
rem partem manu distentionem facit. at si leuis ni-
mis sit, ei appendi puerum iubet, quo pondus ad
distendendum maius reddatur. cōcuti uero hume-
rum ægrotantis ab eo qui sustentat, ea causa uult,
ut brachium ē directo ad propriam sedem rediga-
tur. nam sicut dictū sepe iam est, ubi eò deductus
articulus est: etiam si nos amplius non compella-
mus, cum musculi in officio sint, facile reuertitur.

15 Quia & qui pistillis compellunt, pro-
pe ad naturālē modum reponunt. debet au-
tem pistillū fascia aliqua molli inuolui, quo
sublabi minus queat: atq; inter costas & ca-
put brachij subintrudi. si uero pistillū bre-
ue sit, collocandus in sedili aliquo homo est,
sic ut pistillo circumducere brachium uix
queat: sed longius præcipue sit, ita ut stans
homo ferē circa lignum suspendatur. deinde
de brachio & cubito circa ipsam porre-
cto aliquis ex altera parte corporis ad cerui-
cem circumiectis manibus iuxta iugulum
deorsum compellat.

Hi quoq; quatenus distentione in cōtrarias par-
tes utuntur, eatenus secundum naturā reponunt.
quatenus autē circa pistilli caput circumuagatur
articulus, in eo uero à naturali modo aberrant. cæ-
tera quæ particulatim exponit, plana sunt.

16 Repositio hæc secundum naturam mo-
deste est: & proficere, si quis eam bene tra-
ctauerit, potest.

Mediocriter secundū naturā esse hanc inquit. id
em̄ significat, cū *modicus*, id est modeste dicit: quē-
admodum etiā homo modestus, id est *modicus* me-
diocris & moderatus à Græcis nuncupari solet.
nonnulli tamē sunt qui *modicus* non pro modesto
et mediocriter, sed p̄ admodū et maxime sumant:
ac propterea uo puto, in principio quoq; huius o-
rationis particulā hanc prope abstulerūt, atq; ita
legunt. quā & qui pistillis cōpellunt, ad naturālē
modum reponunt. uerū tamen debebāt et etiā
si nihil ab Hippocrate ipso dictū fuisset, in sequen-
ti oratione ex ijs quæ huic repositioni uitio uertit,
intelligere. reprehendit enim cum inquit. circa e-
nim pistilli caput, etiā si humerus fixus permane-
ret, periculū est ne corpus circūuagetur. atq; iccir-
co ea quæ per scalā sit, ut inquit, melior est: non est
igif hęc ad summū laudanda, ut maxime dici natū-
ralis possit. nā magis ea quæ p̄ scalā sit, approbat.

17 Sed enim alia quædam huiusmodi est
quæ fieri per scalam consueuit, atq; etiam
melior: propterea quod suspensum corpus
hinc & illinc librari stabilius potest. circa
enim

enim pistilli caput, etiam si humerus fixus permaneret, periculū est ne corpus hac uel illac circumuagetur.

Quintus hic repositionis modus est, qui cur superiore qui pistillo fit, sit melior, ipse manifestissime declarat.

18 Oportet autem ut supra gradum scalæ rotundū aliquid alligetur, quod in cauum alæ insinuetur: atq; ita caput brachij reuertitur in naturam cogat.

Ex eodē gradu ipsius ligno eminentia huiusmodi in machinaria hac scala statim a principio efficitur: quæ nos etiam uti consueuimus. rotunda autē hac in gradu eminentia ligno quod deinceps describit, similis est. qd in superiori extrema parte crepidinem habet, a qua posteriores medici omnes crepidinem, id est *ἄκρω* ipsum appellant. adiungi hoc potest statarijs quoq; instrumentis cuiusmodi est Andreæ instrumentum & Tectonis, quorum nullius fabricā referre mihi nunc necesse est: cum a multis recentioribus qui de instrumentis scripserūt, dictū de eis satis sit. nobis enim Hippocratem explanare propositū est, qui ad omnia quæ uehementiore disputatione & molitione indigent, eo quod scamnum uocant, utitur.

19 Optima tamen repositionum omnium hæc est. lignum sumendum est: quod latitudine circiter quinq; aut quatuor digitorū sit: crassitudine duorum, aut etiam tenuius: longitudine uero bicubitali, uel paulo minus, cuius summitas ex altera parte rotunda, & angustissima, & tenuissima sit: habet atq; in extremo paulo supereminentem crepidinē, quæ non ad costas, sed ad caput brachij uergat. ut alæ ad costas sub caput brachij subiecta inferatur. linteo autem aut mitella aliqua molli summa pars ligni, quo lenior sit, est inuoluenda. eaq; sub alam sic est impellenda, ut inter costas & caput brachij interiorem maxime in partem collocetur: brachiumq; ei totum in longitudinem porrectum paululum infra caput brachij, & ad cubitum, & ad articulum manus alligandū est, ut quam maxime firmum permaneat. in primisq; id curandum, ut summa ligni pars superato capite brachij in quam intimū alæ sinum ingrediatur.

Sextū modum repositionis, quem maxime approbavit, nunc docet: ligni cuiusdam apparatus manifeste describens, cui cum in summa extremitate supercilium quoddam ad crepidinū similitudinem promineat: crepidinem, ut dixi, totū ipsum medici uocant. Eiusmodi autem est supercilium, qualis in summa extremitate patinarum crepido est in interiorē cavitatē conuersa, unde etiā comi-

cus quidam carpens patinarū crepidines circumlingere quemdam dixit: *ἄκρω* masculino genere more attico eas appellans. nam lones formineo *ἄκρω* huiusmodi proiecturarū & superciliorū figuras uocant: quo uerbo hic Hippocrates utitur. hac autē crepidine lignū hoc, ut inter caput brachij & costas adaptetur, commodissimum sit: quinetiā moliri uolētibus utilissimū, cū rotunditatē capitis brachij in se firmiter recipiat, ac comprehendat. reliqua omnia in hac oratione aperta sunt.

20 Postea inter duas pilas canterius trāsuerfus cōstituendus est, eisq; bene deligandus. supracq; cum brachium unā cum ligno transmittendum ita est: ut in alterā partem brachio, in alteram corpore propendente sub alam canterius subeat. quod ubi factū fuerit, hinc brachiū inde corpus circū canterium deorsum detrahendum est. in eam altitudinem autē deligari canterius debet, ut corpus suspensum summis digitis insit. Hæc reponendi humeri ratio, longe optima est. iustissime enim molitur, si uel tantū interiorem in partem penitus quā caput brachij lignum iniectū sit, iustissime item in utraq; partem librationes, ac stabiles ossi brachij sunt. Ac recentia quidem citius quā opinaretur quispiā, redeunt, ac prius quā extenta esse uideantur.

Pilas appellare hic Hippocrate columnas: canterium uero trabem quæ ab altera columna ad alteram pertingit, perspicuum est.

21 Quin etiam uetera restituere sola hæc repositio potest. nisi iam ob uetustatem & caro in acetabulum ingressa fuerit, & caput brachij in loco in quem excidit, moram sibi fecerit. quanq; ita quoq; inueteratum brachij lapsum reponere mihi uidetur posse. quid enim iusta molitio non moueret? sed mansurum tamen in sede sua id non puto, sed relapsurum nihilo minus, ad consuetudinem. Idem facit, si hoc modo præparatū brachium supra scalam traiciamus.

Attritam & callo obduratam sedem, moram, id est *ἰσὸς* siue attritionem dixeris, appellat: quæ ex diuturna capitis brachij immoratione efficitur, in ea carnis circumiectæ parte, in quam id prima prolapsione incubuerit. acetabulū uero uocat cavitatē quæ in dearticulatione est in extrema, in dictū est, ceruicis scapulæ parte. plerūq; tamē pfundos sinus magnis supercilij circūdatos tū ipse tū alij nuncupare acetabula cōsueuerūt. nūc uero cavitatē eā hoc nomine appellat, in quā circūiectæ carnes, cū luxatio sit, priorī sede q; brachij caput desinuit, occupata, ineunt. efficitur igitur ex eo q; & ppria capitis brachij sedes est interclusa: & locus

qui ipsum excepit, callo obducto uicem acetabuli exhibet, ut si etiam aliquando fuerit repositus articulus, resistere non possit. cum carnes præter naturam acetabulum obstruxerint, & quæ os exceperunt, callo indurata cavitatem dearticulationi similem adeptæ sint.

22 Idoneum quoque admodum est, si recens sit lapsus, circa mgnũ sedile Thessalicũ compulsionẽ facere, præparatum tamen esse lignum oportet, sicut dictũ est. deinde in sedi li homine in latius collocato, brachiũ ligno alligatum supra reclinatoriũ traducitur: & in alteram partem corpus, in alterã brachium cum ligno deorsum trahitur.

Sedis cuiusdam talis quædam erat forma quæ in Thessalia antiquitus utebatur. quæ a tergo ad rectas lineas porrectum in altum reclinatorium habebant: circa quod distentionem faciendam censebatur quemadmodum superius de canterio edocuit. quo pacto autem collocandus in sede homo sit, manifeste declarat.

23 Idem facit, si supra biforem ianuam cõpellamus. ijs autem quæ forte affuerint, utendum est

Sunt nonnullæ huiusmodi ianuæ quæ in medio transuersum lignum ualidum habent, cuiusmodi erat canterius, quem inter duas columnas protendendum esse antea dixit, infra quod quidẽ lignum altera ualua, supra item altera aperitur. unde biforem ianuam dixit, eo quod binas fores, binasque ualuas in se cõtineret. iubet igitur ut luxatum brachium supra lignũ quod inter duas ualuas situm est, distentionis causa transmittamus.

De luxationibus ab Hippocrate non uisit.

Hippocrates in alam uidisse se tantum brachij delapsonẽ inquit. nonnulli uero ex posterioribus medicis alias quoque luxationes articuli huius ut pote quæ fieri possint, scriptis tradiderunt. & nos quoque quinque ab hunc usque diem uidimus: in Asia semel, Romæ quater: quoties uidelicet in urbe alicui huiusmodi affectio cõtingebat, propterea quod medici omnes absurda atque admirabilia cõsultandi causa ostendere mihi cõsueuerant. Quatuor igitur luxationes cõtingerunt, omnes quidem in anteriore parte: eatenus tamen a se mutuo differentes, quatenus per membri longitudinem & latitudinem uel propius, uel longius a dearticulatione efficiebantur. mirabantur itaque, cum hic nunquam, alij post ipsum aut semel aut bis uidisse se id attestarentur: toties tamen, ut nos, huc usque uiderat nemo. quanquam fortasse posthac etiam alias tale aliquid uidemus. non enim forte quadã, sed probabilis causa rem hæc mihi occurrere arbitror, de qua deinceps nunc dicam. In nostra Asia huiusmodi luxationẽ primũ in spexi, cum adhuc illic sub præceptorũ disciplina Smyænæ erudiret, urbs autem hæc magnitudine ampla est, de qua Hippocrates frequenter meminit: quippe cum in ea

plerumque fuisset uersatus. ego uero post secundum & trigelimum annum Romam me contuli, urbem tanta hominũ frequentia celebratam, ut Polemo orator breuiarium ac cõpendium orbis terrarum eam appellarit. in qua ut dixi quatuor huiusmodi luxationes hucusque extitisse manifestum est. nam quia omnes medici de ijs quæ præter opinionem incidebant, mecum cõmunicare consueuerant: non modo, si quid Romæ huiusmodi contigisset, latere me poterat: sed quicquid etiã ad Portum, & in uicina urbe, quam Hostiam uocat, eveniebat, mihi non erat ignotum: propterea quod qui illis in oppidis medebantur satis frequentibus etiã ipsis, cum istis mihi erant amici. urbes uero quarum Hippocrates fecit mentionem, utpote in eis diutius commoratus non pluribus habitatoribus, quam uicus unus Romæ, incolebantur. nihil mirum igitur, si in urbe multitudine hominũ frequentata plures similis modo pati contingeret. Adde quod illud quoque ab experientia edoctus ad causæ inuentiõnem deductus sum. nonnulli siquidem in palæstris hoc modo luxabatur, alij praua medicorum curatione. duo enim ex ijs qui a me uisi sunt, prolapsum sibi fuisse articulum in alam dicebant: postea uero cum imperite medici molitionẽ adhiberent, impulsum articulum inter musculorum cõmissuras, sicut conspiciebatur, fuisse constrictum. Quare si multitudinẽ quẽ in Romanorum ciuitate est, duas has quoque causas adiunxeris: requires non cur tot uiderim: sed cur plures non uiderim, quib. in hunc modum brachij exciderit. Hippocratis enim tempestate qui medebatur, legitime didicerat: & præcipue in hac manuum opera erant exercitati. nunc uero uel nihil prorsus, uel breui admodum tempore didicerunt. præterea lucidã peritia mirũ dictum est quod creuerit, quamque uarias ac multiformes magistri distortiões membrorũ, luxationesque inuenierint. quæres igit, ut dixi, nõ cur tot, sed cur nõ plures uiderim, in tot millib. hominũ qui a multis aliptis, multisque imperitis medicis in tales luxationes inducuntur. Cæterũ taliũ quoque luxationũ repositiõ iisdem efficitur scopis, distentione, molitione, & depositione. oportet autem hic non ita moliri, sicut cum in alam exciderat, faciebamus. tunc enim in anteriorem partem primũ, deinde sursum articulus erat impellendus, quoad e regione ad finem in quẽ erat ingressurus, fuisset deductus. nunc uero quia in anterioribus dearticulationis partibus est, siue ad exteriorem, siue ad interiorem partem musculis diductis interclusus: in contrarium est agendum: ut a musculis attractus in alam deferatur: ac maxime quidẽ efficere hoc potest uel sola distentio, in qua melius est ut locus sub ala stabiliaf, sicut nos Smyænæ in luxatione quæ hoc modo cõtingerat, egimus. nã cum in palestra cuidam explicatum a colluctante brachium fuisset, qui modus in anteriorem partẽ propellere e sedẽ articulum præcipue potest: eo humi supino collocato distentionem similem ei quæ calce fit, adhibuimus. a tergo enim alterum constituimus, qui lorum latũ a leg circumiectum retraheret, quodam tamen prius inditq

dito quod linum alē expleret. nos uero, ut dixi, ex circumfringentibus musculis articulū expulsum remissa extēsiōe permilimus à musculis in seipsos concurrentibus attrahi, in cavitatēq; cōpellī. atq; hic quidē facile reuersus est. statim em̄ in ipsa palēstra curationē fuimus aggressi. satisq; fuit affe-
cti brachij extēsiō à nobis ipsis facta, sicut in modo repositiōis quī calce administrat quādoq; uero etiā laqueo extēsiōē fecimus. ualidis tamē esse laqueos debet. cuiusmodi est duplex carchesius, & qui ex duobus aduersarijs loris ac perpetuis cōstat. aliās quoq; inueterata iā luxatione Hippocratico scāno indigimus. de quo ipse pcedente oratione postea uerba facturus est. nunc de luxationibus huiusmodi hæc sufficiant. Sed iam ipsi deinceps de corporū ipsorū differētia in quibus magis uel minus articuli excidūt, docenti attendamus.

24 Sciendū tamen est naturas à naturis in eo multum distare, ut quæ excidunt, facile reuertantur. acetabulum quoq; ab acetabulo distat, cum aliud facile transcendatur, aliud minus. plurimam item et ex neruis copula habet differentiam, cum quibusdam laxior, quibusdam intenta sit.

Cum orationem de repositionibus absoluerit: causas nunc subiungere incipit, cur quibus facile excidit articulus quilibet, ijs absq; magno negotio reponatur. quibus uero raro id contingit, ijs difficulter fiat restitutio. dictum etiam à nobis hac de re superius est, cum & osium dearticulationi, & superiectionum musculorum uel laxitudinī, uel intentioni id ascriberemus.

25 Nam humiditas hominibus fit in articulis ob neruorum annexiōem: si laxi natura fuerint, intentionesq; facile ferāt, multos em̄ uideres, qui adeo sunt humidī, ut ijs cum uoluerint, & absq; dolore articuli excidant: & absq; dolore reuertantur.

Per contrariū mihi hoc uidetur enunciaſſe. nam cum ob naturæ hominis humiditatem nerui laxi reddantur, nō ob neruorum laxitatem humiditas in articulis exoritur: ipse cōtrariū oratione hac dicit. Sed cum uellet exprimere promptissimam neruorum extēsiōem ex humiditate hominum existerē, id nō mihi uidetur fuisse assequutus. nam præpositione ob- improprie usus ad causę intelligentiam legentes inducit.

26 Habitudo præterea quædam corporis differentiam affert, quibus enim bene se habet membrum, carnosumq; est: ijs sicut minus excidit, ita difficilius reaptatur. cum uero attenuatiores se ipsis sunt homines, & macilentiores: tunc fit, ut ijs & magis exeat, et facilius redeat. quod ita esse illud est argu-
mento: quod bobus femora tunc magis ex-

acetabulis elabuntur, cum sunt macilentissimi. macilentissimi autē boues fiunt sub finē hyemis. unde etiam eo tempore luxantur maxime. Simodo tale aliquid scribendum in medicina est. sed est sanē.

Naturæ & differentię articulorum, quibus fit, ut uel facile uel difficulter & luxationes & repositiones efficiantur, duæ sunt, quas & ego sæpe, & ipse in oratione supra hanc explicauit. accedit uero his quandoque & tertia, de qua nunc ait. quæ ex plenitudine & tenuitate corporis existit, quam habitudinem uocat. quanto enim carnosiores se ipsi homines fuerint, tanto ijs & luxationes & repositiones articulorum difficiliores euadunt: propterea quod multitudine carniū undique confringuntur. at e contrario si attenuati fuerint, cutis carniū dearticulationibus circumiectarum laxior effecta neutrum uetat. nam si gracilis natura quispiam sit, obesior nihil erit inferior. sicut enim in libris De temperaturis demonstratum est, qui gracilior est natura, sicior: qui est obesior, humidior temperatura est. quare gracilium intenta musculorum substantia, dearticulationem coarctat. obesiorum uero carnes quatenus ampliores sunt, eatenus locū circa articulum obstruūt: quatenus sunt humidiores & molliores, facilius cedunt, & capita excidentium rotundorum osium admittunt: ut par in luxationibus utrisq; his facultas existat. at si quis carnosus natura cum sit, quodam tempore gracilior euaserit: ei facilius tunc quam prius articulus et elabitur & reuertitur. eodem modo si gracilis natura pingue factus sit, eo tempore difficulter luxationes patitur: & quæ luxata sunt, ægre ei restituantur. in huiusce rei testimoniū ea adducit, quæ in bobus fieri conspiciuntur. planeq; omnia declarat, ut nulla indigeat explanatione, nisi uerbum aliquod unum aut alterum inciderit, de quo annotandum aliquid esse uideatur.

27 Recte enim Homerus ex omnibus pecudibus boues eo tempore maxime laborare nouit, & ex bobus aratores: propterea quod hyeme operantur. his igitur articuli excidunt maxime. quippe cum maxime attenuentur. alia enim pecora breuem herbā depasci queunt: boues non ita: nisi prius alta euaserit. quippe cum alijs gracilis labri prominentia, gracilis item superior maxilla sit: boui ecōtrario obesa labri prominentia, & maxilla obesa ac retusa. ut breuibis herbis subijcere eam non ualeat.

Pecudes, id est πρόβατα quod uerbū oues proprie significat, nunc dixit pecora omnia: sicut in libro De sacro morbo ita ad uerbum scriptum est. nulla alia pecus est præterquam boues & capræ. & apud Homerum etiam, ubi inquit: Multæ illi pecudes adsunt.

Cum greges pecorum uelit significare. alij quoq; ueteres hoc nomine ita uisunt.

28 Solipeda siquidē animalia, utpote ambidentia, frēdere sanē possunt, & breui herbae dentes subiicere. delectanturq; eiusmodi herba magis, q̃ cum est alta. breuis enim in totū melior, ac solidior, q̃ alta herba est. & preterea etiā alta prius fatiscit in frugem. ideo igitur in hunc modum canit.

Ceu bobus ueris iucunda superuenit hora. Quia iucūdisima alta herba ipsis apparet. sed alioqui etiam bos laxiorem quā cetera animalia articulū habet. iccirco alijs quoque magis est uolupes, & praesertim cum macer est, & consenuit. his omnibus de causis boui etiam excidit maxime. de quo plura a nobis nunc sunt scripta, quia antedictorum omnium testimonia sunt. Ceterum de quo nunc sermo est, carne expertibus citius & excidit & reponitur, quā carne praeditis. minorq; inflammatio humidis & macilentis, q̃ siccis & carne oppletis superuenit.

Frēdere, id est *ἄρκεσθαι* nonnulli significare dicunt labra inter se ita uehementer committere, ut auellere atq; abscindere partē aliquam graminis ualeant. Alij dentibus inferioribus & superiore labro idem efficere, *ἄρκεσθαι* dici asserūt. propterea quod frēdentes homines atq; indignantes, quod *ἄρκεσθαι* dicimus, mordere dentibus labrum consueuerūt. sed illos quidem dentibus superioribus labrū inferius mordere aiunt; quā uero ruminant animalia cum inferiore tantū dentium ordine praedita sint, eo ad mordendum uti. Alij frēdere inquit nihil aliud esse q̃ dentibus inter se ex utraq; parte commissis scindere. unde etiam dictum esse hic asserunt *ἄρκεσθαι*, quasi carnificare dixeris: propterea quod carniuora animalia utrisq; dentium ordinibus utuntur. atq; his quidem ea quae hic dicuntur, uidentur attestari: cum Hippocrates non ruminantia animalia frēdere, id est *ἄρκεσθαι* dixerit: sed utrosq; dentium ordines habentia, quae ambidentia seu utrinq; dentata appellant. haec depasci etiā breues herbas possunt ut equi, asini, & muli. Ex illis uero quae uno tantū ordine dentium instructa sunt, ea sola ualent idem facere, quibus tenuis ac gracilis labri prominentia est. ideo boues soli animalium quae herbas uescuntur, per hyemem alimentum penuria laborāt: eo quod neq; frēdere, id est dentibus abscindere, neq; labris apprehendere, ac detondere, sicut caprae, & oves, breuē herbam queunt. haec quidem tria animalium genera bifidulas ungulas habent. ambidentata autem solipeda sunt, hoc est solidis ungulis praedita, nomine ita per contractionem facto, pro solidipeda: *μονόφυγε* graece, pro *μονόφυγε*, quasi solunguia & solidunguia dicas. eo q̃ solum habeant unguem. talem enim in huiusmodi animalibus solida ungula obti-

Galen.

net locū, qualem in hominibus unguis, id est summum pedem. Minor autem inflammatio his exoritur: quia cum facile excidat articulus, facile etiā reponitur. ut merito uel parua inflammatio, uel nulla prorsus subsequatur. in uiolentis enim luxationibus, & repositionibus dolores musculi contrahunt, ex quibus inflammationes oriuntur.

29 Vinciturq; minus in posteriore tempore. quin & mucus subest amplior quā par sit si non adsit inflammatio: atq; ita lubricum locū reddit, articuli enim sunt omnino macilentis, quā obesis mucosiores.

De toto tempore quod subsequitur, intelligere potest: quod duplex est. alterum post repositionem, statim cum inflammatae partes curantur: alterum post curationem, cum in tranquillo statu membrum iam constitutum est. nam statim post repositionem cum inflammatio adest, ea ipsa ut ipse etiam dixit, articulum constringit. post curationem uero, quia in talibus hominibus musculorū substantia intenta est, & ex magnis inflammationibus quae superuenerunt, restat durities quaedam in musculis contracta: sit ut articulus quasi uinculo quodam coarctetur.

30 Nam ipsae etiam carnes eorum qui non recte ex arte inedia confecti fuerint, si graues sint, quā si obesi, sunt mucosiores. quibus tamē cum inflammatione mucus subest, ijs cum articulus ab inflammatione uincitur non admodum ex mucositate elabitur: elapsurus quidē, si nihil neq; amplius neq; minus inflammationis cōtigisset. at quibus articulus redijt, & partibus circūiectis inflammatio nulla superuenit: ij uti absq; dolore humero queūt: nullamq; ob id curam sui habendam sibi amplius opinantur. contra quorum opinionē uaticinari medici pariter est: huiusmodi hominibus & rursus magis excidit, quā quibus nerui fuerint inflammati. in omnibus in homine ita res se habet, & praecipue in humero, & genu. quippe cum haec maxime etiā luxentur. quibus cunctq; uero nerui inflammati fuerint: uti humero, cum & dolor, & inflammationis intentio prohibeat, non possunt. ijs cerato, & plagulis, & linteis multis deligando succurrendum est. sub alamq; munda ac mollis lana conuoluta, quae sinum expleat, subiicienda: ut & firmamentū deligationi exhibeat, & articulum sustentet. brachium autem ita ut in superiorem partem uergat, detinendum ut plurimum est. sic enim fiet, ut caput humeri procul a loco in quem lapsus fuerat, absit. ubi autē humerū deligaris: postea

tom. 6

S

brachium

brachium ad costas mitella aliqua corpori circumducta alligandum.

Quicumq; uel ob famem uel ob iracundiam, uel ob luctum, uel ob dolorem, uel ob stomachi fastidium minori alimento sumptio q̄ cōueniebat, extenuantur: ijs non statim carnes siccae efficiuntur: quemadmodum illis, qui recte ab arte inedia confecti fuerint: sed humidiores in omnibus in totū habitibus euadunt, cum ob defectū alimēti colliquationes quedā, & cōtabescētia in ipsis fiant. illi uero etiā magis contabescunt quibus dolor accessit. unde etiā poetæ dolores & curas *μελεδολῶς* uocāt. quasi membras & coruras dicas, quod mēbra edant, & consumant, & cor urant. colliqueſcit aut in ipsis carnis adeps omnis, & quicquid molle & recēter coactum est. quando uero medicus deſicta opera attenuare, ac grācile reddere corpus aliquid uult, primū id inedia coercet: postea frictionibus adhibitis, et exercitationibus accommodatis, si aliqua colliquatio cōtigit, eam uel per sudorem qui sensui patet, uel per sensui obſcura sed ratione perceptibile diſſillationē digerendā curat. neq; ex cibis aut potibus quicq; sibi esse negligēdū ducit. sed ijs ipsis etiā faciles reddere excretiōes omnes studet, tam quæ per aluū, q̄ quæ per urinas fiunt. ita enim efficitur ut maxime unde cūq; si qua est in corpore ex colliquatione humiditas, educatur. quæ si intus maneat, mucosā mora temporis carnes efficit. nam quicquid subtile ac serosum in colliquatione inest, p diſſillationē si ea sola procuret, abire ac digerit: qd crassius est, tantū remanet, qd tēpore lētiore quodā cōtracto mucosimile euadit.

31. Refricandus item humerus est sensim, & leniter. ac multorum quidem peritū medicum esse oportet, sed certe etiam refractionis. quippe cum ex eodē nomine non idem eueniat, refractionis enim articulum laxiorem iusto uincire: duriorē quā conueniat, solvere consueuit. sed de refractione alio in libro à nobis definietur. talis igitur articulus mollioribus manibus (confert enim) & præterea leniter refricandus est.

Ne duritia aliqua ex inflammatione relinquatur: accommodata frictio est, si sensim, & leniter adhibeatur. ea autem multiformi manuum translatione faciendā est, à superiori parte deorsum, & sursum ab inferiore. & deinde non tantum sursum ab inferiore, sed à superiore etiā deorsum. quin etiam orbiculariter, & quasi per trāsuersum à dextris ad sinistram, & e contrario à sinistris ad dextra: ea causa ut fibræ musculorum omnes emolliantur. nam refractionis nomen, id est *ἀναψήφισις* pro frictione à ueteribus dicebat. quocirca ne existimes, id quod opinati nonnulli sunt, cum dicit refricandum humerum esse, uelle eum in fricando ab inferiori parte ductū manu esse faciendum. refricare enim uniuersum frictionis genus, non unam tantummodo eius differentiā ab inferiore parte sursum signi-

ficat. id quod ipse quoq; manifestat, cū inquit. sed de refractione alio in libro à nobis definietur. non enim profecto de una tantū differentia eius omnis reliquis dicturū se esse pollicetur. quin & in libro De ijs quæ in medicatrina fiunt, ipsas oēs declarauit toto genere etiā ibi nominato. refractionis, inquit, solendum, uinciendi, carnem augendi, minuendi uim habet. & quæ sequuntur. de quibus cum in cōmentarijs eiusdē libri, tum in libris De salubribus absolutissime à nobis dictum est.

32. Articulus autē mouendus est non uiolenter, sed adeo ut sine dolore moueatur: constituunt uero omnia, alia longiore tempore, alia breuiore.

Nihil in deficientibus inflammationibus huiusmodi motione uilissimum est. reliquias enim omnes ipsarū absoluit. quibus neglectis amentari ac uinciri articuli consueuerunt. utroq; enim modo affectionem hanc appellant.

33. Exciderit ne brachium hisce notis cognoscendum est.

In libro etiā De fracturis prius in peccantes inuectus est: hic quoq; cum ita fecisset, ac deinde redargutioni eorum de repositione subiunxisset ea, quæ non modo ex antedictis cōsequebantur, sed etiam illis attestabatur: nunc deinceps luxationis humeri notas tradit, quæ sanè licet in operibus artis antecendant, necesse sit, in docendi tamen ratione non esse necesse. sequuntur ne autem aliqua, aut præcedant necessario nec ne, illud tibi argumentum sit: si uidelicet uel agi opus, uel intelligi disciplina recte ante non possit, quā quod præcedit, cognitum fuerit. repositio igitur luxatorū antequam in quem locū articulus excesserit, intellexerimus, tradidare non potest: prius tamē quā signa luxationum perspexerimus, potest. nam modo in alam fieri luxationem ante didicerimus, repositionem & nos ipsi excogitare, & ab alijs traditam cognoscere postea satis possumus: fieri tamen in alam luxationem, nisi prius totam dearticulationis naturam nouerimus, perspicue intelligere non ualemus. si quis igitur loquutus de repositione, postea qualis luxationis repositionem docuerit, subiungeretis ordinem necessariū immutaret, quemadmodum si etiam differentiam prolapsionis prius persequutus, de natura postea dearticulationis quispiā pertractet. nam qui bene nouit quomodo in alam excidat articulus: ei de natura dearticulationis discernere superuacaneum est. sed si prius qualis natura iuncturæ sit, deinde prolapsionem norit: nihil ei deest, quin repositionem optime percipere ualeat. sicut etiam nunc signorum ignoratio nulli impedimento nobis fuit ad repositionem intelligendam. atq; hoc fieri in omni doctrina curationis potest. quid enim uetat, quin inflammationis iecoris, aut uentriculi, aut renis, aut colicurationem prius docere quispiam possit, q̄ eiusmodi morborum dignationē perceperit: curare tamē anteq̄ dignoscat, non poterit. extratio-

ne itidē et docendi uia non est, si uel inuenire curationē, uel doceri ab altero uelis prius, quā exatē naturā mēbri cognoueris, quod curādum est.

34 Nam cum iustum habeant corpus homines, & manus & crura: sano membro uti debemus ad non sani, et non sano ad sani exemplum. neq; alieni articuli inspiciendi.

Quod prorsus ex utraq; parte & a dextris & a sinistris aequale est: iustum appellauit. nam quia forma membrorum longorum, id est crurum & brachiorum diuersa hominibus sunt, membrum coniugatum & comparatus ipsius qui affectus est, comparandum alteri censet: ex quo quantum a naturali statu abierit, coniectandum.

35 Alij enim alijs exarticulati magis natura sunt, sed ipsa eius qui laborat membra attendenda, sanum ne aegrotati dissimile sit.

Eos qui proiectos atq; eminentes articulos habent dū in naturali statu sunt, exarticulatos uocat.

36 Atq; hoc quidem recte dictum est, admodum multam tamen propterea obintelligentiam habet: neq; satis est si tantum ratione artem hanc cognouerimus, sed consuetudine uersandum est.

Non omnem absolute ignorantiam obintelligentiam nuncupat, sed eam tantum quae adiuncta est, & uicina cognitioni: qua fallimur, & obintelligimus, id est praeter id quod uerū est intelligimus. quomodo uero contingat ut decipiamur comparando etiam sanam partem aegrotanti, ipse deinceps ostendit, cum ita inquit.

37 Multi enim sunt qui pra dolore uel alia causa, licet non exciderint articuli, in figuram tamen similem illi in quam sanum corpus formatur, redigi non possint. insuper igitur aduertenda atq; intelligenda huiusmodi figura est, quin & in alam caput brachij magis incumbere in luxato quam in sano uidetur. desuper uero in superhumerali concauus locus apparet: osq; summi humeri, utpote cum in inferiorem partem subiecit articulus, extare conspicitur.

Vnam hic obintelligentiam, ut ipse uocat, ostendit, quae circafigurationem contingit. quippe cum interdum in quasdamfigurationes affecta membra redigi non ualeant: & tamen homines quibus id euenit, non ex luxatione, sed ex dolore, aut musculi contentionē ita affecti sint. alteram deinceps ignorantem subiungit.

38 Caeterum obintelligentiam quoque hoc quandā exhibet: sed postea de hoc cum res digna scriptu sit, nonnulla scribemus.

Cum sinuatus locus apparet in superhumerali quam *inopsida* dicimus, id frustrationē quādam & deceptionē asserere ait. de qua postea scripturū

Galen.

A se pollicetur. error autem hic interdum euenit, cū iugulum a scapula fuerit diuulsum.

39 In luxato praeterea cubiti gibbus uidetur a costis magis, quā alter distare. si tamē uim attulerit quispiam, ad mouebit quidem, sed cum dolore.

Signum hoc errorem adiunctum habet: nisi etiam tumor sub ala appareat, occurrēte ibi si quis contrectet brachij capite: quo fit, ut ad costas ad moueri gibb. cubiti sine magno dolore nō possit.

40 Sursum idem rectam manū ad aurē cubito extento attollere, aut hac & illac perinde ac sanam traducere non poterit.

Hac nota est, quā paulō antea obintelligentiam & deceptionem habere dixit. perspicuum enim est ex ijs quae prius dixit. multi enim sunt qui pra dolore uel alia causa, licet non exciderint articuli, in figuram tamen similem illi in quam sanum corpus formatur, redigi nō possint. nam si manus ad costas ad mouere prompte aliquis potest, articulum quidem esse de naturali non esse dimotum certum iudicium est. sed si aliqua ex parte tamen impediatur, cum uel ex dolore uel ex musculi contentione accidere impedimentum id queat: dubia luxationis indicatio euadit.

41 Ac notae quidē luxati humeri haec sunt. repositiones itē, quas superius scripsimus, & curationes haec sunt. Operae precium autem est discere quomodo ijs quibus frequenter excidūt humeri, mederi ualeamus. quippe cum multi, licet in alijs omnibus idonei admodum sint, hac calamitate a certaminibus fuerint prohibiti: multi item inepti ad res bellicas euaserint, corruptiq; fuerint, opera precium quoq; ob illud erit, quod qui ijs recte medeatur, nouerim neminem: sed alios ne aggredi quidem rem, alios contraria quā conferat & sentire et facere uideā. multi enim medici luxatis humeris & in superhumerali, & in anteriore parte qua brachij caput extuberat, & in posteriore quoque paululum a superhumerali aduersiones adhibuerunt. quae quidem aduersiones, si brachium uel in superiorem, uel anteriore, uel posteriorem partem excidisset: recte fuissent administratae. cum uero in inferiorem partem exciderit, enunciant magis, quā prohibeant. caput em brachij omnes a superiore inani laxitate excludūt. sed ita haec aduerenda sunt. cutē sub ala digitis interceptam contra maxime eum locum in quem brachij caput excidit, attrahere debemus.

In hac quoq; oratione clara omnia sunt. quocirca, nisi

rom. 6

S 2

ca, nisi

ca, nisi ubi obscuritas aliqua occurrerit, à nobis A sunt prætereunda.

42 Deinde ita attractam in ulteriorem usq; partem deurare.

Nullam partem cutis attractæ absq; deustione relinqui uult. sed candens ferramentum à dextris in sinistras alæ partes, & à sinistris in dextras traiciendum censet.

43. Ferramētis autem adurendum est nō crassis, neq; admodum caluatis, sed oblongis: quippe cum penetrabiliora sint, aptioraq; ut manu imprimantur.

Caluata, id est *φελαικὰ*, ferramēta appellat: quæ rotunditatem quandam lauem in extremis partibus habent. cuiusmodi sunt specillorum capitula, & quæ nucleata appellantur, et spatularia. oblonga uero his contraria nuncupat, quorum extrema minime sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionum interpunctiones accommodatis instrumentis quodammodo similia.

44 Adurendūq; est trās lucidis, ut quæce lerrime, quatenus fieri potest, penetrēt. crassa enim cum tarde penetrēt, latiores crustarum casus efficiunt. periculumq; afferunt, ne cicatrices perrūpātur: quod quibus peius nihilo sit, est tamē deformius, & inartificiosius: cum uero in ulteriorem partem deuris satis erit in plerisq; si in inferiore parte adustiones has solas adhibeas.

Ignita esse ferramenta ad alam deurendam uult. admodum enim ignita & candentia translucida appellat.

45 Quod si periculum minime esse uideatur, ut cicatrices perrūpantur, sed multum in medio spaciū inter sit: tenue alius quod linitoriū specillum per adustionum foramina traiciendum est, cute adhuc suspensa ac retracta: alioqui enim traici non posset. ubi uero traiectum fuerit, cutis dimittenda: deinde inter duas adustiones, alia tenui ferramento iniicienda eatenusq; deurendum, quoad in subiectum specillum inciderimus.

Cicatrices, id est *ὀτρίδες* ulcera ipsa hic appellat. Quemadmodum poeta, qui de recenti uulnere loquens ita canit.

Donec adhuc calidum sanguen fert ipsa cicatrix. Posteaq; attractam cutē per trāsuerisū à dextris in sinistra deusseris; alteram secundam tibi faciendam censet, non transuersam illam quidem ferramento impresso, & in medio alte adacto. oportet autem medium inter adustiones spatium idonee esse magnitudinis. si enim paruum admodū esset: in discrimen res ueniret, ne perruptis ulcerationibus magna una plaga efficeretur: ex qua quidem licet quantū ad partem illam excicandam & strin-

gendam spectat, nihil peius euēturum sit: necesse tamen non est, ut magna cicatrice effecta, turpius locum illum reddamus: cum ex paruis perforationibus comparari æquale præsidium queat.

46 Quantū autē ex cute alæ intercipiendū sit, ex his cōiungere debemus. sub ala sub sunt glandulæ sed multis etiam alijs in corporis partibus. cæterum alio in libro De glandularum solimembria scribitur. quidq; sint, et quæ in qualibus significēt, quamq; uim habeāt. glandulæ igitur apprehendendæ nō sunt: nec quæ interius subsunt. magnum enim periculum impendet.

Solidam atq; integram essentia glandularum naturam solimembria, id est *ἀλυσίλιον* uocat, de qua alibi docturum se esse hic pollicetur. non tamen ullus De glandularum solimembria Hippocratis liber nunc extat. tamen si quidam ex recentioribus Hippocratis sectatoribus parum quendam librum edidit De glandularum solimembria inscriptum: qui & dicendi forma & sententijs longe à germanis Hippocratis operib; abest, ut omit tam q; neq; ex superioribus medicis quispiā mentionem eius facit: neq; qui indices librorū Hippocratis considerare, cum agnoscunt.

47 Quippe cum opportunissimis tenoribus uicina sint, sed quicquid extra glandulas est quamplurimum apprehendendum, innoxium enim est.

Subesse glandulis quæ sub ala sunt, tenores, id est *πύρις* oportunos inquit, neruos intentos ita appellans. ridiculū igitur est quod quidā recentiores medicē opinātur, qui tenores appellari à Hippocrate eos neruos tantum asserunt, qui cōiugati & pares à cerebro exoriuntur: propterea quod in libro secundo Vulgarium morborū ita scribit. duo uero tenores à cerebro iuxta os magnæ uertebre, & quæ sequuntur. nam qui ad manus & brachia feruntur, nerui ab omnibus dissectionis professoribus à dorsi medulla exoriri circa collū quæ thoraci appropinquat, conceduntur: quos & nunc appellare tenores in præsentī hac oratione uident Hippocrates: & deinceps his, & inferius etiam iterum ubi de spina dorsi agit, tenores neruos nominat.

48 Sciendum tamē est, si ualde brachium sublatū attollas: nihil ex cute sub ala quod alicuius momēti sit cōprehensurum te esse. resimatur enim in sublatione. neq; tenores ullo modo ferendi sunt, qui in promptu & intenti eafiguratione extant. sed si paululū attollas, & multum cutis apprehendere poteris: & tenores quibus cauēdum est, intus citra comprehensionem subsident.

Cutem sub ala ex nimia totius brachij sublatione absumi inquit, quia cum laxa antea esset, ut superesset.

perfluere uideretur; in hac figuratiōe ita subiectis partibus superextenditur, ut redundatio illa pereat atq; absumatur.

49 Nonne igitur in tota arte ante omnia curandum est, ut iustas figuratiōes in singulis inueniamus.

Iusta ea uocat quæ pro facultate æqualia sunt; hoc est pro dignitate uniuscuiusque rei & conuenientia. nūc enim res propōita est aduſio cutis sub ala; quæ brachio accommodatē figuratō faciēda est. si igitur brachium adeo demissum sit, ut uel costas attingat; uel parum admodum ab eis distet; ne inspicere quidem in intīmū alæ sinū licebit: nedum iniectis digitis cutem apprehendere, atq; inurere poterimus. si uero contra maxime sublatū sit brachium; nihil ex cute erit quod alicuius momenti sit, quod attrahi digitis queat: quippe cum in eiusmodi figuratiōe subiectis corporibus superintendat, ita ut nerui quoq; in promptu extēt. Quo circa tantū diducendū atq; abstrahēdū brachium ab ala est; ut & locus uisui pateat, & digitis facile subiectis cutē attrahere ac deurere ualeamus. hæc figuratiō enim iusta erit ad operatiōem exercendam; neq; amplius erit attollendū, nulla si quidem alia de causa brachium eleuamus, quā ut attrahere cutē sub ala possimus, ac deurere, quēadmodum ipse dixit. nā si etiā operari hæc possemus de misso brachio, figuratiōe ea opus est quæ laxiorē cutem reddat. nam ita & plurimū ex ea trahitur, et operis administratiō periculo omni prorsus uacat.

50 Atq; hæc circa alam. satisq; hæc comprehensiones sunt, si aduſiones recte adhibeantur.

Comprehensiones de cute hic intelliguntur.

51 Extra autē alam duo sola loca sunt, ubi aduſiones affectionem uindicantes iniicere quispiam posset.

Extra hic ad loci differentiā referri uidetur, non sicut apud Demosthenē aliosq; oratores dici consuevit, cum extra rem a se aliquid dictū fuisse aiūt, id est præter rem: Quod igitur hic ab Hippocrate dictū est, tale est, & citra hanc quā diximus alæ aduſionē, duæ alæ sunt, quæ affectioni opitulantur. quod enim inquit affectionē uindicantes, opem ferentes, & liberātes significare perspicuum est, quēadmodum etiam apud Euripidē, cum Orestem ita dicentem inducit.

Ego quidem sum matre iugulata impius, Pius sed alio nomine patrem uindicans. Hoc est liberans a contumeliā, eiq; auxiliū ferens. differt autem *πυρωρύ* cum datiuo quo hic utitur Hippocrates, & *πυρωρύων* cū accusatiuo. illud enim auxilians, hoc ulciscens & puniens, & crucians significat; unde *εαυτοῦ πυρωρύων*, id est seipsum crucians Menandri fabula inscribitur.

52 Vnam in anteriore parte inter caput brachij, & tendonem qui ad alam spectat.

Hoc in loco a nobis quoq; articulus prolapsus promerito uisus est, qui quidem totius anterioris

Galen.

regionis pars una est. cum enim anterior regio tota lata sit, unā partem plane mediā, duas utrinq; habet; alteram uersus anteriorem, cuius nūc mentionem facit; alterā extrinsecus, de qua postea ageſ. quā in re admirandus proculdubio Hippocrates est, quod cum nunquam aliam in partem quā in alam excidere articulum uidisset, satis sibi esse nō putauit si aduſionem ei accommodatam tantum tradidisset; sed duas alias etiam adiungens loca ea exquisitē cōiectura est assequutus; in quibus nos quoq; firmatum caput brachij inspeximus. ex quibus quidē humeralis uenę sedes, quā musculi duo inter se committuntur, alter a pectore magnus, & qui deltoides nominatur, quater; altera extrinsecus, de qua deinceps dicturus est, semel a nobis uisus est brachij prolapsionem excepiſſe.

53 Vbi quidem cutis penitus deurenda: ita tamen ut altius non procedamus. uena enim crassa prope est, & nerui, quorū neura sunt calfacienda.

Venā quæ humeralis appellat, crassam nūc uocat, quā magnā et latā, cui cōmissio illa antedictō rū musculorū superiacet, neruo adiuncto, ex quo tota quæ circū circa uenā est cutis, fibrarū distributio nes accipit. cauendū quidem esse ne in aduſione cutis neruum aut uenā tangamus, manifeste expō suit. sed in primis ne uenæ partibus, an in interioribus, an iuxta ipsam exacte urendum sit, non planē declarauit. possumus enim hoc facere, primū attractam cutē eo modo quo de ala dictum est, per transversum deurere; deinde traiectionē linitoris specillo in orbem secundam cauterij impressionē facere. sicut enim in ala, licet nerui maximi, & unā cum ipsis arteria & uena latissima sub esset; inurentiam tamen cutem præcepit, subiectis partibus ex specilli latī traiectione tutela præparata: ita nunc in propōita hæc aduſione nihil mirū esse debet, si cutem quæ uenæ superiacet, adurendam cēseat; neruos sanē illos sub ala tenores opportunissimos appellauit, eo nomine uti solitus de magnam uim habētibus, sicut illi de ijsq; qui & prope dorsū medullā, & crassissimi substantia sunt. hunc uero neruum qui iuxta uenā humeralem est, nerui simplici nomine nuncupauit; neq; opportunū uocauit; quippe cum & longissimē a dorsū medulla abſit, & magnitudine paruus sit.

54 In posteriore uero parte altera aduſio iniici potest, tendone qui ad alam est multo superius, brachij autē capite inferius paulo. cutisq; penitus adurenda est. sed neque hic alta impressio est faciēda. propterea qd ignis neruis est inimicus.

Ad reliquam partē quæ humeri articulum elapsū excipit, deuenit. quæ in exterioribus partibus anterioris regionis est. in quam quoq; ipsam excidisse brachium semel cōspeximus. non recte autem in plerisq; exemplaribus ita scriptum est. in posteriore uero parte altera aduſio iniici potest. non enim in posteriore parte dearticulationis lō-

cus hic est, sed in exteriore. nam si quis loca iuncturæ humeri circumfita, quæ latitudine contineant, distinguere exquisitè uelit: perspicuè sanè est eū, si omnes aduertat, in anteriorē parte lineam quamdam latitudine carentē planè mediā animo concepturum esse, quæ desuper per longitudinem brachij porrecta latitudine utrinque adiacente anteriorem partē definiat intrinsecus humerali uena, extrinsecus altero quodam tanto intervallo, quanto uena hæc à linea illa latitudine carente abest: atque hi anterioris regionis termini sunt. utrinque uero duo sunt alia loca, in quibus alæ tendones existunt: interiorē alter, alter exteriorē terminans regionem. iuncturæ enim huius interior regio ex interioris tendonis inter uenam & alam circumscriptione consideranda est, exterior ex tendone exteriorē, et linea eius interualli, quanto à linea illa anteriore exquisite mediā distare uenam humeralem dixi. posterior locus de articulationis huius sima scapula pars est: quemadmodum inferior, alia ipsa. superius uero, quicquid inter summū humerum & caput brachij intercedit.

55 Ulcera autē omni medela curanda sunt, in quo aduertendum ne uehementer brachium attollatur, sed mediocriter, quantum ad ulcerum curam sufficiat. ita enim minus refrigerarentur. confert siquidem ut omnes uestiones tegantur, quo curari cōuenienter queant, minus item digrederentur: & sanguinis eruptione infestarentur minus: minusque eis conuulsio superueniret.

Causas ipsas subiicit, cur non esse uehementer attollendum brachium iubeat. primum, quia confert uestiones omnes cōtegantur, quo curari queant: tum ne refrigerentur. alioqui enim, ut ipse dixit, ulceribus frigus mordax est: cutem circa indurata: dolorē irreparabilē creat. sed multo magis istis, quæ ex calida causa extiterunt: quemadmodum nunc ex igne. minus præterea, inquit, digrederentur, id est hiarent, & oras expanderent. quod cum fit: & magis frigeant, & serius consolidantur, & cicatrices maiores cōtrahit. quod uero deinceps dicit, & sanguinis eruptione infestarentur minus, ad omnium ulcerum uniuersalem rationem spectans, subiunxit: non ad ea de quibus nunc loquitur. nam si, ut iussit, cutem deusserit quispiam: nullum subsecuturum sanguinis eruptionis timorē, dubitat nemo. fortasse tamen ex eo quod denudata cute nerui refrigerunt, conuulsionis solius periculum impenderet: cuius etiam in fine ipse huius orationis mentionem facit.

56 At ubi iam pura effecta ulcera sunt, ad cicatricesque deueniunt: tunc profecto omnino brachium ad costas alligatum & diē & nocte semper detinendum est.

Cicatrices hic proprie pro inductione cōsolidationis ulcerum, non sicut superius fecerat, pro ulceribus ipsis posuit. maximā igitur habendam cu-

ram censet, ne brachium à costis diducatur, nisi parum admodum: atque id eo tantū tempore, quo ulceribus curatio adhibetur. maxime enim puris ulceribus ea omnia accidere cōspiciuntur, quæ modo cōmemorauit: & præcipue ab externis causis. nam dum sordida ulcera adhuc sunt, & inflāmata: sordem, & humorum præternaturaliū reductionem pro obstaculo ac tegumēto habent. calor uero inflāmationis frigori extrinsecus adueniēti resistit. ubi autem et inflāmatione carent, & pura, excrementitiisque sordibus mundata iam sunt, magis quā prius ea quibus afficiuntur, persentiant: ac propterea facile ab externis causis, & præcipue frigidis molestantur. & ob exquisitum sensum dolore, ceterisque molestiis uehementius afficiantur.

57 Quin etiam ubi consanuerunt, simili modo in multum tempus brachium ad costas est alligandum. ita enim maxime fieri posset, ut cicatrice obduceretur: & intercluderetur laxitas ea in quam maxime brachium prolabitur.

Ethic finem adustionis quæ proposuit, declarat, cum inquit. ita enim maxime fieri posset, ut cicatrice obduceretur, & intercluderetur laxitas ea in quam maxime brachium prolabitur: perinde ac si ita dixisset. quanto enim cicatrix cōtrahit ac breuior euadit: tanto in angustius spatium cutis circa alam cogitur. id quod maximum remedium est, ne eo excidere facile brachium queat.

58 Quibuscunque uero humerus repositio nē fuerit frustratus, si adhuc in auctiōe sint, os brachij læsi non simili modo ut sani augeri consuevit. sed augetur quidem aliquantum: breuius tamen, quā alterum euadit.

Ea quæ necessario illis eueniunt, qui exarticultum humerum habent: nūc cōmemorat. primum igitur ac maxime cōmune, ex quo etiam reliqua omnia cōsequuntur, illud est: quod minus alimentum brachium percipit. ex hoc enim postea fit, ut iam adultis tenuæ ac macilentum: in adulescentibus breuius euadat. hæc autem alimenti inopia, & ex uenarum et musculorum membri distortionē contingit: & ex eo quoque quod totus articulus non mouetur. nam si sanum quoque membrum diutius prorsus absque motione permaneat, manifeste macilentius fieri conspicitur.

59 Qui etiā ab ortu ancī uocantur, ob duplices has calamitates huiusmodi efficiunt. si uidelicet talis aliqua luxatio in utero eos præoccuparit, alteram item ob calamitatē: de qua postea aliquando à nobis scribetur.

Ancī γαλιανώνες à græcis appellantur, qui an à similitudine γῆ γαλῶν, id est mustellarum quasi mustellā citi dicti sint, an aliqua alia de causa: illi uiderint, qui diligēter hæc inquirere student. me dico uero utile est, si sciāt nōnullos esse, qui utrisque humeris & dextro & sinistro luxatis nascuntur: ac propterea

propterea utraq; brachia contracta ac breuia habeant. sciendumq; ei est alterā quoq; causam esse quæ huiusmodi affectionem inducat. de qua aliis dicturum se esse pollicetur. difficile tamen est alteram reperire, quæ diuersa ab ea sit, quam deinceps ipse contingere infantibus ait, in hunc modum.

60 Ad de quod quibuscunq; adhuc infantibus circa caput brachij altæ & in imo defictes suppuraciones fiunt, ij quoq; omnes anci euadunt. & siue inciduntur, siue adurantur, siue sponte erumpant: ita se habere hæc sciendum est. At qui ab ortu anci sunt, licet uti manu apertissime possint, neq; ipsi tamen attollere brachium ad aurem extento cubiti gibbo ualent: sed multo minus læsa, quam sana manu id faciunt.

Hoc quoq; foetibus in utero accidere potest. nā calamitatem ab hac diuersam quæ in utero foetificationis luxatiois causa sit, inuenire, difficile est. utraq; uero has cōtingere, ex ijs non est quæ fieri nequeant. quippe cum fieri possit, ut & suppuratio foetui oriatur, & erumpat, & à natura consolidetur: & multo magis si in humeri articulo luxatio fiat, tum ob humiditatem naturæ infantis, tum ob id quod acetabulum iuncturæ labilem exitum præbet.

61 At quibuscunq; iam uiris humerus exciderit, & repositus non fuerit: superhumeralis carne magis experts efficitur. habitusque gracilis hac in parte euadit. cum tamen dolor ijs cessauit, quæcunque abducendo à costis gibbo cubiti in latus operandum est, ea nō omnia exercere simili modo possunt, ea autem possunt, quæ traducendo brachio præter costas uel ante uel retro tractantur. nam scobinam, & serrat trahere queunt, et securi itē dolare, & farrire, modo ne nimis sursum attollere cubiti gibbum cogantur: & cætera operantur, quæcunq; huiusmodifigurationes requirunt.

Superhumeralis ijs qui ita sunt affecti non modo statim ubi caput brachij humerum deserit, attenuatur, & gracilior apparet: uerum etiam postea adhuc magis eiusmodi fieri conspiciunt. propterea quod procedente tempore musculi deltoideis partes debiliores atq; ad alimentum capiendum ineptiores redduntur: dum intentus deorsum uolens brachij caput in alam consequitur: & quia non mouetur, neq; propriam operationem exercet, qua brachium attollebat: frigidior & imbecillior, ac propterea macilentior euadit. quippe cum motio corroboaret, ocium tabefaciat.

DE SUMMO HUMERO.

62 Iis autem quibus summus humerus auulsus fuit, os quod auulsum est eminere conspicitur. est autem is iuguli & scapulae

A nexus, quippe cum hac in parte diuersa hominibus ab aliorum animalium natura sit. me dici igitur in hoc uulnere maxime decipi consueuerunt. cum enim os auulsum emineat, superhumeralis humilis & cōcaua apparet: ut ab illis quasi humerus prolapsus sit, cura adhibetur. multos quidem ego noui medicos in alijs sanè non malos, qui dum huiusmodi humeros conantur reponere, excidisse eos rati: multa damna uexando attulerunt: neq; prius destitire, quàm uel sententiam mutarint, uel reposuisse se articulum existimantes frustrati ea re tamen fuerint. his curatio ea est, quæ alijs huiusmodi: ceratum, plagula, lintea. & deligatio in eundem modum facta. urgendum tamen deorsum os eminens est: eaq; in parte plagulae quā plurimæ imponendæ, ac deprimendæ quā maxime sunt: brachiumq; ad costas in superiorē partem annectendum, atq; ita detinendum, hoc enim modo maxime fit, ut accedere ac coire auulsum os possit. Sciendum tamen probe est, et prædicendum etiā tuta hæc esse, si aliter facere uolueris: propterea quod nullum neq; paruū neq; magnū nocumentum ex hoc uulnere humero euenit: sed locus tantum deformior euadit, quippe cum neq; hoc os in pristinā sedem simili modo, ut natura erat, restitui queat: sed necesse omnino sit, ut uel paulo uel multo turgidius in superiore parte efficiatur. neq; aliud aliqd in eundē planē statū redeat, quod cōmunicās cū altero ac cohærēs à pristina cohærentia auulsus fuerit: paucis diebus dolor in summo humero sedatur, si recte deligatur.

Cōiunctionem ac cohærentiā ipsam summum humerum esse hic ostēdit: dicitq; ipsum esse os, & necesse utraq; summum humerum sanè esse charitagineum os cōiunctioni iuguli & scapulae impositum manifestū est: quo membranæ quædam exortę capitā ossium inter se colligant, unde fit, ut si id auulsus sit, iugulum quoq; eodem consequatur: ac propterea emendatio est, si iugulum deorsum urgeat ac deprimatur sic, ut circulares quodā flexus efficiat. Sed depressio hæc in adolescentibus magis succedit: eo quod quanto magis ætas progreditur, tãto corpora nostra sicciora euadūt. sicut igitur sicca ligna ad flexuras idonea minime sunt, sed humida & uiridia facile eas tolerāt: eodē modo eorum qui adhuc augeſcunt, ossa, si uis afferratur, inflecti possunt: ac multo magis si cassā sint ac fistulosa, ut iugulum est. atq; ego quidem in me ipso expertus sum: sensiq; mihi inflecti iugulum palpitabat enim profunde, cum ex uiolēta deligatiōne

tione uehementer deprimeretur. idq; ad quadraginta usq; dies sustinui: quorum spatio capiti brachij ita admotum iugulum est, atq; adhæsit: ut & qui id nunc uident, auulsus aliquando fuisse, non credant: & qui quando auulsus est, distantia triū digitorum uiderunt recessisse, rem supra modum admirantur. quod tamen ut per id tempus brachium penitus alimento deflueretur, sic ut gracie prorsus effectū fuerit: & unā cum ipso cubitus etiā non aleretur. sed hæc sanē uno tantū deligationis subsidio fuerunt emendata: totumq; membrum non multo post tempore q; soluta fasciæ sunt, alimēto iuxta restitutum, in adoleſcentulis uero, ac pueris etiā magis deprimerē os deligatio facile potest. nam mihi quidē quintum & trigelimum annum agenti pati hoc modo in palæstra contigit. non tamen aliq; alium tam adultū, cum ferre uolentiā deligationis non ualere, curare ita unquā potui. ego uero etiam ipse frigidū adeo locum sentiebā, ut toto die ac nocte calido oleo fouere eum cogerer: subiecto toti corpori corio quodā, supra quod nudus, ut pote caniculæ æstibus infestibilibus, cubabam. supposita igitur ad pedes uacua pelui coriū ea parte accōmodate figuratū fuit, ut inde in peluim defluere liquor posset: atq; ita quod in pelui collectum fuerat, iterum in leberē trāssumum, atq; ad ignem calefactum supra affectū locum totum perfundebatur. & si paululum aliquādo qui id mihi strabant, intermisissent, statim musculorum circa collum intentionem sentiebam: ut perspicuum inde esset, si in perfundendo negligentius legessissent, consequuturam facile fuisse cōuulsionem. sed mihi musculorū afflictionis alia quædam nō parua causa acceſſerat, quam cōmemorare nō abesse erit, ut existimare uniusquisq; possit, ex sola iuguli deſpressione nihil eiusmodi musculis fuisse passuros. cum enim mihi auulsus summus humerus fuisset in palæstra, alipta deſpressoꝝ super humeralem intuitus atq; humiliorem, brachiumq; in alam elapsum esse opinatus, brachium mihi extendebat, moliriq; id aggrediebatur: remq; artificiose tractabat. cum uero opus minime procederet, & frustra tempus tereretur: errare ego hominem in molitione existimās, alij unā cum ipso & brachiū deorsum, & sursum humerū distendere iussit: ipse uero digitis integræ manus in alam brachij quod excidisse uidebatur, coniectis, ut inter costas & caput brachij inserti moliendo paululū ipsum retruderent: nullōq; ibi tumore præter naturā inuento, statim desistere ab intentione eos qui unā cum alipta distendebāt, monui: nō enim excidisse articulum, ut opinabatur. at illi quasi ego dolore iam fractus id dicerem: hortabatur, ut me ipsiſ obtemperantem exhiberem, non mihi: neq; intentionem quicquā remittebant. ac fortasse musculū diuulsissent, id quod nōnullis etiā alijs contigit: nisi forte quidam alius superuenisset: qui cum sciret me nequaquā ex mollitiē intentionem fuisse prohibiturū, ut remiserint, effecit. à meq; quid euenisset, quidq; facere iuberem, requisiiuit. at ego cum auulsus esse summū humerum, oleoq; & linteis & la-

nis esse opus dixisset, in balneum profectus sum: ibiq; copioso circūfuso oleo in solio quoad potui, sum immoratus: donec quæ ad curationē spectabant, fuerunt cōportata. quare effectum est, ut mihi ex uexatione ea musculi assidua ſotione indigerent. pleriq; uero licet eis hoc non cōtingat, deligationē ipsam nō tolerant. sed difficultate ex affectione in posterum tempus malunt habere q; ad quadragelimum usq; diem laborem eum sustinere. citius enim iuguli os exacte inflecti posse non existimo. reliqua in oratione hac Hippocratis patēt.

DE IUGULO.

63 Iugulum fractum, si uere abscissum fuerit, curatu facilius est: si per longitudinem, difficilius sanatur, contrariumq; in hoc euenit q; quispiam opinaretur. nam quod uere abruptum est, cogi magis ut in naturalem statum redeat, potest: ut si curam adhibeat aliquis, quod superius abiit, deorsum cōpelere figurationibus idoneis, & accōmodatis deligationibus non difficulter queat. nā etiam si non prorsus coaptatum sit: os certe quod supereminet, nō admodū acutum efficitur. at si per longitudinem confractum os fuerit, similis ut in ossibus auulsis, de quib. superius modo scripsimus, calamitas euenit. quippe cum & cohærere inter se nō admodum partes hæ fractæ soleant, & ossis fragmentum quod eminet, ualde acutū euadat. in uniuersum igitur sciendum illud est, ex iuguli fractiōe nullū neq; humero, neq; reliquo corpori timeri nocumentum, nisi si deretur: sed hoc tamen raro contingit.

Vere abscissum inquit, caulatim abruptum, sic ut nulla in parte contineatur, cuius oppositum est non uere abscissum, quod uno modo fieri ipse declarauit, cum dixit. si per longitudinem, difficilius sanatur. simulq; ostendit quod exquisitè abruptū tur, per transuersum: quod non exquisitè, per longitudinē fractionem pati. Quando igitur penitus abscissum est, alternari ita partes ossis consueuerunt, ut cum uel sursum altera, altera deorsum, uel introrsum altera, altera extrorsum abeant: fractura propterea magna esse, atq; incurabilis uideat. at altero modo cum per longitudinem fractio accidit, licet minor lesio esse appareat: eius tamē difficilior sanatio est. quippe cum iugulum fasciæ circumuolutionem, sicut brachia & crura non admittat. quæ sola complanare, atq; astringere quod in longitudinem scissum est, potest. si hæc quæ nunc dixi, memoria teneas, nihil ex ijs quæ deinceps subiungit, tibi esse obscurum uidebitur.

64 Deformitas tamen circa fracturam euenit: atq; id primum turpissimum, deinde uero minus turpe fit.

Melius erat, si dixisset, minus turpe apparet: inter

ter initia em rei nouitate turpe id esse maxime uidetur: postea uero temporis processu assueti homines, sicut in alijs omnibus, ita in hoc quoque deformitatem negligere consueuerunt.

65 Iugulum porro non secus atque ossa alia cassa cito conglutinantur. quæ enim huiusmodi sunt, callum celeriter obducunt. quando igitur recenter est fractum, & qui uulnerati sunt, maius malum quam sit, esse opinantes, fatagunt: & medici diligentiam ac studium adhibent, ut recte medeantur. procedente uero tempore & uulnerati, quippe cum dolore non afficiantur, neque aut ambulatione, aut comestione prohibeantur, rem negligunt, & medici, quia locum eum restituere in pristinum decorem nequeunt, refugiunt: neque incuriam laborantium ægre ferunt, interim uero calli inductio acceleratur. Deligationis autem modus similis, ut plerisque alijs est. nam & cerato, & plagulis, & linteis mollibus, medendum est, & hæc insuper curanda sunt. insuperque animaduertendum in hac tractatione & plagulas plurimas supra eminentem partem imponi debere: & fasciis plurimis ea maxime in parte comprimere oportere. Sunt autem nonnulli qui coprobari iam plumbum quoddam graue superalligari, quo superextantem partem deorsum cogerent, intelligunt quidem fortasse neque illi qui simpliciter deligant. Sed neque hic modus fracturæ iuguli est accõmodatus. quippe cum fieri non possit, ut quod eminens, deprimatur, quod alicuius momenti sit. Alij uero quidam sunt, qui cum cognouerint huiusmodi deligationes erraticas esse, & non secundum naturam eminentia deorsum cogere: deligant quidem etiam ipsi plagulis & linteis utentes, non secus atque alij, sed mitella quadam cincto homine ea parte qua cingi aptissimum potest, cum plagulas supra eminentiam fracturæ impouere, ita ut extuberent, initium fasciæ ex anteriore parte cinctui alligant: atque ita eam è directo iuguli productam in posteriori partem conuoluunt atque ibi cinctui circumiectam in anteriorem partem rursus, ac rursus in posteriorem reducunt. alij autem non cinctui circumjiciunt linteum, sed intersemineo: atque inde per sedem, & spinam traducendo ac circumuoluendo fracturam comprimunt. Sed hæc quidem non experto dum audiuntur, prope ad naturalem modum accedere uidentur: utenti uero inutilia euadunt, non

enim sunt stabilia ullo tempore, etiam si iaceat quispiam. licet enim ita quammaxime sint, si quis tamē iacēs uel crus inflectat, uel ipse inflectatur, fasciationes omnes mouentur: & alioqui molesta deligatio est.

Cum causam dixerit cur cito huiusmodi ossa conglutinentur, cur inductio calli celeriter efficiat, propterea non explicauit, quia ex ipsorum ossium natura de quibus est sermo, intelligi potest. quæ enim cassa sunt, plus humiditatis in se habent: quæ effusa, ut superius diximus, & à facultate quæ in ossibus est, coagulata, callus circa fracti ossis oras concrescit, quod ubi satis effectum est, oræ ipsæ confirmitur, ac colligantur, non ex intima parte atque alite ossis conglutinatio, quemadmodum carnes solent: sed sicut dictum est, in exteriori tantum superficie quasi uinculo quodam confertur iminatio, cætera omnia si quis animum aduertat, patent.

66 Nam & sedes intercluditur, & linteæ uniuersa in hac angustitate colliguntur. cingula præterea non ita firmiter accincta sunt, ut ea quæ ipsis circumjiciuntur, non elabi sumum cogant: atque ita necesse sit, ut fasciationes omnes laxentur. quaproxime uero aliquis facere uideretur, licet magna non faceret: si aliquibus linteis circa cinctum datis, plerisque alijs ad priorē illam deligationem uteretur. sic enim maxime fasciæ & stabiles sunt, & sese mutuo tuerentur. pleraque quidem quæ ipsi quibus iugulum fractum est, contingunt, dicta iam sunt. sed illud quoque aduertendum est, iugulum ita plerumque frangi solere: ut os quod à pectore est, in superiori partem emineat, quod est à summo humero, in inferiore subsidat, cuius ea ratio est, quod pectus neque inferius multo abire, neque superius potest.

Quod inquit in angustitate, id est *σπυγγροχώρα* quali loci angustiam dixeris, copositum nomen non est, ut quidam opinantur, ex loco & angustia & humido. sed ex *σπυγγρῶ*, id est angusthumido. quod tamen nihil amplius quam angustum significat, per paragogem uetusto more ita producto uocabulo. atque inde *σπυγγροχώρα* nihil amplius quam loci angustiam notat. perspicuum hoc esse ex Simonidis etiam carminibus potest: quæ in hunc modum se habent.

Non sic opacis quispiam unquam in montibus
Pauisse fertur seuæ occursum pardalis,
Angusthumida iter solus iniens semita:
σπυγγρῶ enim hic quoque pro *σπῶ*, id est angusthumida pro angusta tantum positum esse manifestum est.

67 Articuli enim qui est in pectore paruos crissatus est.

Leuem quandam motionem crissatum, id est

κικλίσμῳ uocat. siue autē à Crissa aui quam mora-
cillam dicunt, & græce *κικλον*, nomen hoc dedu-
ctum sit, quæ pennis in cauda alsidue motat, atq;
agitat; siue ab alia aliqua re; cōsiderare ad præsens
propositum minime spectat. sed magis conuenit,
ut causam inquiramus, cur iuguli dearticulatio
quæ ad pectus est, cum ex minimis nequaquā sit,
sicut alia; aliquæ; motionem tamē nullam habeat,
quæ digna existimatione sit. quam rationem hu-
iuscerei afferat Hippocrates ipse, audiamus. sed
aduertendum, pectus hic non pro tota anteriore
thoracis parte sumptum uidetur, sed pro medio tan-
tum osse, quo cum costæ dearticulantur: quod po-
steriores medici proprio uocabulo *σθῆνος* quasi
stratum appellant; ita enim inquit:

68 Ipsum enim pectus & sibi ipsi, & spinæ
dorsi est commissum.

Sibi ipsi cōmissum esse pectus, quod stratum di-
cunt, manifeste apparet. spinæ dorsi uero etiā esse
coaptatū aperte intelliges, si in arefacto animalis
cadauere costas à posteriore parte spinæ dorsi, ab
antere strato huic innixas euidenter inspexeris.

69 Proxime quidem iugulū ad humeri ar-
ticulum natabile est: cogitur em̄ frequentem
motionem habere ex summi humeri conne-
xione. præterea cum uulneratum fuerit, pars
quæ pectori inhæret, in superiorem partem
elabitur: neq; admodum in inferiorem depri-
mi potest. quippe cum natura leue sit, & su-
pra ipsi q̄ infra inanitas laxior pateat. at hu-
merus, & brachium, & quæ his annexa sunt
facile à costis & pectore absolui queunt: ac
propterea & longe superius, & inferius abi-
re possunt. quando igitur fractum est iugu-
lum, os quod ad humerū est, deorsum incli-
natur. procliuus enim ei est simul cum hu-
mero et brachio deorsum desfluere, quā sur-
sum ferri. Cum igitur hæc huiusmodi sint;
desipiunt sanè illi qui supereminentem ossis
partē deorsum depelli posse existimant. nam
id quod infra est, ad superius applicandum
esse perspicuum est. quippe cum id sit, quod
moueatur, quodq; à naturali sede excefferit.
patet itaq; cogi id nullo alio modo posse. de-
ligationes siquidem nihilo magis appellant
quā repellūt. si uero quis brachium costis
quāmaxime adhærens sursum protrudat,
sic ut q̄ acutissimus humerus esse uideatur:
ita planè fiet, ut ad os quod à pectore est, un-
de fuerat auulsum, coaptetur.

Translatis, & uetustis linguarum nominibus,
quamuis ciuili loquutione utatur, uti Hippocra-
tes consuevit. tale quid Xenophon etiam facit.
nam ille quoq; licet ciuilit̄ sicut quisq; alius, elo-

quatur: uetusta tamen sæpenuero & translata
uerba interferit. at rarius quidem in eo frequen-
us in Hippocrate hoc reperitur: quemadmodum
in superiore oratione crissatum dixit, in hac, nata-
bile: quod uerbum idem est atq; infirmum, & sta-
bilimento carens. quemadmodum etiam quod in-
fertur, declarat: cum inquit. cogitur enim frequen-
tem motionem habere ex summi humeri conne-
xione. summus uero humerus ex articulo humeri
frequenti motione preditus est. quippe cum mini-
me int̄tus sit, motusq; maximos habeat. quod ue-
ro in principio dixit. proxime- ambiguum est, ut-
rum ad locum, an ad rem ipsam referendum sit.
nā uel proxime ad articulū mobile esse iugulum
intelligemus, quod mihi esse rectius uidet: uel ut
alijs magis placet, aduerbiū hoc- proxime- ad na-
tabile & mobile erit coniungendū: ut talis oratio
euadat. quā proxime natabile iugulū iuxta hu-
meri articulum est: hoc est quā proxime ad fre-
quentem motionem agitationemq; accedit.

70 Si igitur aliquis legitima deligatione
usus, ut celeriter consolidetur: reliqua om-
nia excepta antedicta figuratione uana esse
existimet; is & recte intelliget, & citissime
atq; optime curabit. si homo tamen cubet,
multum refert. & dies, si quiescat, quatuor
decim satis; uiginti quā plurimi sunt.

Legitimam deligationē uocat ab omnibus usi-
ratam, quæ quasi lex quædam non scripta iam sit,
ita enim & in uitæ communione consuetudines
quædam & institutiones quæ ab omnibus obser-
uantur, legibus similes euadunt: et νόμιμα, id est le-
gitima, seu instituta appellantur. fracturis enim ac
commodata deligationem nō omnes, ut pare-
rat, cōficiēbant: ac propterea plura de ea in primo
libro De fracturis cōscripsit. hic uero nulla huius-
modi affectiōi alicui deligatio adhibetur. nā sicut
& prius in cōmentarijs in eum librum æditis de-
monstratum à me est, & nunc etiam fuit repetitū:
omnes affectiones quæ modo deligationis fractu-
ris accommodatæ subiiciuntur, in eo libro ab Hip-
pocrate fuerunt cōmemoratæ: quæ uero alteram
deligationem requirunt, in hoc exponuntur. si si-
quidem fracturis apta deligatio, cū lineæ soli frac-
to membro in spiram circūducimus. altera autē,
cū in alias quoq; partes, & plerunq; eas quæ mem-
bro affecto oppositæ sunt fasciæ conuoluuntur.
quemadmodum in libro De ijs quæ in medicati-
na fiunt, etiam dicit. Humeri deligationi ea quæ
per alteram alam sit, circumductio consentit.

71 Quod si alicui contrario modo iugulū
fractū sit, id quod non sæpe euenit: sic ut os
quod est à pectore, subeat, quod est à sum-
mo humero, superemineat, superstetq; alte-
ri: nullo magno negotio in curando opus
est. ipse enim humerus dimissus & brachiū
ossa cōmittere inter se potest. & quælibet
uel

uel vulgaris deligatio est satis. pauciq; ad callum contrahendum dies sufficiunt.

Superius dixit, plerunq; fieri, ut cum iugulum totum per trāserum abrumpitur, pars ossis quæ à pectore est, in superiorem locum elabatur: altera uero quæ est ab humero, inclinet inferius. nunc de altero modo scripsit qui rarius contingit, cum eminentius à parte humeri, depressius à pectore os eradit: quod facilius curatu esse inquit. humero siquidem ipso demisso sit, ut iuguli quoq; pars quæ summo humero est annexa, simul cū ipso deorsum sequatur: alteriq; ita æqualis effecta deligationem, & curationem idoneam admittat.

72 Sin autem ita fractum non sit, sed in latus uel hac uel illac fuerit elapsum: restitui-
ere in naturalem situm oportebit, humero unā cum brachio sublato, sicut etiam antea dictum est. ubi uero in pristinam naturam redierit, reliqua medicina celerrima erit. pleraq; quidem alternata sursum compulsum brachium dirigit.

Intelligendū tibi est de ossi in interiōre uel exteriorē partē recessu dictum hic ab Hippocrate esse, sed ex me illud cognoscas, intus in corporis profunditatem, extra ad cutem esse accipiendū.

73 Quæcunq; uero ex superioribus uel in latus elabuntur, uel deorsum: ijs directio preparatur, si homine supino collocato medio inter scapulas dorso paulo sublimius aliquid subiciatur, sic ut pectus anfractum quammaxime sit: brachiumq; ei ob costas porrectum aliquis attollat. medicus uero altera manu in caput brachij impressa uola repellat: altera fracta ossa componat. ita enim quammaxime in naturam restituitur. cæterum id quod dictum iam est, superius os in interiōre partē subire facile admodū solet. plerisq; igitur ubi deligati fuerint, figuratio

ip̄sa opitulatur: cum ad costas gibbo cubiti detento sursum humerus propellitur.

Quando pars iuguli pectori commissā uel in latus, uel deorsum elapsa est: tunc inquit preparari directionē, si quis supino homine collocato inter scapulas sub ipsa dorso spina uidelicet cervical, aut puluinū, aut tale aliquid supponat: ut ea parte totus thorax recuruius ac circumflexus efficiatur, anfractum enim circum circa inflexum appellat. qua uoce etiam poeta utitur, cum inquit: Anfractum mensis super incidit.

In hunc modū igitur figurato homine uult, ut medicus altera manu caput brachij costis prætenti ac diductū in exteriorē partem repellat. ita enim fiet, ut fractæ ossis partes maxime disiliuant: cū ad id etiam circumflexa illa figuratio non parum confert: altera uero, iuguli partes inter se cōformet, ac componat. in sequenti oratione melius aliquādo inquit esse, si ad pectus cubiti gibbus adducatur.

74 Nonnullis uero humerus in superiorē partē propellendus est, ut est dictū: gibbus aut cubiti ad pectus adducendus, ita ut manus ad summū humerū sani brachij detinea-
tur. et si cubare tolerat, opponendū aliquid est quod obfirmet, ut humerus in supremā parte permaneat: si deambulare uult, fundam ex mitella facta circa acutam partem gibbi inferenda, ac collo appendenda est.

Huiusmodi figuratio in exteriorē partem caput brachij abducit: ut pars quoq; iuguli quæ summo humero coniuncta est, simul cum eo abducatur. sed ut plurimum huiusmodi figuratio opus nō esse inquit. satis enim priorem esse ad directionem faciendam, cum ad costas gibbo cubiti detento, non ut nunc ad pectus adducto, brachium sup-
pellebatur. Ad pectus itaq; adducere, nō uelut inutile solum, nobis fugiendū est, sed ueluti etiā superuacuum, quum pleraq; prior operatio corrigere possit. Si uero prior ea in agendo non successerit, ad secundam transire postea poterimus.

GAL. IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE ARTICVLIS COMMENTARIORVM

Liber secundus.

DE GIBBO CVBITI.



vm gibbi cubiti articulus dimotus aut sublatus ad costas aut exteriorē in partem est, acuta eius parte in concaua brachij subsistente, in rectum extendendus: quodq; eminet, retro et in latus repellendū est. cum uero perfecte excelsit uec hac uel illac, extensio ea adhibēda, qua brachium fractum deligatur. ita enim incur-

ua gibbi pars minime prohibebit. excidit autem maxime uersus costas: directio uero eius est, si quam plurimū abducendo ne caput brachij cornicē cubiti attingat: suspensum ita circumagamus et circūflectamus, et non in rectum extendamus: simulq; in contrariū in utraq; partem impellamus, in secundāq; ita compellamus. in his confert etiā si gibbus partim in supinam partim in pronam contorqueatur. curatio postea ex figuratio-
ne ea est, ut paulo superiorem manum
gibbo

gibbo cubiti: brachium uero ad costas habent. sic & appensio, & positio, & gestandi facilitas, & natura, & usus in communi sunt: si modo prae callus non increuerit. increscit autem celeriter. linteis uero curatio sic lege articulari, ut & acuta etiam pars insuper deligetur. rebellacissimus autem gibbus cubiti hic est, febresque, ac dolores, & meræ bilis uomitus mouet: atque id maxime, si in posteriore parte, ob torporem: sciendo, si in anteriore plapsus sit. eadem utrisque curatio. sed repositiones, si retro abiit ut extentum totum brachium intendamus. si gnum autem est quod ita excefferit, cum extendere totum brachium nequeunt. cum uero constrictere id non ualent: quod in anteriore partem exciderit cubitus, indicium est. unde his conuolutum aliquid durum ab anteriore parte imponendum, ac super id, ubi extenderis, repente cubitus inflectendus est. Dissidentia autem ossium nota est: si iuxta uenam quæ ad brachium discinditur, attraharis. Sed hæc cito callo circumdantur. ab ortu sanè quæ infra noxam sunt, breuiores euadunt: plurimum iuxta cubitum: secundo iuxta manum: tertio iuxta digitos, brachium quippe & humerus ob uersionem potiora, at altera manus ob opera adhuc potior est. si extra excidit articulus, in interiori parte caro imminuitur. sin minus, in contraria parte, quam exciderit, si extra uel intro excefferit, extensio in communi figuratio brachij ad cubitum facienda est. alæ enim habena subiecta retrahendum est, summo uero gibbo iuxta articulum pondus aliquod appendendum, uel manibus depellendum, atque ita suspenso articulo palmis coaptationes fiunt, ut in manibus. Deligatio in hac figuratio, et appensio, & positio. At cum in posteriore parte excidit, repente extento brachio palmis dirigendum: simul autem & in directione, alijs opus est. cum in anteriore, supra linteum in tumorem conuolutum constrictendum, ac simul dirigendum: sed si in alteram partem inclinetur, in directione simul utraque facere oportet. medellæ uero communis figuratio, & deligatio est. possunt etiam ex distentione communiter omnia coaptari: repositiones autem aliæ ex suspensione, aliæ ex extensione, aliæ ex circumuagatione reponuntur: atque hæc ex excessibus fi-

gurationum uel hac uel illac celeriter fiunt.
DE MANU.

2 Manus articulus uel intro, uel extra prolabitur: sed plerumque intro. signa aperta sunt. si enim intro excidit, constrictere: si extra, extendere digitos nequeunt. repositio fit, si digitis supra mensam positus in diuersas partes extensio efficiatur: os uero eminens uel palma, uel calce simul retrudatur, & in anteriorem partem et inferiorem trudatur. ab inferiori autem parte ad alterum os inuolucrum aliquod molle, si supra est, pronæ manui, si infra, supinæ est subiiciendum. curatione postea linteis peragimus. at tota manus uel intro uel extra, uel hac uel illac, potissimum tamen intro luxatur. interdum etiam appendix ipsa dimouetur, interdum alterum ex ossibus dissidet. his ualida extensio adhibenda est. tum quod imminet, trudatur: alterum uero os duobus modis simul in posteriore partem & in lateris uel manibus supra mensam, uel calce retrudatur. Quæ rebellat deformia euadunt: tempore tamē ad usum corroborantur. curatio his quoque linteis adhibetur, cum manu & cubito: ferulæque usque ad digitos apponuntur. hæc in ferulis deligata frequentius quam fracturæ resoluenda, & perfusione copiosiore fouenda sunt. ab ortu breuior manus euadit: carniūque imminutio contraria in parte quam qua est, plapsio effecta, maxime contingit. at adulto iam ossa permanent.

DE DIGITIS.

3 Dignus articulus cum prolapsus est, facile patet. reponitur uero, si in rectum extendatur, quodque imminet trudatur, & contrarium retrudatur. curatio uero mitellis, & linteis fit. si non reuersus fuerit, extra callum obducit. quæ autem ab ortu, aut in auctione luxata sunt ossa, infra prolapsionem breuiores efficiuntur: minuanturque carnes contraria præcipue in parte quam in quam exciderunt. ei uero qui iam est adultus, ossa permanent.

Explanatio desideratur.

DE MALA.

4 At mala paucis iam perfecte luxata est. Malam, id est *γῶλον* quæ bucca etiam dicitur, dissectionis professores partem illam uocant, quæ sub ea est, quæ mala proprie nuncupatur. mala enim proprie est id quod sub oculis leniter rotundum ad mali similitudinem prominet. Hippocrates uero sicut superius humeri articulum dixit pro articulo qui in humero est: ita hic quoque de articulo male loquens

quens, inferiorem maxillam malam nuncupauit. Poeta etiam malas pro maxillis ponit, ubi inquit: Ambabus feriens manibus sic uerbere cunctos. Ceu suis, excuterem e malis per gramina dentes. Malas hic maxillas manifeste appellat, quinetiam ipse Hippocrates malas deinceps in sequentibus eas uocat. Sed de appellatione haec tenus, cur uero paucis luxari maxillam dixerit, ipse ijs quae subiungit, declarat, quibus animum aduertito.

5 Os enim quod à superiore mala procedit cum eo subiugatur: quod sub aurem innectitur: quod capita malae inferioris intercludit: cum altero capite superius, altero inferius sit. extrema uero inferioris malae partes altera ob longitudinem non facile exsinuari potest: altera est cornix, quae super iugamentum excedit.

Dictum à me etiam superius est, & in explanatione de cubito, & in primo commentario, si quis ea quae ita ab Hippocrate dicuntur, planè non intelligit: est ossa praecipue hominū, sin minus, simiarum ostendenda esse, neque id faciendum nunc quando librum hunc legit, sed antea per ocium. diximus item à nobis librum quoque De ossibus ad eos qui introducutum, fuisse conscriptum: & qui percipere uult quid in his libris Hippocrates dicat, melius esse, ut prius in illis sit exercitatus. sicut igitur superius etiam scripsi, nunc mediā quandam docendi rationem seruabo: tam eorum qui uiderunt, quā qui non uiderunt, habita ratione, ita enim fiet, ut & qui uiderunt, longitudine orationis non molestantur: & qui non uiderunt, exactae disciplinae, quae absque ossium inspectione fieri non potest, quasi descriptionem quandā habent, intellige igitur, partem oris quae ad dentes mouetur, inferiorē maxillam, quae motu caret, superiorē esse. ab hisque ossibus dentes pro magnitudine & multitudine contineri. è superiore autem mala tenue quoddā eo procedere coaptarique tenui alteri, quod ex osse eo promittitur, quod auditoriū meatum continet. qua uero utraque haec ossa inter se committuntur, similem futurae esse articulae coaptationē. Os itaque hoc tenue quod superiorem maxillam capiti coniungit à dissectione peritis iugamentum, seu iugale os nuncupatur, quandoquidem etiam ipse Hippocrates, cum dicat subiugari, ostendit duo ea ossa ab hoc quasi iugo subiecto inter se cogi. sub hoc iugamentum satis magna cavitās est. quā alter ex inferioris maxillae processibus occupauit: quem *κορνίβιον*, id est cornicem & *λόγων* neutro genere uocant. alter enim processus est, quo maxilla cum osse capitis iuxta aurem dearticulatur. sed hic breuis longitudine, alter longior multo est. utroque hos medium portum iugale os distinguit: ita ut breuiore superius, longiore inferius sit. hos inferioris maxillae processus capita hic nominauit Hippocrates, cum inquit, iugamentum esse quod capita intercludat, id est distinguat inter se hos processus, ac separet: alteri superpositū, & alteri subiectum, perspicuum

Galen.

A igitur ex his est, fieri non posse ut à propria dearticulatione inferior maxilla excidat, nisi cornix eius infra iugamentum elabatur. sed neque si id contingat tantum, luxationem efficit. aperto enim ore in propriam sedem rursus reuertitur. unde si luxatio fieri debet, oportet ut prohibeatur, quominus redeat: id quod fit, si in latus distorqueatur. recte igitur deinceps inquit, nisi quis maxime huiusmodi maxillā in latus distorqueat, fieri, ut excidat minime potest. nam neque ipsa cornix abire infra iugamentum ualeat, nisi inferior maxilla à superiore quamplurimum distet: id quod in maxime huiusmodi evenit, neque sine distortionē in latus reditus in propriam sedem prohibetur. & ob haec igitur difficulter excidit, & quia ualidi musculi sunt, qui ipsam sustinent: de quibus dicentem ipsum audi.

B Præterea ex utroque his extremis nervo si tendones exoriuntur: ex quibus annexi musculi sunt, qui temporales, & manducatorij appellantur.

Quae prius capita inferioris maxillae dixerat, nunc extrema appellat: ex utroque his nervosos tendones exoriri asserens. uocare autem solet tendones, id est *τῶν τένοντες* fines eos musculorum, quos dissectionis professores pronervationes, id est *ἀπὸ τῶν πόνων* nuncupant: qui quidem medijs partibus sunt nervosiores: inter se tamen in eos differunt, quod aliquando plus, aliquando minus uel carnosae, uel nervosae substantiae in se habent. quando sane carnis substantia amplior inest, carnosam pronervationem, quando paucior, nervosam appellant. nunc igitur quia in his nervosae substantiae quam carnea amplior est, merito nervosos tendones si capitis maxillae existere inquit. ex altioribus siquidem partibus infernae maxillae annexos esse musculos inquit, qui temporales & manducatorij, seu mansorij uocantur. utrum autem eosdem musculos utroque his nominibus appellet, an alios temporales, alios manducatorios esse uelit, incertum est. nam posteriores disectores eos temporales, seu malis, temporinos nominant, qui ex ossibus temporum capitis exoriuntur: quos, dum intenduntur, committere, ac claudere os manifeste conspiciamus. alios uero qui latius inferioris maxillae partibus superiecti sunt, utrinque alter: propterea quod in manducando maxillam circumagunt, manducatorios uocant: cum illi qui è superiore parte deferuntur, efficere id minime ualeant. attrahunt enim eam sursum tantummodo, non traducere etiam hac illac queunt. unde in committendo quoque ore ipsorum auxilio indigemus: quando uidelicet uel anterioribus dentibus mordendo, uel caninis qui appellantur, abscindere aliquid uolumus. nam cum molaribus subiectum cibum confringere, ac contereere studemus, manducatio opus id uocat, à musculisque efficitur, qui latissimae partibus superiecti in latus hac illac maxillā traducunt. cōsentaneum igitur est, ut hi manducatorij appellerent: illi uero temporales, qui à temporū ossibus descendentes nervosos tendones comprehendunt, cor-

tom. 6 T nicemque

nicemq; maxillæ circum circa totam circumdant. **A** Quin etiam aliud quoddam musculorū par est, intra os constitutū: qui superiore exortum ex alaribus ossibus quæ *σφρυγιδά* appellat, & ex tota ipsis ad facente cavitare habentes inferiori maxillæ ea maxime parte innectuntur, unde processus ad dearticulationem ascendit. hi musculi ita ad manducatorios pertingunt, quos extrinsecus supra latas maxillæ partes intētos esse dixi: ut intrinsecus utrinq; alter latum id maxillæ occupent. cum igitur Hippocrates inquit, præterea ex utrisq; his extremis nervosi tendones exoriuntur: ex quibus annexi musculi sunt, qui temporales, & manducatorii appellantur. nullam hic lexisse de illis mentionē manifeste videtur, qui extrinsecus maxillæ superijciuntur: sed ad duo ea paria intelligenda nos inducit: quorū alterum ex extremis maxillæ partibus: alterum ex cavitare quæ iuxta alaria ossa sunt, eui denter exoriuntur. nam hi alterum maxillæ caput quod dearticulatur, attollunt. aliud uero illud par, quod cornices circūdare undequaq; dixi, eadem hæc extrema ad caput attrahunt.

7 Ob hoc autem uocantur, & ob hoc mouentur, quia inde annexi sunt.

Cum manducatorios uocari dixerit antedictos musculos appellationis huius causam subiungit. nam quia inde annexi sunt, id est ex maxillæ extremis partibus, propterea & mouentur dum mandimus: & manducatorii uocantur.

8 Nam & in comestione, & in loquutione & in alio oris usu superior mala quiescit.

Inferior maxilla sola est, quæ mouetur: cum duo anteriores circa collum musculi ipsam a superiore abducant: manducatorii uero adducunt, atq; admoveant. qui merito euidentem motionem habent, quia maximo ossis motui inseruiūt: ob eūq; motum manducatorii a uehementissima inferioris maxillæ operatione nuncupati sunt. nam motio quæ in loquutione fit, imbecilla est.

9 Cōnexa em̄ capiti est, non dearticulata. inferior aut mala mouetur, quippe cum et a superiore mala, & a capite abarticulata sit.

Nonnulli non *συνήρηται*, id est connexa est, sed *συνήρῃται*, id est coarticulata est, legunt: propterea quod coarticulationē quoq; ossium commissionem naturalem esse uult: quæ exiguum & obscurum aliquando, aliquando nullum motum præferet. sicut dearticulationem eam coniunctionem naturalem ossium uocat: quæ euidentem motum habent. in hac autem oratione cum abarticulata eam esse dicat, abarticulationē, id est *ἀνάρθρωσις* idem esse cum dearticulatione ostendit.

10 Cum aut in conuulsionibus & rigoribus hic primum articulus cōtentus significationē faciat: cur item ictus in tempora inflicti letales, & sopientes sint: alibi dicitur.

Cum posset breuibus rem explicare, & dicere: quia quæ circa hunc articulum sunt, prope ad ner-

uorum originem accedunt: ictus cito fieri, ut articulus hic in conuulsionibus primum incipere conspiciatur, ictusq; sopientes patiatur: cur id distulerit, nescio, nisi fortasse cum demonstratione id sibi faciendū censebat: ostendendumq; sibi esse nervos a cerebro exorientes eō innecti. id quod planē cōmemorare præsentī doctrinæ nō erat necessarium: ut propterea integram de hoc tractationem alibi scribendam distulerit.

11 Quod igitur non admodum luxetur, hæc in causa sunt.

Quænam hæc sunt prædicta nimirū: quæ duobus capitibus cōtinentur, & natura ossium, quam commemorauī, & robore musculorum.

12 Sed in causa quoq; illud est, qd non admodum fit, ut tales necessitates ciborum inuadant, ut hiare homo supra qd possit, cogatur. excidere uero ex nulla alia figuratione potest, nisi hiando quam maxime maxillam in alteram partem quispīam traducat.

Ad duas causas quas ante exposuit, cur maxilla raro excidat: tertiam nunc adiungit. quod fieri nequit, ut luxatio contingat, nisi quammaxima oris apertio efficiatur. aperire autem id quamplurimum sæpe non est opus. duæ enim talis operationis necessitates sunt, cum uel maximam rei alicuius molem ore excipere quispiā uult: uel oscitando quam maxime potest, os diducit, quorum primum raro contingit: secundum euenire dementibus tantum potest. nam diuiti Placino euenire id aliquando conspexi, cum quamplurimum posset, os apertum in latus traderet. frequenter enim in eam figurationem formare os consueuerat. & quasi egregium quid esset: sponte magis semper quam antea fecerat, hiare nitebatur.

13 Ad excidendum tamen id facit, quod quicumq; nerui & musculi sunt iuxta articulos, uel ab articulis a quibus colligantur, si in usu sæpe moueantur, idonei quammaxime fiunt, ut ad extensiones cedant, quemadmodum etiam pelles quæ optime maceratae sunt, quāplurimā distentionē admittūt.

D Quantum ad antedictas causas spectat, uel nunquam uel admodum raro maxilla erat prolapsura. non tamen ita est. sed raro quidem excidit, non tamen, ut quamplurimi nostrum non uiderint, sicut ea sunt quæ rarissime contingunt. ex frequenti enim dearticulationis motu fit, ut musculi & nerui intendantur: promptioresq; ad extensionem multo sint quam ea quæ raro ad motionis necessitatem diueniunt. non secus inquit ac pelles optime macerate, id est optime emollite quamplurimum extensionem admittunt. nam etiam Poeta τὸ δὲ λείψανον, id est macerandi uerbo utitur pro mollire: cū ait. Nam flaua cera macerata, &c.

14 Sed de quo est sermo, mala quidem raro excidit: sæpe tamen in oris hiationibus

decutitur: sicut aliæ musculorum & neruorum alternationes hoc faciunt.

Decutitur, id est *χάρα* quid significet, intelligemus: si ijs quæ dicuntur attendamus. inquit enim sicut aliæ musculorum & neruorum alternationes hoc faciunt: ut decusio hæc de qua loquitur, musculorum quoque & neruorum absque ulla articulatione affectio esse cognoscatur, quæ cuiusmodi sit, ex eo patet, quod alternationes inquit, significat enim ex naturali situ in alterum transmutari, atque id repente. nam paulo etiam post hoc significare ostendit: cum inquit deinde studium adhibendum est, ut tribusfigurationibus simul repente decutiamus, id est repente prioremfigurationem mutemus. Quinetiam nunc & in Coa & in omnibus ferè Græcanicis urbibus *χασνελαι* uocant, quasi de cussoriam dixeris, præteritum funem in curculis, quo carceres statuunt, ubi qui cursuri sunt, omnes astant: eo quod quando emittuntur, repente decutitur, & decidit. & in palaestra quoque decutere manum, id est *χάρα* nihil aliud est, quam e priore situ in alterum confestim ferre, ac mouere. decutere igitur maxillam cum dixeris, id ad musculorum affectionem referendum est, cum in repentinis agitationibus immutantur, & alternantur: sic ut pristino situ minime seruato aliqua ex parte distorqueantur: aliqua intendantur.

15 Quando uero excidit, his præcipue indicijs manifestum sit. prominet inferior maxilla in anteriorem partem: in contrariumque quam lapsus contigit, promota cõspicitur. ossisque cornix ad superiore malam turgidior apparet: quicquid hoc patiuntur, committere malas ægre possunt.

Dictum à me etiam prius est, os illud quod uocatur iugale, seu iugamentum superiori parti esse obiectum: ubi cornix maxillæ est: quæ nisi in alteram partem præterferatur, ad propriam sedem maxillam esse reditura. necesse igitur est, ut cum maxilla aliquando excidit, cornix extra iugamentum feratur. quippe cum nullam aliam quod delabatur, sedem habeat. quare merito ad superiore malam ubi iugamentum est, eminentior apparet. quod qui dem iugamentum ubinam maxime constitutum sit, cognoscere manifeste poteris: si in macilentis hominibus inter temporale musculum, & malam inspexeris. quod enim in medio horum prominet, iugamentum est. huius igitur situ obseruato, ubi aliquæ uideris qui claudere os nequeat, maxillamque in anteriore partem prominentem, atque in obliquam uersam habeat: da operam, ut & oculis & digitis diligenter scruteris, an iuxta malam & iugamentum eminere cornicem deprehendas. nam si id in ueneris, maxillam lapsam esse certo dignosces.

16 Repositio his qualis sit accommodata perspicuum est. debet enim alter caput uulnerati continere: alter in inferiore malam hian te homine quantum moderate potest, ad mœ-

Galen.

tum & intus & extra digitis apprehensam, prius aliquantisper, hac illac agitare: & tum ipse manu in latus promouere, tum ægro iu bere ut laxam malam tenens promoueat, et promouenti obsequatur quammaxime.

Iis qui structura horum membrorum quæ commemorauit, ex dissectione diligenter inspexerunt, manifesta hæc repositio est. ad quos etiam ipse spectans ita dixit. quæ etiam deinceps de repositione dicuntur, clara omnia sunt. nisi ubi unum, aut duo incidunt uerba, quæ annotabo.

17 Deinde studium adhibendum est, ut tribusfigurationibus simul repente decutiamus. nam & à distortionem in naturalem situm promouenda, & simul retro agenda inferior mala est. æger uero his obsequendo committere os, non hiare amplius debet. Ac repositio quidem hæc est, quæ ne alijs quidemfigurationibus fieri potest. medicina uero postmodum breuis sufficiet. plagula enim cerata imposita laxam deligationem adhibemus. tutius tamē administrationem hanc exercemus: si homo supinus reclinetur, caputque obfirmet subiecto scorteo puluino bene facto: ut quamminimū cedat.

Posteaquā tracta deorsum maxilla, atque a superiore prius fieri potest, abducta, musculos & neruos prius agitauerimus, ac molliuerimus: quod ipse iubet, faciendum est: & repente decutendum, id est repente & simul articulus in directum ad naturalem sedem propellendus: quod ubi factum est, statim rursus retroagendum. atque ut committat os æger, iubendum est. antea enim ipsum hiare uolebat, laxamque malam exhibere, id est nullum ex musculis intendere: eo quod id & ad agitandos musculos & neruos, & ad distortam maxillam in naturalem sedem repente promouendam, & ad eandem retroagenda, opportunissimum sit. ubi uero utraq; maxillæ extremitas è directo ad proprias sedes redacta iam est, uult ut temporales musculi cooperando ad se totam ipsam attrahant. operabuntur autem, si æger committere ac claudere os studeat.

18 Atque aliquis caput uulnerati insuper contineat.

Dum hac illac maxilla agitatur, & in inferiorem partem abducitur: uult ut caput ægri ne ad maxillam consequatur, minister contineat. hoc autem in omnibus quæ in diuersas partes fiunt, extensionibus perpetuum præceptum est. cum uero uulnerati dicit, idem est ac si laxi & affecti dixisset. Ionibus enim peculiare id est, ut læsiones omnes uulnera, hoc est *τράματα* communi nomine appellent.

19 At si utraq; luxata malæ fuerint, curatio eadem adhibetur. committere autem os isti minus possunt. maxillæ enim magis prociderunt, sed indistorta tamē sunt. indistor-

tom. 6 T 2 tum

tum in his ex terminis dentiū superiorum & inferiorum ē directo correspondentium maxime deprehenditur.

Hic malas, id est *γυδός* non totam maxillam, sed utraq; ipsius partem qua dilatatur, qua uero in ima eius ora nudum, ac carnis expers os extat, id maxillas, id est *γυδός* uidetur appellare, cum inquit maxillae enim magis prociderunt. sed tamen paulo post totam inferiore maxillam malam nuncupauit: ubi ait. Si uero inferior mala circa compagem ad mentum diuisa fuerit. sola autē haec compago in inferiore mala est, in superiore multae. unde significata mala, & maxillae apud ipsum confunduntur. Quod igitur in oratione hac inquit, huiusmodi est. Si in utrisq; dearticulationibus luxatio fit, magis quidem in anteriorem partem inferiorem maxilla profluit, quam cum in altera tantum parte luxatur: magisque distare à superiore apparet: non tamen in alteram partem retrahitur, neque distortetur: sed in distorta permanet. id autem ex directione dentium cognoscere poteris. hoc est cum e regione sectores sectoribus, canini caninis, molares molaribus correspondent.

20 His cōfert, ut quācellerrime reponatur. repositiōis autē modus dictus superius est.

Confert ut quamcitissime reponatur, prius uidelicet quam ex musculorum intentione ad cerebrum cōragio perueniat. modus autem repositio nis quo in alterius tantum partis luxatione utendum dixit: non ex toto idem mihi in hac uidetur conuenire. tunc enim in latus & in obliquum maxilla paululū promota fuerat: nunc aequaliter praepōderat. ut satis sit, si ubi agitauerimus, atq; in inferiore partem eatenus traxerimus, ut cornicis uertex inferior iugamēto efficiatur: ita demum in anteriore partem totam maxillam propellamus: aegroq; ut os claudat, iubeamus.

21 Si autē nō redierint, ex febribus cōtinuis, & segni sopore uitae periculū impendet.

Exarticulatio quae altera tantum parte fit, neq; ipsa periculo uacat. quae autem utrinque continetur, cum omnes qui inferiore maxillam continent, musculos extendat, longe infensior est. sunt autē ut dictum est, quatuor. duo ex temporibus: duo ex cauitatibus iuxta alaria ossa originem habentes: qui cum à cerebro nervos accipiant, & ferre ipsū cerebrum contingant, cito fit ut his affectis cerebrum quoque simul afficiatur. hi quidem quatuor musculi in luxationibus maxime laborant: quippe cum principales maxime omnium sint, ut pote quia tertio pari ē cerebro nervos habeant, quod non procul à principio ipso abest. fit tamen, ut qui etiam maxillae extrinsecus iniecti sunt ex utraq; parte exorientes, in huiusmodi luxationibus praeter naturam extendantur: qui quidem non simili modo ut quatuor illi, praecipui sunt. longius enim absunt à cerebro: & origo nerui ē longinquior spatio neq; ex eodem pari nervorum, ad hos pertingit: non paruum tamen etiam ipsi uim ha-

bent. quemadmodum reliqui quoq; musculi, qui per totum corpus sunt, licet his longe ignobiliores. Quocirca ex omnibus his uita in discrimine uertitur, cum praeter naturam intenduntur. dolore enim affecti, & flammati in simile malum cerebrum quoq; inducunt. cerebro uero affecto febres acutae consequuntur: omnesq; animae operationes laeduntur. nam sopor qui *καθ' ὅ* dicitur, facit, ut neq; sentiat, neq; moueatur homo, neq; intelligat: sed & rationem, & memoriam, & sensum & motum quoq; qui per appetitionem fit, corrumpit.

22 Musculi enim hi cum praeter naturam alterantur & intenduntur soporiferi sunt.

Satis alterutrum ex his est ad soporem inducendum. alteratio scilicet, uel intentio musculorum, cum ex utrisq; his caro patiatur. intentio siquidem fit, cum fibrae quae prius laxae erant, omnes in rectam lineam protenduntur: alteratio, cum uel calefacti uel frigefacti, humefacti itē aut arefacti immoderate sunt. necnon si inflammatione, aut erysipelate, aut putredine corripiuntur. in huiusmodi enim omnibus fit, ut in substantia ipsa diuersificentur. intenti uero per fibras porriguntur tantummodo, et distenduntur absq; ulla substantiae alteratione.

23 Solet itē his aluus biliosa mera ac paucaca deijcere. & si uomunt, mera etiam sunt uomitiones.

In acutissimis febribus mera biliosa gigni in corpore mirum nihil esse debet. quippe cum adeps et caro quae tenera est, recenteq; cōcreta ab huiusmodi febribus tabefiat & colliquescat: sanguis uero torreatur. nam ad uentrem & intestina huiusmodi colliquationum confluxio, propria eorum est qui in nervosis partibus dolore patiuntur: propterea quod os uentriculi quod est nervosissimū cum his simul afficitur. dictum autem recte ab ipso est, quae sunt proxima & communia, primum & maxime affligari: & quia pati id dolores, licet parui sint, non sustinet. qui enim circa os uentriculi laborant, ijs animae defectus euenire consueuerunt. In animae defectibus uero tenuia omnia excrementa in uentrem confluunt. quinetiam si id non eueniat, in uehementibus doloribus, & tristitijs talia excrementa in uentriculū et intestina confluere conspiciuntur, unde ea quae in uentriculum defluxerunt, uomitur: quae in intestina descenderunt, deiectione exinaniantur.

24 Hi sanē etiam decimo die maxime moriuntur.

Apud alios quoq; ueteres autores tale huius ad uerbū maxime significatū interdum reperitur, quali nunc usus Hippocrates uidetur: ut proximam quantitatem rei quae numero explicatur, indicet. perinde ac si ita dixisset. qui ita affecti sunt, plerumque decimo die moriuntur. ut si nono etiā uel undecimo decedant, uere dictū hoc nihilominus sit. maxime uero in hoc significato sumi solere his exemplis perspicuū tibi esse poterit. Thucydides in primo ita inquit, haec autē uniuersa quae & inter

se & aduersus Barbarū Græci gessere, annis quinquaginta maxime gesta sunt, id est fere & circiter, & in eodem quoq; abest sexaginta stadijs maxime. & Andocides in oratiōe De mysterijs canēs, inquit, homines numero quidem maxime trecentos. Sed apud omnes Græcos multum huius aduerbij in hac significatione usum inuenies.

25 Cum uero fracta inferior mala est, si nō est prorsus decaulata, sed os adhuc cohæret, contractum tamen est: per transuersum linguæ subiectis digitis dirigendum est: extrinsecusq; sicut confert, renitendum. & si distorti dentes sint iuxta fracturā ac dimosti, ubi ossa in sedem suam fuerint collocata, non duo tantum proximi dentes, sed ulteriores quoq; præcipue quidem auro, sin minus, lineo filo alligandi inter se sunt, quoad os corroboretur. deinde cerato & plagulis paucis, paucisq; linteis nō nimis compressis, sed laxis deligatio est adhibenda.

Quando fracti ossis nihil illæsum subsistit, sed absoluta à se mutuo utræq; partes sunt, sicut nulli cohæreant inter se, & contineant: fracturæ hæc speciei recentiores medici caulatim factam appellat: propterea quod Hippocrates quoq; hic dixit, si nō est prorsus decaulata, id est abscissa atq; abrupta, reliqua & huius orationis & sequentium manifesta sunt. si quid inciderit tamen, explicabimus.

26 Sciendum tamen deligationē quæ linteis fit, malæ fractæ si recte adhibeat, parū prodesse: si prauæ, magnā læsionem asferre.

Commune omnibus fracturis est prauam deligationem multum obesse: non multum uero prodesse si recte adhibeatur in maxillæ fracturis, id non omnibus ossibus cōmune est, sed illis tantum conuenit, quæ circumuolutionem fasciarum non admittunt: si quis non os affectum ita seruauit, ut à medico compositum fuit ac conformatum. in maxilla uero etiam illud accedit, quod deligatio molestiam parit: utpote quæ semper nuda atque intacta manere consueuerit.

27 Frequenter uero iuxta linguam intrastandum est: diuq; digitis renitendū dum os contractum dirigitur. optimumq; esset, si id semper posset: sed non licet. at si decaulatū prorsus os sit (quod raro quidē contingit) eo modo quo dictū est, dirigi debet. quod ubi factum ferit, dentes iungendi, sicut antea etiam diximus. id enim ut quiete permaneat, multum confert. præsertim, si quis sicuti debet futuris iniectis eos coniunxerit. At enim facile non est, ut tota manū operatio scriptis exquisitè tradatur: sed ex ijs quæ scripta sunt imaginanda est.

Tractare, id est *μειναι* palpare ac palpando

Galen.

A & conrectando explorare significat: intrectare uero intus & in ima parte tractado digitis percutari: sicut hic ab Hippocrate usurpatur. uult enim ut iniectis in os digitis nunquid partes fracti ossis alternatæ sint, diligenter exploretur: atq; ita in sedem suā redigantur, ad quodcunq; cōferre uisum fuerit si in exteriorē partem inclinetur, manu obiecta. nō debere autem medicum semper id facere, sed ægotantem etiam, hic doceri manifestum est.

28 Deinde aluta Carthaginenſi opus est. sed si adolescētiō sit is, qui uulneratus est, si tergo eius utamur, est satis. in prouecti oribus aut ipsa aluta utendū est. ex ea habena latitudine circiter trium digitorū, uel quomodo cunq; cōgruerit, secamus: ac sub lita prius gūmi maxilla (ita enim permanet magis) ad abscissam partē glutino extremū eius agglutinamus, sic ut quasi digitum, aut paulo amplius à uulnere absit: atq; id in inferiorē parte. habena uero è processione meatu incisa sit, ut acutā eius partem utrinq; cōplectatur. tū altera habena huiusmodi, aut paulo latior superiori malæ parti agglutināda: quæ etiam ipsa tantum à fractura absit quantum altera: discissaq; etiam ipsa sit, ut circum circa excipere aurem possit.

C Mollem esse uult alutam, cuiusmodi tunc fortasse Carthagine aduehebatur, huius enim nominatim exempli causa mentionem fecit. quemadmodum etiam superius in libro De fracturis Aegyptiam alutam commemorauit. tergus autem, id est *ισχυς*, partem eam que extrema est, atq; ob id durior & densior, appellari hic ab Hippocrate perspicuū est. quo pacto uero extensione fracturarum partium maxillæ in diuersa utatur, ipse declarabit: si propositio huiusce rei attendamus. uult enim ut superior pars fracti ossis ad mentum; inferior sursum ad caput intendatur.

29 Deacuminatæ autem circa connexiōnem habena esse debent: ubi cōnectenda & alliganda capita earum sunt.

D Angustiores esse habenas quodā modo iubet sic ut sensim latitudo earum immineatur: quo deligatio effici firmior queat. latiora enim extrema quamuis diligēter uinciantur, stabilitatem tamen non habent.

30 In agglutinatione id obseruandum, ut caro alutæ ad cutē aduertatur. ita enim agglutinabilior est.

Aluta è corio animalis cōficitur: duplicemq; habet naturam. quæ enim eius pars extrinsecus est cum ambientiaeri exposita sit, densior & nervosior: quæ intus est, mollior & rarior euadit. huius etiam ipsius interioris partis id quod exteriori appropinquat, minus molle est ac minus rarū: quod uero quæ cuti subiacent, ita attingit, id magis mol-

le & rarum & carnosum est. & propterea nunc ca-
ro alutæ ab Hippocrate uocatur: utq; ea parte fiat
agglutination, præcipit. cū em̃ mollior & rarior sit,
ad hunc usum quoq; esse accommodatiorē inquit.

31 Postea intenta etiam hæc habena, ma-
gis tamen ea quæ est ad mentum, quàm ma-
xime ne mala exacuetur, supra uerticē con-
nectendæ utræq; sunt, deinde linteo cir-
cumducenda deligatio fronti est.

Reductis ad caput ægrotantis utrisque habene
extremis ibi supra uerticem faciendam deligatio-
nem censet. inferiore uero magis intentam esse
ea causa uult, ne maxilla, ut ipse inquit, exacuetur,
id est *περὶ μάλιν*, hoc est ne in acutum procidat.

32 Et superiectamentum adhibendum, si
tut de more consueuit. ut deligatio firma
permaneat. decubitus postea in sanam ma-
lam homini faciendus est: sic tamen, ut non
mala, sed capite innitatur, corpusq; ei usq;
ad decimum diem attenuandū: deinde non
tarde nutriendum est, nam si primis diebus
inflammatio non infestari, uiginti diebus
mala conferitur. penitus enim callo obdu-
citur, quemadmodū cætera etiam rara ossa:
nisi sideretur. sed de siderationibus uniuers-
orum ossiū alia longa restat tractatio. hæc
distentio glutinamentis facta satis perdu-
rat, & reseruari facile potest: & ad mul-
tas sæpe directiones perquam utilis est. at
medici qui non cum prudentia prompti
manibus sunt, cum in alijs uulneribus,
tum in malarum fractionibus sunt tales. fra-
ctam enim malā uariē tam bene quàm præ-
ue deligant.

Quod supra omnia extrinsecus iniicitur liga-
mentum, superiectamentum nominat: siue ex ijs
quæ fimbriæ appellantur: siue ex alijs similibus
confiet. uocat autem fimbrias, id est *μαρμαρα*,
sicut etiam nunc appellare consueuerunt, segmen-
ta ea quæ indumentis ab ijs qui ea consunt, de-
trahuntur & refecantur, utpote texturarum exor-
dia. quæ sanè ob mollitiem ad hunc usum maxime
sunt accommodata. si quis tamen his careat, simili-
bus alijs uti potest.

33 Omnis siquidem malæ ita fractæ deli-
gatio ossa in fracturam inclinat magis, q̃ in
naturalem situm reducat.

Ita fractæ inquit maxillæ, id est caulatim & per-
transuersum deligatio ossa magis in fracturam in-
clinat, quàm dirigit. propterea quòd linteæ circū
affectam partem nequeunt circumducī, sed ab ex-
teriore tantum parte iniiciuntur.

34 Si uero inferior mala circa compagem
ad mentum diuulsa fuerit. sola autem hæc
compago in inferiore mala est, in superiorē

re multæ. sed nolo aberrare à proposito. in
alijs enim morborum generibus, de his di-
cendum erit. si igitur compago ad mentum
dissideat, reponere os cuiuslibet hominis
est. quod enim eminet, admotis digitis ab
exteriore parte introrsum propellendum:
quod intro inclinatur, iniectis digitis repel-
lendum extrorsum est: id autē distentio
prius adhibita sic ut distent ossa, faciendum.

Maxilla inferior ex duobus ossibus composita
est ad summum mentum exacte inter se compagi-
natis. at superior ex multis constat, quæ coarticula-
tione inter se iuncta sunt. huiusmodi tamen nomi-
num subtilis obseruatio apud ueteres non erat. un-
de etiam hic Hippocrates functiones ossiū quæ su-
periores maxillam constituunt, sub compagina-
tionis seu coherentie genus redegit, unī illi notæ
attendens quòd nulla quæ sensui pateat motio, in
huiusmodi ossium compositionibus existit.

35 Facilius siquidem ita in naturalē situm
redibunt, quàm si oppacta inter se ossa com-
pellere quispiam conetur. ubi autem in se-
dem collocata ossa fuerint, dentes hinc &
inde, sicut dictum etiam prius est, inter se
sunt alligandi, tum cerato & plagulis pau-
cis & linteis medendum est.

Hoc in omnibus his cōmentarijs scitu dignum
est, Hippocratis morē esse, ut quæcunq; cōmunia
multis particularibus præcepta sunt, ea ubi in uno
tradidit, uim rei postea declarat, quæ similibus om-
nibus cōmunis sit. quemadmodū nunc quoq; pos-
teaquam prius extendendam inferiorem maxil-
lam monuit, atq; ita conformandam, subiungit. fa-
cilius siquidem ita in naturalē situm redibunt, q̃
si oppacta inter se ossa compellere quispiam con-
etur. ita enim dicendo cōmune esse hoc omnibus
ossiibus quæ confirmanda sunt, significauit.

36 Deligationem uero breuem potius q̃
uariam maxime sedes hæc recipit. quippe
cum licet æquilibris non sit, prope ad æqui-
librium accedat.

Planè æquilibre membrum id est, quod forma
est cylindro quàm simillimum. uoco autem cylin-
dram non quòd pueri ludunt: sed figuram eam qua
columnarū scapi præditi sunt cuiusmodi sanè ex-
quisite in nullo osse, in femore & brachio magis
quàm in alijs reperitur. inferioris enim maxillæ,
non esse talem figuram perspicuum est. unde neq;
æquilibre eam esse inquit, sed propè accedere
ad æquilibrum: propterea quòd dextra eius pars
sinistræ in omnib. similis, atq; æqualis est. ut quod
ex utrisq; ossibus est compositum æquilibre effi-
ciatur, cum in neutram partem magis propende-
at. maxilla autem uarias deligationes admittit: si-
cut in deligationum exercitatione quæ prima om-
nium est, iam didicistis.

37 At lintei circūuolutio faciēda si dexte-
rior mala excessit, in dextrā: in dextrā enim
tūc fieri cēsetur, cū dextra manus deligatio
ni praeit. sin altera, altero modo agēda fasciā
est, ac si recte quidē reposita fuerit, & insup
ut debet, quieuerit: & cito cōsanescit, & den
tes illaefos habet: sin minus, & tardius coit,
& distorset: ut dētes laesi et inutiles efficiant.

Dictū etiā superius est, in ulceribus quā labrū
alterū hians atq; expāsum habēt, initio fasciā post
labrū illud iniecto circa id cōuolutionē faciendā,
sicut labra utraq; inter se applicētur. hoc enim cō
mune omnibus est, quē in pristinū statum sunt re
stituenda. ita igitur etiā nunc in maxilla seruandū
hoc cōmune est, quod excedentē partē ad alterā
cōstringat ac cōpellat. id quod efficiēt, si lintea
altere eā applicabunt. applicabūt uero, si cum dex
tra pars excessit, inde initio factō in sinistra: si cum
sinistra est affecta, ab ea exorsi in dextrā fasciā de
duxerimus. Hippocrates uero cum à dextra parte
exordio sumpto in alterā linteorum deuolutionē
facimus, huiusmodi deligationem in dextram uo
cat, non fasciā deuolutione, sed manus ipsius du
ctione cōsiderata. nam si medicum ex aduerso æ
grotanti stare consideres, quā à dextra mala in si
nistram fertur deligatio, dextrā manus: quā à sini
stra in dextram, sinistra ductione incipitur.

DE NARIBVS.

38 Si nares uero frangātur, fractionis mo
dus unus non est.

Ipsē deinceps uarios hos modos explicabit. uel
enim pars aliqua earum frangitur, ita tamē ut con
tinuitate seruata neq; deorsum desidant, neq; in al
terā partē distorqueantur. uel sic ut alterū horum
contingat. atq; hæc uel in cartilagine quā in antero
riore parte est, uel in reliqua ossea parte accidunt.

39 Sed enim qui pulchras deligationes
absq; intellectu se sectantur: cū in alijs mul
tis, tum in naribus uel maxime aberrant.

Per dissimulationē pulchras deligationes appel
lat, nō quod reuera sint bonæ & pulchræ. quæ enim
huiusmodi uere sunt, id student, ut in naturalē se
dem affectū partē restituant. sed ita eas uocat, quæ
speciosæ uisum intuentium oblectant. quæ cuius
modi sint, ex sequenti eius oratione perspicies.

40 Ex deligationibus enim hæc uaria ma
xime est. quippe quæ plurimas ascias, inter
ruptionesq; & interceptiones cutis rhom
bales maxime uarias admittat. Sicut igitur
dixi, qui stultam illam manuum promptitu
dinē ostentare student, fractas nares liben
ter curādas suscipiūt, ea causa ut deligēt. sed
uno tamē aut altero die & medicus, et æger
lætatur. deinde cito (molesta enim gestatio
est) qui deligatus est, fastidit: & satis medi
co est, qd se uariā deligationē nariū scire o-

stētarit. huiusmodi uero deligatio cōtraria
omnia q; cōueniebat, efficit. nam siue ex fra
ctione defederint nares, cū desuper magis
quispiā comprimit, magis resimant. siue uel
hac uel illac distortę fuerint, aut circa carti
laginem aut superius, nullam ex huiusmo
di deligatione utilitatem cōsequuntur: imō
magis lædi consueuerunt.

Asciam, id est σκιαν, deligationē uocari quē
à trāuersa iniectione paululum declinat, superius
diximus. interruptiones uero distantias & inter
ualla quæ inter lintea sunt uocat. at rhōbales, quæ
figura sunt æquilatera, sed nō rectangula. ita enim
rhombus ab Euclide definitur. didicisti autem in
ter fasciationes primā ferē omnium rhombum ap
pellari, ex eo quod tales præcipue figuras efficiat.

41 Non ita enim ex altera nariū parte im
ponere plagulas cōgruet. tametsi neq; hoc
qui deligant faciunt.

Nihil prodesse naribus ex fractione in latus dis
tortis deligationem inquit. nam quod alicui uide
ri posset huic rei esse accommodatū, præstareq; auxi
liū, neq; id quicq; ualet; præstare enim auxiliū ui
det, si à latere in qd inclinatę fuerint, linteis obfir
ment. tamē neq; hoc posse pdesse admodū asserit.

42 Proxime uero resistere mihi deligatio
uidetur, si uel in medijs naribus circa acutā
partem circumtusa caro supra os fuerit: uel
os quoq; non multū, sed paululū offensum
sit. in his enim nares callum superinducūt,
ex eoq; asperiores aliquantulo euadunt. sed
neq; his tamen multo negocio indiget des
ligatio: si modo quippiam deligandum est.

Proxime eō accedere ut utilitatē afferat, cōmu
nis narium deligatio uideri posset, cum in medio
uel cōtuso carnis cōtigit, uel os quoq; ipsū affe
ctum aliquantulū est. quippe cū ex calli obductio
ne eminentia quādā nisi cōprimatur, cōsequi so
leat: deligatio uero id prohibeat, atq; affectam par
tem cōprimat. sed neq; his tamē deligatio necessa
ria est. studendum enim ut contusiones præcipue
quidē absq; inflāmatione cōseruemus: & si inflā
mentur, q; citissime inflāmationē finiamus. nam
incretens callus nihil his deligationibus indiget.

43 Sed satis est si supra contusionem pla
gella cerato illita superimposita, deinde, si
cut ex duobus initijs deligatio sit, ita linteo
semel circumuoluamus.

Media lintei parte supra mediā narium par
tem iniecta non uolenter alterutrum ipsius ini
tium post caput adductum, atq; inde ad frontem
reductum ibi deligandum est.

44 Optima tamē medicina est, ut farinæ
hornotinæ, elotæ, tenacis, aqua subactæ
modico, huiusmodi uitia oblinamus.

Qui uerba Hippocratis explanare optime uidetur, hornotinum triticum, id est *οντάριον*, dictū esse ab eo inquit quod hornum quasi hoc anno, id est *οντός* quod Attici per τ utraque syllabas pronunciantes *οντός* dicunt quasi *οντός*, id est hoc anno, factū est hoc est ueris tempore: quod & trimestre & a quadraginta diebus numero, quadraginti nuncupatur. sed ego tamē hornū seu hornotinū, id est *οντάριον* & in Coō, & apud omnes Asiæ græcancas nationes genus tritici esse noui: quod sicut paucos fursures habet, ita lentum ac tenax farina subactū efficit. id quod maxime hic Hippocrates requirit. quemadmodū deinceps subiungit: ut si id non adsit, mannā aut gummi lentoris causa immisceri iubeat. feritur sanē hoc uere ineunte, non secus atque illud quod bimestre, & ex hora anni præcipua hornū appellat. cuius farina subactū tenax maxime euadit, si ubi molitū triticū est fursuracea omnis pars detrahaat. id autē sit cum tenuibus cribris, tum si ante moliturā præluatur. quemadmodum enim hordeum quod decorticat corticē magis remittit, si rigatū fuerit: sic triticū. sed quo pacto idē est rigare & eluere? non est sanē idē. nam apud omnes triticū in moletrinis antequā molatur, rigari cōsuevit. elui uero non apud omnes, sed in plerisque tantū Asiæ urbibus solet. magnos enim fiscos tenuibus uimibus intextos habet, exiguis adeo foraminibus, ut puluerē & harenā transmittere possint: triticum cōtineant. in quos cum iniecerunt triticū, prius excutunt: deinde in aquā demittunt, sic ut totū demergatur. atque ita fit ut triticum & eluatur, & moderate etiā rigetur. cū enim ex aqua extrahit fiscus, maiore humoris parte decolata tantū tritico adhæret, quantū ad moliturā sufficit. nam si exterior eius cortex extrinsecus rigatus non sit, ac madefactus, adeo granis inoluit, ut sub mola rufus in minuta ramēta cōteratur. atque ita fieri non potest, quin dum cribro excutitur, ex minutis illis fursuribus aliquod unā cū farina egrediat. at si rigatio præoccupet fit cū fursuraceum omne excrementū grandiusculū remaneat, simul cum farina excuti nequeat. atque ita ex tritici madefactione farina purgator euadit. atque ideo ait, elorā & tenacis. huius igitur horni tritici interior quæ sub cortice est pars, quæ quasi caro eius est, in farinā, ut dixi, redacta ac subacta, satis tenax efficitur. quod autē inquit elorā farinā, id ita intelligendū existimārim, ut lorā farinā Hippocrate appellasse dicamus, quæ expurgato hoc modo, ac prius madefacto tritico effecta est. nam si non ita intelligere quispiā uelit: restat, ut lorā farinā eam uocemus, quā aqua inspersam ac perfusam, atque in ea multasie agitata, deinde tantisper depositam quoad quicquid superenatabat, defecerit: tum aqua desuper dempta decoquimus. id quod facere in farre consueuimus, sed repugnat hoc ei quod subiungit. subigere enim aqua hanc farinā iubet. quod sanē eligare ac decoquere dixisset, si ita faciendum censuisset. quæ enim illo modo eluitur farina non subigitur: sed tantū elixatur. unde etiam hoc quod dicit ex eo quod in hac ipsa supra posita

oratione inquit, aqua subacta, id est *πεφραγμένον* intelligi magis potest.

45. Siq̃ ex bono tritico est farina, ac ductilis: ea ad huiusmodi omnes usus adhibenda. sin autem ductilis non admodum est: paululo mannā quam tenuissime tritæ atque aqua dilutæ subigenda est: aut gummi parum iniiciendum. Quibuscūq; autem fractæ sic nares sunt, ut deorsum atque in sinum inclinentur: si ex anteriore parte circa cartilaginē desendant: fieri potest ut quod dirigat aliquid intus adijciatur. sin minus, digitis iniectis, si licet, excitanda omnia huiusmodi sunt.

Bonum triticum hoc est *ἀνάλον*, id quod optimum est uocat. hanc enim appellationem ueteres de omni re dicere consueuerunt, quæ in proprio genere prima sit. quin nunc etiam omnes qui circa panificium uersantur, optimum esse triticū asserunt, quod densum substantia est. rarum enim & cassum sicut multum fursuris in se habet: ita subactam farinam lentam ac tenacem non facit. ductilem autem tenacē ex eo quod accidit, uocat. propterea quod uidelicet si intendamus in contrarias partes, ac distrahamus ex farina subactum non diuellitur: sed ducitur. quod uero lentum non est ac tenax, in huiusmodi operationibus diuelli ac dirumpi consuevit. si enim diuellitur, quomodo sequi id manus intēdentes ac ducētes asserere possimus: at si non sequitur, qui fieri potest, ut ductile esse demonstretur: nam quod diuelli nequit, sed continuum in longum ducitur, merito ductile appellari potest. perinde ac uiscum, quod cum in contrarias partes manibus nostris distrahit, quam longissime ducitur ac distenditur. adde quod inde etiam tenax esse hoc subactum farinā uelle Hippocratem, manifestum est: quod si huiusmodi nō sit, mannā ipsi, aut gummi immisceri iubet. manna autē thuris succussio ac pollen nuncupatur, quæ si non affuerit, thus ipsum quod pinguis sit sumptum terere ad hūc usum poteris. Ego porro cum neq; thus neq; gummi suppetere, liquidam resinam, quæ forte aderat, adhibui. sed si hæc quoque desit, melle utendum est. satius tamen est, si mannam aut gummi imponamus. quippe cum & mel & resina quodammodo calefaciant. id quod inter iniecta inutile est. cum uero tempus iam processit, inflammationisq; reliquæ adhuc sunt, hæc alijs utiliora euadunt. Sicut igitur antea exempli causa alutæ Egyptiæ primum, deinde Carthaginensis mentionem fecit ita etiam nunc hornotinū frumentū appellauit: perinde ac si dixisset, farina ea est utendum, quæ subactum tenax sicut hornotinum triticum efficiat. fortasse etiam hornotinum, id est *οντάριον* triticum omne appellat, cui accidit, ut & densum sit, & subactū ex farina tenax ac lentum reddat. ut ex accideri potius quam ex aliqua peculiari specie nomen hoc habeat.

46 Si non licet, crassum sublinitorio non in anteriorem narium partem, sed qua deficiunt, subiiciendū. extrinsecus uero hinc & inde cōprehendendum digitis, simulq; cōprimendum, ac cōpellendum sursum est. q; si in anteriore admodum partem sit fractura, potestq; aliquid, sicut iam dictū est, intra nares indi: concerpta ex sudariolo linamenta, aut tale aliquid linteo cinctū, aut potius Carthaginensi pellicula circumfutū in ac cōmodatam formam figurandum: ut inferi apte in locū queat. si uero fractura ulterius sit, nihil adijci intus potest. nam si in anteriore parte molesta est gestatio, quomodo in terius non erit? Primum igitur & intrinsecus conformandū, & extrinsecus, in sedēq; pristinam restituendum, et dirigendū nihil parcendo est. Valde enim nares fractae prae cūque quidem eodem die, sin. minus paulo post reformari queūt. sed ignaue agūt medici, & leuius primū, q; oporteat, rem aggre diuntur. oportet enim ut subiectis hinc & inde digitis pro nariū natura q; infime ab inferiori cōpellat, atq; ita maxime simul extrinsecus dirigendo excitet. deinde nullus alius medicus ad hanc eiusmodi est, si studeat ac tolerare uult, ut digitī ipsius indices. hi enim naturali nariū sinui prae cūque sunt accommodati. debet enim utrisq; his digitis subiectis per totas nares, atq; in eas firmatis, quiete ita se habere, maxime quidem, si fieri potest, semper, quoad os confirmetur: sin minus, diutissime, sicut dictum est, sed si ipse nequit, uel puer uel mulier (molles em manus esse debent) id praestent. ita enim nares, si non distortae, sed in inferiore partem depressae aequabiliter sint, quam optime curantur. & ego quidem nullas unquā nares uidi hoc modo fractas, quae si quis recte mederi uelit, & statim anteq; callus increuerit, cōpellat: restitui non potuerint. Verum homines si deformes fiant, magni quidē pendunt: studere tamen ac laborare nisi aut dolore afficiantur, aut mortem timeant, neq; sciunt, neq; patiuntur. cum tamē nares breui tempore occallescant. decē enim diebus, nisi sideretur, cōfirmari solent. quibus cūq; autem os à latere frangitur, medela eadem adhibetur: directio uero nō aequabiliter utrinq; faciēda est: sed quod inclinatum est, in naturalem statū extrinsecus compellens

A dum: & quod intro incidit atq; illapsum est in nares coniectis digitis in tergendō atq; intrectandō celeriter dirigendū, quoad bene restituitur. certoq; id sciendum, nisi mature succurramus, fieri nō posse quin distortus nasus remaneat. ubi in naturalem situm omnia redacta fuerint, in locū quō promissentia excefferat, uel pluribus uel uno tantum digito applicato cohibere uel ipse, uel aliquis alius debet, quoad fractura fuerit corroborata. quin et paruo digito intus adiecto aliās atq; aliās repellendo quae inclinata sunt, dirigere oportet. quicquid uero inflammationis subest, id farina subactō curandum est. nihilominus tamen licet id impositum sit, digitis pari modo est applicandum. quod si ad cartilaginē in latus fractae sint nares, summum nasum detortum effici necesse est, debetq; his in summam narem directoriū aliquod ex antedictis, uel quod conuenire uideatur, inferi. multa etenim ad hunc usum inuenire idonea quispiam poterit: quae neq; odorem habeant, neq; alioquin initia sint. Ego sanē pulmonis ouilli frustum quoddam resectum (id enim forte aderat) immisi. nam spongiae inditae humectationes excipere consueuerunt.

C Si fieri non posset, inquit, ut digitī iniicerentur, sublinitorio utendum est. ita autē appellat, ut superius dixi, instrumenta omnia ad sublinendum idonea: cuiusmodi sunt specilla, & spatularia, & nucleata, quae in summō rotunda capitula habēt. sed sicut in deurenda ala tenuissimis sublinitorijs erat opus: ita nunc crassa sint, necesse est. quippe cum digitos ad eundem usum, quādo licet, intra nares iniicere consueuerimus: quibus fractas nariū partes conformamus, & componimus. quomodo uero uti sublinitorio debeamus, manifeste ipse docet: cum non in anteriore partem narium, sed quā maxime delapsa est fractio, eō subiiciendum esse D moneat. id siquidem est quod molitione maxime indiget, ut sublatum in naturalem sedem restituitur. neq; enim conformare et cōponere quippiam aliud possumus, nisi propria unicuiq; sedem restituerimus. reliqua huius orationis perspicua sunt.

47 Postea ex Carthaginēsis alutae tergo re pollicaris latitudinis habena incisa extrinsecus ad narem inclinatā agglutinanda est: deinde quatenus cōueniat, intendenda. imō paulo amplius intendi debet, quoad uidelicet erectus & abstractus nasus sit. infra praeterea aurē tractata (lōga em sit necesse est) & circa caput reducta ad frontem quidē agglutinari sine suo potest. potest etiam

longius duci, sic ut capiti circumacta deligetur. id quod simul & iustam deligationē affert: & reseruabile præterea est, ut maiorem si uelit quispiam, uel minorem narium repensionē facere possit. nam quibus in lae- tus nares franguntur: reliqua medicina sicut dictum est, adhiberi debet: plerumque tamen opus est, ut habena hac repensionis et retractionis causa summæ nari agglutinetur. At si fractioni uulnus quoque cuspis accessit, turbari ob id nihil debemus: sed picatum ceratum imponendum, uel aliquod quod cruentis uulneribus est accommodatum: cōsanabilia enim hæc sunt. simili modo si ossa recessura sunt: & directio prima illa celeriter nihil omittendo faciēda est, & digitis postea laxius quidē, sed tamē dirigendum, nihil enim ex toto corpore est, quod facilius cōfingi quæ- res, queat. habenarū uero agglutinatione, & in cōtrariū inclinatione nihil obstat quominus uti ualeamus: siue ulcus, siue inflammatio addit: molestiam enim nullā afferunt.

Dum inquit abstractum, id est ἀσπράγην, totam illam intelligit in diuersa extensionem, & quasi directionē nasi distorti, quæ per agglutinamenta fit, cum in cōtrariam partem retrahitur: sed hoc sanè mihi experienti, imbecillum uisum est. nam quod agglutinatur, si uehemētius intendas, resoluatur: si mediocriter, nihil quod alicuius momenti sit, efficit.

DE AVRE.

48 At uero auri fractæ deligatio omnis ini- mica est, non enim ita laxè circuire quispiā potest: & si magis cōprimas, maius malum efficies, quippe cum sanæ quoque auri dolo- rem, & pullationem, & febrem compressa deligatio afferat.

Solutio ac diuisio continui in carne quidem ulcus, in osse fractura nuncupatur: in cartilagine ue- ro, quia proprium nomen non habet, Hippocrates fracturæ appellatione quoque utitur.

49 Quin & cataplasmata pessima quidē ea sunt quæ sunt grauissima: sed & pleraque alia praua sunt, & abscessum prouocant: & tum mucositatem ampliorem, tum suppu- rationes molestas mouent: quibus sanè ad aurem fractam minime est opus.

His quæ in libris De curandi ratione demonstra- uimus, particularia omnia cōsentiant. nam etiam nunc cataplasmatibus offendit aurem, inquit Hippo- crates: quem admodum experimento etiā depre- henditur. excicari enim admodū eam uult, cum & siccissima natura prædita sit, & ex cute conflet. quodecunque aut membrū quanto est siccius, tanto magis excicātē curationē postulare manifestū est.

50 Proxime tamen, si modo imponi quip- piam debet, lentum ex farina subactum ac- cedit: sed neque id pondus habere oportet. tangere uero quam minimū cōfert. bonum siquidem interdum medicamentū est, si & auri, & alijs multis medicamentū non adhi- beamus. uellicatio præterea cauenda: cor- pusque attenuandum, atque id ei magis cui, ne suppuret auris, periculum est, meliusque est ut aluus molliatur.

Proxime inquit, eò accedit ne noceat farina subacta tenax: eo quod alijs exiccat magis. dictū à nobis superius est quare sit hoc tenax farinæ ac- tum quod quod inquit, ubi de illindis atque in dū- ctis naribus loquebatur. simillimū huic cataplas- ma, quī in palæstra uersantur, ex farre conficere consueuerunt. far enim aceto maceratum quoad intumescat, postea terunt.

51 Quod si facilis ad uomendum sit, uomitus ciendus ex tractu est.

Tractus, id est *σφύγιον*, uis medicos purgatio- nes siue per aluum, siue per uomitum fierent, à ue- teribus uocabant. ex his nunc aliquā adhibendam censet: sed multa sunt quæ id efficiant. mel per se copiosius sumptum. aqua mulsa meracior. succus pitisanæ ex aqua decoctus, & per se, & cum melle. atque his magis raphanorū & bulbi narcissi uomitus. qd autē maiorē omnibus his uim habet, neque tamē lentum est, est cum furculis ueratri albi in raphanos infixis raphanos ipsos postero die uel so- los, uel ex aceto mulso comedendos exhibemus.

52 Si ad pus deuenerit, cito quidem ape- riri non debet. quippe cum multa sint, quæ licet suppurare uideantur, etiam si cataplas- ma aliquod nondum imposuerit quispiam, resorbeantur.

Cautio hæc auri ob subiectam cartilaginem adhi- betur. nam si incisā cito non coeat & conglutine- tur, periculum est ne cartilago corruptat. resor- betur autem inquit, id est absorbetur & discutitur quod colligitur ibi pus, aliquando simplicibus & leuibus medicamentis extrinsecus impositis, quæ siccādi absque morfione uim habent. cuiusmodi est cochleæ mucositas cum thure: sique opus uehemen- tiore exiccatione est, cum aloë, aut myrrha, aut u- trisque. mel item illitum. sed unumquodque quidē ex his diligenter detritum atque impositum excicat. thus uero & aloë & myrrha morfione carent.

53 Si uero aperire quis cogatur, citissime quidem cōsanescit, si in ulteriorem partem deusserit. sciendum tamen certo est si in ul- teriorem partem deuratur auris, mancam eam, atque altera minorem futuram.

Cum in deustione non parua & cartilaginis, & quæ ipsam circumit, cutis pars absumpta sit: ut manca & contracta, & minor altera auris euadat, necessa-

necessario fit. ad hoc tamen difficultate sanescendi in cartilagine formidata aliquando deueniendum esse consulit. cartilago enim si denudata sit, cicatricem non obducit, præcipue cum paucis aliquibus diebus inueterauit: neq; posteaquã incisa est, statim cutis coïst, & conglutinata est.

54 Si non in ulteriorem partem adustio fiat, incidendum non admodum parua incisione qua parte tumor eleuatus est.

Ne quicquam puris remaneat, lædaturq; cartilago, fieri satis magnam incisionem iubet.

55 Sub crassiore enim loco pus reperitur, quàm quispian opinaretur.

In dignorione puris qd sub cute subest, quædã deceptio ijs qui incidunt, occurrit: ut & multum esse id, & attenuatã esse cutem opinentur. qui quo modo hoc errore inuoluantur, sequentibus uerbis declarat Hippocrates.

56 Atq; ut summatim dicã, cætera quoq; omnia mucosa, mucosq; gignentia, quippe cum lenta sint, si cõtrecentur, celeriter sub digitis hac & illac illabuntur. ac propterea medici sub crassiore loco talia inueniunt, quàm existimant.

In dignoscendis partibus quæ suppurant, cum moderate tactui affectus locus cedit: in eo si diuidatur, pus subesse deprehenditur. quando cunq; igitur in qualibet alia parte eandem cessionem inuenerint: eodem modo ut ea quæ prius uiderant, suppurasse existimãtes, ad incidendũ deueniunt: atq; aberrant. interdumq; dupliciter peccat: sic ut & nullum omnino pus inueniant, & sub multo crassiore loco quàm opinabantur, talia sint. sæpe enim fit, ut quæ mucosum humorem in se habent, medicis propterea suppurasse uideantur: quia huiusmodi humores, ut ipse inquit, cum attrahant, cito è digitis sublabuntur, & circumfluunt. colligi autem circa cartilagine, tendones, neruos, copulas solent, quemadmodũ ipse deinceps declarat.

57 Nam & gangliosa quacuncq; fluida sunt, & mucosam carnem habent, aperiunt nonnulli inuenturos se intus humorẽ opus nati. atq; ita quidẽ medici sententia fallitur: sed nullũ tamẽ ex apertione nocumentum euenit. quacuncq; uero aquosa loca sint, aut

mucis repleta, qualibus item in locis singula si aperiantur, uel mortem, uel læsiones diuersas afferant: alibi à nobis scribetur.

Circa cartilagine enim & neruos huiusmodi gangilia concretiones quædam & contortiones sunt, quæ ex lento & mucoso humore existunt: cuiusmodi proprium neruorum alimentum est.

58 Cum igitur aurem incideris, omni cataplasmate, omniq; linamento abstinendum est. sed uel ijs medicamentis quæ cruētis accommodata sunt, uel aliquo alio est curandũ, quæ neq; pondus, neq; dolorẽ exhibeant.

Quia siccum membrũ est auris propterea exiccantibus medicamentis indiget. non tamen supra modum exiccantia esse debent, cum statim post incisionem imponuntur. dolorem enim absq; ulla mitigatione afferunt. sed neq; multitudine eorum quæ imponuntur, gratianda auris est. nam præter quam quod pondere eo dolore afficiuntur aures simul etiam nocuum est. optimum igitur est, ut posteaq; cutem aperuerimus, medicamenta mediocriter exiccantia adhibeamus: cuiusmodi sunt, quæ cruenta appellantur. Cataplasmata enim humores superuacuos, præcipue eos qui lenti & crassi sunt, includunt, & prohibent.

59 Nam si cartilago denudari inceperit, subsidentiãq; habuerit purulenta, & mucosa, molestum est.

Addendum orationi huic est: humorum quod uerbum nonnulli etiam ascribunt: ut lectio huiusmodi euadat. nam si cartilago denudari inceperit, subsidentiãq; humorum habuerit & c. uocat autem hic subsidentiã, cum uidelicet humores qui excernendi erant, hoc est pus, & mucosus succus, substans, ac residens. molestum inquit est, id est dolorem afferit. id quod cum cartilago læditur, euenire conspiciamus.

60 At hoc etiam ex illis curationibus euenit. omnibus uero recrudescētib; deustio in ulteriorem partem præsentissimum remedium est.

Quas curationes damnat: eas sanẽ de quibus paulo superius mentionem fecit. cum abstinendum à cataplasmatibus & linamentis, pondusq; & dolorem afferentibus moneret.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE ARTICVLIS COMMENTARIORVM

Liber tertius.

Vertebræ autem spinæ.

Non quod in alia corporis parte uerterbræ sint, iccirco dixit uerterbræ spinæ: omnium enim uerterbrarũ quos σπονδυλοι uocant, structura, spina appellatur. sed quasi ita dixisset. uerterbræ autẽ, quibus

proprium est ut in spinã existant. nonnulli tamen ex recetioribus medicis non totam uerterbrarum structuram spinam appellandam censent, sed circa thoracem tantum & lumbos. ad quorũ sententiã uidetur nunc Hippocrates de uerterbris loqui, quæ ad lumbos & dorsum, non ad collum sunt. à nobis autem exacte tota uerterbrarũ constructio in introductione de ossibus explicata est: in quibus



bus eum exercere constitui, qui cōmentarijs his studium esset adhibiturus. cum sigillatim quale unumquodq; os esset, præcipue quidem in ipsis hominū aridis cadaueribus quæ *σκληρὰ* appellāt; sin minus, in simijs certe diligenter inspexissem.

2 Quibuscunq; ex morbis in gibberum trahuntur.

Distortio spinæ in posteriorem partem gibberositas, in anteriorem repanditas, in latus obstitipitas appellatur: primam *κύρῳσις*, alterā *λόρῳσις*, tertiam *σκολίωσις* græci uocant. eam sanè quæ in posteriorem partem fit, quam etiam *κύρτωσις*, id est incuruationem nominant, ex panis & tuberculis immaturis in spina exortis magnis & duris & diuturnis existere nonnulli opinantur, à quibus in posteriorem partē uertebra propellantur; neq; intelligūt, fieri nullo modo posse, ut panī sibi subiectas uertebras grauent, siue supini iaceamus, siue recti stemus, siue sedeamus, siue in latus recubamus. absurdum præterea est, ut in tantam grauitatem, aut duritiem uenisse panos existimemus, ut ossibus grauioribus & durioribus euaserint. nam ex immaturis panis & tuberculis spinæ distortionē in anteriorem partem fieri, ipse paulo post Hippocrates dicit. sed neq; hoc tantum aduertendum eis est qui librum hunc explanant; uerum etiam illud, quod in proposita hac oratione dicit in gibberū trahuntur. cum impelluntur dicere potuissent, si sicut isti uolunt, intelligendum censuissent. dicere enim uertebras quæ in posteriorem partem promouentur: à morbis trahi in priorem, absurdum est. id siquidem de repandis, non de gibberosis fuerat dicendum. quid igitur & uerum sit, & Hippocrati consentaneū, conabor explicare. Ipsa parō uertebrarū ossa propria sua ratione neq; à panis subuertuntur, neq; trahuntur: sed corporū quæ ipsas inter se colligant, prima hæc affectio est. nam cum panus in uertebris natus in interiorē aut anteriorem partem (utroq; enim modo uocant) sustollitur, & augetur: necesse est, ut copule uertebrarum panos, copulas uertebræ ipse consequantur. si igitur in una tantum spine parte ortus sit panus, cum ea pars subleuat atq; introrsum trahatur: spinæ uertebræ repandæ euadunt. sin duas partes spinæ panī occuparint, sicut medium aliquod spatium integrum atq; illasum intercipiatur, gibberositas. nam cum uterq; panus ad se adherentē uertebrā trahat, mediæ interceptæ in posteriorem partē incuruantur: id quod, euenire manifeste conspiciere in omnibus potes, quæcunq; inflecti mediocriter queunt: cuiusmodi sunt & uirides uirgæ, & calamī scriptorij pleriq;. si enim altero horū extremo capite manus dextra, altero sinistra manus digitis apprehenso inter se in contrarium contrahas: cōlecti & incuruari mediam partem uidebis. sed neq; obstitipitas alia causa existit. nam ea quoq; cū durus aliquis & incoctus panus in aliqua partē à latere spinæ concreuerit, fieri consueuit. tria enim hæc uitia ex uertebrarum exturbatione contingunt: gibberositas, repanditas, & obstitipitas, cum

retro abeunt, gibberositas: cum intro, repanditas: cum in latus torquent, obstitipitas. præter hæc quæ tum uertebrarū uitium accedit, cum dimota quidem iuncturæ ac cōpages sunt: sed uertebræ tamē in sede sua permanent, quæ lationē hanc appellat,

3 Pleraq; quidem fieri non potest ut soluantur: sed illa præterea quæcunq; supra septi annexionem curuantur in gibberum.

Reliqua etiam, inquit, circa spinam uitia solui difficulter queunt: sed præcipue illa quæ supra septi annexionem curuantur in gibberum, id est in uertebra ad thoracem. nam uti Hippocrates solere hac uoce, præterea quod græcæ *πῶρι* dicit, pro præcipue & maxime, statim in principio huius libri manifestum est, ubi inquit: Breuis enim in totum melior ac solidior, quàm alta herba est: & præterea etiā lata prius fatiscit in frugē. cur autē panī qui circa thoracis partē oriunt, dissolui præcipue nequeant: ex sequenti oratione cognosces.

4 Quæ uero infra sunt, nonnulla superuenientes in cruribus uarices soluūt: magisq; illæ quæ in uena poplitis existunt, soluunt gibberum quibuscunq; contigit. sed & in uena inguinis uarices existunt.

Nonnulla, inquit, mala quæ infra thoracem exorta sunt, ad lumbos uidelicet, à uaricibus & dyssenteria soluuntur. cum uidelicet humores quæ ipse efficiat, primum in maximam uenam quæ spinæ adheret: deinde in ramos eius in cruribus descendunt. circa thoracem uero nulla huiusmodi uena est, quæ humores prauos excipere ualeat. una enim est quæ ex utraq; parte ad costas octo fertur. duæ item aliæ paruæ ad reliquas tendunt, utrinq; altera. cum igitur omnes hæc in thoracem discindantur, & dispergantur, si ex panis humor aliquis in eas transferatur, exinaniri non potest: quin etiam ut excipiat difficile est. quippe cum qui dura & cruda gignunt humores, lenti & crassi sint: ut non facile in angustas & paruas uenas transire ualeant. at quæ ad lumbum est uena, cum latissima sit, omnibusq; inferioribus sanguinem superedit, crassos hos ac lentos humores ubi expedit, si ualida in affectis membris ad expellenda excrementa uis superest, in alias huc pertinentes uenas eos deponit. ex quibus si crassi admodū sint, statim quæ in inguine est; si mediocres, quæ in poplite, dilatatur, ac uaricatur. ubi primum enim ex crassitudine & lentore obstructi consistunt, ibi uenæ nam dilatant, ac distendunt. nam qui abq; huiusmodi causa in cruribus uarices habent, ipsæ uidelicet uenas pro ratione crassitudinis humoris dilatant: in crassissimis, latissimas: cuiusmodi sunt uenæ inguinis: in minus crassissimis minus latas, sicut uenæ poplitis sunt. aliquando enim maioribus atq; amplioribus alimentis refertæ atq; obstructæ in malum id incidunt, aliquando in inferiores quæ angustiores sunt, delabuntur: in uaricibus autem crassus prorsus sanguis est, cum ex melancholicis

sepe, ex alijs interdū crudis & crasis humoribus A
affectio hæc existat.

5 Quibusdam etiam dysenteria diuturna
uitium hoc iam dissoluit.

Cum in intestina horum præter naturam humo-
rum transitus sit, intestinorū difficultas quam *συν-
σπικία* uocant, contingit. cum acrimonia humo-
rum confluentium radantur intestina, suppuranti-
bus iam panis: non enim aliter erumpere ob cras-
situdinem in intestina potuissent. suppurationes
siquidem sicut crassos humores attenuant ita etiā
naturā in affectis membris ad humores qui conti-
nentur, iam molestantes excernendos excitant.

6 At quibus dum adhuc pueri sunt, prius
quā corpus integre adoleuerit, spina in
gibberum incuruatur: ijs corpus ad spinam
augeri non solet: sed cum crura & brachia
ad perfectam auctionem deueniant, illa exi-
liora euadunt.

Nihil mirum esse debet, si spina in huiusmodi
affectuibus auctione priuatur: sicut de luxatio-
nibus antea audiuius, cum de ijs quibus fieri nō
potuerit repositio, loquebatur. nam & ex distor-
tione receptaculorū, & ex motione quæ difficul-
ter fit, & ex labore quē in talibus morbis subit na-
tura, minus quā antea huiusmodi membra alan-
tur, necesse est. hoc autē in auctis ac perfectis cor-
poribus, membra fortius facere solēt. at ijs qui ad-
huc adolescunt, auctio ipsa circa spinam impedi-
tur. nam quæ longius ab affecta parte absunt, ut
brachia & crura, nullam læsionē prorsus sentiunt.
quippe cum non totum corpus, sed uiciniore tan-
tum partes contagione mali huius afficiantur.

7 Quibuscumq; etiam supra septum gib-
ber contigit: ijs & costæ in latitudinem au-
geri non consueuerunt, sed in anteriore par-
tem: & pectus non latum est, sed in acutum
prodit: ipsiq; & difficulter spirant, & stridu-
lam faucium asperitatem habent. eo quod
uentriculi qui spiritum & excipiunt, & red-
dunt: minori amplitudine præditi sunt.

De ijs adhuc loquitur qui in adolescente ætate
sunt: de quibus dixit, quæ circa spinam sunt non
solere augeri. cum igitur in uertebis ad thoracem
gibber extitit, partes eę in longitudinem maxime
non augentur: atq; ob id cum in gibbere in poste-
riorem partem uertebrae recesserint, angustum ijs
& acutum thoracem fieri necesse est: interioresq;
in eo uentriculos qui spiritum excipiunt, minores
euadere: ut corpus cum sit respiratio, pauciore spi-
ritu quā par erat, refocilletur. dictū autem in tra-
ctatione De respirationis difficultate est, necesse
esse ut cum minor quā opus esset, inspiratio fit:
secunda breuioris temporis mora post subsequat,
quā si prior naturali modo fuisset producta. bre-
uior uero temporis mora frequentem spiritum fa-
cit: atq; inde ea difficultatis spirandi species effi-

Galen.

citur, quæ paucitate & frequentia constat: stridu-
lam uero faucium asperitatem habet, ex angustia
partium quæ circa fauces, & asperam arteriā sunt,
quam quidem angustiam illud quoq; magis coar-
ctat: de quo in frequenti oratione nunc docet.

8 Coguntur etiam ceruicem ad magnam
uertebra repandam habere: ut caput his
procidū minime sit. id quod multā quoq;
angustiam faucibus præbet, cum in interio-
rem partem inclinetur, nam etiā ijs qui na-
tura recti sunt, hoc os, si in interiorē partem
uerget, spirandi difficultatem eousq; facit,
quoad fuerit repressum. ex huiusmodi igitur
figuratione homines hi magis q̄ qui sa-
ni sunt, gutturosi apparent.

Cum uertebrae circa thoracem in gibberosita-
tibus in posteriore partem excedant, totum col-
lum à contrario in anteriorem partem proclinari
necesse est, & cum ipso caput quoq; quod superia
cet: ut gibberosis eo habitu deambulandum esset,
quo nos flosser, cum nutando toto collo nūc cū
spina conflexo & in posteriorem partem incurua-
to deorsum in terram despiciamus. sed ne ita ipsis
eueniat, collum retro coguntur recurrare. quā in
reparum uertebrae eius, utpote minima motione
præditæ conferunt. unde ubi motum alicuius mo-
menti nanciscuntur, ibi quamplurimū reclinant.
nanciscuntur autem eum in priorum duarum uer-
tebrarum dearticulatione, quā inter se, & cum ca-
pite connectuntur. quæ igitur figuratio in sanis &
illeis in capitis dearticulatione existit, cum caput
retro flectunt: eadem in gibberosis cernitur, cum
eriguntur. et sanē quemadmodum qui naturaliter
affecti sunt, retro caput resupinando: ita gibbero-
si in rectum id intendunt, gutturosi efficiuntur.
gutturosos autem, id est *εφευβόγχοις* quasi guttu-
remulos dicas, eos uocat qui prominentia in an-
teriorē partem guttura habent. guttur enim, id est
βόγχοις uel totam asperam arteriam nominat, uel
fauces duntaxat. atq; hoc est quod stridule asperi-
tatis respirationem maxime facit. quippe cum si
quis etiam huiusmodi figuratiōe dormiat, sterte-
re ei maxime contingat. iccirco enim dixit, nam et-
iam ijs qui natura recti sunt, hoc os si in interiorē
partē uerget, spirandi difficultatem eousq; facit,
quoad fuerit repressum. hoc os, inquiens, dum ad
id uidelicet refert, quod in principio horum uer-
borum ait, in hunc modum. coguntur etiā ad mag-
nam uertebra ceruicem repandam habere. ex quo
cōiungere potest quispiam magnam uertebra se-
cundam ab eo appellari: quæ & in priorē partem
procedere, & retro rursus reprimi potest. nam ean-
dem partem & priorem & interiorē appellare ma-
nifestum est. prior enim est, cum à posteriore par-
te eō uertebra deferatur: interior, cum in profun-
ditatem corporis tendat. siue ad eam quæ intrinse-
cus est, siue ad posteriorem superficiem spectemus.

9 Panis duris & crudis obnoxij ut pluri-

tom. 6

V

mum

num circa pulmonē huiusmodi sunt. nam gibberositas occasio & contentio plerisque ex talibus contortionibus existit: quarum uicini tenores participes fiunt.

Quibus supra septum est gibberositas, ijs circa pulmonem panos & tubercula plerumque fieri inquit. nam quibus ad lumbos est gibber, ibidē quoque esse tubercula manifestum est. dixit autem ut plurimum, propterea quod ex casu quoque & percussione gibberatur spina: non secus ac repanditur, & obstitatur. cum uero ait nam gibberositas occasio & contentio plerisque ex talibus contortionibus existit eandē sententiā significat, quam in principio protulit, cum dixit. uertebrae spinæ quibuscumque ex morbis in gibberum trahuntur, quod autē hic dictū est. quarū uicini tenores participes sunt de neruis dorſi & uertebraū intelligitur. ego autem superius causas retuli in copulas uertebraū, quæ tractæ secum uertebrae quoque ipsas attraherent. non enim puto neruos qui à dorſi medulla exoriuntur, dum trahuntur à tuberculis, secum trahere uertebrae posse: cum ob exiguitatē, & mollitudinē longe sint imbecilliores, quam habere tales uires queant. unde etiam neque ossibus, sicut copulae exortum habent. copulae enim & ualidiores, & tenoribus, id est neruis transsioribus continuatae sunt. hi autem ubi cum tuberculis communicant, attrahere uertebrae ualent.

10 At quibus infra septum gibber est, eorum nonnulli morbi renū et uesicae superueniunt. quin & abscessus ad suppurationē circa ilia & inguina diuturni, & sanatu difficiles: quorū neutri gibberositatē emendāt.

Ex contagione uidelicet huiusmodi morbi eueniunt. cōtagione enim afficiuntur cognata & proxima, quæ, dum superius dixit uicini significauit, & afficiuntur quæ nimirum maxime communicant. dysenterici sanē fluxus, & uarices cum ex fecessu humorum qui tubercula pariebant, gignuntur, gibberositatem curant. at morbi qui ex communicatione contagioneque existunt, pristina mala non tollunt.

11 Coxæ his graciliores euadunt, quam quibus gibber superius contigit.

Gibberosi circa lumbum graciliores habent coxas, quam qui superiori in parte ita affecti sunt. ex quo patet, eis quoque qui circa thoracem idem patiuntur, coxas, quatenus cum spina communicationem habent, mediocriter graciles euadere.

12 Vniuersa tamen spina, quæ illis, longior.

Illis qui nondum ætate integri & adulti sunt, præter quod non aluntur & gracilescunt affectæ partes, etiam absque auctione, sicut superius dictum est, remanent. nunc uero differentiam aliam, non ab ætate illam quidē, sed ab affectis membris sumptā tradit. quanto enim superius iuxta originem suam spina patitur, tanto minus augetur: eo quod à superiori parte & exortum & augmentum accipit.

13 Pubes uero & barba & tardior & imperfectior. adde quod infecundiores quoque hi efficiuntur, quam qui superius gibberum habent.

Ad cōmunem contagionis rationem ex locorum natura differentia accedit. cōmunis ratio siquidem est, ut affectis partibus uicina cōtagione afficiantur. propria uero illa: ut si cōtingat malum ubi respirationis membra sunt, qui id patiuntur, difficilem respirationem, ac stridulam faucium asperitatem habeant: si infra septū accidat, tardior ijs pubes oriatur. ex hoc etiam nocumentum circa barbam consequi solet.

14 At qui corpore iam adulto sunt, ijs si gibber contingit, gibberositas propalā morbi qui tunc adest, iudicationē facit. per tempus tamen aliquod eadem quæ & in alijs uel magis uel minus præ se fert. minus uero maligne in totum talia existunt.

Propalā, id Græcè est ἀπαυλαπν, quod apud alios cōtra & è regione significat: hic uero pro ex aperto & palām positū est. quod nonnulli alij ueteres ἀνάλυψις dicere consueuerunt. ex aperto igitur, inquit, & ita ferē ut sensu percipiatur, iudicationem, id est solutionem & liberationem morbi antecedentis assert. gibberositas: uideturque prorsus sublata fuisse affectio: subsistant tamen paucae quædam reliquiae & ex erroribus in uictu, & ex externarum rerum occurſu contractæ.

15 Ac multi quidem sunt qui facile & salubriter gibberositatem usque ad senectutem iam tulerunt: atque ij præcipue, quibus in carnosum et pingue conuersum corpus fuerit. pauci tamen etiam ex huiusmodi supra sexaginta annos uixerunt. plerique breuioris uitæ sunt.

Ob naturæ robur, malique mediocritatem, quin etiam ob totam uictus rationem quæ ille qui affectus est, utitur: gibberositatē usque ad senectutem nonnulli salubriter tulerunt.

16 Nonnulli etiam in latius uel hac uel illa lac uertebrae obliquantur, sed omnia aut pleraque huiusmodi ex contortionibus in interioriorem partem spinæ contingunt.

De obstitipitate superius iam dixi, quod fiat, cum à latere ex altera parte consistit panos, & uertebrae copulas ad se attrahit. hoc etiam Hippocrates per neruos quos tenores uocat, fieri assertit.

17 Quibusdam uero unā cum morbofigurationes quoque ad hoc cōducunt, in quas cubare consueuerint.

Partim quia in humiliorē locum magis confluant humores: partim quia pars ea in quam cubat aliquis, magis comprimitur: fit, ut ad gibberi generationem figuratio faciat. prima tamē & præcipua panos, aliorumque morborum causa mem-

bris inbecillitas est: quippe cū in huiusmodi membra confluere excrementa demonstratum sit.

18 Sed de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur: ibi enim de ijs quæ sunt euentura, pulcherrimæ prænotiones sunt.

Multa quoque alia quæ nunc non extant, hoc in libro scripturum se esse promisit: quæ fortasse uel omnino non scripsit; uel si scripsit, seruata hucusque non sunt. quemadmodum multi alij etiam ueterum libri perierunt: de quorum intersitu à plerisque scriptis traditū est. de longinquis quidem pulmonis morbis dicta sanè multa sunt tum in maiori libro De affectionibus, cuius principium hoc est. Si pulmonis arteria ulcerata sit, tum in primo De morbis qui non recte est inscriptus, qui ita incipit. Qui de curatione uult & interrogare, & si interroget, respondere. in neutro tamen horum ea quæ nunc pollicitus est, perfecte definita reperiuntur.

19 At enim quibus ex casu spina gibberatur: ijs pauca fuerunt corroborata sic ut directæ fuerint.

Hactenus de spinæ absque externa causa distortionem scripsit. quæcumque hinc sequuntur, omnia de ijs agunt, qui ex casu aliquo aut ictu læsione in uertebis patiuntur: suntque pleraque manifesta: nisi ubi præmissam causam adiungere opus est. quæ admodum nunc, cur uidelicet pauca spinæ subluxationes dirigi atque emendari queant, cum enim posset id nunc explicare, in sequentibus declarat: quia scilicet cardinatim uertebre structæ inter se sunt: ut quādo una ex ipsis quocumque modo ex articulatione exciderit, reponere difficillimum sit: cū multi processus, multæque cavitates in unaquaque sint. hoc enim uel uisui ipso in ossibus didicistis.

20 Nam quæ per scalam fiunt, extensiones, nihil, quod ego quidem nouerim, direxerūt. ea enim maxime medici isti utuntur, qui uulgi imperiti auram affectant, apud eiusmodi enim homines admiratione digna hæc sunt, si pendere aliquem, aut deijci, aut simile aliquid uiderint: hæc semper celebrant, quicquid uero ex aggressione hac euaserit, siue id bonum, siue malum sit, nihil curant medici tamen qui hæc tractant, rudes sunt & imperiti, quos ego quidem non ui. nam cōmentum uetus est, ac laudo ego sanè uehementer eum qui primum excogitauit, tum hoc, tum aliud quodlibet machinamentū, quod secundū naturā inuentum sit, nihil enim despero, quin si recte id quispiam præpararit, ac dequassarit, restitui in directum nonnulla queant, sed ipse tamen huiusmodi omnia curare ita propterea erubui, quia impostorū magis tales modi sunt.

Quoniam unicuique articulorum repositioni antecedere, ut ostendimus, extensiones debent: in

Galen.

ossibus etiam spinæ idem facere necesse est: in quibus quomodo intendendum utiliter sit, postea docebit. nunc de extensionibus prauæ adhibitis prius agit: ita enim solet, sicut ex superioribus demonstratum iam est, quippe cū redarguere ea prius oporteat quæ nonnulli medici prauæ agunt: deinde ita ad docenda meliora descendere. cum igitur multi spinæ subluxationes per scalam deorsum trahunt, præcipue quidem nihil proficere cōmentū id asserit: si tamen eo uti quis uelit, modos docet, quibus uti optime ualeamus. in extensione enim id propositum est, ut intentio spinæ ad superiora, laqueis iuxta affectam partem circumiectis: ad inferiora pondere ipsius corporis efficiatur. si ad hoc spectes cætera quæ ab ipso deinceps dicuntur, facile percipies, pleraque enim patent.

21 Quibuscumque autem iuxta ceruicē gibberositas contigit: ijs par est, ut extensiones hæc in caput minus prosint, caput enim, & summi humeri propendentes paruum pondus afferunt: uidentque si in pedes dequassentur, directionem magis consequuturi: quippe cum ita maior propensio futura sit, at qui inferius gibberum habent, si in caput dequassandi magis uidentur. si quis igitur dequassare uult, recte in hunc modum præparabit. scala per scorteos uel laneos puluinos in obliquum subiectos consternenda est. puluini uero bene alligati sint & in longitudinem & hinc & inde paulo ampliori spatio, quæ quod hominis corpus occupet.

Quoniam spina aut prope superius principium suum, aut prope finem, aut in mediâ parte inter utrumque patitur: de ea læsione primum agit, quæ iuxta collum cōtingit. quæ cum accidit, si quis in scala affectum hominem ex pedibus suspendat, sicut eius tempestatis medici nonnulli facere consueverant: nulla deorsum extensio, quæ alicuius momenti sit, efficietur: quippe cum paruum pondus ceruicis tantum, & capitis futurum sit. at si infra prope sacrum os sit affectio, maxime sperare posset quispiam extensionem esse successuram: quæ quomodo postea optime efficiatur, ostendit.

22 Deinde supino homine supra scalam collocato pedes eius non digredientes iuxta malleolos uinculo gestabili quidē, sed molli, tum & infra & supra utrumque genu, nec non circa coxam deligandi ad scalam sunt. libris uero & pectori laxæ mitellæ circūijciendæ, sic ut dequassationem minime impediant, manus autem ad costas reductæ corpori ipsi, non scalæ applicandæ sunt.

Cū aperte omnia exponat, gestabile, id est uinculum uocat quod bene gestat & sustinet: hoc est firmiter & sine ulla cōpressione continet.

23 Quod posteaquæ præparatum fuerit,

scala uel ad arcem aliquam altam, uel ad tecti testudinatum attrahenda est.

Arx, id est *ῥύγος* nihil aliud quam turris intelligenda est. testudinatum uero tecti quod ipse *ἄστραμα* uocat, quasi dixeris aquilatum, suprema domus pars est. ita enim in altum sublata triangulari forma domum culmina appellant. nam si solarium quispiam facere uelit, loco regularum planam contiguationem quae teporem non arceat, constituet. at si imponit tegulas, ea forma tectum erigit, qua facile pluuialis aqua defluere queat. unde in altum medio columine a posteriore in anteriorem partem per longitudinem porrecto hinc & inde supra laterales parietes tectum humiliter deducitur: ut geminarum demissarum alarum speciem praeferat. ex qua similitudine ueteres huiusmodi tecto aquilati nomen indiderunt. uinctum etiam, id est *ἄστυ* tecti, hoc est lacunar appellant: quemadmodum Pindarus in Pleiadibus. Aureae tectorum uincti famae celebrant. Euripides item in Hypsipyle.

Ad aethra ecce transeuntes uirgines,

Pictas lacunari intueri imagines.

Arcem quoque, id est *ῥύγος* turrim significare Dioscles Carystius esse locuples testis potest: cum hanc eandem Hippocratis orationem in libro De faciliatibus paraphrasticè in hunc modum exponat. scala uel ad turrim altam; uel ad domus lacunar attrahenda est.

24 Locus uero in quem dequassabis, durus ac renitens: qui attollunt, periti esse debent: ut aequaliter, pulchre, æquo libramento, & repente dimittant: quo neque scala in alteram partem propendeat, neque ipsi praecipites ferantur.

In sublime aliquid scalae superiorem partem sublatam, alligato, ut dixit, homine deorsum supra paumentum dimittendam censet: ut uehementi concussione facta spina deorsum procumbens elapsam uertebra in sedem naturalem recipiat. qua in re durum ac renitens esse solum pauimenti oportet. nam si ita esset molle, ut cederet, dequassationemque impediret, nihil proficeremus.

25 Ex arce tamē, aut è malo defixo carcheium habente si demiseris: melius praeparabis, si è trochlea aut ex asino demissio efficiatur. sed importunum fortasse est de his longiore oratione agere, ex his tamē apparatusibus maxime dequassari quispiam posset, quod si ualde superius sit gibber, dequassandumque omnino sit: in pedes id facere confert, quemadmodum iam dictum est. quippe cum amplior sit eo modo euasura propensio.

Quia scala in sublimem aliquem locum subtrahita in terram repente, & aequaliter, & pari praeponderatione demittenda est: melius esse inquit, ut laqueis quibus scalam attrahimus, trochleis subducatur: ita enim fore, ut modo uolubilis, aequalis, & æquo

A libramento propendens euadat. cum uero superius arcis, & testudinati tecti mentionem duxerit fecerit, malum nunc etiam adiungit: quod *ἰσὶν* astando appellant: qui sanè maximè atque erectum lignum est: cui alterum per transuersum in supremo capite imponitur, ex quo uidelicet uelum dependet. nam multum interest, si *ἰσὶν* duabus syllabis, aut *ἰσῖον* tribus dixerimus. *ἰσὶν* enim, ut dixi, id est malus lignum erectum in nauis infixum est. *ἰσῖον*, id est uelum, linteum appellant, quod à uentis inflatum cōsuevit. rudentes uero qui de summo malo demittuntur, carchisia nominant. quocirca cum malo uti uis, ad suspendendam scalam, trochleis & carchisiis id efficias. adde quod non ab re quoque esse inquit, si asellis, id est fuculis & axibus, ita enim uocat ut dixi, idem faciendum cures.

26 Affulciendum autem ita est, ut ad pectus ualide ac firmiter scalae alligetur, ad cervice uero quam laxissima mitella eatenus circumdetur, quatenus dirigatur. quin & caput ipsum ad frontem, scalae est alligandum. at manus porrectae ad corpus non ad scalam uinciendae sunt, reliquum corpus absque deligatione esse debet: nisi quod ut in directione contineatur, alibi atque alibi mitella laxa ei iniicitur.

Dictum à me etiam superius est, fulcimina firmamenta esse, & fulcire firmare: idemque apud Hominum significari, cum inquit: Fulcimina puppibus abstrahunt.

27 Sed ne uincula haec dequassationem prohibeant, spectandum est. crura quidem ad scalam non alligentur, sed inter se: quo è directo ad spinam propendeant. atque haec quidem, si modo in scala dequassandum omnino est, in hunc modum sunt facienda. sed turpetamen cum in omni arte, tum in medicina maxime est: si cum multam turbam, multam ostentationem, multumque rumorem excitaris, nullum deinde adiuumentum afferas.

Si homo quidem qui dequassandus est, corpus nullo modo firmatum atque affulcitur ad scalam habeat, sed tantummodo ex superioribus partibus sit alligatus: facile in concussionem in obliquum deuoluatur. sin contra ualide ita sit deligatus, ut dum quassatur immotus permaneat: nullam inde utilitatem percipiet. ita enim utrisque his utendum censet, ut neque ex firmitate, & constrictione uinculorum immobile corpus eius sit: neque adeo laxè uinciatur, ut in latus conuoluatur. licet autem Hippocrates extensionem huiusmodi non approbet: scripsit tamen quo pacto parari optime possit. propterea quod uidebat eos qui ea utebantur, optime eam exercere haudquaquam scire. quin etiam superius dixit. nihil enim despero, quin si recte id quispiam praepararit, ac dequassarit, restitui in directum nonnulla queant.

28 Cognoscendum igitur primum est, quae

lis spīng natura sit. ad multos enim morbos ea opus erit.

Volo nunc uel semel indicare, cōmemorareq; id qd in primo statim libro De Hippocratis dissectione dictum à me est: ubi impudentiam experimentariū agnosces, qui Hippocrate experimentariū uocare audebant experimentariū enim omnium maxime qui in medicina arte uersauerant, erat: maximeq; experimentis animū aduertebat, omniaq; eis probanda esse censebat, ut rem tamen assequeretur, multis rationalibus cōmentis uti cōsueuerat: dissectioniq; præcipue studium adhibebat, utpote quæ multum afferre adiumentum arti posset: id quod nunc quoq; manifeste ostendit: cū naturam spīng cognoscendam nobis esse censeat, cuius cognitionem sicut aliarum quoq; omnium partium inutilem esse experimentarij affirmant.

29 Qua parte enim ad uentrē tendit, uertebrae intus pares inter se sunt.

Vertebrarū posterior pars processum acutum in fine cartilaginofum habet, quem proprie *apophyseam*, id est spinā appellant. opposita uero pars quæ in priorem partem pergit atq; interiorem (utroq; enim modo uocant) cartilagine quidem etiam ipsa cōmittitur: rotunda tamē est ac laeuis: nullumq; acutum processum emittit, quia neq; omnino prominentia ulla uel minima asperatur, sicut & in posteriore parte & à lateribus. quales quidem unicuiq; ex uertebribus processus alibi sint, & in arefatis cadaueribus uidere licet. quod uero nunc de uertebribus inquit ex dissectione ab interiori parte constabit. quas pares inter se appellat, hoc est planas & rectas & per se unamquamq; & mutua copaptatione inter se omnes. Nam quia ea parte eminentia nulla extat, & ex toto apte inter se coherent: pares ipsas inter se, hoc est pariter, atq; apte coherentes uocat.

30 Vinculoq; inter se uinciūtur mucoso, & neruoso, quod ex cartilaginibus exoritur usq; ad medullam.

Exquisite admodum uertebrarum cōmissionis naturam exponit. non enim, sicut nonnulli opinati sunt, multum inter se uniuntur, & conseruntur ab interiori parte. ita enim in uehemētiōribus spinæ in posteriore parte retortionibus uel omnino resisterent, uel diuellerentur: sed inter se cōmissæ tantum uinculo quodam mucoso ac neruoso colligantur, ac propterea breui quodam motu hac etiam ex parte præditæ sunt: eum minime habiturae, si insertæ mutuo fuissent. sed neq; earū copula usque ad medullam penetraret. circuit enim undequaq; crassiorē membranam. nam cum medulla tenui membrana perinde ac cerebrum primum obducatur, deinde crassiore extrinsecus supra hanc antedictio uinculo obuoluitur. hoc enim opusculum medulla præter cerebrum adæpta obstaculi ac propugnaculi causa est: ne dum ossa spīng mouerentur in uertebas offendens laboraret. uertebribus autē copula hæc mucosa, hoc est len

Galen.

ta, & uelut pituitosa effecta est, ut & promptiorē uertebribus motionem exhiberet: & ipsa iniurijs minus esset obnoxia. quippe cum quæ sicca sunt, humoreq; uacant, abrumpi in motibus facile solent. unde etiam habenas & lora inungunt, qui eis ad uehicula & subuglia utuntur. eandem ob causam huiusmodi mucosum humorem in omnibus articulis uidere licet.

31 Alij q; quidam tenores neruosi, aduersarij ac perpetui, annexi hinc & inde ab ipsis prætenduntur.

Perpetuos, id est *συνεχόμενους* à superiori parte dorsum aliquantulum proluxitate pertinentes, intelligere debemus, cur uero neruosos hos tenores uertebrarum dixerit, haud satis scio. non enim neruosi, sed nerui erant dicēdi: nisi quia ualidi sint, eos neruosos appellat. prætendunt autē manifeste unicuiq; uertebrae nerui per totū thoracem, quorum superiorē exortū in dissectionibus me demōstrante inspexistis. circa collū enim & lumbū uertebribus superiecti musculi sunt, per quos nerui feruntur.

32 Venarum uero & arteriarum cōmunicationes, quotq; hæ, & quales sint, & unde proficiantur, quamq; in quibus uim habeant: alio in libro declarabimus:

De his quoq; in dissectionibus didicistis. quin etiam in cōmentarijs scriptam uenarū & arteriarum, quemadmodū quoq; neruorū dissectionem habetis: atq; accuratius omnia in Dissectorijs tractationibus. ut producere sermonē adhuc quoq; hic scribendo non debeam. cum neq; ipse Hippocrates totam ipsorum naturam hoc in libro recensere uoluerit: sed sicut alia multa, ita hoc quoq; alibi scribendū distulerit. quanq; hoc quod hic promittere uidetur De uenis & arterijs opus non extat. de neruis autem qui ad uertebas prætenduntur, in secundo De uulgaribus morbis cōmentationis potius in modum, quàm legitimæ conscriptionis, nonnulla ab eo dicta sunt. non secus ac cætera quæ in eo libro cōmentaria potius quædam esse Hippocratis, quàm iusta opera ostendimus. solus siquidem primus & tertius De uulgaribus morbis liber editionis causa fuit conscriptus.

33 Ipsa itē medulla quibus uaginis, & unde exortis, & quo perficientibus, & quibus cum cōmunicatibus, qualemq; uim habentibus instructa sit.

Operimenta & inuolucra aliquarum rerum uaginas appellant ueteres. unde etiā hic Hippocrates ea quæ paulo superius dicta etiam à me sunt, medullæ tegumenta uaginas uocat. quæ duæ quidem intus sunt: extrinsecus alia cum uertebrarum uinculis cōmunitis: illæ à membranis cerebri exortæ: tertia ab osse capitis quo cum prima uertebra dearticulatur. terminantur uero uincula hæc, non secus ac medulla ipsa, usq; ad finem spinæ. Hippocrates autem simili modo pro terminantibus perficientibus dixit, ut Poeta. Si modo perficiant

tom. 6

V 3 isthac

isthac, finēq; sequantur. Quam uim autē habeant, exacte in Dissectorijs libris explicatū est cum peculiaribus demonstrationibus, ex illis autē praeceptis est, qui De usu partiū est conscriptus. unde nunc satis erit, si medullae huius dorſi circumiectas membranas eundem exhibere usum dixerimus, quem cerebro praestant. Cralſior quidem quasi custodia quaedam ac tutela est, ne à circumiectis ossibus offendatur; tenuior ut cerebrum ipsum operiatur. de tertia uero tunica medullae huius paulo ante dictum est.

34 In ulteriore parte in articulis uertebrae inter se cardinatae sunt.

Cum naturam spinæ dicere proposuisset, atq; ab interiori parte ipsius incepisset, ubi inter se uertebrae pares ac planae inter se coaptabatur, qua ad uentre spectat; merito nunc cum in ulteriore parte cardinatas uertebrae esse docet, de posteriore parte intelligit. neq; retro & à posteriore parte ex aduerso antedictae uertebrae colligationis accipiendus locus is est in spina, qui exquisitè posterior est, qui acantha, id est spinae proprie nuncupatur; sed utriusq; etiā ab ea, ubi dearticulationes uertebrae sunt. quæ si quis ad acanthā spectet, à latere spinæ: si ad anteriore partē cōparet, de qua loquutus est, ubi inter se uertebrae uinciuntur, à posteriore parte esse uidebuntur. cardinatas autē esse uertebrae inquit, propterea q̃ cum processus quatuor habeant, duos alterius sinibus suis unaquaq; excipit; duobusq; suis in alterius cauitates inseritur; non secus atq; in cardinationibus fit.

35 Tenores uero cōmunes ad omnes tam interioribus quam in interioribus partibus praetenduntur.

Vertebrae partes quæ colligationi oppositae sunt, posteriores & exteriores: sicut eas quæ sunt ad ipsam colligationem, interiores & anteriores uocari licet. sed tenores quidem in posteriore parte praetētos non reperies: si modo tenores praecipui nerui nominantur. ad uertebrae enim commiſſiones foramen quoddam est per quod unusquisq; ex neruis qui à dorsali medulla prodeunt, statim ubi egressus est, discinditur: sic ut alter eius ramus in anteriore parte deferatur; alter in posteriore tendat: ibiq; in superiōres musculos distributur, qui spinales uocantur.

36 Processusq; unus ossis ab unaquaq; ex omnibus uertebrae, tam à maioribus q̃ minoribus in exteriorē partē est, supraq; hos processus cartilaginum agnatae appendices sunt. atq; ex illis neruorū progerminatio, quæ cum extimis tenoribus frangat.

In exteriorē seu posteriore parte spinæ uniuscuiusq; uertebrae processus eminet, qui uidelicet totam acantham componit. in cuius processus extremo cartilago agnata est, quæ neruorū progerminationes copulatiuas habet: quæ cum tenoribus, inquit, frangat, id est quæ uel illis assimilant;

uel eodē tendunt, quod illi, & cōmisercentur. uerum, quæ enim uerum est.

37 Costae in interiorē partem magis, q̃ in exteriorē capitibus inclinatis annexae, ad unamquancq; ex uertebrae adarticulant.

Ossa thoracis quæ transuersa positura paululū oblique tamē è spina ad pectus pertingunt, non Hippocrates tantū, uerū etiā posteriores omnes medici costas uocant. has uertebrae adarticulati inquit, nō secus ac si dearticulati dicas. hoc enim uerbum magis usitatū apud recentiores medicos est, dearticulationes appellantes ossiū iuncturas, quæ motum aliquē sensibilem momenti alicuius praeseferant. capita itē costarū extrema ea appellauit, quibus cū uertebrae dearticulant ad radices, processū qui à latere ipsarū eminent; intorsum autē inclinatās esse eas magis dixit: ita enim eas sese habere cognouistis, sed discretā quoq; ac dispartitā esse earum dearticulationē inspicimus: id quod praetermissum ab Hippocrate est; uel quia non exquisitè tota dearticulationis natura inspecta hoc cum lauerit: uel quia exactam huiusmodi explicationē cōuenire praesenti tractationi minime existimauit.

38 Curuissimaeq; hominis costae sunt ob tortum in modum.

Curuissimas homo ex omnibus animalibus costas habet: propterea q̃ latissimū etiā omnium pectus ei est. cetera em̃ omnia alia magis, alia minus acuto pectore sunt praedita. latissimū uero hominis pectus habet. simia autē latius quidē ceteris, sed angustius homine. animalibus tamē omnibus cōmune est, quæ thoracem habet: ut costas ab exteriorē parte qua attingere ipsas possumus, incuruas & cōuexas: ab interiorē concauas habeant. nam ad amplitudinē thoracis efficiendā necessariū hominibus hoc fuit, quia em̃ ad pectus directae esse debebant: in reliqua tota parte incuruari eas necesse fuit: si ad spinæ uertebrae eis erat deueniendum. ac res quidē ipsa manifesta nobis euadit: tū ex eo q̃ curuissimas costas esse inquit: tum q̃ ex simili figuratiōe ita esse cognoscunt. sed non in re sicut in superioribus restat inquisitio, at in uerbo: cum uidentia ac diluciditatis causa Hippocrates hic in exemplū subiunxerit ob tortū in modum, hoc est *ποσειδῶνα ποταμῷ*, quod maiore tamē obscuritate rei cognita, q̃ claritatem attulerit. antea enim fortasse in usu erat haec uox, alioqui enim eā hic non posuisset: postea cum ex usu recesserit, obscura euasit. nam si per *κ* legatur, id est *ποσειδῶνα ποταμῷ*, quod ob tortū & uariū in modum significat, apud Theocritū quoq; scriptū id reperitur, ubi inquit: At clauam ob tortam ex oleastro dextra habebat. Item apud Archilochum.

Sed paruus is sit atq; tortus cruribus, Aptus stabiliter, corde plenus, ingrediti, apud Nican drum quoq; sic legitur. Sunt alij æquales tortis similesq; paguris. si uero per *β* legat *ποσειδῶνα*, quid sibi uelit, haud satis scio. in nonnullis enim exemplaribus per *β* scriptū est in approbationibus tamen per *κ* inuenitur.

39 Inter uero costas & ossa quæ à uertebis procedūt, mediam partem utrinq; musculi à ceruice incipiētes usq; ad septi transversi annexionem replent.

Id quod ex dissectione apparet, eū sententia horum uerborū non admodum consentit. quæ enim ex dissectione patēt, hæc sunt. ad capita costarum quæ in uertebras articulantur, musculi sunt à posteriore parte qui spinales uocantur, per spinæ longitudinem usq; ad initium crurum porrecti; ab anteriore uero in longitudinem non per totum thoracem transversi inter costas iacent, quos intercostales appellant. Deinde ad paucas ex costis tendunt gulæ subiecti musculi, à quibus in anteriore partem totum collum tractū paululū inclinatur, absq; capitis dearticulatione. nam illud dū annuimus & renuimus, maximā per seipsum motionē habet. si quis in ijs qui ad primas uertebras sunt, cōpararit; qui exigua admodū motionē præditi inter se sunt. sed ex lumbi etiā sedibus ad thoracē iuxta extremas costas uertices musculorū eorū ascēdunt, qui *lōui*, id est lumbales dicuntur. quæ uero in media thoracis parte sunt: musculi superiectos minime habēt ad laterales uertebrarum processus, quæ dearticulati costas iam diximus. sunt præterea alij duo angustī & parui musculi qui per totum thoracē extrinsecus ad spinales in anterioribus uidelicet eorum partibus, nō posterioribus circa acantham porriguntur. atq; hæc est positura musculorū qui circa uertebras sunt: quæ ex dissectione deprehenditur. Nūc de quibus ex his intelligere hic Hippocrates possit, uideamus. de intercostalibus sanē non posse intelligere, ex eo perspicuum est, quod musculi hos à ceruice incipere ait. Restat igitur ut de spinalibus mentionē facere cum hic existimemus: quanquam de neutris satis recte dictum esse id potest, quod inquit: musculi hos mediam partem inter costas & ossa quæ à uertebis procedunt, replere. spinales enim dearticulationibus omnibus antedictorum ossium à posteriore parte ita obijciuntur, ut nihil intectū relinquant: sed & radices omnes costarum, & processus à latere uertebrarū operiāt. adde q; illud quod inquit: usq; ad annexionē si de angustis musculis hic loquatur, ita erit interpretandum, ut de septi transversi: si de spinalibus, ut de crurum annexione dictum esse intelligamus. nisi fortasse annexionem dearticulationē hic uocet. Sed ego sanē quomodo sententiam hanc ijs quæ apparent, accommodare recte queam: nō uideo. ut ab aliquo qui eam primo descripserit, non secus atq; alia multa fuisse deprauatam existimem. Cæterum cum ita se habeant, sicut diximus, ea quæ extāt in dissectionibus; inquisitio accommodatæ horum uerborum explanationis in medium relinquitur. ut tamen distinctam quandam ac probabilem maxime opinionem proferamus, costas hic pro costarū ipsarū capitibus: ossa uero quæ à uertebis procedunt pro ijs quæ acantham constituūt, accipiemus. musculi, qui mediam regionem replent, spinales; an-

nexionem, septi esse intelligemus. Præceptor uero nostri Pelops laterales uertebrarum omnium processus costas: annexionem, septi diciam esse hic ab Hippocrate asserebat.

40 Ipsa uero spina per longitudinem directe obliqua est.

Obstipitas seu obliquatio distortio in latum appellatur. nunc tamen non in latum sed in posteriorem & anteriorem partem distortionē significat. cum enim recta per longitudinem sit spina, parum & in posteriorem, & anteriorem partem declinat, ac tortuosa euadit; sicut ipse deinceps docet.

41 A sacro quidē osse usq; ad magnā uertebra ad quā crurū annexio appēditur, gibberosa est. nā & uesica, & genitura, & principis intestini laxitas in eo spatio cōtinetur.

Crurū annexio multipliciter intelligi potest. sed potissimū fortasse à coxæ dearticulatione sumēda est. quæ sit, cū femoris caput ossi coxæ & per latas copulas colligatur: & per teretē: quia intima & cetera profunditati coheret; quin etiā per musculi qui dearticulationē mouent; per neruos item, necnon per arterias, & uenas merito crus annexi superioribus dici posset. sed uideat nunc Hippocrates de annexione per neruos intelligere. si quidē ad lumbum ad extremā uertebra quæ cum ato & sacro osse dearticulatur: neruorū qui ferūtur ad crura, est exortus. nam hoc ad ipsam spinā esse & uesicam, & geniturā, & principis intestini laxitatem in eo spatio contineri: id quod in dissectione apparet, testimonio est. unde etiā incurua extrinsecus euasit. genituram autē membra genitalia appellat: in foemini uterū; in maribus seminaria uascula quæ nuncupant. laxitatem autē principis intestini, eam partē uocat quæ supra musculū constrictorium, quem *σφιγκτηρ* appellant, est: quæ & sacro ossi adiacet: & uere laxa est; cum musculi nō habeat, qui recti intestini extremum confringunt.

42 At inde usq; ad septi transversae annexionem directe est repanda.

Nihil hac spinæ parte eiusmodi cōtinetur, ut in inferioribus uulua, & uesica & c. ut ab interiori parte simari: ab exteriori curuari ac gibbari eam necesse fuerit. sed potius paululū introrsum uergit: quippe cum supra eam & arteriam magnam & uenam firmari oportuerit.

43 Solusq; hic locus ab interiori parte musculi adnatos habet, quos quidem psoas uocant.

Ex his Hippocratis uerbis maxime conijcere quispiā posset, eum uertebras colli spinæ non adnumerare: nā si tota spina ex lato osse et thoracis uertebris struatur: uerū est solum hunc locum ab interiori parte musculorū agnascuntia habere. si uero colli etiā uertebra annumerent: falsum prorsus erit. nō enim solus hic locus habet adnatos musculi: sed collo quoq; ab interiori parte magni musculi adeo sunt, ut ignorari minime queant. ue-

rum neq; si minores multo essent, ignorari potuissent. particulam autem quandam horum musculorum qui psoa, id est lumbales appellatur, supra septimae sectionem ferri hic non indicauit: eo quod nimis ita exquisitae hae recedere pertinere ad praesens propositum non exilisimabat.

44 Ab hac autem parte usque ad magnam uertebrae quae supra superhumerales est, directe gibberosa est: magisque huiusmodi apparet, quae sit. acantha enim in medio eminentissimos: hinc et inde minores ossium processus habet.

Vertebrae paululum circa thoracem ossa ab interiori parte uidentur sumari: ita ut in posteriorem partem ex acanthae prominentia satis gibbosa appareant. quod autem de magna uertebra inquit quae supra superhumerales est: id ad commentarii memoriam reuocandum est, in quo De ossibus conscripsi. accommodanda siquidem illa ijs quae dicuntur, subinde sunt, neque enim mea explanatio ne indigent, nisi ubi aliquid inciderit, quod perspicuitatem desideret: cuius causa huiusmodi commentaria conscribuntur.

45 Ipse uero cervicis articulus repandus est. quibuscumque igitur gibberositas in uertebriis contingit, non admodum multis, sed paucis expulsiō magna aliqua euenit: quae uel una, uel plures uertebrae a cohaerentia abruptat. neque enim facile est ut uulnera talia efficiantur: neque in exteriorem partem expelli facile possunt nisi aut ab interiore uentrem hementi aliqua re per uentrem uulneratio fiat. sed moreretur hoc pacto homo, aut ex alto aliquo loco delapsus in coxas, aut humeros impingat. id quod etiam letale esset, licet nonnilico mortem afferret. a posteriore uero parte in anteriorem huiusmodi prolapsio fieri, nisi perquam graue aliquod pondus ingruat, non facile potest. ex ossibus enim quae extra prominent talis unumquodque est naturae, ut prius frangeretur, quam introrsum inclinationem aliquam magnam admitteret: & copulis uiolenter abductis.

Repandus est, id est in anteriorem partem inclinatus: ita enim apparet. duae autem sunt primae uertebrae quibus cervicis articulus constat. ex quo deinceps tres sunt, quae quo situ collocatae sint, mentionem non fecit. sunt autem inter secundam & sextam, tertia uidelicet, & quarta & quinta, quae quidem maxime rectam habere posituram uidentur, cum duabus alioqui minores sint, & praesertim tertia. nam quarta maior quam ea est, sicut huiusmodi quinta. sexta uero non solum his, sed septima quoque est maior. omnes autem quae sequuntur usque ad spinam terminum proportionem sunt altera quam altera subinde maiores. primum si in homine res consideretur, secundum hominem si in simijs, at-

A quae ijs praesertim quae & faciem similiorem homini habent: & magis quam aliae erectae ingrediuntur. haec enim cum in alijs, tum in situ ossium hominibus assimulantur. in spina tamen commune quoddam ipsis est cum ceteris quadrupedibus, quod homini non adest. lumbum enim longiorem pro reliquarum partium magnitudine, quam homines habent. nam homini quinque duntaxat, simijs sicut ceteris quoque quadrupedibus plures uertebrae lumbum obtinent. aduertendum autem in hac oratione Hippocratem cum de spine figura loqui proposuisset, atque ita incepisset ipsam spinam per longitudinem directe obliqua esse, ac tortuosa in fine hic subiungere ipse uero cervicis articulus repandus est. ut in hoc uersus ipsum quoque col- lum attribuere spinam uideatur.

46 Et articulis qui alternati inter se sunt, dorsualis praeterea medulla laboraret: si ex paruo spatio inflexione haberet tali elapsu egressa uertebra: tum uertebra quae exiliisset, medullam comprimeret, nisi etiam abrumperet. at ea compressa & interclusa multis magnis et opportunis partibus torporē induceret. ut cum multa & urgentia alia mala infestent: medico, quomodo uertebra dirigat, curare non liceat. quin neque fieri posse ut reponatur, neque dequassando, neque alia quapiam ratione, perspicuum est.

C Articulus uertebRARUM intelligit quibus per laterales processus inter se committuntur: quos alternatos propterea uocat: quia cum duos sublimiores processus una quaeque habeat, quibus cum superiecta dearticulatur: alijs ex ipsis eminentias alterius excipit, alijs in alteram inseritur. sed de his in commentario De ossibus scriptum exacte est.

47 Nisi quis dissecto homine atque in uentrem manu iniecta intructando ab interiori parte ad exteriorē retrudat. at hoc mortuo quidem fieri potest, uiuo non potest. sed quorum haec scribo: ut intelligamus nonnullos esse qui curasse se eos homines arbitrantur, quibus ab interiore parte uertebrae prolapsae articulos omnino transierint. quin et distortionē hanc curatu facillimā, nullaque indigere repositione, sed sponte sanari opinantur. ignorant quidem multi, atque ex eo quod ignorant, lucrantur. suadet enim alijs hoc ipsum, & ipsi falluntur hac de causa: acanthā quae hac in parte spinae eminet, uertebrae ipsas esse autumant: propterea quod rotunda ac teres attracta ti apparet. neque aduertunt ossicula esse illa a uertebriis procedentia, de quibus paulo antedictum est. at uertebrae multo antea abeunt. angustissimum enim ex omnibus animalibus

homo pro magnitudine uentrē habet ē po-
steriore in anteriorem partem, præsertim
ad pectus. cū igitur aliquod ex his eminē-
tibus ossibus ualide confractum fuerit, siue
unum, siue plura: ea in parte depressior lo-
cus efficitur, q̄ hinc & inde uideatur. ac p-
pterea isti uertebras intro ab̄isse existimāt,
ac decipiūtur. figurationes quoq; uulnera-
torum eos insuper fallūt. si enim inflectere
dorsum tentent, dolore afficiuntur, cū ea
parte qua uulneratio contigit, cutis distēda
tur, simulq; ossa fracta ita magis carnē pun-
gant: si repandantur & recuruetur, facilius
ferunt. nā & cutis laxior circa uulnus fit, &
ossa minus pungūt. quin et si quis attrectet,
ea parte cedunt recuruati: locusq; uacuus,
& mollis attrectāti apparet. Hæc omnia in-
super sunt quæ medicos decipiāt: sani autē ci-
to, & sine noxa sponte sua, qui ita affecti
sunt, fiunt. quippe cum omnia huiusmodi
ossa quæ casta sunt, celeriter occallescant.

Intrectādo, id est intrudēdo in imā partē digitos,
ut aliquid quod ibi sit tentemus ac perscrutemur.

48 Obstipatur igitur & obliquatur spi-
na, etiā in sanis, multis modis, nam & in na-
tura & in usu ita res se habet, quin & à fene-
ctute, & doloribus: contrahendi enim uim
habēt: gibberositates autē casu plerumq; effi-
ciūtur: si aut in coxas, aut in humeros quī-
piam cadendo impingat, necesse siquidē est
ut in gibbere una aliqua uertebra alta emi-
neat: alia uero hinc & inde desidere uidean-
tur. neq; tamē multum ab alijs ea exilit, sed
paululum: cum singulæ in uniuersum cōce-
dant, inde etiam fit, ut medulla dorsualis hu-
iusmodi distortionē quia circulares, nō an-
gulares euadunt, facile ferat.

Distortionem spinæ in posteriorē partem gib-
berositatem: in anteriorem repanditatem: in latus
obstipitatem appellari diximus. nomine tamen
hoc obstipitatis seu obliquitatis, id est σκολιότης,
de omni spinæ distortionē utitur: ut ostendat ge-
neralius quoddam quā aliorum eius esse signifi-
catum. ita nunc quoq; obstipari spinam dixit, pro
quocumq; modo distorqueri & superius etiā, ipsa
uero spina, inquit, per longitudinem directē ob-
stipa est: distortionem eius in posteriorem & ante-
riorem partem significans.

49 Fabrica autē huiusmodi ad detruden-
dum instruenda est. Possumus lignum ali-
quod ualidū & latum quod prælongā inci-
sionem habeat, in terra defodere, possumus
etiam loco ligni huius in pariete excauatio-

A nem hanc canalicularem facere: quæ uel cu-
biti altitudine à solo distet, uel quantū con-
gruum erit. quod ubi factum fuerit: colum-
na querna quadrangula in latus admouen-
da ad parietē est: ea distantia, ut pertransire
aliquis, si opus sit, queat. tum uel tunicis in-
sternēda, uel aliqua alia re, quæ sicut mollis
sit, ita non multum cedat. homo præterea
fotus, ac si admiserit, multa etiam aqua calida
lotus, pronus collocandus supra colūnā
est, ita ut porrectas manus secundum natu-
ralem figurationem alligatas ad corpus ha-
beat. tum habena mollis, idonea, lata & lon-
ga ex duobus perpetuis atq; aduersarijs lo-
ris constās media parte medio pectori quā
proxime ad alas bis circumdanda est, atq;
inde quod superest, ex utriusq; capitib. per
alam utrinq; circa humeros cōuoluēdum.
tum capita ad pistillarem fustem deliganda
ea longitudine, quæ supposito ligno cōgru-
at: ut ad id ima fustis parte obiecta retor-
quendo extendamus. postea tali altero uin-
culo tum supra genua, tum supra calces inie-
cto simili modo capita ad eiusmodi aliquē
fustē deligamus. alia præterea habena lata
& molli et ualida ad mitellæ formā, latitudi-
ne & lōgitudine idonea ualide illa quā pro-
xime ad coxas circūligamus: deinde capiti-
bus utriusq; ad fustem ad pedes deligatis, in
hac figuratione et hinc & illinc æqua ppon-
deratiōe, & in directū extendimus. nullum
enim magnū malū huiusmodi extēso affer-
re, si recte administraretur, potest: nisi uidelicet
dedita opera extēdi quispiā uelit. debet
uero medicus, uel quispiā alius præualēs, ac
minime imperitus imposita manus uola su-
pra gibberū, atq; altera supra alterā manū
insuper iniecta deprimere: aduertēs an in di-
rectū deorsum, an ad caput, an ad pedes de-
primendū sit. atq; hæc innoxia maxime ne-
cessitas est. si quoq; super insideat aliquis su-
pra gibberū dum extēditur, atq; suspenden-
do se incutiat, innoxium est. quin etiā quo mi-
nus consistamus pedibus supra gibberū ac-
gestemur, sensimq; incutiamus, nihil uetat:
id aut moderate efficere aliquis ex ijs pōt,
qui in palæstra assueti sunt. efficacissima autē
necessitas est: si uel paries qui incisionē ha-
bet, uel lignū defossum, tanto inferiorē spi-
na hominis excauationē habeat, quanto cō-
uenire uideatur: in quā absis tiliacea, aut alte-
rius

rius alicuius ligni non tenuis illa quidem inferta, supra gibberum imponatur: multiplici aliquo panniculo, aut paruo aliquo scorte puluillo subiecto: quod quanto minus fit tanto utilius est: modo caueamus, dumtaxat, ne assis duritie sua dolorem aliquem importune afferat. gibber autem è regione quammaxime esse debet ad excuationem quæ in pariete est: ut assis ea parte qua maxime spina extat, imposita maxime deprimat, ubi enim imposita fuerit, alij siue unus siue duo extremam partem assis depellere: alij corpus per longitudinem tum hinc tum illinc extendere, sicut dictum est, debent. licet etiam assis extensionem hanc facere: siue iuxta lignum hoc defigamus, siue in eodẽ hoc ligno, uel utrinque erectos paulo eminentes, uel ad ligni capita hinc & illinc postes affellorum extruamus. Hæ quidem necessitates seruabiles sunt: ut & ualentissime, et mediocrius intendant: talẽque uim habent, ut si quis etiam ad damnum, non ad curationem eis uti uelit, tunc quoque plurimum possint. nam siue in longitudinem tantum extendas hinc & illinc, nullamque assis necessitatem adhibeas, extendere facis poteris. siue non extendas, sed assereduntaxat comprimas, ita quoque satis depelles. bonæ igitur huiusmodi uolentia sunt: quibus & ualidioribus & imbecillioribus pro occasione seruatis uti quilibet potest: quæque secundum naturam compellunt. quæ enim excefferunt, in sedem suam redire uel depressio cogit. quæ uero præter naturam coierunt, extensiones secundum naturam extendunt. ego quidem neque pulchriores neque iustiores his necessitates habeo.

Adeo clare hæc & sequentia omnia exponit, ut si quis ea non intelligit, is explanatione non indigeat, sed monitione. quippe cum cõmentaria quoque non nisi ijs qui huiusmodi operationes uident, scribi consueuerint. Dictum a me etiam superius est, si quis primo intuitu ita aperte scripta non percipiat, eum bis, & ter, & sæpius animum adhibendo debere lectitare. nam si ita fecerit, non esse dubitandum: quin planè omnia intellecturus sit.

50 Nam extensio quæ per directum acanthæ fit, ab inferiore parte & ab osse quod sacrum uocant, apprehensionem nullam habet: desuper uero ad ceruicem & caput habet quidem: sed specie tamen indecorum est. quin & hac parte facta extensio si nimia sit, alias

A quoque læsiones afferre potest. Tentauero olim ego hominem supinum extendere, utrem minime inflatũ gibbero subijciebã: ac deinde immisso folle ex fabri officina inflabã. sed non successit. nam cum bene hominem extendebã, cedebat uter: neque uim inferre ullã inflatio poterat. adde quod promptus uter ad circũlabendũ erat: utpote cum in idẽ et hominis gibber, et utris repleti tumor urgeretur. si uero non admodum uehementer extendebam, uter quidẽ ex inflatione insurgebat: sed homo magis quàm utile esset, recuruabatur. atque hæc studiose scripsi, pulchræ enim earum quoque rerum disciplinæ sunt, quæ ad experimentum perductæ, frustratæ apparuerunt. & cur frustratæ fuerint apparet.

Apprehensionem pro reprehensionem, & anasam dixit: cum circumiecti laquei eminentium aliarum partium obiectu firmanur ut ne elabatur: cuiusmodi nihil ad os sacrum est. desuper uero licet ad collum et ad caput aliquid sit: si tamen hac parte laqueos circumijciat quispiam, strangulãri homo uideretur: atque ob id indecora extensio euaeret. quin etiam læsiones posset afferre, si laqueus ad guttur summum elaberetur.

51 Quibuscunque autem in interiorem partem uertebrae ex casu, aut ex pondere aliquo ingruente obliquantur: nulla ijs uertebra ut plurimum admodum multũ extra alias excedit. quod si multum excefferit aut una aut plures, mortem maturant: quemadmodum scilicet etiam antea dictum est. circularis quoque hæc, & non angularis dimotio est. ijs urinæ, & deiectiones alui magis quàm illis qui in exterioriorem partem gibberosi sunt, supprimuntur. pedes item & tota crura frigescent magis. lætaliaque hæc magis quàm illa quæ dixi. & si superstites sint fluidi magis in urina hi euadunt: crurumque incontinentiores, ac torpidi magis. quod si in superiore parte magis repãditas cõtigerit: totius corporis incontinentes, & torpidi fiunt. neque machinationem ullã ego habeo, qua reponi in sedem suã hæc queant, nisi dequassatio per scalã afferre his præsidium aliquid possit: aut aliqua alia huiusmodi medela, aut extensio, qualis paulo ante fuit commemorata. depulsionem uero quæ unã cum extensione afferri queat, nullã habeo. quemadmodum in gibbero detrusio per asserẽ efficiebatur. quod pacto enim ex anteriore parte per uentrẽ compellere quispiã posset: non enim licet. quin neque tussis, neque sternutamen-

ra ullam uim habent, ut distentione open-
aliquam ferant. neq; item quicq; prodest, si
in uentrem inflatio aliqua subiiciatur. add
quod magnæ cucurbitæ quæ admoventur
attrahendarum uerterbarum causa quæ in-
tro inclinata sunt, in magno opiniois erro-
re uersantur. deprimunt siquidem magis q̃
attrahant. neq; id aduertunt qui eas admo-
uent. quāto enim quis eas magis imprimi-
tanto repandiores ægri euadunt, cum cutis
fursum contrahatur. alios modos dequassa-
tionum diuersos ab ijs, quos superius dixi,
possem referre: quos accōmodatos esse af-
fectioni huic existimaret quispiā: quos pro
pterea nolo ascribere, quia fidem ipsis non
adhibeo. in uniuersum igitur de his de qui-
bus summatim dictum est, sciendū: quæ in
repandū declināt, pernicioſa & noxia esse.
quæ in gibberum abeunt, esse innoxia in to-
tum: quantum uel ad mortem, uel ad urinæ
suppressionem, & torporem attinet.

De uerterbarum dimotione in interiore par-
tem hæc scribit: quam grauiorē esse inquit, quā
quæ extrorsum sit. cuius rei causa in aperto est. nā
nerui omnes qui à medulla dorſi exoriantur, in-
trorsum tendunt, unde contingit, ut in talibus ex-
cessibus magis cōprimantur, quā in ijs qui gib-
berum efficiunt. simulq; cum neruis omnes spinæ
adiacentes partes, atq; ita superior quoq; uesicæ
extremitas compressionem sentiat: quā omnia
ex contagione in inflammationem incidunt. quo-
circa neq; urinam uesicæ, neq; excrementa alui in-
testina reddunt. cum enim urina & deiectio sup-
primitur: excernentis facultatis, quæ una est ex na-
turalibus, affectio est. cum uero stupida actordi-
da membra euadunt: id ex neruorum læsione exi-
stit. ex læsione igitur circa intestina & uesicā quo-
ad inflammatio finiatur, periculum imminet, ne
æger pereat: cum qui stringit uesicam musculus
non ex arte operantis, exitum urinæ nō exhibeat:
quicq; in sede est, quem constrictorium uocant, ut
uersimile est, eadem debilitate afficiatur.

52 Nō enim gibberositas in exteriorē par-
tem riuos in uentre intendit: neq; prohibet
quo minus bene fluere ualeant. repanditas
uero & utraque hæc facit, & ad alia multa
hæc accedunt.

Cum superius dixisset, ijs urinæ & deiectiones
alui magis, quā illis qui in exteriorē partem
gibberosi sunt, supprimuntur: nunc causam sub-
iungit, cū inquit. non enim riuos in uentre inten-
dit, hoc est effluuia & exitus & circa uesicam, & se-
dem. partes enim eas quibus excrementa effluunt,
intendi & ex compressione, quæ ex recessu uerte-
brarum in interiorē partem fit, & ex contagio-
ne cum neruis, uersimile est.

A 53 Nam multo plures crurū & manuum
incontinētes euadūt, & corpore torpescūt,
urinæq; suppressionem patiuntur: qui licet
curuamen, neq; extrorsum neq; introrsum
ullū ipsis excesserit: quassati tamen per dire-
ctum spinæ uehementē fuerunt. quibus ue-
ro curuamen excelsit, ij minus patiuntur.

Hic curuamen, id est *curuamen* ut generale nomen
de omni uerterbarū distortionē præter naturam
posuit. tota sententia clara est. ad quartā enim dif-
ferentiam affectionum spinę deuenit, quam quassationem appellat. cum uidelicet compages uni-
uersæ uerterbarum spinæ dimota sunt: & discussa
ea uehementer ita est, ut in diuulsionis confusio-
nisq; periculum uenerit. id quod longe peius esse
inquit, quā quæ absq; quassatione distortionē
spinæ contingunt. Deinceps costis quoq; fractis
tale quid euenire commemorat.

DE COSTARVM FRACTIONE.

54 Multa quoq; alia in medicina uidere
quispiam posset: quorum grauiora innoxia
sunt, cum totam iudicationem morbi per se
ipsa suscipiāt: imbecilliora uero noxia, atq;
eiusmodi, ut & diuturnos morborum exor-
tus efficiant: & cum reliquo corpore com-
municationem ampliorem habeant.

Cum de spinæ affectione, quam quassationem
uocant, ante dixerit, quæ sit absq; ullo uerterbarū
excessu: hic multa esse inquit in medicina, quæ li-
cet grauiora esse uideantur, mitiora tamen reuera
sint. grauiora enim sunt ea in quibus contagiones
maiores contingunt. nam quæ nullam principa-
lium membrorum contagionem afferunt: sed per
se ipsa iudicationē faciunt: minus pernicioſa sunt:
licet uehementiora esse uideantur. deinceps igitur
quali exempli loco affectionum quæ costis con-
tingunt, mentionem facit. ostēditq; in his alia spe-
cie tantum, alia uigrauiā esse atq; infesta.

55 Nam & costarū fractioni tale quid con-
tingit. quibus enim fractæ costę fuerint aut
una, aut plures, sicut plerisq; euenit, ita ut
ossa in interiorē partem non penetrarint,
neq; denudata fuerint: pauci febre correpti
iam sunt: quā neq; sanguinem multi expue-
runt: neq; suppurati effecti sunt, neq; lina-
mentarij. neq; ossium siderationes contige-
runt. hisq; uulgaris uictus sufficit.

Mediocre ac moderatā orationem dilucidi-
tatem efficere uel ex hac quæ longa est, cognosce-
re possumus: cuius ego priorem partem modo su-
perius exposueram, quam Hippocrates longius
protrahēs obscuram reddidit: breuib; tamen in
hunc modū exponi posuisset. fracturæ costarum
cum simplices & solæ sunt, speciem quidem gra-
uiorem q̃ contusiones præ se ferunt: uī tamen sunt
mitio

mitiores; curanturq; absq; periculo citissime. at si sine fractura circa costas cōtuse carnes fuerint, maximum interdum periculum afferunt, atque hæc summa horum uerborum sentētia est. reliqua particulatim uideamus. Si in prima parte huius orationis breuibus quemadmodum ego, cum simplices & solæ fracturæ costarum sunt, Hippocrates dixisset: clarius rem explicasset: sed ipse quasi interpretans rem circumloquendo ait ita ut ossa in interiorē partem non penetrarint. de inanitate thoracis intelligēs: in quam fieri non potest ut os penetret, nisi & ipsum omni circumiecta carne de nudatum, & membrana quæ subcingens uocatur, diuisa fuerit, per hæc simplicem fracturam signifi cavit. sequentibus uero mali mansuetudinem declarat: cum inquit paucos febricitasse, raroq; sanguinem expulisse aliquos, & suppurasse, aut linimentarios euasisse, quos *εμμότους* uocat: hoc est, ulcus cauum & exesum contraxisse, quod curationem per linamenta desideraret: raro item ossi costæ siderationem contigisse: propterea his uulgarē uictū sufficere. didicisti autē semper solere uulgarem appellare, id est *φαύλον* uictum Hippocratem, eum qui tenui & exquisito contrarius est. in proposita igitur hac oratiōe tota sentētia hæc est. reliqua quæ sequuntur uideamus.

56 Si enim febris continua eos non corripiuerit, exinanire hos peius est quā nō exinanire: doloremq; & febrem, & tussim maiorem affert: repletio enim mediocris uentris directio costarum efficitur. exinanitio autem costis suspensionem præbet. suspensio dolorem parit.

Ventris tumor firmamentū costis efficitur, unde etiam qui maiores uentres habent, ijs si costa frangatur, minore dolore uexari consueuerunt, quibus uero graciles & cōtracti uentres sunt, grauius dolent: cum infirmatas, ac suspensas costas sentiant. si igitur continua febris corripiantur, exinanendum est, id est inedia macerandum. quandoquidem maius nocumentum ex esione, quā ex suspēsiōe existat. sin febris abstul, melius est ut tantum comedant, quantum in tumorem adeo uentrem attollat: ut absq; compressiōe affectæ partis sedes ac sustentaculum costis fiat.

57 Extrinsecus uero uulgaris deligatio talibus sufficit cum cerato & plagulis & linteis leniter cōprimendo planā deligationē facimus: uel laneo etiam aliquo superimposito. uiginti diebus autē costa confirmatur. ce leriter enim ossibus his callus inducitur.

Vulgarem deligationem appellat, sicuti superius uictum, quamlibet, & quomocunq; adhibitam: quæ ei quæ accurate sit, contraria est.

58 At si circa costas caro aut ictu, aut casu, aut renitētia, aut aliqua alia causa huiusmodi contusa fuerit, multū iam sanguinem multum expuerunt.

Hæc oratio memoria tenenda uobis ob eos est, qui in lateralibus morbis aliquam necessario ex pulmonis fibris pati opinantur. pulmonem enim cum inflāmata costam attingat aliquid ex inflā mationis sanie contrahere inquirunt. at Hippocrates nihil pulmone patiente, sed sola affectiōe in costis existente spūere nonnullos sanguinem assent. quod quo pacto fiat, inquirere per ocū licet. præsertim cum nos quæstionē hanc, in libro Erasistrati de sanguinis excreatione, perpendamus. satisq; est nūc, si illud cognoscamus: fieri interdū, ut absque ulla pulmonis affectiōe ex costarū lāsione aliqui sanguinis spūitū educant. quā & in alijs sæpe insepulcristis, cū cūcuten non uulnerata sed integra in fracturis cruentus humor emanat sic ut fascias omnes imbuat: cum tamē multo densior cutis circa membra longa quæ *κωλά* appellantur, sit, quā membra quæ subcingit costas membrana, ut nihil mirū esse debeat, si per eam quippiā in interiorē partē ex affecta costa effluat: quod statim postea in gutturales cauitates pulmonis in expiratiōibus excipitur. quemadmodū in ijs uidere licet, quibus uulnerata membrana hæc fuerit. quicquid enim per uulnus in thoracē infuderis, statim ad os ascēdere cōspicitur. id quod Erasistratus nō aduertens in absurdas rationes inductus est in libro, quæ De sanguinis excreatione inscripsit: quæ q; prauæ sint, ex me sæpe super ipso opere differente audiuitis.

59 Riui enim in cassā parte unicuiq; costæ obtēta, & tenores ab opportunissimis partibus corporis exortus habent. unde multi & tussiculosi, & uomicosi, & suppurati, & linamentarij effecti sunt: in costæq; siderationem inciderunt, quod si etiam nihil huiusmodi contigerit, tardius tamen dolore destituuntur, quibus contusa caro circa costam, quā quibus fracta costa fuerit, magisq; his dolorum recidiuas patitur locus. magisq; tales noxas negligunt nonnulli, si costa fracta ipsis sit.

Riuos appellat arterias ac uenas: cassam costarum partem, quæ inter ossa intercedit, ubi intercostales musculi sunt: tenores, neruos. hæc autem omnia ob opportunissimis corporis partibus exoriri ait, propterea quod uenarum harum origo, non secus atque artierum iuxta cor est. nerui uero à dorsualibus qui circa thoracem sunt, ortum habent. quadamq; communicatione cum reliquo neruorum pariunguntur, qui à cerebro descendunt. Quæ deinceps scribuntur, si quis memoria teneat omnia quæ superius in his commentarijs dicta sunt, patent.

60 Quin & exactiore curatione indigent hi, si sapiunt. de uictu enim detrahendum, & quiescendum corpore quammaxime: à uenereq; abstinendum est.

Exactiorem, exquisitiorem, accuratioremq; uocat, uulgari & uili contrariam.

61 A cibisq; omnibus pinguibus, aspre-
dinosis & ualidis.

Quicunq; cibi fauces exasperant, tussiculamq;
prouocant, aspredinosis hic ab aspredine quam as-
ferunt, uocantur: id quod pinguibus, & acidis, &
acribus accidit. ualidos aut appellat, qui difficilis
concoctionis sunt. uerbum autem hoc aspredino-
sum in accuratis exemplaribus *αεχρῶδες* per *ν* in
secunda syllaba scriptum reperitur: quod *αεχρῶν*
fit. *αεχρῶν* enim Iones *αεχρῶν*, id est mīsum nuncu-
pant: quando uidelicet sensus in faucibus & gut-
ture exiguarum aspredinum speciem, perinde ac
milij præfert: quasi miliosos dixeris. quod uero si
perius de ijs qui circa pulmonem tuberculis diu-
turnis & immaturis affecti sunt, dixit: quod diffi-
culter spirant, & stridulam faucium asperitatē ha-
bēt, id absq; *ν*. *αεχρῶδες* legitur: idq; *αεχρῶν* dedu-
citur: quod sonū & sibilum facere significat: quasi
sibilosos dicas: cum uel angustia aliqua, uel humi-
ditas amplior, uel, quod plerunq; cōtingit, utraq;
hæc spirandi meatus occupant, ita ut sine sono
euadere spiritus nequeat: cuiusmodi spirationem
densam nonnulli appellant. cur aut à tussim mo-
uentibus cibis abstinere iubeat, apertum est: cum
quiescere omnia affecta membra debeant. unde
etiam postea tacendum esse censet. alia quoq; om-
nia quæ uehementem motionem toti corpori affe-
runt, manifesta causa est cur cauenda esse moneat:
quippe cum unā cum toto pars etiam agitetur.

62 Tum uena ad cubitum secunda: tace-
dumq; quàm maxime est, plagulis uero lo-
cus contusus non multiplicibus, sed multis
longeq; latoribus q̃ cōtusio sit, tegendus:
ceratoq; sublinendū, tum linteis latis, latis
mitellis, & mollibus deligandum mediocri-
terq; astringendū, ita ut neq; ualde se com-
pressum esse dicat qui deligatur, neq; laxè.
incipere autem supra collisionē debet qui
deligat, ibiq; astringere maxime.

Memoria tenēdum hoc uobis quoq; est, aduer-
sus eos qui ob solum plenitudinis, ut uocant, con-
cursum admittendam uenæ sectionem opinantur:
ē quorum numero quoq; est Menodotus experi-
mentarius. sed eorum sententia & in libro De san-
guinis missioe per uenas, & in libro De plenitudi-
ne falsa esse demonstrata est: cum alijs, tum eo re-
darguta, q̃ ob huiusmodi percussiones in quibus-
dam corporis partibus illatas ad uenam secādam
deuenimus: licet qui id patiuntur plenī habitu nō
sint: quodq; nisi uena incisa sanguis detraha-
tur, maxime inflammationes oriuntur: ex quibus mala pro-
culdubio accidentia consequantur.

63 Deligationemq; ex duobus initijs face-
re, ne cutis quæ circa costas est in alterutrā
partem inclinetur, sed æqualiter præpōdes-
ret, deligādūq; uel singulis, uel alternis die-
bus, meliusq; est, ut leni aliquo alius duca-

tur: quantū uidelicet ad exinanendū cibū
sufficiat. et decē quidē diebus extenuemur:
deinde alamus corpus, & obesemus.

Laxa supra costas cutis plerisq; est, & præcipue
si pingues non sint: uel si eo tempore non fuerint,
quo læsionem passi sunt. hos igitur inquit, ex duo-
bus initijs, id est à medio orsa fascia esse deligan-
dos: propterea quod si ex uno initio fasciantur, in
alterutram partem ijs cutis soleat inclinari. sed si
ex superabundā cautione pingues quoq; ita de-
ligaris, nihil lædes: præsertim si iuxta alam (ibi e-
nim laxior est cutis) contusio sit.

64 Sed cum extenuamus astrictiore: cum
ad obesitatē deducimus, laxiore utendū de-
ligatione est. & si inter initia sanguis expui-
tur, cura ad quadragesimū usq; diem adhi-
benda est, & deligatio facienda: si nō expui-
tur, satis, ut plurimum, uiginti dies erūt. ex
ui autem uulneris tempus coniectandum.

Hoc commune omnibus fracturis est. dictaq; à
mē etiam superius multa alia sunt ex ijs quæ nunc
ab Hippocrate dicuntur, cum librum De fractu-
ris explanabamus. inde ea repetēda uobis memo-
ria sunt, non mihi scribendo iteranda.

65 Nā qui tales contusiones neglexerint,
etiam si nihil aliud mali patiantur, illud cer-
te nō euitabunt, quin locus affectus mucos-
siorē carnē cōtrahat, q̃ prius habebat. Vbi
uero tale quippiā relinquitur, & curatione
non probe exprimitur: deterius quidē est,
si iuxta os mucosum id relinquitur: quip-
pe cū neq; amplius caro simili modo os at-
tingat, & os ipsum morbosius efficiatur:
quin siderationes quoq; ossis diuturnæ ex
his occasionibus multis iam contigerunt.

Mucosum humorem eum cōsuevit appellare,
qui lentore quodam, & albedine præditus est: qui
ad exangues partes, hoc est ossa & cartilagine co-
gi cōsueuit: cum imbecilla ita natura est, ut bene
conficere alimentum in ipsis nequeat: sed quasi se-
micoctum quid relinquat. nō secus atq; in oculis
membranæ relinquant, cum lippitudine ea labo-
rant, quā à sordibus his *λινμυ* uocant. imbecillior
autem natura euadit, aut ex propria intemperatu-
ra, aut ex multitudine humoris, qui illuc cōfluxit:
quemadmodum in præternaturalibus tumoribus
euenit. reliqua orationis huius aperta sunt.

66 Verum si etiā iuxta os minime sit, sed
ipsa caro sit mucosa: sic quoq; recidiuæ &
dolores interdū fiunt, si quis forte corpore
laborarit. propterea deligatione utendū est
tum bona, tum conueniente: quoad exicca-
ta atq; absorpta hæc exuccatio fuerit, quæ
in contusione extiterat: carneq; sana opple-
tus locus fuerit: caroq; ossis augeatur.

Caro nō propria sui ratione fit mucosa, aut que cuncq; alia pars quæ sanguine prædita est, propriū enim eius excrementum eiusmodi est, cuiusmodi in fluxionū affectionibus, & iecinorarijs deiectionibus apparet. unde frequenter in ossibus, aut cartilaginibus, aut membranis: raro in carnibus mucosus hic humor colligitur; aut ex communicacione quam cum illis partibus habet, aut ex copia succi qui illuc confluit, quando pituitosus & mucosus collectus ibi humor est. qui sanè exinaniri difficulter potest: cum neq; perusionibus, neq; cataplasmatibus, neq; medicamentis aut attrahit, aut discutit ualeat, neque alia aliqua re nisi prius attenuatus, atq; in uaporem dissolutus fuerit. quoniam uero lentus humor dissolui in uaporem nō facile potest: idcirco difficulter euacuatur. ubi igitur huiusmodi aliquid excrementi relinquatur, leui de causa fit ut pars ea uexetur: cum ob imbecillitatem prompta ad excipienda excrementa omnia reddita sit, quæ in reliquo corpore uel qualitate, uel quantitate aggregantur.

67 Quibus autem neglectum hoc malum inueterauit, ita ut & dolore locus infestus, & caro submucosa sit: ijs optimum in aduersione præsidium est, et si caro ipsa sit mucosa, usq; ad os adurendum est: sic tamē ut os minime calefiat, si inter costas sit malum, neque ita in summo adustio facienda est: modo caueas, ne in ulteriores partem deurendo penetres. at si ad os contusio esse uideatur, sitq; adhuc recens, nōdumq; sideratum fuerit os: si parum quidem occupet loci, ita adurendum est, sicut dictum est: si prælonga suspensio circa os sit, plures uestigationes iniiciendæ. De sideratione autem costæ simul cum linamentariorum medicina dicitur.

Cū lentū humorē medicamentis absumere non possumus, reliquū est ut adustione succurramus. quæ quomodo facienda sit, manifeste declarauit.

DE FEMORIS LUXATIONE.

68 Cum femoris articulus è coxa excidit, quatuor modis promoueri consuevit: in interiorē partē sapissimè: sæpe in exteriorē: in posteriorē & anteriorē interdū, sed raro.

Qui coxæ acetabulum inspexit ei opus non est ut à me cur in interiorē partem femur sapissimè deinde in exteriorē excidat, causam intelligat. acetabuli enim profunditas omnibus in partibus æqualis non est. unde fit, ut qua humilior supercilium eminet, inde articulus facilius exiliat.

69 Quibus cuncq; igitur intro excesserit, crus ijs si alteri comparatur, lōgius diabius de causis merito apparet. nam & ossi quod à coxa procedit, superiusq; ad pectinem fertur, caput femoris infidet: articuli uero ceruix in acetabulo uehitur. ab exteriori autē

A parte, utpote cum in interiorē caput brachij profluxerit, clunis sinuata conspicitur.

Fere omnia ipse à principio exorsus ita aperte scripsit, ut explicare clarius queat nemo. quin & causas etiam eorum quæ dicit, manifestissime subiungit. quare id quod sæpe à me dictum est, nunc etiam repetam. si quis ijs quæ dicuntur, animum aduertat, si non semel, at certe iterum, ac tertio relecta facile intelliget.

70 Extrema femoris pars ad genu, tibia item, & pes simili modo spectare in exteriorē partem coguntur. unde fit, ut quia pes extra uergit, medici ob imperitiā sanum pedem ad hunc, non hunc ad sanum applicent. propterea multo longius læsum crus quam sanum apparet.

Hoc quoq; cōmune esse omnibus quæ secesserunt, ut alterum extremum in oppositum locum, quam illi quod excessit abeat: superius demonstratum est. nunc igitur etiam cum caput femoris introcesserit, merito alterum extremū quod est ad genu, in exteriorē partem uergit.

71 Multis quoq; alijs modis obintelligentiam hæc habent.

Obintelligentiam non deceptionem absolute, sed eam quæ ueritati adiacet, atq; ob id probabilis uidetur, appellare Hippocratē solere, dictum etiā à me superius est, cum præter id quod uerum est, intelligamus atq; aberramus. hæc autem deceptio de qua nunc loquitur, fit cum in comparando affectum membrum sano à naturali figuracione membri aberrant nonnulli. cum enim deberent protendendo rectā ad sanum crus affectum comparare: e contrario faciunt: sanum affecto applicant.

72 Sed neq; constricti ad inguen, quemadmodum sanum potest. quin & si contractus mus, caput femoris in interfemineo euidenter extuberare sentitur. atq; hæ notæ quidē eorum sunt, quibus intro femur exciderit.

Constrictur quidem, sed cum dolore, & non prorsus: cuius rei in causa sunt musculi à posteriore parte ijs qui inflectunt femur oppositi: qui usq; ad integrā flexionem sine dolore non consequuntur. quoniam cum ita femur luxatum est: amplius q̃ naturaliter conueniat, singuli infummis inflectionibus subsistunt.

73 At quibus elapsus articulus reuersus non fuerit uel frustratione uel neglectu: ijs circūuolutim non secus ac bob. ambulatio fit: et in sano crure uexatio plurima cōtingit.

Cum lōgius alterum crus in luxatione euadat, necesse est, ut qui ita sunt affecti, ingressione, nō secus ac boues faciāt. propterea q̃ quæadmodum in principio huius libri ipse quoq; dixit: illi etiam laxum articulū coxæ habent. sed fortasse causa huiusce rei non tantū in laxitatem dearticulationis, uerum etiam in musculorum qui ipsum mouent, debi

debilitatem erat referenda. non enim si robusti essent, difficulter dearticulationē inflecterent. ea uero inflexa circumferre in exteriorē partem crus minime esset necesse. crurum siquidem ingressio fit, dum alterutrum per uices & firmatur, & mouetur. quādo enim sinistrum firmatur, tunc dextrum à posteriore parte in anteriorem traducimus: eoque ibi ante collocato ac firmato, sinistrum rursus à posteriore parte simili modo prorsum mouemus. sicque eo in anteriore parte firmato rursus ad dextrum promouendum redimus: atque ita subinde facimus: semperque alterum erectum in terra firmamus, alterum quod mouemus, attollimus. si enim natura esset cōparatum, ut neque ad genu, neque ad coxam inflecti crura possent: transferre crura tanquam ligna quædam prorsus cogeremur: sic ut in altum aliquatenus alterutrum iperum sublatum, in orbem postea circūuoleremus. sed quia utriusque his dearticulationibus cōtrario quidem interesse, at toti cruri perquā utili modo inflecti possunt, idcirco absque eo ut in orbem circumferamus, uel at tollamus crura tanquam ligna, cōmode ingredimur. nam dearticulatio quæ est ad inguen, in priorem partem femur: quæ est ad genu, in posteriore tibiam attollit. ut etiam si crus quod traducimus, longius eo sit quod in terra firmatum est: nō opus sit tamen ut in exteriorē partem circumuoluatur: si modo musculos ualidos habeat, qui cito inflectere utraque dearticulationem queant cum uero prompte inflectere ob imbecillitatem nō possunt, dolorque auersantur: circumferre id in orbem cogitur, nihil enim ne attollere quidem rigidum sicut lignum musculis licet, qui imbecilli sint, aut dolore afficiantur. atque ob hæc potius, quam ob longitudinem quæ cruri accessit, ingressiōem circumuolutum fieri, ex eo quod ipse Hippocrates subiungit, exemplo manifeste cognosces. inquit enim. nam et quicumque in pede aut tibia ulcus habent, ingredi crure non admodum possunt: et infantes ita ambulant, his siquidem ita ingredi contingit, licet crus longius ipsis non euaserit, ex dolore quo attentantur, cum dearticulationes inflectunt, ad inguen & genu præcipue, tum etiam ad malleolum. hæc enim dearticulatione summum crus resimari necesse est cum naturali ingressione ambulamus: sursumque attolli totum pedem. alioqui enim præsertim inæquali in solo offenderet.

74 Cogunturque hi circa ile & circa articulum luxatum manēre & obstipi esse.

Non cum firmato sano crure alterum luxatum mouent, & transferunt, hoc modo figurare se ipsos coguntur: sed cum affectum firmantes, sanum traducunt. non enim læsum superiecto corpori erectum substat, quemadmodum cum naturali in situ erat, ad rectam lineam in solo firmatum: sed obliquum sicut ab inguine in exteriorē partem promouetur. in quam etiam corporis partem quæ est directio ad crus affectum sita est, inclinare consueuerunt: quippe cum in periculū ueniant ne in contrariam partem subuertantur. atque ita fit, ut ad ile

Galen.

A corpus contrahant, ac recipiant. *κνηῶνα* enim, id est ile locum eum uocat, qui inter iliorum ossa & ad ulteriores costas intercedit: propterea quod *κνηός*, id est uacuus & cassus ossibus est: quasi cassum dixeris. Sed cum neque hoc modo læsum crus gestare corpus tum ob imbecillitatem, tum obfigurationem queat, subsidio indiget: quod qui id patiuntur, ab ipsa re edocti manu suffulciendo afferunt: atque id ubi maxime est opus, extrinsecus ad femur. id quod cum ad partem eam affecti cruris inclinari eos cogat, ipsorum obspicitatem atque obliquitatem circa ile auget. nam si quis etiā absque cruris in exteriorē partem porrectione hacfiguratione constituitur, ile ipsi subsistit ac sinuatur.

B 75 In sano uero crure in exteriorē partem clunis rotunda extare cogitur. nam si quis pede sani cruris extra ingrederetur: reliquū corpus in læsum crus gestandum reijceret. sed gestare id læsum crus non potest: quomodo enim posset? quare cogitur pede sani cruris intus, non extra ingredi. ita enim fit, ut sanū crus maxime partem corporis, quæ sibi & cruri læso imminet, sustineat.

C Immutata loquutione obscuritatem quandam induxit: ita enim erat dicendum: ut ego nunc subiungam. In sano uero clunis in exteriorē partem rotunda extare propterea cogitur, quia intus crure hoc ingreditur. si enim quis extra ingrederetur, reliquum corpus in læsum crus gestandum reijceret: id quod fieri non potest. ita enim fit ut sanum crus maxime corpus sustineat &c. hoc est, hoc modo, quando uidelicet sani cruris pede ingredimur: tunc enim totum corpus firmari optime potest, ut subuerti difficulter queat.

76 Cum autem excauentur & ad ile & ad articulum pusilli uidentur: cogunturque baculo à latere sani cruris reniti, ea parte enim baculi cōtatione est opus: quippe cum in eā & clunes uergant, & pondus corporis ingruat.

D Quia affectum crus superpositum sibi corporis partem gestare non potest, propterea & totum crus sanum quam intimam in partem subiiciunt: & ipsi supra id toto corpore incumbunt. fit enim ut cum in alterā partem propendeant, periculum sit, ne in contrariā à crure affecto subuertantur. quemadmodum igitur cum transferre in anteriorem partem sanum uolebant, manu affectum suffulciebant, ne sublaberetur: ita sanum baculo firmant, eiusque auxilio subnituntur.

77 Coguntur etiā inclinari: quippe cum manum læso cruri à latere femoris obfirmare compellantur. in crurum enim uicissitudine corpus gestare læsum crus nequit, nisi ad terram compressum detineatur.

Hic quoque obscuritatem quādam creauit. cum non dixerit se ad reliquam partem ingressiōis transire. hucusque enim de parte ea ingressiōis lo-

tom. 6 X 2 quu

quutus est, in qua crure quod naturali in situ est, in terra firmato alterum affectum in anteriorem partem traducitur, nunc uero de altera ingressus parte agit; cum affecto crure firmati ac subnixi sanum traducit; sed paulo ante de hac ingressionis parte dictum iam est.

78 His igitur figurationibus uti coguntur ij, quibus in interiore partem prolapsus articulus non redierit. nihil que homo præmeditatur ut quamfacillime figuretur: sed casus ipse ex præsentibus facillima eligere edocet. nam & quicūq; in pede aut tibia ulcus habent, insistere crure nō admodum possunt; & infantes ita ambulāt: læso enim crure extra ingrediuntur.

Cum duabus figurationibus nō una utantur in deambulationibus illi qui hoc modo affecti sunt, merito his dixit altera enim est cū manu crus læsum suffulciunt: altera cum in sanum toti incumbunt. unde etiam conti & baculi subnitione indigent. quare fit, ut in contraria his corpus diuerget, modo in dextram partem inclinatis cum dextro pede: modo in sinistram, cum sinistro firmantur. hisq; præterea deformiore uti figuratione in ingressione contingit, q̃ ijs quibus coxa in exteriori partem luxata est, de quibus deinceps dicit.

79 Ac duplex lucrum consequuntur: duplici enim indigent. nam & corpus nō similiter supra crus extra ingrediens gestatur, sicut supra id quod intus est. non enim ē directo ad ipsum est pondus: sed multo magis ad id quod subingreditur. ipsi siquidem & in ipsa ambulatione & in crurum transmutatione ē directo incumbit pondus. in hac figuratione sanum crus citissime supponere poterit, si eo quod læsum est exterius, sano interius ingrediatur. de quo igitur est sermo, bonū est ut sibip̃ corpus eas figurationes reperiat, quæ facillimæ sint.

Dum extra affectum crus circumducunt, intus uero sano firmantur, duplex lucrum consequuntur: quod neque læsum crus grauatur toti corpori subnixum: neq; ministerium diutius subit, cum sanum per breuissimū intervallum moueatur. nam si diligenter aduertere uolueris, atque obseruare tempus quo utrunque crus ambulationi ministerium exhibet: non modo duplo, sed triplo amplius esse alterū altero reperies. per paucissimam enim distantiam etiam celeri delatione sanum motetur: ægrum uero per longissimā & tarde. quanto autem maior sit ingressio quæ circulo ducitur, quàm quæ in rectum fit, patet: etiam si utriusque termini ijdem essent.

80. At cum ijs qui nondum ad integrum incrementum peruenere, elapsus articulus nō est reuersus: decurratur eis femur, tibia,

A & pes. neque enim ossa in longitudinem similiter augescunt, sed breuiora efficiuntur, & præcipue femur.

Totum crus, inquit, minus efficitur & breuius, quibus femur cum nondum ad integram longitudinem excreuisset, luxatum est. id quod cōmune cæteris quoq; articulis est, quemadmodum etiam prius dixi, cuius quidem rei cōmunis causam ipse subiunxit, sicut mos ei est: ut in particulari aliquo quod cōmune est, semel cōmemoret. ob id enim inquit, absq; auctione atq; alimento crus relinqui, partim quia sede sua caret articulus: partim quia ad usum ineptum euasit. ego uero superius gracilitatis & exiguitatis membrorum causam esse etiā ocium dixi. utraq; autē ex luxatione eueniunt. unde nescio quo pacto Hippocrates cum dixerit luxationem esse in causa, deinceps ocium et uacationem membri subiungat. luxatio enim non est quæ primo inducere innutritiōne queat: sed media instrumentorum distortio, & uacatio intercedit.

81 Carne item uacuum, et demusculatum, & effœminatum, & tenuius totum crus fit: partim quia sede sua caret articulus: partim quia cum in naturali situ non maneat, ad usum ineptum euasit.

Totius musculorum substantiæ partes sunt carnes ut sæpe in musculorum dissectione inexististis: dum ostenderem ego duo esse sensus ipsorum elementa quæ sensu perciperentur, neruosas uidelicet fibras, & quæ extrinsecus ipsis accrescunt carnes. cum igitur aliquis exercitationibus, & frictionibus robustior q̃ erat, euadit: is fibrarū substantiam pleniorē, carnis uero tenuiorē quidem, sed ualidiorem tamē etiam ipsam habet. artijs qui exercitati non sunt, e contrario euenit. cum enim fibras graciles habeant, carne multa, sed mollī ob humiditatem præditi sunt: horum siquidem caro caseis qui coagulatur: illorum qui exercitati sunt, iam bene atq; integre coagulatis persimilis est. unde fit ut exercitatorū musculi duri & neruosi sint, tororumq; delineationes euidenter præferant: inexercitatorū molles et carnosī appareant: nec nisi obscuras & exiles circumscriptiones ostendat. propterea Hippocrates cū his crus carne uacū fieri dixisset, animaduertere t̃q; plerisq; exercitatis hominibus idem euenire: subiunxit & demusculatum. quod idem est, ac si dixisset, quod nullas musculorum circumscriptiones habet, quæ sensu percipi queant. non enim aliquos his musculos interiō credendū est: sed sicut deueniat et uenis carens corpus appellamus, quod uenas nullas exantes atq; apparentes præfert: ita demusculatū dicimus, in quo musculorum delineationes obscuræ sunt. adde quod declarare apertius uolēs, qualis huiusmodi hominib. cruris species euadat, insert effœminatum. hoc est humidum & molle, & non astrictum sed fluidum: cuiusmodi in mulieribus uidere licet. omnia enim hæc de mulierum carne dici cōuenienter possunt: a quibus per translationem effœ-

effeminatum dixit tenuius uero post omnia ad iungit: ut omnium partium quæ in eo sunt, diminutionem ostendat: dearectq; quod prius dixerat: decuratur hoc est *γυῖσται*, quasi deartuatur, & demembratur dicas, carne enim uacuum de sola carnis detractio: decurtatum uero de omnibus cruris partibus diminuitur dicitur.

82. Vfus enim quidam à nimia effeminatione liberat: & nō nihil etiam ab exolescentia in longitudinē. Quibuscūq; cum in uentre sunt, luxatus hic articulus fuerit, ij maxime lædūtur. deinde quibus in prima infantia idem contigit: minime omnium, qui luxatione sunt p̄sali cū adulti integre iam sunt: quibus qualis ingressio fiat, dictū iam est.

Ex Herodoto maxime licet cognoscere uocem hanc quidam hoc est *μυρτερεῖσθαι*, qua hic utitur Hippocrates, nihil aliud significare apud Ionas q̄ *ἔρεπος*, id est alius: saepe enim Historicus ille in hūc modū nomē hoc usurpat. sed ex hac lectione non solum pro *ἔρεπος*, id est alio, sed pro *τῶν*, id est aliquo & quodā sumi posse perspicū est. cum enim ante dixerit ex oculo & uacatione crus huiusmodi luxatus decurrit & debilitari: ne aliquid perperā hoc interpretaretur, putaretq; omnem usum huiusce membri esse interdictum: non omnem inquit: nam quendam, hoc est moderatū esse eum, qui non modo nō noceat, uerumetiam prosit. non secus atque omnia cetera in toto salubri uisū: id quod cum alibi, tum uno capite in sexto Vulgarium morborum in hūc modum ab eo dictum est: cum inquit. Labores, cibi, potus, somni, ueneria, moderata omnia sint.

83. At quibus in infantia casus hic appareret: pleriq; corporis directionem ignauiter habent: maleq; cōuoluuntur ad sanū crus, manu id ad terrā suffulcientes. quin & non nulli iam adulti quibus calamitas hæc contigit, ignauiter etiam ipsi deambulationem in rectum curāt, sed infantes hoc malo affecti si recte educuntur & regantur, sano crure in rectum utuntur: subiecto uero alæ eisdem sanæ partis scipione, id circūducunt, quidā etiam utrisq; alis idem officium præstant: læsum autem crus suspensum tenent.

Iis quibus membra ætate confirmata iam sunt: cum accidit hæc calamitas crure quamuis claudicante uti licet, infantibus uero admodū paruis, cū idem euenit: & si etiā ipsi, si bene gubernarent, uti eo secundū naturā possent, desidia quedā surrepit: ac propterea ignauiter erectā ingressiōnē habet, id est negligunt, & præ desidia nō curant. sed quid mirum: cum illi quoq; qui adulti sunt, idem quandoq; faciant, dum recti claudicare non tolerant, sed, ut inquit, ad sanum crus conuoluuntur. quo conuolutionis uerbo deambulationis modus cuiusmodi in his fiat, manifeste declarauit.

Galen.

84. Tantoq; facilius se habent, quāto breuius læsum crus ipsis fuerit.

Facilius se habere inquit, promptius atq; expeditius incedentes: id quod ipsis euenit, cum breuius crus læsum ipsis est. non enim est opus ut conuoluentes in orbem ipsum transferant: quemadmodum cum integre adultis luxatio contigit, illi siquidem cum longius ex luxatione effectum crus sit, circulo ipsum traducere coguntur: utiq; ea ingressione, quam circūuolutum in exteriorē partem fieri superius dixit.

85. Sanum uero crus nihilo minus ualens ipsis est, quā si sana utraq; essent.

Merito hoc inquit. sano enim perinde utuntur, ac si utraq; essent sana. cum igitur eius usus idem sit, qui esset, si utraq; in naturali situ essent constituta: efficitur, ut id & alimento plenum & robustum nihilo minus habeant.

86. Omnibus tamē huiusmodi carnes cruris effeminantur, atq; ut plurimum ab exteriorē parte magis quā ab interiorē. Fabulantur nōnulli Amazonas masculā suā prolem statim ab infantia exarticulare conueniisse, partim ad gēua, partim ad coxas: ut claudi uidelicet efficerēt, neq; insurgere mares contra scēminas possent: eisq; uti ad manualia opera solitas: cuiusmodi tutoria, aut fabrilia sunt, aut quoduis aliud sedentariū. qd quidē sicut an uerū sit, nec ne ignore: ita illud scio: si quis statim ab infantia puerulos exarticulet, tales esse euasuros.

Omnibus, inquit, carnes magis extra articulū quā intus effeminantur, cum in interiorē partem excessit: atq; hoc fit propterea quod exterior pars magis est ociosa. nam in interiorē licet præter naturam, nonnulli tamen ad caput femoris fieri motus consueuerunt.

87. In coxis quidem intus ne aī extra facta sit luxatio, multum interest. in genibus interest etiam nonnihil, sed minus tamen. utriusq; uero claudicantis modus proprius est. nam quod in exteriorē partem luxatum fuerit, magis decuratur. minus uero recti stant, quibus in interiorē luxatio cōtingit. simili modo si ad malleolū luxetur, cum in exteriorē partem excedit, manci quidem fiunt, sed stare possunt: cum in interiorē, ualgi efficiuntur, & stare minus queunt.

Mancum, hoc est *κνῶν*, nōnulli de omni membrorum longorum distortionē intelligendū censent: generaleq; ei attributū significatum. alij eam tantūmodo distortionē significare asserūt, in qua in exteriorē partem membrum inclinatur. quod cum accidit, necesse est ut summū eius, id est pes, intro cōtortus quasi mutilus & mancus appareat.

tom. 6 X 3 id

id quod tamē ad stationis firmitatem nō parū confert. nam illi etiā qui ex naturali cōstitutione uari & ob torti appellant, stabilius stare ac firmius solent: q̄ qui penitus recta crura habent: quē admodum etiā declarat Archilochus his uersibus.

Magnum ducem & diuarcantem haud diligo.

Sed paruus is sit, atq; tortus cruribus.

Aptus stabiliter, corde plenus, ingrediti.

Accurata tamen hæc nominis huius *κωλῶ* significatiōis disquisitiō parū ad præsens propositū facere uidetur: cū ex oratione ipsa Hippocratis res satis pateat. cū enim in exteriorē partē prolabitur articulus, ut inquit, stare homines magis possunt q̄ si intus prorumpat. estq; pes ē directio magis ad totū corpus ijs, quibus coxæ articulus extrorsum: magisq; a directiōe recedit, quibus introrsum est eiectus. scimus præterea eos qui natura ualgiores sunt, & infirmius stare, & neq; currere celeriter posse: sed promptos ad subuersionē, & lapsū leuibus de causis esse. hæc igitur rei differentia in coxam maximā, in genu secundā, tertiā in malleolum habet: quippe cum ex dearticulatiōis magnitudine magnitudo quoq; nocuenti cōsequatur. ex his ergo satis constat melius & stare & ingredi posse, quibus caput femoris in exteriorē partem luxatum est: de quo paulo post dicturus est.

88 Coactio tamē ossium talis sit: quibus ad malleolos tibie os excesserit, ijs pedis ossa minime coaugescunt: quippe cū quam proxime ea ad læsionē sint. ossa uero tibie augentur nō multo minus illa quidem: sed carnes tamen minuuntur. at cum ad malleolum in naturali sede manet articulus, ad genu uero excidit: tibie os nō simili modo solet augeri, sed breuius sit: est enim proximū malo. pedis autem ossa minuuntur quidem, sed nō simili modo, sicut paulo ante dictum est: propterea quod articulus iuxta pedem est saluus, q̄ si eo etiā uti possent ut manco, minus adhuc pedis ossa diminuerentur. quibus uero ad noxam luxatio est: ijs os femoris, cum proximū læsioni sit, non simili modo augetur: sed breuius sano euadit. ossa autem tibie & pedis etiā non eodem modo diminuuntur: id quod ob id euenit: quia & femoris articulus qui ad tibiam est, & tibie qui est ad pedem, in natura sua persistit. carnes tamen totius cruris minuuntur. nam si uti crure possent magis augerentur ossa, sicut dictum est, excepto femore: minusq; carne uacaret, quamuis carne multo magis carerent, q̄ sana, cui rei argumēto illud est, q̄ quicumq; brachio ab ortu luxato ancī euaserūt, uel in auctione prius q̄ adulti plene fuerint: iñ cū brachij os breuius ha-

beant, cubitum & summā manū paulo exiliore sanis ob antedictas has causas habent. quia brachiū articulo luxato proximū est: ut ob id breuius euaserit. cubitus uero propterea nō simili modo calamitati succubuit, quia brachij articulus qui ad cubitū est, in pristino statu naturali situs est. manus uero longius quoq; q̄ cubitus a malo hoc abest: iccirco sit, ut his de causis ossa, & quæ coaugentur, augeantur: & quæ nō augentur, absq; auctiōne remaneant. nam ad carnulentiam totius brachij manus laboratio multū proderit. ad pleraq; enim manus opera exercenda ancī ea manu parati sunt, quæ altera exequi possunt: atq; id nihilo peius, q̄ illæsa. non enim supra manus, sicut supra crura gestari corpus necesse est: sed leuia ipsis opera sunt. quocirca sit, ut ob usum carnes neq; in manu neq; in cubito ancīs imminuantur. quinetiā brachiū ipsum ad carnis plenitudinē ex hoc nōnullā utilitatē cōsequitur. nam cum coxa etiā in interiorē partem extrusa fuerit uel ab ortu, uel adhuc infanti homini, carnes ob id imminuuntur magis quā in brachio: quia uti crure non possunt.

Clara hæc omnino & deinceps subsequens oratio est: cuius hæc doctrinæ capitula sunt: ea quæ articulus ē propria sede prolapsus sunt uiciniora, incremento & alimento magis destitui: quæ absunt longius, minus. in luxationibus uero femoris quæ intus sunt, magis q̄ quæ extra, et augmento & alimento carens crus euadere: propterea q̄ & deterius mouetur, & magis impediuntur. ancos uero, ita autem uocat, ut in luxatione brachij in alam de clauimus, id est *γαλιέγκανος*, eos quibus cum adhuc augeretur eorum corpora, ex huiusmodi luxatione os brachij breuius euasit. illos igitur ancos minorem læsionem in toto brachio sentire, quā in toto crure hi quibus extrusus coxæ articulus fuerit: ea uidelicet causa, quia cum illi in plerisque uitæ operibus laborare satis possint: hi simili modo uti crure nequeant.

89 Atq; hæc quidem in hunc modū se habere ex illis sumere testimonium quoddam licebit, quæ paulo posterius dicentur.

Testimonium dicturum se esse pollicetur, hæc in hunc modum se habere: hoc est licet præter naturam aliqua sese habeant: ea quæ minus mouentur, magis & incremento & alimento destitui solere. promittit sanē ipse Hippocrates se id in ijs quæ paulo inferius dicuntur, demonstraturum. quo circa ego quoq; cum ad ea uerba, ubi hoc extitit, deueniam: hoc significabo.

90 At enim quibus in exteriorē partem caput femoris excidit: ijs crus affectū si alte

ri obtendatur, breuius apparet: merito qui-
dem. non enim super osse, sicut cū intro ex-
cidebat, caput femoris insidet: sed præter os
inclinatum in carne humida & cedente fir-
matur: unde breuius apparet. ab interiori
uero parte ad gressuram quæ *πλὴξ* uoca-
tur, mancius femur & macilentius: extrinse-
cus incuruatio clunis conspicitur: utpote
cum in exteriorē partem femoris caput pro-
lapsum sit, quin & superius clunis apparet:
eo q̄ hac parte caro capiti femoris cōcelsit.
extrema autem pars femoris ad genu, & ti-
bia, & pes introrsum tendere cōspiciuntur.

De secunda coxæ luxationum differentia nunc
sermo ipsi instituitur: signaq̄ quæ apparent, com-
memorat, & causas subiungit, sicut in alijs omni-
bus fecit, ab experimentaria doctrina nihil rece-
dens. sed tota quoq̄ hæc oratio perspicua est.

91 Sed neq̄ conflectere quemadmodum
sanum crus possunt. atq̄ extra quidem pro-
lapsi femoris notæ hæc sunt.

Atq̄ hoc fit, quia musculi à posteriori parte fle-
xioni resistunt, cum in talifiguratione extensio-
nem tolerare diutius nequeant.

92 Quibus uero iam integre adultis elap-
sus articulus non redijt: ijs totum crus bre-
uius apparet, in ambulatione autē calce con-
tingere terrā non possunt, sed pedis pecto-
re in terra insistant: paululumq̄ in interio-
rem partē summis digitis uergunt, magisq̄
multo his gestare corpus læsum crus pos-
test, q̄ quibus in interiorē partē luxatio cō-
tigit: partim quia caput femoris et ceruix ar-
ticuli cū in latus tendat, maiori parti coxæ
substat: partim quia summus pes nō extror-
sum cogitur, p̄minere: sed p̄pe ad directio-
nem totius corporis, & interioris etiā tendit.

Pectus pedis uocat, quod à dissectionis profes-
soribus solum pedis nuncupatur, seu planta: quæ
ad initium digitorum sita est. quibus enim natura
in formā figuratus est pes: ij mediam partē ca-
uam habent, quæ à posteriore parte ima calcis ex-
tremitate: à priore initio soli terminatur: ut ijs &
calce, & solo, & ultimo digitorū carnosio apice in
terra firmatis, reliqua quæ inter hæc sinuantur, præ-
ter exteriorē partē, quæ tota terram contingit, sus-
pensa habeantur. prauæ tamen nonnulli pedes
formati sunt: quemadmodum qui planci seu pla-
nipedes nominantur: qui mediam partē non caua,
sed eminentem ac planā ab interiori parte habent.
quorum formatio ualgis cum sit persimilis, in hæc
oratione ab Hippocrate prætermittit. est. conside-
ra igitur quæ deinceps dicuntur, in formatis secun-
dum naturam singula perpendens. hi siquidē cum
moderate progrediuntur, totū calcem, & solum,

& carnosos digitorum uertices in terra firmant. at
si maxima digressione conctur incedere: inter ini-
tia quidem calce: deinde quando iam in priorem
partē alterū crus traducunt: tunc solo quoq̄ terrā
cōtingunt: postremo quando simili modo altero
pede in longissimū intervallū progredi uolunt, in
terra firmare calcem incipiunt: tum firmati prius
pedis calce sublato, summis digitis terræ obnitun-
tur: atq̄ hæc eorum qui naturaliter cōstituti sunt,
ambulatio est. eorū uero qui ex affectione aliqua
aut longius aut breuius habent crus: duplex utro-
rumq̄ causa est. aut enim humiditas multa neruo-
sarum partium, aut luxationis genus: de quo nunc
propositū est. modus uero ingressionis priorum
eiusmodi est, qualis paulo ante dictus est: secūdo-
rum, qualis nunc cōmemoratur. nam cum, ut su-
perius dixit, caput femoris carnosā sedes excipiat,
non os, quemadmodum in altera luxatione: fit, ut
ibi cedēte carne, & unoquoq̄ musculo ad p̄priū
caput sursum retracto, simul totum femur contra-
harur. atq̄ idcirco minus crus totum altero appa-
ret. neq̄ simili modo terram cōtingere, sicut cum
in naturali statu erat crus, possunt. quando igitur
ingredi coguntur, qui ita affecti sunt: contrarium
in modum pedem figurant, quā illi qui antea di-
cti sunt, quibus longius crus læsum quā sanum
esse uidebatur. illi enim ad tali dearticulationē pe-
de resimato sursum digitos attollebant. hi contra
inclinant, & deflectunt in terram pedem: ac sum-
mis digitis eam attingere conantur. propterea fit,
ut circa coxam affectam sese demittant: quo non
solum summos digitos in terra firmant, uerū etiā
multo amplius ex pede quā digitos: hoc est eam
quoq̄ partem, quā à dissectionis peritis solum
& plantā appellari dixi, pectus Hippocrates num
cupauit. quod si calce etiā in terra uelint deside-
re: adeo demittere ac deprimere coxam affectam
coguntur, ut cum in alteram partem toti propen-
deant, periclitentur ne cadant. hæc de causa ne ten-
tant quidem in ingressione uti calce.

93 Cum tamen in carne in quam prolapsus
est articulus moram inuenit, & caro len-
torem contraxit, dolore uacans temporis
processu euadit. cū uero dolore uacat, absq̄
baculo si alioqui uoluerint, possunt ambu-
lare, possuntq̄ corpus læso crure sustentare,
atq̄ ob usum his fit, ut minus carnes ef-
fœminentur, quā illis de quibus paulo an-
te dictum est. effœminantur uero uel magis
uel minus, magisq̄ ab interiori parte, q̄ ab
exteriore plerumq̄ effœminantur. ac nonnulli
quidē horū calcē sibi inducere ob ri-
giditatē cruris non possunt. nonnulli etiā
id possunt. q̄bus uero cū in utero sunt, luxa-
tus hic articulus, aut cū adhuc adoleſcūt, ui-
ciectus non redierit, aut etiā ex morbo ex-
cesserit, extrususq̄ fuerit (multa em̄ huius-

modi cōtingunt) horū inquā nonnullis, si insuper fideratū femur fuerit: suppuratiōes diuturnæ, & quæ linamenta desiderant, ex ulcerationes eueniunt: osiumq; nonnullis denudationes. simili modo uero tā quibus fideratur, q̃ quibus non fideratur, os femoris multo breuius altero euadit: et augeri si mul cū sano non solet, ossa itē tibie læsi cruris breuiora quidē etiā ipsa q̃ sani efficiuntur: sed paulo tamē, ob easdē causas quæ superius etiā cōmemorata sunt, possuntq; hi ambulare: alij eodē modo, ut iam integre adulti, q̃bus elapsus articulus repositus nō fuerit: quidā sic, ut toto etiā pede insistant.

Per translationem moram dixit à locis diuturna immoratione attritis, atq; affluēfactis. eiusmodi autē oratio eius hæc est. cum caput femoris ē propria sede elapsum in exteriorē partem in carne firmatum fuerit: inter initia qui id patiuntur ex compressione dolore afficiuntur: postea uero temporis processu caro ibi, non secus ac fossorū manus, occallescit. quod cum fit, locus de articulationi similis euadit: cum mora illa, quemadmodū antea acerbulo coxæ caput femoris utatur. nam præter alia etiam humor quidam ibi coalescit, à principio ex inflammatione amplior quidē collectus: postea parte eius tenuiore & aquosa medicamentis extrinsecus impositis dissoluta, lentus ac mucosus relictus: id quod ad motionē capiti femoris commodissimū est. ob hanc enim humiditatem mora illa tanq; articulo utuntur: magisq; in exteriorē q̃ in interiorē partē inclinantur. oppositas uero partes ijs quæ articulum elapsū excepere macilentiores & molliores fieri propterea dictū quoq; superius est: quia ab operatione magis uacāt. nam illinc ubi firmatus articulus est: licet præter naturam, nonnulla tamē motiones existunt magis q̃ unde discifit primæ quædā, & ex accidenti nonnullæ leues quæ ex primis illis cōsequunt: quamuis partes illæ effoeminentur. atq; hoc testimoniū illud est, quod in sequentibus dicturū se esse pollicitus est. De ijs partibus quæ magis uel minus alimento destituuntur, & attenuantur.

94 Sed diuergant tamen in ambulationibus à breuitate cruris coacti. hæc autem huiusmodi eueniunt, si diligenter in figuratibus et recte in quibus oportet, fuerint instructi: & priusq; ad ambulationem confirmantur, & postq; confirmati fuerint, nihilominus diligenter & recte. plurimam diligentiam requirūt, quibus à prima infantia malum hoc cōtigerit, nam si in infantia neglecti fuerint, ijs inutile prorsus, carēsque augimento totum crus euadit: carnesq; totius cruris magis q̃ sani diminiuntur. multo ta-

men minus, quàm quibus intro exciderit articulus, ob usum & laborem, ut statim uti crure ualeant: quemadmodum paulo ante de ancis dictū est. Sunt uero nonnulli quibus partim ab ortu statim, partim ex morbo utrorumq; crurum articuli in exteriorē partem excefferunt. ijs ossa quidem ipsidem noxis afficiuntur: at carnes minime effoemnantur: satisq; carnosa etiā, nisi quid ab interiori parte paululum deficiat, crura ipsa euadunt. ob id autē sunt satis carnosa, quia utrisq; cruribus simili modo utuntur.

B Quidnam significet diuergant, id est *διαπερνουν*, hoc est in utraq; partem propendunt, & inclinantur: licet superius etiā dictum sit, nunc tamen etiam dicitur. cum femur in exteriorē partem luxatur, attrahitur à musculis qui hac parte sunt, ut paulo ante diximus: atq; una cū eo totū crus cōtractū breuius efficitur: ut uiuix attingere terrā queat. hac de causa solo pedis pectore, dum ingredimur, uti coguntur: ac toto corpore ad affectū crus dum eo insiliunt, inclinantur. necesse igitur ipsis est, ut cum sano operari uoluerint, in ulteriores partem id traducendo, in id rursus femore erecto uergant. atq; ita in ambulatione in duas hasfigurationes alternatim subinde immutentur: dum eo tempore quo naturaliter affecto crure firmatur, corpus attollunt, atq; erigūt: quo uero in læsum crus incumbunt, in eam partem demittunt, atq; insiliunt. transmutare igitur corpus modo ab erecto et arduo statu in humile & flexū: modo ab humili & flexo in erectū & celsū, diuergere appellauit: uno hoc uerbo hæc figuratiō uicissitudinē significat.

95 Simili enim modo in ambulatione hac & illac iactatur: maximeq; cluneminuli ob articulorum excessum uidentur.

C Quibus utriq; articuli luxati sunt, cum utraq; crura in exteriorē partem prominent, mutatio figuratiōum totius corporis in ambulando similis in utroq; crure fit: sicut in altero tantum exarticulato fiebat, cum eo in terra impresso, deprimebantur ad ile & excauabantur. nam cum affecto crure firmabantur, hoc modo figurari consueverant: cum altero sano insisteret, arduū attollebant corpus, directūq; ile efficiebant. nunc uero utrisq; cruribus tam dextro quàm sinistro simili modo inclinantur. ac nihilo minus hac quàm illac diuergant in pedū firmantiū uicissitudine, id quod iactari in ambulatione dixit. diuergere em̄ & iactari, id est *διαπερναι* & *σαλιδειν* idē fere hic significat. cōmunis tamen est iactari q̃ diuergere. hic enim euenit ut similiter utrisq; corporis partibus figurerent: dum per uices alterutrum crus in terra sistit: prius uero non ita erat, sicut demonstratum est.

D 96 Quod si non fiderata ossa ipsis fuerint, nec gibber supra coxā contigerit (nonnullos enim talia quædam etiam occupant) si

igitur huiusmodi aliquid non euenerit, satis salubres in reliquis degunt.

Ex crurum luxatione per contagionem gibberosos nonnullos fieri perspicuū est: inflammatione primum in uertebraꝝ copulis exorta, deinde duratione quadam ibidem relicta. quippe cum fieri hoc etiam in locis extrinsecus conspiciatur, in poplite uidelicet, & in cubiti dearticulatione: quin etiam in digitis nō raro, quod ἀγκύλη, id est amutum uocant. fit enim in huiusmodi dearticulationibus amentalis hæc extuberatio non nisi ex duratione quā *ελίξιν* dicunt; cum extēdentibus membrū musculis tendo non obsequitur. quemadmodum si extendentes obdurati inflectentibus non cedant: circa huiusmodi dearticulationem forma rigida existit, quam *ἰσχυρότης*, id est erectimancā appellat. potest igitur fieri, ut uel ex huiusmodi aliqua duratione spina distorqueatur, uel ex contagione tuberculo aliquo immaturo & maligno exorto, & adstrictionē inducēt. Quomodo uero ex talibus affectionibus spina distortio cōsequatur, superius in propria eius tractatione explicatū est.

97 Magis tamē hi inepti euadunt, ut toto reliquo corpore excepto capite augeantur.

Si in exteriorem partem coxæ articulus excidit, melius qui id patiuntur, quā quibus intus luxatio contigit, ingreditur; modo ex inflammatione & cōtagione pericula opportunarum partium euaserint. sed his tamen magis q̄ illi obnoxij sunt. secessio enim articuli in anteriorem partem super oleū saltem inflexionem habet; quod neq; cōprimi ob duritiem, neq; inflammari potest. at cum locus exterior femoris maximis musculis sit occupatus, fit, ut ij, si luxatio eam in partem contingat, uehementi dolore afficiantur. contunduntur siquidem musculi cum supra eos articulus prolabitur. collidunt, & tumore præternaturali illuc prorūpente, id est capite femoris distēduntur; ex sensuq; horū omniū dolorē cōtrahunt. atq; ita cum ex cōtusione & collisione inflammationis in musculis exoritur, qui articulum prolapsū excipiunt: cum cætera uicina membra, tum partes circa spinā contagione afficiuntur. que ubi semel egrotarint, ijs qui in auctione adhuc sunt, tum hæc inepta magis ut augeantur, & minora, quā cetera omnia deteriora euadunt. meminisse enim te oportet, id quod & sæpe a me dictum est, & paulo superius dictis attestatur: sicut ijs qui in auctione patiuntur, membra minus augeri: ita iam adultis hominibus macilentiora fieri, & molliora. cum autem spina augmēto destituitur: consentaneum est, ut totum corpus ijs, qui hoc modo luxati sunt, exilius efficiat. nam infra crura ex contagione minuiunt. supra crura usq; ad caput spina occupat. quocirca si & spina breuior, & totum crus redditur: merito de huiusmodi hominibus dici potest, magis ineptos fieri ut toto reliquo corpore excepto capite augeantur.

98 At uero quibus posteriorem in partem caput femoris excidit (paucis autē excidit)

ij neq; ad articulum qui excidit, neq; admodum ad poplitem extendere crus possunt. atq; id minus, quā quibus ex uetusto idē contingit. hi enim magis & ad inguen & ad poplitem articulum extendunt.

Paucis in hunc modum caput femoris luxatur ob eam quam superius diximus causam: quia uide licet acetabuli profunditas inæqualis est. propterea enim fit, ut ubi parum inexcavatū os est, frequenter excidat articulus. atq; iccirco in interiorē partem magis id contingit. ubi uero altius descendit, rarius. unde paucis in posteriorem partem luxatio hæc fit. euenit autem in hoc luxationis modo, ut ad inguen nullo pacto: ad genu non perfecte crus extendatur. cuius utriusq; causa musculorum positura est, quorum totam naturam exacte & in Musculorum dissectione, & in secundo Dissectionum tractationū licet descriptam habeatis: pauca quædam tamen hic quoq; afferam, ut in memoriam uobis ea reuocem: quæ dum simiam dissecarem, sæpe inspexisti. id enim animal in plerisq; hominū corporis structura correspondet. Memoria igitur repetite primū musculum ex lumbis ad processum eum femoris pertingere, quem paruū trochanterem quasi rotatorem dixeris, uocant: secundum ex ossibus huic continentem qui ad eundem processum connectitur. Hi musculi quando caput femoris retro excidit, cum illuc circumuoluantur, & circumtorqueantur circa acetabulum, uehementer intendunt. siq; is qui hoc patitur, extendere articulum hūc uellet, opus esset, ut totum femur ei retro cōuolueretur: atq; ita prædicti duo musculi tracti atq; intenti maiorem in modum affligerentur. nam cum sint maiores effecti q̄ prius essent, maiorem distentionem tolerare absq; dolore non possunt. quin neq; omnino id posset: propterea quod caput femoris quod ex acetabulo excidit, a posteriore parte ossis quod ipsum cōtinet, collocatū est. quod si penitus inflexo inguine extremum femoris quod ad genu est, esset multū attollendum: necesse esset, ut caput femoris ad interiorē partē constitueretur. quod sanē fieri nequit, nisi musculi qui ipsum excepit, diuulsus fuerint: in quē id naturalis sua dearticulatione prorupit. adde q̄ neq; alterum id quod priusquam extenderetur articulus in dearticulatione inguinis fiebat, existere amplius ualet. nam neq; extēdi, neq; inflecti integre amplius potest. Caterum cur Hippocrates alterius tantummodo, id est extensionis mentionem fecit: ob id sanē quia statim post luxationem inflexum femur apparet, quippe cum extremitas eius iuxta genu tantum in priorem partē processerit: quantum caput in posteriorem abiit, quantumq; ad inguen crus inflexum conspiciatur. ad poplitem præterea musculi omnes posteriores, cū in posteriorem partē hoc modo secedit femur, in originibus suis desuper intendunt: quibus partibus intentis totū quoq; reliquū eorum corpus extendatur: necesse est, usq; ad tendones qui ad tibiam pertingunt. tendendum uero extensio tibiam inflectit. quapropter

pter qui ita luxati sunt nō iniuriā utraq; dearticulationes inflexas habere conspiciuntur. quas cum extendere conantur, in ea maxime quæ ad inguen est laborant, impotentesq; sunt. Vnde Hippocrates hos tantū dixit dearticulationes has extendere non posse, sed in coxæ articulo absolute dixit in genu adiunxit admodum; quod ualde et multum significat. quasi ibi extendi quiddē crus possit, non tamen multum, & perfecte. quod enim perfecte fit, nihil ab eo quod naturale est, deficere consuevit. hoc autē euenit eandem ob causam, ob quam fit, ut post dearticulationē, poplitis articulum confestim inflectatur. Sciendum etenim tibi illud est, quod in omnibus distortionibus est cōmune, cū intenduntur partes aliquæ ex proximarum confectione inclinationes in eas fieri. nihil enim est ex ijs quæ dimouentur, quod ita propria quadam affectione sedem suam destituit. sed cum à continente trahatur, continens etiam ipsum & proximum trahit. atq; ita una quidem communi ratione intenditur: cum tamen una causa id non patitur. nam & humefacto supra quā par sit, & excitato, & inflammato item, & durato, & e sede sua exturbato commune est, ut affectio contingat. iccirco de omnibus huiusmodi diffusius Hippocrates deinceps docuit: & nos quoq; sermones eius sequuti omnia explanauimus.

99 Aduertendum tamen illud quoq; est. q̄ sicut utile est, & magnificandum, ita latet plerōsq; neq; eos qui sani sunt, posse poplitis articulum extendere, nisi etiam articulum inguinis simul extendant: nisi uelint ualde sursum pedē sustollere. ita em̄ possunt, hi igitur neq; cōflectere poplitis articulum simili modo, sed multo difficilius queunt: nisi inguinis quoq; articulum cōflexerint.

Quam dixi esse membrorum & partium communicationē, cum aliquo motu priuantur, & non propriam quandam affectionem: in naturaliter cōstitutis musculis nunc declarat. nullus enim ex ipsis licet multi sint, ex femore dependet: sed alij ex osse ilium descendunt; alij ex coxa exoriuntur. unus solus ex osse pubis deuenit. ut necesse ob id sit, ut dearticulationes mutua agitatione moueantur. sicut modo in pedis & poplitis articulo demonstratum est: in quibus simul ad inguen etiā inesse communicationem quandam apparebat. sicut enim ostendimus eos qui posteriorem ipsorū partem mouent, ab inferioribus femoris extremitatibus ad condylorum & tuberculorum radices exoriri: ita nunc alios intellige anteriore parte supra pedem in tibiā à prædictis initijs pertingere. cum igitur poples extenditur, posteriores: cum inflectitur, anteriores extendi necesse est. cum alteri ex his amplius quā naturale ipsis sit, intenduntur: oppositi retrahunt, & non sequuntur. oppositos autem uoco extendentes inflectentibus: hoc est posterioribus anteriores. Satis erit puto, si perspicuitatis causa duorum musculorū exemplo

rem hanc explicauero. Nam qui omnes crurū musculos in dissectionibus contemplati sunt, ex his duobus de alijs quoq; eadem poterunt considerare. qui non uiderunt, ijs ne de duobus his quidem satis clara oratio erit. Hi igitur musculi ex iliorum osse exorti deferuntur, ac primum femoris dearticulationem ad inguen, deinde totum femur, tum alteram dearticulationem ad genu transgressi, alter qui angustior est ad unū femoris tuberculum delatus paulo inferius, ac postea rursus reflexus in priorem tibiæ partem quam *ἀντιπυλιν* uocāt, ibi in interiore eius sede innectitur: alter magnus ualidissimus producit tendonem, qui cum altero tendone cōmiscetur à maximo musculo ex anterioribus exortum habente, qui à clune descendit: primū hic patellæ inhærescit, postea in tibiā innectitur. quando igitur ad inguen crus inflectitur minor hic musculorum longitudo: quando extenditur, maior efficitur. genu uero & poplitis dearticulatione inflexa qui patellæ inhæret, breuior: qui ab interiore parte fertur, longior euadit. quare anterior summa extēsiōe distenditur, si ad inguen extento crure, popliteum conemur inflectere. si contra extento poplite inguen inflectamus, posterior idem patietur. descendens enim ex alto loco per priorem partem femoris inflectitur: atq; inde oblique conuersus ad tibiā anteriorem partem quæ uocaf, reflectitur. merito igitur hic cum longior efficitur, primas partes & femoris & tibiæ longiores reddit. Extremam uero musculorū contractionem, extremamq; extensionem dolorem afferre, in libris De musculorum motu demonstratum est. ac cōtractionem quidem ipsi operantur: extensionem ab oppositis tracti patiuntur. cum itaq; musculis ad contractionem operantibus oppositi dolore non affecti coextenduntur: naturaliter quiddē modo in cōmunicationibus iam dictis dearticulationum: præter naturā uero, in ijs quæ deinceps dicentur, tunc fit, ut multi medici decipiantur, putentq; musculos eos esse affectos quorū im pediri operationem uident. Sed hoc ex sequentibus etiam manifestius patebit.

100 Multa item alia in corpore fratriationes huiusmodi habent, & circa neruorum cōtractiones, & circa musculorum figuras, & cogniti digniora quā quispiam opinetur: in natura etiam intestinorum, & uniuer si uentris, & uteri erroribus, & contractionibus. Sed de his alibi tractatio cū his quæ dicuntur consentiens, habebitur. Nunc uero de quo est sermo, neque extendere crus possunt, sicut iam dictum est: breuiusq; id duabus de causis apparet: partim quod nō extenditur: partim quod ad carnes natium prolapsus articulus est.

Dicūm à me etiam superius est cōmunitates & cognationes partium *ἀδελφείας*, id est fratriationes solere Hippocrate nominare, quasi fraternitates

rates, & congermanescencias dixeris. sententia autem eius hæc est: cum altera pars affecta est, in altera uel operationis, uel positura, uel figura, uel magnitudinis læsionem existere: cõmunemq; in omnibus causam esse intentionem, quæ in oppositum locum sit, utputa ex positura, ut ab euidentissimis exordiar: multos uidit, ex ijs qui in arte sese ingerūt, licet legitime eam non didicerint, cum repente contrahitur aliquod membrum, ita ut & magnitudine breuius appareat, & pristinū situm nõ exquirit se feruet, ad remedia statim ei adhibenda confugere: cum tamen id nulla affectione eiusmodi prædicitum sit, quæ curatione aliquam requiratur. nam si alterius buccæ musculi resoluantur, fit, ut altera opposita breuior & quasi conuulsa appareat: eadem uero quæ affecta est, sanam cõsequens extendatur. propterea enim quod musculi omnes uenam habent propriam operationem, ut ad sua capita singuli attrahantur: cum qui in sinistra bucca sunt, suam operationem amiserunt: alteri qui sunt in dextra ualentes & naturaliter affecti operando totam in se buccam dextrâ & labra attrahunt: atq; ita efficitur, ut sinistrum labrum extentum & longius seipso: dextrum breuius & contractius appareat: atq; hic quidem quod sanum est, atq; illesum, cum alteram partem buccæ resolutam ad se attrahat, breuius euadit. alias uero quod affectione caret ab affecto trahi ac conuelli consuevit. quemadmodum cum aut tendo ut musculus duratus extendi una cū oppositis non ualet. cuiusmodi multa & in manus digitis & in cubito & poplite contingere cõspiciuntur: dum uel amentantur & incuruantur musculis aut tendonibus ab interiore parte affectis: uel ex læsionibus huiusmodi extrinsecus rigidi & erectimanci euadunt. ita enim medicis appellare mos est, id est *ὀρθονία*, quod extensum aliquid ita sit, ut constricti nequeat. idem ex magnis & duris cicatricibus euenire consuevit. nam cū ab interiore parte cõrescunt, amentant, & contrahunt membrū: cum ab exteriori, uitium quod erectimanci cū ut dixi uocatur, inducunt exsiccitate itē, & ex multa humorū influxione, aut uentoso & flatuoso spiritu idem contingit. nam dum in se coguntur quæ ita affecta sunt membra, cõsentaneum est, ut oppositi musculi imbecilles reddantur ad operandum: cum qui contracti sunt, membra ad se retrahant. sic etiā cõuulsiones fiunt, cum musculi ipsi à sese primo ac præcipue ad propriam originē pertrahantur, deinde per ipsos membra quoq; in quæ pertingūt, simili modo & uteris modo sursum abit: modo in latus promouetur: nec ipse qui dem propria sua operatione, sed ab altero tractus è sede propria recedit. nam quæ trahūt multa sunt. nexus enim, nerui, arteriæ, uenæ quæ in ipsum pertinent, omnia hæc efficere id idonea sunt: cum in tumorē exurgentia tantum demunt de longitudine, quantum in latitudinem creuerit. cõmune siquidem hoc corporibus omnibus est, quæ distentiones & contractiones admittunt, non uiuentibus tantummodo, uerū etiam uita carentibus atq; inanimatis: cuiusmodi utres, & sacculi, & cirri sūt.

uterus igitur hac de causa & attrahitur & detrahitur: & nonnulla q; ex intestinis. & musculi multum, & per musculos mēbra, & maxillæ. huic rei cõsentaneum quoddam etiam ubi de affectibus spinæ agebatur, in gibberositate, & repanditate, & obstipitate superius demonstratum est.

101. Natura enim ossis coxæ ea parte est, quæ & caput & ceruix femoris inest. quando uero luxatum fuerit, pronom in exteriori rem partem natium defertur. constrictere tamen hi, si dolor non prohibeat, possunt.

Natura & forma ossis coxæ tenuis est, ubi est acetabulum. constat enim secessum capitis femoris in posteriorem partem non nisi in posteriore acetabuli sede firmari: ita ut inter cauitatem & caput femoris os id intercedat, quod à posteriore parte acetabulum circūdat: quæ profecto non nisi pars coxæ ipsius est. de quo nunc loquens pronū in exteriori rem partē natium deferri inquit. perspicuum siquidem is est qui dissecari hæc loca aliquando uiderunt, caput femoris cum tota ceruice in musculum magnum natium incubuisse, qui extensionem de articulationis huius efficit: à quo quidem musculo tendo quidam membraneus exoritur, cum eo unitus, quæ paulo ante diximus ex duobus anterioribus femoris musculis originem habere, patellâq; transgressum in caput tibiæ innecti. hic igitur musculus qui caput femoris prolapsus excipit: maxime omnium dolore afficitur, cum ab eo cõprimatur, & distendatur: quare necesse est ut etiam inflametur: eumq; quæ modo dixi membraneū tendonē ad se trahat. quod cum euenit, ut doleat ager cum poplite inflectit, cõsentaneū est. quoad enim poples inflectitur, distendatur à patella tendo, & cõtundatur necesse est. distensus uero hic sursum ad musculū illū magnū unde exoritur, in quæ caput femoris incubuit, intentionē remittit. processu tamē temporis fit, ut ubi finita inflammatio musculi huius fuerit, parsq; eius quæ articulum attingit humorē aliquem lentum collegerit, callumq; cõtraxerit: inflexio poplitis absq; dolore efficiatur. ad hoc quoq; conducunt & cætera quæ antea de cruris musculis dicta sunt.

102. Et tibia & pes modeste recta apparēt: & neq; hac neq; illac multum inclinata.

Modeste quod *ἐμῶν* dixit, neq; perfecte, neq; uehementer, neq; prorsus hic significare, sed mediocriter, ex ipsa eius oratione perspicuū est. quippe cum ipse Hippocrates subiungens, neq; hac, neq; illac multum inclinata, uelut significare non multum distortionis cruri adesse, sed parum id inuersum esse, ac distortum. propterea enim inquit & tibia et pes modeste recta apparent: perinde ac si mediocriter ac paululū recta apparere dixisset.

103. Ad inguen uero calsior esse caro uisdetur, præterea etiam si attrectetur: quippe cum in alteram partem articulus fuerit prolapsus, ad nates autem femoris caput

attrectatum extuberare magis etiam cōspicitur. atq; hæc quidem notæ sunt, cum in posteriore partem femur excidit. porro cuius cūq; adulto iam prolapsus hoc modo femur non rediit, ubi tempus aliquod intercessit, & dolor iam fuit sedatus, articulusq; in carne uersari assuevit: ambulare is quidē potest: uehementer tamē conlecti ad inguina ambulando duabus de causis cogit: quia uidelicet multo breuius ob antedicta crus efficitur: multumq; abest, ut terram calce attingat: sicq; tentaret uel paululum nullo alio obfirmatus pede eo sustineri, retro decideret. multum enim in posteriorem partē coxæ ultra pedis ingressum propenderent: tū spina in coxas incumberet. uix igitur pedis pectore insitit. sed neque id facit, nisi scipsum ad inguina inflexerit, & alterius cruris poplite incuruarit. ita enim fit, ut manu obiecta superiori parti femoris læsi cruris in singulis gressionibus firmetur: id quod ut ad inguina inflectatur, aliquantulum cogit. in crurum enim uicissitudine in ambulatione sustineri læso crure corpus non potest. nisi manu admota crus affectum terræ obfirmarit. quippe cum articulus corpori non substat, sed ad coxam in partem posteriorem extet, hi tamē absq; baculo ambulare, si assuescant, possunt: propterea quod incessus pedis pristinam directionem obseruat, non in exteriorē partem inclinatur. unde nullo indigent baculi renixu quo obfirmetur. quanquā si loco apprehensionis femoris, scipione sub ala quæ supra crus affectum est, subiecto uti uelint, qui longiorem scipionē adhibent, rectiores quidem ingrediuntur: pede tamen in terra nequeunt firmari. quod si firmari uelint, breuior ijs baculus faciendus est: ad inguināq; inflectant, necesse est. At enim carniū imminutiones his quoq; pro ratione, sicut superius etiā dictum est, efficiuntur. qui enim suspensum habet crus, nihilq; laborant: ijs uel maxime imminuitur. qui uero ingressione plurimum utuntur: minimū quidē ijs carnis imminutio fit, sed sanum tamē crus utilitatem non modo non consequitur, si læso crure in terrā insistendo utantur: uerum etiam deformius euadit: cum illi inseruiendo & promittere coxam, & poplitē inflectere cogantur. at si

A affecto crure in terra quispiam non utatur, sed suspensum id habeat, scipioneq; obnita tur: ita fiet, ut sanum robustum euadat, cum & naturali in statu incedat, et exercitatione insuper corroboretur. Cæterum hæc extra medicinam esse diceret fortasse quispiam. nam quid de ijs quæ incurabilia iam euaserunt, scire amplius nobis opus est. nam & hæc intelligere eiusdem sententiæ est. non enim fieri potest, ut à se mutuo abalienent. Dare siquidem operam debemus, ut quæ curabilia sunt, incurabilia non euadant: intelligendo quo pacto ne ad incurabile deueniant, prohibenda sint. incurabilia uero intelligenda etiā sunt, ut ne maxime offendant. prædictiones autē splendide, & gloriosæ ex eo existunt, q; dignoscimus, quò, & qualiter, & quando desinere aliquid debeat, siue in curabilem, siue in incurabilem affectionem conuertatur. Iam uero quibus ab ortu, uel alioqui in auctione adhuc constitutis, ita retro elapsus articulus est, & nō est reuersus, siue per uim, siue per morbum exceßerit (multæ enim huiusmodi luxationes in morbis contingunt: quinam autem morbi sint in quibus articuli prolabantur, posterius scribetur) si igitur luxatus nō residerit, femoris primum os breue efficitur: tum nocumentū patitur totū crus: ac multo magis & augmento & carne, propterea quod nihil eo utuntur, destitui consuevit.

Dictum à me etiam superius est, solere Hippocratem modo hoc loquendi uti *πρωτὶ νόσῳ*, id est præterea etiam, cum augere rem uoluerit. talis enim oratio eius est. ad inguē cassior esse caro inspicientibus uidetur, præterea etiam, id est præcipue etiam & multo magis, si locum quispiam attrectet. cætera omnia, si quis memoria teneat ea quæ iam dicta sunt, patent.

104. Nocumentum enim his etiam poplitis articulus patitur: nerui ob ea quæ dicta antea sunt, intenduntur. unde quibus hoc modo coxa exciderit, ij extendere poplitis articulum nequeunt. ut enim summam dicam, cuncta quæ in corpore ad usum facta sunt, si quis ea moderate utēdo exerceat his laboribus quibus singula sunt assueta, salubria euadunt, beneq; augentur, & bene senium ferunt. si contrā non utatur eis quispiam, sed quiescat, morboſa & incremento carētia efficiuntur, celeriterq; cōsenescunt.

inter quæ articuli non minime idē patiunt, & nerui, nisi eis quispiam utatur. ob has igitur causas nocumētū maius accipiūt in hoc luxationis modo q̄ in alijs. quippe cū totū crus quantū & ad ossa, & ad carnes attinet, incrementō destituatur. hi igitur quādo in uiros iam euaserūt, suspēsum, & cōflexū crus detinentes altero sustinentur, ac gestantur, baculo aut uno, aut duobus innixi.

Coxam excidere pro articulum coxæ dixit. sapie enim iam diximus ueteres omnes nondū hāc, quæ postea diligēter est exercitata, exquisitam ac minutam in nominibus obseruandis curiositatem nouisse: sed satis habuisse, si in exponendis rebus solū id spectarent, ut audientes intelligerēt. quod igitur inquit, huiusmodi est. quibuscumq; in posteriore partem femur excidit, q̄s non solum articulus qui luxatus est, no cumento afficit: uerum etiā insuper poplitis articulus patitur. propterea enim addit etiam coniunctionem, & non absolute dixit: no cumentum enim his poplitis articulus patitur. quo autem no cumento afficiatur, ipse manifeste declarat, cum ait, nerui intenduntur. an autem neruos appellet eos qui proprie ita nominantur, qui à dorsi medulla exoriuntur: an musculorū pro-nervationes quæ in tibiā pertingunt, nihil ad præ-sens propositū refert. quippe cum utraq; testimo-nia nobis esse possint, si antedicta in superiore o-ratione recte explanemus: ubi dicebat quibus ita excidisset coxa, eos articulum ad poplitem exten-dere non posse: cōmunemq; quandam rationem adiungebat, multas inquiring læsiones mēbris qui-busdam contingere quantum ad formas, & magnitudines, & situs, & motus spectat: cū tamē membra illa nullo proprio mōdo afficerentur: sed alia quædam quæ cum illis cōmunicationē haberent, essent ea quæ paterentur: & præcipue intēiones esse harum contagionū causam afferēbat. de quibus ego superius differens tribus modis esse posse huiusmodi causas do cui. uno, cū resolutus muscu-lus aliquis fuisset: nā in eo casu alius qui sanus est, contractus cōuulsusq; apparet: altero modo cum aduersarius extensus fuerit: alio actertio cū quod sanum est, à continente & proximo attrahitur. si-cut in uteri secessionibus contingit. nunc igitur cum posterioribus neruis, & muscularis, & tendoni-bus intentis poples inflexus sit: extēdentibus mu-sculis non obtemperat. superius De tendonum & musculorū intēione dixit: nūc De neruis ait, qui à dorsi medulla exorti ad crura deferuntur, quo-rum quidē tres origines sunt: una in prioribus par-tibus ad magnū foramen ossis pubis: secūda ad in-guen, quæ & unā cum magna uena, & extra ipsam in anterioribus femoris partibus neruus defertur. sed hæc parua sunt. illud maximū neruorū initium est, quod in totum crus pertinet à posteriore par-te, primumq; ab eo loco egreditur, quod inter la-tum os est, & id quod *κακρυγας*, hoc est cuculū uo-cant. hoc igitur initium prolapsio in posteriorem

Galen.

A partem articulo colliditur, atq; intenditur. ac propterea dixi posse nihilominus hic Hippocratem de his qui proprie nerui appellantur, intelligere.

105 Cum autē in anteriore partē caput fe-moris prolabitur, id quod paucis cōtingit: extendere quidē integre crus egri possunt: sed conslecti ad inguen minimum queunt. si item poplitem cogantur inflectere, labo-rant, longitudo uero cruris ad calcem qui-dem uel prorsus similis apparet.

Profunditate acetabuli quæ omnibus in par-tibus æqua non est, esse in causa ut alibi raro, alibi frequenter articulus excidat, superius iam dictum à me est. nunc cum de luxatione femoris in an-teriorem partem facta agat: cōtraria pati eos qui ita affecti sunt, inquit, illis quæ in posteriore partem luxatis eueniebant. illi enim extendere crus, hi in-flectere nequeunt: ad inguen quidem propterea quod in ipso flexu caput femoris unā cum cerui-ce tunc est ad genu, ob anteriorem musculum qui ab osse ilium defertur: qui cum à capite femoris in eum prolapsio incuruetur, colliditur, ac distendit. is enim cum extēdi amplius non possit, si quis in-flectere poplitem conetur, resistit. longitudo ue-ro cruris similis apparet. de luxatione in interiorē partē ipse superius dixit his uerbis: nam oīsi quod à coxa procedit, superiusq; ad pectinem fertur, ca-put femoris insidet, articuli uero ceruix in aceta-bulo uehitur. cum priori tempore non in ipso to-ta, sed maiore sui parte in acetabuli profunditate ueheretur. de hac uero luxatione nunc ita scribit: atq; ad inguen quidem extuberantur: & conten-tus locus is apparet. ut in hac luxatione secus q̄ in illa, ad femur in anteriorem partem, & paulo etiā inferiorem recesserit. propterea enim sit, ut affe-ctum crus sano æquale uideatur. atq; id maxime ad calcem. nam summus pes inclinari in terrā mi-nus potest. cuius rei causa & superius à nobis di-cta est, & deinceps etiam summam referetur.

106 Sed summus pes in anteriore partem prominere minus uult. totū tamē crus cum neq; hac neq; illac inclinetur, directionem naturalem obtinet.

Velle hic pro posse positū est, quemadmodum apud Homerū, cū inquit: Nec profluere ipse uo-lebat. id est poterat. summū pedē autē partē eam pedis uocat, quæ à planta & solo usq; ad digitos & ungues porrigitur. euenit enim, sicut antea di-ctum est: ut extento poplite non recte in postero-rem partem tali articulus inflecti queat. hæc igitur nunc quoq; exponere cum uelit, inquit: sed sum-mus pes in anteriore partē pminere minus uult. significās digitos, qui est summus pes, nō posse fa-cile protendi, & inclinari, neq; in terram deferri.

107 Dolore uero hi statim præcipue affi-ciuntur. urinaq; his inter initia magis, quam alijs in luxationibus supprimitur.

Causam ipse cur hæc contingant, subiungit.

tom. 6

Y His

108 His enim caput femoris proxime ad A
opportunos tenores electū est. atq; ad in-
guen quidem extuberantur. & contentus
locus is apparet, ad nates uero, rugosior &
macilentior. atq; hæc sanè, eorum quibus
hoc modo femur excesserit, indicia sunt.

Tenores, id est *τῆρες*, hic nominat neruos qui unā
cum arteria & uena per inguen deferuntur: quos
opportunos appellat, propterea quòd, sicut etiā
antea didicimus, qui magnam habent uim eos ita
uocare consuevit. hi autem magnam uim habent:
cum proxime ad dorsualem medullam siti sint, &
ijs in partibus exortum habeant, unde nerui ad ue-
sicam deueniunt. ideo enim fit, ut in his luxatio-
nibus contagio uesicæ consequatur: cum inflāma-
tione oborta ad urinam excernendā ea impotens
redditur. fortasse etiam ob magnitudinem inflā-
mationis in collo uesicæ existens, ubi astringens
musculus est, urina supprimitur: cum inflammatae
partes meatum occuparint, atq; obstruxerint.

109 At quibuscunq; in uiros iam adultis
articulus hic luxatus nō rediit: ij ubi dolor
iam cessauit, & articulus eo in loco in quē
prolapsus est, uersari assuevit, ambulare sta-
tīm ferè erecti absq; baculo possunt, sed ad-
modum directi. quippe cum in læso crure
neq; ad inguen, neq; ad poplitem flecti faci-
le queant. ex inguinis enim inflexibilitate
directiore toto crure quàm cum sani erant,
in ambulatione utuntur.

Statim à principio cum luxatio hæc cōtigit, do-
lorē accidere his, urinamq; supprimi dixit. ubi ta-
men tempus processit, & hæc iam cessarunt: ingre-
di possunt. Sed cur hæc cessant, si in eodem loco
caput femoris permanet, & nihilominus neruos
cōprimit, atq; intendit: te ipse hoc docet, cum ad-
iungit. & articulus eo in loco in quē prolapsus est,
uersari atq; agitari assuevit. in assuetudinem enim
referre huiusce rei causam uidetur. nam quæ com-
primuntur ab aliquibus, cum tempore callum cō-
trahunt, facile postea ea tolerant. simili modo quæ
extenduntur, cum eodem tempore pari id assue-
uerint, dolore non amplius afficiuntur: cur uero
absq; baculo recti ingredi queant, ipse se quando
declarat. summa orationis eius est: quòd crus his
in directione ad corpus seruetur, & neuter articu-
lus neq; ad inguen, neq; ad genu inflectatur.

110 Trahuntq; hi interdum per terrā pe-
dem: quippe cū & superiores articulos non
facile inflectant, & toto pede ingrediantur.
nihilominus enim minus hi calce, quàm anteriore
pedis parte insistant.

Superiores articulos, qui est ad inguen, & qui
est ad poplitem uocat. articuli autē qui ingressio-
ni inferuiunt, quatuor sunt: ad inguen, ad poplitē,
ad talum, ad digitos. hunc ultimū licet multi sint,
ob usum tamen & operationis cōmunionem, loco

unius connumero. qui sanè parum quid confert.
nam ut pedem in terra firmemus ex eo maxime e-
uenit: cum parum quid ipsi digitorum articuli ad-
fuerant. tota tamen crurū operatio & in ingredien-
do, & in currendo etiam multo magis ex inguinis
& poplitis articulis procuratur. cum enim hi infle-
ctuntur, sublatum à terra crus facile demittitur.
merito igitur nunc cum neuter inflectatur, trahere
ipsos per terrā pedem dixit. interdum uero ad-
iungit tum ad solorum terræ differentiam, tum ad
læsionis quantitatem spectans. nam qui in plano
solo & decliui ingrediuntur, etiā si parum crus in-
flectat: superioribus articulis, pedem nequaquā
trahunt. qui uero cōtrā in inæquali loco & acciui
incedunt: quamuis multū inflectant, tantū abest,
ut pedem non trahant, ut etiam in eminentias soli
aliquando offendant, atq; impingant. toto autem
pede ingrediuntur, qui & calce, & planta, & digi-
tis summis in terra innituntur. non enim illi quibus
in posteriōrē partem recesserat articulus, atq; ob
id breuius crus habebant: calce in ambulando ute-
bantur. sed satis ipsis erat pedis pectore in terra fir-
mari: q; à dissectionis professoribus solum & plan-
tam appellari dixi. at cum in priorem partem exci-
dit, calcem ij in terra prius summā: propterea quòd
tunc digitorum parte insistere nequeunt: qua ta-
men postea utuntur, cum iam crure affectio innixi
transferre alterum aggrediuntur.

111 Quòd si possent magnis gressibus pro-
gredi, uel admodum calcigradi essent: nam
ualētes quoq; quanto magis progrediēdo
ambulāt, tanto magis calcigradi sunt: dum
pedē alterū ponunt, & contrariū attollunt.

Eos qui multū progrediuntur, in terra calcem
firmare & dictum à me superius est, & euidenter
apparet. nihilominus item cōstat non multum om-
nino progredi eos posse, qui superiores articulos
qualibet de causa inflectere nequeunt. hoc autem
ipsis euenit, propterea quòd laborem non ferunt,
quem in transferendo extentū crus suscipere co-
guntur. nihil enim aliud impedimento ipsis est, ne
longe progrediant. nam si sano crure firmato ue-
lint id facere, possunt quidem, sed non sine labore
& defatigatione. quare melius fortasse oratio hæc
in hunc modum enunciari potuisset. quibus in an-
teriorē partem coxæ articulus excidit: ij in am-
bulationibus nihilominus quàm planta & digitis
calce uti queunt. & si sustinerent & paterent mag-
nis gressibus progredi: uel admodum calcigradi
essent. sed non tolerāt: propterea q; dum rigidum
crus difficulter transferunt labore afficiantur.

112 Quocirca quibus ita excidit, & adhuc
magis calce oppangunt, quàm anteriore pe-
dis parte.

Oppangere, id est *ἐγγίγειν* de ijs consuevit di-
cere, quæ inter se cōiunguntur, & sese contingendo
allidunt. hoc significato etiā est usus cū conforma-
re fracturas consulebat. diducēda enim prius ossa
fracta ac distrahenda à se mutuo extensione esse
affirma-

affirmabat. ita enim facilius repositionē fieri, q̄ si quis oppacta ea inter sese cōmitteret. aperte uero hic explicauit, quod paulo superius dixerat. nihil enim minus hi calce q̄ anteriore pedis parte incedunt. q̄d clarius quoq̄ et melius dictū fuisse, si quis hoc modo enūciasset. nihil enim minus calce hi q̄ anteriore pedis parte ingrediunt, uerūtētiā magis. sed adhuc etiam magis superius non addiderat.

113 Anterior enim pedis pars, cū reliquū crus extentum est, in priorem partem flexari non potest: sicut, cum inflexum crus est. neq̄ contra simari pes potest conflexo crure: sicut, cum extentū est. ac sana quidem natura ita constituta est, sicut dictū est, cumq̄ luxatus articulus non redierit, sic ambulans ut diximus, ob antedictas causas. macilentius tamē crus q̄ alterū sit, & ad nates, & ad posteriorem tibiæ carnosam partem, & in posteriore processione. quibus uero infantibus adhuc prolapsus articulus, non repositus fuerit, uel etiā ab ortu: ijs quoq̄ femoris magis q̄ tibiæ & pedis os imminuitur.

Pars pedis circa plantam & digitos, quam anteriorem uocat, inclinari poplite extento in terram non potest. in quem modū pedem figurare flexari, id est *καμπύλειαν* nominauit: propterea quod in tali articulo sicut neq̄ extēso, ita neq̄ inflexio appellari cōsueuerit. quemadmodū in poplite, & in guine. quādo igitur anteriores musculi primam plantæ partē, quem *πρόον* dicūt, attollunt: in usu est ut simari tunc pedem dicant. cum uero à posterioribus calx & tarsus trahitur: huiusmodi figurationis nullum nomen usitatum reperitur. iccirco Hippocrates ut dixi huiuscerei quā explicare uolebat, propriam quandam uocem excogitauit, flexariq̄ pedem dixit. neq̄ igitur simari inflexo crure pes potest, sicut cum extentū est: hoc est ab anterioribus musculis attolli, id enim simari significat. neq̄ flexari, nisi crus etiam fuerit inflexū. paulisper enim & uiolenter utrunq̄ hoc quidē sit: sed multum & absq̄ uolentia non potest. cum igitur, sicut dicebam, a sura non à tibiæ exorti musculi calcem & totū pedē in posteriorem partē trahunt: alij extensionem, alij flexionē, pedis nominant. cum

atq̄ oppositus motus ab anterioribus musculis fit: eodem modo extensionē alij, alij flexionē uocāt. sed in hac quidem motionē consuetū est, ut simari pes dicatur: in cōtrariā nullum, quod inter omnes constet, uerbum habemus. uerumtamen nullam propterea ex nominum discrepantia rerum cognitio iacturā facit. Nos enim nūc satis clare, ut puto, & perspicue utranq̄ hanc rem absq̄ etiā discrepantibus nominibus oratione hac explicauimus.

114 Minimum quidem in hoc modo luxationis femur minuitur, carnes tamen ubiq̄ minuuntur. maxime uero ex posteriore processione, quemadmodū iam superius dictū est. quicunq̄ uero recte educati fuerint, ijs dum augeantur, uti crure possunt, quod quidē aliquantulo breuius altero est. sed tamen innixi baculo ea parte qua læsum crus est. non enim absq̄ calce pedis pectore uti admodum possunt, id insipientes, ut in alijs claudicantibus nonnulli possunt. causa cur hi nequeāt, ea est, quam paulo prius diximus. ob id igitur baculo indigēt. at qui neglecti sunt, nihilq̄ crure in terra utunt, sed suspensum id habent: ijs ossa magis quā utentibus imminuuntur. Sed & carnes multo magis his quā utentibus minuuntur: in articulis uero quoad directionem crus magis debilitatur, quā quibus alio modo luxatio contigerit.

Nonnulli ex ijs qui hanc explanant, adeo periti harum loquutionum uidentur, ut minimum nullo modo significare existimant, non minimum uero maxime. sed hi dictū hic ab Hippocrate esse opinarent, ita affectis nullo modo femur imminui. quod tamen uerum non est. imminui enim conspicitur aliquantulum: non adeo tamen ut in alijs luxationibus. propterea q̄ minores hanc quā illæ imminuentes causas habet: quas duas esse dictum iam est, instrumentorum naturalium distortionem uidelicet, & operationū impedimētum, quo fit ut crure parum uti queant. sed in hac affectione præter quā q̄ non magni opere distortum crus est, neq̄ operationis nocumentum ualde multum accedit.

GAL. IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE ARTICVLIS COMMENTARIORVM

Lib. quartus.



igitur summatim dicā, articuli qui excidūt & elabuntur: inæqualiter ipsi si bijsi & excidunt & elabuntur: multo amplius interdum, quandoq̄ multo minus, quibusq̄ multo amplius prolapsi fuerint, & exciderint: dis-

Galen.

faciliores repositu omnino sunt. & si repositi nō fuerint: maiores et manifestiores debilitationes & læsiones in ossibus, & carnibus, & figurationibus præ se ferūt. cum uero minus exciderint & elapsi fuerint: facile repositionem admittūt. at si uel per frustrationē, uel per negligentia non reuerſi sint: minores magisq̄ innoxia debilitationes

tom. 6

Y, 2 his

his contingunt, quàm quibus paulo ante dictum est. atq; alij quidem articuli quatenus prolapsio eis interdum minor, interdum maior contingit: admodum multũ inter se differunt. sed femoris & brachij capita quàm simillime inter se utraq; elabuntur. cũ enim rotunda sint: simplicẽ rotunditatẽ ac caluatã habẽt. sinus uero qui ipsa excipiunt, orbiculares sunt, capitibusq; ipsis adaptantur. quapropter in his ut dimidiũ articuli excedat, fieri nõ potest. nam ob rotunditatẽ uel in exteriorẽ, uel in interiorẽ partẽ prolaberetur. Sed de quo nũc sermo est, integre excidũt, alioqui nõ excidũt. tamẽ hi quoq; sic aliàs magis, aliàs minus à naturali statu exiliunt. magisq; id femur, q̃ brachiũ patitur.

Non solius huius orationis, sed & sequentium omnium una cõmunis summa hæc est: luxationes non parua differentia inter se discrepare, dum magis, & minus contingunt: quippe cum aliæ multũ præter naturam, aliæ parum recedant: magisq; & minus alterutræ id patiantur. atq; in alijs quidem articulis, cubiti uidelicet, manus, tibiæ, pedis, & digitorum res perspicua est. in humeri uero & coxæ articulo non possẽ subluxationem quæ uocatur, contingere, ostendit: propterea quod capita articulorum globosa ac rotunda in cauitates orbicularibus supercilijs circumdatas inferuntur: in quibus cum luxatio fit, sublatæ capita nullo modo possunt. necesse enim est ut statim ubi e cauitatibus aliquo modo excidũt, extra ipsas elabuntur. Sed tamen inquit in his quoq; fit ut modo multũ, modo parum præter naturam articuli excedant: quod uero inter plurimum & paucissimum intercedit, non paucas habere differentias in eo quod magis & minus contingit, manifestum est.

2 Nam nonnullæ quoq; ex ijs quæ ab ortu contigerunt luxationes, si parum elapsæ fuerint, in naturalem statũ reduci queunt: præcipue ad pedis articulos.

Ab ortu. alij de ijs qui foetificantur, dictum esse affirmant: alij de iam natis, non multo tamen post tempore quàm geniti fuerint, intelligendum censent. his ea quæ deinceps dicuntur, uidentur attestari, illiq; manifeste errant qui de solis foetificatis intelligunt. melius enim esset ut de utrisq; dictum hoc esse existimarent. alijs autem quæ deinceps dicuntur, attestari, paulo post ubi ad ea uerba explanda deuenierimus, ostendemus.

3 Quicunq; ab ortu manci fiunt.

Distortionem cruris in exteriorẽ partem mancatẽ, id est *κλίωσις* prius ipse appellauit: in qua dixit contingere, ut pes intro conuersus atq; incli natus mutilationem præ se ferret. articulos autem pedis dixit, propterea q̃ plures numero sunt, ad tali dearticulationes omnes existẽtes: neq; uno osse

A constant furæ enim os ab exteriori parte, tibia ab interiori magnis quibusdam processibus talum cõplectuntur, cuius quidem tali anterior pars rotunda cum sit quasi caput quoddam supra ceruicẽ prominẽs habet, quod sinu ossis cõprehendit, quod nauiculari nuncupatur: qua præcipue dearticulatione fit, ut pes & limitas attollatur, & retro abducat. talus præterea ab inferiori parte, eo quo in cõmentario De ossibus dictum est modo, cum calce dearticulatur. quo in libro exercitatuẽ esse de here unumquenq; monuit, qui explanationes has esset lecturus. manciates autẽ pedis præcipue cõtinentur, cum in exteriorẽ partẽ tibia luxatur: sic ut furæ processus qui extrinsecus talum cõplectitur sine stabilimento ullo suspensus relinquatur.

B 4 Pleraq; ex his curabiles sunt: nisi admodum magna declinatio extiterit, aut prouentis iam infantibus contigerint. quam celerime igitur his curationẽ adhibere optimũ est, prius quàm ualde magnus ossis pedis defectus fiat: prius item quàm carnes in tibia admodum multum deficiant.

Prouectos uocat, qui paulo amplius creuerunt. quorũ non simili modo ut tenellis infantibus ossis natura formari ac fingi potest. hinc de iam natis Hippocratem loqui perspicuum est. an autẽ de ijs quæ adhuc foetificantur, in uteroq; gestant, etiã intelligat, non ita liquet. sæpe tamen in superioribus infantibus quoq; dum adhuc in utero gestantur luxationes contingere commemorauit.

C 5 Modus uero manciatis unus non est, sed plures. pleraq; enim luxata prorsus non sunt: sed ex figurattonis cõsuetudine in quadam pedis interceptione demancata.

D Plerumq; cum de aliquo ex ijs quæ sigillatim differunt, quispiam loquitur: modi nomine uti cõsueuit. nunc tamẽ de manciatum generatione dicere uidetur, quod multis modis fiat. nam quod subiungit, utrisq; attestatur. inquit enim: pleraq; enim luxata prorsus non sunt: sed ex figurattonis cõsuetudine in quadam pedis interceptione demancata. ex eo enim quod ait: luxata prorsus nõ sunt: unum quendam modum affectionis huius ostendit: ex eo quod infert: ex figurattonis cõsuetudine: alios quosdam significat: cum tenera & quasi cerea infantium ossa prauè à nutricibus figurata distorquentur: dum in incunabulis oborta quodam modo, aut pluribus inuolucris intercepta collocantur: ita ut à quibusdam etiam contundantur: quibus omnibus fieri distortionem cõsueuerunt.

6 Attendendum autem in curatione horum est, ut os tibiæ ad malleolum, quod extrinsecus est, in interiorẽ partem detrudamus, & reponamus: retrudamus uero contrà in exteriorẽ os calcis quod ex processione correspondet: ut inter se ossa quæ eminent, sibi occurrant & in medio & à latere

pedis. digiti uero uniuersi unà cum pollice intro in clinandi & circumagendi ita sunt.

Ipsè in libro De fracturis ita inquit iam uero tibia duo offa sunt: quorum quidem partim multo tenuius alterum altero, partim non multo tenuius est: horum alterum quod extrinsecus est, posteriores suram appellare consueuerunt. hoc repellendum intro monet, simulq; calcem extra repellendum: præcipue ea parte qua ex processione, id est ex directione ad tibiam correspondet, sibi naturali situ impositam. sæpe autem de hoc reponendi modo cum omnibus sit cõmunis, superius iam dixit, quod enim præter naturam eminet, in pristinam sedem reducendum est: ut sibi occurrant, aptenturq; inter se ossa. Quæ de conformatione deinceps dicuntur, satis sunt aperta: si quis meminerit eorum quæ tum superius hunc librum explanantes: tum ante hunc, in libro De fracturis diximus. si quid tamẽ incidit quod obscurius paulo dictum esse uideatur: id tantum explicabimus.

7 Tum cerato bene refinato, & plagulis, & linteis mollibus non paucis, neq; nimis compressis deligandum est.

Conformatis partibus ceratum quod refinam habeat, ac cõmodatum est: propterea quod & continent magis linteæ, cutiq; adherent: & partes ipsæ corporis magis excitantur. ex adhesionem uero fit, ut conformatio immota conseruetur: ex deligatione, ut cõpingantur partes, & corroborentur: atq; hoc quoq; ipsum stabilem ac firmam cõformationem seruat. linteis uti iubet mollibus ob partium molli tudinem qua ex ætate præditi infantes sunt. quæ leniter quidem circumfisi uult: cauens ne uehementi circumiectione compressio efficiatur: præsertim ubi mollia corpora deligantur. quia uero præcipit ut minus cõprimamus, ideo pluribus linteis esse utendum censet. deligationis enim firmitatem ac tutelam dixit, uel compressionem, uel linteorum multitudinem procurari.

8 Atq; ita fasciæ circumductiones faciendæ, quemadmodum manibus etiam pedis correctio fiebat: sic uidelicet ut pes paulo magis in ualgum tendere uideatur.

Hoc quoq; omni articularum & fracturarum correctioni & restitutioni cõmune ac perpetuũ præceptum est, sæpe ab ipso traditum. non uult enim, ut in directionibus & restitutionibus cõformatas partes ad naturalem statum exquisitè reductas, ibi relinquamus: sed paulo ulterius circumducendas censet: ut hoc modo diuturnam earum in clinationem ad distortionem contrariam retrahendo in medium restituamus: qui exquisitè naturalis earum status est. nam si in hoc à principio relinquerent partes ad diuturnam suam distortionem facile relaberentur. hoc autẽ præceptũ illi maxime generali curandi scopo subiectũ esse manifestũ est quo cõtraria cõtrariorũ esse remedia dicebat. cũ neq; perfrigerata mediocri calefactione calfaciamus: neq; calefacta mediocriter perfrigeremus: sed adeo in

Galen.

contrariũ ultra mediocritatẽ progrediamur, quantum à mediocritate affectio in alteram partem recesserit. nunc igitur quoq; quia affectio mēbris est mancitas, quæ ualgitati cõtraria est: in ualgum cõuertendum pedem Hippocrates censet: quod uidelicet ultra exquisitè naturalem statum excedit.

9 Solea præterea uel ex pelle non admodum dura, uel è plumbo faciendæ sũt.

Hanc etiã stabilitatis deligationis causam machinatur. unde etiã alligandã eam fasciã postremã omnium esse iubet: ut & deligationẽ totã cõtineat, & carnẽ non cõprimat. hoc autẽ significat cum uerbis his deinceps subiungit in hunc modum.

10 Alligandaq; ea nõ supra carne quidem posita, sed ubi iam postremis linteis es deligaturus, cum autẽ deligatum fuerit, unius ex linteis quibus deligatio fit, caput ad fascias quæ in inferiore parte pedis sunt è directo parui digiti assuendum est: deinde sursum intendendum. ut si mediocriter se habere uideatur, supra carnosam tibiam posteriorem partem circumficiatur, ut ita collocatum stabile maneat, ut autẽ in uniuersum dicam, oportet ut quasi ceram fingendo, ita ad naturam iustam adducamus, ita ut & inclinata, & distenta præter naturam, & manibus sic dirigamus, & similiter deligatione adducamusq; nõ uolenter, sed leniter.

E regione parui digiti, hoc est ab exteriori pedis parte ad carnosam tibiam posteriorem partem appensionem facit: propterea quod mancum pedem curat. nam si de ualgato mederetur, contrario fecisset: quippe cum in contrariã partẽ inclinare pedẽ oporteat, q̃ distortio cõtingit. nam in exteriorẽ partem distorta, intro contorquentur: quæ intro secesserunt, in contrarium abducuntur.

11 Assuenda uero linteæ ita sunt quemadmodum cõfert, ut exceptiones efficiant. aliæ enim aliã exceptionem claudicantis requirunt.

Id quod modo ego dicebam ipse hic explicat, alias aliam exceptionem & appensionem claudicantes requirere inquit. de mancata enim appensionem proculdubio requirunt, quæ sicut extemum tibiæ finem intro, ita extra pedem adducat. de ualgata contra, ea exceptionem indigent, quæ intro pedem, extra tibiam trahat. quæ item parum utroq; hoc modo affecta sunt: mediocriter in contrariam partem retrahenda sunt. quæ multum recesserunt, uehementer sunt reducenda. propterea etiam claudicantis, hoc est *χολώματ*, nomine est usus: quod cõmune omnibus distortionibus est.

12 Calceus præterea plumbeus faciendus est, qui supra deligationem extrinsecus inducatur: qualem chiæ crepidæ modulũ habebant. sed nihil eo est opus, si quis recte & manibus direxerit, & linteis deligarit, & ap

tom. 6

Y 3 pensio-

si diligenter multa in tota curatione adhibeatur, salutem adipiscuntur. Sed quod ad curationem utile est, iam dixi. Nunc rationalis quædam quæstio restat consideranda, quæ nihil curationi uel prodesse uel nocere potest. Inquirunt enim nonnulli cur de ossibus tibiæ loquens hic Hippocrates, luxata, id est exarticulata dixerit, cum luxatione & exarticulatione eorū ossiū esse affectionē asserat, quæ in cavitates ingrediuntur: non quæ eminentiis suis circūplectunt. quamuis nō articulos hos, sicut superius sepe demonstratū est, uocet, non igitur oportebat, inquirunt, eum exarticulati tibiæ dicere, sed talū. ad hos qui ita inquirūt, respondendū illud est, quod à me sæpe antea quoq; est dictū: solum id curare Hippocrate, ut rem de qua loquitur, exponat, quemadmodū etiā Plato nobis faciendum hoc censer, primūq; ipse facit. demonstratūq; alibi à nobis est, ueteres omnes ad nihil aliud, quam ad hoc spectare consueuisse. solus enim Prodicus uidetur minutam istam in nominibus obseruandis curiositatem affectasse: quam exactam loquendi diligentiam appellare qui Prodicū sectantur, solent. Cæterū perspicuitate narrationis nihil lædi ex ipsis his Hippocratis uerbis patet, cum inquit quibuscūq; tibiæ ossa luxata penitus ē pedis articulis eminent. nam si etiā uerbū illud luxata et exarticulata sustuleris, nihil minus quod dicitur manifestum est. quod Hippocrates adiunxit nulla minutæ istius nominum curiositatis habita ratione: quam qui assestant, ferē inepti ad dicendum sunt. qui enim enunciandi & eloquendi facilitate sunt præditi, ad uim enunciationis ipsius spectantes singula uerba minime consecrant: sed ijs quæ ipsis affluunt ex Græcorū usu & consuetudine utuntur. Hippocrates igitur cum animo concepisset ossa tibiæ ē dearticulatione penetrata cute eminere, ita uidetur eloquutus. propterea q; si quis quod eminet, ac multum extra dearticulationem exeat, luxatum esse atq; exarticulatū diceret: rem euidentius explicaret: audiretremq; ad rei speciem mente contemplandam facile induceret.

17 Adde quod euenit etiam ut & tibiæ & pes gangræna corripitur. hæc ita esse euentura sciendum certo est.

Gangræna quoq; malum his cōtingere inquit, ex magnitudine uidelicet inflammationis, si eminentia extra cutem ossa reposita fuerint: cum uidelicet in inflammatis membris liuida carne iam sub oriente rubor inflammationis euanescit: dolorq; ex torpore sensus uidetur imminutus. nam si penitus stupida, sensuq; carentia membra euadant: malum id non amplius gangrænam, sed siderationem nuncupant. inter siderationem enim & magnam inflammationē gangræna media est, tanto peior inflammatione, quāto sideratione est leuior. sideratio siquidem totius substantiæ membri corruptio est. quæ, ubi iam tenet, curari à nullo potest: sed inter initia tantummodo, quādo uidelicet nondū uere est sideratio, sed gangræna magna, quæ prope ad siderationē accessit. Verū uicinarū affectionē nō

A minibus abuti interdum cōsueuimus, de illis quæ ad ipsas quidem deueniunt: nondum tamen integre ipsarū formā & naturam consequuta sunt. Ita fit, ut maxima inflammatiō, cum neq; colorē suum seruarit, neq; dolorem: gangrænam quandoq; appellemus, cum nondum prorsus gangræna sit: sed si negligatur tamen, paulo post sit futura.

18 Sed neq; ueratrum mihi uidetur & eodem die exhibitum & rursus epotum præsidio futurū. proxime quidem si quicquam huiusmodi facit, sed neq; tamen id puto. At si neq; effecta, neq; tentata repositio fuerit, pleriq; ex his euadunt.

B De usu ueratrum in huiusmodi affectionibus in commentarijs in libro De fracturis dictum à me est.

19 Affulcienda uero tibiæ & pes ita est, ut ipse uult.

Affulciri tibiæ & pedē, firmiter stabiliri ac firmari significat: quod cum facis, illud tibi attendendū monet, ut figurationem eligas quæ minimū ægrotanti dolorē afferat. quod enim inquit ut ipse uult qui ægrotat scilicet, nihil aliud quam hoc ostēdit.

20 Tantū, ne aut suspensa, aut mota sint.

C Quod inquit ne mota sint idē est quod modo dixit affulcienda sunt. Affulcire enim ita omni ex parte firmari membrū significat, ut moueri nullo modo queat. Suspensa uero ne sint bene addidit. cum enim dixisset eam figurationē esse eligendā, quæ facillimā ægrotanti esset: decliue & suspensam uitandā esse censer: propterea q; cum affectæ partes defluxionem patiuntur, causam inflammationis admittūt meminimus sanē in superioribus de cruris figuratione dictum ab eo esse, summum pedē paulo sublimiorē exquisita rectitudine tenendū. nunc uero concedere ægrotantibus uidetur, ut recta pedis collocacone uti possint. nā cū tres sint huiusmodi collocacone, decliui, accliuī, & æqualis seu recta: concedit ut excepta decliui, quocūq; modo æger uoluerit, crus collocetur. prius uero iussit ut sola accliuī depositione uteretur. perspicuū igit est in huiusmodi affectionibus cōuulsionis timore maximā curā cū adhibere, ut dolore ne attentent. dolor siquidē in nervosis mēbris cōuulsionē maxime parit. quare si ita affecta neq; perfrigerentur, neq; dolore afficiant: ut conuulsio ipsis superueniat, fieri nullo modo potest.

21 Medendumq; est cerato picato, & uino imbutis plagulis paucis non admodum frigidis. frigus enim in huiusmodi affectionibus conuulsionem prouocat.

De his quoq; superius dictum à me est, hoc est de cerato picato ulceribus curandis accommodato: & uino, præsertim, ut ipse docuit, nigro & austero: qd absq; inflammatione affectas partes cōseruat. de eo uero q; fugiendū esse frigus inquit, uerpo te quod cōuulsionem inducat, in carnosissimis partibus explanatione aliqua fortasse indigeret: in nervis uero prorsus clarū est. nervis enim utrūq; inest, ut

& facile perfrigerentur, cum natura frigidi sint & exangues; & ubi patiuntur, in cōuulsionem deueniant. Quin neq; alia quępiam pars absq; nervorum contagione incidere in cōuulsionem potest. ne uosiores uero reliquis partibus esse dearticulationes constat. ubi uidelicet musculi depōita carne quam in reliquis suis partibus habent, in tendonē desinūt. Quapropter magis illud quęstio dignū esse uideretur, cur uino mediocriter frigido utendum censeat. non enim mediocriter frigidū, sed calidū adhibēdum esse unusquisq; existimaret. Huius rei ratio huiusmodi est. medicinā ulceratarum partiū scopus in eo cōsistit, ut ne inflāmentur; id autē sit, si prohibeatur, ne ulla humiditas in affectam partem influat; non influet autem, si perfrigeremus. nam quę calciant & humectant, si corpori applicentur, id cōsest in rubicundis rediunt; paulo post etiā in tumorē subducunt; aliasq; ei similes inflāmationi affectiones afferūt. quę uero perfrigerant, e contrario omnia faciunt; nō modo nullā ē superioribus locis superuacua humiditatem ad affectā partem attrahunt; uerū eas etiā quę in ea cōtinentur, ad uicina membra expellūt, atq; exprimunt. perfrigerantiū autē duplex genus est; alia recenti qualitate ad tactū; alia insita qualitate id faciunt. nā quę astringūt frigida sunt; sicut in libris De simplicibus medicamētis ostenditur, & reliquū perfrigerantiū genus, ab his distinctū est; ut papaueris succus, mandragorę succus, cicuta, & alia quęcumq; cum humiditate frigesciunt. austerā em̄ omnia terrestre perfrigeratiōē afferre demonstratū est. dicta etiā nō pauca sunt de usu huiusmodi medicamentorū in libris De curā dīratione, quemadmodū quoq; in cōmentarijs De ulceribus Hippocratis. sed ad presentē rem satis est, si illud tantū cognoscamus: humidorū & frigidorum medicamentorū facultatē in totam corporis altitudinē penetrare, cui applicātur: citoq; ipsum refrigerare amplius q̄ opus sit, ita ut corpus regētem facultatē stupefaciant. at quę terrestre refrigerationem afferunt, ea in libris quoq; dixi, accommodatissima esse demonstrata sunt ad influentes humores reprimendos. propterea igitur ipsa hęc adhibemus. quia uero calidum attrahere quoq; ad se humores cōsueuit, ideo recēti quoq; qualitate frigida adhibemus, neq; ea calefacimus. Nūc igitur Hippocrates quātum ad affectionē ulceratarum partium spectat, eis frigidis quidē uteretur, sicut in alijs uulneribus facit: quia tamen cōuulsionem timet, quę ex refrigeratione superuenire consueuit: prorsus frigida adhibere non audet; atq; iccirco non admodum frigidis utendum monet.

22 Accommodata quoq; sunt betę folia, aut tussilaginis, aut alicuius alterius huiusmodi in uino nigro austero semicocta, atq; imposita. medendumq; est & supra ulcus, & supra adiacentia.

Herba quędam est tussilago, idonea ad presentem rem, propterea q̄ mediocriter exicat. quare indigere ulcera omnia demonstratū est, de uino au

tem nigro austero dictum a me quoq; est in cōmentarijs De fracturis, ipsum cū reprimendi uim non secus, atq; alia uina habet, crassius tamen ceteris esse; atq; ideo ulcerata membra non mordere. quam ob causam eligendum ceteris magis est.

23 Ceratoq; tepido illinendum ipsum ulcus est.

Demonstratum a me est dum librum De ulceribus explanarem, sumere nunc ceratum Hippocratem, taliaq; medicamenta adhibere, quę conglutinationem prohibeant: non q̄ ulceri cōueniant, sed quia nunc non absolute tanquam ulcus, ulcus curat. unde neq; glutinare id studet, sicut alia recentia consueuit: sed primum id in hac curatione sibi proponit, ut ne cōuulsionē homo corripia. ob id enim neq; reponendum articulum censet; sed potius permittendū ut crus turpiter claudum euadat. neq; absolute mollia medicamenta adhibet, quę *μαλακῶς*, id est mollitudinosa ipse in libro De ulceribus uocat: licet uim mitigandę inflāmationis habeant. inter iniūta namq; nondū exorta inflāmatione, ut ne exoriat, cauet; ac propterea reprimētia imponit; neq; tamen ea sola, sicut in alijs ob cōuulsionis timorem, sed misto curationis modo utitur: medicamentis facultate contrarijs mensura conuenienti inter sese iunctis: id quod ex sequentibus maxime spectare cōspicies, quibus iam animum aduerte.

24 Quod si hybernū tempus sit, lanę sordidę ex oleo & uino tepido imponēdę sunt, ac desuper irrigandum.

Neq; tepidis uteretur medicamentis, neq; prorsus immisceret oleum, si tanquam ulceratū tantūmodo membrū curaret. sed sicut prius dixi, quia cōuulsionē timet, & oleum immiscet, & tepida omnia adhibenda censet. uerum neq; ad cōuulsionem tantū spectat, sic ut a medela ulceris prorsus recedat. nam in mistis & coniunctis affectionibus curatio quoq; mista adhibenda est. propterea imponi etiā lanas sordidas iubet, id est succidas: ita enim a succo sordii appellare cōsueuerūt; quia hoc quoq; medicamentū nō simplicis est facultatis, ut in libris De medicamentis ostendimus: sed mixtę ex contrarijs qualitibus & facultatibus, astringēte uidelicet, & leniter ac tepide calefaciente. irrigandas uero, hoc est perfundendas ac made facienas huiusmodi affectiones uult, non tam de hyeme, q̄ de æstate quoq; intelligēs. cōmune em̄ hoc toti curationi est: nam quod si hybernū tempus sit, subiunxit, nō q̄ per hyemē tantum huiusmodi affectiones assidua humectatione indigēat, sed quia æstate magis id requirāt. quippe cū magis per id tēpus lanę ita affectis partibus circūiectę soleāt exiccare. semper igit made facienda ac perfundenda assidue huiusmodi omnia esse cēset. qd autē infundis ac made facit: tale esse debet, quale in prima statim curatiōe precepit adhiberi: uel uinū solū, si sit æstas: uel adiectio oleo per hyemē. ac quātitas quidē calorē ex ambiētis nos aeris cōstituit: reperiet, nam quādo admodū frigidus aer fuerit, calo

calorem humidorum quibus perfundes, augebis: quando calidus, diminues: non enim omnino uti calido decreuit: atq; ita quantitatē caliditatis pro aeris temperatura subinde immutabis. memoria autē tenenda sunt in huiusmodi omnibus ea quoq; quae ab ipso in uniuersum dicta sunt, & non cupiendum, omnia in omnibus audire ac dici. sed quae ea sunt: quae uidelicet, tum in cōmentarijs in definitiones eius quos Aphorismos dicit, tum in alijs multis memoria tenēda esse censui. quorum cum unum dictū fuerit, reliqua quoq; omnia quae eandem uim habēt, intelligenda sunt: ac de omnibus dictum id esse quasi cōmune, est existimandum, ita igitur etiam nunc cum ipse tempus tantum hybernū cōmemorarit, tu & regionem, & etatem, & consuetudines, & naturalem corporum constitutionem intellige: regionem scilicet frigidam, etatem senilem, consuetudines quae corpus perfrigerant, naturalem constitutionem frigidam. quippe cum omnia haec cum tempore hyberno ab Hippocrate scripto eandem in indicationē indicent. Ceterum sicut in hyeme in calidiorem modum curationem immutas, ita per aestatem econtrario in frigidiorē immutabis. aestati autem simili modo arates, & regiones, & cōsuetudines, & corporum constitutiones calidae correspondent. quae si omnia calefacere praeseferant, in frigiditate: si refrigerare, in caliditate totam curationem augebis: & si alia ad calefaciendum, alia ad refrigerandum tendant: ad numerum ipsorum & facultatē spectans, ita pro rata cuiusq; portione & caloris & frigoris convenientiam moderaberis.

25 Nihil autem ulla re deligandum est, neque circumplectendum. scire enim oportet compressionē, & pondus talibus affectionibus omne malum asferre.

Non solum in his subligaminum circumuolutionem, qua in omnibus & fracturis & luxationibus utitur, auferendam esse censet: uerum etiā deligationes omnes quibus ad lanas continendas, cum iijci solent: causamq; ipse addit, cū inquit, compressionem & pondus omne malū huiusmodi affectionibus asferre. satis enim ipsis sunt solae lanae, cum ob mollitudinem & leuitatem neq; cōprimere, neq; grauare quicq; possint. atq; haec non ut ulcus curans euitat, sed cauens ne denudati & cōtusi tendones & nerui conuellantur.

26 Accommodata his etiam sunt nōnulla ex cruentis: quibus cūq; ex ipsis confert, ut lanae impositae uiuō irrigatae multo tempore relinquuntur.

Cruenta, id est γράμα, appellat medicamenta & his in libris, & in libro De ulceribus, quae cruentis uulneribus statim imponuntur. ex his inquit ea praecipue esse admittenda, quae cum post longius tempus soluantur, irrigari inter solutiones queunt. uult enim ut sicut reliqua omnia in curatione hac in leniorem modum referatur: ita quoq; neq; deligatio egrotanti adhibeatur, neq; frequens fiat

A resolutio. Ex cruentis autem medicamentis post multum tempus resolui ea possunt, quae maxime exiccandi uim habent: si tamen in ipsis id cauermus, nec ex uehementia contrahant, exempli causa duorum medicamentorum quae nostis, mentio nem faciā, quae in omnibus libris descripta sunt, quī De medicamentorum compositione tradūt, cuiusmodi sunt Andromachi duo, Herae unus, & aliorum quamplurimi. ex bitumine haec componuntur medicamēta: quorum alterum barbarum: alterum Cyzicenum appellatur. hoc cum magis quam cruenta exiccet, nocet magis, quam profit, cum contrahat membra, atq; in dolore inducat. alterum accommodatum est, si tamen etiam ipsum moderate fuerit contemperatum. nonnulla enim ex his & immoderatus exiccat, & constitutione dura sunt. Sed de differentia huiusmodi medicamentorum in libris de eorum cōpositione dictū latius est. Pleraq; uero quae ab Hippocrate deinceps dicuntur, clara sunt, si quis memoria teneat ea quae antea & librum hunc De articulis, & alterum superius De fracturis explanans commemorauit.

27 At quae paucissimorum dierum sunt cruenta, quaeq; resina comprehenduntur: non simili modo ut illa idonea sunt. diuturna enim ulcerum purgatio his fit. quippe cum multo tempore madore abundant. alios quos autem horum deligare bonum est. sciendum tamē certo est, necesse omnino esse ut homo turpiter claudus euadat. nā & pes in superiorem partem attractus est: & ossa prolapsa extra eminentia apparent. nequē enim ullum ex talibus ossibus plerumq; nisi parum aliquid carne destituitur, neq; recedit, sed tenuibus & imbecillibus cicatrici bus circumducitur: atq; id si multum tempus quieuerint: sin minus, periculum est, ne insanabile aliquid ulcusculum relinquatur. ueruntamē de quo est sermo, qui ita curantur, salutem consequuntur. quibus repositus articulus permanet, moriuntur.

D Quānam paucissimorum dierum cruenta medicamenta appellet, si meministi quae in superiore oratione explananda exposuimus, non difficile reperies. ea enim ita uocasse eum cōstat, quae post paucos dies resoluntur. resolui autem quae paucos dies debent, quae ex antedictis sunt imbecilliora. nam quia non satis exiccat, sinunt, ut sanies ampliores circa ulcera colligantur. haec nonnulli ex ueteribus nescio quo cōsilio (multa em̄ dici possunt) resina extrinsecus cōprehendebant. sed cum Hippocrates omnia huiusmodi medicamenta cauenda esse cēseat, protrahere longius orationem, superuacaneum existimo: praefertim cum in libris De medicamentis quaecūq; de his scienda sint, cuncta fuerint definita. Nunc igitur de propositis dictum sit satis. Cetera quae subsequuntur si quis prius

prius explanata memoria teneat, perspicua sunt: atq; igitur pratercunda.

28 Eadem ratio est, si ossa quoq; cubiti ad articulū manus ulcere facto siue in interiorē, siue in exteriorē partem manus emineant. certo enim sciendū est intra paucos dies ea morte, qua superius dictū est, eum esse moriturum, cui reposita ossa permanse- rint. quibus uero neq; reposita fuerint, ne- que tentata, ij multo plures euadunt. His ta- lis curatio competit, qualis dicta iam est. ne- cesse uero est ut claudicantis distortionisq; si- gura deformis efficiatur: digitiq; manus & imbecilli & inutiles reddantur.

Sicut totum id quod inter genu & talum est, ex duobus ossibus constans, tibiā appellat: ita quoq; quod inter brachium & primam partem palmæ intercedit, cubitum uocat: quod neq; ipsum uno osse, sed duobus compositū est: quorum alterum radius, alterum cubitus proprie nuncupatur: non secus atq; in tibiā. articulusq; ad manum cum tali articulo: qui uero ad brachium est, cum eo qui est ad genu, conuenientiam habet. maiorum tamen partium affectiones, siue fractum, siue luxatum a- liquid sit, difficiliore semper sunt. quod si quis meminerit, ad reliqua quæ dicenda sunt, pauca ex- planatione indigebit.

29 Nam si in interiorē partem lapsa fue- rint ossa, inflectere digitos: sin in exteriorē, extendere non potest.

Cur uerbo labendi utatur, superius declaratum est, ubi tibiæ ossa ad pedem cū ulcere luxari dixit. nunc referre causam uolo, cur quando in interiorē partē cū ulcere cubitus excederit, inflecti di- gitū nequeat. in hac affectione sit, ut cubiti ossa ab interiori parte, ossibus primæ partis palmæ quem *καρπὸν* uocāt, incumbāt, unā cum tendonibus qui extrinsecus eō pertingunt ad superiorem locum ad brachium: ita ut digitos in exteriorē partem at- tolli necesse sit: id quod nihil aliud ipsis est quā extendi. propterea igitur inflecti prorsus nō pos- sunt, cum musculi & tendones musculis ab interio- ri parte ipsos inflectētibz extrinsecus renitantur. sæpe enim dictum est, nisi musculis operari co- nantibus alij oppositi obsequantur, fieri nō posse ut operatio ullo pacto expleatur. eadem ratio est, quod extendi nequeant digiti, cum in exteriorē partē cubiti ossa excederint. nam cum interiores musculi & tendones uehementer intenduntur, ac propterea obsequi exterioribus nequeant: pereat illorum operatio necesse est. quin etiā ipsa ossium positioe cum uidelicet cubitus ab interiorē parte ossibus primæ partis palmæ insidet, flexura: cum ab exteriorē, extensio admodum prohibetur.

30 At si tibiæ os cum ulcere ad genu emi- neat, siue in interiorē, siue in exteriorē partem id contigerit: quibus repositum fue-

rit magis in præcipiti mors est, quā superio- ribus: licet etiā illis in promptu sit, si osse non reposito medearis, spes salutis ita tan- tummodo habentur. periculosiora tamē ossa hæc sunt, quo sunt superiora, ac ualidiora, a ualidioriq; prolapsa. Si uero os femoris ad genu facto ulcere prolapsum sit, repositum ac subsistens uiolentiorē mortem maturius afferet, quā si superius dicta: non repo- situm, multo quidem periculosius q̃ prio- ra: sola tamen spes salutis hæc subest.

Testimoniū non paruum hoc quod hic inquit, eorum est, quæ paulo superius de ossibus quæ & in dearticulatione ad malleolos, & ad primā par- tem palmæ eminent, atq; extantiam diximus. nam neq; talus in dearticulatione ad pedem, neq; prima pars palmæ quem *καρπὸν* appellant, ad cubitū ex- tra cutem prominet: sed in crure tibiā, in brachio cubitus. merito igitur hæc & luxari seu dearticula- ri, & prolabi dixit, quippe quæ extra dearticulatio- nem excederint. tibiā enim in dearticulatione ad malleolos interdum eminere modo in exteriorē, modo in interiorē partem dixerat. nunc ue- ro non tibiā solum, uerum etiā femur extare in- quit: non iniuria id quidē. nam in dearticulatione ad genu interdū tibiā, interdū femur extare cōspi- citur. ad pedem uero tibiā semper. quemadmodū ad primam partem palmæ cubitus. cætera aperta sunt, si antedictorum oblitus non fueris.

31 De articulis ad gibbū cubiti, & cubiti item & brachij eadē ratio est. quæcunq; e- nim ex his luxata cū ulcere extiterint, om- nia si reponantur, mortē: si nō reponantur, spem salutis afferunt, qui euadunt, claudica- te debilitātur. articuli quidem qui superius sunt, repositi letaliores: sed & non repositi periculosiores. si uero alicui superiores arti- culi luxati ulcere facto emineant, hi si repo- nātur citissima morte conficiunt: si nō repo- nātur, periculosiores cæteris sunt. Quæ me- dela accōmodatissima his mihi esse uideat, dictū iā est. Iā uero quibus digitorū uel pes- dis uel manus articuli luxati uulnere facto exierint, nō osse quidē fracto, sed in ipsa co- hæretia auulso: ijs si repositi permaneāt, cō- uulsiōis quidē periculū impēdet, nisi recte curētur. at operæ precīū tamē est, ubi prædi- xeris rē cautione & cura multa indigere, ita repositionē aggredi. facillimū autē & effica- cissimum & artificiosissimum est, si uetūci- lo reponamus: quemadmodum de fractis ossibus atq; extantibus dictū superius est. deinde quiescendum quammaxime est, & cuban

cubandum, & inedia pugnandū: meliusq; est ut desuper leui aliquo medicamento ho-
minem purgemus.

Merito hic inquit articulos numero plurali, si-
cut de genū. nam de dearticulatione ad primam
partem palmæ, & ad malleolos loquens, nō dixit
in multitudinis numero articulos. plures autē ar-
ticulos hoc in loco esse, de quo nūc sermo ipsi pro-
positus est, in tertio cōmentario in librum De fra-
cturis declaratum est. eandem rationem itaq; esse
inquit in proposita hac cubiti dearticulatione, si-
cut in genu. sicut enim illic aliquādo tibia, aliquan-
do femur extare dictum est: ita nunc modo cubi-
tus, modo brachiū in eiusmodi affectionē incidit.
Que deinceps cōmemorat, perspicua omnia sunt.

32 Vlcus uero uel cruentis medicamentis
irrigatis curandum est, uel multioculis, uel
ijs quibus in capite ossa fracta curantur: ni-
hilq; quod admodum frigidum sit adhiben-
dum. Primi articuli minimum quidem sunt
periculosi: superiores maius periculum as-
ferunt. Repositio autem uel eodem die, uel
postero molienda est: tertio aut quarto mi-
nime. quarto enim die rebelliones maxi-
me attentantur. quocirca quibus non statim
facta repositio fuerit, ijs antedicti hi dies
sunt prætereundi. quodcumq; enim intra
decem dies reponitur, omne id continetur.
at si post repositionē conuulsio superuene-
rit, statim ejciendus articulus est. ac calida
aqua quā sæpissime fouendū. curandumq;
est ut cum totū corpus, tum præcipue circa
articulos calidū, lene, ac molle custodiatur.

Quænam sint cruenta medicamenta irrigata, su-
perius dictum est. multioculi autē herbe que etiam
βόειος ὀφθαλμός, hoc est bouis oculus nūcupatur, folio
hinc utendum censet, sicut prius rursuslaginis: cum
eandem uim, quam illa habeat. huius herbe Dio-
cles quoq; in libro De holeribus meminit. Tale
autem esse totius curationis propositum debere
inquit, quale in fracturis capitis declarauit. eo in li-
bro nobis quoque illius curationis modus sicciore
esse est demonstratus, quam qui in libro De ulce-
ribus traditus est, & præcipue circa articulos.

33 Debetq; inflexum magis q̃ extentum
totum corpus esse. expectandum tamen re-
cessionem passuros esse digitorum articu-
los qui reponentur. plerisq; enim ita cōtin-
git, si uel quælibet inflammationis particu-
la subsit. ut nisi ex uulgarium imperitia in
crimen medicus incideret nihil omnino re-
poni oporteret: atq; ossa quidem ad articu-
los extantia si reponantur, ita sunt pericu-
losa, sicut dictum est.

Non idem est si dicamus extentum esse & ex-

tendit, sicut neq; inflexum esse et inflecti: qui enim
extentum esse membrum dicit, unam eius solam
figurationem significat: quæ in directum tendit,
quæ neq; maiorem neq; minorem suscipere dire-
ctionem potest. qui uero esse inflexum inquit, om-
nes post extensionemfigurationes indicat: que
magis & minus inter se differentes usq; ad ultimā
flexuram procedunt. extēdi autem & inflecti mo-
tiones ipsas notat, quæ in transfigurandis mēbris
fieri consueuerunt. extendi siquidem omnes eos
motus in se continet, qui inter extremā flexuram,
& exquisitam extensionem intercedunt: sicut in-
flecti a summa extensione usq; ad summam flexio-
nem motiones complectitur. nunc igitur Hippo-
crates cum dixit extentum esse, extensionem ulti-
mam que per directum planē est, significauit: quæ
solam reprobatur. cum dixit inflexum esse omnes
habitus indicauit qui inter hanc, & ultimam fle-
xionem sunt. ē quibus qui accommodatissimus sub
inde fuerit, eligendus est: modo qui paulum, mo-
do qui multū a summa extensione recesserit. quan-
do autem alterutrum ex his eligendum sit, ex an-
tedictis conijcere poteris.

DE OSSIBVS EXCIDENDIS.

34 Quæ uero ad articulos digitorum pe-
nitus exciduntur, innoxia pleraq; sunt: nisi
quis in ipsa uulneratione ex animæ defectu
læsione afficiatur.

De excidendis ossibus docere hinc incipit ita
clare omnia differens, ut nulla nostra explanatio-
ne opus sit. sed satis est, si illud tantum præmonea-
mus, te omnia percepturū esse quæ dicit, si id tibi
proposueris, qd de extantib. ossibus docuit: quæ
recentiores medici *ἐκβυσσόμενα*, id est excutatio-
nes, hoc est extra cutem eiectiones appellare con-
sueuerūt. pro magnitudine enim articulorum ma-
gnitudo periculi impendit: sicut igitur in illis, ita
in ossibus quæ exciduntur, contingit. si quid autē
obscure esse dictum uidebitur, id explanabo.

35 Medelaq; uulgaris talibus ulceribus
sufficit: quinetiam quæcumq; non ad articu-
los, sed ad aliam aliquam ossium directio-
nē præciduntur, innoxia sunt: alijsq; etiam
sanabiliora. quæcumq; item in digitis ossa
fracta extiterint non ad articulos, ea si repo-
nantur, innoxia sunt. excisiones uero inte-
græ ossium ad articulos, & in manu, & pe-
de, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad
primam partem palmæ, plerisq; læsione ua-
cant, si non statim animæ defectio occupa-
rit: aut quarto die continua febris superue-
nerit. siderationes tamen carniū contin-
gunt, & in uulneribus cruorem erumpenti-
bus, & ualidis constrictionibus, & ossium
fracturis compressis magis quam par erat:
quæq; alijs uinculis uiolētis intercepta fue-
rint

runt, plerisque decidunt: ac plerisque ex his euadunt, necnon quibus pars femoris aliqua & carniū & ossis deciderit: quibus etiā brachij pars minus tamen id euenit, si cubitus aut tibia decidat: hi facile etiā euadunt. quibus igitur fractis ossibus siderationes, et denigrationes statim obortæ sunt, ipsi cito carnes circumabrumpuntur ac resoluuntur: ut quæ decidere debent, ossibus iam cōcedentibus, celeriter decendant. at quibus sanis ossibus denigrationes fiunt, carnes ipsi statim emoriuntur: ossa autem sero decidunt: qua parte denigrationis fines, & nudatio ossis extiterit.

Sæpe iam dictum est uulgarem medelam cum appellare illam quæ accuratæ & exquisitæ opposita est.

36 Quæcūque partes inferiores finibus denigrationis fuerint, si prorsus iam emortuæ sint, & dolore careant, ad articulum detrahendæ sunt: cauendumque ne uulneratio inferatur. nam si qui exciditur, doleat, nondumque ea parte emortuum corpus habuerit: periculum admodum est, ne præ dolore anima deficiat, huiusmodi autem animæ defectus multos ilico iam peremerunt. Ac femoris quidem os hoc modo nudatū octogesimo die recedere uidi. sed tibia tamen huic homini uigesimo die ad genu fuerat detracta. uidebatur autem mihi etiam propius. non enim simul, sed ad maiorem cautionem mihi ita facere uisum est. ossa uero tibiæ ex huiusmodi denigra-tione ad mediam tibiā sexagesimo die mihi deciderunt, quæcūque ex ipsis fuerant nudata. ad efficiendū enim, ut citius aut tardius ossa quæ denudantur, decidat: curatio curationi sanæ præstat. cōpressio item à cōpressionē ualiditate & imbecillitate differt ad efficiendū, ut nerui, carnes, arteriæ, uenæ denigratæ aut celerius aut serius emoriantur. nam quæ non uehementer intercepta moriuntur, nonnulla non ad ossium nudationes deueniunt, sed magis in summitate decidunt. ob has igitur causas uno numeri nomine tēpus, quo tō lingua ex his iudicantur, comprehendī nō licet.

Cum antea dixerit, cum carnes ossibus circumiectæ denigrantur, & corruptuntur, necesse esse ut ossibus carne denudatis tandem eueniat: ac propterea præcidenda ea esse iussit, nunc consilii, ut detrahantur sanis minime contactis: ne æger ex dolore adeo uehementi, animæ defectu ita

corripiatur, ut recreationem amplius non admittat. ad articulū autem, si fieri potest, detractiōnem esse faciendam monet, celeritatis causa. nam si in media membrorum parte ossa præcidantur, tempus trahere necesse est. in articulis uero absque ossium tactu affecta membri pars reciditur.

37 At enim admittendæ maxime huiusmodi curationes sunt. quippe quæ ad inspicendum quàm ad medendum formidabiliores sint. & medela lenis omnibus huiusmodi sufficit. ipsa enim seipsa duntaxat iudicant. studendum item est, ut uictus facultate febriculosus non sit.

Non ægrotantium tantum curam habere Hippocrates uidetur, uerum etiā medicorum ipsorum: ut cum semper quidem apud ægrotantes reprehensione uacent, in plerisque laudē consequantur. propterea enim notat ac distinguit affectiones quæ specie magnæ sint, & quæ uelut in uehementibus & ualidis uis quæ specie huiusmodi minime apparent, detractandū esse censet. quæ specie uero magna esse uideantur, aggredienda. sicut hæc sunt de quibus nunc loquitur. ubi namque pars aliqua penitus emortua fuerit, ut uicinatorum nulla admodum magna contagio timeri possit: si eam præcidas, animæ defectus euitato periculo, nihil mali consequitur.

38 Tum in iustis figurationibus collocari membrū debet. iustæ etiā hæc sunt: si neque suspensum sit, neque deorsum inclinetur, sed magis sursum uergat: præterea etiā quo ad integrè circumabrumpitum fuerit. nam eo tempore sanguinis eruptionum periculum est. ideo uulnera non decliuiā, sed in contrarium collocanda sunt.

Sæpe à me dictum est, iustum ab Hippocrate dici pro eo quod potest esse æquale. hoc est quod prouinciuscuiusque dignitate est. tale quid esse etiam iustitiam ipsam nouimus. quantum igitur ad musculos spectat, iusta figuratio ea erit, in qua in neutram partem neque qui insclectunt, neque qui extendunt, intenduntur. quantum uero ad decliue aut accliuē attinet, ea iusta esse figuratio uideri posset, quæ inter accliuitatem & decliuitatem media est: hoc est quæ in rectam lineam exquisitè est extenta. quæ sanè, nisi periculum aliquod eruptionis sanguinis impedeat, siquid æger facilius ferat: eligenda est. de hac paulo ante diximus, ubi de extra cutem eiectionis ossibus sermo erat. nunc uero in præcidendis ossibus sicut in operatione ipsa periculū est, ne dolore uehementi affectus æger, animæ de fectione opprimatur: ita postquā operati sumus, alter metus impendet, ne sanguinis eruptio consequatur. id quod quando putrefactæ partes deciderint, euenire cōsuevit. deorsum igitur uergentem habitū ad eruptiones huiusmodi sanguinis promptissimum esse, perspicuum est. unde ut hoc periculū penitus ac tuto euitaremus, præcisum membrum

brum acclivæ ac suspensum esset figurandum: nisi dolorem ea figuratio afferret. quocirca sic ut paululum sursum uergat, collocamus. patet itē in hac oratione Hippocrate, ut rem augeret, dixisse prætereā etiam perinde ac si ita scripsisset. si neq̃ suspensum sit, neque inclinetur deorsum, sed sursum magis uergat: & præcipue cum putrefactæ partes circum abruptæ ac resolutæ fuerint. nā eo tempore sanguinis eruptionum periculum est.

39 Nam cum tempus plus processerit, & purgata iam ulcera fuerint: non amplius hæcfigurationes idoneæ sunt: sed recta collocatio convenit. quandoq̃ etiam in declivē tendentes habitus, temporis enim mora nonnullis ex his ossis recessiones cōtingunt: atq̃ ita fit, ut subligaminibus indigeant.

Sicut cum sanguinis eruptionem cauebat, rectam collocaationem licet mediam & iustam ad acclivitatem tantisper redigebat, quatenus absque dolore laborātis membrum attolleretur: ita nunc mediocriter declivē interdum figurandum censet, ut sanies externi commodè queant. nam si neque sanguinis eruptionis, neq̃ cōtagionis, neq̃ inflammationis periculum sit, & iam purgata ulcera sola consolidatione indigeant: ante omnia illud cauendum est, ne aut pus, aut sanies aliqua tenuis subsistat, curandumq̃ ut omnia effluant. Sed interdum tamen accidit, ut aliqua pars ibi sinuata eo tempore sanie corrosa quo metu sanguinis eruptionis ac cliuem figuram elegeramus: subligamina quibus sinus contrahatur, requirat. cuiusmodi in occasione deligatio cōtrario modo quam cæteræ omnes antedictæ fieri debet. illæ enim ab inferioribus oris partibus in superiorem desinunt: hæc quæ his affectuibus adhibetur, in quibus exprimere pus uolumus, incipiens desuper ad inferiora deuolui consuevit: ac paulo supra os sinus ipsius finitur: ea causâ, ut quod è fundo ipsius expressum deligatio nefuerit, aperto ore effluere statim queat.

40 Expectandum tamē est, hos post tempus aliquod dysenteria esse laboraturos. nam & pleriq̃ his quæ denigrantur, & sanguinis eruptionibus ex ulceribus dysenteria superuenit. atq̃ id plerumq̃ fit, ubi iam & denigrationes & eruptiones sanguinis iudicatæ sunt.

Δυσεντερίαν uocabulum non pro ulceratione intestinorum, ut pleriq̃ medici solent, sed pro cruenta ex intestinis proluuie sumere Hippocrates uidetur: ut etiam quando ex icoris imbecillitate cruenta deiciuntur: affectio ea dysentericē nomine appellet. id quod & fieri & dici à medicis quoque uidetur. quin etiam nostris multis ita affectos curantiū inscitia periisse. nam cum aliquando ex acrimonia exeuntium unā cum deiectionibus nescio quid sanguinis inter initia: deinde processu temporis strigmenta quoq̃ intestinorum excernantur: quia pleriq̃ ex medicis quasi solam intesti-

norum exulcerationem neglecto icinore curare cōsueuerunt: in causa sunt ut agri moriantur. morbus igitur est, & icinoris imbecillitas, & intestinorum exulceratio. cōmune autem accidens cruenta hæc per sedem deiectio est, quæ non ob ante dictas causas existit. nam ex copia sanguinis uenarum orificijs in intestina apertis cruenta hi deiciunt, ut malum hoc sanguisuius uenis in ano quas *αἰμαρροΐδας* appellant, perquam simile sit. eo tantum differēs quod illæ in ano tantummodo fiunt: in hoc in intestinorum anfractibus & reuolutionibus, uel in ipso etiam recto intestino, lōge tamen ab ano in superiore eius parte ubi exoritur, uenæ aperiantur, multos nos uidimus hoc pati, quibus excisum os aliquod fuerat, quicq̃ etiam cum priori tempore ualidis exercitationibus essent assueti, repente eas deseruerunt: cum alij certaminibus, alij fossionibus, aut talī alicui rei laboriose antea uacarent. nisi enim hi unā cum exercitationibus copiam etiam cibi, qua cum laborabant, utebantur, immi- nuerint: celeriter nonnulli plenitudinis morbis corripuntur: alij quibus cum felicius agitur, in dysenteria, quod dictum hic ab Hippocrate est, malum incidunt: ita enim, ut dixi, sanguinis deiectionem appellat: nonnullos item noui qui profluuiio sanguinis è naribus: alios qui cholera laborarunt. omnibusq̃ his ex circuitu omnino talia accidētia cōtingunt, æquali ferē tempore intercedente. nam uniuerſis his ac repentinis exinanitionibus afflictis ac perfrigerati uictui postea studium non adhibent: sed rursus incaute ac libere eo usi, copiam rursus sanguinis æqualem priori in æquali tempore contrahunt, ac colligunt. cōmunem igitur causam omnium qui ita patiuntur, esse plenitudinem dicemus: quæ per uenarum ora uel in naribus, uel in sede, uel in intestinis aperta exinanitur. quæ quidem plenitudo in hominibus contrahitur, qui cum comedant ut prius faciebant, abunde sanguinem ex alimento procreatum, ut prius solebant, non digerunt, nec cōsumunt. sub hanc cōmunem rationē omnium qui ita afficiuntur, ea quoq̃ quæ ab Hippocrate hic dicta sunt, referuntur. quippe cum illis quibus membrum aliquod præcisum fuit, alimentum quod prius ad id deferebatur, in uenis collectum copiam sanguinis faciat. Quapropter consulendum huiusmodi omnibus hominibus est, ut pauciora edant quam prius, atq̃ ea quæ paucum alimentum exhibeāt: frequenter aluum ducant: quatenus possunt, exerceantur: amplius perfricentur: ante cibum sape, post nunquam lauentur. siq̃ uti aquis possunt, quæ digerendi uim habeant, id uel maxime faciant. atq̃ hæc obiter dicta à me sunt: quæ tamen ipsa obiter minime sint consideranda. Sed enim addendum quoq̃ esse illud uidetur, quam ob rem nonnullis qui uehementem sanguinis eruptionem passi sunt, talis dysenteria post aliquod tempus superueniat. id itaq̃ fit propterea quod uehementibus sanguinis profusionibus frigefacto corpore minus q̃ prius per cutem digeritur. quod ergo non exinanitur, in corpore subsistens sanguinis copiam auget ex qua, si

cut prius demonstratum est, & cholera, & sanguinis profluvia per nares, & cruenta dysenteria eueniunt. ita enim clarioris doctrinæ causa appello, ex sanguinis autem copia, ut dixi, hæc consequuntur ob robur magis & vires, quam ob imbecillitatem: cum ad exercendū id natura incitetur, e contrario quā in iecinorariis affectionibus contingat. in illis enim infirmitate & imbecillitate iecoris fit, ut cruenta ex intestinis deiciantur. Si igitur uel per hæmorrhoidas, uel per uenas quæ aut ad intestina, aut ad nares pertingunt, quod redundat, natura expellere potuerit: fortunata exinanitio succedit. sed si locis his copia ea non admissa ad petus & pulmonem inclinata fuerit, graue iam malum impendit. alterum enim ex duobus contingit: nam aut in pulmonias & laterales morbos, aut in sanguinis excreationes incidunt.

41 Atq; incitatur quidem impetuose & uehemēter: sed neq; multos dies perdurat, neq; mortifera est. quippe cum neq; ipsi hi qui hæc patiuntur, cibi abstinentia laborēt; neq; alioqui exinaniri eos conferat.

Non ut historiam scribat eorum quæ huiusmodi ægrotis accidunt, hæc subiungit Hippocrates: sicut Thucydides facit, cum pestilentiam illam de scribit: sed ut à dysenterijs quæ alijs de causis eueniunt, hæc de qua loquitur, distinguat. nam quamuis propositi huius operis propria hæc consideratio non sit: expedit tamen, ut diligentius pertractetur: cum medicī cōplures sint, qui affectiones in quibus sanguinis deiectiones cōtingunt, discernere non ualeant. nonnulli enim longe aberrantes omnes eas ex intestinorum ulceratione euenire opinantur. excretio sanè quæ per hæmorrhoidas fit, neq; ipsos ægrotantes latet. cruenta uero quæ desuper ad sedē deferuntur, alia statim à principio ueniunt: alia ubi tale aliquid præcesserit. si repente sanguis multus deijciatur, scire licet apertio nem orificiorum uenarum natura quod grauabat excernente contigisse: cuiusmodi hæc quæ nunc dicta ab Hippocrate est, dysenteria. quæ cum impetuose incitetur, cito desinit: præterquam quod neq; fastidium cibi laborantes afficit: quemadmodū cum ex iecoris infirmitate huiusmodi deiectiones consequuntur. tamen si raro iecoraria affectio à tali exinanitione incipit: ut plurimū enim quasi carniū lotura, & sanies sanguinis tenuis inter initia excerni consuevit. incipit tamen quandoq; etiam cum huiusmodi repentino sanguinis profluuio, cum uisceris huius infirmitati plenitudinis quoq; affectio accesserit. post initia uero utro modo contigerit, unā cum summo cibi fastidio sanguis merus, aliquando nō multus, aliquando flauē bilis admixtus cum intestinorum derafis adipibus deijciatur. postea etiam, quando uidelicet male admodum affectum iecur est, quasi sanguinis faex exit. in huiusmodi autē excretionibus, præsertim cum aliquid bilis etiam habuerint: ipsorum intestinorū particulæ quoq; quas *φόρυγες*, id est strigmenta uocant, simul deijciuntur, summa intestinorum

tunica humoris acrimonia derafa. his tenuissimō uictu est opus: at qui redundantem sanguinem excernuntijs congruis cibis exhibendus est. quippe cum sanum ac ualens iecur habeant, quod præualere ei possit.

FEMORIS AD COXAM REPOSITIO.

42 Femoris ad coxam prolapsio si in interiorē partem prociderit, in hunc modum reponenda est.

Hippocratem, quod articulum ad coxam reponere aggrediatur, cum tamē relapsurus statim sit, primus Ctesias Cnidius ipsius cognatus (nam etiā ipse genere erat Asclepiades ab Aesculapio originem ducens) post Ctesiam alij quoque nonnulli damnant. cum igitur duplex omnium huiusmodi rerum iudicium sit, alterum cum aliquis ipse in spe xerit rem, quæ in dubium uenit: alterum cum longo experimento non expectato, demonstratiua ratione ex natura rei sumpta quippiam probatur: nos utroq; in præsentia utemur. Quod ad naturā rei pertinet, huiusmodi est. in hac de articulatione ualidissima copula est, teres, in ipsa occultata, quæ ueritatem capitis femoris profundissimæ cavitati acetabuli connectit: ut si quis eam etiam non uiderit, ex hac oratione consentaneum sit, intelligere eam longitudine esse admodum breuem, quæ parte uidelicet femur semper uersatur: quemadmodum Hippocrates inquit, in coxa uersatur nunquam supercilium acetabuli extra transcendens. necesse igitur est, ut minima quantum ad longitudinem attinet, copula hæc sit. quocirca quoad naturā in statu est, prohibet, quo minus excidere femur queat. fieri tamen potest, ut non solum abrupta, uerum etiam ex humiditate multa in sinu acetabuli collecta adeo præter naturam extendatur, ut è naturali sede excidere femur permittat. Si itaque fracta copula femur luxari contingat, licet statim fuerit repositum, in sede tamen persistere non poterit. cum enim deuexum acetabulum sit ac de plute, magnūq; pōdus totius cruris inferum habeat: facile femur rursus à propria sede elabētur, si quis ingrediēdo uel paulo citius moueatur, uel transcendere aliquid quod ante pedes sit, uelit. nā si paruo motu eius in plano solo utatur, semper fortasse seruari id in naturali situ poterit. sed hoc fieri uidetur nullo pacto posse. Etenim etiam si nihil aliud sit, quod impediatur, saltem uelut in insensu foliorum in balneis attollere crus prorsus cogetur, atque ita quidem femur repositum in sede sua permanere non posse, si diuilla copula fuerit, rei ipsius natura nos docet. Quinetiam illud quoque uere adiungere quispiam posset. cum in dearticulatione ad genu copula quadam neruosa extrinsecus sint: femur solā hanc habere nullamq; aliam huiusmodi extrinsecus, neq; musculos qui dearticulationem constringant. neq; enim musculi paruo cuidam presidio sunt ne articuli facile excidant: præsertim si robusti, ac contenti fuerint. propterea enim ceratoribus, licet uehemētissimos ictus in luctationibus, & casus, & distentiones, & articulo

culorum cōtortiones sustineant, brachia & crura non luxantur; quia undique magnis et validis musculis constricta sunt. Ipse etiā Hippocrates inter initia huius libri, bobus quoque maxime articulum ad coxam luxari, ubi consenuerint, gracilesque ac macilenti euaserint. dirupta igitur hac femoris copula quamuis repositus articulus fuerit, contineri in sede, præcipue in gracilibus, inquit. Videamus deinceps si ex copiosa humiditate laxata copula excidere femur poterit, atque id deinde repositum fuerit; quid euenturum esse uersimile sit. mihi quidem hic quoque esse manifestum uidetur, si mauerit ibi ea humiditas, rursus id esse elapsurum: si exiccata fuerit, firmitatem naturalem esse recepturum. nam ex humiditate quoque effici, ut articulus luxetur, ex ipso etiā Hippocrate potes cognoscere; qui in definitionibus quos Aphorismos uocant, ita scribit: Quibuscumque ad coxendicem uexatis coxa luxata rursus reditijs mucus suboritur. mucos igitur collecto in dearticulatione, id est lento humore, madefacta copula relaxatur. nihil autem interfit in præsentia, siue copulam, siue copulatum neruum & colligatiuū uocemus. quæ enim copulæ teretes in neruorum speciem sunt, copulatiui seu colligatiui nerui appellari à dissectionis professoribus consueuerunt. Huiusmodi femoris luxationem bis iam nos ita curauimus, ut reliquū tempus nō amplius exciderit. diu autem exiccantibus medicamentis circum circa dearticulatio cōprehendenda est, quo usque copulatiuus hic neruus satis fuerit exiccatus; ut non amplius ita extendi queat, ut femur supercilium acetabuli transcendens sequatur: sed in naturali situ ipsū intus contineat. femur enim aliquādo manere si repositum sit, locupletissimus testis Tarentinus Heraclides est: uir profecto qui neque decreti confirmandi causa mentitus sit, ut plerique ex dogmaticis & decretantibus consueuerunt: neque in arte in exercitatus: sed si quisquam alius fuit, ipse operum medicinæ admodum peritus extiterit. sed orationem eius audiamus, quam in quarto libro De curandorum eorum quæ extrinsecus sunt, ratione scripsit. quæ ad uerbum ita se habet. Qui femur repositum non manere propterea opinantur, quia diuulsus neruus fuerit, qui ad acetabulum coxæ femur continet, ignorant: cum in uniuersali modo negationem faciant. nam neque Hippocrates & Diocles, neque Philotimus & Euenor, et Neleus, et Molpis, & Nymphodorus, alijque nonnulli repositiones eius tradidissent. Quin nos etiam in duobus puerulis propositum obtinuimus: Sepe tamen & magis in adultis articulus rursus relabitur. non igitur res ratione iudicanda est. sed quia aliquando contingit ut permaneat: non semper auulsionem, sed & relaxationem, & contractionem rursus nerui fieri existimandum est. quandoquidem querere utile quidem est, sed non prorsus commune. In fine orationis huius suæ Tarentinus hoc adiunxit, sectam suam, quæ experimentaria erat, sequutus. cuius id propositum est, quæcumque aperte ita inspecta sunt, ut ex ipsis utilitatem quæ ad artem spectet, discere

Galen.

ualeamus, inutilem esse in his causis inquisitionē. Caterum etiam post Heraclidem alij multi recentiores repositum femur à se semper remansisse memorie prodiderunt.

43 Bona autem & iusta & secundum naturam repositio hæc est: quæ nescio quid etiam ambitiosæ concertationis in se habet, si quis harum rerum ostentatione delectatur. homo pedibus ad medianum forti, sed molli ac lato uinculo suspendendus est: ita ut pedes quatuor circiter digitos aut etiam minus inter se distantes habeat. tum ei supra genua lata & mollis habena quæ ad idem medianum attollat, circundanda est.

Scite atque urbane aliquid iactare, ostētare, id est *καταθέσθαι* dicere Attici consueuerunt. id quod etiam nunc Hippocrates significat, cum inquit: si quis harum rerum ostentatione delectatur: nam superius etiam De ijs qui extensionē per scalam adhibebant, loquens, dixit, eos imperiti uulgi auram affectantes id facere. & tamen de ea quoque scripsit, quia tempestatis suæ medicos non bene uti ea uidebat. si nunc etiam quo pacto extentum per scalam femur reponere quispiā optime posset, docere proposuit. quæ fortasse reponendi ratione, si non affuerit scannū de quo postea dicturus est, ut etiam nos poterimus. Iubet igitur hominem scalæ alligatum suspendere uinculis scala ad medianum sublata. medianum autē, id est *μεσότης* tignum magnum transuersarium appellatur: quod in magnis diuersiorum stabulis, ubi manēt iumentum, nec non in agris in rusticis domicilijs ab uno pariete ad alterum pertingit. uultque ut pedes sursum ad medianum conuersi sint, caput uero non longe abest à terra: sicut ille qui reponit, rectus assilens manibus uti in reponendo articulo queat: quemadmodum deinceps docebit.

44 Debet autem læsum crus duobus circiter digitis magis quam alterum esse extentum: caput uero duos ferè cubitos, aut paulo amplius, aut minus à terra abesse. manus autem ad costas appositæ molli aliquo alligandæ sunt: atque hæc omnia supino ei iacenti sunt apparanda: ut quamminimū tempus dependeat.

Vincula quomodo circumijcienda sint partibus corporis quas commemorat, aperte declarauit. ualidiora autem esse iubet & mollia quæ crus affectum attollunt, merito quidem: quippe cum tota hæc extensio causa curationis illius efficiatur, communi omnium quæ reponuntur, ratione, quoniam enim caput femoris ex acetabulo elapsum in interiorē partem abiit, à musculis qui illic sunt, attractum: conuenit sanè ut prius deorsum id unā cum femore uidelicet agatur: deinde ita in exteriorē partem propellatur. ubi uero ē directio ad acetabulum promotum fuerit, uel musculis inde

tom. 6

Z 2

com

committendum negotium est: uel simul etiam impellendum. musculos enim omnes ad capita sua naturali motu attrahi, saepenumero dictum iam est. hi igitur simul secum femur etiam attrahunt, id attractum capite suo in acetabulum coarctantur.

45 Vbi uero suspensus iam fuerit, uir peritus & non imbecillis debet traiectionem inter femora cubitum suum inter caput femoris prolapsam, & interfemineum inferere, deinde altera manu ad traiectionem coniunctam rectus assistens e corpore suspensi hominis repetere annexus sublimis aequabilissime appendere. Hac repositio omnia quae secundum naturam debent, exhibet. nam & corpus ipsum suspensum suo ipsius pondere extensionem facit, & homo appensus tum extendendo impendere caput femoris super acetabulum cogit: tum osse cubiti moliendo relabi id in pristinum situm compellit. oportet autem quam optime uinculis instructum hominem esse. nec non quam ualentissimum esse eum, qui appenditur. Sicut autem prius quoque est dictum, multum inter hominum naturas interest quantum ad id spectat, ut uel facilia, uel difficilia reposita sint. curque multum intersit, superius ubi de humero agebamus, dictum est.

Totum id quod inter inguina utriusque cruris est, *πυκνία*, id est gressura solet appellare. cuius mediam partem *πυκνίαιον* nuncupat, hoc est interfemineum, eo quod duobus feminibus interiacet. quae est intercapedo quae ab exortu pudendi usque ad anum pertinet: ubi etiam uesica collum collocata est. iubet igitur, ut inter hoc interfemineum quod per longitudinem in media gressura porrigitur, et caput femoris cubito inserto, manuque altera ei coniuncta, quemadmodum aperte ipse descripsit, ille appendatur qui caput femoris deorsum est attracturus, id quod non solum efficietur, uerum etiam molitio accedet: quae articulum in exteriori partem coget excedere, quo caput femoris directum supra acetabulum coxae constituitur.

46 Nonnullis enim ex nullo apparatu femur ingreditur, sed ex parua extensione, quatenus dirigere manibus ualeamus, leuiterque crissationem restituitur.

Sicut superius *κρίκλισμος* crissatum masculino genere dixit: ita nunc foeminino *κρίκλισις* crissationem ad crissa uisum motacilla, paruum & leuem agitationem uocat. nam agitare hac illac de leui quadam motione intelligendum esse ostendit, ubi repositionem luxatae maxillae tradit.

47 Multis item si ad articulum crus inflexerint, id facta circumuagatione in sedem

iam est relapsum. plerumque tamen fit, ut cui libet apparatus non obtemperet. quocirca scire quidem optima ac praestantissima de unaquaque re in omni arte debemus: sed uti postea quibus sigillatim uisum fuerit. porro extendendi rationes etiam in superioribus dictae a me sunt: ut uti ex illis ea quae obuia fuerit, ualeamus. uehementer enim in diuersas partes extendatur homo necesse est, ut in alteram crus, in alteram corpus adducatur. nam si bene fuerit extensus, caput femoris pristinae sedis superimpendebit. si uero ita superimpenderit, neque facile postmodum est prohibere, quo minus in sedem propriam insideat: ut iam inde omnis molitio, & reapatio sufficiat. Sed enim in extensione deficiunt, atque idcirco euenit, ut molestiam multam afferat repositio.

Dum crus ad inguen inflectitur suspensum totum femur efficitur, quod cum sit, femoris caput agitat redire interdum per circumuagationem conseruit. per circumuagationem autem quid significet, id quod & humeri articulo & coxae, dum & excidunt & reponuntur, contingit: ipse superius declarauit ubi edocuit in his de articulationibus subluxationem fieri non posse, sicut in alijs quae ad cubitum, ad manum, ad genu, ad talum sunt. propter ea enim quod globosa & rotunda femorum capita sunt, orbiculare uero & in circulum conclusum cavitatum quae cum ipsis dearticulantur, supercilium eminet: fieri non potest, ut pars aliqua capitum in cavitatibus contineatur: aliqua non contineatur, sed in supercilio ipso acetabuli insideat: uerum statim ubi deuoluuntur uel intra dearticulationem, uel extra labantur, necesse est. quia igitur capitis lapsio in utrilibet minimo circumuagationis momento regitur: rem hanc circumuagationem nominauit.

48 Oportet igitur non solum ad pedem uincula annexa esse, uerum etiam supra genu: ut non magis genu, quam coxae articulum deligatio intendat. atque ita debet extensio ad pedem apparari. in alteram autem partem non solum ex deligatione ad pectus & alas retractio procuranda est: uerum etiam habena longa, duplicata, ualida, leni, inter femineo circumiecta, atque a posteriore parte ad spinam, ab anteriore ad iugulum porrecta utrinque dextrum distendendum est. uidendum tamen ut habena non supra femoris caput praetenta sit, sed inter caput femoris & interfemineum. inter extendendum autem ad caput femoris pugno offirmato, propellendum est, quod si qui trahitur suspen-

spendatur, traiecta manu, atq; altera ei coniuncta, simul & detrahendum, & in exteriori partem propellendum est. quod cum sit, iubendum alteri est, ut partem femoris ad genu interiore in partem detineat.

Cum pedibus suspensus homo caput deorsum habeat, omnibus articulis distenditur: sed unum tantum eius articulum qui est ad inguina, extendi uolumus. merito igitur supra genu iniicienda esse uincula precipit, quæ femur sursum intendant. nam si solis tibiæ inuolutis attrahere crus permittamus, nihilominus, sed magis quoq; qui ad genu est, quam qui est ad coxam articulus, quippe cum uiciniior uinculis sit, distendetur.

49 Dicitum autem prius etiam est, operæ precium esse, ut qui in ciuitate aliqua frequentius medetur, lignum quadrangulum habeat sex circiter cubitorum, aut paulo maius: latitudine bicubitali, crassitudo autem dodrantalis sufficiat.

In libro De fracturis de machinamento hoc mentionem fecit: quare inde testimonium adducunt nonnulli qui asserunt, unum librum scriptum à principio ab Hippocrate fuisse quem inscripserat, quæ in medicatrina sunt: qui deinde ob magnitudinem in duas partes fuit diuisus: quarum altera quæ prior est, De fracturis: secunda, De articulis inscriptionem obtinuerit. Cuiusmodi autem esse machinam hanc uelit, ijs qui uiderunt quod scamnum Hippocraticum uocatur, perspicuum est. ita enim ex multo iam tempore appellari à medicis consuevit. formulasq; paruas ad imitationem eius factas pleriq; habent. eoq; sapissimè utuntur. solumq; id est quod ad articulum repositiones sufficiat. Si tamen alijs etiam uti machinis quispiam uelit, habet ad itinera quidem accommodata, quæ diuisilibus appellatur: quod Archimedis ipsius inuentum esse prædicant ad usus uero in urbibus, statariam quidē, quæ Tectonis aut Andree nuncupatur: seisilem, hoc Hippocratis scamnum: quod nonnulli ex recentioribus medicis elegantius, non secus ac machinariū crepidinem appararunt. Deinceps igitur instrumenti huius fabricam describenti animum aduerte, atq; ea quæ dicit, illis quæ inscriptis accommodare. sola enim monstratio quæmadmodum antea etiam diximus, est, quæ huiusmodi res declarat. nam illis qui apud me librum hunc legunt, promptè equidem hoc officium exhibeo productum in medium instrumentum huiusmodi uel ipso magno, uel paruo aliquo ex eius simulachris, quæ huius tantummodo usus causa conficimus: ut legentibus ostendere ualeamus, non enim scilicet per ea reponi articulum quispiam potest. sed nunc sicut hoc facere mihi nullo pacto licet: ita explanare si quid in uerbis Hippocratis obscurius inciderit, licet. quod & in superioribus hucusq; feci, & facturum insequentibus sum.

Galen.

A 50 Id per longitudinem hinc & inde incisionem prælongam habere debet, ne altior opportunitate machinatio sit.

Cum inquit hinc & inde, à sinistra & dextra parte intelligit. quod ex eo patet quòd addidit per longitudinem, quinetiam prælonga idem significat. nam supra caput & infra pedes incisionem transversam potius quam prælongam appellasset. Quod autem inquit huiusmodi est. melius enim est, ut diluciditatis causa orationē hanc totam paraphrastice explicemus. Id, inquit, per longitudinem hinc & inde incisionem prælongam sicut lignum est, habere debet: quæ ea sit profunditate, ut ad molitionem sit accommodata, ut ne altior quam conueniat machinatio sit. quod enim inquit opportunitate, Græcorum more dictum est, qui κατὰ πόλιν, id est opportunitatem, pro conuenientiam interdum ponere consueuerunt. quod etiam αὐτοῖς, id est quod debet & par est, appellant. sit igitur incisio scamni tanta ut in ea firmari uectis ad molitionem faciendam queat.

51 Deinde postes breues, ualidi utrinque inaptandi: qui assellos habeant.

Assellos qui & fuculæ dicuntur, axes uocant: postes uero firmamētā in quibus axes infixi sunt. quæ utrinq; id est à superiore parte, et inferiore scamni inapata esse uult. ad axes enim hos laqueorum qui ægro circumijciuntur, capita tempore quo in diuersa extendendum est, innectuntur.

C 52 Tum satis quidem est, si in dimidia ligni parte: nihil uetat tamen quo minus per totum etiam, quasi fossulæ longæ quinque aut sex incidantur quatuor digitis inter se distantes, trium digitorum latitudine, atq; eadem profunditate.

Κατὰ μέρος, id est fossulas quo uerbo hic utitur Hippocrates, non pauci ex ueteribus fossas appellarunt. quam uocem per translationem hic posuit Hippocrates, dum incisa in scamno caua ad uectes firmandos exprimere uult: quæ quidem in dimidia parte ligni, hoc est inferiore præcipue excauanda censet. nihil uetare tamen inquit quin in superiore quoque fieri possint. quippe cum instrumentum hoc quod describit, non solum ad coxæ articulum, uerum etiam ad uertebras, & humeros reponendos nobis utile futurum sit. hæc autem caua esse plura debent, propterea quòd qui curantur, & ætātibus, & magnitudinibus, & toto corporis habitu inter se differunt. quæ sanè quantā magnitudine faciendi sint, quantaq; inter se distantia, ipse manifeste exposuit.

53 Habere præterea in medio lignum hoc debet cauum aliud profundius ad tres circiter digitos quadrata figura, ut in eo cum esse opus uidebitur, lignum infigatur: quod ima sui parte foramine accommodetur & quadret: teres superior sit, infingendumq; id est,

tom. 6 Z 3 ubi

ubi uisum fuerit, inter caput femoris, & inter femineum. lignum hoc erectum stans im-
 pediat, ne corpus, dum trahitur, ad pedes se-
 quatur. interdumq; satis ipsum solū est: ut à
 superiori parte qui in contrariū adducat, nō
 requiratur. interdū dum etiam hinc & inde
 crus extenditur: laxū id uel hac uel illac in-
 cumbens in exteriorē partem caput femo-
 ris moliendo extrudet. nā propterea quoq;
 fossula illæ excavatae sunt, ut in quibuscunq;
 ex ipsis conuenierit, ligneus uectis iniectus
 & uel iuxta ipsa uel ad ipsa articulorum ca-
 pita prorsus impactus simul cum extensio-
 ne moliatur: siue in exteriorē, siue in inte-
 riorem partem facere id expedierit.

Scalpi in medio scamno cauum quoddam uult,
 quod ad suscipiendum lignum erectum quod infi-
 gatur inter caput femoris & interfemineum, ido-
 neum sit. clare autem ipse cur lignum hoc inter ex-
 tendendum statuendum sit, quemadmodum cæ-
 tera quoq; omnia deinceps explicat. ob eos tamē
 qui ingenio sunt tardiore, orationem hanc plani-
 us aliquantulo exponere non recusabo. lignum
 hoc inter caput femoris lapsum et interfemineum
 erectum deorsum intendendi obstaculum sit. di-
 ctum siquidē saepe iam antea est, nisi quis obstat,
 & in contrariam partem reducat: dum membrum
 extenditur, facile fieri, ut corpus intendenti ce-
 dens, atq; obsequens intentionem omnem resolu-
 at, hoc quidē praestat etiam per laqueos superio-
 ribus partibus iniectos facta intentio: firmitatis ta-
 men causa ligno hoc quoq; uisum, quinetiam ipso
 aliquantulum relaxato molitionem facit.

54 Siue item teretē, siue latū esse uectem
 utile sit: alius enim alij ex articulis cōpetit.
 in omnium autē articulorū cruris repositio-
 ne hæc cum quassatione molitio perquam
 utilis est. Sed de quo nunc sermo est, teretē
 esse uectem conuenit. Ex his machinamen-
 tis, & necessitatibus mihi non uidetur fieri
 posse, ut restitutione ullus articulorum frustre-
 tur. tamen si alij quoq; modi reponendi hu-
 ius articuli reperiuntur.

Ipse deinceps dicet teretē uecte utendum esse
 cum in exteriorē partem femur molimur. id quod
 ipsi nūc propositum est, cum intro prolapsionem
 factam reponet. nam si extra excesserit, latum ue-
 ctē adhibendum censet. nunc enim uult ut inter
 prolapsum caput & interfemineum ingrediatur,
 sic ut paulo superius capite collocetur. in excessio-
 ne in exteriorē partem cum multa amplitudo eo
 loci sit, stabilius ac firmitus latus uectis obnititur.
 sicut paulo post suo loco iterum dicetur.

55 Nam si lignum hoc magnū in medio et
 à lateribus postes duos pedales habeat ea

altitudine, quæ cōuenire uideatur, hinc u-
 num, et inde alterum: deinde lignum trans-
 uersum tanquam scalæ gradus inter postes
 sit collocatum sano crure inter postes traie-
 cto, læsum supra gradum transfertur, atq;
 adaptatur. ueruntamen facile aliquid desu-
 per & in quam partem excidit articulus, ac
 cōmodandum est: altior enim q̃ moderatū
 sit, gradus est: & stragulū multiplex prout
 congruerit, corpori substernendum.

Non sola axium firmamenta postes se uocare
 ex hac oratione manifestat. in media enim parte
 per longitudinem totius scamni lignum quod-
 dam trāuersum quasi scalæ gradus inter duos po-
 stes à dextra ad sinistram pertingens constituitur:
 supra quod luxatum crus extenditur. non ita qui-
 dem simpliciter, sed cum altero ligno, quod per
 longitudinem à superiore usq; ad inferiorem cru-
 ris partem porrectum ei alligatur: cum hoc enim
 supra gradum crus compellitur. constat enim sa-
 num crus infra gradū esse debere in medio inter
 postes loco. postes enim gradus huius sustentacu-
 la appellat: quorum utrinq; alterum scamno infi-
 gendum censet. hos autē à postibus ianuarum per
 translationem ita esse nuncupatos perspicuū est.

56 Deinde lignū moderata latitudine &
 longitudine usq; ad malleolū cruri subten-
 dendum est: quod ultra caput femoris qua-
 tenus fieri potest, porrigatur: crurique quot
 partibus congruerit, alligetur.

Lignum toti cruri alligari dictum à me etiam
 prius est. sed nunc ligni superius caput capite fe-
 moris altius esse faciendū censet, adiungens
 quatenus fieri potest. eo quod quod faciendū esse di-
 cit, difficile admodum est: nisi quis partem eam ca-
 pitis ligni huius longi qua ad inguen innititur, hu-
 miliorem: qua uero exterius tendit, altiore esse
 cerit. nam si æquale sit, æqualemq; altitudinem ha-
 beat: perdifficile est, simul caput ipsius & inguine
 firmare, & supra caput femoris impellere, quod in
 hac luxatione inguine altius euasit.

57 Postea dum crus extēditur, siue pistil-
 lari fuisse, siue aliqua alia ex his extensioni-
 bus, simul et crus unā cum alligato ligno cir-
 cum gradū deorsum cōprimatur, & aliquis
 alius hominē supra articulū ad coxā detine-
 at, necesse est. nā ita sit, ut caput femoris &
 extensio eō redigatur, ut supra acerbū
 impendat: & molitione in pristina naturā
 retrudat. Hæc omnes cōmemorate neces-
 sitates ualidae sunt: omnesq; si quis recte &
 bene exerceat, calamitate sunt superiores.
 quemadmodū enim prius etiā diximus, ex
 imbecillioribus extensionibus uilioriq; ap-
 paratu luxatio hæc plerisq; restituitur.

Femore cum supra gradum translatus est humilior luxatus articulus efficitur: id quod est ad repositionem ualde accommodatum: cum acetabuli margo inferior femoris capite etiam fiat. nam cum luxatus articulus nisi marginē acetabuli transscendat, reuerti non queat, ea uero superius excesserit: si depressiore & humiliori eo facto extendamus, optimum est. laquei autem quibus intentio fit uel ad pistillarem aliquem fustem deligandi sunt: qui ima sui parte stabili alicui morae in terra obiectus offerretur. uel si huiusmodi fuste uti nolueris, axi qui in scamno est ad pedes, intendentium habentur capita circūjicies. hoc enim significauit cum inquit - siue aliqua alia ex his extēsiōibus - ex his uidelicet antedictis, a pistillari ligno distinctis. Quæ subsequuntur, perspicua sunt.

58 At uero si in exteriorem partem caput femoris prolapsum sit, hinc et illinc tali quodam modo, sicut dictum est, extensiones fiunt. molitio uero lato uectē simul cū extensione ab exteriore parte in interiorē impellendo adhibetur: ita ut ad ipsam clunē uel paulo superius uectis statuatur. alius uero ab altera coxa ad clunē etiam ipse, ne recedat corpus, uel manibus, uel altero aliquo huiusmodi uectē accommodata alicui fossulæ offirmato, reniti debet: ac simul femoris luxati partē quæ ad genu est, ab interiori parte in exteriorē sensim promouere. Suspensio huic luxationis modo nō cōuenit. cubitus enim appēsi hominis femoris caput ex acetabulo extruderet. molitionē tamē cū subiecto ligno, ut huic quoque luxatiōis modo cōpeteret, machinari quispiā posset, si extrinsecus id applicaret. Sed quid plura? nā si recte & bene extēdamus, & recte restituiamur, quis articulus ita prolapsus non restituitur?

Si ualde quispiam crus extenderit, neque uectis molitione opus erit. manus enim nostræ sufficiēt quibus totum femoris caput extrinsecus ad clunē apprehensum propellere eatenus facile possumus, quoad ē directio ad acetabulum deueniat. teretem autem uectem ad huiusmodi molitionem esse ineptum manifestū est: quippe cum etiam latus officio desit: nisi talis ea parte sit qua clunem comprehendit, qualem faciendā esse eam iussit quæ *ἔκφυς*, id est spatularis crepido appellatur. ipse enim ita inquit - ita ut ad ipsam clunem uel paulo superius uectis statuatur - si itaque paulo superius statuendus est, resimus aliquantulum ad comprehendendam partem illam non prorsus rectus esse debet. Cetera clara omnia sunt.

59 Si uero in posteriorem partem excidit femur, extensiones ita, sicut dictū est, faciendæ sunt: tantū stragulo multiplici, quo molissimū sit, lignū insternendum: homoque su-

pra pronus collocandus est. simul autē cum extensione asserere non secus atque in gibbero sis faciebamus, deprimere debemus: sic ut alsis ē directio ad natē, & magis inferiorē quā superiorem coxarum partem constituatur. incisio uero in pariete ad asserem excipientdam non recta, sed paululū ad pedes inclinata faciendā est. Hæc repositio & ex natura maxime huius luxationis modi, & ualidissima præterea est. loco asseris fortasse factis esset, si insideret aliquis, aut manibus cōniteretur, aut inscendens quoque repente simul dum extenditur, calce impēderet. Alia nulla ex prædictis ex natura huius prolapsionis modi repositio est.

Hæc quoque quæ de modo hoc luxationis tradit, aperta sunt omnia, si quis quæ antea dicta sunt, memoria teneat. uult enim hūc nō ut priores supinū, sed in utrē collocari. ea siquidē prona figura proculdubio est, deinde forti adhibita extēsiōe a posteriore parte in priorē articulū propellī. nam posterior pars desuper, prior infra in hac cubatione statuitur. unde oportet eum qui reponit, deorsum femoris caput detrudere: id quod oppressio per asserē cumulatissime præstat. posset tamē id recte etiam facere quispiā, si supra eminentiā uolēter insideret. quanquā nisi suę natis protuberatione supra luxatū caput innitatur, egroto nihil proderit. Hoc igitur opus uiri diligentia & prudentia requirit.

60 Quod si in anteriorem partem promotio contigerit, extensionū idem modus adhibendus est. uir autē debet qui & manibus quam ualidissimus, & quæperitissimus sit, uola alterius manus ad inguē impressā, atque altera manu ea cōprehensā simul & prolapsionē deorsum cōpellere, & femur ad genu in anteriorē partē trahere. Hic repositionis modus maxime ex natura huius luxationis est. Sed & suspensio prope ad naturam accedit. in ea tamen oportet hominem qui appenditur, peritū rei esse: ut non cubiti molitione articulū retrudat, sed ad mediū inters femineū, & ad os sacrū appensionē faciat.

Cum ad quartam luxationis coxæ differentiam deuenieris, apertissime omnia de ea cōmemorat: & præcipue si eorum meminierimus, quæ etiam superius comprehensa sunt: ut nobis nihil hic præter propositum nugandum esse uideatur.

61 Qui etiam per utrē reponere hūc articulum tentauit, laudī est. nōnullos tamē uidī, qui ob imperitiā extra & retro factas luxationes per utrē reponere conarētur: neque aduerterēt se eo modo ejicere magis articulū quam restituere. nam qui id primus cōmen-

tus est, ad ea proculdubio quæ in interiorē partem prolapsa fuerant, repositionem per utrem adhibere tentauit. sciendum tamen est, multa alia ad hoc utre esse præstiora. uter uero flaccidus & uacuus intra femora coniiciendus, sic ut quàm intimam in partē potest, ad interfemineū ingerat: deinde femoribus à patellis usq; ad eorū dimidiū fascia producta inter se colligatis, per partem solutam follis ex officina fabri inferendus est, atq; inflatus: sic ut uter uiolenter distendatur. homo autē in latus cubare, læsumq; crus habere in superiore parte debet. atq; apparatus quidem huiuscemodi est. sed pleriq; peius quàm ego nūc dixi, instruuntur. nam neq; ad multam partē femora deligat, sed tantum genua: neq; insuper extendunt, insuper enim extendendū est. nihilominus tamen aliqui hoc etiā pacto facilē rem nacti reposuerūt. At hoc modo compellere non recte se habet. uter enim dum inflatur, partes suas tumidiore ad caput femoris quod emoliendum est, minime habet: sed infra ipsum, cum in medio femorū, uel inferius etiā à medio collocatus sit. adde q; femora etiā curua natura sunt: in superiore enim parte carnosae & inter se coeuntia, in inferiore sub siccanæ & tenuiora: ita ut femorum etiā natura ac forma utrem ab opportunissimo loco depellat, ac deiciat, q; si paruum utrē inseras, exigua uis ad cōpellēdum articulum erit imbecilla. Quocirca si utre utendū est, ad multā partē femora inter se sunt colliganda: & simul cū extensione corporis uter inflandus. utraq; uero crura in hoc reponendi modo ad finem simul deliganda sunt.

Hunc quoq; per utrem reponendi modum licet non probet: docet tamen qua ratione eo optime uti quispiā posset, plane omnia persequutus.

62 Cæterū illud in tota arte in primis studendum tibi est: ut quod ægrotat, sanū reddas: siq; multis modis ad sanitatem restituere id liceat, eum eligas qui molestia magis careat. hoc enim sicut ad uirum bonum magis spectat, ita quoq; est artificiosius: si populo gratū fucum non affectes. de quo igitur est sermo, tales nonnullæ domesticæ extensiones corporis esse possunt: ut ex præsentibus facile omnia expendantur.

Hæc extrema eius oratio est qua monet, ut facilitatem eorum quæ ad curationem spectant, secū

mur: ut etiam si neq; scannū, neq; aliud quippiam ex antedictis affuerit, simile aliquid nos ipsi exco-gitemus: de quibus deinceps adeo aperte omnia exposuit, ut nulla uel breuissima explanatione opus iam sit. quod tamē obscurius paulo esse mihi uidebitur, ascribam.

63 Nam si uincula lorea mollia & mitia nō ad sint, sed uel ferrea, uel armamenta, uel fustes, prius fascijs debemus, aut pannorū læneorū segmētis eū locū maxime, quē uincula occupatura sunt, circūuoluere, & multo etiā amplius: deinde uinculis ita deligare.

Nauis funes ὀπλὰς, id est armamēta appellat: id quod etiā Homerus eo uersu declarat, cū inquit: Veliuolæ sub porticibus tunc forte iacebat Armamentum illuc. Nunc igitur Hippocrates nomine armamentorū, nauium rudentes & funes intelligit: ceteros funes quibus in urbibus & agris utunt, cōmuni funis appellatione cōprehendit.

64 Tum in lecto qui ualidissimus & maximus sit ex præsentibus recte homo extendendus est, hoc pacto. lecti fulcra quæ uel ad pedes, uel ad caput sunt, ad limē ianuæ aut intus aut foris prout cōtulerit, offirmari debent. deinde ad altera fulcra lignū quadrangulū per transuersum apponendū, quod à fulcro ad fulcrū pertingat: siq; id parū sit, ad fulcra est alligandū: sin magnū, ita relinquendū. postea initia uinculorū tam à capite, quàm à pedibus utraq; ad pistillum, aut tale aliquod lignū sunt deliganda: ita ut uincula directe ad corpus respōdeant, uel paulo etiā superius sint. pistilla uero erecta atq; alterū ad limen, alterū ad lignū illud appositum obiecta, ac retro adducta, extensionem absoluūt. tametsi loco & liminis & ligni apppositi scala lecto subiecta quæ ualidos gradus habeat, sufficere potest: ut pistillis hinc & inde ad cōpetētes gradus firmatis extensionē faciamus. Femoris articulus si in interiorē aut anteriorē partē exciderit, reponitur etiā in hunc modum. supra scalam in terra defixam homo insidens collocandus est: tū sano crure eius leniter porrecto, atq; quod pertigerit, alligato: ex læso aut testaceū uas aqua plenū, aut sportula lapidib. referta appēdēda est. Alter repositionis modus si interiorē in partē facta luxatio sit. Inter duas colūnas cāterius moderata altitudine hinc inde deligat, præmineat autē una pars canterij, pro magnitudine natū: deinde supra canterium ea parte homo pectori stragulo circūuoluto insidens collocatur: pectoreq;

eius ad columnam lato aliquo uinculo alligato sanū crus ne circumuagetur ab aliquo detinetur: laeso uero pondus aliquod quod congruat, sicut etiam prius dictum est, appenditur. Primum igitur sciendum est, omnium ossium iuncturas plerumque ex capite & acetabulo constare, in quibusdamque sedem acetabularem & ob longam: in nonnullis pupillarem esse, semper autem omnes elapsi articuli maxime quidem extemplo dum adhuc calidi sunt, reponi debent: sin minus, quam citissime, nam & qui reponit, facilius et citius reponit: et qui ægrotat, leuius repositionem prius quam intumuerit, tolerat, prius autē semper ubi repositurus aliquos articulos es, præmollire ac præagitare leniter eos te oportet, facilius enim ita ingredi consueuerunt, in omnibusque repositionibus articuloꝝ maxime in maximis & repositu difficillimis: in paruis uero & facilibus minimū attenuāduꝝ homo est.

DE DIGITORVM LUXATIONE.

65 Si uero digitorū articulus excidat, siue primus qui manus est, siue secundus, siue tertius: idē & æqualis repositionis modus est. maximi tamē repositu difficiliores semper sunt, luxantur autem hi in quatuor partes, sursum & deorsum & alterutrum in latus, sursum maxime, in latera minimum: atque idum uehementius mouentur, ex alterutra autem parte in quam excesserunt, quasi crepido quædam eminet. Si igitur in superiorem aut inferiorem partem prolapsus articulus sit, quia leuior hac sedes est, quam à lateribus, paruamque excedēs articulus transgressionē fecit: facilis repositio est. Eius modus hic est. Dignū summitate aut fasciola, aut alia aliqua huiusmodi re circumuoluta, ne si in extendendo eam apprehēderis, elabatur: alter manu supra primam partē palmæ, alter summo digito circumuoluto apprehenso in diuersa ad se uterque extendant, tum simul prolapsum articulum in sedem repellant. Si in latus excidit, idem quidem extensionis modus adhibetur, in qua ubi iam transcendisse lineam uisus articulus fuerit, confestim simul cum extensione in sedē repellendus est, quod cum fit, alius aliquis ab altera parte obseruare ac reniti debet, ne in eam delabatur, moderate etiā reponunt di-

gitalia quæ ex palmis textuntur, quas *σάβας* uocant: si hinc & inde digitum, extendendo altera manu digitale, altera primam palmæ partem apprehendas, posteaque reposeris, linteis tenuissimis quam celerrime deligandum est, quæ cerato neque liquido & molli, neque nimis duro illita sint, durum enim à digito abhæsit: liquidum cum digitus calefit, euanescit & perit, tertio aut quarto post die resoluendum, frequentius, si inflammatio ne patiatur articulus: sin minus, rarius. Sed hæc de omnibus articulis dicta sint, digiti articulus quartodecimo die constituitur: ac digitorum manus & pedis eadem curationis ratio est, in omnibus autē articuloꝝ repositionibus attenuatione & inedia usque ad septimum diem utendum est, sique inflammatio adsit, frequentius: si non adsit, rarius resoluendum, semperque affectus articulus & quiescere, & quam optima figuraione esse collocatus debet.

DE GENU LUXATIONE.

66 Genu cubiti gibbo ob expeditā facilius naturam benignius est: unde etiam facilius excidit: atque in interiorē partem sæpius: sed & in exteriorē & posteriorem aliquādo, cuius repositiones fiunt uel ex repentina cōflexione, uel ex calcitatione: uel conuolutā fasciæ molem in poplitem ponito, & circum illam corpus ita ad flectendū genua in terram dimittito, potest etiam si moderate extendatur, cum in posteriorem partem prolapsum est, non secus ac cubitus, reuerti, cum uero hac uel illac excessit, ex cōflexione uel ex calcitatione reconditur. Restitutio tamē quæ extensione moderata fit, cōmunis omnibus est, Si non redierit genu, cum retro quidē excessit, cōflecti nequit: sed neque admodum id potest, cum alias in partes excidit, femoris uero et tibiæ pars anterior imminuitur: si interius prolapsum est, ualgiores euadunt: & exterior pars minuitur, si exterius, magis uari, & minus claudī efficiuntur, crassiore osse gestatur: hisque ab interiore parte imminutio fit, ijs autē qui ab ortu, aut in auctione luxationem hanc patiuntur, eo modo quo superius diximus, res cedit.

DE MALLEOLO.

67 Articuli circa malleolos luxationes ualida extensione uel manu uel alijs huiusmodi adhibita

adhibita indigēt, directioneꝫ quæ simul utraꝫ efficiat, sed hoc cōmune omnibus est.

DE PEDE.

68 Quæ in pede cōtingunt sicut in manu curantur. Qui uero cum tibia cōmunicatio nem habent articuli, si exciderint aut ab ortu aut in auctione, sicut in manu repositio nem expetunt. Quicūq; autem desilientes ex alto uehementer calce innixi sunt, sicut ossa dissederint, & uenæ humores effuderint, & nerui fuerint contusi, atq; hæc graui ter euenerint: periculum n̄s est ne os sidera tū toto aūo negotia faceſſat. obtorta enim ossa euadunt, & nerui inter se cōmunicatio nē habēt. quibus itē ex uulnere, uel in tibia, uel in femore, uel ex absolutione neruorū q cōmunicant cum his, uel ex negligenti cubatione calx denigrata fuerit: n̄s rebellatio nes cōtingunt: & interdum ad siderationē febres superueniunt acutæ, singultuosæ, mentem attentantes, & quæ celerem mortem afferant: uenarum item sanguifluarum liuores. Rebellantium ac recrudentium no tæ sunt: si exuccata & denigrata, uicinaꝫ his, subdura & subrubra sint. Si enim cum duritia liuida euaserint, ne nigrescant, peris

culum est. si subliuida, uel etiā liuida sugil lata fuerint, mollia tamen & diffusa, uel sub uiridia et mollia, in omnibus huiusmodi bona signa præ se ferunt. Curatio horum hæc est. si absit febris, ueratrum est exhibēdum: si adsit, dandū non est: sed loco potus mella est præbenda si opus sit. deligatio quæ articulorum est, conuenit: deligandaꝫ omnia magis sunt, ad cōtusiones sicut pluribus lin teis & mollioribus utendum ita minus cō primendum est: pleraꝫ calci circūuoluen da. Figuratio ea est seruanda quam deliga tio requirit, ne uidelicet in calcem deprimatur: ferulis utendū non est. At quibuscunq; pes uel ipse exceſſerit uel cum appēdice (in interiorem autem partem magis excidit) n̄s si non reuerſus sit, & coxa & femur & ea ti biæ pars tēporis processu attenuatur quæ è regione luxationis est, repositio eadē quæ & primæ partis palmæ: ualidaꝫ extensio adhibetur. curatio, quæ articulis conuenit si quiescant, minus quā in manu recrudescit. quiescentibus uero tenuior uictus exhibēdus est. Quæ autē ab ortu aut in auctione cōtingunt, sicut superius cōprehensum est. Deest explanatio.

SEXTI TOMI FINIS.

SERIES CHARTARVM.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ABCDEF
GHIKLMNOPQRSTVXYZ.

Omnēs sunt terniones.

BASILEAE, APVD HIER. FROBENIVM ET NIC.
EPISCOPIVM M D XLIX



